ENTOMOLOGIAE
SYSTEMATICAE
EMENDATAE ET AUCTAE.

TOM. I. PARS II

46. CRIOCERIS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla bifida.
Labium corneum, integrum.
Antennae filiformes.

1. C. fulva elytris pallidis: margine omni fulvo. 2 *tuberculata.*
Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.
Scutellum fuscum. Pedes fulvi plantis fuscis.
Variat tuberculis coleoptrorum duobus versus apicem approximatis, elevatis, fulvis. An varietas sexus?

2. C. flava elytris nigris apice rufescentibus. 2 *dentata.*
Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.
Tuberculum parvum elevatum ad futuram uti in praecedente. Plantae omnes nigrae.

3. C. rufa capite nigro, elytris violaceis. *melanocephala.*
Habitat in nova Hollandia Musc. Dom. Banks.
Antennae nigrae. Thorax punctis duobus impressis, dorsalibus. Scutellum rufum. Pedes nigri femoribus rufis.

4. C. violacea capite thorace pedibusque rufis. *cantharoides.*
Habitat in Anglia Musc. Britann.
Antennae fuscae basi rufescentes.

Crioceris corpus oblongum, immarginatum, glabrum, tardum, saepius laeviusculum, nitidulum, capite rotundato, inferto, oculis lateralibus, rotundatis, prominulis, antennis approximatis, frontalibus, inter oculos insertis, thorace brevi, transverso, vix marginato, planiusculo, scutello parvo, rotundato, elytris molliusculis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus validis, mediocribus, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

4 maculata. 5. C. pallida elytrorum maculis duabus abdomineque atris.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Muſ. Dom. Banks.

Antennae fuſcae. Thorax linea dorſali impreſſa. Elytra laevia maculis duabus, altera ad baſin, altera pone medium. Subtus pallida abdomine atro.

6punctata. 6. C. nigricans thorace pallido, elytris albidis: punctis ſex nigris.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Muſ. Dom. Banks.

Statura omnino praecedentis. Caput nigrum. Antennae nigrae baſi pallidae. Thorax laevis, pallidus, nitidus. Elytra laevia, albida punctis ſex nigris 2. 2. 2. Pectus nigrum. Abdomen pallidum. Pedes nigri femoribus baſi pallidis.

variegata. 7. C. nigra thorace elytrorumque lunula margine faſciisque duabus pallidis.

Habitat Cajennae Muſ. D. Boſc.

Statura omnino praecedentium. Antennae pallidae, medio nigrae. Caput atrum, omnino immaculatum. Thorax laevis, glaber, nitidus, pallidus, immaculatus. Elytra laevia, atra lunula baſeos ad ſuturam, margine exteriori toto faſciisque duabus, altera in medio abbreviata, altera verius apicem lunata pallidis. Corpus nigrum abdomine pedibusque pallidis.

pygmea. 8. C. rufa capite abdomineque atris.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Minuta, tota rufa capite abdomineque atris.

teſtacea. 9. C. nigra capite thorace elytris pedibusque teſtaceis.

Habitat in India orientali Dom. Vahl.

Antennae teſtaceae.

ochreata. 10. C. teſtacea pectore tibiisque nigris.

Habitat in Inſula Guadelupe D. de Badier.

Media. Antennae teſtaceae ultimo articulo nigro. Caput, thorax elytraque laevia, teſtacea, nitida, immaculata. Scutellum nigrum. Pectus nigrum. Abdomen teſtaceum. Pedes teſtacei tibiis nigris.

11. C. nigra elytrorum margine, antennis pedibusque flavis. *Betulae.*

Habitat in Lapponiae Betula Muſ. Dom. de Paykull.

Caput, thorax rotundatus elytraque nigra. Faemina vitta ſuturali elytrorum ferruginea. Antennae margo elytrorum & pedes flava.

12. C. capite thoraceque fulvis, elytris pedibusque teſtaceis. *fulvicollis.*

Act. hiſt. nat. Pariſ. 1.

Crioceris pallida oculis nigris Geoff. Inſ. 1. 242. 6.

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Paullo major C. Betulae. Antennae fuſcae primo articulo rufo. Caput fulvum margine poſtico nigricante. Thorax glaber, laevis, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, teſtacea. Corpus obſcurum pube cineraſcente. Pedes teſtacei.

13. C. nigra thorace elytrisque pallidis immaculatis. *minuta.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Caput nigrum puncto baſeos pallido. Elytra laevia.

14. C. nigra capite thoraceque ferrugineis, elytris viridibus. *erythrocephala.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Antennae nigrae. Caput obſcure ferrugineum puncto baſeos nigro. Thorax laevis puncto medio nigro. Elytra laevia. Pedes nigri.

15. C. nigra elytris maculis duabus teſtaceis, thorace cylindrico. *4 puſtulata.*

Habitat in Siam Muſ. Dom. Banks.

Major C. merdigera. Thorax puncto utrinque impreſſo. Elytra laevia punctis duobus altero baſeos, altero pone medium.

impreſſa. 16. C. atra elytris rubris, thorace cylindrico utrinque ſubimpreſſo.

Habitat in Siam Muſ. Dom. Banks.

Elytra ſtriato punctata. Pedes nigri femoribus ſubclavatis.

brunnea. 17. C. ferruginea antennis pectore abdominisque baſi nigris, thorace cylindrico utrinque impreſſo.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & ſumma affinitas C. merdigerae. Caput rufum antennis oculisque nigris. Thorax cylindricus utrinque impreſſus, rufus. Elytra vix punctata, rufa, immaculata. Corpus nigrum ano rufo. Pedes ruſi.

retuſa. 18. C. thorace utrinque impreſſo ferrugineo, elytris teſtaceis: lineola baſeos atra.

Habitat in Inſula Guadeloupe Muſ. Dom. Boſc.

Statura & magnitudo omnino C. merdigerae. Antennae nigrae apice ferrugineae. Caput atrum, immaculatum. Thorax rotundatus, utrinque impreſſus, ferrugineus, immaculatus. Elytra ſtriato punctata, teſtacea lineola ante marginem baſeos nigra. Sutura etiam baſi nigricat. Pectus nigrum. Abdomen & pedes rufa.

merdigera. 19. C. ſupra rubra thorace cylindrico utrinque impreſſo.

Crioceris rubra Geoff. Inſ. 1. 239. 1.

Chryſomela merdigera Linn. ſyſt. nat. 2. 599. 97. Fn. Sv. 563.

Degeer Inſ. 5. 338. 43.

Reaum. Inſ. 3. tab. 17. fig. 12.

Sulz. hiſt. Inſ. tab. 3. fig. 14.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 4.
Habitat in Europae Convallaria.
Habitu ab hoc genere differt, vix tamen diſtinguenda.

20. C. thorace cylindrico rubra elytris punctis ſex nigris. *12punctata.*
Crioceris Geoff. Inſ. 1. 241. 2. tab. 4. fig. 5.
Chryſomela 12 punctata Linn. ſyſt. nat. 2. 601. 110. Fn. Sv. 568.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 5.
Friſh. Inſ. 13. tab. 28.
Habitat in Europae Aſparago.

21. C. thorace cylindrico fulvo: punctis quinque nigris, elytris flavis: punctis ſeptem. *14punctata.*
Attelabus 14 punctatus Scop. carn. 116.
Habitat in Germania Dr. Schulz.
Caput fulvum ore, antennis punctoque verticali nigris. Thorax punctis quinque 4. 1. Elytra pallidiora punctis 1. 2. 2. 1. 1. quorum ſextum magis transverſum, ſeptimum terminale. Abdomen & femora fulva.

22. C. thorace cylindrico rufo, elytris flavis: faſciis duabus nigris. *ruficollis.*
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Caput atrum antennis apice rufis. Elytra punctato ſtriata faſciis duabus, altera baſeos, altera pone medium. Pectus nigrum. Abdomen pedesque flaveſcentia.

23. C. nigra thorace rufo, coleoptris flaveſcentibus: maculis quinque nigris. *5punctata.*
Habitat in Germania Dr. Schulz.
Antennae nigrae. Thorax gibbus. Elytra glabra, laevia, puncto altero baſeos, altero apicis & quinto communi in medio dorſi. Pedes nigri.

[illegible]rata. 24. C. flavescens thorace rufo, elytris albis: maculis quinque nigris.
Habitat Cajennae Dr. Schulz.
Caput testaceum ore oculisque nigris. Antennae subferrugineae. Elytra alba maculis tribus baseos, exteriori elongata, lineari & duabus versus apicem nigris. Pedes albi.

praeusta. 25. C. thorace cylindrico rufa, elytris apice atris.
Habitat — — Musf. Dom. Lund.
Statura omnino praecedentium. Corpus totum rufum, immaculatum folis elytrorum apicibus atris. Thorax cylindricus linea media transversa, impressa. Pedes rufi. Alae obscurae.

unifasciata 26. C. thorace cylindrico rufa, elytris fascia atra.
Habitat in nova Hollandia Musf. D. Banks.
Nimis sequenti affinis. Differt tantum basi elytrorum haud atra sed rufa.

[illegible]fasciata. 27. C. thorace cylindrico rufa, elytris fasciis duabus atris.
Habitat in nova Hollandia Musf. D. Banks.
Antennae nigrae basi rufae. Fascia altera elytrorum baseos, altera versus apicem. Pedes rufi plantis fuscis.

nigripes. 28. C. thorace cylindrico flava, antennis pectore pedibusque nigris.
Habitat in nova Hollandia Musf. D. Banks.
Antennae nigrae. Thorax utrinque impressus. Pectus pedesque nigra.

grisea. 29. C. pallida capite femoribusque ferrugineis, antennis tibiisque nigris.
Habitat ad Cap. Bon. spei Musf. Dom. Banks.
Caput ferrugineum antennis nigris. Elytra laevia. Corpus pallidum nigro varium. Pedes nigri femoribus rufis.

30. C. thorace cylindrico flava, elytris baſi nigris: puncto flavo. *oculata.*
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae flavae longitudine corporis. Elytra vix ſtriata, flava, baſi nigra: puncto magno flavo. Pectus nigrum. Abdomen flavum. Pedes flavi femoribus nigris.

31. C. teſtacea thorace immaculato, elytris maculis duabus ocellaribus albis. *bioculata.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Antennae nigrae baſi ferrugineae. Macula anterior elytrorum puncto antico nigro, poſterior pone medium annulo nigro cincta. Tibiae fuſcae.

32. C. thorace ſubcylindrico pallida antennis nigris. *pallens.*
Habitat — — Muſ. Dom. Banks.
Caput magis obſcurum antennis elongatis, nigris. Pedes pallidi.

33. C. cyanea elytris flavis: maculis duabus cyaneis. *fucata.*
Habitat in Inſula St. Bartholomaei Americae meridionalis Dom. de Paykull.
Caput fuſcum antennis flavis. Corpus cyaneum abdomine flavo. Pedes obſcuri femoribus cyaneis.

34. C. viridi aenea nitida elytris teſtaceis: maculis duabus cyaneis. *aulica.*
Melyris aulicus Oliv. Inſ. 2. 21. 7. 6. t. 1. f. 4.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Antennae fuſcae. Os teſtaceum. Macula elytrorum poſtica major. Pedes teſtacei femoribus aeneis.

35. C. coerulea thorace cylindrico: lateribus gibbis. Geoff. Inſ. 1. 343. 5. *cyanella.*
Chryſomela cyanella Linn. ſyſt. nat. 2. 600. 104. Fu. Sv. 572.

Herbſt Arch. tab. 23. fig. 34.
Degeer Inſ. 5. 340. 44.
Habitat in Europae plantis.

melanopa. 36. C. coerulea thorace pedibusque rufis.
Chryſomela melanopa Linn. ſyſt. nat. 2. 601. 105.
Fn. Sv. 573.
Sulz. Inſ. 3. tab. 3. fig. 19.
Degeer Inſ. 5. 342. 46.
Habitat in Europa boreali.

flavipes. 37. C. nigra thorace pedibusque flavis.
Chryſomela flavipes Linn. ſyſt. nat. 2. 601. 106.
Habitat in Germania.
Affinis C. melanopae.

ſubſpinoſa. 38. C. oblonga nigra capite thorace pedibusque rufis, thorace ſpinoſo.
Habitat in Europae Betula Muſ. Dom. Banks.
Antennae nigrae, baſi rufae. Thorax ſubpunctatus. Elytra punctata. Abdomen nigrum. Pedes rufi.

rufipes. 39. C. atra nitida antennarum baſi pedibusque flavis.
Habitat in Saxoniae fruticibus D. Romanus.
Antennae nigrae baſi flaveſcentes. Corpus totum atrum pedibus ſolis flavis.
Mera varietas C. flavipedis obſervante Helwigio.

cyanocephala. 40. C. cyanea thorace rufo, antennis pedibusque fuſcis.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Thorax planus, glaber.

Aſparagi. 41. C. thorace rubro: punctis duobus nigris, coleoptris flavis: cruce punctisque quatuor nigris Geoff. Inſ. 1. 241. 3.
Chryſomela Aſparagi Linn. ſyſt. nat. 2. 601. 112.
Fn. Sv. 567.
Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 9. 10.
Roeſſ. Inſ. 2. Scarab. 3. tab. 4.

Friſh. Inſ. 1. 27. tab. 6.
Habitat in Europa Aſparagos devaſtans.

42. C. nigro violacea elytris ſtriatis. *violacea.*
Galleruca nigro violacea Geoff. Inſ. 1. 254. 6.
Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.
Statura omnino C. Phellandrii corpore oblongo plano toto nigro violaceo. Antennae apice craſſiores. Forte proprii generis.

43. C. nigra thoracis margine elytrorumque lineis duabus flavis Naturf. 24. tab. 1. fig. 24. *Phellandrii.*
Chryſomela Phellandrii Linn. ſyſt. nat. 2. 601. 111. Fn. Sv. 569. Geoff. Inſ. 1. 266. 20.
Degeer Inſ. 5. 324. 25. tab. 9. fig. 34.
Habitat ad Phellandrii aquatici radices.

44. C. nigro coeruleſcens thoracis limbo rufo, elytris punctis tribus: poſticis margine flavo connexis. *campeſtris.*
Chryſomela campeſtris Linn. ſyſt. nat. 2. 602. 113.
Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 9. 10.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 107. 273.
Habitat in Europa auſtraliori D. de Schlanbuſch.
Caput cum antennis nigrum. Thoracis limbus rufus. Elytra punctato ſtriata.
Variat thorace toto rufo.

45. C. elongata nigra elytris vitta flava. *elongata.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Reliquis longior, nigra, viridi colore parum nitens.

46. C. pallida thorace maculis tribus, elytris ſtriis tribus abbreviatis nigris. *trilineata.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Os antennarumque baſis pallida. Maculae thoracis fere coeuntes. Corpus pallidum pectore plantisque nigris.

47. C. capite thoraceque teſtaceis, elytris brunneis: margine lineola baſeos faſciaque media flavis. *equeſtris.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Antennae flavescentes. Corpus nigrum pedibus flavescentibus.

vittata. 48. C. thorace rufo, elytris flavis: vitta nigra.
Ciftela melanocephala Mant. Inf. 1. 86. 22.
Petiv. Gazoph. tab. 17. fig. 11.
Habitat in Carolina Muf. Dom. Monfon.
Caput nigrum antennis bafi pallidis. Thorax rotundatus, glaber. Abdomen nigrum. Pedes flavescentes geniculis nigris.

innuba. 49. C. atra thorace ferrugineo, elytris margine vittaque futurali flavis.
Ciftela innuba Mant. Inf. 1. 86. 23.
Habitat in Americae Infulis.
Caput atrum antennis ferrugineis. Thorax marginatus. Elytra ftriata. Corpus atrum pedibus ferrugineis.

4 maculata. 50. C. thorace rufo, elytris teftaceis: maculis duabus atris.
Chryfomela 4 maculata Mant. Inf. 1. 75. 111.
Chryfomela 4 maculata Herbft Arch.
Habitat in Germania auftraliori.
Media. Caput nigrum antennis teftaceis. Pectus teftaceum. Abdomen nigrum pedibus teftaceis.

47. GALLERUCA. *Palpi* fex: articulo ultimo acuto.
Labium bifidum.
Antennae filiformes.

2 maculata. 1. G. atra elytris teftaceis: macula atra.
Chryfomela binaculata Mant. Inf. 1. 73. 87.
Habitat in America Dom. Drury.
Abdomen atrum ano teftaceo. Pedes atri.

2. G. teſtacea ſubtus nigra. *teſtacea.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. D. Banks.
Diſtincta omnino a reliquis ſpeciebus. Antennae fuſcae baſi teſtaceae. Corpus ſupra teſtaceum, immaculatum, laeve, nitidum, ſubtus nigrum ſegmentorum abdominis marginibus teſtaceis.

3. G. atra elytris faſciis tribus flavis. *faſciata.*
Chryſomela faſciata Mant. Inſ. 1. 73. 88.
Habitat in America Dom. Drury.
Antennae nigrae baſi pallidae. Caput atrum margine poſtico pallido. Elytra laevia, atra faſcia baſeos, altera in medio & tertia ante apicem latis flavis. Abdomen atrum ano flavo. Pedes atri femoribus apice tibiisque flavis.

4. G. viridi aenea thorace pedibusque rufis Geoff. Inſ. 1. 263. 16. *ruficollis.*
Chryſomela ruficollis Mant. Inſ. 1. 73. 89.
Habitat in Anglia Dom. Lee.
Antennae rufae apice fuſcae. Caput aeneum ore rufo. Corpus viride pedibus rufis.

5. G. punctata viridi aenea antennis pedibusque flavis. *flavicornis.*
Chryſomela flavicornis Mant. Inſ. 1. 73. 90.
Erotylus flavipes Mant. Inſ. 1. 92. 22.

Gallerucae corpus oblongum, glabrum, depreſſiuſculum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotundato, inferto, oculis rotundatis, lateralibus, prominulis, antennis approximatis, ante oculos infertis, thorace rotundato, brevi, ſcutello parvo, rotundato, elytris rigidis, planiuſculis, longitudine abdominis, pedibus mediocribus, validis, femoribus poſticis ſæpe incraſſatis, ſaltatoriis, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae flavae. Caput & thorax punctata. Elytra ſtriato punctata & ſere crenata. Corpus viridi aeneum pedibus flavis.

crenata. 6. G. ſubtus aenea ſupra cuprea, antennis flavis: articulo quinto ultimoque fuſcis.

Chryſomela crenata Mant. Inſ. 1. 73. 91.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Caput & thorax punctata obſcure cuprea. Elytra ſtriata ſtriis punctatis. Corpus aeneum pedibus concoloribus.

littoralis. 7. G. atra elytris porcatis.

Galleruca atro fuſca. Geoff. Inſ. 1. 252. 1. tab. 4. fig. 6.

Chryſomela littoralis Mant. Inſ. 1. 73. 92.

Habitat ad Europae auſtralioris littora.

G. Tanaceti major, atra, immaculata. Elytra lineis quatuor elevatis poſtice coeuntibus interjectis punctis impreſſis, numeroſis.

Cajennenſis 8. G. atra capite thorace femoribusque quatuor anticis obſcure rufis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Caput rufum ore antennisque nigris. Thorax in medio impreſſus, rufus. Elytra laevia, atra. Corpus atrum pectoris margine rufo.

nigripennis. 9. G. pallida capite elytrisque cyaneo nigris.

Habitat Surinami Muſ. D. Boſc.

Statura et magnitudo G. cajennenſis. Antennae nigrae articulo primo pallido, apice nigro. Caput canaliculatum, nigrum, parum cyaneo nitidum. Thorax transverſus, brevis, obſcure pallidus, immaculatus. Elytra laevia, obſcura, nigra margine inprimis cyaneo, nitido. Corpus obſcure pallidum. Pedes nigri femoribus ſubtus pallidis.

10. G. nigra punctata elytris coriaceis. Linn. syst. nat. 2. 587. 5. Fn. Sv. 507. *Tanaceti.*
Degeer Inf. 5. 299. 4. tab. 8. fig. 27.
Chrysomela Tanaceti Mant. Inf. 1. 74. 94.
Roeff. Inf. 2. Scarab. 3. tab. 5.
Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 14.
Merian Inf. Europ. tab. 68.
Habitat in Europae Tanaceto.
Os maxillis palpisque. Palpi sex breves, subaequales, filiformes: articulo ultimo acuminato, anteriores crassi, biarculati: articulis aequalibus, ultimo acutiusculo adhaerentes maxillae dorso, intermedii paullo longiores, quadriarticulati: articulo, secundo longiori, ultimo acuto ad basin exteriorem anteriorum adnati, posteriores triarticulati, incurvi: articulo ultimo acuto adnati labii medio inferiori. Mandibula brevis, crassa, incurva, cornea, apice tridentata. Maxilla brevis, membranea, obtusa, integra. Labium breviſſimum membranaceum, bifidum, laciniis aequalibus, conniventibus.

11. G. oblonga nigra thorace elytrisque griseis. *rustica.*
Galleruca fusca. Geoff. Inf. 1. 253. 1. β.
Chrysomela rustica Act. Hallens. 1. 274. Mant. Inf. 1. 74. 95.
Habitat in Germaniae fruticibus.
Affinis certe C. Tanaceti. Elytra punctata lineis tribus elevatis multo distinctioribus.

12. G. oblonga thorace flavescente, elytris viridibus: punctis sex nigris. *12 punctata.*
Chrysomela 12 punctata Mant. Inf. 1. 74. 96.
Habitat — —
Caput nigrum antennarum articulo secundo tertioque virescentibus. Thorax flavescens puncto utrinque impresso. Elytra virescentia punctis

fex nigris per paria diſpoſitis. Pectus nigrum. Abdomen & pedes flaveſcentia.

Alni. 13. G. oblonga violacea elytris vage punctatis, pedibus antennisque nigris Geoff. Inſ. 1. 132. 1.
Chryſomela Alni Mant. Inſ. 174. 97.
Linn. ſyſt. nat. 2. 587. 9. Fn. Sv. 511.
Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 6.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 79. 199.
Degeer Inſ. 5. 314. 21. tab. 9. fig. 18.
Sulz. hiſt. Inſ. tab. 3. fig. 13.
Friſh. Inſ. 7. 13. tab. 8.
Habitat in Europae Betula Alno.

Jamaicenſis. 14. G. oblonga cyanea antennis pedibusque nigris.
Habitat in Jamaica Muſ. Dom. Lund.
Affinis C. Alni at alia & minor. Antennae nigrae. Thorax & elytra cyanea, nitida, immaculata. Abdomen obſcurum. Pedes nigri.

Abſinthii. 15. G. oblonga pallida thorace macula, elytris lineis tribus nigris.
Chryſomela Abſinthii Mant. Inſ. 1. 74. 98.
Chryſomela Abſinthii Pall. Icon. 2. 725. 70.
Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.
Caput pallidum baſi nigrum. Thorax pallidus macula media nigra. Elytra pallida lineis tribus atris, quae tamen nec baſin nec apicem attingunt, exteriores apice coeunt. Pedes ferruginei geniculis nigris.

concolor. 16. G. flaveſcens nitida oculis fuſcis.
Chryſomela concolor Mant. Inſ. 104. 99.
Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. D. Banks.
Corpus totum pallide flaveſcens, omnino concolor, nitidum.

guadelupenſis. 17. G. atra elytris fuſcis: limbo flaveſcente.
Habitat in Inſula Guadeloupe de Badier.
Media. Caput & thorax atra, nitida, immaculata

Thorax poſtice utrinque macula impreſſa. Elytra laevia, punctato ſtriata, fuſca margine omni ſive limbo flaveſcente. Corpus & pedes nigra. Abdomen ruſeſcens.

18. G. picea pedibus teſtaceis. *picea.*
Chryſomela picea Mant. Inſ. 1. 74. 100.
Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. D. Banks.
Corpus glabrum, obſcure ferrugineum, nitidum. Thorax puncto utrinque impreſſo. Pedes pallide teſtacei.

19. G. violacea elytris punctato ſtriatis Geoff. Inſ. 1. 264. 17. *Betulae.*
Chryſomela Betulae Mant. Inſ. 1. 74. 101. Linn. ſyſt. nat. 2. 587. 10. Fn. Sv. 514.
Degeer Inſ. 5. 318. 24. tab. 9. fig. 3. a. b.
Roeſſ. Inſ. 2. Scarab. 3. tab. 1.
Habitat in Betulae albae foliis paginam inferiorem exedens.

20. G. thorace fulvo viridi punctato, elytris viridibus nitidis, abdomine nigro. *tricolor.*
Chryſomela tricolor Mant. Inſ. 1. 74. 102.
Habitat — — Muſ. Dom Banks.
Caput viride ore fulvo antennisque fuſcis. Thorax laevis, nitens, fulvus punctis quinque baſeos viridibus 4. 1. Elytra laevia. Pectus fulvum. Abdomen nigrum cinereo ſubtomentoſum. Pedes fulvi.

21. G. nigra elytris pedibusque teſtaceis. *livida.*
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura omnino Crioceris lividae. Caput nigrum ore livido. Thorax niger, immaculatus. Elytra laevia, ſubvilloſa, teſtacea. Corpus nigrum pedibus teſtaceis.
Variat colore obſcuriore.

Vitellinae. 22. G. coerulea aut viridis elytris punctato ſtriatis, ano ruſo.

Chryſomela Vitellinae Mant. 1. 74. 103. Linn. ſyſt. nat. 2. 589. 23. Fn. Sv. 519.

Degeer Inſ. 5. 323. 27.

Roeſ. Inſ. 2. Scarab. 3. tab. 1.

β. Chryſomela vulgatiſſima Mant. Inſ. 1. 75. 104. Linn. ſyſt. nat 2. 589. 22. Fn. Sv. 517.

Degeer Inſ. 5. 317. 23.

Habitat in Europae Salicibus frequens.

Larvae foetentes, flavae, nigro punctatae capite caudaque nigris in turmis paralelis foliorum pulpam exedunt.

ruficauda. 23. G. nigra elytris viridibus, ano ruſo.

Chryſomela ruficauda Thunb. Diſſ.

Habitat — — Muſ. Dom. Boſc.

Media. Antennae, caput & thorax nigra, obſcura thoracis margine incraſſato. Elytra obſolete punctata, obſcure viridia, nitidula. Corpus ſubtus nigro aeneum abdominis margine apice rubro.

Avicenniae. 24. G. ferruginea elytris cyaneis.

Habitat in Americae meridionalis Avicenniis Dr. Iſert.

Parva. Antennae nigrae baſi ferrugineae. Caput & thorax laevia, ferruginea, nitida, immaculata. Elytra laevia, cyanea, nitida. Corpus & pedes ferruginea.

Lactucae. 25. G. capite thoraceque obſcure ferrugineis, elytris nigro aeneis.

Chryſomela Lactucae Mant. Inſ. 1. 75. 105.

Habitat Dresdae Muſ. Dom. Romani.

Elytra punctato ſtriata. Abdomen nigrum. Pedes ferruginei.

26. G. viridis nitida elytris aeneis. *Raphani.*
Chryſomela aenea Mant. Inſ. 1. 75. 106.
Herbſt Arch. tab. 23. fig. 21.
Habitat in Betula, Alno, Raphano.

27. G. atra elytris ſtriato punctatis, tibiis apice unidentatis. *calcarata.*
Habitat in Germania Muſ. D. de Loewenſkiold.
Statura & magnitudo omnino C. coccineae. Antennae nigrae baſi pallidae. Thorax transverſus, laevis, ater margine punctato. Elytra punctato ſtriata, atra, immaculata. Pedes nigri tibiis omnibus apice unidentatis.

28. G. atra elytris punctato ſtriatis, antennis pedibusque flavis. *punctulata.*
Habitat in Germania Muſ. D. de Loewenſkiold.
Statura & magnitudo omnino praecedentis. Antennae flaveſcentes, apice fuſcae. Caput atrum ore flaveſcente. Thorax punctatus, ater. Elytra ſtriato punctata, atra, immaculata. Corpus nigrum pedibus flaveſcentibus.

29. G. nigra antennis thorace abdomine pedibusque flaveſcentibus. *morbilloſa.*
Habitat in Germania Muſ. D. de Loewenſkiold.
Statura praecedentium. Caput nigrum. Antennae flaveſcentes apice nigrae. Thorax punctatus, rufus, immaculatus. Elytra punctato ſtriata, nigra margine hinc inde rufo. Abdomen & pedes flaveſcentes.

30. G. ſanguinea thorace immaculato, elytris punctis tribus nigris. *cruenta.*
Chryſomela cruenta Mant. Inſ. 1. 75. 108.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Banks.
Elytra laevia, ſanguinea puncto unico baſeos parique in medio nigris. Corpus pallidius ſanguineum.

coccinea. 31. G. thorace marginato ſanguineo: macula nigra, elytris ſanguineis: maculis duabus nigris Naturf. 24. 14. 20. tab. 1. fig. 20.
Chryſomela coccinea Mant. Inſ. 1. 75. 109. Linn. ſyſt. nat. 2. 592. 43. Fn. Sv. 532.
Degeer Inſ. 5. 301. 10. tab. 9. fig. 1.
Habitat in Europae boreâlis Corylo.

cruciata. 32. G. rubra coleoptris cruce nigra.
Chryſomela cruciata Schall. Act. Hall. 1. 273.
Habitat Halae Saxonum.
Caput obſcurum antennis nigris. Coleoptra laevia ſutura faſciaque lata media atris. Corpus ruſum abdominis baſi nigra. Pedes nigri.

4puſtulata. 33. G. nigra thoracis margine elytrorum maculis duabus pedibusque ruſis.
Habitat in Germaniae Lycoperdis Dom. Hybner, in Italia Dr. Allioni.
Paullo minor C. coccinea. Caput cum antennis nigrum. Thorax laevis, niger, nitidus margine ſubreflexo, obſcure ruſo. Elytra laevia, nigra maculis duabus magnis ruſis, altera baſeos, altera apicis. Corpus nigrum pedibus ruſis.

Boviſtae. 34. G. atra nitida antennis pedibusque ferrugineis.
Habitat in Germaniae Lycoperdo Boviſta Dom. Helwig.
Statura & magnitudo omnino praecedentis. Antennae moniliformes hujus generis, rufae. Caput atrum, nitidum. Thorax ater, nitidus margine ſubreflexo. Elytra atra, laevia, nitida. Pedes ferruginei.

4 maculata. 35. G. thorace teſtaceo immaculata, elytris teſtaceis: maculis duabus nigris.
Chryſomela 4 maculata Mant. 1. 75. 111.
Habitat in nemoribus Kilonienſibus Dom. Lund.
Caput teſtaceum baſi inter oculos nigrum. Tho-

rax rotundatus. Elytra laevia maculis duabus magnis, altera baſeos rotundata, altera pone medium transverſali fere faſciam conſtituente. Abdomen atrum. Pedes teſtacei.

36. G. viridiaenea thoracis marginibus albis, elytris albis: maculis decem aeneis. *20 punctata.*
Chryſomela 20 punctata Mant. Inſ. 1. 75. 112.
Bergſtr. Nom. 1. 87. tab. 13. fig.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 4. tab. 51. fig. 7.
Habitat in Anglia, Italia.
Sutura elytrorum aenea. Maculae oblongae.

37. G. capite thoraceque flaveſcentibus nigro maculatis, elytris griſeis, corpore nigro. *triloba.*
Crioceris triloba Mant. Inſ. 1. 86. 1.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Caput flaveſcens macula baſeos antennisque nigris. Thorax flaveſcens maculis tribus nigris intermedia triloba.

38. G. griſea thorace linea dorſali, elytris puncto baſeos nigris. *lineola.*
Crioceris lineola Mant. Inſ. 1. 86. 2.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Caput griſeum antennis nigris. Thoracis latera ſubangulata. Corpus fuſcum, cinereo pubeſcens.

39. G. fuſca elytrorum margine prominulo flaveſcente. *Nymphaeae.*
Crioceris Nympheae Mant. Inſ. 1. 86. 3.
Chryſomela Nympheae Linn. ſyſt. nat. 2.600.99.
Fn. Sv. 565.
Galleruca Geoff. Inſ. 254. 4.
Degeer Inſ. 4. 326. 31. tab. 20. fig. 1. 2.
Habitat in Europae Nymphaeis.

40. G. thorace nigro maculato elytrisque griſeis, antennis nigris. *Capreae.*
Crioceris capreae Mant. Inſ. 1. 86. 4.

Chryſomela Capreae Linn. ſyſt. nat. 2. 600. 100.
Fn. Sv. 516.
Galleruca Geoff. Inſ. 1. 254. 5.
Degeer Inſ. 5. 325. 30.
Habitat in Europae Salicibus.
Abdomen nigrum.

cincta. 41. G. pallida elytrorum margine omni atro.
Crioceris cincta Mant. Inſ. 1. 86. 5.
Hybn. Naturf. 24 42. 7. tab. 1. fig. 6-8.
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.
Antennae ſingulares articulo ſecundo minuto, globoſo, tertio utrinque ſpinoſo, quarto & quinto impreſſo, extrorſum emarginato. Elytra futura omni lineaque marginali poſtice interrupta nigris.

palliata. 42. G. lutea elytris nigris.
Crioceris palliata Mant. Inſ. 1. 87. 6.
Chryſomela palliata oblonga lutea, oculis elytrisque nigris Act. Hall. 1. 279.
Hybn. Naturf. 24. 44. 9. tab. 2. fig. 10.
Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Ceraſi. 43. G. nigra thorace rufo, elytris pallidis: margine nigro.
Chryſomela Ceraſi Linn. ſyſt. nat. 2. 600. 101.
Habitat in Sueciae Ceraſo Dom. de Paykull.
Caput atrum puncto frontali ferrugineo, obſoleto. Antennae cinereae. Thorax glaber, rufus. Elytra pallida margine nigro. Pedes ferruginei.

livida. 44. G. livida antennis fuſcis.
Habitat in Selandia Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Statura praecedentium. Corpus totum laeve, glabrum, obſcure lividum, immaculatum antennis ſolis fuſcis.

melanura. 45. G. ſubteſtacea elytris apice abdomineque fuſcis.
Habitat in Suecia Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Statura praecedentis at paullo minor. Antennae teſtaceae apice nigrae. Caput, thorax, pedes laevia, glabra, nitida, teſtacea Elytra magis livida apice nigra.

46. G. ovata cinerea elytris vitta lineolaque baſeos nigris. *calmarienſis.*
Chryſomela calmarienſis Mant. Inſ. 1. 87. 7. Linn. ſyſt. nat. 2. 600. 101. Geoff. Inſ. 1. 253. 3.
Habitat in Europae Salice.
Thorax nigro variegatus.

47. G. flava antennis abdomineque fuſcis: ano flavo Hybn. Naturf. 24. 43. 8. tab. 2. fig. 9. *abdominalis.*
Chryſomela abdominalis Mant. Inſ. 1. 87. 8.
Habitat in India & Cap. Bon. ſpei.
Maxillae nigrae.

48. G. nigra obſcura pedibus ferrugineis. *Morio.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Antennarum baſis pedesque ferruginei.

49. G. rufa antennis oculisque nigris. *ſanguinea.*
Crioceris ſanguinea Mant. Inſ. 1. 87. 10.
Habitat Halae Saxonum Dom. Schaller.
Abdomen nigrum pedibus cinereis.

50. G. ferruginea thorace elytrorumque margine flavis. *tenella.*
Chryſomela tenella Linn. ſyſt. nat. 2. 600. 102. Fn. Sv. 564.
Crioceris tenella Mant. Inſ. 1. 87. 11.
Habitat in Europae Salice.
Affinis G. cupreae at minor.

51. G. fuſca capite thoraceque flavis nigro maculatis. *picta.*
Crioceris picta Mant. Inſ. 1. 87. 12.
Habitat in India Muſ. Dr. Hunter.
Antennae pallidae nigro lineatae. Caput flavum linea dorſali nigra. Thorax flavus linea dorſali

puncto parvo utrinque ad lineam dorsalem & alio ad marginem exteriorem nigris. Elytra & corpus fusca.

denticornis. 52. G. nigra thorace elytrorum margine punctis duobus fasciaque ferrugineis.

Habitat in Dolicho Sinensi Americae meridionalis Dr. Pflug.

Media. Antennae singulares, rufae articulo tertio majori, late emarginato. Caput nigrum. Thorax laevis, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, nigra margine anteriori puncto magno baseos, fascia media, punctoque apicis ferrugineis. Corpus nigrum. Pedes rufi femoribus posticis apice nigris.

nigricornis. 53. G. flavescens capitis basi elytrisque aeneis, antennis nigris.

Crioceris nigricornis Mant. Inf. 1. 87. 13.

Chrysomela Halensis Linn. syst. nat. 2. 589. 20.

Herbst Arch. tab. 45. fig. 5.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Caput flavescens basi aeneum antennis nigris. Thorax puncto utrinque impresso. Pectus utrinque puncto nigro. Elytra aenea, glabra, nitida. Abdomen flavescens.

thoracica. 54. G. saltatoria flava thorace nigro punctato, elytris violaceis.

Chrysomela thoracica Mant. Inf. 1. 75. 113.

Habitat in America Dom. Lee.

Thorax flavus punctis sex nigris. Elytra laevia, violacea margine imprimis baseos flavo. Pedes nigri femoribus flavis, posticis incrassatis obscurioribus.

caroliniana 55. G. saltatoria flavescens thorace punctis duobus, coleoptris vittis quinque nigris.

Chrysomela Caroliniana Mant. Inf. 1. 75. 114.

Habitat in Carolina Dom. Drury.

Caput flavum antennis oculisque nigris. Elytra flava vitta nigra ad marginem exteriorem, altera in medio elytri & tertia communi per futuram. Femora poſtica incraſſata, ferruginea.

56. G. ſaltatoria ferruginea coleoptrorum diſco atro. *diſcoidea.*

Habitat in America boreali.

Magna in hac familia. Antennae nigrae. Corpus glabrum, laeve, nitidum, pallide ferrugineum coleoptrorum diſco atro, immaculato. Pedes nigri femoribus pallide ferrugineis.

57. G. ſaltatoria thorace pallido: punctis tribus nigris, elytris nigris: vittis duabus albis. *glabrata.*

Chryſomela glabrata Mant. Inſ. 1. 76. 115.

Habitat in Jamaicae Myrto Pimenta Dr. Schwarz.

Caput nigrum fronte alba. Elytra glabra, nitida vittis duabus albis, quae apice coeunt. Margo elytrorum omnis niger. Abdomen fuſceſcens lateribus albis. Femora poſtica incraſſata, fuſca margine interiori pallido.

58. G. ſaltatoria pallida antennis tibiisque nigris. *pallens.*

Habitat in Inſula Guadeloupe Dom. de Badier.

Statura praecedentium. Caput pallidum antennis nigris baſi pallidis. Thorax & elytra glabra, laevia, nitida, pallida, immaculata. Corpus pallidum. Pedes nigri femoribus pallidis.

59. G. ſaltatoria ferruginea thorace elytrorumque maculis duabus albis. *2 guttata.*

Chryſomela biguttata Mant. Inſ. 1. 76. 116.

Habitat in America boreali D. Drury.

Antennae nigrae. Caput ferrugineum fronte alba. Pedes ferruginei.

60. G. ſaltatoria ferruginea thorace albo, elytris atris: punctis quatuor albis. *4 guttata.*

Chryſomela 4 guttata Mant. Inſ. 1. 76. 117.

Habitat Cajennae Dr. Schulz.
Affinis praecedenti at puncta elytrorum quatuor magna diſtincta.

equeſtris. 61. G. ſaltatoria thorace elytrisque albis: margine baſeos faſciaque media ferrugineis.
Chryſomela equeſtris Mant. Inſ. 1. 76. 118.
Habitat in America Muſ. Dr. Hunter.
Caput cum antennis nigrum puncto albo inter antennas. Elytra alba, nitida margine baſeos faſciaque lata media ferrugineis cupro nitidis. Corpus fuſcum.

cincta. 62. G. ſaltatoria nigra elytris viridi aeneis: margine punctisque duobus albis.
Chryſomela cincta Mant. Inſ. 1. 76. 119.
Habitat in Luſitania Dr. Gray.
Caput nigrum. Thorax obſcure aeneus margine albo. Margo & anticus & poſticus in medio albus.

picta. 63. G. ſaltatoria flava elytris nigro maculatis.
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Magna. Corpus flaveſcens. Antennae ſubferrugineae. Caput & thorax laevia, immaculata. Elytra laevia, flava baſi punctis duobus parvis, tunc macula transverſa, denique punctis duobus parvis & tandem quinque majoribus 2. 2. 1. Pedes ferruginei.

nobilitata. 64. G. ſaltatoria ferruginea elytrorum margine faſciaque albis.
Chryſomela nobilitata Mant. Inſ. 1. 76. 120.
Hybn. Naturf. 24. 411. 5. tab. 2. fig. 4.
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Thoracis limbus albus.

quadri-faſciata. 65. G. ſaltatoria ferruginea elytris ſtrigis quatuor albis.
Chryſomela 4 faſciata Mant. Inſ. 1. 76. 121.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Caput puncto verticali antennisque nigris. Thorax obsolete albo varius. Elytra glabra, nitida striga prima in ipsa basi, quarta undata.

66. G. saltatoria nigra thorace albo, elytris obscure violaceis: punctis quatuor albis; interiori lineari. *albicollis.*
Chrysomela albicollis Mant. Ins. 1. 76. 122.
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Caput macula magna frontali alba. Elytra obscure violacea puncto interiori ad suturam lineari, obliquo.

67. G. saltatoria flavescens elytris fasciis duabus nigris. *2fasciata.*
Habitat in Guineae Aquapim Dr. Isert.
Parva. Caput ferrugineum antennis flavescentibus. Thorax flavescens margine antico parum ferrugineo. Elytra laevia, flavescentia fasciis duabus nigris, altera baseos, altera pone medium. Corpus flavescens.

68. G. saltatoria flavescens elytris viridibus: margine pallido. *famelica.*
Chrysomela famelica Mant. Ins. 1. 76. 123.
Habitat in America Dom. Drury.
Antennae nigrae. Caput & thorax mox maculata, mox immaculata. Tibiae fuscae.

69. G. saltatoria rufa elytris femoribusque posticis coeruleis. *bicolor.*
Chrysomela bicolor Mant. Ins. 176. 124. Linn. syst. nat. 2. 593. 52.
Degeer Ins. 5. 357. 12. tab. 16. fig. 20.
Habitat in Cytiso Cajan Americes Dr. Isert.

70. G. saltatoria viridi aenea elytris violaceis, pedibus flavis. *aestuans.*
Habitat in Americae merid. Insulis D. Smidt.

Media. Antennae nigrae baſi flavae. Caput & thorax aenea, nitida ore flavo. Elytra laevia, violacea, nitida. Pedes omnes flavi.

Volkameriae 71. G. ſaltatoria rufa elytris coeruleis.
Habitat in Volkameria aculeata Americae merid. Dr. Pflug.
Parva. Caput, thorax, corpus, pedes rufa, immaculata. Elytra vix ſtriata, coerulea, immaculata. Antennae fuſcae.

calida. 72. G. ſaltatoria nigra thorace viridiaeneo, elytris violaceis.
Habitat in Americae merid. Inſulis Dr. Pflug.
Corpus magnum, nigrum. Caput cum antennis nigrum, Thorax laevis, viridi aeneus, nitidus. Elytra laevia, violacea, nitida, immaculata. Pedes nigri.

aequinoctialis. 73. G. ſaltatoria thorace rubro, elytris violaceis: maculis quatuor albis alternis.
Chryſomela aequinoctialis Mant. Inſ. 1. 775. 125. Linn. ſyſt. nat. 2. 596. 71.
Degeer Inſ. 5. 356. 11. tab. 16. fig. 19.
Habitat in America meridionali.

oleracea. 74. G. ſaltatoria viridi aenea.
Chryſomela oleracea Mant. Inſ. 77. 126. Linn. ſyſt. nat. 2. 593. 51. Fn. Sv. 534.
Degeer Inſ. 5. 344. 49.
Habitat in Cotyledonibus plantarum inprimis Tetradynamiſtarum.
Pellitur cineribus vegetabilium inprimis Tabaci.

Erucae. 75. G. ſaltatoria coerulea nitida antennis nigris.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Affinis certe C. oleraceae at alia, & diſtincta, tota glabra, cyanea, nitida, immaculata antennis ſolis nigris. Femora poſtica incraſſata.

76. G. saltatoria thorace pallido, elytris aeneis: maculis duabus fasciaque aureis. *albicollis.*
Chrysomela albicollis Mant. Ins. 1. 77. 127.
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.
Caput nigrum antennis basi pallidis. Elytra glabra, nitida, aenea punctis duobus fasciaque media aureis. Abdomen nigrum. Pedes pallidi femoribus posticis nigris.

77. G. saltatoria thorace rufescente, elytris pallidis: futura maculisque duabus nigris. *fulvicollis.*
Chrysomela fulvicollis Mant. Ins. 1. 77. 128.
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.
Caput atrum, nitidum. Thorax rufescens margine pallidiore. Elytra laevia, nitida, pallida futura, quae postice puncto majori terminatur maculisque duabus altera baseos, altera medii magnis, atris. Subtus pallida geniculis pedum nigris. Femora postica rufa.

78. G. saltatoria coeruleo nigra antennarum basi pedibusque testaceis: femoribus posticis nigris. *Napi.*
Habitat in Germania Dom. Prof. Helwig.
Statura & magnitudo C. oleraceae. Antennae nigrae, basi rufae. Caput & thorax nigra, obscure nitida, laevia. Elytra punctato striata, concolora, nigra, immaculata. Pedes testacei femoribus posticis valde incrassatis, nigris.

79. G. saltatoria viridis nitida pedibus testaceis: femoribus posticis violaceis Geoff. Ins. 1. 248. 11. *Hyoscyami*
Chrysomela Hyoscyami Mant. Ins. 1. 77. 129.
Linn. syst. nat. 2. 594. 54. Fn. Sv. 536.
Degeer Ins. 5. 345. 51.
Habitat in Hyoscyamo, Brassica.

80. G. saltatoria viridiaenea pedibus nigris. *nigripes.*
Chrysomela nigripes Mant. Ins. 1. 77. 130.
Altica nigro aenea ovata. Geoff. Ins. 1. 246. 5.

Habitat in Anglia Muſ. Dr. Hunter.
Diſtincta a. C. Hyoſcyami pedibus nigris.

nitidula. 81. G. ſaltatoria viridis nitens capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis.
Chryſomela nitidula Mant. Inſ. 1. 77. 131. Linn. ſyſt. nat. 2. 594. 60. Fn. Sv. 542.
Altica nigro aurata. Geoff. Inſ. 1. 249. 13.
Degeer Inſ. 5. 346. 54.
Habitat in Europae ſalice.

Helxines. 82. G. ſaltatoria viridiaenea antennis fuſcis, pedibus teſtaceis.
Chryſomela Helxines Mant. Inſ. 1. 77. 132. Linn. ſyſt. nat. 2. 594. 58. Fn. Sv. 543.
Altica aurea Geoff. Inſ. 1. 249. 14.
Degeer Inſ. 5. 345. 52.
Sulz. Inſ. tab. 3. fig. 12.
Habitat in Polygono Fagopyro.

fulvicornis. 83. G. ſaltatoria aurea antennis pedibusque flavis.
Habitat in Suecia Dom. de Seheſtedt.
Statura parva G. nitidulae. Corpus totum aureum, nitidum antennis pedibusque flavis. Femora poſtica macula apicis nigra.

trifaſciata. 84. G. ſaltatoria ſupra albida: faſciis tribus fuſcis.
Chryſomela trifaſciata Mant. Inſ. 1. 77. 133. Linn. ſyſt. nat. 2. 594. 61.
Habitat in Europae plantis.
Faſcia unica capitis, duae elytrorum. Femora ruſa.

Modeeri. 85. G. ſaltatoria viridiaenea elytris macula poſtica pedibusque anticis flavis.
Chryſomela Modeeri Mant. Inſ. 1. 77. 134. Linn. ſyſt. nat. 2. 594. 57. Fn. Sv. 539.
Habitat in Europae plantis.

ſemiaenea. 86. G. ſaltatoria thorace aeneo, elytris punctatis nigris apice rufis.
Habitat in Germania Dom. Smidt.

Affinis G. *Modeeri* at magis oblonga. Antennae breviores, nigrae primo articulo rufo. Caput & thorax aenea, nitida, immaculata. Elytra punctata, nigra apice late rufa. Pedes rufi femoribus posticis nigris.

87. G. saltatoria atro coerulea capite geniculisque pedum rufis. *erythrocephala.*
Chrysomela erythrocephala Mant. Inf. 1. 77. 135. 56. Fn. Sv. 538.
Altica Geoff. Inf. 1. 246. 4.
Habitat in Europae plantis.

88. G. saltatoria atra thorace fulvo, elytris pallidis: margine omni atro. *Sisymbrii.*
Habitat Kiliae.
Statura & summa affinitas G. atricillae, at duplo fere major. Antennae basi pallidae apice nigrae. Caput & corpus atra. Thorax pallide fulvus. Elytra glabra, laevia, pallidiora, futura margineque nigris, qui tamen color apicem haud attingit. Pedes antici pallidi, postici nigri.

89. G. saltatoria nigra thorace elytrisque cinereis. *atricilla.*
Chrysomela atricilla Mant. Inf. 1. 77. 136. Linn. syst. nat. 2. 594. 55. Fn. Sv. 537.
Altica Geoff. Inf. 1. 251. 19.
Habitat in Europae plantis.

90. G. saltatoria atra elytris testaceis: margine omni nigro. *Nasturtii.*
Habitat in Holsatiae oleribus.
Differt manifeste a G. nemorum & magis affinis G. atricillae ejusdemque magnitudinis, tota atra elytris solis testaceis: margine omni nigro.

91. G. saltatoria nigra thorace elytrorumque margine pallidis. *dorsalis.*

Chryſomela dorſalis Mant. Inſ. 1. 77. 137.
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.
Mera forte varietas G. atricillae. Differt tantum dorſo elytrorum nigro.

anglica. 92. G. ſaltatoria atra elytris tibiisque pallidis.
Chryſomela anglica. Mant. Inſ. 1. 77. 138.
Habitat in Anglia Muſ. Dr. Hunter.
Affinis G. atricillae, at thorax ater. Tibiae pallidae.

4 puſtulata. 93. G. ſaltatoria nigra coleoptris lineolis quatuor flaveſcentibus.
Chryſomela 4 puſtulata Mant. Inſ. 1. 77. 139.
Altica Geoff. Inſ. 1. 250. 15.
Habitat in Angliae, Galliae hortis.
Lineola elytrorum altera ad baſin, altera ad apicem.

rufipes. 94. G. ſaltatoria coerulea capite thorace pedibus antennarumque baſi rufis.
Chryſomela rufipes Mant. Inſ. 1. 77. 140. Linn. ſyſt. nat. 2. 595. 65. Fn. Sv. 545.
Altica nigra Geoff. Inſ. 1. 245. 2.
Degeer Inſ. 5. 343. 47. tab. 10. fig. 11.
Schaeff. Icon. tab. 166. fig. 5.
Habitat in Europae Malva parvi flora.

fuſcipes. 95. G. ſaltatoria violacea capite thoraceque rufis, pedibus nigris.
Chryſomela fuſcipes Mant. Inſ. 1. 77. 141.
Habitat in Angliae Malvis.
Affinis praecedenti. Differt tantum pedibus nigris.

ruficornis. 96. G. ſaltatoria coerulea capite thorace antennis pedibusque rufis, elytris crenato ſtriatis.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura & magnitudo omnino G. rufipedis at alia. Antennae totae rufae. Thorax rufus.

nitidus linea transverſa poſtica, impreſſa. Elytra crenato ſtriata, coerulea. Pedes ruſi.

97. G. ſaltatoria ſubrotunda atra nitida antennis pedibusque nigris. *Mercurialis*
Habitat in Germaniae Mercuriali Prof. Helwig.
Corpus medium, reliquis magis rotundatum. Antennae nigrae. Caput, thorax, elytra laeviſſima, atra, nitida, immaculata. Pedes nigri femoribus poſticis incraſſatis.

98. G. ſaltatoria gibba cyanea nitida, antennis fuſcis. *adverſa.*
Habitat in America Dom. Smidt.
Media. Antennae totae fuſcae. Caput obſcure cyaneum ore ferrugineo. Thorax & elytra cyanea, nitida, immaculata. Pedes cyanei.

99. G. ſaltatoria teſtacea gibba elytris laeviſſimis. *teſtacea.*
Chryſomela teſtacea Mant. Inſ. 77. 142.
Altica Geoff. Inſ. 1. 250. 17.
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.
Differt ſane at G. exoleta. Major eſt & magis gibba, thorace elytrisque laeviſſimis. Antennae plantaeque fuſcae.

100. G. ſaltatoria ferruginea elytris ſtriatis. *exoleta.*
Chryſomela exoleta Mant. Inſ. 1. 78. 143.
Linn. ſyſt. nat. 2. 594. 59. Fn. Sv. 541.
Altica Geoff. Inſ. 1. 250. 16.
Degeer Inſ. 5. 338. 42.
Habitat in Echii floribus.

101. G. ſaltatoria nigra nitida elytris apice puncto rubro. *holſatica.*
Chryſomela holſatica Mant. Inſ. 1. 78. 144.
Linn. ſyſt. nat. 2. 595. 67. Fn. Sv. 544.
Habitat apud nos frequens olera depaſcens.

102. G. ſaltatoria pallida oculis nigris. *tabida.*
Chryſomela tabida Mant. Inſ. 1. 78. 145.
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.

Paullo minor C. exoleta pallida oculis nigris. Antennae apice fuſcae. Elytra laevia.

Braſſicae. 103. G. ſaltatoria atra elytris pallide teſtaceis: margine omni faſciaque media atris.
Habitat in Germaniae oleribus.
Antennae baſi pallidae. Pedes atri.

nemorum. 104. G. ſaltatoria atra elytris vitta longitudinali flava.
Chryſomela nemorum Mant. Inſ. 1. 78. 147. Linn. ſyſt. nat. 2. 595. 62. Fn. Sv. 543.
Altica Geoff. Inſ. 1. 247. 9.
Degeer Inſ. 5. 347. 55.
Sulz. hiſt. Inſ. tab. 3. fig. 11.
Habitat in Pulmonaria, Dentaria aliisque.

atra. 105. G. ſaltatoria atra nitida antennarum baſi pedibusque piceis.
Chryſomela atra Mant. Inſ. 1. 78. 148.
Altica nigra Geoff. Inſ. 1. 247. 8.
Habitat Hafniae.
Parva tota atra ſolis pedibus piceis.

Euphorbiae 106. G. ſaltatoria atra pedibus pallidis: femoribus poſticis nigris.
Altica Euphorbiae Schrank.
Habitat in Germaniae Euphorbia Dom. Smidt.
Statura & magnitudo C. atrae at magis nitida, parum aenea. Antennae nigrae baſi pallidae. Pedes pallidi femoribus poſticis valde incraſſatis, nigris.

haemiſphaerica. 107. G. ſaltatoria ſubborbiculata depreſſa nigra.
Chryſomela haemiſphaerica Mant. Inſ. 1. 78. 149. Linn. ſyſt. nat. 2. 595. 68.
Degeer Inſ. 5. 348. 56.
Habitat in Europae Corylo.

ſurinamenſis. 108. G. ſaltatoria flaveſcens elytris margine faſciaque ſanguineis.

Chryſomela ſurinamenſis Mant. Inſ. 1. 78. 150
Linn. ſyſt. nat. 2. 595. 69.
Degeer Inſ. 5. 355. 10. tab. 16. fig. 17.
Habitat Surinami.
Antennae & pedes pallidae.

109. G. ſaltatoria pallida elytris nigris linea longitudinali flexuoſa alba. *S. littera.*
Chryſomela S. littera Mant. Inſ. 1. 78. 151.
Linn. ſyſt. nat. 2. 595. 70.
Degeer Inſ. 5. 357. 13. tab. 16. fig. 21.
Habitat Surinami.

110. G. ſaltatoria viridi coerulea antennis nigris: primo articulo ferrugineo. *St. Crucis.*
Habitat in Inſula St. Crucis Americae D. Smidt.
Diſtincta omnino a G. Erucae triplo minor, tota viridi coerulea, nitida, laevis antennis ſolis nigris primo articulo ferrugineo.

111. G. ſaltatoria pallide teſtacea antennis nigris. *hortorum.*
Habitat in America meridionali Dom. Smidt.
Corpus minutum pallide teſtaceum, nitidum antennis ſolis nigris.

48. EROTYLUS. *Palpi* quatuor inæquales.
antici ſecuriformes.
poſtici clavati.
Labium corneum, apice dilatatum, emarginatum.
Antennae perfoliatae.

1. E. ovatus niger coleoptris punctis fulvis numeroſiſſimis. *giganteus.*
Chryſomela gigantea Linn. ſyſt. nat. 586. 1.
Oliv. Inſ. 80. tab. 1. fig. 6.

Degeer Inſ. 5. 349. 1. tab. 16. fig. 8.
Habitat in India.
Dorſum gibbum.

reticulatus. 2. E. ater elytris flavis nigro reticulatis.
Habitat in Braſilia Muſ. Dr. Hunter.
Corpus magnum, fere globoſum, atrum.

6faſciatus. 3. E. ovatus ater elytris faſciis ſex undatis fulvis: antica interrupta.
Habitat in America meridionali.
Corpus magnum, atrum, nitidum, immaculatum. Thorax planus maculis duabus dorſalibus impreſſis. Elytra faſciis ſex fulvis, quarum anterior interrupta, reliquae valde undatae.

hiſtrio. 4. E. ater elytris nigro flavoque faſciatis: macula baſeos apicisque coccinea.
Habitat Cajennae Muſ. Dr. Hunter.
Magnus, ater. Elytra punctata, atra faſciis tribus flavis nigro maculatis. Praeterea punctum flavum ad ſcutellum & macula coccinea ad marginem exteriorem baſeos & altera ad apicem.

teſtaceus. 5. E. teſtaceus antennis tibiisque nigris.
Habitat in America Dom. Drury.
Corpus gibbum, teſtaceum.

gibboſus. 6. E. niger elytris flaveſcentibus nigro punctatis: faſcia media poſticaque nigris.
Chryſomela gibboſa Linn. ſyſt. nat. 2. 586. 2.
Olivier Inſ. 89. tab. 1. fig. 4. at faſcia anterior interrupta.

Erotyli corpus ovatum, gibbum, glabrum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotundato, inferto, oculis rotundatis, lateralibus, vix prominulis, antennis ſub oculis inſertis, thorace planiuſculo, transverſo, ſcutello minuto, rotundato, elytris rigidis, gibbis, fornicatis, abdomine longioribus, pedibus longiuſculis, tenuibus, femoribus compreſſis, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

Herbſt Arch. tab. 23. fig. 3.
Amoenit. acad. 6. 393. 13.
Gronov. Zooph. 606. tab. 14. fig. 5.
Habitat in America meridionali.
Magnus. Thorax puncto utrinque impreſſo. Coleoptra valde gibba.

7. E. ater elytris faſcia media flava nigro maculata baſi rubro notatis. *notatus.*
Erotylus notatus Oliv. Inſ. 89. tab. 1. fig. 11.
Habitat Cajennae Muſ. D. Olivier.
Praecedentibus minor. Caput & thorax laevia, atra, immaculata. Elytra nigra punctis duobus approximatis baſeos rubris. In medio faſcia lata flava & in hac ſtrigae duae e punctis quadratis nigris anteriore quatuor, poſteriore tribus. Margo faſciae ferratus.

8. E. ater elytris flavo nigroque reticulatis: faſciis duabus atris. *concatenatus.*
Habitat — — Dr. Schulz.
Corpus magnum atrum.

9. E. ovatus elytris nigris: punctis quinque rubris Oliv. Inſ. 89. tab. 1. fig. 5. *5 punctatus*
Chryſomela 5 punctata Linn. ſyſt. nat. 2. 586. 3.
Petiv. Gazoph. 613. tab. 16. fig. 7.
Habitat in America meridionali.
Variat rarius punctis albis loco rubrorum.

10. E. niger elytris flavis: punctis numeroſiſſimis nigris. *punctatiſſimus.*
Habitat in America meridionali Dr. Hunter.
Elytra gibba. Corpus ſubtus piceum.

11. E. ater elytris punctatis medio fulvo maculatis. Oliv. Inſ. 89. tab. 1. fig. 7. *variegatus.*
Habitat Surinami Muſ. Dom. Banks.
Corpus totum atrum, haud gibboſum. Thorax punctis cicatriſantibus. Elytra punctata.

gemmatus. 12. E. ater elytris punctis fulvis numeroſiſſimis, thorace varioloſo.

Habitat Cajennae Muſ. D. Boſc.

Medius: Caput atrum. Thorax ater punctis varioloſis, cicatriſantibus, impreſſis. Elytra medio gibba, punctis fulvis in ſtrigas diſpoſitis. Corpus atrum.

longimanus 13. E. ater elytris faſciis atris flavisque alternis, pedibus anticis elongatis.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Thorax punctis duobus impreſſis. Elytra faſciis valde undatis nigris quinque, flaviis quatuor. Corpus atrum.

abdominalis. 14. E. ater elytris flavis: faſciis quatuor undatis punctoque diſtincto nigris.

Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.

Statura & magnitudo omnino E. faſciati. Caput & thorax glabra, laevia, atra, immaculata. Elytra flava faſciis quatuor valde undatis, atris, ultima terminali. Inter faſciam 2. 3. punctum diſtinctum, atrum. Corpus atrum abdomine flavo lineis duabus punctorum atrorum. Pedes atri.

faſciatus. 15. E. ater elytris faſciis tribus flaveſcentibus.

Habitat — — — — Dom. Drury.

Elytra faſciis tribus flavis nigrisque alternis, e quibus flava baſeos, nigra apicis. Alius minor e Braſilia in Muſeo Dom. Banks pedibus flavis vix diſtinctus.

Zebra. 16. E. flaveſcens capite, thoracis baſi faſciis tribus elytrorum pedibusque atris.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Scutellum atrum. Elytra faſciis tribus flavis nigrisque alternis, e quibus flava baſeos, nigra apicis.

17. E. niger coleoptris faſciis duabus flavis: anteriore nigro punctata. *alternans.*
Erotylus alternans Oliv. Inſ. 89. tab. 1. fig. 10.
Chryſomela Gronovii. Herbſt Arch. tab. 23. fig. 4.
Habitat — — Muſ. Britannicum.
Statura praecedentium. Caput, thorax, corpus glabra, atra, nitida. Elytra atra faſciis duabus dentatis, flavis, altera baſeos puncto uno alterove nigro, altera verſus apicem immaculata. Macula praeterea magna marginalis, flava pone faſciam poſticam.

18. E. niger elytris rubris immaculatis. *Surinamenſis.*
Coccinella ſurinamenſis Ent. Syſtem. 1. 266. 4. deleatur.
Coccinella ſurinamenſis Linn. ſyſt. nat. 2. 579. 2. Amoen. acad. 6. 393. 12.
Erotylus ſurinamenſis Oliv. Inſ. 89. tab. 1. fig. 9.
Habitat in America meridionali certe hujus generis.

19. E. oblongus ater immaculatus. *Morio.*
Habitat in nova Hollandia Muſ. D. Banks.
Elytra punctato ſtriata, viridi nitentia.

20. E. oblongus ater thoracis margine elytrorumque limbo flavo. *limbatus.*
Erotylus limbatus Oliv. Inſ. 89. tab. 2. fig.
Habitat Cajennae Muſ. D. Olivier.
Statura oblonga praecedentium. Antennae perfoliatae, nigrae. Caput flaveſcens macula frontali nigra. Thorax laevis, ater margine laterali lato, ſinuato, flavo. Elytra laevia, atra limbo omni lato flavo margine tamen futuraque tenuiſſime atris. Scutellum & corpus atra.

cupreus. 21. E. oblongus ater thorace elytrisque cupreis.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae nigrae. Elytra punctato ſtriata.

nebuloſus. 22. E. ater, thorace elytrisque ferrugineo variis.
Habitat in America meridionali Muſ. Dr. Hunter.
Caput cum antennis nigrum. Thorax glaber, rufus margine tenuiſſimo maculisque tribus dorſalibus, difformibus, connexis nigris. Elytra laevia, atra faſciis tribus undatis punctoque apicis ferrugineis. Faſcia baſeos nigro punctata.

dilatatus. 23. E. oblongus ater thorace elytrisque ferrugineis.
Habitat ad Cap Bon. ſpei Dom. Lee.
Antennae fuſcae baſi ferrugineae. Elytra corpore multo latiora, laevia.

ſmaragdulus. 24. E. oblongus ater elytris ſtriatis viridibus.
Habitat in nova Hollandia Muſ. D. Banks.
Elytra punctato ſtriata.

amethyſtinus. 25. E. oblongus ater thorace elytrisque cyaneis.
Habitat in nova Hollandia Muſ. D. Banks.
Praecedenti affinis. Frons retuſa. Elytra ſtriato punctata. Corpus atrum femoribus interdum rufis.

bicolor. 26. E. oblongus ater ſupra aeneus.
Habitat in nova Hollandia Muſ. D. Banks.
Caput aeneum antennis nigris. Elytra punctato ſtriata, obſcure aenea.

ruſipes. 27. E. oblongus niger pedibus piceis.
Habitat Kiliae Dom. Lund.
Praecedentibus minor. Antennarum primus articulus ferrugineus. Elytra ſtriata. Pedes picei geniculis nigris.

49. CEBRIO. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla membranacea, vix unidentata.
Labium apice palpigerum.
Antennae filiformes.

1. C. villoſus fuſcus elytris abdomine femoribusque teſtaceis. *gigas.*

Cebrio gigas Oliv. Inſ. 31. tab. 1. fig. 1.
Ciſtela gigas Mant. Inſ. 1. 84. 1.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 100. 256. tab. 7. fig. 9.
Habitat in Gallia auſtraliori Dr. Brouſſonet.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, filiformes, anteriores longiores, quadriarticulati: articulis ſubaequalibus, obconicis; ultimo obtuſo adhaerentes maxillae dorſo, poſteriores paullo breviores, triarticulati: articulis obconicis; ultimo obtuſo adnati labii apice. Mandibula elongata, tenuis, cornea, arcuata, edentula. Maxilla brevis, membranacea, apice rotundata vix unidentata. Labium breve, membranaceum, integrum, apice palpigerum. Antennae ſerratae.

Thorax dente poſtico utrinque prominet.

Variat elytris teſtaceis & fuſcis.

2. C. fuſcus elytris ſtriatis. *fuſcus.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. de Paykull.

Cebrio corpus elongatum, immarginatum, pubeſcens, agile, capite ovato, exſerto, oculis lateralibus, rotundatis, prominulis, antennis ſub oculis inſertis, thorace transverſo, poſtice latiori angulo utrinque porrecto, acuto, ſcutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus validis, femoribus craſſiuſculis, tarſis anticis quinque poſticis quadriarticulatis, colore obſcuro.

Statura & ſumma affinitas praecedentis & forte mera ejus varietas paullo minor. Caput et thorax anguſtiora & color totius corporis fuſcus, immaculatus.

50. CISTELA. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla unidentata.
Labium membranaceum, bifidum.
Antennae filiformes.

√ *cervina.* 1. C. livida pedibus fuſcis.
Chryſomela cervina Linn. ſyſt. nat. 2. 602. 115. Fn. Sv. 575.
Habitat in Europae plantis.

√ *cinerea.* 2. C. livida elytris pedibusque fuſcis.
Habitat in Germania, Italia.
Mera praecedentis varietas, obſervante Helwigio.

livida. 3. C. livida antennis fuſcis.
Habitat in Terra del Fuego Muſ. D. Banks.
Antennae fuſcae articulis ſuperne lividis. Thorax & elytra laevia.

√ *ceramboides* 4. C. atra thorace antice anguſtato, elytris ſtriatis teſtaceis.
Chryſomela ceramboides Linn. ſyſt. nat. 2. 602. 117. Fn. Sv. 576.
Herbſt Arch. tab. 23. fig. 27.

Ciſtelae corpus oblongum, ſubpubeſcens, immarginatum, agile, capite ovato, exſerto, oculis rotundatis, lateralibus, antennis ſub oculis inſertis, thorace vix marginato, ſaepe antice parum anguſtato, ſcutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus longiuſculis, tenuibus, femoribus compreſſis, tarſis anticis quinque poſticis quadriarticulatis, colore ſaepius obſcuro, rarius variegato aut nitido.

Mordella Geoff. Inf. 1. 354.
Habitat in Europa boreali.
Variat rarius thorace teſtaceo.

5. C. atra thorace quadrato, elytris ſtriatis teſtaceis. *lepturoides.* √
Ciſtela rufitarſis Leſk Reiſ. 1. 15. 5. tab. A. f. 4.
Habitat in Europae auſtralioris ſpicis ſecalinis Dom. de Seheſtedt.
Thorax omnino diverſus a praecedente transverſus, quadratus, paullo marginatus.

6. C. nigra thorace elytris abdomineque teſtaceis. *teſtacea.*
Habitat in Chryſanthemo, Sambuco aliisque Barbariae plantis Dom. Vahl.
Thorax punctis duobus dorſalibus impreſſis.

7. C. nigra thorace quadrato, elytris teſtaceis, antennarum baſi tibiisque piceis. *picipes.*
Habitat in Daniae plantis Dom. de Seheſtedt.
Statura & ſumma affinitas C. lepturoides, at duplo minor. Antennae nigrae baſi piceae. Caput & thorax quadratus, vix pubeſcens, nigra, immaculata. Elytra vix ſtriata, teſtacea, pedes nigri tibiis piceis.

8. C. flava elytris ſulphureis. *ſulphurea.* √
Chryſomela ſulphurea Linn. ſyſt. nat. 2. 602. 114.
Tenebrio lutea Geoff. Inf. 1. 351. 11.
Herbſt Arch. tab. 23. fig. 28.
Habitat in Europae floribus umbellatis.
Antennae fuſcae.

9. C. atra thorace ferrugineo, elytris ſtriatis. *ruficollis.* √
Habitat in Europae auſtralioris Santolina.
Antennae nigrae.

10. C. atra elytris ſtriatis coeruleſcentibus. *coerulea.*
Habitat in Barbariae plantis Dom. Vahl.
Differt a praecedente thorace atro & elytris coeruleſcentibus.

nigripennis. 11. C. ferruginea capite elytrisque ſtriatis nigris.
Habitat in Gallia meridionali.
Statura omnino C. ruficollis at corpus ruſum pectore nigricante.

analis. 12. C. rufeſcens antennis macula elytrorum anoque nigris.
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.
Antennae nigrae. Elytra rufa macula magna baſeos nigra.
Abdomen rufum ano nigro.
Variat elytris maculis duabus nigris, altera baſeos, altera verſus apicem.

rufipes. 13. C. nigra elytris laevibus, antennis pedibusque ferrugineis.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Nimis affinis C. varians, at paullo major, obſcure nigra antennis pedibusque ſolis ferrugineis. Thorax latior. Elytra vix ſtriata.

fulvipes. 14. C. nigra, elytris ſtriatis, pedibus ferrugineis.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Paullo minor praecedente. Antennae fuſcae primo articulo rufo. Caput & thorax laevia, nigra, immaculata. Elytra ſtriata nigra. Abdomen ferrugineum ano obſcuriore. Pedes ferruginei.
Variat abdomine nigro.

varians. 15. C. griſea oculis nigris, elytris ſubſtriatis.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
C. murina paullo major.

murina. 16. C. nigra elytris ſtriatis pedibusque teſtaceis.
Chryſomela murina Linn. ſyſt. nat. 2. 602. 118. Fn. Sv. 577.
Herbſt. Arch. tab. 23. fig. 29.
Mordella Geoff. Inſ. 1. 355. 4.
Habitat in Europae plantis.

17. C. teſtacea capite thoraceque fuſcis, elytris ſtriatis. *ferruginea.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Nimis affinis C. murinae at diſtincta & alia. Antennae fuſcae baſi ferrugineae. Caput & thorax fuſca interdum litura dorſali thoracis ferruginea, obſoleta. Elytra ſtriata, teſtacea. Abdomen & pedes ferruginea.

18. C. fuſca thorace pedibusque ferrugineis, elytris laevibus. *thoracica.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Magnitudo & ſtatura C. murinae. Antennae fuſcae, baſi rufeſcentes. Caput nigrum. Thorax laevis, ferrugineus. Elytra laevia, fuſca. Corpus fuſcum pedibus ferrugineis.

19. C. atra elytris nigris: macula baſeos flava, abdominis baſi pedibusque flavis. *flavipes.*

Habitat Muſ. Dom. Banks.

Nimis affinis C. humerali & forte mera ejus varietas. Caput & thorax laevia, atra, nitida, antennis obſcure ferrugineis. Elytra ſubſtriata, nigra macula magna baſeos flava. Pectus abdominis baſis pedesque flava.

20. C. teſtacea abdomine griſeo, elytris laevibus. *Evonymi.*

Habitat in Germaniae Evonymo Dom. Schneider.

Magnitudo & ſtatura omnino C. murinae. Antennae teſtaceae, apice fuſcae. Abdomen fuſcum.

21. C. nigra elytris puncto baſeos ferrugineo. *humeralis.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus nigrum, minime nitidum, ſubvilloſum. Tibiae teſtaceae.

22. C. atra elytris ſubſtriatis, antennarum baſi pedibusque ferrugineis. *maura.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Minor C. fulvipes. Antennae breviores, nigrae, basi ferrugineae. Caput nigrum ore ferrugineo. Thorax pubescens, niger, immaculatus. Elytra vix striata, nigra, immaculata. Corpus nigrum pedibus rufis.

pallipes. 23. C. nigra nitidula antennarum basi pedibusque pallidis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Duplo minor C. fulvipes. Antennae nigrae, basi pallidae. Caput & thorax nigra, immaculata. Elytra vix punctata, nigra, nitidula. Abdomen mox nigrum, mox ferrugineum. Pedes pallidi.

Mario. 24. C. nigra obscura pedibus testaceis.

Cistela gibbosa Thunberg. Diss.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Statura parva, angustata, oblonga. Pedes omnes testacei.

angustata. 25. C. thorace elytrisque obscure rufis medio nigris.

Habitat in Anglia Mus. D. Banks.

C. murina angustior. Caput nigrum antennis fuscis. Elytra ferruginea futura nigra. Abdomen ferrugineum linea media & laterali fuscis. Pedes ferruginei.

pallida. 26. C. pallida capite elytrorumque apicibus fuscis.

Habitat in Anglia Mus. Dr. Hunter.

Antennae fuscae. Pedes pallidi.

aeruginea. 27. C. flava capite pectoreque nigris, elytris viridibus.

Habitat in Aeschynomene floribus Africae, quos destruit.

Antennae basi virescentes, medio nigrae, apice flavae, ultimo tamen articulo nigro. Thorax & abdomen flava.

28. C. ferruginea elytris cyaneo viridibus: margine ferrugineo. *feſtiva.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Antennae fuſcae, baſi ferrugineae. Caput ruſum, baſi nigrum. Thorax glaber, nitidus, ſubpunctatus. Pedes apice nigri.

29. C. atra thorace ruſo, elytris cyaneis. *aulica.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Abdomen atrum ſegmentorum marginibus ruſis.

30. C. teſtacea elytrorum marginibus vittaque media nigris. *ſvittata.*
Habitat in Carolina Muſ. D. Monſon.
Corpus teſtaceum antennis ſerratis, nigris. Femora poſtica valde incraſſata, intus canaliculata.
Ad Chryſomelas ſaltatorias forte emendanda.

31. C. hirta capite thoraceque ruſis, elytris cyaneis. *hirta.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Antennae ſerratae, ferrugineae, apice fuſcae. Thorax hirtus, ferrugineus punctis duobus, dorſalibus, nigris. Corpus cyaneum pedibus ruſis.

32. C. pubeſcens griſea capite abdomineque fuſcis. *pubeſcens?*
Habitat in Dania Muſ. Dom. Lund.
Caput fuſcum antennis baſi ferrugineis. Thorax pubeſcens, griſeus, obſcurior. Elytra griſea, ſutura parum nigricante. Corpus nigrum pedibus griſeis.

33. C. ferruginea elytris flavis: lineolis tribus nigris. *ſexlineata.*
Habitat —— —— Muſ. Dom. Banks.
Antennae nigrae articulo primo baſi ultimisque tribus ferrugineis. Caput ferrugineum. Thorax pallidior, nitidus. Elytra laevia, nitida, flava lineolis tribus nigris, exterioribus duabus baſi coeuntibus, intermedia breviori. Subtus ferruginea pectore pedumque geniculis nigris.

51. ZYGIA. *Palpi* quatuor inaequales, filiformes.
Maxilla unidentata.
Labium elongatum, membranaceum.
Antennae moniliformes.

oblonga. 1. Zygia.
Habitat in Oriente Prof. Forſkahl.
Media, oblonga, rufa, capite elytrisque obſcure cyaneis. Thorax rotundatus, immarginatus, punctatus, carinatus. Scutellum rotundatum. Elytra rugoſa, obtuſa lineis elevatis tribus laevibus. Pedes inermes, rufi.

52. ZONITIS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla palpis longior, integra.
Labium emarginatum.
Antennae ſetaceae.

praeuſta. 1. Z. thorace mutico teſtacea antennis elytrorumque apicibus nigris.
Mylabris teſtacea Mant. Inſ. 1. 217. 8.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Antennae nigrae primo articulo teſtaceo. Caput inflexum, teſtaceum oculis nigris. Thorax pla-

---

Zonitis corpus oblongum, glabrum, laeve, immarginatum, agile, capite ovato, inflexo, exſerto, oculis lateralibus, renıformibus, vix prominulis, antennis ſub oculis inſertis longitudine corporis, thorace quadrato, plano, ſcutello triangulari, elytris molliuſculis, longitudine abdominis, pedibus tenuibus, longiuſculis, tarſis anticis quinque, poſticis quadriarticulatis, colore nigro teſtaceoque, nitido.

nus, laevis, teſtaceus, immaculatus. Elytra laevia, teſtacea, apice nigra. Corpus teſtaceum pectore tarſisque nigris. Mas minor elytris totis nigris, abdomine nigro: ano ruſo.

2. Z. thorace angulato ſpinoſo teſtacea elytris apice cyaneis, antennis pedibusque nigris. *angulata.*
Cantharis angulata Mant. Inſ. 1. 168. 7.
Hybn. Naturf. 24. 45. 11. tab. 2. fig. 12.
Habitat in Inſula Amſterd. Muſ. Dom. Banks.
Caput teſtaceum ore antennisque nigris. Thorax utrinque angulato ſpinoſus, teſtaceus. Elytra laevia, nitida, teſtacea, apice cyanea. Corpus teſtaceum, ſubtus parum fuſcescens. Pedes nigri.

3. Z. thorace mutico nigra thorace elytrisque teſtaceis. *mutica.*
Zonitis mutica Hybn. Naturf. 24. 44. 10. t. 2. f. 11.
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.
Statura & magnitudo praecedentis. Caput cum antennis atrum. Thorax planus, laevis, rotundatus, muticus, rufus. Elytra flexilia, laevia, teſtacea, immaculata. Corpus nigrum.

4. Z. thorace mutico atra elytris teſtaceis. *fulvipennis*
Habitat — —
Magnitudo omnino praecedentium tota atra elytris ſolis teſtaceis, immaculatis.

5. Z. flava elytris puncto medio apiceque nigris. *chryſomelina.*
Habitat in Oriente Prof. Forſkahl.
Caput flavum ore, antennis oculisque nigris. Thorax glaber, nitens, flavus puncto medio nigro. Elytra laevia, flava puncto apiceque nigris. Subtus atra ano rufescente.

6. Z. rufescens elytris flavis apice nigris. *flava.*
Habitat in Oriente Prof. Forſkahl.
Affinis praecedenti at minor. Antennae nigrae articulo primo rufo. Caput & thorax rufescentia.

Elytra laevia, flava, apice fuſca. Abdomen baſi nigricans. Pedes flavi.

roſtrata. 7. Z. teſtacea pectore elytrorumque punctis tribus nigris.

Habitat in Barbaria Muſ. Dom. Desfontaines.

Statura omnino praecedentium. Caput teſtaceum antennis ſetaceis. Maxilla exſerta, roſtriformis, capite longior. Thorax teſtaceus. Elytra laevia, teſtacea puncto parvo baſeos, majori ante medium & tertio verſus apicem nigris. Corpus teſtaceum pectore abdominisque baſi atris.

53. APALUS. *Palpi* aequales, filiformes. *Maxilla* cornea, unidentata. *Labium* membranaceum, truncatum, integrum. *Antennae* filiformes.

2 maculatus 1. A. niger elytris teſtaceis: puncto nigro.

Meloe bimaculatus Linn. Syſt. nat. 2. 680. 9. Fn. Sv. 828. Udm. Diſſ. 82.

Degeer Inſ. 5. tab. 1. fig. 18.

Habitat primo vere in Europae borealis arenoſis.

4 maculatus 2. A. rufus capite elytrorumque maculis duabus nigris.

Habitat in America boreali.

Apali corpus oblongum, depreſſiuſculum, immarginatum, glabrum, laeve, agile, capite ovato, exſerto, oculis lateralibus, rotundatis, prominulis, antennis ſub oculis inſertis, corpore demidio brevioribus, thorace brevi, anguſtato, rotundato, ſcutello rotundato, elytris flexilibus, planis, pedibus brevibus, validis, tarſis anticis quinque, poſticis quadriarticulatis, colore nigro teſtaceoque obſcuro.

Hujus generis videtur. Paullo major A. 2 maculato. Antennae breves, filiformes, nigrae. Caput nigrum palpis filiformibus, rufis. Thorax laevis, ovatus, rufus, immaculatus. Elytra laevia, flexilia, rufa macula magna baſeos apiceque late nigris. Corpus rufum ano obtuſo nigro. Pedes nigri femoribus rufis.

54. ALURNUS. *Palpi* ſex breviſſimi.
Maxilla cornea, fornicata.
Antennae filiformes.

1. A. thorace coccineo, elytris flavis. *groſſus.*
Habitat Cajennae.
Antennae cylindricae, nigrae, corpore dimidio breviores. Thorax ſubrugoſus, baſi utrinque acuminatus, coccineus margine poſtico nigro. Scutellum rotundatum, nigrum. Elytra corpore majora longioraque, baſi gibboſa, ſubpunctata, flava. Pedes nigri tarſis ſubtus valde ſpongioſis.

55. SAGRA. *Palpi* quatuor inaequales, filiformes.
Maxilla cornea, unidentata.
Labium breve, corneum, rotundatum, ciliatum, fiſſum.

1. S. viridi aenea femoribus tibiisque poſticis dentatis. *femorata.*
Tenebrio femoratus Drury Inſ. 2. tab. 34. fig. 5.
Tenebrio viridis Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 7. fig. 8.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Banks.
Os maxillis palpisque. Palpi quatuor, inaequales, filiformes, anteriores quadriarticulati: articulo ſecundo longiori, ultimo ovato adhaerentes maxillae dorſo, poſteriores triarticulati: arti-

culis ſubaequalibus; ultimo obtuſo adnati labii medio. Mandibula cornea, arcuata, edentula. Maxilla brevis, cornea, rotundata, in medio unidentata. Labium breve, rotundatum, corneum, ciliatum, fiſſum. Corpus magnum, laeve, viridi aeneum, nitidum antennis corpore dimidio brevioribus, articulis ultimis nigris. Femora poſtica incraſſata, bidentata: dente anteriori majori. Tibiae elongatae, obſcuriores apice ſinuatae, unidentatae.

dentipes. 2. S. nigra femoribus tibiisque poſticis dentatis.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. D. Schulz.
Praecedenti nimis affinis at tota nigra. Femora poſtica incraſſata, apice bidentata. Tibiae incurvae, tridentatae.

56. CRYPTOCEPHALUS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla unidentata.
Labium corneum, integrum.
Antennae filiformes.

longipes. 1. C. niger obſcurus elytris pallidis: maculis tribus nigris, pedibus anticis elongatis.
Clytra longipes Laichart. 1. 166. 1.
Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 3.
Habitat in Germaniae Corylo.
Antennae breves, ferratae, nigrae. Elytrorum punctum ad baſin, duaque in medio. Pedes nigri, antici in omni ſexu elongati.

2. C. nigro cyaneus elytris teſtaceis punctis: tribus nigris, pedibus anticis elongatis. *3 punctatus*

Habitat in Italia D. Allioni.

An a praecedente ſatis diſtinctus at minor. Caput, corpus, thorax obſcure cyanea, immaculata. Elytra teſtacea punctis tribus nigris. 1. 2. Pedes antici in altero ſexu elongati.

3. C. ater nitidus elytris rubris: punctis tribus nigris. *ſalicis.*

Habitat in Saxonia Dom. Hybner.

Diſtinctus omnino a C. longipede. Magnitudo C. 2. punctati. Antennae breves, nigrae. Caput & thorax atra, nitida, immaculata. Elytra rubra, interdum teſtacea: punctis tribus 1. 2. Corpus nigrum.

4. C. ater elytris teſtaceis: punctis duobus lineolaque poſtica nigris. *6 notatus.*

Habitat in Barbaria Muſ. D. Desfontaines.

Parva. Antennae elongatae. Thorax ater, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, teſtacea punctis duobus baſeos exteriori, majori lineari lineaque poſtica atris. Sutura tenuiſſime atra. Corpus atrum.

Variat puncto tantum baſeos.

5. C. niger thorace rubro immaculato, elytris rubris: punctis tribus nigris. *6 maculatus.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Cryptocephali corpus cylindricum, antice poſticeque obtuſum, glabrum, immarginatum, capite plano, inferto, oculis lateralibus, rotundatis, antennis ſub oculis infertis, corpore brevioribus, thorace brevi, transverſo, rotundato, ſcutello parvo, rotundo, elytris rigidis, fornicatis, abdomine fere longioribus, pedibus validis, longiuſculis, tarſis quadriarticulatis, colore vario, ſaepius nitido.

Antennae breves, ſerratae, nigrae. Elytra glabra, puncto unico ad baſin & duobus in medio.

4 punctatus 6. C. niger elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis brevibus ſerratis.
Chryſomela 4 punctata Linn. ſyſt. nat. 2. 596. 76. Fn. Sv. 547.
Melolontha Geoff. Inſ. 1. 195. tab. 3. fig. 4.
Degeer Inſ. 5. 329. 32. tab. 10. fig. 7.
Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 1. 2.
Habitat in Europae Corylo frequens.
Larva faccata: ſacco ovato ſcabro antice oblique truncato Act. Hall. 1.

4 notatus. 7. C. cyaneo niger elytris rubris: maculis duabus cyaneis, antennis brevibus.
Habitat in Barbaria Prof. Vahl.
Macula elytrorum poſterior major. Pedes nigri.

laetus. 8. C. viridi aeneus elytris teſtaceis: maculis duabus nigris.
Habitat in Saxonia Dom. Hybner.
Caput viridi aeneum, nitidum antennis teſtaceis apice fuſcis. Thorax aeneus, nitidus margine teſtaceo. Elytra laevia, teſtacea maculis duabus cyaneo nigris, poſteriore majore. Corpus nigricans ano aeneo. Pedes aenei tibiis teſtaceis.

atraphaxidis. 9. C. niger thorace rubro trimaculato, elytris teſtaceis: maculis tribus nigris, tibiis rufis.
Chryſomela Atraphaxidis Pall. Iter. 2. 725. 65.
Habitat in Sibiriae Atraphaxide Muſ. Dom. Banks.
Antennae ferratae, cinereae. Thorax rufus maculis tribus fere contiguis ad baſin. Elytra pallidiora macula poſtica majori transverſa. Pedes rufi femoribus nigris. Abdomen nigrum, cinereo villoſum.

10. C. ater nitidus elytris flavis: lunula faſcia punctoque apicis nigris. *lunulatus.*
Habitat — — Muſ. Dom. Banks.
Antennae breves, ſerratae. Corpus atrum.

11. C. niger thorace elytrisque rubris: punctis quatuor nigris. *12 maculatus.*
Habitat ad Cap. Bon. Spei Muſ. Dom. Banks.
Antennae breves, ſerratae, baſi rufeſcentes. Thorax rotundatus, laevis, rufus punctis quatuor nigris, intermediis, majoribus. Elytra glabra, rufa, pari punctorum ad baſin, in medio macula magna fere faſciam conſtituente & puncto parvo ad apicem.

12. C. teſtaceus antennis elytrorumque margine nigris. *obſitus.*
Habitat in America Dom. Drury.
Antennae ſerratae, nigrae. Elytra margine omni nigro inprimis futura. Abdomen cinereo fuſcum.

13. C. rufeſcens thorace maculis, elytris lineis duabus nigris. *lineatus.*
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.
Caput nigrum fronte rufeſcente. Antennae thorace longiores, filiformes, nigrae, baſi rufeſcentes. Thorax maculis duabus magnis, dorſalibus, nigris. Scutellum nigrum. Pedes nigri femoribus baſi rufis.

14. C. coeruleſcens elytris teſtaceis: puncto humerali nigro. *tridentatus*
Chryſomela tridentata Linn. ſyſt. nat. 2. 596. 73. Fn. Sv. 546.
Melontha Geoff. Inſ. 1. 196. 3.
Degeer Inſ. 5. 333. 36. tab. 10. fig. 10.
Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 5.
Habitat in Lonicera Xyloſteo.

Punctum parvum, cyaneum ad basin elytrorum. Pedes antici in altero sexu elongati.

taxicornis. 15. C. cyaneus elytris testaceis immaculatis, antennis seratis.

Habitat in Italia D. Allioni.

Affinis certe C. tridentato. Antennae valde compressae, serratae. Caput & thorax cyanea, immaculata. Elytra testacea. Pedes antici valde elongati.

venustus. 16. C. griseo fuscus thorace margine maculisque duabus flavis, elytris flavis: vittis duabus nigris.

Habitat in America Mus. D. Hunter.

Antennae basi rufae, apice nigrae. Caput rufescens orbita oculorum flava. Thorax margine omni lineolisque duabus margine postico connexis flavis. Elytra striato punctata margine omni tenuissime nigro. Vitta lata nigra in medio nec basin nec apicem attingens, & altera futura postice junctis.

Gorteriae. 17. C. ater glaber, thorace elytrisque punctis quatuor flavescentibus.

Chrysomela Gorteriae Linn. syst. nat. 2. 596. 74. Amoen. acad. 6. 394. 16.

Habitat in Gorteria Cap. Bon. spei.

8punctatus. 18. C. niger thorace rufo, elytris testaceis: punctis quatuor nigris. Naturf. 24. 17. 22. tab. 1. fig. 22.

Habitat in Barbariae plantis Dom. Vahl.

Antennae breves, serratae, nigrae. Puncta elytrorum 2. 2. oblique posita. Scutellum nigrum. Pedes nigri tibiis testaceis.

maxillosus. 19. C. capite thoraceque fulvis, elytris flavis: puncto baseos scutelloque nigris.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae ſerratae, nigrae, baſi fulvae. Abdomen cinereo villoſum. Pedes fulvi geniculis nigris.

20. C. ater thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. Herbſt Arch. tab. 44. fig. 5. *auritus.*
Chryſomela aurita Linn. ſyſt. nat. 2. 256. 75.
Habitat in Saxoniae Corylo.

21. C. coeruleus elytris ſanguineis: maculis coeruleis cicatricantibus. *Lentiſci.*
Chryſomela varioloſa Mant. Inſ. 1. 70. 50. Linn. ſyſt. nat. 20. 591. 33.
Habitat in Africae Lentiſco Muſ. Dom. Desfontaines.
Statura praecedentium. Antennae ſerratae, nigrae. Caput & thorax coerulea, cinereo villoſa. Elytra rubra maculis plurimis cicatriſantibus coeruleis. Corpus coeruleum.

22. C. rufus elytris maculis tribus nigris: anteriore poſtice didyma. *didymus.*
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae thorace longiores, filiformes, nigrae, baſi rufeſcentes. Elytra ſtriato punctata, glabra, ſutura dimidiaque parte poſtica marginis exterioris maculisque tribus diſci nigris. Macula anterior oblonga, poſtice didyma, media ſubrotunda, tertia verſus apicem linearis. Subtus rufus pectore pedumque geniculis nigris.

23. C. rufus capitis baſi elytrorumque maculis duabus cyaneis. *4 maculatus.*
Chryſomela 4 maculata Linn. ſyſt. nat. 2. 596. 77.
Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 67.
Habitat in Saxoniae Corylo.
Puncta elytrorum remota, alterum ad baſin, alterum ad apicem. Abdomen cinereum.

flavicollis. 24. C. niger thorace fulvo: punctis ſex nigris, elytris pallidis: punctis duobus.

Habitat in Sibiria Muſ. Dom. Banks.

Caput lineola inter antennas punctisque utrinque duobus fulvis. Antennae nigrae baſi fulvae. Puncta thoracis ſex nigra in ſtrigam diſpoſita. Puncta elytrorum duo, alterum apicis. Pedes ruſi geniculis nigris.

longimanus 25. C. obſcure aeneus, elytris teſtaceis: puncto baſeos nigro.

Chryſomela longimana Linn. ſyſt. nat. 2. 599. 93.

Habitat in Trifolio montano, Euphorbia cypariſſias Sueciae.

Punctum parvum aeneum ad baſin elytrorum. Pedes in altero ſexu elongati.

Larva glabra, ſaccata: ſacco pyriformi, piloſo, fuſco.

Lar. 26. C. ruſus elytris fuſcis cyaneo nitidis, pedibus anticis elongatis.

Habitat in America meridionali Muſ. Hunter.

Antennae obſcure pallidae. Elytra punctato ſtriata. Corpus cum pedibus rufum.

marginatus 27. C. nigro aeneus elytris flavis: margine nigro. Cryptocephalus phaleratus Act. Hall. 1. 216.

Habitat in Germaniae plantis.

Punctum flavum ad os. Elytra flava margine omni nigro.

pubeſcens. 28. C. thorace elytrisque obſcure aeneis pubeſcentibus.

Habitat in America boreali.

Antennae porrectae, cinereae. Corpus totum pube cinerea tectum. Scutellum nigrum.

29. C. niger nitidus elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longitudine corporis Geoff. Inſ. 1. 234. 2 *punctatus*
Chryſomela 2 punctata Linn. ſyſt. nat. 2. 597. 78. Sv. 548.
Degeer Inſ. 5. 332. 35.
Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 8.
Pet. Gazoph. tab. 31. fig. 4.
Habitat in Europae Corylo.

30. C. ater nitidus elytris rubris: linea media atra, antennis longitudine corporis. *lineola.*
Chryſomela bipunctata Fn. Sv. 548. β.
Habitat in Europae Corylo.
Nimis affinis C. 2 punctato, cujus forte mera varietas. Differt tantum punctis duobus elytrorum connatis in lineolam latam longitudinalem nec baſin nec apicem attingentem.

31. C. niger obſcurus thorace fulvo, elytris teſtaceis: punctis duobus nigris. 2 *maculatus.*
Chryſomela melanocephala Act. Hall. 1. 272.
Habitat in Italia D. Allioni.
Nimis C. 2 punctato affinis. Differt tantum thorace haud nigro ſed fulvo.

32. C. thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris. Geoff. Inſ. 1. 235. 2. *cordiger.*
Chryſomela cordigera Linn. ſyſt. nat. 2. 598. Fn. Sv. 588.
Degeer Inſ. 5. 330. 33.
Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 1.
Habitat in Europae Corylo, Salice.
Macula thoracis intermedia interdum cordata.

33. C. ater thorace linea longitudinali rubra. *bothnicus.*
Chryſomela bothnica. Linn. ſyſt. nat. 2. 598. 90. Fn. Sv. 557.
Herbſt Arch. tab. 44. fig. 8.

Degeer Inſ. 5. 335. 39.
Habitat in Suecia.
Frons macula quadrata rufa. Pedes flavi.

frenatus. 34. C. ater capite thorace pedibusque rufis, thorace punctis duobus nigris.
Habitat in Auſtria D. Schneider.
Affinis praecedenti. Caput rufum margine poſtico nigro. Thorax rufus maculis duabus poſticis nigris. Elytra vix ſtriata, nigra. Pedes rufi femoribus annulo nigro.

obſcurus. 35. C. niger obſcurus pedibus poſticis elongatis.
Chryſomela obſcura Mant. Inſ. 1. 73. 81. Linn. ſyſt. nat. 2. 599. 96.
Degeer Inſ. 5. 336. 40.
Habitat in Europae plantis.

Vitis. 36. C. niger glaber thorace globoſo, elytris rufis.
Geoff. Inſ. 1. 232. 2.
Schaeff. Icon. tab. 86. fig. 6.
Habitat in Vite viniſera Europae auſtralioris, quam miſere ſaepius depaſcit.

plagiocephalus. 37. C. niger thorace elytrisque teſtaceis, capite craſſiuſcula.
Habitat in Gallia meridionali Muſ. Dom. Seheſtedt.
Affinis certe C. Coryli, at diſtinctus. Antennae breves, ſerratae, nigrae. Caput craſſum, prominens, atrum. Thorax rubro teſtaceus. Scutellum nigrum. Elytra teſtacea ſutura concolore. Corpus & pedes nigra.
Variat interdum uti C. Coryli puncto parvo humerali, nigro.

Coryli. 38. C. niger thorace elytrisque teſtaceis: ſutura nigra.
Chryſomela Coryli Linn. ſyſt. nat. 2. 598. 88. Fn. Sv. 555.

Habitat in Europae Corylo.

Mas thorace nigro, at distinctus a praecedente.

39. C. niger cinereo villosus thorace elytrisque pallidis. *pallens.* 82.

Habitat in China D. Pflug.

Caput atrum fronte cinereo villosa. Thorax & elytra pallida, nitida. Abdomen pube cinerea. Pedes nigri tibiis pallidis & concoloribus.

40. C. niger thorace linea dorsali abbreviata marginibusque rubris, elytris testaceis. *variegatus*

Habitat in Italia D. Allioni.

Caput nigrum puncto flavo inter antennas. Pedes nigri.

Variat elytris immaculatis &, puncto uno alterove nigro.

41. C. supra testaceus thorace fascia, elytris tribus nigris. *trifasciatus*

Habitat in China D. Pflug.

Caput nigrum macula magna frontali testacea. Fascia thoracis margines haud attingit & margo posticus niger. Elytra punctato striata fasciis tribus, quarum anteriores margines haud attingunt, tertia apicis. Corpus nigrum.

42. C. niger thorace rufo, elytris testaceis, pedibus anticis elongatis: femoribus apice unidentatis. *rufipes.* 82.

Habitat in Insula St. Helenae Dom. Banks, in Italia Pr. Helwig.

Antennae crassae, valde serratae. Pedes testacei, antici valde elongati femoribus linea dorsali nigra, apice acute dentatis.

Variat elytris immaculatis & nigris bipunctatis.

43. C. capite thoraceque rufis, elytris pallidis, pedibus apice nigris. *nigripes.* 82

Habitat in America.

Antennae nigrae basi rufae. Scutellum nigrum. Elytra pallida futura margineque nigricantibus. Abdomen pallidum.

6 punctatus 44. C. niger thorace variegato, elytris rubris: maculis tribus nigris.
Chryſomela 6 punctata Linn. ſyſt. nat. 2. 599. 92. Fn. Sv. 559.
Degeer Inſ. 5. 331. 34. tab. 10. fig. 9.
Sulz. Inſ. fig. 3. tab. 18.
Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 3.
Habitat in Europae plantis.
Genicula tibiarum puncto albo notata.

coerulans. 45. C. cyaneus nitidus antennis fuſcis.
Habitat in Africa aequinoctiali D. Banks.
Antennae breves, ſerratae.

violaceus. 46. C. nigro cyaneus antennis pedibusque nigris, elytris ſubſtriatis.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura omnino praecedentium. Antennae nullo modo ſerratae, nigrae. Caput & thorax cyanea, laevia, nitida. Elytra vix ſtriata, obſcuriora, immaculata. Pedes nigri.

cupreus. 47. C. rubro cupreus nitidus ſubtus cyaneus.
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Corpus ſupra nitidum, ſubtus magis obſcurum.

rubrifrons. 48. C. cyaneus nitidus fronte thoracis faſcia femoribusque rubris.
Habitat — — Prof. Leſke.
Antennae fuſcae baſi rufae.

calcaratus. 49. C. violaceus capite thorace femoribusque dentatis rufis.
Habitat in Sierra Leon. Muſ. Dom. Banks.
Caput rufum ore antennisque nigris. Thorax valde globoſus. Elytra ſtriata. Pedes violacei

femoribus dente acuto notatis, rufis basi apiceque nigris.

50. C. obscure cyaneus tibiis posticis apice lobatis. *lobatus.*
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.
Medius. Antennae nigrae basi testaceae. Caput & thorax cyanea, obscure nitida. Elytra obscuriora. Tibiae posticae apice lamina parva, quadrata auctae.

51. C. cyaneus aut viridis nitidus pedibus rufis. *rufipes.*
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.
Statura omnino sequentis, ut supra cyaneus aut viridis, immaculatus pedibus solis rufis.

52. C. cyaneus thorace pedibusque rufis. *cyaneus.*
Melolontha Geoff. Inf. 1. 197. 4.
Habitat in Gallia Dom. Mallet.

53. C. capite thoraceque rufis, elytris nigris: margine rufo. *cinctus.*
Habitat in America meridionali D. Hunter.
Antennae fuscae basi rufae. Elytra striato punctata, nigra margine exteriori late rufo. Pedes rufi geniculis nigris.

54. C. cyaneus ore thoracis marginibus pedibusque rubris. *bucephalus.*
Chrysomela bucephala Act. Hall. 1. 276.
Habitat in Anthylli vulneraria Saxoniae.
Maxillae in altero sexu incrassatae, forcipatae, rufae, apice nigrae.

55. C. cyaneus nitidus thoracis lateribus elytrorum apicibus femoribusque rubris. *collaris.*
Habitat in Sibiria Mus. Dom. Banks.
Antennae basi rufae. Corpus nigrum. Pedes nigri femoribus rufis.

56. C. viridi coeruleus antennis nigris Geoff. Inf. 1. 233. Oliv. Inf. 96. tab. 1. fig. 5. *fericeus.*

Chryſomela ſericea Linn. ſyſt. nat. 2. 598 86. Fn. Sv. 554.
Degeer Inſ. 5. 334. 37.
Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 2. 3. 5.
Sulz. Inſ. tab. 3. fig. 13.
Habitat in Europae Salicibus.
Variat corpore toto aureo.
Chryſomela Hypochaeridis Linn. vix differt, quamvis duplo fere major.

nitens. 57. C. viridis nitens ore pedibusque teſtaceis.
Chryſomela nitens Linn. ſyſt. nat. 2. 598. 84. Fn. Sv. 551.
Degeer Inſ. 5. 334. 38.
Habitat in Europae Corylo.

glabratus. 58. C. violaceus thorace elytrisque aeneis, antennis fuſcis.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.
Caput aeneum fronte canaliculata. Antennae fuſcae baſi ferrugineae. Elytra laeviſſima. Subtus totus violaceus.

vittatus. 59. C. niger elytris margine ſtriaque abbreviata flavis. Geoff. Inſ. 1. 233. 4. Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 8.
Herbſt. Arch. tab. 23. fig. 23.
Cryptocephalus quadrum ater elytris flavis: vitta media abbreviata atra, Mant. Inſ. 1. 82. 46. mera hujus varietas.
Habitat in Europae auſtralioris graminoſis.

limbatus. 60. C. ferrugineus thorace rufo, elytrorum ſuturis cyaneo nitidis.
Habitat Cajennae D. Schulz.
Elytrorum margines omnes cyanei, nitidi.

nitidulus. 61. C. thorace aeneo nitido, elytris cyaneis, capite antennarum baſi pedibusque flavis.
Habitat in Ruſſia meridionali Dom. Boeber.

Caput basi parum aeneum. Antennae nigrae basi flavescentes. Elytra subpunctata. Corpus nigrum. Pedes flavi femoribus linea nigra.

62. C. ater nitidus ore pedibus basique antennarum luteſcentibus. *labiatus.*

Chryſomela labiata Linn. ſyſt. nat. 2. 598. 87. Fn. Sv. 553.

Habitat in Europae Roſis.

63. C. violaceus nitidus ore pubeſcente, antennis pedibusque nigris. *flavilabris.*

Cryptocephalus parvulus Myll. Prod. 519.

Habitat in Saxoniae Betula Dom. Schaller.

Elytra ſtriato punctata. Antennae nigrae basi luteſcentes.

Larva ſaccata: ſacco antice oblique truncato. *flavipes.*

64. C. ater nitidus capite pedibusque luteis.

Cryptocephalus paracentheſis Schrank.

Habitat in Italia D. Allioni.

Margo elytrorum basi flavus. Pedes omnes flavi.

65. C. coeruleo ater nitidus fronte pedibusque flavis. *flavifrons.*

Habitat Kiliae.

Affinis certe praecedenti at diſtinctus & paullo minor. Antennae corporis longitudine, nigrae, basi flavae. Caput coeruleo atrum fronte inter antennas flava. Thorax laevis, nitidus, coeruleo ater. Elytra coeruleo atra, immaculata, vix ſtriata. Pedes flavi, interdum nigri anticis tantum flavis.

66. C. niger capite elytrorum apicibus pedibusque flavis. *Hübneri.*

Habitat in Germania Dom. Hübner.

Statura praecedentium. Antennae nigrae, basi flavae. Caput flavum margine poſtico nigro, in medio dentem emittente. Thorax laevis,

ater, nitidus. Elytra crenato ſtriata, nigra, apice late flava. Corpus nigrum pedibus omnibus flavis.

Moraei. 67. C. ater elytris maculis duabus flavis marginalibus Geoff. Inſ. 1. 234. 5.
Chryſomela Moraei Linn. ſyſt. nat. 2. 597. 82. Fn. Sv. 550.
Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 7. tab. 238. fig. 5.
Habitat in Europae Hypericis.

8 guttatus. 68. C. ater elytris maculis quatuor flavis.
Habitat in Saxoniae Fraxino D. Hybner.
Caput atrum fronte flavo maculata. Thorax margine antico flavo. Elytra punctata: macula prima baſeos, duabus in medio & quarta ad apicem. Pedes nigri anticis flavis.

15 guttatus. 69. C. rufus thorace maculis tribus, elytris ſex flavis.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.
Antennae nigrae, baſi flaveſcentes. Caput rufum fronte flava. Maculae thoracis laterales majores, ſublunares, elytrorum per paria diſpoſitae. Femora antica puncto flavo.

10 punctatus 70. C. thorace teſtaceo: vitta marginali atra, coleoptris flavis: punctis decem nigris.
Cryptocephalus hieroglyphicus. Herbſt. Arch. tab. 23. fig. 26.
Chryſomela 10 maculata Linn. ſyſt. nat. 2. 599. 93. Fn. Sv. 560.
Habitat in Europa.
Puncta elytrorum 2. 2. 1. omnino diſtincta. Caput teſtaceum margine poſtico atro. Margo thoracis ipſe teſtaceus at vitta lata atra. Pedes flavi femoribus poſticis nigris.

hieroglyphicus. 71. C. thorace flavo: punctis nigris quinque, coleoptris flavis: punctis nigris decem.

Cryptocephalus hieroglyphicus Laich Tyrol.
Habitat in Italia D. Allioni.
Affinis praecedenti at diſtinctus. Caput flavum linea frontali margineque poſtico nigris. Thorax flavus punctis quinque ſubcontiguis nigris. Elytra ſubſtriata punctis quinque 2. 2. 1. poſtico fere interiori connato. Corpus nigrum. Pedes flavi tibiis poſticis nigris.

72. C. thorace fulvo: punctis duobus, elytris teſtaceis: punctis quinque nigris. *12 punctatus.*
Habitat in Germania Dom. de Loewenſkiold.
Statura & magnitudo praecedentium. Antennae nigrae baſi fulvae. Caput fulvum oculis magnis nigris. Thorax fulvus punctis duobus dorſalibus nigris. Elytra, vix ſtriata pallide teſtacea punctis quinque nigris 2. 2. 1. Pedes flaveſcentes plantis nigris.

73. C. cyaneus elytris apice pedibusque fulvis. *haemorrhoidalis.*
Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 7.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 97. 247. β.
Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.
Affinis certe C. 2. puſtulato at diſtinctus videtur. Differt colore cyaneo, antennarum baſi pedibusque fulvis.

74. C. ater elytris macula apicis rufa. *2 puſtulatus.*
Cryptocephalus Podae Laich. Tyrol. 197. 7.
Herbſt Arch. tab. 44. fig. 6.
Habitat in Chryſanthemo coronario.
Elytra ſtriata.

75. C. rufus thorace maculis duabus, elytris faſciis duabus nigris. *2 faſciatus*
Habitat in Africa aequinoctiali D. Banks.
Caput rufum oculis reniformibus, fuſcis. Elytra punctato ſtriata faſcia baſeos alteraque pone medium nigris.

4puſtulatus 76. C. niger elytris laevibus rufo bimaculatis.
Chryſomela 4 puſtulata Linn. ſyſt. nat. 2. 597. 80. Fn. Sv. 549.
Habitat in Suecia.
Maculae elytrorum remotae, altera major ad baſin, altera minor ad apicem.

notatus. 77. C. niger elytris punctato ſtriatis: faſcia punctoque apicis teſtaceis.
Habitat in America Muſ. D. Hunter.
Faſcia elytrorum ad baſin lata ad marginem exteriorem extenditur.

hiſtrio. 78. C. niger, thorace elytrisque ferrugineo variis, pedibus ferrugineis: geniculis nigris.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 98. 249.
Habitat in Italia D. Allioni.
Caput nigrum orbita oculorum rufa. Thorax niger margine lineolisque tribus abbreviatis ferrugineis. Elytra punctata, nigra maculis apiceque ferrugineis. Pedes ferruginei geniculis femorumque poſticorum faſcia rufcis.

ſcopolinus. 79. C. niger thorace rufo, elytris rufis: faſciis duabus cyaneis, pedibus nigris.
Chryſomela Scopolina Linn. ſyſt. nat. 2. 597. 81.
Panz Naturf. 24. 17. 23. tab. 1. fig. 23.
Habitat in America, Europa auſtrali.
Faſciae elytrorum nec ſuturam nec marginem attingunt.

Koenigii. 80. C. rufus elytris punctis duobus coeruleſcentibus.
Habitat Tranquebariae D. Koenig.
Statura & magnitudo omnino praecedentis. Pedes rufi femoribus nigris.

paracenthe-ſis. 81. C. elytris flavis: lineola punctisque tribus nigris.
Chryſomela paracenthelis Linn. ſyſt. nat. 2. 1066. 1.
Habitat in Europae Salice, Betula.

Supra flavus thorace nigro variegato. Pedes antici elongati.

82. C. aeneus nitidus fronte cuprea. *Hordei.*
Habitat in Barbariae Hordeo murino Prof. Vahl.
Antennae ferratae, nigrae. Caput grande fronte late cuprea. Pedes antici elongati.

83. C. viridi aeneus nitidus antennis basi flavescentibus, fronte impressa. *concolor.*
Habitat in Europa.
Corpus parvum, viridi aeneum, nitidulum, antennis solis basi flavescentibus. Frons impressa. Pedes concolores.

84. C. testaceus elytris vage punctatis pallidis; antennis fuscis. *Pini.*
Chrysomela Pini Linn. syst. nat. 2. 598. 89. Fn. Sv. 556.
Habitat in Sueciae Pino.

85. C. thorace elytrisque albis testaceo reticulatis. *reticulatus.*
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Caput testaceum orbita oculorum alba. Thorax albus lineolis quatuor testaceis, quarum laterales antice intermediae postice coeunt. Laterales praeterea postice dilatatae puncto albo. Elytra alba, testaceo reticulata. Pectus nigrum. Abdomen & pedes flavescentes.

86. C. thorace fulvo, elytris striatis testaceis nigro maculatis. *pusillus.*
Rossi. Fn. Etr. 1. 100. 255.
Habitat Hamburgi D. Schulz.
Duplo minor C. Pini. Caput fulvum antennis pallidis oculisque nigris. Thorax fuscus, immaculatus. Elytra substriata, testacea punctis duobus baseos fasciaque postica nigris. Corpus nigrum. Pedes pallidi.

Variant maculae elytrorum, interdum confluunt, interdum omnino deſunt.

minutus. 87. C. thorace fulvo, elytris ſtriatis teſtaceis immaculatis.

Habitat Kiliae.

Statura & ſumma affinitas C. puſilli. Antennae teſtaceae, apice fuſcae. Caput fulvum margine poſtico tenuiſſime nigro. Thorax fulvus, nitidus, immaculatus. Elytra ſtriata, teſtacea, immaculata. Corpus nigrum pedibus teſtaceis.

gracilis. 88. C. ater capite thoraceque fulvis, elytris linea marginali baſeos alba.

Cryptocephalus Geoff. Inſ. 1. 237. 11.

Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.

Parvus. Antennae nigrae baſi rufae. Caput & thorax rufa, immaculata. Elytra ſtriata, atra lineola baſeos marginali alba. Pedes rufi.

pygmaeus. 89. C. ater nitidus elytris teſtaceis: ſutura nigra.

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Minutus. Antennae nigrae baſi flavae. Caput nigrum fronte flava. Thorax margine antico & laterali flavo. Elytra ſtriata, teſtacea puncto calloſo baſeos ſuturaque atris. Corpus atrum pedibus flavis.

57. HISPA. *Palpi* aequales, medio craſſiores, filiformes.
Maxilla bifida.
Labium corneum, integrum.
Antennae cylindricae.

atra. 1. H. antennis fuſiformibus, thorace elytrisque ſpinoſis. Linn. ſyſt. nat. 2. 603. 1.

Crioceris tota atra Geoff. Inſ. 1. 243. 7.

Act. Societ. Berol. nat. Cur. 4. tab. 7. fig. 6.

Roſſ. Fn. Etr. 52. 129.
Habitat in Europa auſtraliori ad radices graminum.

2. H. antennis fuſiformibus, corpore teſtaceo, antennis oculisque nigris. Linn. ſyſt. nat. 2. 603. 2. *teſtacea.*
Roſſ. Fn. Etr. 52. 128.
Habitat in Africa.
Thorax ſpinis lateralibus, elytra ſpinis ſparſis, omnibus nigris.

3. H. antennis ſerratis hirta atra, elytris macula baſeos rufa. 2 *puſtulata*
Habitat in Italia D. Allioni.
Corpus minus atrum, nitidum pilis erectis nigris. Macula magna rufa, marginalis ad baſin elytrorum.

4. H. antennis piloſis nigra elytris ſtriatis. Linn. ſyſt. nat. 2. 604. 4. *mutica.*
Dermeſtes clavicornis Linn. Fn. Sv. 413.
Degeer Inſ. 5. 47. tab. 3. fig. 1.
Habitat in Europae quisquiliis, Muſcis.

5. H. antennis fuſiformibus, thorace elytrorumque baſi ſanguineis, elytris ſerratis. Linn. Mant. 1. 530. *ſanguinicollis.*
Habitat in America Dom. von Rohr.

Hiſpae corpus oblongum, immarginatum, tardum, parvum, capite ovato, inſerto, antennis, approximatis & fere connatis, inter oculos inſertis longitudine thoracis, oculis oblongis, magnis, lateralibus, thorace brevi, rotundato, ſcutello triangulo, elytris rigidis longitudine abdominis, ſaepius aculeatis aut apice dentatis, pedibus brevibus, validis, rotundatis, tarſis quadriarticulatis, colore vario, minus nitido.

Elytra apice ſerrata ſtriis tribus elevatis ſpatio interjecto punctato nigra baſi rufa.

Variat rarius elytris baſi nigris.

ſerrata. 6. H. antennis fuſiformibus nigra elytris rufeſcentibus apice ſertatis, nigris.

Habitat Surinami Muſ. D. Hunter.

Thorax niger lateribus rufis. Elytra ſtriata, rufa apice nigra, valde ſerrata.

dentata. 7. H. antennis fuſiformibus nigra thoracis margine elytrorum ſerratorum macula baſeos faſciaque media flavis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Caput cum antennis nigrum. Thorax niger lateribus late flavis. Elytra ſerrata denticulis duobus porrectis longioribus, ſulcata, nigra macula baſeos futuram haud attingente faſciaque media flavis. Pectus & abdominis baſis flava.

angulata. 8. H. antennis fuſiformibus flava capite thoracis linea dorſali elytrorumque margine ſinuato nigris.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Caput cum antennis nigrum. Thorax flavus linea dorſali nigra. Elytra ſulcata, flava margine ſinuato, nigro & in hoc margine pone medium punctum flavum, apice truncata, dentata, dente exteriori majori, validiori angulata. Corpus ſubtus ferrugineum.

marginata. 9. H. antennis fuſiformibus nigra elytris baſi macula rufa apice bidentatis.

Habitat Surinami Muſ. Dom. Boſc.

Statura & magnitudo omnino praecedentium. Caput rufum oculis globoſis, prominulis anten-

nisque nigris. Thorax niger. Elytra striis tribus elevatis pollice coeuntibus: sulcis transverse striatis, nigra basi macula oblonga ferruginea, apice obtusa, bidentata. Corpus subtus pallescens. Pedes nigri femoribus basi pallidis.

10. H. antennis basi compressis serratis nigra thoracis margine elytrisque macula baseos flavis. *serraticornis.*

Habitat Surinami Mus. Dom. Bosc.

Affinis certe H. emarginatae. Antennae nigrae articulis quinque baseos compressis, serratis, reliquis fusiformibus. Caput albidum vertice nigro. Thorax niger lateribus flavis, antice unidentatus. Elytra sulcata lineaque elevata unica in medio, macula baseos rufa, apice tridentata dente intermedio majori, rotundato, serrato. Pectus femorumque basis alba.

11. H. antennis — — — ferruginea thoracis linea laterali nigra, elytris apice unidentatis. *bidens.*

Habitat Surinami Mus. Dom. Bosc.

Statura praecedentium. Antennae desunt. Caput ferrugineum oculis nigris. Thorax ferrugineus linea laterali nigra. Elytra sulcata: sulcis duplici serie punctatis, ferruginea linea laterali nigra terminantur dente valido, acuto, marginali, incurvo, atro. Corpus ferrugineum.

12. H. glabra coccinea antennis nigris. *nigricornis.*

Habitat ad Cap. Bon. spei D. Paykull.

Statura praecedentium at tota glabra, laevis, coccinea antennis solis cylindricis, nigris.

58. DRYOPS. *Palpi* quatuor inaequales.
antici ſecuriformes.
poſtici filiformes.
Labium membranaceum, late emarginatum.
Antennae filiformes.

femorata. 1. D. livida fronte maculisque duabus thoracis atris, femoribus poſticis incraſſatis.

Dryops femorata Oliv. Inſ. 2. tab. fig.

Habitat in Helvetia Muſ. Dom. Olivier.

Statura & magnitudo omnino D. lividae, at diſtincta. Caput lividum macula magna inter antennas atra. Thorax lividus maculis duabus magnis fere totum dorſum occupantibus atris. Elytra laevia, livida, immaculata. Corpus fuſcum ano livido. Pedes lividi femoribus poſticis incraſſatis macula magna fuſca.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, antici longiores, quadriarticulati: articulo primo brevi, rotundato, ſecundo tertioque obconicis, ultimo ſubſecuriformi adhaerentes maxillae dorſo. Poſtici triarticulati: articulo primo & ſecundo obconicis, ultimo truncato, obtuſo adnati labii inferioris medio. Mandibula cornea arcuata, apice fiſſa. Maxilla membranacea, cy-

---

Dryops corpus elongatum, cylindricum, laeve, vix tomentoſum, immarginatum, agile, capite ovato, inferto, ore palpisque prominulis, oculis magnis, globoſis, lateralibus, antennis diſtantibus, ſub oculis inſertis, corpore brevioribus, thorace ſubcylindrico, ſcutello brevi, rotundato, elytris rigidiuſculis, longitudine abdominis, pedibus longiuſculis, tenuibus, curſoriis, tarſis quadriarticulatis, colore vario, ſubnitidulo.

lindrica, unidentata. Labium elongatum, membranaceum, apice late emarginatum. Antennae filiformes articulis cylindricis. In reliquis ſpeciebus palpi antici magis ſecuriformes.

2. D. obſcure aenea immaculata. *aenea.*
Lagria aenea Mant. Inſ. 1. 93. 1.
Dryops aenea Oliv. Inſ. 2. tab. fig.
Habitat in Americae Inſulis Muſ. Dom. Banks.
Corpus magnum, oblongum. Antennae filiformes, nigrae articulis obconicis. Thorax & elytra obſcure aenea, minime nitida.

3. D. livida oculis nigris. *livida.*
Dryops livida Oliv. Inſ. 2. tab. fig.
Lagria livida Mant. Inſ. I. 93. 2.
Habitat in Otaheite maris auſtralis Muſ. Dom. Banks.
Statura & magnitudo praecedentis. Antennae filiformes, lividae longitudine corporis. Thorax & elytra laevia, glabra, livida, immaculata. Pedes lividi.

4. D. livida thorace lineis, elytris vitta fuſca. *lineata.*
Dryops lineata Oliv. Inſ. 2. tab. fig.
Lagria lineata Mant. Inſ. 1. 93. 3.
Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae filiformes, lividae. Caput macula frontali fuſca. Thorax ſubcylindricus lineis tribus fuſcis. Elytra laevia, glabra, livida vitta lata fuſca, quae tamen apicem haud attingit. Subtus livida.

5. D. coerulea antennis fuſcis. *cyanea.*
Dryops cyanea Oliv. Inſ. 2. tab. fig.
Lagria cyanea Mant. Inſ. 1. 93. 4.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Duplo minor D. livida. Antennae longae, filiformes, fuſcae. Corpus glabrum, obſcure cyaneum. Anus ſtylis duobus, validis, acutis. Femora poſtica craſſiora, incurva.

marginata. 6. D. rufa elytris fuſcis: marginibus lineaque media rufis.

Dryops marginata Oliv. Inſ. 2. tab. fig.

Lagria marginata Mant. Inſ. 1. 93. 5.

Habitat in America meridionali Muſ. D. Hunter.

Duplo major L. vittata. Caput rufum antennis nigris oculisque globoſis, coeruleſcentibus. Thorax glaber, rufus, immaculatus. Scutellum rufum. Elytra laevia, fuſca margine omni lineaque media nec baſin, nec apicem attingente rufis. Pedes nigri femoribus rufis.

vittata. 7. D. rufa elytris vitta abdominisque apice fuſcis.

Lagria vittata. Mant. Inſ. 1. 93. 6.

Habitat in America Dom. von Rohr.

Caput cum antennis rufum oculis nigris. Thorax rotundatus, rufus, immaculatus. Elytra rufeſcentia vitta lata fuſca vel potius fuſca margine omni rufeſcente. Abdomen rufum apice fuſcum. Pedes rufi.

rufifrons. 8. D. cyanea capite thoraceque rufis.

Lagria rufifrons Mant. Inſ. 1. 93. 7.

Habitat in America boreali.

Antennae longitudine fere corporis fuſcae, apice rufeſcentes. Caput rufum oculis magnis nigris. Palpi exſerti, ſecuriformes, fuſci clava rufa. Thorax cylindricus, rufus. Elytra ſtriata, cyanea. Pedes cyanei femoribus anticis rufis.

59. TILLUS. *Palpi* quatuor inaequales.
antici filiformes.
poſtici ſecuriformes.
Labium membranaceum, inter palpos porrectum, integrum.
Antennae ſerratae.

1. T. ater thorace villoſo rufo. *elongatus.*
Tillus elongatus Oliv. Inſ. 2. 22. 4. 1. t. 1. f. 1.
Lagria elongata Mant. Inſ. 1. 93. 8.
Chryſomela elongata atra thorace rubro ſubvilloſo. Linn. ſyſt. nat. 2. 603. 1. 22.
Habitat in Europa, Anglia.
Genus Notoxo affine videtur. Os palpis maxillisque. Palpi quatuor inaequales, antici breves, quadriarticulati: articulo ultimo paullo longiori, obtuſo adhaerentes maxillae dorſo. Poſtici breves, triarticulati: articulo primo ſecundoque rotundatis, tertio majori clava ſecuriformi, truncata adnati labii medio. Mandibula brevis, cornea, arcuata, acuta, edentula. Maxilla brevis, membranacea, bifida: laciniis rotundatis, ſubaequalibus. Labium breve, membranaceum, inter palpos prominens, rotundatum, integrum. Antennae ſerratae.

Tilli corpus cylindricum, hirtum, immarginatum, tardum, capite thoracis latitudine, globoſum, infertum, oculis reniformibus, lateralibus, antennis diſtantibus, ſub oculis insertis, longitudine thoracis, thorace cylindrico, anguſto, ſcutello breviſſimo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus longiuſculis, tenuibus, tarſis quinquearticulatis, colore nitidiuſculo.

ambulans. 2. T. glaber ater elytris punctatis.
Lagria ambulans Mant. Inſ. 1. 93. 9.
Habitat in Germania Dom. Schneider.
Summa affinitas praecedentis at thorax corpore concolor, ater. Elytra glabra, nitida, punctata. Antennae ſerratae.

ſerraticornis. 3. T. ater elytris teſtaceis.
Tillus ſerraticornis ater, elytris, teſtaceis, antennarum articulis ultimis tribus ſerratis. Oliv. Inſ. 2. 22. 4. 2. tab. 1. fig. 2.
Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.
Minor T. elongato. Antennae porrectae ultimis tribus articulis majoribus valde ſerratis. Caput & thorax villoſa, rotundata, atra, immaculata. Elytra villoſa, teſtacea. Corpus atrum.

60. LAGRIA. *Palpi* quatuor inaequales.
antici ſecuriformes.
poſtici extorſum craſſiores.
Labium membranaceum, integrum.
Antennae filiformes.

tuberculata. 1. L. ovata glabra atra elytris tuberculatis.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Omnino diſtincta tuberculis elytrorum numeroſis, elevatis, obtuſis.

Lagriae corpus oblongum, hirtum, immarginatum, tardum, capite ovato, inferno, oculis oblongis, lateralibus, antennis diſtantibus, ſub oculis inſertis, longitudine thoracis, thorace rotundato, ſcutello parvo orbiculato, elytris fornicatis, interdum molliuſculis, longitudine abdominis, pedibus tenuibus, curſoriis, tarſis quadriarticulatis, colore obſcuro.

2. L. villoſa atra thorace elytrisque viridibus. *villoſa.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Affinis certe L. pubeſcens at thorax & elytra viridia. Abdomen & pedes atra.

3. L. nigra villoſa thorace tereti: puncto medio impreſſo, elytris teſtaceis. *pubeſcens.*
Chryſomela pubeſcens Linn. ſyſt. nat. 2. 603. 122.
Habitat in Europa.

4. L. villoſa nigra thorace tereti, elytris pallidis. *hirta.*
Chryſomela hirta Linn. ſyſt. nat. 2. 602. 119. Fn. Sv. 578.
Tenebrio alatus. Degeer Inſ. 5. 44. 6. tab. 2. fig. 23. 24.
Habitat in Europae Soponariis Dom. Lund.

5. L. villoſa cyanea elytris lineis elevatis tribus, abdomine rufo. *abdominalis.*
Melyris abdominalis Oliv. Inſ. 21. 4. 2. tab. 1. fig. 7.
Habitat in India Dom. Daldorff.
Caput & thorax villoſa, obſcure cyanea. Elytra villoſa, magis nitida. Abdomen rufum. Femora cyanea.

6. L. villoſa cyanea abdomine femoribusque rufis. *tomentoſa.*
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae rufeſcentes, apice fuſcae. Caput & thorax obſcure cyanea. Elytra paullo dilutiora. Abdomen rufum. Pedes nigri femoribus rufis. Variat elytris fuſcis.

7. L. villoſa cuprea elytris nigris. *obſcura.*
Habitat in Guinea D. Iſert.
Statura praecedentium. Antennae nigrae. Caput & thorax villoſa, obſcure cuprea. Elytra nigra. Corpus nigro cyaneum, nitidum pedibus nigris.

lugubris. 8. L. glabra ferruginea capite thoraceque obſcurioribus, antennis apice nigris.
Habitat in Guinea D. Iſert.
Statura omnino praecedentium. Antennae ferrugineae apice nigrae. Caput & thorax fuſca, obſcura, minime nitida. Elytra glabra, laevia, ferruginea. Corpus ferrugineum.

ſcutellaris. 9. L. nigra cinereo hirta ſcutello albo.
Habitat in Hiſpania Dom. Prof. Vahl.
Corpus totum pilis denſis cinereis hirtum & ſcutellum omnino album.

atra. 10. L. antennis ſerratis hirta atra.
Dermeſtes hirtus Linn. ſyſt. nat. 2. 563. 14.
Melyris atra Oliv. Inſ. 21. tab. 2. fig. 8.
Habitat in Europae auſtralioris Tritico.
Alter ſexus tibiis poſticis unco valido, incurvo, acuto.

nigra. 11. L. piloſa nigra elytris laeviuſculis.
Melyris villoſus Oliv. Inſ. 21. tab. 2. fig. 10.
Habitat in Europae floribus.

lineata. 12. L. piloſa nigra elytris lineis ſeſquitertiis rufis.
Melyris lineata Oliv. Inſ. 21. tab. 1. fig. 6.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.
Caput & thorax piloſa, nigra aeneo paullo mixta. Elytra mollia, nigra margine exteriori, linea baſi flexuoſa, ad ſuturam, quae apicem haud attingit & lineola in diſco abbreviata rufis. Pedes nigri.

flavipes. 13. L. villoſa nigricans antennarum baſi pedibusque teſtaceis.
Habitat Hamburgi D. Schulz.
Antennae nigrae baſi teſtaceae. Caput inflexum. Elytra villoſa, nigra, parum vireſcentia. Pedes omnes teſtacei.

14. L. ſubvilloſa cyanea antennis nigris. *coerulea.*
Melyris cyanea Oliv. Inſ. 21. 8. 8. tab. 2. fig. 9.
Cicindela viridi coerulea Geoff. Inſ. 1. 177. 14.
Habitat in Europa auſtraliori.
Statura & magnitudo omnino L. nigrae.

15. L. antennis ſerratis hirta obſcure aenea. *metallica.*
Habitat in Barbariae floribus compoſitis frequens Dom. Prof. Vahl.
Affinis L. atrae at minor, tota hirta, obſcure aenea, nitida. Pedes & antennae atrae.

16. L. antennis ſerratis hirta aenea nitida antennis nigris, tibiis teſtaceis. *nigricornis*
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Statura omnino praecedentis, at tamen diſtincta videtur tota laete aenea, nitida. Antennae nigrae. Pedes teſtacei femoribus nigris.

17. L. ſubvilloſa nigra thorace elytrisque cyaneis. *minuta.*
Anobium minutum Sp. Inſ. 1. 72. 8.
Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.
Statura omnino L. cyaneae at duplo minor & corpus nigrum.
Variat interdum elytris vireſcentibus.

61. CEROCOMA. *Palpi* aequales, filiformes.
Maxilla linearis, integra.
Labium membranaceum, bifidum.
Antennae moniliformes, irregulares.

1. C. viridis antennis pedibusque luteis. *Schaefferi.*
Meloe Schaefferi Linn. ſyſt. nat. 2. 681. 12.

Cerocoma Geoff. Inſ. 1. 358. 1.
Schaeff. Elem. tab. 37.
Icon. tab. 53. fig. 8. 9.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 7. fig. 13.
Habitat in Europa auſtrali.
Maris tibiae tarſique dilatatae, appendiculatae.

Vahlii. 2. C. viridis antennis pedibusque nigris.
Habitat in Barbariae umbellatis Dom. Vahl.
Nimis praecedenti affinis & forte mera ejus varietas. Abdominis baſis rufeſcens.

Schreberi. 3. C. viridis antennis pedibus abdominiſque ſegmentis tribus flavis.
Habitat in Europa auſtrali Dom. Schreber.
Nimis praecedentibus affinis at duplo fere major. Antennae irregulares, flavae.

microcephala. 4. C. antennis biarticulatis: clava irregulari dentata maxima, corpore fuſco.
Pauſſus microcephalus. Linn. Diſſ. Big. Inſ. tab. 1. fig. 6. 10.
Pauſſus microcephalus. Thunb. Act. Sv. 1781. 170. 1.
Habitat in Africa Muſ. Dom. Banks.
Ad ulteriorem examinationem hic inſero inſectum ſingulare, proprium genus uti videtur conſtituens, mihi haud rite notum.

lineata. 5. C. antennis biarticulatis: clava elongata integra, fuſca elytris linea nigra.

Cerocomae corpus oblongum, laeve, pubeſcens immarginatum, tardum, capite ovato, prominulo, inflexo, oculis lateralibus, ovatis, antennis approximatis, thorace brevioribus, thorace brevi, ovato, ſupra plano, ſcutello breviſſimo, rotundato, elytris incumbentibus, molliuſculis, longitudine abdominis, pedibus longiuſculis, tenuibus, curſoriis, tarſis anticis quinque, poſticis quadriarticulatis, colore aeneo, nitido.

Pauſſus lineatus. Thunb. Act. Sv. 1781. 170. 3. tab. 1. fig. 4. 5.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Ejusdem generis videtur mihi haud rite nota.

6. C. antennis biarticulatis: clava elongata integra, nigra thorace elytrorumque ſtriga ferrugineis. *ruficollis.*
Habitat — — Dom. Lund.
Parva ſtatura praecedentium & ejusdem generis videtur. Antennae magnae, clavatae, irregulares, ferrugineae. Caput nigrum. Thorax laevis, ferrugineus, immaculatus. Elytra nigra ſtriga media margineque omni a ſtriga ad apicem ferrugineis. Pedes nigri.

62. LYTTA. *Palpi* quatuor inaequales.
poſtici clavati.
Maxilla bifida.
Labium truncatum.
Antennae filiformes.

1. L. viridis antennis nigris. *vesicatoria* *Ruficollis.*
Meloe veſicatorius. Linn. ſyſt. nat. 2. 679. 3. Fn. Sv. 827.
Cantharis veſicatoria Oliv. Inſ. 46. tab. 1. fig. 1.
Geoff. Inſ. 1. 341. 1. tab. 6. fig. 5.
Degeer Inſ. 4. 12. 2. tab. 1. fig. 9.

Lyttae corpus oblongum, laeve, glabriuſculum, immarginatum, tardum, capite magno, exſerto, ovato, thorace latiore, oculis lateralibus, rotundatis, antennis diſtantibus, in oculorum cantho interiori inſertis, thorace longioribus, thorace ſubcylindrico, ſcutello minuto, elytris molliuſculis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus elongatis, tenuibus, curſoriis, tarſis anticis quinque, poſticis quadriarticulatis, colore vario, nitidulo.

Schaeff. Icon. tab. 47. fig. 1.
Sulz. Hift. Inf. tab. 7. fig. 55.
Habitat in Europae Liguſtro, Fraxino, Sambuco.
Officinalis pro veſicatoriis.

ſegetum. 2. L. aurea elytris viridibus.
Habitat in Barbariae Segete Muſ. D. Desfontaines.
Statura omnino & ſumma affinitas praecedentis at duplo minor & diſtincta. Antennae nigrae. Caput & thorax mox aurea, mox viridi aenea, auro nitentia. Elytra viridia. Corpus ſemper aureum pedibus obſcurioribus.
Variat corpore toto cyaneo.
Odorem nullum ſpargit.

nitidula. 3. L. viridi aenea elytris teſtaceis.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Minor L. veſicatoria. Antennae nigrae.

collaris. 4. L. atra vertice thorace pedibusque ferrugineis, elytris cyaneis.
Habitat in Roſſia meridionali Dom. Boeber.
Magna. Antennae ferrugineae. Caput nigrum fronte margineque ferrugineis. Thorax ferrugineus margine omni parum nigro. Elytra cyanea, obſcure nitida. Corpus atrum pedibus ferrugineis.
Mas faemina duplo minor.

gigas. 5. L. cyanea pectore ferrugineo.
Oliv. Inf. 46. tab. 1. fig. 9.
Habitat in Guinea D. Iſert.
Corpus ſtatura & magnitudine L. veſicatoriae totum obſcure cyaneum pectore ſolo ferrugineo. Alter ſexus elytris ſubſtriatis, alter laevibus.

ſyriaca. 6. L. villoſa viridi coerulea thorace rotundato ferrugineo.

Meloe ſyriacus. Linn. ſyſt. nat. 2. 680. 4. Muſ. Lud. Ulr. 102.
Cantharis ſyriaca. Oliv. Inſ. 46. tab. 1. fig. 5.
Herbſt Arch. tab. 30. fig. 1.
Habitat in Europa auſtraliori frequens.

7. L. glabra viridi aurea thorace antice attenuato rufo. *ruficollis.*
Cantharis ruficollis. Oliv. Inſ. 46. tab. 1. fig. 6.
Pallas Inſ. 3. tab. E. fig. 35.
Herbſt Arch. tab. 48. fig. 4.
Habitat in India orientali Muſ. D. Olivier.
Diſtincta a praecedente minor, mox aurea, mox viridi aenea, nitida, thorace ſemper antice attenuato, rufo.

8. L. ſupra teſtacea elytris macula magna oblonga apicis nigra. *teſtacea.*
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.
Caput teſtaceum ore antennisque nigris. Thorax punctatus, teſtaceus. Elytra laevia, teſtacea macula magna oblonga, nigra. Corpus atrum.

9. L. viridi aenea nitida elytris teſtaceis: maculis viridi aeneis. *feſtiva.*
Meloe feſtiva. Pall. Iter. 2. 721. 54.
Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.
Corpus totum viridi aeneum, immaculatum. Maculae elytrorum aeneae variant.

10. L. atra elytrorum marginibus cineraſcentibus. *marginata.*
Meloe cinereus Forſt. nov. ſp. Cent. 1. 62. 62.
Cantharis marginata. Oliv. Inſ. 46. tab. 1. f. 2.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
L. veſicatoria minor, ſupra tota atra, opaca. Subtus & margo exterior elytrorum pubeſcens, cinereus.

vittata. 11. L. elytris nigris: vitta marginibusque flavis.
Cantharis vittata. Oliv. Inſ. 46. tab. 1. fig. 3.
Pall. Inſ. tab. E. fig. 53.
Habitat in America Muſ. D. Hunter.
Affinis praecedenti. Caput flaveſcens vertice maculis duabus nigris. Thorax niger lineis tribus flavis. Elytra nigra margine omni vittaque media flavis. Abdomen & pedes nigra.

atrata. 12. L. corpore atro immaculato.
Meloe penſylvanica. Degeer Inſ. 5. 16. 1. tab. 13. fig. 1.
Habitat in Barbaria Dom. Prof. Vahl.
Praecedente duplo minor & tota atra.

erythrocephala. 13. L. atra capite teſtaceo, thorace elytrisque cinereo lineatis.
Meloe erythrocephala. Pall. Iter. 1. 466. 46.
Herbſt Arch. tab. 30. fig. 2.
Scop. Ann. Hiſt. nat. 5. 103. 81.
Habitat in Auſtria Muſ. D. Schulz.
Affinis L. atratae at caput teſtaceum ore lineaque media nigra. Thorax canaliculatus.

ocellata. 14. L. nigra puncto calloſo flavo pone oculos.
Habitat in Guinea D. Isert.
Praecedentibus minor, tota nigra, immaculata puncto magno elevato flavo utrinque pone oculos. Pedes nigri.
Faeminam majorem, apteram, elytris abbreviatis miſit Dom. de Paykull.

dubia. 15. L. atra capitis vertice fulvo, thorace elytrisque immaculatis.
Meloe algiricus. Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 7. fig. 12.
Habitat in Sibiria Muſ. Dom. Banks.
Affinis praecedenti, a quo tamen differt vertice capitis rufo, immaculato, thorax elytrisque atris immaculatis.

16. L. nigra thorace rufo. *afra.*
Meloe afer. Linn. ſyſt. nat. 2. 680. 10.
Cantharis afra. Oliv. Inſ. 46. tab. 1. fig. 4.
Roſſ. Fn. Etr. 240. 594. tab. 3. fig. 1. t. 3. f. 3.
Habitat in Africa.
Forte ad Zonitis genus emendanda mihi haud rite nota.

17. L. coeruleo nigricans abdomine poſtice rufo. *haemorrhoidalis.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. de Paykull.
Parva. Antennae nigrae. Caput & thorax villoſa, nigra, coeruleo parum nitentia. Elytra magis coeruleſcentia. Corpus coeruleſcens, nitidulum ano late rufo.

63. MYLABRIS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla cornea, compreſſa, bifida.
Labium membranaceum, ſubemarginatum.
Antennae moniliformes.

1. M. nigra elytris faſcia media flava. *faſciata.*
Habitat in Indiis D. Torſtenſon.

Mylabris corpus oblongum, laeve, ſubpubeſcens, immarginatum, tardum, capite magno, exſerto, ovato, inflexo, oculis rotundatis, lateralibus, antennis diſtantibus, ante oculos inſertis, thorace rotundato, ſcutello parvo, quadrato, elytris rigidiuſculis, fornicatis, abdomine longioribus, pedibus longiuſculis, curſoriis, tarſis anticis quinque, poſticis quadriarticulatis, colore nigro, obſcuro, elytris teſtaceis nigro maculatis.

M. Cichorei major. Caput nigrum oculis teſtaceis. Thorax niger utrinque macula ferruginea. Elytra nigra faſcia media, lata, lutea. Alae hyalinae coſta venisque ferrugineis.

Cichorei. 2. M. nigra elytris flavis: faſciis tribus nigris. Linn. ſyſt. nat. 2. 680. 5. Muſ. Lud. Ulr. 103.
Oliv. Inſ. 47. tab. 1. fig. 1. 2. 3. 8. 9. 10.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 7. fig. 11.
Degeer Inſ. 5. 17. 2. tab. 13. fig. 2.
Habitat in totius Orientis Cichoreis in China officinalis.
Variat elytrorum faſciis & colore.

praeuſta. 3. M. atra elytris apice teſtaceis: macula atra.
Habitat in Barbariae Segete Muſ. D. Desfontaines.
Statura omnino M. Cichorei at paullo minor. Corpus totum atrum elytris ſolis apice teſtaceis macula magna, transverſa, atra.

marginata. 4. M. atra elytrorum margine ſanguineo.
Habitat in Barbariae Segete Muſ. D. Desfontaines.
Statura omnino & magnitudo M. Algiricae at elytra atra margine exteriori ſanguineo.

algirica. 5. M. atra elytris teſtaceis immaculatis Linn. ſyſt. nat. 2. 651. 11. Oliv. Inſ. 47. tab. 1. fig. 5.
Lytta indica. Herbſt Arch. tab. 30. fig. 3.
Wulf Inſ. cap. tab. 1. fig. 8.
Cyrill. Ent. Neapolit. 1. tab. 2. fig. 10.
Habitat in India.

capenſis. 6. M. nigra elytris maculis ſex flavis: prima arcuata. Linn. ſyſt. nat. 2. 180. 7. Muſ. Lud. 104.
Wulf Inſ. Capenſ. tab. 1. fig. 5.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Duplo minor M. Cichorei.

7. M. villoſa nigra elytris macula baſeos faſciisque duabus dentatis flavis. *Hermanniae.*
Habitat in Guineae Hermanniis D. Iſert.
Affinis certe M. Cichorei at triplo minor. Antennae nigrae apice ferrugineae. Caput & thorax nigra villis cinereis ſparſis hirta. Elytra nigra baſi macula magna margineque exteriori flavis. Faſciae duae pone medium dentatae, flavae. Corpus atrum, nitidum.

8. M. villoſa atra elytris faſciis duabus: anteriore flava; puncto nigro, poſteriore rufa. *punctum.*
Habitat Tranquebariae Dom. Lund.
Minor M. Cichorei. Caput & thorax villoſa, atra, immaculata. Elytra atra faſcia antica lata, flava: puncto medio diſtincto atro, poſtica lata ferruginea, immaculata.

9. M. atra elytris teſtaceis: punctis quinque nigris. *10punctata.*
Meloe 4 punctata. Linn. ſyſt. nat. 2. 680. 6.
Oliv. Inſ. 47. tab. 1. fig. 4.
Habitat in Italia D. Allioni.
Triplo minor M. Cichorei. Antennae nigrae. Corpus nigrum. Elytra teſtacea punctis quinque nigris 2. 2. 1.

10. M. atra elytris teſtaceis: punctis duobus nigris. *4punctata.*
Habitat in Roſſia Muſ. Dom. Banks.
Affinis praecedenti. Differt tantum elytris teſtaceis: maculis duabus dorſalibus nigris.

11. M. nigra coleoptris flavis: faſcia punctoque communi fuſcis. Cyrilli Ent. Neapolit. 1. tab. 3. fig. 7. *3maculata.* ✓
Habitat in Oriente Prof. Forſkahl.
M. capenſi quadruplo minor, tota laevis, atra. Coleoptra flava macula communi in medio dorſi & faſcia poſtica fuſcis, quae tamen marginem exteriorem haud attingit.

argentata. 12. M. villoſo argentea elytris maculis flaveſcentibus: plerisque margine connexis.
Habitat in Senegalia Muſ. Dom. de Paykull.
Parva. Antennae ferrugineae. Thorax tomento argenteo, immaculato. Elytra argento tomentoſa macula parva baſeos, tribus marginalibus, unica verſus apicem flavis annulo nigro cinctis. Praeterea punctum atrum in medio & apex flaveſcens. Corpus argento tomentoſum ano albido. Pedes ferruginei.

64. HORIA. *Palpi* quatuor filiformes. *Maxilla* unidentata. *Labium* bifidum: laciniis linearibus, diſtantibus. *Antennae* moniliformes.

maculata. 1. H. flaveſcens elytris maculis ſeptem nigris.
Horia maculata. Oliv. Inſ. tab. fig.
Cucujus maculatus. Swed. Act. Holm.
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Olivier.
Statura omnino H. teſtaceae at paullo major. Corpus totum flavum mandibulis pedibusque nigris. Elytra maculis ſeptem 2. 2. 2. & ultimo terminali.
Character generis emendandus. Os maxillis palpisque. Palpi quatuor aequales, filiformes, anteriores quadriarticulati: articulis ſubaequalibus, ultimo cylindrico adhaerentes maxillae dorſo, poſteriores triarticulati adnati labii medio. Mandibula magna, craſſa, fornicata, exſerta, obtuſa, ante apicem unidentata. Maxilla recta, cornea, unidentata. Labium membranaceum, biſidum: laciniis linearibus, diſtantibus ſub palpis reconditum.

2. H. rufa antennis pedibusque nigris Mant. Inſ. 1. 164. 1. *teſtacea.*
Cucujus clavipes Mant. Inſ. 1. 166. 4.
Hybn. Naturf. 24. 47. 13. tab. 2. fig. 14-17.
Habitat Tranquebariae.
Corpus magnum, cylindricum, rufo teſtaceum pedibus ſolis nigris femoribus baſi ferrugineo teſtaceis.
Mas femoribus poſticis incraſſatis, ſubtus canaliculatis dentatis.

65. LYMEXYLON. *Palpi* antici porrecti: articulo penultimo magno; appendiculo ovato, fiſſo, ultimo ovato, acuto. *Antennae* filiformes.

1. L. teſtaceum oculis alis pectoreque nigris. *dermeſtoides.*
Horia dermeſtoides. Mant. Inſ. 1. 164. 2.
Cantharis dermeſtoides. Linn. ſyſt. nat. 2. 650. 25. Fn. Sv. 702.
Lytta Francofurtana. Herbſt Arch. tab. 30 fig. 4.

Lymexylon corpus elongatum, cylindricum, glabrum, immarginatum, agile, capite rotundato, ſupra plano, inſerto, oculis rotundatis, prominulis, lateralibus, antennis diſtantibus, brevibus, ante oculos inſertis, thorace brevi, transverſo, vix marginato, ſcutello rotundato, elytris incumbentibus, flexilibus, longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, femoribus compreſſis, tarſis quinquearticulatis, colore obſcuro.

Lymexylon dermeſtoides. Oliv. Inſ. 25. t. 1. f. 1.
Habitat in Europa.

abbreviatum. 2. A. nigrum thoracis linea dorſali flava, elytris breviſſimis fornicatis.
Habitat in Sierra Leon Africae D. Pflug.
Caput planum, nigrum linea frontali flava. Antennae breves, in medio craſſiores. Thorax niger linea dorſali lata, flava. Elytra breviſſima, fornicata, obſcura. Alae albidae venis fuſcis, abdomine breviores. Abdomen elongatum, planum, nigrum ultimo ſegmento margine ferrugineo. Pedes nigri apice teſtacei.

proboſcideum. 3. L. nigrum elytris teſtaceis apice nigris.
Lymexylon proboſcideum. Oliv. Inſ. 25. 6. 5. tab. 1. fig. 5.
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.
Caput & thorax plana, depreſſa, nigra, immaculata. Elytra laevia, teſtacea apice nigra. Abdomen nigrum apice teſtaceum.

barbatum. 4. L. fuſcum antennis tibiisque piceis.
Lymexylon barbatum. Oliv. Inſ. 25. 5. 3. tab. 1. fig. 3.
Mordella barbata fuſca palpis enſiformibus trilobis: lobis lateralibus latiſſimis Schall. Act. Hallenſ. 1. 322. tab. 1. fig. 7.
Schaeff. Icon. tab. 279. fig. 7.
Habitat in Germaniae lignis.
Praeccdenti affinis. Corpus fuſcum tomento aureo fugaci nitidum. Antennae & pedes pallidiores.
Mas L. dermeſtoides obſervante Helvigio.

navale. 5. L. luteum capite elytrorumque margine apiceque nigris.
Lymexylon navale. Oliv. Inſ. 25. 5. 4. tab. 1. fig. 4.

Cantharis navalis. Linn. ſyſt. nat. 2. 650. 26. Fn. Sv. 718. Iter. Wgoth. 155. tab. 2. fig. Friſh Inſ. 13. 24. tab. 20. Schaeff. Icon. tab. 59. fig. 1. Habitat in Quercus lignum, quod deſtruit. Variat rarius elytris totis nigris.

6. L. nigrum elytris baſi, abdomine apice pedibusque flavis. *flavipes.*
Habitat in Saxoniae ligno Dom. Hybner.
Caput, thorax, antennae nigrae, immaculatae. Elytra nigra baſi ad futuram flava. Corpus nigrum. Abdomen apice flavum. Pedes flavi. Faemina mare triplo major.

7. L. nigrum pedibus anticis flavis. *morio.*
Habitat in Saxoniae lignis Dom. Hybner.
Corpus totum nigrum pedibus quatuor anterioribus ſolis flavis.
Mas faemina triplo minor. Magnitudine praecedentis.

66. CUCUJUS.

Palpi quatuor aequales: articulo ultimo truncato, craſſiori.

Labium breve, bifidum: laciniis linearibus, diſtantibus.

Antennae moniliformes & filiformes.

1. C. thorace denticulato elytrisque rufis, pedibus ſimplicibus nigris. *depreſſus.*
Cantharis ſanguinolenta. Linn. ſyſt. nat. 2. 646. 19.
Friſh Inſ. 12. tab. 7. fig. 1.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Antennae nigrae, piloſae articulis undecim: ultimo acuto. Caput depreſſum, planum, rufum ore oculisque nigris, poſtice utrinque angulo obtuſo globoſo auctum. Thorax planus, ſubſulcatus, rufus margine denticulato tenuiſſime nigro. Elytra plana, rigida, rufa. Corpus ſubtus & pedes nigra.

ſulcatus. 2. C. thorace ſulcato niger elytris crenato ſtriatis.

Habitat in Croatiae ligno-putreſcente Dom. Saldoner.

Antennae breves, ſubfiliformes. Caput triſulcatum ſulco intermedio longiore. Thorax triſulcatus ſulcis lateralibus apicem haud attingentibus.

ruſipes. 3. C. thorace ſulcato, elytris punctatis ater antennis pedibusque ferrugineis.

Habitat in Barbariae ligno Muſ. D. Desfontaines.

Magnus in hoc genere, depreſſus. Antennae cinerascentes articulo primo majori, incurvo, atro. Caput punctatum, atrum, immaculatum. Thorax poſtice anguſtatus ſulcis tribus fere obſoletis exaratus. Elytra connata, plana, depreſſa punctis numeroſis ſparſis impreſſa. Abdomen piceum pedibus ferrugineis.

coeruleus. 4. C. thorace ſulcato niger elytris ſtriatis coeruleis, abdomine rufo.

Cucujus corpus oblongum, depreſſum, planum, glabrum, agile, capite ovato, exſerto, ad angulum poſticum producto, oculis parvis, rotundatis, lateralibus, prominulis, antennis elongatis, diſtantibus, ſub oculis inſertis, thorace plano, ſubmarginato, rotundato, margine ſaepius dentato, ſcutello brevi, rotundato, elytris planis, rigidis, includentibus, longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, femoribus ſubclavatis, tarſis quadriarticulatis, colore obſcuro.

Tenebrio depreſſus. Linn. ſyſt. nat. 2. 677. 24.
Habitat in Germania Dom. Schneider.
Major C. depreſſo at ſtatura eadem. Caput nigrum ore piceo. Thorax depreſſus, canaliculatus ſulcoque utrinque profundo, abbreviato exaratus. Elytra coerulea, nitida, ſtriata. Abdomen rufum pedibus nigris.

5. C. thorace ſulcato niger elytris ſtriatis coeruleis, abdominis margine tibiisque rufis. *feſtivus*
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura omnino C. coerulei at duplo minor. Corpus nigrum. Thorax biſulcatus aut potius utrinque impreſſus, niger. Elytra ſtriata, coerulea, nitida. Abdomen nigrum margine rufo. Pedes rufi femoribus nigris.

6. C. thorace ſulcato niger elytris ſtriatis abdominis margine pedibusque teſtaceis. *caſtaneus.*
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Affinis certe praecedenti & forte mera ejus varietas. Differt tantum elytris teſtaceis: margine poſtico parum nigro.

7. C. thorace denticulato rufus elytris nigris, antennis filiformibus longitudine corporis. *dubius.*
Habitat in America boreali.
Ab hoc genere differt antennis longioribus flexuoſis articulo ultimo acuto. Caput rufum. Thorax denticulatus, rufus. Elytra ſtriata, nigra, obtuſa. Corpus cum pedibus rufum.

8. C. thorace denticulato nigro, pedibus flaveſcentibus, antennis filiformibus longitudine corporis. *flavipes.*
Cerambyx planatus. Linn. ſyſt. nat. 2. 625. 15.
Habitat in Europae borealis truncis decorticatis.

Antennae elongatae, filiformes, fuſcae. Caput nigrum ore flaveſcente. Thorax denticulatus, ſulcatus, niger. Elytra laevia, fuſca.

pallens 9. C. thorace ſerrato obſcuro, elytris ſtriatis, abdomine pedibusque teſtaceis.

Habitat in Germania Dom. Daldorff.

Nimis affinis C. flavipes. Antennae filiformes longitudine corporis, obſcurae. Caput obſcurum. Thorax planus, ſerratus, obſcurus. Elytra ſtriata, teſtacea. Abdomen & pedes teſtacea.

dermeſtoides 10. C. thorace ſulcato fuſcus elytris laevibus teſtaceis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Parvus. Antennae breves. Corpus fuſcum. Thorax fuſcus, biſulcatus. Elytra laevia, biſulcata.

teſtaceus. 11. C. thorace ſubquadrato mutico teſtaceus femoribus compreſſis.

Habitat ſub Betulae corticibus Muſ. D. Romani.

Triplo minor C. flavipes. Antennae filiformes, teſtaceae longitudine fere corporis. Corpus elongatum, teſtaceum, immaculatum. Pedes breves, teſtacei femoribus compreſſis.

muticus. 12. C. thorace mutico nigro: puncto utrinque impreſſo, elytris ſtriatis fuſcis.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Statura depreſſa praecedentium. Antennae filiformes corpore breviores. Caput & thorax atra, immaculata thorace punctis duobus baſeos impreſſis. Elytra filiformia, ſtriata, obſcura ſive fuſca. Pedes ſimplices, nigri.

monilis. 13. E. thorace mutico niger thoracis margine elytrorumque macula ferrugineis.

Habitat in Germania.

Antennae breves, moniliformes. Corpus ſubtus obſcure ferrugineum.

67. COSSYPHUS. *Palpi* quatuor inaequales.
antici ſecuriformes.
Maxilla bifida.
Antennae clava perfoliata.

1. Coſſyphus. *depreſſus.*

Coſſyphus depreſſus Oliv. Inſ. tab. fig.

Lampyris depreſſa fuſca clypei elytrorumque margine dilatato plano. Mant. Inſ. 1. 162. 19.

Herbſt Arch. tab. 46. fig. 7.

Habitat in India orientali, Mauritania.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, anteriores longiores, quadriarticulati: articulo ſecundo longiori, ultimo ovato, ſecuriformi adhaerentes maxillae dorſo, poſteriores breves, triarticulati: articulo ultimo ovato, ſubaequali adnati labii baſi exteriori. Mandibula cornea, arcuata, apice fiſſa. Maxilla brevis, cylindrica, membranacea, bifida: laciniis ſubaequalibus, filiformibus. Labium breve, corneum, rotundatum: margine parum reflexo, integro. Antennae articulis undecim: ultimis quatuor craſſioribus, perfoliatis. Corpus totum fuſcum, minime nitidum. Margo clypei & elytrorum valde dilatatus, planus, vix reflexus. Elytra ſtria in medio unica elevata.

68. LAMPYRIS. *Palpi* quatuor ſubclavati.
Maxilla bifida.
Labium corneum, integrum.
Antennae filiformes.

noctiluca. 1. L. oblonga fuſca clypeo cinereo. Linn. ſyſt. nat. 2. 643. 1. Fn. Sv. 699.
Oliv. Inſ. 28. tab. 1. fig. 2.
Degeer Inſ. 4. 31. 1. tab. 1. fig. 19. 20.
Habitat in Europae borealis Juniperetis.

ſplendidula 2. L. oblonga fuſca clypeo apice hyalino. Linn. ſyſt. nat. 2. 644. 3.
Oliv. Inſ. 28. 11. 1. tab. 1. fig. 1.
Geoff. Inſ. 1. 166. 1.
Mouff. Inſ. 109. fig. 1. 2.
Brad. nat. tab. 26. fig. 3. A. B.
Habitat in Europae ſylvaticis tempeſtate pluvioſa inprimis lucem ſpargens.

corruſca. 3. L. obſcure nigra clypeo utrinque lunula roſea. Linn. ſyſt. nat. 2. 644. 2.
Oliv. Inſ. 28. tab. 2. fig. 14.
Habitat in America boreali D. Blakburn.

Lampyris corpus oblongum, glabrum, marginatum, capite parvo, rotundato, ſub thoracis clypeo recondito, oculis maximis, globoſis, approximatis, antennis brevibus, approximatis, ſupra oculos inſertis, thoracis clypeo marginato, dilatato, caput tegente, ſcutello parvo, rotundato, elytris molliuſculis, incumbentibus, longitudine abdominis, (faemina aptera) abdomine ſaepius phoſphoreſcente, pedibus brevibus, compreſſis, validis, tarſis quinquearticulatis, colore ſaepius obſcuro.

Corpus totum obſcure nigrum, minime nitidum. Clypeus utrinque linea lunata roſea ab apice ad baſin ducta.
Duplo major ex America Muſ. D. Banks.

4. L. nigra clypeo utrinque macula rufa. *obſcura.*
Oliv. Inſ. 28. tab. 2. fig. 13.
Habitat in Terra del Fuego Muſ. Dom. Banks.
Clypeus integer, niger lateribus depreſſis macula magna rufa. Elytra fuſca, immaculata. Abdomen & pedes nigra.

5. L. ovata atra clypei margine rufo, antennis compreſſis. *laticornis.*
Lampyris laticornis. Oliv. Inſ. 28. tab. fig. 1
Habitat in Senegalia Muſ. Dom. Olivier.
Media. Antennae ſingulares, compreſſae, craſſiores, atrae. Clypeus rotundatus, ater margine utrinque rufo. Elytra ſubſtriata, atra, immaculata. Corpus atrum abdomine punctis duobus aut tribus ultimi ſegmenti albo pellucidis.

6. L. clypeo rufo: medio nigro, elytris nigris: marginibus abdomineque albis. Linn. ſyſt. nat. 2. 644. 4. Muſ. Lud. 78. *pyralis.*
Oliv. Inſ. 28. tab. 2. fig. 11.
Degeer Inſ. 4. 52. 7. tab. 17. fig. 7.
Habitat in America meridionali.
Margo clypei ipſe uti margo elytrorum rufeſcens.

7. L. fuſca thorace elytrorum margine abdominisque apice fulvis. *cincta.*
Oliv. Inſ. 28. tab. 3. fig. 22.
Habitat in Poulicandor Muſ. Dom. Banks.
Caput fuſcum. Abdomen nigrum ſegmento penultimo albo, ultimo fulvo. Pedes nigri femoribus fulvis.

marginata. 8. L. oblonga nigra thoracis elytrorumque margine omni ſcutello abdominisque poſtico flavis. Linn. ſyſt. nat. 2. 644. 5.
Oliv. Inſ. 28. tab. 2. fig. 16.
Panz. Naturf. 24. 31. 43. tab. 1. fig. 43.
Habitat in America.
Antennae fuſcae baſi flavae. Pedes variegati.

pectinata. 9. L. atra clypei lateribus baſi exteriore, elytrorum abdominisque apicibus albis, antennis pectinatis.
Degeer Inſ. 4. 51. 11. tab. 17. fig. 13.
Linn. ſyſt. nat. 2. 649. 17.
Habitat in America.
Antennae pectinatae longitudine fere corporis.

flabellicornis. 10. L. nigra clypeo ante marginem elytris lineola marginali baſeos abdomineque apice albis.
Oliv. Inſ. 28. tab. 3. fig. 26.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.
Antennae maximae, flabellatae. Clypeus niger ante marginem exteriorem & anticum pallidus. Elytra vix ſtriata, nigra lineola pallida ante marginem exteriorem baſeos. Corpus nigrum ano albo.

Heſpera. 11. L. ovata elytris fuſcis: macula marginali triangulari flava.
Linn. ſyſt. nat. 2. 644. 6.
Oliv. Inſ. 28. tab. 1. fig. 6.
Degeer Inſ. 4. 49. 2. tab. 17. fig. 1.
Habitat in America.
Clypeus flavus macula antica fuſca.

ignita. 12. L. ovata elytris fuſcis: macula marginali ovata lutea. Linn. ſyſt. nat. 2. 645. 7.
Oliv. Inſ. 28. tab. 1. fig. 7.
Degeer Inſ. 4. 49. 2. tab. 17. fig. 2.
Habitat in America meridionali.

Clypeus maculis duabus anticis fuſcis. Abdomen flavum.

13. L. oblonga elytris fuſcis: margine exteriori lucida, luteo, abdomine flavo. Linn. ſyſt. nat. 2. 645. 8. *lucida.*
Oliv. Inſ. 28. tab. 2. fig. 19.
Degeer Inſ. 4. 51. 5. tab. 17. fig. 5.
Sulz. Inſ. tab. 5. fig. 22.
Habitat in America meridionali.
Nimis L. noctilucae affinis videtur.

14. L. oblonga fuſca thorace flaveſcente: macula media nigra, abdominis apice maculis duabus flavis. *nitidula.*
Oliv. Inſ. 28. tab. 2. fig. 15.
Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. Dom. Banks.
Caput atrum. Elytra vix ſtriata, fuſca, immaculata. Abdomen fuſcum apice ſive ultimo ſegmento ſubtus maculis duabus flavis.

15. L. oblonga ſubteſtacea abdomine atro poſtice flaviſſimo. Linn. ſyſt. nat. 2. 645. 9. *phoſphorea* ✓
Degeer Inſ. 4. 51. 6. tab. 17. fig. 6.
Habitat in America meridionali.
Antennae nigrae.

16. L. flava ſegmento abdominis antepenultimo nigro. *Japonica.* ✓
Thunb. nov. ſp. 4. 79.
Oliv. Inſ. 28. tab. 2. fig. 18.
Habitat in Japonia menſe Maii & Junii copioſiſſima veſperi lumine phoſphoreo e veſiculis binis caudalibus aera replens. Thunb.
Tota flava antennis, oculis, alis ſegmentoque abdominis antepenultimo nigris.

17. L. atra thoracis margine rufo. *atra.*
Lampyris atra. Oliv. Inſ. 28. tab. 3. fig. 28.
Habitat in America boreali.

Antennae ferratae. Corpus atrum ſolo margine thoracis rufo.

✓ *capenſis.* 18. L. livida thorace flaveſcente, abdomine poſtice flaviſſimo.
Oliv. Inſ. 28. tab. 2. fig. 17.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Antennae fuſcae. Caput nigrum ore livido. Scutellum flaveſcens. Elytra livida macula baſeos fuſca margineque flaveſcente. Alae nigrae. Pedes lividi plantis fuſcis.
Variat thorace maculis duabus fuſcis.

✓ *auſtralis.* 19. L. flavicans capite elytrisque fuſcis, abdomine apice albiſſimo. Mus. Sole. Orb.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Varietatem L. italicae credit Olivier at vix rite. Thorax & ſcutellum ferruginea. Subtus tota flavicans abdominis ultimis ſegmentis albiſſimis. Pedes flaveſcentes plantis nigris.

✓ *italica.* 20. L. nigra thorace transverſo pedibusque rufis, abdomine apice albiſſimo. Linn. ſyſt. nat. 2. 645. 11.
Oliv. Inſ. 28. tab. 2. fig. 12.
Degeer Inſ. 4. 53. 9. tab. 17. fig. 9. 10.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 3.
Habitat in Italiae arboribus.
Antennae nigrae. Thorax immaculatus.

vittata. 21. L. rufa elytris nigris: margine omni vittaque media abbreviata flavis.
Oliv. Inſ. 28. tab. 3. fig. 20.
Habitat in Inſula Guadeloupe Dom. de Badier.
Paullo major L. italica. Caput rufum antennis nigris: articulis baſi ferrugineis. Thorax orbiculatus, rufus, immaculatus. Elytra laevia, nigra, margine futura vittaque media flavis,

quae tamen apicem haud attingit. Corpus ferrugineum. Pedes ferruginei geniculis nigris.

22. L. elytris lividis, corpore flavo. Linn. ſyſt. nat. 2. 645. 10. *mauritanica.*
Oliv. Inſ. 28. tab. 1. fig. 5.
Habitat in Africa.

23. L. nigra elytris breviſſimis. *hemiptera.*
Lampyris hemiptera Geoff. Inſ. 1. 168. 2.
Oliv. Inſ. 28. tab. 3. fig. 25.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Parva. Antennae compreſſae. Clypeus rotundatus, integer, niger, immaculatus. Elytra ovata, breviſſima, nigra. Abdomen planum, nigrum. Pedes nigri.

69. OMALYSUS. *Palpi* quatuor aequales, extrorſum craſſiores. *Maxilla* membranacea, bifida. *Labium* emarginatum. *Antennae* filiformes.

1. Omalyſus. ♀ *futuralis.*
Omalyſus. Geoff. Inſ. 1. 180. 1. tab. 2. fig. 9.
Omalyſus futuralis. Oliv. Inſ. 24. 14. 1. tab. 1. fig. 1.
Fourcroi Ent. 1. 64. 1.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Olivier.
Genus Pyrochrois valde affine, attamen diſtinctum videtur. Palpi quatuor, aequales, extrorſum craſſiores, anteriores quadriarticulati: articulo ultimo majori, obtuſo adhaerentes maxillae dorſo, poſteriores vix breviores, triar-

ticulati: articulo ultimo parum craſſiori, obtuſo adnati labio. Mandibula elongata, tenuis, cornea, arcuata, acuta, edentula. Maxilla brevis, membranacea, bifida: laciniis aequalibus. Labium breve membranaceum, emarginatum. Antennae filiformes, undecim articulatae fere longitudine corporis.

Corpus ſtatura fere Pyrochroae planum. Elytra punctato ſtriata, rufa, ad futuram late nigra.

70. PYROCHROA. *Palpi* quatuor ſubfiliformes.

Maxilla integra.

Labium corneum, lineare, integrum.

Antennae filiformes.

coccinea. 1. P. nigra thorace elytrisque ſanguineis immaculatis.

Lampyris coccinea. Linn. ſyſt. nat. 2. 646. 18. Fn. Sv. 705.

Pyrochroa. Geoff. Inſ. 1. 338. 1. tab. 6. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 4.

Degeer Inſ. 4. 47. 4.

Habitat in Europae ſepibus.

Pyrochroae corpus oblongum, planum, depreſſiuſculum, immarginatum, tardum, capite ovato, exſerto, plano, oculis rotundatis, prominulis, lateralibus, antennis thorace longioribus, ſerratis, ſuboculis inſertis, thorace rotundato, plano, ſcutello minuto, rotundato, elytris rigidiuſculis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus longiuſculis, tenuibus, curſoriis, tarſis anticis quinque poſticis quadriarticulatis, colore rubro nigroque nitidiuſculo.

2. P. nigra capite thorace elytrisque ſanguineis immaculatis. *rubens.*
Lampyris rubens. *Act.* Hallenſ. 1. 301.
Habitat in truncis putreſcentibus Salicis inventa Pariſiis frequens & nuper excluſa.
Vix a praecedente diſtincta, ſorte varietas tantum ſexus. Differt tantum capite ruſo.

3. P. coccinea antennis elytrisque nigris. *flabellata.*
Habitat in America Muſ. D. Hunter.
Antennae valde ſerratae, nigrae articulo primo rufo. Caput, thorax, abdomen, pedes rufa, immaculata. Elytra laevia, nigra, immaculata.

4. P. atra thorace elytrisque teſtaceis, antennis pectinatis. *pectinicornis.*
Cantharis pectinicornis thorace orbiculato, elytris rufo teſtaceis, antennis pectinatis. Linn. ſyſt. nat. 2. 650. 20. Fn. Sv. 715.
Habitat in Germania Dom. Hübner.
Antennae nigrae, valde pectinatae aut potius flabellatae. Caput atrum. Thorax teſtaceus macula media atra. Elytra glabra, teſtacea, immaculata. Corpus atrum.

5. P. rufa elytris ſtriatis nigris: maculis quinque rubris, thorace utrinque trituberculato. *10 maculata*
Trachys 10 maculatus. Oliv. Inſ. tab. fig.
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Gigot d'Orcy.
Magna, mihi haud rite nota at hujus generis videtur. Antennae flabellatae, rufae. Caput rufum, immaculatum. Thorax punctatus, obſcure rufus linea media elevata tuberculisque utrinque tribus elevatis: duobus marginalibus, obtuſis, validis. Elytra punctata ſtriisque elevatis tribus, nigra maculis quinque rubris, tribus ad baſin duabusque pone medium.

71. LYCUS. *Os* roſtro cylindrico, incurvo. *Palpi* quatuor: articulo ultimo craſſiori, truncato. *Antennae* filiformes.

latiſſimus. 1. L. flavus elytris macula marginali poſticeque nigris: margine laterali maximo dilatato.
Lycus latiſſimus. Oliv. Inſ. 29. tab. 1. fig. 2.
Lampyris latiſſima. Linn. ſyſt. nat. 2. 646. 14.
Habitat in Sierra Leon. Africae Dom. Drury.
Macula nigra in medio margine elytrorum. Os cylindricum, prominens, roſtrum ſimulans.

palliatus. 2. L. elytris coriaceis latiſſimis teſtaceis apice nigris.
Lycus palliatus. Oliv. Inſ. 29. tab. 1. fig. 3.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Corpus nigrum. Thorax niger antice macula utrinque teſtacea. Elytra latiſſima, ſtriata, coriacea, teſtacea, apice nigra. Alae apice fuſcae.

roſtratus. 3. L. niger thoracis lateribus elytrisque dilatatis flavis antice poſticeque nigris.
Lycus roſtratus. Oliv. Inſ. 29. tab. 1. fig. 4.
Lampyris roſtrata. Linn. ſyſt. nat. 2. 646. 15. Muſ. Lud. 10. 78.
Degeer Inſ. 7. 622. 19. tab. 46. fig. 11.
Habitat in Africa.
Margo thoracis flavus.

Lycus corpus oblongum, glabrum, tardum, capite parvo, rotundato, ſub thoracis clypeo recondito, ore porrecto, cylindrico, roſtrato, oculis parvis, globoſis, lateralibus, antennis aproximatis, ſerratis, thorace longioribus, ante oculos inſertis, thoracis clypeo plano, marginato, dilatato, caput tegente, ſcutello minuto, rotundato, elytris flexilibus, dilatatis, abdomine latioribus, pedibus brevibus, compreſſis, tarſis quinquearticulatis, colore vario.

4. L. niger thoracis lateribus elytrisque flavis poſtice nigris. *proboſcideus.*
Lycus proboſcideus Oliv. Inſ. 29. tab. 1. fig. 6.
Habitat in Africa aequinoctiali.
Affinis certe L. roſtrato, a quo tamen differt elytris anguſtioribus aut minus dilatatis apice tantùm nigris.

5. L. niger thorace elytrisque rufeſcentibus, elytris apice nigris. *ferraticornis.*
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Praecedente triplo minor. Antennae compreſſae, ſerratae, nigrae. Thorax rufeſcens marginibus ſubreflexis. Elytra ſulcata ſulcis rugoſis, rufeſcentia apice nigra. Corpus nigrum. Femora baſi teſtacea.

6. L. ferrugineus elytris apice nigris. *praeuſtus.*
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Statura & magnitudo omnino L. ferraticornis. Antennae ferrugineae apice nigrae. Corpus totum ferrugineum elytris ſolis apice nigris.

7. L. ater thoracis margine flaveſcente, elytris faſcia lata alba. *faſciatus.*
Lycus faſciatus. Oliv. Inſ. 29. tab. 1. fig. 8.
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Totus ater ſolo thoracis margine flavo elytrorumque faſcia media alba. Femora baſi parum flava.

8. L. ater thoracis margine flavo, elytris flavis: faſcia apiceque nigris. *reticulatus.*
Lycus reticulatus. Oliv. Inſ. 29. tab. 1. fig. 7.
Habitat in America boreali.
Antennae ſerratae, compreſſae, atrae. Clypeus rotundatus, planus, niger margine lato flavo. Elytra plana, poſtice latiora nervis elevatis

quatuor ſtrigisque numeroſis transverſis reticulata, flava faſcia media apiceque late nigris. Subtus ater ſterno flavo.

bicolor. 9. L. ſanguineus elytris poſtice violaceis.
Lycus bicolor. Oliv. Inſ. 29. tab. 1. fig. 9.
Lampyris bicolor. Linn. ſyſt. nat. 2. 646. 16.
Cantharis bicolor. Linn. Amoen. acad. 6. 395. 21.
Habitat in Africa.

ſanguineus. 10. L. niger thoracis lateribus elytrisque glabris ſanguineis.
Lycus ſanguineus. Oliv. Inſ. 29. tab. 1. fig. 1.
Lampyris ſanguinea. Linn. ſyſt. nat. 2. 646. 17. Fn. Sv. 704.
Lampyris elytris rubris, thorace rubro nigra macula. Geoff. Inſ. 1. 168. 3.
Friſh Inſ. 12. tab. 3.
Schaeff. Icon. tab. 24. fig. 1.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 4.
Degeer Inſ. 4. 45. 2. tab. 2. fig. 1.
Habitat in Europae lapidoſis.

Aurora. 11. L. niger thoracis lateribus elytrisque reticulato ſtriatis rufis.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura & ſumma affinitas praecedentis at elytra reticulato ſtriata. Antennae & pedes nigri. Thoracis margo anticus itidem rufus.

nigripes. 12. L. ſanguineus antennis pedibusque nigris.
Lycus nigripes. Oliv. Inſ. 29. tab. 1. fig. 12.
Habitat in Siam Muſ. Dom. Banks.
Statura praecedentis at corpus & thorax tota ſanguinea. Elytra ſubſtriata. Antennae & pedes nigrae baſi rufae.

minutus. 13. L. ater antennarum apicibus elytrisque ſanguineis.

Lycus minutus. Oliv. Inſ. 19. tab. 1. fig. 13.
Panz Naturf. 24. 31. 45. tab. 1. fig. 44.
Habitat in Norvegia Muſ. Dom. Lund.
Praecedente duplo minor & thorax uti totum corpus ater. Antennae apice rufae.

14. L. niger thoracis margine teſtaceo, antennis ferratis. *flabellicornis.*
Habitat Cajennae Dom. de Paykull.
Parvus. Antennae valde ſerratae, nigrae. Thoracis clypeus niger margine elevato, teſtaceo. Elytra ſtriata ſtriis punctatis nigra puncto parvo humerali, flaveſcente. Corpus atrum.

15. L. ater thorace rufo. *ruficollis.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. de Paykull.
Statura & magnitudo praecedentis. Antennae ſimplices, nigrae. Thorax rufus margine lineaque media excavata elevatis. Elytra ſtriata ſtriis punctatis.

72. RIPIPHORUS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla breviſſima, ovata.
Labium acutum.
Antennae flabelliformes.

1. R. elytris breviſſimis ovatis fornicatis palleſcentibus. *ſubdipterus*
Habitat in Gallo provincia Muſ. Dom. Boſc.
Genus omnino diſtinctum. Palpi quatuor inaequales, filiformes, anteriores paullo longiores, quadriarticulati: articulo primo breviſſimo, ſecundo longiſſimo, ultimo ovato adhaerentes

maxillae dorſo, poſteriores paullo breviores triarticulati: articulis ſubaequalibus adnati labii baſi. Clypeus porrectus, ovatus, membranaceus, bifidus: laciniis aequalibus. Mandibula exſerta, cornea, arcuata, edentula. Maxilla breviſſima, vix ultra baſin palporum prominens, membranacea, ovata, obtuſa. Labium breve, membranaceum, inter palpos acutum. Antennae breves maris utroque latere lamellis elongatis, tenuibus 7-8 omnino flabelliformibus, flavis, faeminae altero latere tantum lamellis minus elongatis, nigris. Caput inflexum nigrum. Thorax elevatus, gibbus, niger, immaculatus. Abdomen maris nigrum, faeminae pallidum ano nigro. Elytra breviſſima, ovata, fornicata, palleſcentia. Alae exſertae, corpore longiores, albidae macula media fuſca. Pedes obſcuri, apice rufeſcentes.

ferrugineus 2. R. rufus pectore ano pedibusque nigris.
Mordella ferruginea. Mant. Inſ. 1. 217. 1.
Habitat in India orientali D. Koenig.
Antennae nigrae, flabellatae. Elytra acuminata. Alae fuſcae.

naſutus. 3. R. corpore atro immaculato.
Mordella naſuta. Mant. Inſ. 1. 217. 2.
Mordella naſuta. Thunb. nov. ſp. 3. 66. fig. 77.

Ripiphori corpus oblongum, compreſſum, gibbum, glabrum, immarginatum, agile, capite ovato, adſcendente, exſerto, oculis ovatis, lateralibus, antennis brevibus, diſtantibus, in cantho oculorum inſertis, thorace gibbo, antice attenuato, poſtice trilobo, ſcutello nullo, elytris rigidis, attenuatis, abdomine brevi, obtuſo ſublongioribus, pedibus tenuibus, compreſſis, tarſis anticis quinque poſticis quadriarticulatis, colore minus nitido.

Habitat in Japonia.
Differt omnino a reliquis corpore toto atro immaculato.

4. R. rufus elytris nigris. *pectinatus.*
Habitat in America Dom. Drury.
Antennae flabellatae, nigrae. Caput rufum oculis nigris. Thorax antice anguſtatus, glaber, rufus, poſtice loco ſcutelli acuminatus. Elytra attenuata, nigra a baſi ad medium litura cinerea. Alae nigrae. Abdomen breve, gibbum rufum, tectum utrinque ſquama baſeos ovata. Pedes rufi geniculis nigris.

5. R. niger thoracis lateribus elytrisque teſtaceis. *paradoxus.*
Linn. ſyſt. nat. 2. 682. 1. Fn. Sv. 831.
Roſſ. Fn. Etruſc. 1. 244. 603.
Habitat in Europae floribus.

6. R. teſtaceus ore pectore abdominisque dorſo atris. *flabellatus.*
Cyrilli Ent. Neapol. 1. tab. 4. fig. 1.
Habitat in Italia D. Allioni.
R. ferrugineo duplo major. Antennae nigrae articulo primo ferrugineo. Caput teſtaceum ore nigro. Pectus atrum. Abdomen obtuſiſſimum, teſtaceum dorſo nigro.

7. R. thorace teſtaceo nigro punctato, elytris nigris: margine teſtaceo. *punctatus.*
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Caput teſtaceum antennis nigris. Thorax teſtaceus punctis nigris 4. 1. 2. Elytra nigra margine & ſutura teſtaceis apice puncto nigro. Caput atrum. Pedes nigri tibiis baſi teſtaceis.

8. R. ater thorace ferrugineo, elytris teſtaceis: macula nigra. *C. maculatus.*
Habitat in America Muſ. Dom. Banks.

Caput nigrum fronte elevata, ferruginea. Thorax obſcure ferrugineus. Elytra teſtacea maculis tribus nigris, altera baſeos, altera in medio & tertia apicis. Abdomen & pedes atra tibiis piceis.

2 maculatus 9. R. ferrugineus pectore atro, elytris teſtaceis: macula nigra.

Habitat in Hungaria Dom. Saldoner.

Caput magnum, transverſum, ferrugineum ore atro. Thorax gibbus, ferrugineus. Elytra teſtacea macula magna ante apicem nigra. Pectus atrum. Abdomen breviſſimum, gibbum, ferrugineum ano obtuſo, fere truncato: margine prominulo. Pedes ferruginei geniculis nigris.

Color maris obſcurior.

dimidiatus. 10. R. ater elytris baſi flavis.

Habitat — — Muſ. Dom. Yeats.

Corpus totum atrum, nitidum elytris ſolis a baſi ad medium flavis. Abdomen valde obtuſum & fere truncatum.

limbatus. 11. R. ferrugineus vertice thoracis diſco elytrisque atris.

Habitat — — Muſ. Dom. Yeats.

Antennae nigrae articulo primo ferrugineo. Caput ferrugineum, nitidum. Thorax in medio ater limbo omni ferrugineo. Scutellum ferrugineum. Pectus ferrugineum macula laterali atra. Elytra laevia, atra, immaculata. Abdomen breve, obtuſum, ferrugineum baſi utrinque macula magna, atra. Pedes nigri femoribus ferrugineis.

populneus. 12. R. niger elytris teſtaceis: faſciis tribus nigris; prima annulari.

Habitat in Germaniae Populo Dom. Smidt.

Caput obſcurum antennis ferrugineis apice nigris. Thorax niger, obſcurus. Elytra teſtacea faſcia baſeos annulari, inaequali, media dentata, tertia apicis. Corpus nigrum.

73. MORDELLA. *Palpi* quatuor. inaequales.
antici clavati.
poſtici filiformes.
Maxilla bifida.
Labium membranaceum, bifidum.
Antennae moniliformes.

1. M. ano aculeato, corpore atro immaculato. Linn. ſyſt. nat. 2. 682. 2. Fn. Sv. 532. Geoff. Inſ. 1. 353. 1. Schaeff. Elem. tab. 84. Sulz. Inſ. tab. 7. fig. 46. Schaeff. Icon. tab. 127. fig. 7. Habitat in floribus ſemifloſculoſis, umbellatis. *aculeata.*

2. M. ano aculeato nigra elytris faſciis duabus cinereis. Geoff. Inſ. 1. 354. 2. Habitat in Europae auſtralioris floribus. *faſciata.*

Mordellae corpus oblongum, compreſſum, glabrum, gibbum, immarginatum, agile, parvum, capite rotundato, inflexo, vix exſerto, oculis ovatis, lateralibus, inſertis, antennis longitudine thoracis, ſub oculis inſertis, thorace gibbo, transverſo, ſcutello minuto, elytris rigidis, attenuatis, longitudine abdominis faeminae ſaepius aculeati, pedibus curſoriis, compreſſis, tarſis anticis quinque, poſticis quadriarticulatis, colore minus nitido.

Differt a praecedente elytris baſi faſciaque media villoſo cinereis, nitentibus.

8 *punctata.* 3. M. ano aculeato, elytris nigris: punctis quatuor flavis; primo lunato.
Habitat in America ſeptentrionali Muſ. D. Banks.
Caput fuſcum. Thorax villoſo flaveſcens, antice punctis quatuor, poſtice ſtrigis undatis, fuſcis. Elytra atra, truncata punctis quatuor flavis, quorum primum baſeos lunatum. Corpus griſeum ano aculeo atro.

teſtacea. 4. M. atra elytris teſtaceis: marginibus nigris.
Habitat in Africae Dauco D. Prof. Vahl.
Corpus atrum elytris ſolis teſtaceis margine omni tenuiſſime nigro. Anus aculeatus.

ventralis. 5. M. atra abdomine fulvo, ano aculeato.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura & ſumma affinitas M. abdominalis at thorax niger. Abdomen totum fulvum aculeo elongato, nigro.

abdominalis. 6. M. ano aculeato nigra thorace abdomineque fulvis.
Mordella bicolor. Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 7. fig. 15.
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.
Caput, pectus, elytra, ſpina analis, pedes atra. Thorax & abdomen fulva, immaculata, nitida.

humeralis. 7. M. atra elytris baſi flaveſcentibus. Linn. ſyſt. nat. 2. 682. 3. Fn. Sv. 833.
Anaſpis. Geoff. Inſ. 1. 356. 2.
Habitat in Europae floribus.

lateralis. 8. M. atra ore thoracis lateribus pedibusque teſtaceis.
Habitat in Holſatiae floribus.
Statura parva praecedentium.

frontalis. 9. M. atra fronte pedibusque flaveſcentibus. Linn. ſyſt. nat. 2. 682. 4. Fn. Sv. 834.
Habitat in Europae floribus.

10. M. atra immaculata ano inermi. *atra.*
Habitat in Dania Dom. de Seheſtedt.
Statura & magnitudo omnino M. frontalis, at corpus totum atrum, immaculatum.

11. M. atra capite thoraceque flavis. Linn. ſyſt. nat. 2. 682. 8. Fn. Sv. 835. *thoracica.*
Habitat in Europa.

12. M. atra ore thorace pedibusque flavis. *ruficollis.*
Anaſpis. Geoff. Inſ. 1. 356. 3.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Nimis affinis M. thoracicae. Differt tantum capite nigro ore flavo. Forte mera ejus varietas.

13. M. flava elytrorum apicibus nigris. Linn. ſyſt. nat. 2. 682. 6. Fn. Sv. 836. *flava.*
Habitat in floribus Europae umbellatis.

74. DONACIA. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla unidentata.
Labium membranaceum, integrum.
Antennae ſetaceae.

1. D. plana obſcura elytris ſtriatis viridi vel coeruleo nitidulis, abdomine argenteo villoſo, femoribus poſticis dentatis. *craſſipes.*

Donaciae corpus depreſſiuſculum, planum, glabrum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotundato, inferto, oculis globoſis, prominulis, lateralibus, antennis thorace longioribus, approximatis, inter oculos infertis, thorace anguſto, cylindrico, ſcutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis ſaepius ſericei, pedibus longiuſculis, tenuibus, rotundatis, ſaepius femoribus clavatis, tarſis quadriarticulatis, colore ſaepius aurato, nitidulo, ſubtus ſericeo.

Leptura aquatica. Linn. ſyſt. nat. 2. 637. 1. Fn. Sv. 671.
Degeer Inſ. 5. 140. 18. tab. 4. fig. 14. 15.
Geoff. Inſ. 1. 229. 12.
Friſh Inſ. 12. tab. 6. fig. 2.
Habitat in plantis aquaticis, Nymphaeis.
Corpus planiuſculum. Caput & thorax obſcura. Thoracis margo prominet & fere ſubſpinoſus. Elytra crenato ſtriata, nitidula. Abdomen argento villoſum. Pedes mox obſcuri, mox rufi femoribus poſticis clavatis dentatis in utroque ſexu.

Feſtucae. 2. D. coeruleo nigra femoribus poſticis incraſſatis dentatis.
Habitat in Germaniae Feſtuca aquatica Dom. Smidt.
Differre videtur, quamvis reliquis affinis. Corpus totum obſcure coeruleo nigrum. Elytra punctato ſtriata. Femora poſtica brevia, incraſſata, dentata.

dentipes. 3. D. aenea elytris cupreis: margine omni viridi, femoribus poſticis dentatis.
Habitat in Germaniae aquis Dom. Smidt.
Affinis reliquis. Caput & thorax aenea. Elytra cuprea margine omni viridi. Corpus ſubtus auro holoſericum. Pedes obſcure rufi femoribus poſticis haud incraſſatis at dentatis.

Nympheae. 4. D. thorace elytrisque cupreis, corpore cinereo villoſo, femoribus poſticis dentatis.
Habitat in Nympheae foliis frequens.
Reliquis paullo minor. Caput cupreum antennis oreque nigris. Thorax cylindricus, canaliculatus, antice utrinque puncto gibbo, prominulo, cupreus, immaculatus. Elytra crenato ſtriata, cuprea. Corpus totum ſubtus cum pe-

dibus villis argenteis nitidulum. Femora poſtica vix incraſſata at unidentata.

5. D. ſupra aenea elytris ſubmicantibus, ſubtus villoſo aurea, femoribus poſticis dentatis. *Sagittariae*

Habitat in plantis aquaticis Germaniae Dom. Smidt.

Inter majores numeranda. Caput canaliculatum, aeneum, antennis nigricantibus. Thorax cylindricus, canaliculatus, ſcaber, aeneus. Elytra punctato ſtriata, aenea, ſubinaequalia & micantia. Subtus villis aureis nitidula. Pedes concolores femoribus poſticis dentatis.

6. D. nigra elytris ſubſtriatis, abdomine pedibusque rufis. *nigra.*

Habitat in Germaniae aquis Dom. Smidt.

Statura & ſumma affinitas D. Feſtucae. Antennae nigrae: primo articulo rufo. Caput & thorax nigra, immaculata, nitidula. Elytra minus ſtriata minusque depreſſa. Abdomen rufum. Pedes rufi femoribus poſticis in altero ſexu ſimplicibus in altero dentatis.

7. D. aenea abdomine argenteo villoſo, femoribus poſticis clavatis inermibus. *clavipes.*

Habitat in Germaniae plantis aquaticis D. Smidt.

Reliquis paullo major. Antennae nigrae apice rufae. Thorax & elytra punctato ſtriata, aenea, nitidula. Abdomen argenteo villoſum, nitidulum. Pedes rufi femoribus poſticis clavatis, inermibus.

8. D. nigra pedibus poſticis elongatis: tibiis apice faſciculatis. *faſciculata*

Habitat Cajennae Muſ. Dom. Boſc.

Statura tenuis fere Cimicis lacuſtris. Corpus totum ſupra nigrum, ſubtus argenteo nitens. Pedes omnes nigri femoribus clavatis. Poſtici

valde elongati tibiis apice faſciculo magno pilorum elongatorum, nigrorum.

ſimplex. 9. D. aenea nitidula pedibus omnibus ſimplicibus.
Habitat in Europae plantis aquaticis.
Diſtincta omnino a praecedentibus. Corpus inter minores, cinereum, nitidulum antennis pedibusque paullo obſcurioribus. Elytra ſtriato punctata. Pedes in omni ſexu ſimplices.

Hydrocharis. 10. D. cineraſcens ſubtus argenteo villoſa pedibus ſimplicibus.
Habitat in plantis aquaticis.
Praecedentibus paullo minor. Caput cum antennis cinereum. Thorax rotundatus, utrinque tuberculo obtuſo. Elytra punctato ſtriata, cinerea. Corpus argenteo villoſum. Pedes ſimplices.

75. TRICHIUS. *Palpi* quatuor filiformes. *Maxilla* bifida. *Antennae* clevato lamellatae.

√ *Eremita.* 1. T. aeneo ater thorace inaequali, ſcutello ſulco longitudinali.
Cetonia Eremita. Mant. Inſ. 1. 28. 23.
Scarabaeus Eremita. Linn. ſyſt. nat. 2. 556. 74.
Oliv. Inſ. 1. 6. 53. 71. tab. 3. fig. 17.
Roeſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. 3. fig. 6.

Trichii corpus ovatum, depreſſiuſculum, hirtum, immarginatum, tardum, capite ovato, inferto, labio prominulo, oculis ovatis, lateralibus, vix prominulis, antennis brevibus, diſtantibus, ſuboculis inſertis, thorace antice anguſtato, hirto, ſcutello parvo, triangulari, elytris rigidis, includentibus, abdomine brevioribus, pedibus brevibus, validis, tibiis anticis dentatis, tarſis quinquearticulatis, colore variegato.

Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 1.
Degeer Inſ. 4. tab. 10. fig. 22.
Voet. Scarab. tab. 3. fig. 21.
Habitat in truncis putreſcentibus Pyri, Salicis.
Triplo major T. nobilis. Recens odorem ſpargit corii Ruſſici.

2. T. auratus abdomine poſtice albo punctato, elytris rugoſis. *nobilis.* ✓
Cetonia nobilis. Mant. Inſ. 1. 27. 8.
Scarabaeus nobilis. Linn. ſyſt. nat. 2. 558. 81. Fn. Sv. 401.
Scarabaeus viridis nitens, thorace infra aequali non prominente Geoff. Inſ. 1. 73. 6.
Oliv. Inſ. 1. 6. 59. 72. tab. 3. fig. 10.
Roeſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. 3. fig. 1. 5.
Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 5.
Voet. Scarab. tab. 4. fig. 28.
Habitat Larva in ligno putreſcente, imago in floribus praeſertim umbellatis.
Larva griſea pedibus flaveſcentibus, capite ferrugineo.

3. T. niger thorace utrinque puncto baſeos elytrisque duobus flavis. *8 punctatus* ✓
Cetonia cordata. Mant. Inſ. 1. 27. 10.
Scarabaeus variabilis. Linn. ſyſt. nat. 2. 558. 79.
Oliv. Inſ. 1. 6. 60. 73. tab. 4. fig. 27.
Voet. Coleopt. tab. 5. fig. 41. 42.
Habitat in Germaniae ligno putreſcente.
Statura & magnitudo praecedentis. Corpus atrum puncto flavo utrinque ad baſin thoracis. Puncta duo in elytris, interiore minutiſſimo. Punctum oblongum utrinque in ultimo abdominis ſegmento.

4. T. niger tomentoſo flavus elytris faſciis tribus abbreviatis nigris. *faſciatus.* ✓

Scarabaeus faſciatus. Linn. ſyſt. nat. 2. 556. 70.
Fn. Sv. 395. Geoff. Inſ. 1. 80. 16.
Oliv. Inſ. 1. 6. 1. 74. tab. 9. fig. 84.
Drury Inſ. 1. tab. 36. fig. 2.
Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 4.
Degeer Inſ. 4. tab. 10. fig. 19.
Act. Nidroſ. 4. tab. 16. fig. 2.
Voet. Scarab. tab. 5. fig. 43.
Habitat in Europae borealis floribus umbellatis.

ſuccinctus. 5. T. niger tomentoſo cinereus elytris nigris: faſciis duabus flavis.
Scarabaeus ſuccinctus. Pall. Icon. tab. A. fig. 19.
Habitat in Germania Dom. Hübner.
Duplo minor praecedente. Clypeus integer, niger. Elytra nigra in medio faſciis duabus approximatis, flavis.

indus. 6. T. thorace hirſuto, elytris lividis fuſco maculatis.
Scarabaeus Indus. Linn. ſyſt. nat. 2. 556. 61.
Muſ. Lud. Ulr. 27.
Oliv. Inſ. 1. 6. 40. 46. tab. 6. fig. 40.
Habitat Indiis.

√ *2punctatus.* 7. T. capite thoraceque glabris viridi aeneis, elytris teſtaceis, abdominis ultimo ſegmento prominente bipunctato.
Melolontha bipunctata. Oliv. Inſ. 1. 5. 57. 44. tab. 6. fig. 69.
Habitat — — Muſ. Dom. Banks.
Caput & thorax aenea, obſcura nitida. Scutellum breve, triangulare, aeneum. Elytra glabra, laevia, teſtacea, immaculata. Corpus atrum ſegmentis abdominis utrinque ſtrigis albis, ultimum ſegmentum prominet punctis duobus magnis albis.

8. T. capite thoraceque viridi aeneis piloſis, elytris teſtaceis viridi nitentibus. *bibens.*

Oliv. Inſ. 1. 6. 62. 75. tab. 10. fig. 87.

Habitat in America Muſ. Dom. Tunſtal.

Caput viridi aeneum, piloſum clypeo emarginato. Thorax viridi aeneus, nitens, piloſus. Elytra abbreviata, teſtacea, viridi colore nitida. Abdomen & pedes viridia, piloſa.

9. T. thorace tomentoſo: rugis duabus longitudinalibus, elytris abbreviatis. *hemipterus.* ✓

Scarabaeus hemipterus ſcutellatus muticus thorace tomentoſo rugis duabus longitudinalibus marginato, elytris abbreviatis. Linn. ſyſt. nat. 2. 555. 63.

Scarabaeus ater depreſſus & ſquamoſus, maculis albis variegatus, elytris abdomine brevioribus, faemina aculeo ani. Geoff. Inſ. 1. 78. 12.

Oliv. Inſ. 1. 6. 65. 80. tab. 9. fig. 83. tab. 11. fig. 103.

Schaeff. Icon. tab. 46. fig. 10. 11.

Voet. Coleopt. tab. 10. fig. 88-90.

Habitat in Europae ligno putreſcente.

Faemina aculeo ani elongato, nigro.

10. T. fuſco teſtaceus cinereo maculatus thorace canaliculato. *canaliculatus.*

Oliv. Inſ. 1. 6. 69. 84. tab. 10. fig. 89.

Habitat in America ſeptentrionali D. Lee.

Affinis praecedenti at minor & elytra fuſco teſtacea maculis aliquot cinereis ſparſis. Thorax valde canaliculatus. Pedes teſtacei.

11. T. glaber cyaneus elytris lunulis duabus albis. *lunulatus.*

Oliv. Inſ. 1. 6. 63. 77. tab. 10. fig. 88.

Habitat in Carolina.

Capitis clypeus emarginatus. Corpus cyaneum maculis duabus lunatis albis ad marginem ex-

teriorem elytrorum. Elytra abdomine multo breviora.

viridulus. 12. T. viridis pubescens ano albo bimaculato. Oliv. Inf. 1. 6. 63. 76. tab. 9. fig. 86.
Habitat in India Mus. D. Hunter.
Corpus totum viride, nitens pilisque cinereis pubescens. Puncta alba minutissima in elytris. Ultimum abdominis segmentum prominet maculis duabus majoribus albis. Abdomen subtus utrinque lineola transversa alba.

piger. 13. T. capite thoraceque aeneis villosis, elytris testaceis albo maculatis.
Oliv. Inf. 6. 64. 78. tab. 7. fig. 54.
Habitat in Marylandia Mus. Brit.
Clypeus emarginatus. Segmentum ultimum abdominis prominens, testaceum macula utrinque oblonga, alba.

Delta. 14. T. thorace nigro: triangulo albo, elytris testaceis: puncto fusco.
Oliv. Inf. 1. 6. 64. 79. tab. 11. fig. 107.
Forster Cent. Inf. 1. 7. 7.
Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 1. 2.
Habitat in America.
Antennae ferrugineae clava nigra. Caput porrectum, atrum lineola transversa punctisque duobus verticis albis. Thorax holosericeus, niger margine omni trianguloque dorsali albis. Apex trianguli postica respicit. Scutellum nigrum punctis duobus albis. Elytra abbreviata, laevissima, testacea puncto medio fusco. Sutura fusca basi albicat. Abdominis ultimum segmentum majus prominet niveum. Femora postica crassiora, incurva.

lineatus. 15. T. pubescens thorace fulvo nigro lineato, elytris testaceis: sutura fulva.

Scarabaeus quadratus. Degeer Inſ. 7. 645. 48. tab. 48. fig. 10. 11.
Oliv. Inſ. 1. 6. 67. 81. tab. 7. fig. 63.
Voet. Coleopt. tab. 10. fig. 8.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Antennae piceae faſciculo medio pilorum nigrorum. Thorax fulvus lineis tribus poſtice fere coeuntibus, nigris. Scutellum triangulum, nigrum puncto medio fulvo. Elytra teſtacea futura lata fulva. Anus fulvus. Pedes ſubteſtacei.

16. T. hirtus fuſcus elytris teſtaceis: margine apicis cineraſcente. *nigripes.* ✓
Oliv. Inſ. 1. 6. 67. 82. tab. 9. fig. 85.
Degeer Inſ. 7. 647. 1. tab. 48. fig. 9. *Scar. ſtigma*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Caput & thorax nigra, hirta. Elytra teſtacea margine apicis ſaepius cinereo. Abdomen albidum. Pedes nigri.

17. T. ſupra glaber cinereo maculatus capite thoraceque nigris, elytris piceis. *maculatus.* ✓
Cetonia craſſipes. Oliv. Inſ. 1. 6. 68. 83. tab. 7. fig. 62.
Scarabaeus obſcure purpureus ſcutellatus villoſus, thorace nigro, elytris obſcure purpureis: maculis albis ſparſis, abdomine ſubtus albo Degeer. Inſ. 7. 646. tab. 48. fig. 12.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Caput nigrum, immaculatum clypeo emarginato. Thorax glaber, ater margine tenuiſſimo punctisque utrinque duobus cinereis. Elytra picea, cinereo maculata. Subtus cinereo pubeſcens abdominis apice flaveſcente. Pedes nigri tibiis poſticis brevibus, truncatis.

76. CETONIA. *Maxilla* apice ſetoſa. *Labium* coriaceum, emarginatum palpos tegens. *Antennae* lamellatae.

goliata. 1. C. thorace piceo albo lineato, elytris glaucis, clypeo porrecto bifido.
Scarabaeus goliatus. Mant. 1. 7. 54.
Scarabaeus goliatus. Linn. Mant. 5. 30.
Cetonia goliata. Oliv. Inſ. 1. 6. 7. 1. tab. 5. fig. 33. tab. 9. fig. 33.
Drury Inſ. 1. tab. 31. 3. tab. 40. fig. 1.
Jablonsk Coleopt. 1. tab. 10. fig. 4.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 1. fig. 2.
Habitat in Africa Muſ. D. Hunter.

Cacicus. 2. C. thorace flaveſcente nigro lineato, elytris albidis nigro maculatis, clypeo porrecto bifido.
Cetonia Cacicus. Oliv. Inſ. 1. 6. 8. 2. tab. 3. fig. 22.
Scarabaeus goliatus. Jabl. Coleopt. 1. t. 11. f. 2.
Voet. Coleopt. tab. 21. fig. 51.
Habitat in America meridionali.
Elytra apice ſubemarginata. Clypeus apice bifurcus laciniis arcuatis.

bifrons. 3. C. obſcure aenea elytris fuſcis albo irroratis, clypeo porrecto bifido, vertice haſtato.

Cetoniae corpus oblongum, glabrum, immarginatum, laeve, tardum, capite ovato, inſerto, labio prominente: margine incraſſato, oculis globoſis, lateralibus, antennis brevibus, diſtantibus, ſub oculis inſertis, thorace antice anguſtato, elevato, ſcutello longiori, triangulo, elytris rigidis, fornicatis, vix abdomine brevioribus, pedibus brevibus, validis, tibiis dentatis, tarſis quinquearticulatis, colore ſaepius nitido.

Cetonia bifrons. Oliv. Inſ. 6. tab. fig.

Habitat in America meridionali Muſ. Dom. Gigot d'Orcy.

Minor C. cacico. Caput depreſſum, obſcure aeneum, clypeo porrecto, bifido: laciniis recurvis, truncatis, obtuſis. Vertex ſpina incumbente, acuta. Antennae nigrae. Thorax glaber, obſcure aeneus puncto utrinque magno impreſſo. Scutellum triangulum, obſcure aeneum. Elytra nigra, albo irrorata ſtrigaque media, valde angulata, alba. Corpus obſcure aeneum. Tibiae anticae bidentatae.

4. C. viridis albo lineata capite tricorni: cornu medio porrecto bifido. *Polyphemus.*

Scarabaeus Polyphemus. Mant. 1. 7. 53. Oliv. Inſ. 1. 6. 9. 3. tab. 8. fig. 61.

Habitat in Africa Muſ. Dom. Banks.

C. goliata duplo minor. Caput depreſſum albo villoſum antennis nigris. Cornua tria, atra, nitida anteriori porrecto longiori, recurvo, apice bifido: laciniis arcuatis, lateralibus minoribus, ſubarcuatis. Thorax viridis lineis quinque albis: intermedia abbreviata. Scutellum triangulare, viride, immaculatum. Elytra viridia lineis tribus e maculis albis, intermedia abbreviata. Subtus albida ſterno prominulo obtuſo abdomineque viridibus, nitidis. Pedes virides femoribus utrinque linea alba. Tibiae anticae utrinque dentatae, poſticae intus ciliatae.

5. C. viridis nitens clypeo porrecto recurvo bifido, tibiis anticis ſerratis. *micans.*

Cetonia micans. Oliv. Inſ. 1. 6. 10. 4. tab. 1. fig. 2.

Scarabaeus micans Drury Inſ. 1. tab. 32. fig. 3.

Habitat in Africa.

Caput carinatum ſpina parva utrinque inter oculos. Denticuli duo parvi, elevati in medio & duo alii ad apicem clypei. Carina ipſa excurrit in dentem elongatum, fere longitudine capitis, compreſſum, recurvum, bifidum: laciniis divergentibus. Elytra abdomine paullo breviora, acuminata, nitentia. Sternum antice porrectum, latum, obtuſum linea longitudinali tenuiſſima, ferruginea. Pedes antici elongati tibiis ferratis & tarſis ſub unguibus faſciculo pilorum. Ultimum abdominis ſegmentum prominet puncto parvo utrinque impreſſo.

chinenſis. 6. C. aenea clypeo emarginato ſubſpinoſo, thorace poſtice lobato, elytris acuminatis.
Oliv. Inſ. 1. 6. 11. 5. tab. 2. fig. 5.
Forſter Cent. Inſ. 1. 2.
Voet. Coleopt. tab. 5. fig. 40.
Habitat in China Muſ. Dom. Banks.
Clypeus cylindricus, late emarginatus apicibus ſubſpinoſis. Thorax & elytra viridi aenea, immaculata. Elytra acuminata. Sternum prominens, obtuſum. Corpus caſtaneum, parum nigro maculatum. Femora poſtica nigra puncto rubro. Tarſi omnes nigri.

nigrita. 7. E. glabra atra clypeo emarginato ſubſpinoſo, thorace poſtice lobato.
Oliv. Inſ. 1. 6. 11. tab. 10. fig. 92.
Pet. Gazoph. tab. 28. fig. 3.
Hermann. Muſ. 1?. 257.
Habitat Ceylonae Muſ. Britann.
Statura praecedentis at tota atra, nitida. Clypeus quadratus, late emarginatus: apicibus porrectis acutis. Thorax laevis, glaber, ater macula laterali brunnea, obſoleta. Pedes nigri.

8. C. aurata ſegmento abdominis primo lateribus unidentato, elytris lineolis transverſis albis. *aurata.* √

Scarabaeus auratus. Linn. ſyſt. nat. 2. 557. 78. Fn. Sv. 400.
Scarabaeus viridi aeneus. Geoff. Inſ. 1. 73.
Friſh Inſ. 12. 25. tab. 3. fig. 1.
Roeſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. 2.
Oliv. Inſ. 1. 6. 12. 7. tab. 1. fig. 1.
Voet. Scarab. tab. 1. fig. 1.
Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 2. 3. 7.
Drury Inſ. 1. tab. 33. fig. 1.
Degeer Inſ. 4. tab. 11. fig. 1.
Habitat in Europae ligno putreſcente, Formicarum acervis Larva. Imago in floribus.
Imago tacta per anum ejicit liquorem foetidiſſimum.

9. C. aenea nitidiſſima immaculata. *faſtuoſa.* √

Cetonia ſpecioſiſſima. Roſſ. Fn. Etr. 1. 25. 57.
Scopol. Del. Inſ. 1. tab. 21. fig. A.
Roeſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. 2. fig. 6.
Voet. Coleopt. tab. 1. fig. 2.
Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 4.
Habitat in Europa auſtraliori.
Varietatem C. auratae olim credidi at diſtincta videtur major, nitidiſſima, ſupra & ſubtus absque maculis albis. Pedes virides. Punctum parvum ad baſin elytrorum impreſſum.

10. C. aenea thorace elytrisque atomis numeroſis albis ſparſis. *marmorata.* √

Voet. Coleopt. tab. 1. fig. 3.
Habitat in Germaniae Quercu Dom. Smidt.
C. aurata major. Caput aeneum, immaculatum clypeo apice incraſſato. Thorax aeneus, nitidiuſculus lateribus albo maculatis. Elytra aenea, obſcure nitida atomis plurimis ſparſis

albis. Subtus aenea utrinque linea punctorum alborum.

√ *viridis.* 11. C. viridis opaca ſubtus nitidior, elytris albo maculatis.

Cetonia Hungarica. Herbſt Archiv. t. 29. f. 7.

Habitat in Italia D. Allioni.

Affinis omnino C. auratae. Caput, thorax & ſcutellum viridia, opaca, omnino immaculata. Elytra viridia, opaca maculis lateralibus unaque dorſali verſus apicem albis. Subtus nitidior ano prominulo, albo bipunctato.

√ *metallica.* 12. C. aenea opaca immaculata ſubtus cuprea.

Habitat in Italia D. Allioni.

Caput aeneum clypeo margine incraſſato. Thorax aeneus, obſcure nitidus, immaculatus. Elytra aenea, opaca, immaculata. Subtus tota cuprea, immaculata.

pubeſcens. 13. C. obſcure aenea thoracis ſegmentorumque margine albo, ano bipunctato.

Cetonia pubeſcens. Oliv. Inſ. 1. 6. 21. 18. tab. 11. fig. 100.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Olivier.

Paullo major C. aurata. Caput obſcure aeneum fronte cinereo pubeſcente. Thorax obſcure aeneus margine albo. Elytra obſcure aenea, immaculata. Abdomen magis nitidum, aeneum ſegmentorum marginibus utrinque albis. Anus maculis duabus albis. Femora ſupra macula magna alba.

opaca. 14. C. viridis opaca capitis clypeo reflexo.

Habitat in Africae floribus compoſitis Muſ. Dom. Prof. Vahl.

Magnitudo C. auratae ſupra viridis obſcura, ſubtus atra nitidior. Capitis clypeus reflexus.

15. C. nigra obſcura corpore ſubtus nitidiore. *morio.* ✓
Cetonia morio. Oliv. Inſ. 1. 6. 27. 27. tab. 2. fig. 3.
Scarabaeus lugubris. Voet. Coleopt. tab. 2. fig. 14.
Habitat in Europa auſtraliori D. Allioni.
Affinis C. auratae at tota nigra.

16. C. nigra capitis clypeo porrecto baſi utrinque ſinuato, thoracis limbo elytrorumque margine cinereis. *cuſpidata.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.
Capitis clypeus valde porrectus, niger, margine ſubreflexo, vix emarginato, baſi utrinque ſinu magno, rotundato. Puncta duo cinerea interdum inter antennas. Antennae lamellis tribus elongatis. Thorax glaber, niger limbo ſaepius toto cinereo, interdum tamen margo anticus concolor. Elytra glabra, obſcure nigra margine cinereo. Corpus nigrum ultimo abdominis ſegmento prominente punctis duobus cinereis.

17. C. atra nitida capitis clypeo cordato. *cordata.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.
Capitis clypeus omnino cordatus, glaber, laevis, ater. Antennae lamellis tribus brevibus. Thorax glaber, ater, nitidus, immaculatus. Elytra vix ſtriata, atra. Tibiae anticae valde dentatae.

18. C. nigra thorace punctis quatuor albis. *4 punctata.* ✓
Habitat in agro Paedemontano D. Allioni.
Statura & magnitudo omnino C. Morio at puncta quatuor minutiſſima alba in thorace.
Mera varietas C. morio teſte Roſſi.

19. C. nigra ano bipunctato, pedibus rufis, tibiis poſticis ſpinis annulatis. *ruſipes.*

Cetonia 4 punctata. Oliv. Inſ. 1. 6. 80. 101. tab. 10. fig. 93.
Habitat in India Muſ. D. Hunter.
Caput nigrum antennis ferrugineis. Caput & thorax laevia, glabra, atra, obſcure nitida, immaculata. Abdomen nigrum ſegmento ultimo punctis duobus albis. Pedes ferruginei digitis nigris, ungulis arcuatis, validis, acutis. Tibiae poſticae annulis tribus elevatis e ſpinis brevibus, radiatis.

nitida. 20. C. thorace poſtice lobato, capite ſpina incumbente, ſterno cornuto.
Scarabaeus nitidus ſcutellatus muticus, thorace poſtice lobato, capite ſpina recumbente, ſterno porrecto. Linn. ſyſt. nat. 2. 552. 52. 20. M. Lud. Ulr. 20.
Oliv. Inſ. 1. 6. 18. 14. tab. 3. fig. 16. tab. 7. fig. 56.
Roeſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. B. fig. 4.
Drury Inſ. 1. tab. 33. fig. 5. 6.
Voet. Coleopt. tab. 3. fig. 2. 3.
Degeer Inſ. 4. tab. 19. fig. 8. 9.
Habitat in America, Carolina.

lobata. 21. C. nigra nitida thorace poſtice lobato, clypeo emarginato, ſterno cornuto.
Cetonia lobata. Oliv. Inſ. 1. 6. 23. 21. tab. 4. fig. 26.
Voet. Coleopt. tab. 3. fig. 20.
Habitat in America meridionali Muſ. D. Olivier.
Statura & affinitas C. nitidae. Clypeus late emarginatus. Thorax punctatus, poſtice productus. Elytra lineis duabus elevatis, ante apicem coeuntibus. Sternum breve, cornutum, obtuſum.

22. C. nigro viridis, thorace elytrisque teſtaceis, ano albo bipunctato. *Carmelita.*
Habitat in Africa Dom. Saldoner.
Statura praecedentis. Caput nigrum clypeo emarginato. Thorax rotundatus, teſtaceus diſco obſcuriore. Elytra teſtacea, immaculata. Corpus nigro viride. Abdomen ſegmentorum marginibus utrinque albis. Anus prominet punctis duobus albis. Tibiae poſticae in medio unidentatae.

23. C. viridi aenea nitida elytris ſulcatis. *ſulcata.*
Cetonia ſulcata. Oliv. Inſ. 1. 6. 36. 39. tab. 5. fig. 32.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.
Statura praecedentium. Caput & thorax viridi aenea, nitida, immaculata. Scutellum porrectum, aeneum. Elytra viridi aenea, nitida, ſulcata. Corpus viridi aeneum ſterno abbreviato.

24. C. ſcutello elytris dimidio breviore, ſterno porrecto, corpore viridi ſubtus cupreo. *Chryſis.*
Scarabaeus Chryſis ſcutellatus muticus ſterno porrecto, ſcutello elytris dimidio breviore. Linn. ſyſt. nat. 2. 591. 49. Muſ. Lud. Ulr. 21.
Gronov. Zoophyl. 423. tab. 15. fig. 1.
Oliv. Inſ. 1. 6. 76. 96. tab. 4. fig. 19.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 1. fig. 10.
Voet. Coleopt. tab. 8. fig. 63.
Degeer Inſ. 4. tab. 19. fig. 4.
Habitat in America auſtrali.

25. C. ſcutello elytris dimidio breviore, ſterno porrecto, corpore aeneo nitido. *lucida.*
Cetonia lucida. Oliv. Inſ. 1. 6. 75. 94. tab. 7. fig. 64.
Habitat in Inſula Guadeloupe Dom. Olivier.

Diſtincta a C. Chryſis, inprimis corpore toto aeneo, nitido.

capucina. 26. C. picea thoracis margine flaveſcente, ſterno porrecto.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura omnino C. Chryſis tota picea, ſupra glabra margine thoracis flaveſcente, ſubtus nitida, hirta, ſterno antice porrecto, recurvo. Femora poſtica valde compreſſa.

Lanius. 27. C. exſcutellata livida thorace punctis duobus, elytris maculis plurimis nigris, ſterno antice cornuto.

Cetonia Lanius. Oliv. Inſ. 1. 6. 19. 15. tab. 2. fig. 4.

Voet. Coleopt. tab. 4. fig. 44.

Drury Inſ. 1. tab. 33. fig. 8.

Sloan. Jamaic. 2. tab. 237. fig. 7. 8.

Habitat in America meridionali.

graculus. 28. C. exſcutellata obſcure livida thorace elytrisque nigro maculatis.

Habitat — — Muſ. Dom. Banks.

Nimis affinis C. Lanius at minor multoque obſcurior. Thorax haud punctis, ſed maculis plurimis nigris. Liturae aliquot albae ad marginem exteriorem elytrorum. Elytra poſtice gibba futuraque parum acuminata. Sternum porrectum, minus cornutum.

Carnifex. 29. C. ſcutellata rubra elytris nigro maculatis.

Scarabaeus Lanius exſcutellatus muticus ruber, adſperſis punctis nigris. Linn. ſyſt. nat. 2. 557. 77.

Oliv. Inſ. 1. 6. 29. 16. tab. 6. fig. 43.

Roeſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. B. fig. 3.

Voet. Coleopt. tab. 2. fig. 16.

Habitat in America meridionali.

Differt manifeste a C. Lanio. Caput rufum ore nigro. Thorax punctatus, rufus, vix maculatus margine baseos subemarginato. Scutellum distinctum, triangulum, nigrum. Elytra substriata, rufa, nigromaculata. Subtus atra sterno vix porrecto, obtuso, rufo. Abdomen lineis tribus punctorum rubrorum intermediis majoribus. Femora quattuor postica rufa, nigro marginata. Tibiae nigrae, apice rufae.

30. C. testacea nitida sterno antice porrecto obtuso. *glabrata.*
Cetonia glabrata. Oliv. Inf. 1. 6. 70. 86. tab. 9. fig. 80.
Melolontha glabrata. Mant. Inf. 1. 20. 17.
Habitat in Indiis Musc. Britt.
Supra glaberrima, testacea at viridi aeneo colore tincta, nitidissima. Clypeus late emarginatus. In capite & thorace maculae duae obscuriores. Subtus aenea.

31. C. nigra obscura elytris obsolete rufo maculatis. *rauca.*
Habitat ad Cap. Bon. spei Musc. Dom. Vahl.
Corpus obscure nigrum, minime nitidum. Thorax laevis, immaculatus. Elytra maculis plurimis rufis, obsoletis. Sternum abbreviatum.

32. C. nigra obscura immaculata thoracis margine antico subcornuto. *cornuta.*
Habitat ad Cap. Bon. spei Musc. Dom. Vahl.
Corpus nigrum, obscurum, supra glabrum, subtus rufo hirtum. Thorax rotundatus margine antico in medio elevato, subcornuto. Elytra vix striata. Femora postica incrassata.

33. C. nigra, albo maculata abdominis segmentis margine albis, clypeo emarginato, sterno cornuto. *tristis.*

Cetonia triſtis. Oliv. Inſ. 1. 6. 22. 20. tab. 18. fig. 91.
Habitat in America Muſ. D. Hunter.
Clypeus porrectus, emarginatus. Thorax niger, poſtice productus. Elytra picea linea una alterave elevata. Sternum breve, cornutum. Abdomen piceum ſegmentorum marginibus albis, qui tamen color haud usque ad medium extenditur.

ſmaragdula 34. C. ferrugineo flaveſcens elytris vireſcentibus, ſterno cornuto.
Cetonia ſmaragdula. Oliv. Inſ. 1. 6. 73. 91. tab. 10. fig. 90.
Drury Inſ. 2. tab. 3. fig. 3.
Habitat in America Muſ. D. Hunter.
Caput & thorax obſcure flaveſcentia. Elytra vireſcentia. Corpus flaveſcens abdomine obſcuriore. Tibiae poſticae punctis impreſſis.

√ *faſcicularis* 35. C. thorace lineis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis inciſuris barbatis.
Cetonia faſcicularis. Oliv. Inſ. 1. 6. 16. 12. tab. 11. fig. 108.
Scarabaeus faſcicularis. Linn. ſyſt. nat. 2. 557. 75. Muſ. Lud. Ulr. 26.
Drury Inſ. 1. tab. 33. fig. 2.
Voet. Coleopt. tab. 3. fig. 17.
Wulf Inſ. Cap. tab. 1. fig. 1.
Habitat in Africa.
Subtus tota lana heluola faſciculatim tecta.

√ *aulica.* 36. C. viridis nitida thoracis margine elytrorumque maculis albis.
Cetonia aulica. Oliv. Inſ. 1. 6. 16. 11. tab. 2. fig. 7. 6.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Caput viride punctis duobus parvis ante oculos albis. Clypeus emarginatus. Thorax viridis, nitidus margine exteriori albo. Elytra obtusa, viridia, nitida, macula baseos, quinque marginalibus, duobus dorsalibus & unica apicis albis. Subtus viridis pectore albo villoso. Abdomen lineis quatuor macularum albarum. Ultimum abdominis segmentum prominet maculis duabus albis. Pedes virides femoribus posticis macula alba.

37. C. glabra nigra thorace elytrisque purpurascentibus. *purpurascens.*

Habitat in India orientali Prof. Abilgaard.

Statura & magnitudo praecedentium. Caput nigrum oculis testaceis clypeoque subemarginato. Thorax & elytra laevia, purpurescentia, immaculata. Scutellum fere nigrum. Sternum haud porrectum.

38. C. hirta rufa albo punctata. *capensis.* √

Cetonia capensis. Oliv. Inf. 1. 6. 27. 28. tab. 6. fig. 38.

Scarabaeus capensis. Linn. syst. nat. 2. 556. 73. Mus. Lud. Ulr. 30.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 3.

Voet. Coleopt. tab. 2. fig. 11.

Roes. Inf. 2. Scarab. 1. tab. B. fig. 6.

Degeer Inf. 7. 640. 40. tab. 48. fig. 2. *albo punctata V. D.*

Wulf Inf. cap. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Africa.

39. C. thorace nigro: margine albo, elytris testaceis: sutura margineque nigris. *signata.* √

Cetonia signata. Oliv. Inf. 1. 6. 28. 29. tab. 5. fig. 35.

Voet. Coleopt. tab. 2. fig. 13.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Caput atrum clypeo ſubemarginato. Thorax glaber, laevis, ater ſutura dorſali baſi ferruginea margineque laterali albo. Scutellum atrum. Elytra teſtacea ſutura, margine exteriori, lineola baſeos calloque apicis nigris. Margo poſticus parum albicat. Subtus hirta ſterno brevi obtuſo.

marginata. 40. C. glabra atra thoracis elytrorumque marginibus rufis.

Cetonia marginata. Oliv. Inſ. 1. 6. 26. 26. tab. 5. fig. 34.

Scarabaeus marginatus. Degeer Inſ. 4. tab. 19. fig. 10.

Drury Inſ. 2. tab. 32. fig. 1.

Voet. Coleopt. tab. 1. fig. 4.

Habitat in Guinea frequens in Jatropha Gorcas.

Clypeus emarginatus, omnino inermis. Thorax niger margine antico & laterali rufis. Elytra glabra, atra margine laterali & poſtica lateo rufis.

ornata. 41. C. glabra obſcure purpuraſcens thorace elytrorumque margine ſinuato teſtaceo.

Habitat in Guinea Dom. Iſert.

Statura & magnitudo omnino C. marginatae. Caput nigrum macula magna, frontali, teſtacea. Thorax obſcure purpuraſcens margine late teſtaceo puncto medio nigro. Elytra laevia, obſcura, purpuraſcentia margine lato & valde ſinuato, teſtaceo. In medio ſtrigam abbreviatam flexuoſam, emittit. Anus prominet teſtaceus margine atro. Subtus flava abdomine, ſegmentorum marginibus atris. Pedes nigri femoribus poſticis teſtaceis.

marginella. 42. C. viridis thoracis elytrorumque margine ferrugineo.

Habitat in Sierra Leon. Dom. Tunſtall.
Color ſupra viridis margine thoracis & elytrorum ferrugineo. Subtus viridis, nitens abdomine utrinque lineis duabus macularum albidarum. Sternum breve, obtuſiſſimum, capitatum. Ultimum abdominis ſegmentum prominet maculis quatuor albidis.

43. C. nigra lineola flava a capite ad ſcutellum ducta. *lineola.* ✓
Cetonia lineola. Oliv. Inſ. 1. 6. 77. 98. tab. 5. fig. 28.
Scarabaeus lineola. Linn. ſyſt. nat. 2. 552. 53.
Roeſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. B. fig. 7.
Degeer Inſ. 4. tab. 19. fig. 5.
Cetonia ephippium nigra thoracis margine lineaque dorſali, elytris macula difformi ferrugineis. Mant. Inſ. 1. 29. 31.
Oliv. Inſ. 1. 6. 78. 98. tab. 11. fig. 106.
Voet. Coleopt. tab. 9. fig. 81.
Drury Inſ. 3. tab. 44. fig. 3.
Habitat in America meridionali.
Conf. Scarabaeus ſurinamenſis. Linn. ſyſt. nat. 2. 552. 54.
Oliv. Inſ. 1. 6. 79. 99. tab. 11. fig. 104. vix differt.

44. C. glabra atra nitida thoracis margine teſtaceo: puncto nigro, clypeo emarginato. *ſtriata.*
Cetonia ſtriata. Oliv. Inſ. 1. 6. 79. 100. tab. 11. fig. 102.
Habitat in Guadeloupe Americae Dom. Iſert.
Statura & magnitudo C. lineolae. Clypeus niger, late emarginatus. Thorax glaber, laevis, nitidus margine teſtaceo puncto medio nigro. Elytra ſtriata, brunnea, nitida, immaculata.

Corpus ſubtus variegatum ſterno porrecto, teſtaceo. Pedes teſtacei.

Variat capitis ſcutellique linea dorſali alba.

ſinuata. 45. C. fuſca thorace elytrisque margine punctisque duobus flavis.

Cetonia ſinuata. Oliv. Inſ. 1. 6. 25. 24. tab. 8. fig. 28.

Scarabaeus punctato marginatus. Degeer Inſ. 7. 639. 38. tab. 47. fig. 20

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Caput nigrum clypeo emarginato. Thorax niger margine late flavo puncto medio nigro. Puncta duo flava in medio dorſi. Scutellum utrinque puncto baſeos flavo. Elytra margine ſinuato flavo punctoque apicis nigro. Puncta praeterea duo flava in ſingulo elytro. Subtus atra ſterno rotundato.

faſciata. 46. C. nigra thoracis margine elytrisque teſtaceis, elytris ſutura faſciaque dentata nigris.

Habitat Alexandriae Dom. Prof. Forſkahl.

Corpus nigrum ſtatura C. thoracicae. Thorax niger margine antico & laterali teſtaceis. Elytra teſtacea ſutura faſciaque poſtica dentata nigris.

thoracica. 47. C. nigra thorace ferrugineo, elytris nigris ſubpurpuraſcentibus.

Habitat Alexandriae Dom. Prof. Forſkahl.

Major C. aurata atra. Thorax ferrugineus, baſi niger. Elytra obſcura purpureo colore inprimis ad margines tincta.

olivacea. 48. C. teſtacea thorace lineis punctisque duobus, elytris maculis quatuor transverſis nigris.

Cetonia olivacea. Oliv. Inſ. 1. 6. 37. 41. tab. 8. fig. 69.

Scarabaeus cordatus. Drury Inſ. 2. tab. 32.

Voet. Coleopt. 1. tab. 1. fig. 7.
Habitat in Sierra Leon. Africae Muſ. Dom. Tunſtall.
Caput nigrum, immaculatum. Thorax teſtaceus lineis duabus, latis, dorſalibus & puncto utrinque parvo laterali nigris. Scutellum teſtaceum margine nigro. Elytra obtuſa, teſtacea maculis quatuor magnis, transverſalibus, nigris, quae tamen marginem exteriorem haud attingunt. Subtus olivacea abdominis ſegmentis apice nigris. Sternum breve, obtuſum.

49. C. thoracis margine lineaque dorſali, elytrorum faſciis interruptis teſtaceis. *interrupta.*
Cetonia interrupta. Oliv. Inſ. 1. 6. 35. 42. tab. 8. fig. 70.
Habitat in Senegalia Muſ. Dom. Olivier.
Statura C. olivaceae at duplo minor. Caput atrum clypeo emarginato. Thorax ater vittis tribus latis teſtaceis, marginalibus puncto medio atro. Scutellum teſtaceum. Elytra margine faſciisque tribus interruptis, teſtaceis. Sternum exſertum, breve, obtuſum.

50. C. nigra thorace quinque lineato, elytris acuminatis albo maculatis. *picta.*
Habitat in Oriente Prof. Forſkahl.
Caput nigrum lineolis duabus maculaque utrinque oculari albis. Thorax niger lineis quinque albis. Scutellum triangulum, nigrum linea alba, quae baſin haud attingit. Elytra acuminata, antice punctis albis ſubſtriata, poſtice maculata. Ultimum abdominis ſegmentum prominens album linea nigra. Subtus alba linea media atra.

51. C. nigra thorace lineis tribus, elytris faſcia flexuoſa ſcutelloque albis. *trilineata.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Lee.

Caput nigrum linea longitudinali flava. Clypeus emarginatus. Thorax niger linea dorſali lateralibusque flavis. Punctum nigrum in margine. Scutellum triangulum, flavum. Elytra lubrriata nigra linea flexuoſa abbreviata, flava. Abdomen nigrum ano faſcia flexuoſa flava. Pedes nigri flavo variegati.

elata. 52. C. atra thorace lineis tribus albis, elytris olivaceis: margine atro albo punctato.

Habitat in Guinea Dom. von Rohr.

Media. Clypeus porrectus, tridentatus dente intermedio minuto, lateralibus porrectis. Caput atrum, nitidum punctis duobus albis. Thorax ater, nitidus lineis tribus albis: intermedia abbreviata. Scutellum atrum linea alba. Elytra vix punctata, olivacea ſutura atra, immaculata, margineque atro albo punctato, inprimis macula magna alba elytron terminat. Corpus atrum lateribus albo maculatis, ſterno porrecto. Pedes atri femoribus linea alba.

ſemipunctata. 53. C. viridis nitida thorace quadrilineato, elytris baſi lineatis apice punctatis.

Habitat — — Dom. Boeber.

Clypeus ſubemarginatus, viridis lineis duabus abbreviatis, albis. Thorax lineis utrinque duabus albis. Scutellum immaculatum. Elytra laevia, viridia baſi lineis duabus, apice punctis plurimis albis. Corpus ſubtus albo villoſum linea media glabra, aenea. Pedes virides femoribus albo villoſis.

lineata. 54. C. nigra thorace quinque lineato, elytris albo maculatis, clypeo reflexo ſpinaque incumbente.

Cetonia 5 lineata. Oliv. Inſ. 1. 6. 56. 36. tab. 8. fig. 76.

Habitat — — Muſ. Dom. Banks.

Caput nigrum, immaculatum clypeo apice elevato, acuto, in medio ſpina incumbente, acuta. Thorax niger lineis impreſſis albis. Scutellum triangulum margine lineola baſeos alba. Elytra fuſca, albo maculata futura lineisque duabus elevatis rubris interiore abbreviata. Abdomen atrum utrinque lineis duabus punctorum alborum. Anus prominet fuſcus maculis duabus albis.

55. C. nigra nitida elytris atro maculatis maculaque poſtica alba. *atromaculata.*

Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Media. Capitis clypeus reflexus, vix emarginatus, niger. Thorax laevis, niger, nitidus, immaculatus. Elytra ſtriata, nigra maculis plurimis holoſericeis atris at poſtice macula transverſa, alba. Corpus atrum abdomine punctis lateralibus albis.

56. C. nigra thoracis margine ferrugineo. *limbata.*

Habitat in Aegypto Dom. Prof. Forſkahl.

Obſcure nigra, haud nitida. Thorax margine antico & laterali ferrugineis. Linea parva purpuraſcens in dorſo elytrorum ad futuram.

57. C. cyanea thoracis margine elytrisque teſtaceis. *ſplendida.*

Cetonia ſplendida. Oliv. Inſ. 1. 6. 75. 95. tab. 4. fig. 21.

Voet. Coleopt. tab. 8. fig. 62.

Habitat in India.

Corpus totum glabrum, nitens. Caput, thorax, ſcutellum & abdomen cyanea. Thoracis margo & elytra teſtacea. Scutellum longitudine fere dimidii elytri.

elegans. 58. C. viridis nitidiſſima elytrorum ſutura punctoque apicis atris.

Cetonia elegans. Oliv. Inſ. 1. 6. 29. 30. tab. 4. fig. 25.

Habitat in Coromandel Muſ. Dom. Banks.

Magnitudo omnino C. auratae. Clypeus apice ſubreflexus ſpinaque incumbente minutiſſima. Thorax viridis, nitidiſſimus, immaculatus. Scutellum concolor. Elytra viridia, nitidiſſima, ſutura punctoque apicis gibbo atris ob coloris nitorem vix conſpicuis. Subtus concolor primo abdominis ſegmento margine teſtaceo. Sternum prominens, ſubrecurvum, obtuſum.

Variat rarius puncto adhuc baſeos nigro.

4 maculata. 59. C. viridis fulvo micans elytris maculis duabus nigris, ſterno obtuſo.

Cetonia 4 maculata. Oliv. Inſ. 1. 6. 30. 31. tab. 8. fig. 73.

Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.

Capitis clypeus obtuſus, ſubemarginatus, fulvus. Thorax, elytra, ſcutellum viridia, laevia, fulvo colore micantia. Punctum nigrum ad baſin & alterum ad apicem elytrorum; ſubtus viridis nitens ano obſcuro. Femora utrinque linea fulva.

cuprea. 60. C. cuprea nitida thorace ſcutello elytrisque viridibus.

Habitat Surinami Muſ. Dom. Tunſtall.

Caput cupreum clypeo truncato, integro. Thorax viridis, nitidus, poſtice emarginatus. Elytra laevia, viridia, immaculata. Subtus tota colore cupri vivaciſſimi. Sternum breve, obtuſum.

africana. 61. C. aenea nitens capitis ſpina incumbente, ſterno porrecto, elytris punctis nigris ſtriatis.

Cetonia africana. Oliv. Inſ. 1. 6. 31. 32. tab. 8. fig. 70.
Scarabaeus africanus. Drury Inſ. 2. tab. 30. fig. 3.
Voet. Coleopt. tab. 4. fig. 25.
Habitat in Africa, Sierra Leon.
Clypeus apice reflexus in medio ſpina parva incumbente armatus. Thorax aeneus, nitidus, laeviſſimus. Elytra aenea, nitida, punctis nigris impreſſis ſtriata, apice obtuſa. Sternum valde porrectum. Subtus concolor atomis minutiſſimis fuſcis irrorata. Alae coeruleſcentes. Pedes aenei plantis nigris.

62. C. thorace nigro: margine rufo, elytris aeneo nitidis: ſutura nigra. *futuralis.*
Cetonia futuralis. Oliv. Inſ. 1. 6. 32. 34. tab. 8. fig. 74.
Habitat in Africa Dom. Drury.
Clypeus apice reflexus ſpinaque parva incumbente. Thorax elevatus, laevis, ater, nitens margine obſcure rufo. Scutellum nigrum. Elytra laeviſſima, aenea ſutura, apice calloque baſeos nigris. Sternum porrectum. Abdomen piceum. Pedes picei, apice nigri.

63. C. hirta viridi aenea elytris teſtaceis: vitta media nigra ſuturaque aenea. *vittata.*
Melolontha Zebra. Oliv. Inſ. 1. 6. 5. 54. 73. tab. 7. fig. 75.
Voet. Coleopt. tab. 7. fig. 60.
Habitat in Africa Muſ. Dom. Banks.
Caput viridi aeneum, cinereo villoſum clypeo emarginato. Thorax villoſus, aeneus. Elytra glabra, laevia, teſtacea vitta media margineque exteriori nigris. Sutura aenea. Subtus hirta, aenea.

fulgida. 64. C. aenea nitidiſſima abdominis ultimo ſegmento prominente quadripunctato.

Cetonia fulgida. Oliv. Inſ. 1. 6. 33. 35. tab. 8. fig. 75.

Voet. Coleopt. tab. 3. fig. 24.

Habitat — — Muſ. Dom. Banks.

Capitis clypeus integer. Thorax aeneus, ferrugineo parum micans, nitidiſſimus. Elytra viridia, nitidiſſima, ferrugineo parum micantia, poſtice gibba. Sternum breve, rotundatum. Abdomen aeneum utrinque lineis duabus macularum albidarum. Anus prominet punctis quatuor albis. Pedes ruſi geniculis nigris.

Iris. 65. C. viridis nitidiſſima fuſco micans.

Cetonia Iris. Oliv. Inſ. 1. 6. 31. 33. tab. 8. fig. 77.

Voet. Coleopt. tab. 4. fig. 25.

Habitat Surinami Muſ. Dom. Banks.

Corpus viride, nitidiſſimum at fuſco colore micans. Capitis clypeus emarginatus at absque ulla ſpina. Thorax elytraque ſubtiliſſime punctata. Sternum porrectum, breve, orbiculatum.

√ *gagates.* 66. C. atra nitida clypeo truncato reflexo, ſterno obtuſo.

Cetonia gagates. Oliv. Inſ. 16. 25. 25. tab. 4. fig. 20. tab. 11. fig. 20.

Scarabaeus carbonarius. Degeer Inſ. 4. 324. 18.

Scarabaeus gagates. Forſter Cent. Inſ. 6. 6.

Habitat in Sierra Leon. Muſ. Dom. Banks.

Clypeus truncatus, obtuſus, reflexus. Thorax ater, nitens, poſtice emarginatus. Elytra obtuſa, nitida, poſtice gibba. Sternum obtuſum.

√ *tetradactyla* 67. C. atra ſcutello elytris dimidio breviore, pedibus triunguiculatis: pollice fixo.

Cetonia tetradactyla. Oliv. Inſ. 1. 6. 74. 93. tab. 2. fig. 8. tab. 7. fig. 53.
Scarabaeus tetradactylus. Linn. Mant. 530.
Drury Inſ. 1. tab. 33. fig. 7.
Sloan. Jam. 2. 237. fig. 2.
Habitat in America meridionali.
Statura & magnitudo C. Chryſis at tota atra.

68. C. viridi cuprea nitida elytris teſtaceis, ſterno antice cornuto. *clavata.*
Oliv. Inſ. 1. 6. 72. 89. tab. 8. fig. 68.
Habitat in America meridionali Dom. Banks.
Magnitudo & ſtatura omnino praecedentis. Corpus laeve, nitidum, immaculatum, mox aeneum, mox cupreum. Elytra laevia, glabra, teſtacea. Sternum antice valde porrectum, ſubclavatum, obtuſum.

69. C. atra nitida thoracis margine omni elytrorumque vittis duabus flavis. *fucata.*
Cetonia quadrivittata. Oliv. Inſ. 1. 6. 92. 7. fig. 65.
Drury Inſ. 3. tab. 44. fig. 4.
Habitat in America meridionali Muſ. D. Banks.
Praecedentibus paullo minor. Caput atrum, immaculatum. Thorax laevis, ater, nitidus margine omni late flavo, nitido. Scutellum atrum. Elytra laevia, nitida, atra vittis duabus latis flavis apice coeuntibus. Sternum antice porrectum, elevatum. Corpus nigrum.

70. C. nigro aenea elytris lineis duabus elevatis alboque maculatis. *lurida.*
Cetonia livida. Oliv. Inſ. 1. 6. 43. 50. tab. 9. fig. 81.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.
Clypeus rotundatus, integer. Thorax vage punctatus, poſtice emarginatus. Elytra ob-

tuſa, nigra, albo maculata. Lineae duae elevatae poſtice coeuntes apicem haud attingunt. Sternum obtuſum.

aurichalcea 71. C. cuprea nitida elytris acuminatis albo maculatis.

Cetonia aurichalcea. Oliv. Inſ. 1. 6. 42. 49. tab. 9. fig. 78.

Habitat ad Suratte Indiae Muſ. Britann.

Clypeus integer. Thorax cupreus, immaculatus. Elytra poſtice acuminata, cuprea, parum albo maculata.

nitidula. 72. C. viridis teſtaceo nitida clypeo emarginato, elytris acuminatis.

Habitat in Africa Dom. Lee.

Statura parva praecedentis. Corpus viride, teſtaceo nitidum. Clypeus late emarginatus apicibus nigris. Elytra ad ſuturam accuminata. Ultimum abdominis ſegmentum prominet immaculatum. Pedes concolores.

philippenſis 73. C. aenea nitida thorace margine punctisque duobus albis, elytris acuminatis maculatis.

Cetonia Philippenſis. Oliv. Inſ. 1. 6. 34. 37. tab. 10. fig. 97.

Pet. Gazoph. tab. 26. fig. 9.

Habitat in Inſulis Philippinis Muſ. Britann.

Clypeus valde emarginatus. Thorax rotundatus, aeneus, nitens margine punctisque duobus dorſalibus albis. Elytra viridia, ſplendida, albo maculata, poſtice acuminata.

ſtolata. 74. C. viridi fuſca thorace margine punctisque, elytris acuminatis: faſcia media maculisque niveis.

Cetonia ſtolata. Oliv. Inſ. 1. 6. 43. 51. tab. 7. fig. 59.

Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Caput fuſcum lineis duabus albis baſeos. Clypeus emarginatus. Thorax obſcure vireſcens margine laterali punctisque utrinque duobus albis: poſteriore majore. Elytra obſcure vireſcentia faſcia in medio undata, quae tamen futuram haud attingit maculisque plurimis albis. Pedes fuſci.

75. C. atra albo maculata elytris acuminatis: vitta lata teſtacea. *feſtiva.*

Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.

Caput atrum clypeo emarginato. Thorax holoſericeus, ater, minime nitidus ſubtus utrinque macula magna antica alba. Elytra atra margine exteriori albo maculato vittaque media lata teſtacea, apice ad futuram acuminata. Anus prominet punctis duobus albis. Pectus macula laterali alba. Abdomen atrum, nitidum maculis lateralibus transverſis albis. Pedes atri.

76. C. atra nitida coleoptris faſcia lata interrupta flava. *abbreviata.*

Habitat Senegalia Muſ. Dom. Geoffroy.

Media. Corpus totum atrum, nitidum faſcia coleoptrorum lata, ſinuata in medio ad futuram interrupta, flava.

77. C. aenea nitida thorace utrinque macula, elytris plurimis albis, ſterno obtuſo. *maculata.* ✓

Cetonia maculata. Oliv. Inſ. 1. 6. 36. 40. tab. 7. fig. 66.

Voet. Coleopt. tab. 1. fig. 8.

Habitat in Coromandel Muſ. Dom. Banks.

Caput aeneum, immaculatum. Thorax aeneus, nitidus utrinque macula magna, ſinuata, alba. Elytra laevia, aenea, albo maculata, quarum anterior major fere faſciam conſtituit, apice vix

acuminata. Subtus cuprea pectore utrinque macula magna alba. Abdomen lineis quatuor punctorum alborum.

acuminata. 78. C. obſcura aenea pallido maculata, elytris acuminatis.

Cetonia acuminata. Oliv. Inſ. 1. 6. 42. 48. tab. 8. fig. 72.

Voet. Coleopt. tab. 5. fig. 37.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Elytra poſtice excurrunt in ſpinam compreſſam, acutiſſimam. Subtus aenea lateribus albo maculatis.

haemorrhoidalis. 79. C. nigra elytris viridibus nitidis, thoracis margine anoque rufis.

Cetonia haemorrhoidalis. Oliv. Inſ. 1. 6. 55. 66. tab. 4. fig. 24. tab. 11. fig. 24.

Degeer Inſ. 7. 642. 43.

Herbſt Arch. tab. 43. fig. 8.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. D. Hunter.

Parva. Caput nigrum clypeo emarginato. Thorax glaber, rufus linea media lata, nigra. Scutellum nigrum. Elytra ſubſtriata, viridia, nitida. Anus rufus prominet. Corpus nigrum.

areata. 80. C. nigra pubeſcens elytris diſco rufo.

Cetonia areata. Oliv. Inſ. 1. 6. 48. 58. tab. 9. fig. 82.

Habitat in Virginia Muſ. Britann.

Thorax niger, pubeſcens. Elytra glabra, poſtice gibba ad futuram linea unica elevata nigra diſco ferrugineo. Abdomen nigrum.

hirta. 81. C. nigricans hirta elytris pallido maculatis, thorace carinato.

Cetonia hirta. Oliv. Inſ. 1. 6. 52. 63. tab. 8. fig. 36. 44.

Scarabaeus hirtellus. Linn. ſyſt. nat. 2. 556. 69.

Schaeff. Icon. tab. 198. fig. 8.
Voet. Coleopt. tab. 4. fig. 33. 34.
Scopol. Ent. carn. 8.
β. Scarabaeus ſqualidus. Linn. ſyſt. nat. 2. 556. 68.
Voet. Scarab. tab. 4. fig. 33.
Habitat in Europa auſtraliori.

82. C. glabra nigra thorace elytrisque albo punctatis. *funeſta.*
Habitat in Italia D. Allioni.
Caput nigrum, immaculatum clypeo emarginato. Thorax laevis, glaber, obſcurus, utrinque punctis quinque albis. Elytra obtuſa, nigra, obſcura punctis plurimis albis ſparſis. Subtus atra, nitida.

83. C. clypeo emarginato nigra albo maculata abdomine ſubtus punctis quatuor albis. *ſtictica.* ✓
Cetonia ſtictica. Oliv. Inſ. 1. 6. 53. 64. tab. 7. fig. 57.
Scarabaeus ſticticus. Linn. ſyſt. nat. 2. 552. 54.
Scarabaeus nigro coeruleſcens. Geoff. Inſ. 1. 79. 14.
Herbſt Arch. tab. 19. fig. 27.
Voet. Coleopt. tab. 22. fig. 32.
Habitat in Galliae Carduis frequens.

84. C. cinerea elytrorum ſtriis albo punctatis. *punctulata.*
Cetonia punctata. Oliv. Inſ. 1. 6. 54. 64. tab. 6. fig. 47.
Habitat in Senegalia Muſ. D. Geoffroy.
Statura parva C. ſticticae. Thorax cinereus punctis parvis albis diſtinctis, ſparſis. Elytra cinerea ſtriis obſcurioribus, albo punctatis.

85. C. glabra nigra thoracis elytrorum abdominisque margine albo. *floralis.*

Habitat in Africae floribus compoſitis, Dom. Prof. Vahl.

Caput atrum punctis duobus albis inter oculos. Clypeus ſubemarginatus. Thorax ater margine laterali & poſtico albis. Elytra nigra margine albo maculari interdumque maculis aliquot ſparſis albis. Anus prominet albus. Abdomen atrum margine albo maculato. Pedes nigri.

Variat minor fere tota nigra.

14 maculata 86. C. capite thoraceque aureis, elytris punctis quatuordecim albis.

Habitat — — Muſ. Dom. Lee.

Parva. Caput & thorax aurea, nitidiſſima. Clypeus emarginatus. Thorax poſtice productus, acutus. Elytra obſcure viridia, glabra punctis ſeptem albis. Pectus albo maculatum. Abdomen ſubtus utrinque lineis duabus punctorum alborum.

verſicolor. 87. C. nigra thorace rufo nigro maculato, elytris nigris albo punctatis: dorſo rufo.

Cetonia verſicolor. Oliv. Inſ. 1. 6. 46. 54. tab. 4. fig. 23.

Scarabaeus cruentus. Pall. Icon. tab. B. fig. 24.

Herbſt Arch. tab. 19. fig. 28.

Acta Berol. tab. 1. fig. 8.

Habitat in Aegypto Prof. Forſkahl.

Caput atrum. Thorax rufus antice maculis duabus, magnis, nigris lineolaque marginali cinerea. Margo tamen ipſe parum elevatus, tenuiſſime niger. Scutellum nigrum puncto apicis albo. Elytra nigra punctis ſparſis albis & diſco macula magna, oblonga, ferruginea. Abdomen atrum marginibus anoque albo maculatis.

Variat maculis thoracis atris albo pupillatis & coecis.

88. C. atra thorace margine elytrisque maculis albis ſparſis. *variegata.*
Cetonia variegata. Oliv. Inſ. 1. 6. 47. 56. tab. 5. fig. 30. 31. 6.
Scarabaeus albellus. Pall. Icon. 1. 17. tab. A. fig. 18.
Herbſt Arch. tab. 19. fig. 29.
Habitat Tranquebariae D. Koenig.
Forte mera praecedentis varietas, at color rufus omnino deeſt.

89. C. atra thoracis margine albo, coleoptris teſta-ceis: macula ſcutellari apiceque atris. *aequinoctialis.*
Cetonia aequinoctialis. Oliv. Inſ. 1. 6. 50. 60. tab. 6. fig. 42.
Habitat in Senegalia Muſ. Dom. Olivier.
Statura & magnitudo praecedentis. Caput atrum clypeo emarginato. Thorax ater margine albo. Elytra rufeſcentia macula communi ad ſcutellum atra, apice acuminata, atra macula transverſa albida. Corpus atrum.

90. C. atra elytris acuminatis: macula magna marginali fulva. *ſanguinolenta.*
Cetonia ſanguinolenta. Oliv. Inſ. 1. 6. tab. 6. fig. 41.
Habitat in Senegalia Muſ. Dom. Geoffroy.
Statura praecedentis. Elytra acuminata macula magna irregulari, ſinuata, laterali, fulva.

91. C. atra elytris fulvis: macula ſcutellari apiceque atris faſciaque media purpurea. *diſcoidea.*
Habitat in Bengalia Muſ. de Paykull.
Statura praecedentium. Caput, thorax, ſcutellum atra, immaculata. Elytra fulva macula

communi ad ſcutellum atra ſtriga baſeos faſciaque media ad marginem biſida purpurea. Apex late ater, immaculatus. Corpus atrum.

lugubris. 92. C. glabra atra elytris macula laterali anoque albis.

Cetonia lugubris. Oliv. Inſ. 1. 6. 44. 52. tab. 7. fig. 60.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Clypeus integer. Abdomen utrinque macula lineaque punctorum albis.

hiſtrio. 93. C. teſtacea capite thoracis lineis duabus elytrorum ſutura maculisque tribus nigris.

Cetonia hiſtrio. Oliv. Inſ. 1. 6. 45. 53. tab. 10. fig. 94.

Habitat in Aegypto D. Prof. Forſkahl.

Caput nigrum. Thorax teſtaceus lineis duabus dorſalibus, apice convergentibus, nigris. Scutellum teſtaceum. Elytra acuminata, teſtacea ſutura & maculis tribus: poſteriore transverſa. Subtus picea punctis plurimis albis.

modeſta. 94. C. ſupra viridis opaca albo punctata capite emarginato atro.

Habitat Tranquebariae Dom. de Seheſtedt.

Parva. Caput atrum, immaculatum antennis palpisque teſtaceis. Clypeus emarginatus. Thorax ſupra obſcure viridis punctis duobus, parvis, albis, ſubtus utrinque lobo antico albo. Scutellum viride. Elytra obſcure viridia punctis parvis, ſparſis, albis. Corpus piceum, nitidum lateribus denſe villoſis. Ultimum abdominis ſegmentum prominet, baſi album, apice ferrugineum. Pedes atri.

95. C. teſtacea nitida lineis abbreviatis nigris. *glorioſa.*
Melolontha Dorcyi. Oliv. Inſ. 1. 5. 34. 38. tab. 4. fig. 41.
Habitat in Inſula St. Domingo.
Magnitudo C. auratae. Caput teſtaceum orbita oculorum atra. Thorax nitidus lineolis apicis ſex nigris, abbreviatis, intermediis longioribus. Scutellum teſtaceum margine nigro. Elytra laevia lineis duabus abbreviatis lituris-que aliquot marginalibus atris. Subtus brunnea, flavo lineata.

96. C. atra glabra elytris poſtice punctis duobus albis. *hottentotta.*
Cetonia hottentotta. Oliv. Inſ. 1. 6. 56. 68. tab. 7. fig. 55.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Statura reliquis longior & anguſtior. Caput atrum clypeo obtuſo, integro. Thorax ater, glaber, nitens, poſtice rotundatus. Elytra baſi gibba, vix ſtriata, atra, apice pari punctorum alborum notata. Ultimum abdominis ſegmentum prominet utrinque macula obſcure picea. Pedes atri.

97. C. glabra atra thorace poſtice maculis duabus elytrisque ſanguineis. *cruenta.*
Cetonia cruenta. Oliv. Inſ. 1. 6. 57. 69. tab. 6. fig. 37. tab. 7. fig. 58.
Habitat — — Muſ. Dom. Banks.
Statura praecedentis. Caput retuſum, atrum. Thorax punctatus, ater, nitidus, poſtice maculis duabus ſanguineis, quae totum fere margi-nem poſticum occupant. Elytra ſtriata, atra vitta lata ſanguinea. Corpus atrum ano ſanguineo.

77. MELOLONTHA. *Maxilla* brevis, cornea, apice multidentata: dentibus ſimplicibus, acutis.

Antennae lamellatae.

Fullo. 1. M. teſtacea albo maculata ſcutello macula duplici, antennis heptaphyllis.

Scarabaeus Fullo. Linn. ſyſt. nat. 2. 553. 57.
Fn. Sv. 394. Geoff. Inſ. 1. 69. 2.
Oliv. Inſ. 1. 5. 9. 1. tab. 3. fig. 28.
Schaeff. Icon. tab. 23. fig. 2.
Pet. Gaz. tab. 138. fig. 1.
Voet. Scarab. tab. 6. fig. 48. 49.
Petagna Inſ. Calabr. 3. 11. tab. 1. fig. 1.
Friſch Inſ. 11. 22. tab. 1. fig. 1.
Roeſ. Inſ. 4. tab. 30.
Aub. Miſcell. tab. 16. fig. med.
Habitat in Europae ſylvis arenoſis.
Conf. Scarabaeus albus. Pall. Icon. 1. 19. tab. B. fig. 21.
Scarabaeus heloleucos. Pall. Icon. 1. 19. tab. B. fig. 21.

Melolonthae corpus oblongum, gibbum, tomentoſum, laeve, immarginatum, tardum, capite ovato, inſerto, labio rotundato, oculis globoſis, lateralibus, inſertis, antennis brevibus, ſub oculis inſertis, thorace transverſo, ſcutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, tibiis dentatis, tarſis quinquearticulatis, colore variegato.

Melontha alba. Oliv. Inſ. 1. 5. 10. 2. t. 8. f. 91.
vix mihi diſtincta videtur.

2. M. obſcure teſtacea clypeo emarginato, thoracis margine ſerrato. *ſerrata.*
Oliv. Inſ. 1. 5. 11. 4. tab. 1. fig. 5.
Habitat in Coromandel D. Koenig Muſ. D. Banks.
Magnitudo M. vulgaris. Capitis clypeus fuſcus apice elevatus, emarginatus. Thorax laevis, obſcure teſtaceus margine dentibus nigris ſerrato. Elytra teſtacea lineis aliquot elevatis, obſoletis.

3. M. teſtacea thorace villoſo, inciſuris abdominis albis. *vulgaris.* ✓
Scarabaeus melolontha. Linn. ſyſt. nat. 2. 554. 60. Fn. Sv. 392.
Geoff. Inſ. 1. 70.
Oliv. Inſ. 1. 5. 12. 5. tab. 1. fig. 1.
Pet. Gazoph. 29. tab. 19. fig. 2.
Roeſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. 1.
Degeer Inſ. 4. tab. 10. fig. 14.
Voet. Scarab. tab. 6. fig. 45. 46.
Schaeff. Elem. tab. 8. fig. 3. tab. 109. fig. 4.
Icon. tab. 93. fig. 1. 2. tab. 102. fig. 3. 4.
Habitat in Europae borealis graminoſis.
Variat thorace rufo & nigro & utraque varietas alternat annuatim Roeſſel.
Animalculum inter omnia noſtrata maxime fatale. Larva mollis, griſea capite pedibusque teſtaceis per plures annos ſub terra degit & devorat radices vegetabilium agros prataque deſolens. Imago veſperi volitans cum ſuſurro devaſtat folia arborum tilia intacta.
Devoratur a ſuibus, corvis, cornicibus, picis, gallinis, meleagribus, carabis majoribus. Per diem arboribus concuſſis facillime colligitur a pueris.

villoſa. 4. M. teſtacea clypeo marginato reflexo, corpore ſubtus lanato, ſcutello albo.
Scarabaeus ſaepicola. Linn. ſyſt. nat. 2.
Scarabaeus cerealis. Scop. Flor. Inſ. 1. 49. tab. 21. fig. B.
Oliv. Inſ. 1. 5. 13. 6. tab. 1. fig. 4.
Habitat in Europa auſtraliori Dom. Allioni.
Statura & magnitudo M. vulgaris. Clypeus major & latior quam in reliquis apice reflexus. Thorax rotundatus, niger, ferrugineo pubeſcens. Scutellum albo villoſum. Elytra teſtacea. Subtus lana denſa alba tecta.

piloſa. 5. M. villoſa nigricans clypeo reflexo ſubemarginato, antennis ferrugineis.
Habitat in Hungaria Muſ. D. de Seheſtedt.
Affinis certe M. villoſa, cujus varietatem olim credidi, at minor & diſtincta videtur. Corpus nigricans, tomento cinereo tectum inprimis ſubtus. Scutellum latum, ſubemarginatum. Antennae ferrugineae.

occidentalis 6. M. teſtacea thorace pubeſcente, elytris lineis quatuor niveis.
Scarabaeus occidentalis. Linn. ſyſt. nat. 2. 555. 62.
Oliv. Inſ. 1. 5. 14. 7. tab. 1. fig. 7.
Drury Inſ. 2. tab. 32. fig. 2.
Habitat in Europa auſtraliori.

ſervida. 7. M. glabra teſtacea clypeo emarginato. Oliv. Inſ. 1. 5. 24. 21. tab. 9. fig. 109.
Habitat in America ſeptentrionali.
Praecedenti affinis at minus villoſa totaque teſtacea, rore coeruleſcente tecta.

reflexa. 8. M. glabra teſtacea clypeo reflexo. Oliv. Inſ. 1. 5. 24. 22. tab. 4. fig. 32.

Habitat in Africa Muſ. Dom. Banks.
Praecedente paullo minor. Corpus totum glabrum.

9. M. fulvo hirta clypeo reflexo emarginato, elytris glabris nigris. Oliv. Inſ. 1. 5. 18. 9. tab. 4. fig. 35. *Alopex.*
Scarabaeus vertumnus. Pall. Itin. 1. 10. 28.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.
Clypeus rotundatus, glaber margine reflexo emarginato. Caput & thorax pilis denſiſſimis, fulvis tectum. Elytra glabra, laevia, nigra, immaculata. Corpus hirtum.

10. M. cinereo hirta elytris nigris, clypeo reflexo integro. *tomentoſa.*
Habitat in India orientali Dom. Lee.
Statura & magnitudo M. Alopex. Clypeus rotundatus, reflexus, integer. Caput, thorax abdomen cinereo hirta, immaculata. Elytra punctata, nigra, cinereo irrorata. Pedes nigri.

11. M. teſtacea thorace villoſo, elytris luteo pallidis: lineis tribus pallidioribus. *ſolſtitialis.*
Scarabaeus ſolſtitialis. Linn. ſyſt. nat. 2. 554. 61. Fn. Sv. 393.
Oliv. Inſ. 1. 5. 16. 10. tab. 2. fig. 8. 11.
Friſh Inſ. 9. 30. tab. 15. fig. 3.
Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 3.
Voet. Scarab. tab. 6. fig. 51. 52.
Degeer Inſ. 4. tab. 10. fig. 15.
Habitat in Europae arboretis
M. vulgaris ſerior ad ſolſtitium aeſtivum frequens.

12. M. clypeo rotundato, corpore villoſo albo. *candida.*
Melolontha candida. Oliv. Inſ. 1. 5. 15. 8. tab. 8. fig. 98.
Habitat in India orientali Dom. Lee.

Statura fere M. vulgaris at duplo major & corpus villoſo albidum. Punctum niveum verſus apicem elytrorum.

atra. 13. M. clypeo reflexo villoſa nigra antennis ferrugineis.

Melolontha atra. Herbſt Arch. tab. 24. fig. 1.

Melolontha fuſca. Oliv. Inſ. 1. 5. 99. 13. tab. 2. fig. 10.

Habitat in Europa auſtraliori Dom. Prof. Vahl.

Magnitudo & ſtatura M. ſolſtitialis. Caput nigrum clypeo rotundato, reflexo, integro. Thorax rotundatus, villoſus. Elytra ſtriata, nigra. Pectus albo villoſum. Corpus nigrum. Antennae rufae. Pedes nigri.

aequinoctialis. 14. M. villoſa teſtacea clypeo ſubreflexo.

Melolontha aequinoctialis. Herbſt Arch. tab. 22. fig. 11.

Melolontha aeſtiva. Oliv. Inſ. 1. 5. tab. 2. fig. 11. 6.

Habitat in Hungaria Dom. Helwig.

Statura omnino M. ſolſtitialis at alia & diſtincta, tota teſtacea, pilis cineraſcentibus hirta. Antennae rufae.

Pini. 15. M. nigra clypeo thoracis lateribus elytris pedibusque pallidis.

Melolontha Pini. Oliv. Inſ. 1. 5. tab. fig.

Habitat in Barbaria Muſ. D. Desfontaines.

Affinis M. ſolſtitiali. Caput nigrum clypeo ſubreflexo, pallido. Thorax niger margine late pallido. Elytra ſtriis elevatis. Corpus fuſcum pedibus pallidis. Tibiae dentatae.

2 *maculata.* 16. M. oblonga glabra teſtacea thorace utrinque macula abdomineque flavis. Oliv. Inſ. 1. 5. 33. tab. 5. fig. 45.

Habitat in China Muſ. Dom. Banks.

Thorax teſtaceus utrinque macula magna flaveſcente. Elytra vix ſtriata, teſtacea. Abdomen flavum macula ultimi ſegmenti teſtacea. Pedes flaveſcentes.

17. M. oblonga villoſa pallida elytris ſutura apiceque nigris, clypeo reflexo. *Atriplicis.*
Oliv. Inſ. 1. 5. 28. 28. tab. 8. fig. 99.
Habitat in Barbariae Atriplice hamilifolio Muſ. Dom. Prof. Vahl.
Clypeus rotundatus, reflexus. Caput, thorax, corpus villoſa, pallida, immaculata. Elytra ſublaevia, pallida ſutura apiceque late nigris. Pedes pallidi tarſis fuſcis.

18. M. oblonga glabra nigra elytris obſolete ſtriatis. *oblonga.*
Scarabaeus oblongus. Scop. carn. 10.
Oliv. Inſ. 1. 5. 19. 14. tab. 4. fig. 34.
Habitat in Germania.
Minor M. vulgari tota glabra, nigra. Oculi teſtacei. Elytrorum ſtriae per paria approximatae, obſoletae.

19. M. villoſa teſtacea abdomine albicante. *ruficornis.*
Voet. Scarab. tab. 6. fig. 50.
Habitat in Germania Dom. Hattorff.
Forte varietas M. ſolſtitialis. Caput nigricans antennis ruſis. Thorax & pectus villis denſis albis tecta. Elytra teſtacea, immaculata. Abdomen albidum ano nigricante. Pedes nigri.

20. M. ſubtus lanata capite thoraceque aureis, elytris luteis. *lanigera.*
Scarabaeus lanigerus. Linn. ſyſt. nat. 2. 555. 67. Muſ. Lud. 20.
Oliv. Inſ. 1. 5. 21. 17. tab. 4. fig. 39.
Drury Inſ. 1. tab. 34. fig. 6.
Voet. Coleopt. tab. 7. fig. 59.

Habitat in India.

Clypeus truncatus, obtuſus. Sternum antice acutum.

longicornis. 21. M. ſupra glabra nigra elytris ferrugineis, antennarum clava elongata.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.

Statura & magnitudo M. lanigerae. Capitis clypeus rotundatus, glaber, integer, niger. Antennarum clava lamellis tribus porrectis, obſcure ferrugineis. Thorax glaber, niger, immaculatus. Elytra glabra, laevia, obſcure ferruginea. Subtus fulvo hirta abdomine glabro.

punctata. 22. M. teſtacea elytris punctis tribus fuſcis diſtantibus.

Scarabaeus punctatus. Linn. ſyſt. nat 2. 557. 76. Muſ. Lud. 23.

Oliv. Inſ. 1. 5. 22. 18. tab. 1. fig. 6.

Drury Inſ. 1. tab. 34. fig. 6.

Gronov. Gazoph. 438.

Voet. Scarab. tab. 8. fig. 65.

Habitat in America.

Ungues arcuati, acutiſſimi.

viridis. 23. M. glabra ſupra viridis ſubtus aurea.

Oliv. Inſ. 1. 5. 29. 31. tab. 3. fig. 21. 6. tab. 3. fig. 18.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Sternum haud porrectum.

aenea. 24. M. glabra aenea abdominis lateribus albis, elytris acuminatis.

Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Color ſupra aeneus, nitidus, immaculatus, ſubtus magis coeruleſcens pectoris abdominisque marginibus piloſo albis. Scutellum rotundatum. Elytra apice ad futuram acuminata.

Sternum porrectum, acutum. Femora linea punctorum impressorum.

25. M. viridis elytrorum sutura flavescente Oliv. Inf. 1. 5. 31. 34. tab. 7. fig. 80. *suturalis.*
Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.
Caput viride, immaculatum margine elevato. Thorox glaber, viridis marginibus parum flavescentibus: postico obtuse angulato. Elytra glabra, substriata, viridia sutura flavescente. Pectus & abdomen pilis albis tecta sterno porrecto, acuto. Pedes virides tarsis ferrugineis.

26. M. glabra viridis subtus testacea pedibus apice aureis Oliv. Inf. 1. 5. 30. 33. tab. 7. fig. 86. *bicolor.*
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.
Duplo praecedente minor supra tota viridis, glabra, obscura, immaculata, subtus obscure testacea, aeneo colore tincta, Femora pallidiora. Tibiae & tarsi aurei.

27. M. glabra nigra nitida abdominis ultimo segmento prominulo barbato. *barbata.* ✓
Scarabaeus barbatus Mant. Inf. 1. 10. 91.
Habitat in India.
Tota laevis, glabra, nitens. Ultimum abdominis segmentum ultra elytra ♀ prominet pilis longioribus ferrugineis barbatum.

28. M. glabra testacea capite elytrorum sutura tibiisque posticis nigris, clypeo reflexo. *elata.*
Habitat Tranquebariae Mus. Dom. de Seheſtedt.
Statura & magnitudo omnio M. punctatae. Caput nigrum clypeo reflexo oculisque albidis. Thorax laevis, glaber, testaceus, utrinque puncto parvo fusco. Scutellum testaceum margine nigro. Elytra laevia, testacea. Pedes testacei tibiis posticis nigris.

dorſalis. 29. M. glabra teſtacea capite thoracis coleoptrorumque dorſo nigris.

Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

Paullo minor M. ſolſtitiali. Caput nigrum. Thorax niger lateribus teſtaceis: puncto nigro. Coleoptra teſtacea linea lata, communi, dorſali, nigra. Pedes teſtacei tibiis poſticis nigris.

glacialis. 30. M. glabra picea antennis pedibusque teſtaceis Oliv. Inſ. 1. 5. 78. 46. tab. 6. fig. 61.

Habitat in Terra del Fuego Muſ. Dom. Banks.

Corpus magnitudine praecedentis glabrum, piceum, obſcurum. Clypeus emarginatus. Pedes teſtacei, poſtici obſcuriores.

lurida. 31. M. thorace nigro: margine pallido, elytris griſeis nigro punctatis.

Habitat — — Muſ. Dom. Tunſtall.

Caput nigrum clypeo ſubintegro. Thorax niger margine laterali pallido. Elytra griſea macula oblonga ad marginem exteriorem baſeos, punctis duobus ad ſuturam & unico verſus apicem nigris. Pedes nigri.

ſtriata. 32. M. glabra aenea elytris ſtriatis: ſutura lineisque quatuor cupreis.

Oliv. Inſ. 1. 5. 39. 49. tab. 6. fig. 65.

Habitat in Terra del Fuego Muſ. Dom. Banks.

Statura praecedentium at minor. Caput & thorax glabra, aenea, nitida. Scutellum aeneum. Elytra paullo obſcuriora, ſulcis decem ſtriata. Sutura lineaeque quatuor, quae poſtice per paria coeunt, cuprea. Corpus ſubtus & pedes atra.

triſtis. 33. M. thorace villoſo obſcuro, elytris laevibus teſtaceis, ſcutello albo.

Habitat in America boraeli Dom. Blackburn.

Caput & thorax hirta, obſcura. Scutellum rotundatum, hirſutie denſa albidum. Elytra laevia, teſtacea. Corpus obſcurum.

34. M. glabra teſtacea capite obſcuriore, elytris ſtriatis. *teſtacea.*
Oliv. Inſ. 1. 5. 39. 47. tab. 5. fig. 49.
Habitat in Terra del Fuego Muſ. Dom. Banks.
Statura omnino M. brunneae at paullo major. Corpus totum teſtaceum capite tamen magis nigricante & punctum nigrum ad apices femorum. Labium emarginatum. Elytra ſtriata.

35. M. hirta nigra elytris punctatis glabris rufis. *hirticollis.*
Habitat in Africa Dom. Prof. Vahl.
Clypeus rotundatus, reflexus, niger. Caput, thorax, abdomen, pedes nigra, punctata, cinereo hirta. Scutellum nigrum. Elytra glabra, punctata, rufa, immaculata.

36. M. glabra teſtacea capite elytrorumque ſutura nigris. *pallida.*
Meloſontha ſpinipes Herbſt Arch. 13. 4. tab. 19. fig. 21.
Oliv. Inſ. 1. 5. 25. 24. tab. 9. fig. 103.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Major M. brunnea. Caput rotundatum, nigrum ore pallidiore. Thorax glaber, laevis, teſtaceus. Elytra ſubſtriata, pallidiora ſutura in primis ad ſcutellum nigra. Pedes pallidi apice nigri.

37. M. glabra punctata ferruginea elytris teſtaceis. *ruficollis.*
Oliv. Inſ. 1. 5. 27. 26. tab. 9. fig. 111.
Habitat in Coromandel Koenig Muſ. Dom. Banks.
Major M. brunnea. Clypeus rotundatus, integer, obſcure ferrugineus, in medio lineis duabus elevatis, transverſis. Thorax glaber,

valde punctatus, rufus, immaculatus. Elytra glabra, teſtacea, punctata.

varioloſa. 38. M. villoſa nigra thorace elytrisque varioloſis.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lee.
Statura M. ſignatae. Corpus ſupra nigrum punctis impreſſis cinereis, ſubtus villoſum. Clypeus rotundatus, reflexus lineaque media transverſa, elevata.

ſignata. 39. M. glabra pallida thorace lineis duabus elytris maculis tribus nigris.
Scarabaeus nigrocephalus ſcutellatus rufo lividus, capite rufo poſtice nigro, corpore oblongo. Degeer Inſ. 4. tab. 19. fig. 6.
Habitat in Jamaica Muſ. Dom. Banks.
Caput baſi atrum. Clypeus integer, pallidus. Thorax pallidus lineolis duabus atris, quae tamen nec baſin nec apicem attingunt. Elytra glabra, laevia, pallida maculis tribus 2. 1. quarum exterior reliquis minor. Subtus pallida abdomine nigro. Tibiae anticae apice compreſſae, dentatae. Tarſi picei baſi apiceque ſpinoſi.

marginata. 40. M. glabra aenea elytris teſtaceis: ſutura margineque exteriori aeneis.
Habitat — — Muſ. Dom. Banks.
Media. Caput & thorax punctata, aenea, nitida clypei margine obſcuriore. Scutellum aeneum. Elytra ſubpunctata, ſtriata, teſtacea ſutura margineque anteriori viridi aeneis. Corpus obſcure aeneum. Tibiae dentatae.

coeruleoce-phala. 41. M. glabra coeruleo nigra elytris teſtaceis: ſutura ferruginea.
Oliv. Inſ. 1. 5. 36. 43. tab. 6. fig. 59.
Habitat — — Muſ. Dom. Banks.

Paullo praecedente minor. Caput coeruleo nigrum clypeo ſubreflexo. Thorax glaber, laevis, coeruleo niger margine exteriori teſtaceo. Scutellum coeruleo nigrum. Elytra vix ſtriata, teſtacea futura ferruginea. Corpus obſcurum.

42. M. glabra teſtacea elytris ſtriatis, thorace utrinque puncto notato. *brunnea.*

Scarabaeus brunneus Linn. Syſt. nat. 2. 556. 72.
Scarabaeus fulvus Geoff. Inſ. 1. 83. 22.
Degeer Inſ. 4. tab. 10. fig. 17.
Oliv. Inſ. 1. 5. 43. 55. tab. 4. fig. 33.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 22. 50.
Voet. Coleopt. tab. 7. fig. 53. 54.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 1. fig. 9.
Habitat in Europae arboretis.
Larva mollis, albida capite pedibusque teſtaceis devorat radices, imago folia.

43. M. glabra refeſcens capite nigro, elytris pallidis. *melanocephala.*

Oliv. Inſ. 1. 5. 43. 55. tab. 7. fig. 83.
Voet. Coleopt. tab. 9. fig. 80.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.
Statura & magnitudo praecedentis. Clypeus rotundatus, reflexus, ater, orbita oculorum albida. Thorax glaber, rufeſcens, nitidus. Scutellum rufum. Elytra laevia, pallida. Subtus uti & pedes rufeſcens.

44. M. glabra pallida capite rufo baſi nigro. Oliv. Inſ. 1. 5. 41. 51. tab. 7. fig. 80. *erythrocephala.*

Habitat in Coromandel Muſ. Dom. Banks.
Affinis M. melanocephala at duplo minor. Corpus totum glabrum, laeve, immaculatum capite ſolo obſcure rufo, baſi nigro.

45. M. nigricans thorace pallido: punctis duobus nigris. *mixta.*

Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Lee.
Statura & magnitudo omnino M. melanocephalae. Caput nigrum oculis albis. Thorax glaber, laevis, pallidus utrinque puncto nigro. Elytra nigricantia, flavo mixta. Corpus nigrum femoribus teſtaceis.

obſcura. 46. M. obſcure picea immaculata pilis breviſſimis erectis albis. Oliv. Inſ. 1. 5. 42. 53. tab. 6. fig. 64.
Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. Dom. Banks.
Corpus magnitudine M. rufae, totum obſcurum, rufum & pilis breviſſimis albis vix nudo oculo conſpicuis tectum.

ruſa. 47. M. glabra rufeſcens elytris teſtaceis, clypeo quinquedentato.
Oliv. Inſ. 1. 5. 4. 3. tab. 7. fig. 29.
Voet. Scarab. tab. 9. fig. 70.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Statura M. brunneae. Clypei margo reflexus dentibus quinque obtuſiſſimis. Caput & thorax rufeſcentia. Elytra laevia, teſtacea, ſubtus pilis albidis hirta.

feſtiva. 48. M. ſupra glabra viridis thorace linea dorſali, elytris ſutura nigris. Oliv. Inſ. 1. 5. 47. 62. tab. 5. fig. 48.
Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.
Minor M. brunnea. Caput viride clypeo emarginato. Antennae ferrugineae clava nigra. Thorax glaber, viridis, nitens linea dorſali fuſca. Elytra viridia, nitida ſtriis novem exarata, ſutura longitudinali fuſca. Corpus ſubtus teſtaceum, albo piloſum. Sternum porrectum, ſubcornutum.

laeta. 49. M. ſupra glabra aurea thoracis linea dorſali ſcutelloque ſanguineis.

Oliv. Inſ. 1. 5. 48. 63. tab. 6. fig. 56.
Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.
Forte praecedentis mera varietas. Differt tamen colore aureo, nitido thoracis linea & ſcutello ſanguineis elytrorumque ſutura concolore.

50 M. ſupra viridis holoſericea ſubtus cuprea elytris lineis elevatis quatuor. *holoſericea.*
Habitat in Roſſia auſtraliori Dom. Boeber.
Paullo major M. Friſchii. Corpus totum ſupra viridi holoſericeum, ſubtus cupreum.

51 M. viridi aenea elytris ſubſtriatis obſcuris. *Julii.* ✓
Scarabaeus dubius Herbſt Arch.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Affinis certe M. Friſchii at minor & elytra obſcura, minime nitida, ſubſtriata, mox vireſcentia, mox ſubteſtacea. Pedes nigricantes.

52. M. glabra nigra clypeo reflexo, elytris obſolete ſtriatis. *nigrita.* ✓
Habitat in America.
Statura omnino M. Julii. Clypeus rotundatus, reflexus, niger, immaculatus. Elytra glabra, obſolete ſtriata. Corpus nigrum. Majorem vix diſtinctam ex Italia miſit Dom. Allioni.

53. M. nigro aenea nitida elytris teſtaceis. *Friſchii.* ✓
Scarabaeus Vitis Friſch. Inſ. 4. 29. tab. 14.
Oliv. Inſ. 1. 5. 35. 40. tab. a. fig. 29.
Degeer Inſ. 4. tab. 10. fig. 16.
Schaeff. Icon. tab. 23. fig. 3. 7.
Habitat in Vite, Roſa Germaniae.
Caput & thorax obſcure aenea, glabra, nitida. Scutellum aeneum.
Elytra teſtacea ſutura aenea.
Variat elytris teſtaceis, aeneis, cyaneis.

54. M. viridis thoracis lateribus flavis. *Vitis.* ✓
Oliv. Inſ. 5. 34. 39. tab. 2. fig. 12.

Schaeff. Icon. tab. 259. fig. 6.
Petagn. Inſ. Calabr. 5. 19.
Voet. Scarab. tab. 6. fig. 56. 57.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 1. fig. 11.
Habitat in Europae, Americae Vite.
Nimis praecedenti affinis. Color elytrorum variat. Thoracis margine flavo diſtincta videtur.

Cardui. 55. M. glabra viridi aenea abdomine rufo cinereo villoſo.
Melolontha maura. Oliv. Inſ. 1. 5. 38. 45. tab. 8. fig. 90.
Scarabaeus maurus thorace inermi, capite mucronibus tribus, corpore violaceo, abdomine teſtaceo. Mant. Inſ. 1. 9. 68. Linn. Syſt. nat. 2. 5. 48. 304.
Habitat in Carduo pycnocephalo Africae Prof. Vahl.
Caput, thorax, elytra glabra, viridiaenea, immaculata. Elytra vix ſtriata. Abdomen rufum pilis cinereis villoſum. Corpus cyaneum.

Serratulae. 56. M. villoſa viridis elytris ſerratis acuminatisque, femoribus poſticis incraſſatis.
Habitat in Barbaria Muſ. Dom. Desfontaines.
Statura & magnitudo omnino M. Cardui. Caput viride, nitidum ore antennisque fuſcis. Thorax punctatus, viridis, nitidus. Elytra viridia pilis breviſſimis, rufis villoſa, margine exteriori denticulis plurimis, acutis, nigris ſerrato: apicis majori, acuminato. Subtus villoſa, cuprea abdomine ſubteſtaceo, femoribus poſticis valde incraſſatis tibiisque incurvis, apice uniſpinoſis.

faſtuoſa. 57. M. viridi aenea nitida elytris vittis duabus aureis.
Melolontha Leei Oliv. Inſ. 1. 5. 30. tab. 8. fig. 37.

Scarabaeus Leei ſcutellatus muticus caeruleus nitidiſſimus, capitis diſco, thorace faſcia interrupta elytrisque vittis quatuor aureis. Swed. Act. Holm. 1787. 188. 4.

Habitat in India orientali Dom. Lee.

Statura & magnitudo M. Friſhii, viridis, nitida. Caput macula, thorax duabus elytrisque vittis duabus laete aureis. Subtus aurea abdomine apice ſubteſtaceo.

58. M. teſtacea thorace maculis duabus nigris, pedibus rufis. *errans.*

Oliv. Inſ. 1. 5. 45. 58. tab. 8. fig. 92.

Habitat in Anglia Muſ. Dom. Tunſtall.

Statura M. horticola. Variat thoracis colore, interdum teſtaceus, immaculatus, rarius niger margine teſtaceo. Elytrorum margo interdum niger.

59. M. ſubteſtacea griſeo villoſa pedibus teſtaceis. *umbroſa.*

Habitat in Guinea Dom. Iſert.

Magnitudo M. brunneae. Corpus totum villis brevibus, denſis, cinereis tectum. Clypeus rotundatus, integer margine parum reflexo. Pedes ſoli teſtacei.

60. M. villoſa vireſcens capite nigro. *rupicola.*

Oliv. Inſ. 1. 5. 68. 92. tab. 6. fig. 70.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Parva. Caput nigrum. Thorax & elytra pubeſcentia, vireſcentia. Corpus ſubtus cinereum.

61. M. glabra nigra thoracis margine abdomine femoribusque teſtaceis. *innuba.*

Oliv. Inſ. 1. 5. 46. 59. tab. 8. fig. 93.

Habitat — — Muſ. Dr. Hunter.

Parva, nitida. Caput nigrum ore antennisque flavis. Thorax punctatus, niger margine laterali teſtaceo. Elytra ſubſtriata, nigra, imma-

culata. Pectus nigrum. Abdomen teſtaceum. Pedes nigri femoribus teſtaceis.

elongata. 62. M. capite thoraceque nigris, elytris nitidulis, corpore teſtaceo.

Habitat — — Dom. Lee.

Corpus parvum at reliquis longius. Antennae pallide teſtaceae. Elytra viridi nitidula margine teſtaceo. Corpus teſtaceum, cinereo villoſum. Pedes teſtacei.

rauca. 63. M. clypeo reflexo, thorace elytrisque punctatis nigro aeneis.

Oliv. Inſ. 1. 5. 41. 56. tab. 6. fig. 62.

Habitat in Coromandel Muſ. Dom. Banks.

Clypeus punctatus, niger margine reflexo. Thorax punctatus, nigro aeneus, obſcure nitidus. Elytra punctata, nigro aenea linea una alterave elevata. Corpus nigrum.

ferruginea. 64. M. rufa thorace elytrisque vage punctatis.

Oliv. Inſ. 1. 5. 44. 56. tab. 7. fig. 82.

Habitat in Coromandel Muſ. Dom. Banks.

Praecedenti affinis at duplo minor & color rufus, nitidus.

ſplendida. 65. M. atra elytris vitta abbreviata aurea.

Oliv. Inſ. 1. 5. 49. 65. tab. fig. 50.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Parva. Capitis clypeus punctatus, ater, apice emarginatus. Thorax punctatus, ater, immaculatus. Elytra punctata vitta vel potius macula oblonga, aurea.

aulica. 66. M. cuprea nitida clypeo emarginato.

Oliv. Inſ. 1. 5. 49. tab. 7. fig. 81.

Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. Banks.

Statura praecedentium. Caput cupreum, nitidum, late emarginatum. Thorax punctatus, cupreus, nitidus. Elytra punctata, cuprea, nitida.

67. M. nigra hirta elytris ſtriatis teſtaceis. *arbicola.*
Melolontha nitidula. Oliv. Inſ. 1. 5. 46. 60. tab. 9. fig. 102.
Habitat in America.
Statura omnio M. horticolae at paullo major. Caput & thorax nigra, cinereo piloſa. Elytra valde & denſe ſtriata, teſtacea margine exteriori parum nigricante. Corpus nigrum. Pedes cupro parum nitent.

68. M. capite thoraceque coeruleo piloſis, elytris teſtaceis, pedibus nigris. *horticola.*
Scarabaeus horticola Linn. Syſt. nat. 2. 554. Fn. Sv. 391.
Scarabaeus Geofr. Inſ. 1. 75. 8.
Oliv. Inſ. 1. 5. 26. tab. 2. fig. 17.
Schaeff. Icon. tab. 32. fig. 4.
Degeer Inſ. 4. tab. 10. fig. 18.
Habitat in Europae hortis.
Larva devaſtat radices Braſſicae Botrydis & capitatae, intactis viridis & ſavoyae, imago pomonam, intacta Pyro communi. Si Mali ſativi ac ſylveſtris folia depaſci contingat, tunc chylus in inteſtinis contentus croceus ad picturam adhiberi poteſt. Liſter.

69. M. capite thoraceque coeruleo piloſis, elytris teſtaceis, abdomine villoſo albo. *abdominalis.*
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Nimis affinis M. horticolae. Antennae teſtaceae, Pedes nigri.

70. M. cyanea nigra glabra elytris rufis, abdomine punctis faſciculatis albis, clypeo reflexo. *floricola.*
Melolontha auſtriaca Herbſt Arch. tab. 20. fig. 8.
Habitat in Africa Dom. Prof. Vahl.
Statura & ſumma affinitas M. horticolae. Clypeus valde reflexus. Caput, thorax, ſcutel

lum, corpus cyaneo nigra, glabra, immaculata. Abdomen punctis lateralibus, fasciculatis, albis.

Variat rarius colore elytrorum nigro Desfontaines.

arvicola. 71. M. hirta capitis clypeo reflexo, thorace coerulescente, corpore nigro.

Oliv. Inf. 1. 5. 6. 4. 78. tab. 7. fig. 84.

Habitat in Rossiae regionibus australioribus.

Nimis affinis M. horticolae, at elytra nigra.

praticola. 72. M. thorace subpiloso nigro flavoque vario, elytris testaceis.

Oliv. Inf. 1. 5. 60. 83. tab. 7. fig. 74.

Habitat in Siberia Musc. Dom. Banks.

Affinis M. agricolae, at clypeus haud reflexus. Variat colore. Caput nigrum. Thorax mox magis flavus, mox magis niger. Scutellum nigrum. Elytra pallide testacea, interdum fascia media nigra.

√ *fruticola.* 73. M. capite thoraceque coeruleo pilosis, elytris lividis, clypeo apice reflexo.

Oliv. Inf. 1. 5. 36. 56. tab. 2. fig. 13.

Petagn. Inf. Calabr. tab. 1. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 1.

Scarab. campestris Herbst Arch. 15. 11. tab. 19. fig. 25.

Scarab. segetum Herbst Arch. 15. 10. tab. 19. fig. 24.

Scarab. austriacus Herbst Arch. 16. 12. tab. 19. fig. 26.

Voet. Scarab. tab. 8. fig. 67.

Habitat in Europae spicis secalinis.

Faemina macula quadrata coleoptrorum nigra scutellum cingente.

74. M. thorace villoſo, elytris lividis: limbo faſcia- *agricola.* √
que nigris, clypeo apice reflexo.
Scarabaeus agricola Linn. Syſt. nat. 2. 553. 58. Oliv. Inſ. 1. 61. 84. tab. 2. fig. 19.
Habitat in Germaniae Graminibus.
Variat interdum faſcia elytrorum obſoleta.

75. M. atra ſericea elytris rufis: margine omni *ruricola.* √
nigro.
Scarabaeus Geoff. Inſ. 1. 80. 15.
Scarabaeus marginatus Fourcr. Pariſ. 1. 9. 15.
Oliv. Inſ. 1. 5. 52. 71. tab. 3. fig. 25.
Panz Naturf. 24. tab. 1. fig. 10.
Herbſt. Arch. tab. 43. fig. 7.
Habitat in Angliae graminoſis Dom. Lee.
Variat interdum elytris obſcuris margine tamen ſemper obſcuriore.

76. M. albo farinoſa thorace canaliculato atro, *atomaria.*
elytris fuſcis, abdomine albo: punctis lateralibus atris.
Oliv. Inſ. 1. 5. 71. 98. tab. 5. fig. 52.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Statura M. farinoſae. Caput & thorax atra atomis plurimis albis pilisque rarioribus erectis adſperſa. Thorax canaliculatus. Elytra fuſca, atomis albis irrorata. Abdomen niveum utrinque linea laterali e punctis nigris.

77. M. ſupra coeruleo ſubtus argenteo ſquamoſa *farinoſa.* √
nitens clypeo integro.
Scarabaeus farinoſus ſcutellatus muticus niger polline virescente, elytris abbreviatis Linn. Syſt. nat. 2. 555. 64. Fn. Sv. 399.
Scarabaeus violaceus ſquamoſus: ſquamis ſubtus argenteis. Geoff. Inſ. 1. 79. 13.
Scarabaeus coeruleus Drury Inſ. 2. tab. 32. fig. 4.

Oliv. Inſ. 1. 5. 66. 90. tab. 2. fig. 14. a. c.
Voet. Coleopt. tab. 9. fig. 73.
Degeer Inſ. 4. tab. 10. fig. 23.
Habitat in Europa auſtraliori.
Supra coerulea, nitida. Thorax latior quam in reliquis & elytra parum abbreviata. Aqua calida imbuta color coeruleus in vivaciſſimum viridem tranſit.

✓ *ſquamoſa.* 78. M. ſupra viridi ſquamoſa ſubtus pallido nitens capite fuſco.
Melolontha minuta Panz. Naturf. 24. 9. 11. tab. 1. fig. 11.
Melolontha argentea Laicbart. 1. 42. 7.
Oliv. Inſ. 1. 5. 65. 89. tab. 2. fig. 14. 6.
Herbſt Arch. tab. 20. fig. 6.
Degeer Inſ. 4. tab. 10. fig. 23.
Voet. Coleopt. tab. 9. fig 71. 72.
Habitat in Germania Dom. Hybner.
Summa affinitas M. farinoſae at paullo minor. Corpus ſupra ſquamoſo viride, immaculatum, ſubtus pallidius capite ſolo fuſco.

regia. 79. M. ſquamoſa ſupra lutea capite nigro ſubtus cinerea.
Scarabaeus aulicus ſcutellatus muticus piloſus luteus, capite nigro, pedibus poſticis elongatis uniunguiculatis. Linn. Syſt. nat. 2. 555. 65.
Oliv. Inſ. 1. 5. 44. 88. tab. 9. fig. 106.
Habitat in Africa Prof. Vahl.
Supra laete flava, ſubtus cinerea. Pedes poſtici elongati, uniungulati.

✓ *argentea.* 80. M. clypeo marginato nigra ſubtus argenteo niteus elytris teſtaceis.
Scarabaeus argenteus Scop. carn. 9.
Scarabaeus Philanthus Herbſt Arch.
Oliv. Inſ. 1. 5. 67. 91. tab. 8. fig. 22.

Voet. Scarab. tab. 8. fig. 68.
Habitat in Angliae floribus frequens.
Deſcriptio Scopoli optima, at nullo modo Linnaei Scarab. farinoſus. Elytra abdomine breviora, poſtice gibba. Pedes teſtacei, poſtici elongati.

81. M. argenteo ſquamoſa clypeo reflexo. *graminicola* ✓
Melolontha farinoſa. Herbſt Arch. tab. 25. fig. 3.
Habitat in Germania Dom. Prof. Helwig.
Duplo praecedente minor. Caput fuſcum clypeo rotundato, reflexo. Antennae teſtaceae clava fuſca. Thorax fuſcus ſquamis argenteis tectus. Corpus ſquamis argenteis tectum. Pedes nigricantes.

82. M. pubeſcens obſcure ferruginea antennis pedibusque teſtaceis. *chryſomelina.* ✓
Scarabaeus chryſomeloides Schrank. Ent. 16. 25.
Habitat in Auſtria Prof. Helwig.
Statura praecedentium. Caput fuſcum antennis trilamellatis, teſtaceis. Thorax pubeſcens, obſcurus. Elytra ſtriata, magis rufeſcentia. Pedes ferruginei.

83. M. nigro aenea nitida elytris brunneis: margine nigro. *cincta.*
Melolontha marginata. Oliv. Inſ. 1. 5. 70. 96. tab. 3. fig. 23.
Habitat in Inſula Guadeloupe Muſ. Dom. Olivier.
Parva. Caput & thorax obſcure aenea, nitida, immaculata. Elytra brunnea margine nigro. Pedes ſpinoſi, nigri.

84. M. clypeo porrecto ſubreflexo hirta nigra elytris teſtaceis: margine nigro. *proboſcidea.* ✓
Oliv. Inſ. 1. 5. 59. 81. tab. 8. fig. 96.

Habitat in India Muſ. Dr. Hunter, in Africae floribus. Prof. Vahl.

Clypeus valde porrectus, integer. Caput & thorax nigra, villo cinereo hirta. Elytra teſtacea margine exteriori nigro.

ſpinipes. 85. M. nigra immaculata pedibus poſticis elongatis: femoribus baſi uniſpinoſis.

Oliv. Inſ. 1. 5. 72. 100. tab. 6. fig. 63.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Clypeus apice elevatus, niger, obſcurus. Thorax & elytra nigra, minime nitida. Pedes poſtici elongati, incraſſati femoribus ad baſin interiorem ſpina valida, acuta.

dentipes. 86. M. nigra elytris teſtaceis, clypeo quadridentato, femoribus tibiisque poſticis ſpinoſis.

Oliv. Inſ. 1. 5. 73. 102. tab. 6. fig. 66.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Affinis praecedenti. Caput & thorax villoſa, atra. Elytra teſtacea. Femora poſtica compreſſa, uniſpinoſa. Tibiae ſpinis duabus aequalibus.

podagrica. 87. M. nigra clypeo tridentato, femoribus tibiisque poſticis dentatis.

Oliv. Inſ. 1. 5. 75. 104. tab. 5. fig. 51.

Habitat in Coromandel Muſ. Dom. Banks.

Caput & thorax atra, vix hirta, immaculata, clypeo apice denticulis tribus elevatis. Thorax poſtice rotundatus. Elytra laevia, atra macula una alterave griſea. Pedes nigri femoribus poſticis incraſſatis, compreſſis, apice interiori uniſpinoſis. Tibiae breves, incurvae ſpina brevi, valida baſeos & altera elongata apicis.

arthritica. 88. M. nigra elytris griſeis, clypeo tridentato, femoribus tibiisque poſticis incraſſatis ſubinermibus.

Oliv. Inſ. 1. 5. 75. 104. tab. 5. fig. 44.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Praecedentibus paullo minor. Caput & thorax atra, immaculata. Elytra griſea. Abdomen atrum, utrinque albomaculatum. Femora & tibiae poſtica, incraſſata, compreſſa, fere inermia.

89. M. griſea pedibus rufis: femoribus poſticis incraſſatis muticis. *gonagra.*
Oliv. Inſ. 1. 5. 64. 103. tab. 6. fig. 68.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Praecedentibus minor. Clypeus ſubbidentatus. Abdomen retuſum, atrum. Pedes omnes rufi femoribus poſticis incraſſatis, compreſſis, muticis. Tarſi nigri unguiculis arcuatis.

90. M. atra albo maculata pedibus poſticis elongatis craſſiſſimis. *craſſipes.*
Oliv. Inſ. 1. 5. 72. 99. tab. 2. fig. 15.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Caput nigrum clypeo ſubemarginato. Thorax rotundatus, ater margine punctisque aliquot minutiſſimis, albis. Elytra atra, albomaculata. Abdomen album. Pedes atri, poſtici elongati, incraſſati digito incurvo, intus dentato ungue arcuato.

91. M. atra albo irrorata femoribus poſticis elongatis craſſiſſimis apice ſpinoſis, tibiis unidentatis. *cancroides.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Lee.
Nimis affinis M. craſſipes. Clypeus late emarginatus. Thorax niger margine tantum paullo albo maculato. Elytra haud maculata, ſed punctis plurimis parvis irrorata. Abdomen album ultimo ſegmento prominente faſcia lata atra. Pedes nigri femoribus poſticis valde

incraſſatis apice biſpinoſis tibiisque baſi unidentatis.

marginella. 92. M. thorace nigro: margine albo, elytris teſtaceis.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lee.
Statura M. craſſipes. Caput nigrum, immaculatum. Thorax rotundatus, niger margine omni albo. Elytra brevia, teſtacea. Scutellum cinereum. Corpus ſubtus villoſo album. Pedes nigri, poſtici parum elongati.

pulverulenta. 93. M. corpore polline vireſcenti argenteo, elytris pedibusque teſtaceis.
Oliv. Inſ. 1. 5. 69. 49. tab. 7. fig. 87.
Herbſt Arch. tab. 25. fig. 7.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 1. fig. 7.
Habitat in Germania.
Duplo minor M. argentea. Clypeus ſubmarginatus. Thorax polline obſcuriore adſperſus. Elytra teſtacea, abdomine breviora. Subtus nitida, viridi argentea, farinoſa.

Morio. 94. M. hirta atra clypeo reflexo.
Habitat in Barbaria Muſ. Dom. Desfontaines.
Statura omnino M. horticolae at duplo minor. Corpus totum hirtum, atrum, immaculatum. Clypeus valde reflexus.

ſylvicola. 95. M. clypeo reflexo integro, corpore glabro nigro.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Minor M. ruricola. Clypeus rotundatus margine reflexo, integro. Caput & thorax glabra, nigra, immaculata. Antennae fuſcae. Elytra abdomine breviora, laevia, nigra.
Variat interdum elytris fuſcis.

ſubſpinoſa. 96. M. flaveſcens pedibus rufis, thorace ſubſpinoſo.
Melolontha elongata Herbſt Arch. tab. 26. fig. 3.
Oliv. Inſ. 1. 5. 70. 97. tab. 7. fig. 73.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis.

Antennae rufae lamellis nigris. Corpus totum flaveſcens, immaculatum. Thorax utrinque in medio exſerit dentem breviſſimum, obtuſiſſimum. Pedes rufi plantis nigris.

97. M. capite thoraceque atris, elytris villoſis pedibusque teſtaceis, abdomine brevi retuſo. *longipes.*

Oliv. Inſ. 1. 5. 76. 106. tab. 7. fig. 72.

Habitat — — Muſ. Dom. Banks.

Caput & thorax atra, nitida, vix pubeſcentia. Clypeus rotundatus, integer. Elytra pubeſcentia, teſtacea, immaculata. Abdomen breve, obtuſiſſimum. Pedes ideo inprimis poſteriores longiores apparent, teſtacei femoribus ſubincraſſatis, plantis nigris.

98. M. villoſa nigra clypeo tridentato, elytris abbreviatis teſtaceis. *abbreviata.*

Oliv. Inſ. 1. 5. 75. 105. tab. 5. fig. 54.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Praecedentibus minor. Capitis clypeus brevis, niger, apice tridentatus. Thorax canaliculatus, piloſus, niger. Elytra abdomine multo breviora, anguſtiora, laevia, teſtacea. Corpus atrum pilis aliquot albis.

99. M. nigra elytris griſeis, pedibus teſtaceis: femoribus poſticis acute dentatis. *minuta.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lee.

Minuta. Caput & thorax piloſa, nigra. Elytra glabra, griſea, immaculata. Pedes omnes teſtacei femoribus poſticis craſſioribus baſi dente valido, recurvo, acuto.

100. M. atra tomento cinereo villoſa. *mutabilis.* √

Oliv. Inſ. 1. 5. 61. 69. tab. 3. fig. 24.

Voet. Coleopt. tab. 9. fig. 75.

Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

Reliquis minor, tota atra, at tomento cinereo ſubtiliſſimo tecta, quo cinereo colore certo ſitu reſplendit.

variabilis. 101. M. nigricans elytris cinereo nitentibus, antennis pedibusque teſtaceis.

Scarabaeus atro fuſcus ſupra veluti cineraſcens, antennis pedibusque fuſcis, lamellis antennarum longis, elytris ſtriatis. Geoff. Inſ. 1. 74. 25.

Trox holoſericeus Laichart. 1. 31. 4.

Scarabaeus Sulzeri Fyes. Helvet. 35.

Melolontha Berolinenſis Goez. Beytr. 1. 93.

Scarabaeus pellucidus Harrer. tab. 21. fig. 24.

Oliv. Inſ. 1. 5. 52. 70. tab. 21. fig. 37.

Habitat in Germaniae, Americae ligno putreſcente.

Antennae pallide teſtaceae. Caput & thorax atra, immaculata. Elytra ſtriata, atra, cinereo colore ſplendentia. Pedes teſtacei.

Varietas americana tomento aureo tecta.

verſicolor. 102. M. obſcure aenea elytris tomento cinereo nitidulis.

Oliv. Inſ. 1. 5. 51. 68. tab. 9. fig. 105.

Habitat in Sierra Leon. Africae Muſ. Dom. Banks.

Parva. Caput, thorax, elytra nigra, immaculata, pilis erectis albis hirta. Scutellum uti & abdomen ſubtus albo villoſa. Thorax ſubcanaliculatus. Pedes nigri.

picea. 103. M. glabra ferruginea elytris ſtriatis.

Oliv. Inſ. 1. 5. 47. 61. tab. 5. fig. 43.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Statura gibba M. variabilis. Corpus totum ferrugineum capite thoraceque obſcurioribus

omnino glabris. Pedes poſtici compreſſi tibiis ſerratis.

104. M. clypeo ſubreflexo flaveſcens elytris ferrugineis fuſco ſubfaſciatis. *araneoides.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lee.

Statura omnino praecedentium. Caput & thorax flaveſcenti hirta, immaculata. Elytra ferrugineo hirta faſciis duabus fuſcis. Corpus flaveſcenti hirtum. Pedes nigri.

105. M. obſcure vireſcens elytris lineis duabus rufis. *lineata.*

Oliv. Inſ. 1. 5. 49. 66. tab. 6. fig. 68.

Habitat in Sierra Leon, Africae. Muſ. Dom. Banks.

Corpus parvum, gibbum. Caput & thorax obſcure viridia ore nigro. Elytra obſcure viridia lineis duabus rufis, ad baſin coeuntibus, quae tamen apicem haud attingunt. Subtus nigra pedibus piceis.

106. M. gibba teſtacea tomento cineraſcente nitidula. *gibba.*

Oliv. Inſ. 1. 5. 50. 67. tab. 6. fig. 67.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Reliquis magis gibba. Praecedente duplo major. Capitis clypeus reflexus. Corpus totum teſtaceum, tomento cinereo tenuiſſimo nitidulum. Tibiae poſticae extus unidendatae, intus ſerratae, apice truncatae, ſpinoſae.

107. M. clypeo integro reflexo glabra teſtacea, capite atro. *monticola.*

Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Minuta. Caput atrum clypeo integro, reflexo. Antennae teſtaceae. Corpus teſtaceum. Elytra abdomine multo breviora, nitidula.

108. M. atra elytris baſi punctoque medio pallidis. *humeralis.*

Oliv. Inſ. 1. 5. 53. 72. tab. 3. fig. 26.

Habitat in Europa Muſ. Dom. Tunſtall.

Parva. Caput atrum clypeo reflexo, truncato, integro. Thorax ater, immaculatus. Elytra ſubſtriata, bafi pallida puncto nigro. Punctum parvum, pallidum in medio elytrorum. Pedes nigri.

√ *Urſus.* 109. M. hirſutiſſima atra pedibus quatuor anticis teſtaceis.

Oliv. Inſ. 1. 5. 58. 79. tab. 8. fig. 88.

Wulf. Inſ. Cap. tab. 2. fig. 19.

Voet. Coleopt. tab. 9 fig. 74.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Clypeus porrectus, apice emarginatus. Corpus atrum pilis longioribus nigris hirſutiſſimum. Pedes quatuor antici teſtacei femoribus nigris.

Variat pedibus omnibus nigris at vix diſtincta videtur.

Lynx. 110. M. hirta nigra elytrorum margine aureo.

Oliv. Inſ. 1. 5. 58. 80. tab. 9. fig. 101.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Lee.

Statura & magnitudo omnino praecedentis, cujus forte mera varietas. Differt tantum elytrorum margine exteriore aureo, nitido.

√ *crinita.* 111. M. hirta ſupra viridis ſubtus nigra.

Scarabaeus longipes ſcutellatus muticus atro cyaneus, pedibus nigris: poſticis elongatis uniunguiculatis. Linn. ſyſt. nat. 2. 555. 66. Muſ. Lud. Ulr. 20.

Scarabaeus bombyliformis Pall. Icon. tab. A. fig. 17.

Oliv. Inſ. 1. 5. 57. tab. 2. fig. 16.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Lee.

Affinis praecedentibus tota pilis longioribus nigris tecta, at ſupra viridis nitens.

112. M. hirta capite thoraceque viridibus, elytris fuſcis. *hirta.*

Scarabaeus Alopecias Pall. Icon. tab. A. fig. 15.

Oliv. Inſ. 1. 5. 65. 66. tab. 7. fig. 17.

Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.

Statura praecedentium. Caput & thorax viridia, nitida pilis albis elongatis hirta antennisque piceis. Scutellum viride. Elytra fuſca pilis albis hirta margineque pilis erectis, nigris ciliato. Sutura parum virеſcit. Subtus pilis denſioribus albis tecta. Pedes virides, nitidi.

113. M. aurea fulvo hirta abdomine ferrugineo. *vulpes.*

Oliv. Inſ. 1. 5. 55. tab. 7. fig. 76.

Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.

Clypeus brevis, integer, aureus margine nigricante. Thorax aureus pilis fulvis, elongatis, denſiſſimis tectus. Elytra magis teſtacea itidem pilis fulvis denſis tecta. Abdomen rufum, baſi nigrum apice pube maris cornea, inflexa, bidentata. Pedes aurei.

Varietas ſexus praecedentis teſte Pallas.

114. M. fulva hirta elytris abbreviatis atris, abdomine ferrugineo. *Meles.*

Habitat in Barbaria Dom. Desfontaines.

Statura omnino praecedentium. Antennae nigrae baſi hirtae clava ſuborbiculata, obſcure

rufa. Clypeus reflexus, integer. Caput & thorax nigro aenea *tomento* denſo, fulvo tecta. Elytra laevia, nigra, immaculata abdomine breviora. Abdomen rufum. Pectus nigro aeneum. Pedes nigri.

bombylius. 115. M. nigra cinereo hirta elytris teſtaceis: lineis tribus apicis albidis.

Habitat in Africae plantis Dom. Vahl.

Statura & magnitudo praecedentium. Caput, thorax, corpus, pedes nigra pilis denſis cineraſcentibus. Elytra glabra, teſtacea lineis tribus albicantibus a medio ad apicem ductis, lateralibus ſubmarginalibus.

vittata. 116. M. piloſa cyanea elytris teſtaceis: lineis tribus albicantibus.

Scarabaeus acuminatus mutieus corpore viridi, elytris flavis corpore brevioribus apice acuminatis Lepech. Itin. 1. 508. *tab.* 16. fig. 9.

Oliv. Inſ. 1. 5. 55. 74. tab. 8. fig. 94.

Scarabaeus oxypterus Pall. Itin. 1. 462. 26. Pall. Icon. 1. 14. tab. a. fig. 14.

Degeer Inſ. 7. 644. 40. tab. 48. fig. 8.

Petiv. Gazoph. tab. 2. fig. 12.

Voet. Scarab. tab. 5. fig. 35.

Habitat in Indiis.

Reliquis magis oblonga. Clypeus truncatus. Caput, thorax, ſcutellum cyanea, valde piloſa. Elytra abdomine paullo breviora, teſtacea, lineis tribus e villis albicantibus exarata. Subtus hirta.

78. BUPRESTIS. *Palpi* quatuor filiformes: articulo ultimo obtuſo, truncato.
Maxilla obtuſa, unidentata.
Labium cylindricum, acuminatum.
Antennae filiformes, ſerratae.

1. B. elytris unidentatis aeneis: margine aureo. ***unidentata.***
Bupreſtis unidentata Oliv. Inſ. 32. tab. 8. fig. 86.
Habitat — — Muſ. Dom. Banks.
Magna. Antennae breves, nigrae. Caput viride fronte canaliculato, aureo. Thorax viridis lineis tribus latis cupreo aureis. Elytra glabra, viridia, nitida margine aureo, apice unidentata. Corpus viride, nitens plantis fuſcis.

2. B. elytris acuminatis viridi aeneis: macula flava, ***bicolor.***
pectore abdomineque flavis.
Bupreſtis bicolor Oliv. Inſ. 32. tab. fig.
Habitat in America Dom. Drury.
Magna. Antennae ſerratae, nigrae. Caput viridi aeneum oculis teſtaceis. Thorax viridi aeneus

---

Bupreſtis corpus oblongum, depreſſiuſculum, rarius rotundatum, immarginatum, glabrum, tardum, capite rotundato, inferto, obtuſo, oculis magnis, lateralibus, oblongis, vix prominulis, antennis thorace brevioribus, ſerratis, approximatis, ſub oculis inſertis, thorace transverſo, ſaepius ſinuato, elytris rigidis, concavis: margine ſaepius dentato, ſcutello parvo, rotundato, pedibus brevibus, validis, tarſis quinque articulatis, colore ſaepius nitido, vario.

utrinque macula flava baſeos, apice ad futuram acuminata. Pectus, gula, abdomen flava. Pedes aenei.

4 dentata. 3. B. elytris acuminatis obſcuris, corpore aeneo nitido, ano quadridentato.

Habitat — — Muſ. Dom. Banks.

Media. Caput aeneum, nitidum macula cordata, elevata, frontali. Vertex obſcurus. Thorax ſubobſcurus punctis numeroſiſſimis viridibus, nitidulis. Elytra obſcura, laevia, minime nitida, immaculata baſi puncto impreſſo, apice acuminata. Corpus aeneum, nitidum abdomine ſupra marginibusque ſegmentorum ſubtus cyaneis. Sternum gibbum. Anus quadridentatus, cyaneus.

gigantea. 4. B. elytris bidentatis rugoſis, thorace laevi, corpore inaurato.

Linn. Syſt. nat. 2. 659. 1. Muſ. Lud. Ulr. 85.
Bupreſtis gigantea. Oliv. Inſ. 32. tab. 1. fig. 1.
Degeer Inſ. 4. 134. 1.
Grew. Muſ. 165. tab. 13.
Sloan. Jamaic. 2. tab. 236. fig. 1. 2.
Petiv. Gazoph. 147. fig. 16. 17.
Sulz. Inſ. tab. 6. fig. 38.
Merian Surinam tab. 50. fig. inf.
Seb. Muſ. 3. tab. 48. fig. 12.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 1.
Habitat in America, Aſia.

vittata. 5. B. elytris bidentatis punctatis: lineis quatuor elevatis viridi aeneis vittaque lata aurea.

Bupreſtis vittata. Oliv. Inſ. 32. tab. 3. fig. 17.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 14.
Habitat in India. Muſ. Dom. Banks.
Statura B. ignitae. Caput viride fronte aureo antennisque nigris. Thorax punctatus macula

aurea utrinque ad baſin. Elytra tomento ferrugineo tecta.

Variat rarius thorace lineis duabus vittaque elytrorum brunnea.

6. B. elytris bidentatis punctato ſtriatis viridibus: dorſo aureo. *faſtuoſa.*

Buprestis faſtuoſa Oliv. Inſ. 32. tab. 8. fig. 81.

Habitat in America ſeptentrionali Muſ. Banks.

Caput ſcabrum, antice emarginatum, aureum. Thorax punctatus, viridi aeneus. Elytra viridia, ſplendida dorſo aureo punctis majoribus ſtriata. Subtus punctata, aenea ſterno antice poſticeque emarginato.

7. B. elytris bidentatis fuſcis: faſciis duabus flexuoſis lineolisque duabus remotis viridibus. *regalis.*

Habitat Cajennae Muſ. Dom. Geoffroy.

Media. Caput fuſcum oculis teſtaceis. Thorax fuſcus margine lineaque dorſali aureis. Elytra fuſca futura parum auro nitida, lineola baſeos, faſciis duabus valde flexuoſis lineolaque apicis viridibus.

8. B. elytris bidentatis viridi aureis, thorace fuſco nitido: ſtrigis duabus aureis, ſterno cupreo. *collaris.*

Buprestis collaris Oliv. Inſ. 32. tab. 2. fig. 9.

Habitat Cajennae Muſ. Dom. Olivier.

Caput viride, nitens antennis nigris. Thorax fuſcus, nitidus ſtrigis duabus aureis fere marginalibus. Elytra bidentata, ſtriata, viridia diſco aureo. Corpus viridi aeneum, nitidum ſterno toto cupreo, nitidiſſimo.

9. B. elytris bidentatis attenuatis ſtriatis viridi aenea: futura cuprea. *attenuata.*

Habitat in Rio Janeiro Muſ. Dom. Banks.

Statura & magnitudo B. faſtuoſae. Caput & thorax punctata, viridia, nitida. Elytra ſtriata

apice attenuata, bidentata futura cuprea. Corpus cupro nitet.

punctatiſſima. 10. B. elytris bidentatis cupreis: punctis numeroſis violaceis.
Bupreſtis punctatiſſima Oliv. Inſ. 32. tab. 7. fig. 76.
Habitat in Sierra Leon, Africae Muſ. Dom. Banks.
Corpus cupreum, nitidum maculis plurimis ſparſis, violaceis.

ruſipes. 11. B. elytris ſtriatis cyaneis: maculis quatuor flavis, corpore viridi aeneo nitido.
Bupreſtis ruſipes Oliv. Inſ. 32. tab. 7. fig. 73.
Petiver. Gazoph. tab. 2. fig. 2.
Habitat in Marylandia Muſ. Britann.
Caput viridi aeneum, nitidum antennis brunneis. Thorax vix punctatus, viridi aeneus lateribus ſubtus flavis. Elytra bidentata, ſtriata, cyanea maculis quatuor: baſeos longitudinali, elongata 2, 3. transverſis, 4. apicis. Abdomen baſi aeneum maculis flavis, apice brunneum. Pedes brunnei.

berolinenſis. 12. B. elytris bidentatis viridi nigroque variis, ano tridentato.
Bupreſtis berolinenſis Herbſt Arch. tab. 28. fig. 5.
Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 7.
Pall. Icon. tab. D. fig. 10.
Habitat in Germania.
Corpus ſubtus cupreum.

corruſca. 13. B. elytris bidentatis aenea nitidiſſima, elytris apice abdomineque aureis.
Bupreſtis corruſca Oliv. Inſ. 32. tab. 9. fig. 99.
Bupreſtis tereticollis Pall. Icon. tab. D. fig. 18.
Habitat in Jamaica Muſ. Dom. Banks.

Antennae cyaneae. Abdomen auro nitidum. Pedes viridi aenei.

14. B. elytris bidentatis ſtriatis aeneis coeruleo micantibus: margine aureo. *micans.*

Habitat in Italia Dom. de Schlanbuſch, Hafniae Muſ. Dom. Lund.

Statura & magnitudo B. decorae. Caput aureum antennis viridibus. Thorax punctatus, viridi aeneus, nitidus. Elytra ſubbidentata, ſtriata, viridi aenea, coeruleo micantia, nitida margine exteriori aureo. Corpus viridi aeneum, nitidiſſimum. Pedes virides.

15. B. elytris truncatis bidentatis viridibus: vitta coeruleſcente marginibusque aureis. *decora.*

Bupreſtis decora Oliv. Inſ. 32. tab. 8. fig. 82.

Habitat in America Muſ. Dom. Banks.

Caput ſcabrum. Thorax poſtice rotundatus, aureus. Elytra truncata, ſubbidentata, viridia vitta media coeruleſcente, margine exteriori & ſutura aureis. Subtus punctata, aurea ſterno antice poſticeque emarginato.

16. B. elytris bidentatis obſcure aenea thorace punctato cupreo nitido, elytris ſtriatis. *funeſta.*

Habitat in Guinea Dom. Iſert.

Magna. Antennae ſerratae, breves, nigrae. Caput punctatum, obſcurum. Thorax punctatus, obſcure aeneus, cupro nitidulus. Elytra ſtriata, obſcuriora. Abdomen nigrum lateribus cinereo villoſis.

17. B. elytris bidentatis ſtriatis nigro aeneis: vitta marginali nitidiore. *umbroſa.*

Habitat in Guinea Dom. Iſert.

Praecedente paullo minor. Caput punctatum, nigro aeneum, obſcurum. Thorax nigro aeneus, obſcurus punctis duobus dorſalibus

elevatis, glabris, diſtinctis, nigris. Elytra bidentata, ſtriata, nigro aenea, obſcura vitta marginali, impreſſa, nitidiora. Corpus obſcure aeneum.

lurida. 18. B. elytris bidentatis obſcura ano tridentato.
Bupreſtis lurida. Oliv. Inſ. 32. tab. 8. fig. 83.
Habitat in America boreali Dom. Banks.
Thorax elytraque rugoſa, aeneo cinereoque varia, ſubtus aenea.

obſcura. 19. B. elytris bidentatis obſcure aenea: punctis elevatis obſcurioribus.
Habitat in America boreali Muſ. Dom. Blackburn.
Parva. Corpus totum ſupra obſcure aeneum, punctis elevatis, obſcurioribus. Subtus tota cuprea, nitida.

punctata. 20. B. elytris ſubbidentatis ſtriatis aenea, capite abdomineque teſtaceo maculatis.
Bupreſtis punctata Oliv. Inſect. 32. tab. 10. fig. 114.
Habitat in Barbaria. Dom. Prof. Vahl.
Caput aeneum punctis ad os duobus aliisque duobus inter antennas orbitaque oculorum teſtaceis. Thorax punctatus, aeneus macula utrinque apicis teſtacea. Elytra ſtriata, aenea. Abdomen aeneum punctis utrinque quatuor teſtaceis: ultimo majore.

morbilloſa. 21. B. elytris bidentatis ſtriatis nigris: punctis impreſſis numeroſis albis.
Bupreſtis morbilloſa Oliv. Inſ. 32. tab. 8. fig. 84.
Habitat in America meridionali Muſ. D. Banks.
Media. Caput nigricans fronte impreſſo, villoſo, albido. Thorax punctatus, niger. Elytra ſtriata, nigra punctis impreſſis, numeroſis, villoſo albis. Corpus villoſo albidum. Pedes nigri.

22. B. elytris bidentatis viridibus: maculis impreſſis aureis numeroſis, pedibus cyaneis. *aurifer.*
Bupreſtis aurifer Oliv. Inſ. 32. tab. 9. fig. 95.
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Olivier.
Media. Caput viride, obſcurum. Thorax viridis, nitidus maculis impreſſis, magnis, aureis. Elytra bidentata, punctata, ſtriata, viridia maculis numeroſis, impreſſis, aureis, fere faſcias conſtituentibus. Corpus obſcure nitidum pedibus cyaneis.

23. B. elytris bidentatis viridi aeneis apice cyaneis: faſciis duabus ferrugineis. *faſciata.*
Bupreſtis faſciata. Oliv. Inſ. 32. tab. 4. fig. 92.
Habitat in America boreali Muſ. Dr. Hunter.
Antennae nigrae. Caput & thorax viridi aenea, nitida. Elytra ſtriata, viridi aenea, apice cyanea puncto medio faſciisque duabus pone medium ferrugineis, anteriore ſinuata, poſteriore margines haud attingente. Corpus aeneum.

24. Belytris bidentatis aenea nitidiſſima: vitta abbreviata abdomineque fulvo aeneis. *lucidula.*
Habitat Surinami Muſ. Dom. Boſc.
Parva. Antennae deſunt. Caput & thorax punctata, viridi aenea, nitidiſſima. Elytra punctata, viridi aenea vitta dorſali lata fulva, quae tamen apicem elytrorum haud attingit. Corpus viridiaeneum abdomine toto fulvo, aureo.

25. B. elytris bidentatis ſubſtriatis, corpore obſcure aeneo immaculato. *rauca.*
Habitat in Barbaria Prof. Vahl.
Corpus parvum, totum obſcure aeneum, nitidum, immaculatum.

26. B. elytris truncatis ſubbidendatis cupreis: lineis elevatis quatuor. *ſtriata.*

Bupreſtis ſtriata. Oliv. Inſ. 32. tab. 7. fig. 77.
Habitat in Penſylvania Muſ. Dom. Banks.
Antennae breves, nigrae. Caput & thorax ſcabra, obſcure cuprea. Elytra lineis quatuor elevatis, quarum exteriores apice coeunt, inferiores abbreviatae.

√ *rutilans.* 27. B. elytris tridentatis ſerratisque viridibus nigro maculatis: margine aureo.
Bupreſtis rutilans Oliv. Inſ. 32. tab. 5. fig. 45.
Bupreſtis faſtuoſa Jaqu. Miſcell. 2. tab. 23. fig. 2.
Schaeff. Icon. tab. 35. fig. 6.
Pall. Icon. tab. D. fig. 12.
Habitat in Auſtria Dr. Schulz.
Antennae fuſcae. Thorax ſcaber, viridi nitens margine aureo. Elytra ſtriata, viridia margine aureo punctis numeroſis nigris. Corpus ſubtus viride, nitidum.

√ *ignita.* 28. B. elytris tridentatis, thorace impreſſo, corpore inaurato.
Linn. Syſt. nat. 2. 669. 3.
Bupreſtis ignita. Oliv. Inſ. 32. tab. 4. fig. 33.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 14.
Petiv. Gazoph. tab. 20. fig. 8.
Kaempf Japonenſ. 1. tab. 10. fig. 7.
Habitat in India orientali.

Lineata. 29. B. elytris truncatis ſubtridentatis nigro aeneis: vittis duabus fulvis.
Bupreſtis lineata. Oliv. Inſ. 32. tab. 8. fig. 80.
Habitat in America Muſ. Dom. Banks.
Caput aeneum margine antico pallido faſciaque media rufa. Thorax punctatus, aeneus margine exteriori antice rufo. Elytra vittis duabus rufis, quarum exterior ad baſin flexuoſa, interior baſi latior apicem haud attingit. Ster-

num antice poſticeque emarginatum. Primum abdominis ſegmentum ſulcatum.

30. B. viridi nitens elytris tridentatis: maculis duabus aureis ocellarique flava. *ocellata.*
Bupreſtis ocellata Oliv. Inſ. 32. tab. 1. fig. 3.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 15.
Degeer Inſ. 7. 633. 30. tab. 47. fig. 12.
Habitat in India orientali.
Thorax aureus linea longitudinali coeruleſcente. Elytra lineis tribus elevatis viridibus maculis duabus aureis, altera ad baſin, altera ad apicem, in medio vero macula ſubocellaris, flava, quae in quibusdam fere faſciam conſtituit.

31. B. elytris tridentatis, corpore aeneo immaculato. *aenea.*
Bupreſtis tricuſpidata Oliv. Inſ. 32. tab. 8. fig. 87.
Habitat in Coromandel Muſ. Dom. Banks.
Corpus totum aeneum, obſcure nitidum. Elytra ſtriata.

32. B. elytris tridentatis cyaneis flavo maculatis. *maculata.*
Bupreſtis maculata. Oliv. Inſ. 32. tab. 6. fig. 61. tab. 10. fig. 61.
Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.
Caput cyaneum ore flavo. Frons flava punctis duobus nigris maculisque duabus cyaneis. Thorax punctatus, cyaneus margine flavo. Elytra ſtriata, cyanea maculis duabus magnis lunatis, flavis, quarum poſterior interdum in duas diviſa. Corpus aeneum abdomine utrinque linea punctorum flavorum.

33. B. elytris truncatis dentatis ſtriatis nigris: maculis quatuor flavis. *flavo maculata.*
Bupreſtis flavo maculata Degeer Inſ. 4. 137. 6.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 8.
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Caput aeneo nigrum fronte flava. Thorax niger margine flavo. Elytra ſtriata, apice truncata, dentata maculis quatuor flavis: poſtica didyma. Abdomen aeneo nigrum apice punctis duobus fulvis. Pedes nigri.

interrupta. 34. B. elytris ſubtridentatis nigris; lineis tribus baſeos unicaque apicis interrupta impreſſis albis.
Bupreſtis interrupta Oliv. Inſ. 32. tab. 4. fig. 28.
Habitat in Senegalia Muſ. Dom. Olivier.
Statura & magnitudo B. ſternicornis. Caput nigrum, cyaneo nitidum ſulco medio villoſo, albo. Thorax niger punctis numeroſis albis impreſſis. Elytra nigra lineolis tribus abbreviatis baſeos impreſſis albis poſticaque longiori interrupta. Corpus cinereo villoſum ſterno porrecto, aeneo, nitido. Pedes aenei.

ſternicornis. 35. B. elytris ſerrato tridentatis: punctis cinereis impreſſis, ſterno porrecto conico. Linn. ſyſt. nat. 2. 660. 5. Muſ. Lud. Ulr. 88.
Bupreſtis ſternicornis. Oliv. Inſ. 32. tab. 6. fig. 52.
Herbſt Arch. tab. 46. fig. 2.
Grew. Muſ. 167. tab. 13.
Habitat in India orientali.
Variat punctis elytrorum conſolidatis excepto puncto latiori baſeos.

chryſis. 36. B. elytris ſerrato tridentatis caſtaneis, ſterno conico porrecto.
Bupreſtis Chryſis. Oliv. Inſ. 32. tab. 2. fig. 8.
Bupreſtis ſternicornis Linn. ſyſt. nat. 2. 660. 5. β.
Muſ. Lud. Ulr. 88. β.
Degeer Inſ. 4. 136. 2. tab. 17. fig. 25.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 2.
Habitat in India orientali.
Differt a praecedente elytris caſtaneis, laevibus.

37. B. elytris ſerrato tridentatis caſtaneis: puncto baſeos ferrugineo impreſſo, thorace atro ferrugineo reticulato. *caſtanea.* ✓

Bupreſtis caſtanea. Oliv. Inſ. 32. tab. 2. fig. 3. 6.

Habitat in Senegalia Muſ. Dom. Olivier.

Statura & ſumma affinitas praecedentis. Caput nigrum antennis caſtaneis. Thorax niger punctis numeroſiſſimis impreſſis, ferrugineis reticulatus. Elytra vix ſtriata, caſtanea puncto magno baſeos ferrugineo, villoſo, impreſſo. Corpus nigrum abdomine utrinque maculis lateralibus, transverſis, ferrugineis. Sternum conicum, vix porrectum.

38. B. elytris truncato quadridentatis violaceis, corpore elongato cyaneo. *violacea.*

Habitat in Sierra Leon. Africae Dr. Pflug.

Corpus totum cyaneum elytris ſolis violaceis.

39. B. elytris ſerratis cyaneis: faſcia poſtica teſtacea. *equeſtris.*

Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Lee.

Media. Corpus aeneum, nitidum ſterno parum porrecto. Thorax cyaneo nitidus, immaculatus. Elytra ſerrata, punctato ſtriata, in medio punctorum duorum par & poſtice faſcia ſinuata, teſtacea. Pedes cyanei femoribus aeneis.

40. B. elytris ſerratis ſulcatis, corpore depreſſo obſcuro. *depreſſa.*

Habitat in Oriente Dom. Prof. Forſkahl.

Thorax punctatus, canaliculatus, obſcurus, utrinque angulatus. Elytra ſubtiliſſime ſerrata, ſulcis octo exarata. Corpus magis cupreum.

41. B. elytris ſerratis longitudinaliter rugoſis: maculis duabus impreſſis, thorace ſulcato. Linn. ſyſt. nat. 2. 660. 6. Fn. Sv. 754. Muſ. Lud. 89. *mariana.* ✓

Bupreſtis mariana. Oliv. Inſ. 32. tab. 1. fig. 4.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 49. fig. 1. tab. 128. fig. 3.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae nigrae. Caput canaliculatum, fuſcum orbita oculorum aurea. Thorax obſcure aeneus dorſo canaliculato, marginibus lunula impreſſa. Elytra rugoſa, viridia ſulco longitudinali a medio ad apicem impreſſa. Corpus aeneum, polline ferrugineo adſperſum.

ventricoſa. 43. B. elytris ſerratis viridibus punctatis, thorace aeneo: ſulco maculisque aureis impreſſis.
Bupreſtis ventricoſa. Oliv. Inſ. 32. tab. 6. fig. 63.
Habitat in Madagaſcar Muſ. Dom. Olivier.
Statura praecedentis. Antennae nigrae. Caput aeneum ſulco profundo impreſſo. Thorax aeneus ſulco dorſali maculisque lateralibus aureis. Elytra ſerrata, punctata punctis baſeos majoribus, aureis. Corpus aeneum abdominis baſi prominulo.

ſmaragdula 44. B. elytris ſerratis viridi aenea thorace utrinque macula impreſſa aurea.
Bupreſtis ſmaragdula. Oliv. Inſ. 32. tab. 1. fig. 8.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Olivier.
Caput viridi aeneum, retuſum, nitidum. Thorax viridi aeneus, nitidus: maculis duabus dorſalibus, impreſſis, aureis. Elytra ſubſtriata, nitida.

fulminans. 45. B. elytris ſerratis aenea nitidiſſima elytris apice aureis.
Habitat in Indiis Muſ. Dom. Zſchuck.
Corpus magnum, aeneum, nitidiſſimum. Elytra punctata apice rubro aurea.

cyanipes. 46. B. elytris ſerratis ſtriatis viridi aeneis, thorace plano coeruleo.

Bupreſtis cyanipes. Oliv. Inſ. 32. tab. 9. fig. 104.
Habitat in America meridionali Muſ. Dr. Hunter.
Caput cum antennis cyaneum. Thorax punctatus dorſo plano, coeruleus, immaculatus. Elytra ſtriata ſtriis crenatis, apice valde ſerrata. Corpus viridi aeneum pedibus cyaneis.

47. B. elytris ſerratis corpore obſcurioribus: maculis tribus impreſſis aureis. *modeſta.*
Bupreſtis modeſta. Oliv. Inſ. 32. tab. 7. fig. 72.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.
Caput impreſſum, viride oculis teſtaceis. Thorax punctatus, aeneus maculis tribus impreſſis. Elytra ſubſulcata, obſcuriora, baſi nitidora maculis tribus aureis impreſſis.

48. B. elytris ſerratis attenuatis ſulcatis viridi aeneis: ſulcis cupreis. *blanda.*
Bupreſtis blanda. Oliv. Inſ. 32. tab. 9. fig. 94.
Habitat in America meridionali Dr. Hunter.
Corpus viridiaeneum, nitidum. Thorax linea dorſali impreſſa viridi cupreoque rutilans. Elytra ſerrata, ſulcata, attenuata lineis elevatis.

49. B. elytris ſerratis aurea thorace aeneo. *aurata.*
Bupreſtis aurea. Oliv. Inſ. 32. fig. 33.
Habitat in America Muſ. D. Hunter.
Caput ſulcatum, aeneum oculis teſtaceis. Antennae aeneae dentibus nigris. Thorax laevis, obſcure aeneus. Elytra vix ſtriata, aurea, nitida. Corpus aureum.

50. B. elytris ſerratis viridi aenea thorace vittis duabus, elytris unica rufo cupreis. *fulgida.*
Bupreſtis fulgida. Oliv. Inſ. 32. tab. 9. fig.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Geoffroy.
Magna. Caput ſulcatum, viridi aeneum. Thorax vittis duabus dorſalibus rufo cupreis.

Elytra laevia, viridi aenea, nitida vitta lata, rufo cuprea. Corpus aeneum.

3 punctata. 51. B. elytris ſerratis ſtriatis cupreis: punctis tribus impreſſis aureis.

Bupreſtis 3 punctata. Oliv. Inſ. 32. tab. 2. fig. 10.

Habitat in America meridionali Dr. Hunter.

Corpus aureum. Caput & thorax cuprea, obſcure nitida, immaculata. Elytra ſtriata punctis tribus parvis, dorſalibus, impreſſis, aureis. Anus bidentatus.

elegans. 52. B. elytris ſerratis aenea nitida thorace lineis duabus elytrorumque unica aureis.

Bupreſtis elegans. Oliv. Inſ. 32. tab. 8. fig. 89.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Caput ſcabrum, viride. Thorax punctatus & fere varioloſus, aeneus lineis duabus dorſalibus, approximatis, aureis. Elytra lineis quatuor elevatis interſtitiisque valde punctatis viridia linea longitudinali aurea. Subtus aenea.

trifaſciata. 53. B. elytris ſerratis nigro aenea pubeſcens elytris faſciis tribus flavis: anteriore margine dilatata.

Habitat in America meridionali.

Statura omnino B. 9. maculatae at duplo major. Antennae nigrae. Caput aeneum. Thorax pubeſcens, aeneus margine ad baſin flaveſcente. Elytra faſciis tribus flavis, quarum prima in medio ad marginem valde dilatata puncto parvo nigro, ad ſuturam vero paullo abbreviata, ſecunda etiam abbreviata, tertia integra. Praeterea lineola abbreviata, fere obſoleta ad ſcutellum. Corpus villoſum, nigro aeneum.

9 maculata. 54. B. elytris ſerratis nigra fronte puncto unico thorace duobus elytris tribus flavis.

Bupreſtis 9 maculata. Linn. ſyſt. nat. 2. 662. 17.
Oliv. Inſ. 32. tab. 4. fig. 30.
Panz Naturf. 24. 33. 47. tab. 1. fig. 48.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 17.
Habitat in Europa auſtrali Muſ. Dom. Zſchuck.
Macula baſeos elytrorum baſi biloba.

55. B. elytris ſerratis porcatis, thorace angulato, corpore fuſco nitido. *porcata.*

Bupreſtis depreſſa. Linn. Mant. 2. 533.
Oliv. Inſ. 32. tab. 2. fig. 15.
Habitat in Oriente Prof. Forſkahl.
Thorax punctatus dorſo valde impreſſo lateribusque prominentia obtuſa angulatis. Elytra porcata vel lineis elevatis tribus, ſpatio interiecto punctis concatenatis in duplici ſerie ſtriatis. Corpus fuſcum, cupreo nitidum.

56. B. elytris ſerratis obſcure aenea abdominis dorſo aureo, ano bidentato. *dorſata.*

Habitat in America meridionali Muſ. Dr. Hunter.
Corpus totum obſcure aeneum ſolo abdominis dorſo aureo. Elytra glabra, laevia baſi punctis duobus parvis, impreſſis.

57. B. elytris ſerratis longitudinaliter ſuleatis: maculis duabus aureis impreſſis, thorace punctato. *chryſoſtigma.*

Linn. Syſt. nat. 2. 660. 7. Fn. Sv. 755.
Cucujus aureus elytrorum foſſulis quatuor impreſſis nitentibus. Geoff. Inſ. 125. 1.
Degeer Inſ. 4. 129. 3.
Oliv. Inſ. 32. tab. 6. fig. 54.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 6.
Schaeff. Elem. tab. 31. fig. 1. 2.
Sulz. Inſ. tab. 6. fig. 39.
Habitat in Europae nemoribus.

impreſſa. 58. B. elytris ſerratis laevibus aeneis: punctis tribus impreſſis.

Buprestis impreſſa. Oliv. Inſ. 32. tab. 5. fig. 42.

Habitat in India Muſ. Dom. Bernoulli Baſilienſis.

Corpus obſcure aeneum abdominis margine albo punctato. Thorax puncto utrinque impreſſo. Elytra toto margine ſerrato punctisque tribus diſtinctis, impreſſis. Linea unica ad ſuturam elevata.

frontalis. 59. B. elytris ſerratis nigris: maculis ſex viridibus, fronte impreſſa.

Buprestis frontalis. Oliv. Inſ. 32. tab. fig.

Habitat in Carolina auſtraliori Muſ. Dom. d'Orcy.

Statura & magnitudo omnino B. impreſſae. Caput aeneum, nitidum fronte valde impreſſa. Thorax utrinque angulatus, viridi aeneus, nitens maculis duabus magnis, dorſalibus, atris. Elytra nigra maculis duabus baſeos, duabus in medio, exteriori majori, duabus parvis, approximatis pone medium, viridibus. Pedes aenei femoribus anticis dente valido, compreſſo.

ornata. 60. B. elytris ſerratis obſcuris albo maculatis.

Buprestis ornata. Oliv. Inſ. 32. tab. 7. fig. 67.

Habitat in Penſylvania Muſ. Dom. Banks.

Antennae breves. Caput & thorax punctata, nigra. Elytra margine toto ſerrata, punctata, ſtriata, obſcura maculis plurimis albis ſparſis. Corpus nigrum.

ſerrata. 61. B. elytris ſerratis aenea fronte tuberculo transverſo elevato, abdomine ſerrato.

Habitat in Guinea Dom. Iſert.

Parva. Caput aeneum tuberculo frontali transverſo, elevato. Thorax laevis, glaber, aeneus, nitidulus. Elytra brevia, aenea, obſcure nitida

margine ſerrato. Abdomen aeneum, nitidulum margine itidem ſerrato. Pedes aenei.

62. B. elytris ſerratis cinereo villoſa elytris nigris: faſciis duabus ferrugineis. *taeniata.* ✓

Bupreſtis blanda. Oliv. Inſ. 32. tab. 5. fig. 41. 49.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 191. 474.
Pill. It. Poſ. Scl. 84. tab. 7. fig. 12.
Habitat in Hyperici floribus Europae auſtralioris.
Antennae nigrae. Caput & thorax villoſa, obſcure griſea. Faſciae elytrorum pone medium, quarum poſtica margines haud attingit. Ante faſcias punctum unum alterumve ferrugineum. Corpus cinereo villoſum.

63. B. elytris ſerratis vireſcentibus, corpore elongato cupreo. *elongata.*

Bupreſtis elongata. Oliv. Inſ. 32. tab. 9. fig. 102.
Habitat in Barbaria Muſ. Dom. Olivier.
Reliquis multo longior & anguſtior, tota cuprea elytris vireſcentibus cupro tamen nitentibus.

64. B. elytris ſerratis: faſciis tribus ſanguineis abbreviatis, corpore atro. *pulcra.*

Habitat in Marocco Dom. de Seheſtedt.
Media. Antennae ſerratae, nigrae. Caput atrum. Thorax canaliculatus, punctatus, ater, immaculatus. Elytra crenato ſtriata faſciis tribus ſanguineis pone medium, quae nec marginem, nec ſuturam attingunt. Ante faſcias punctum unum alterumve ſanguineum. Corpus atrum.

65. B. elytris ſerratis ſtriatis baſi gibbis viridi aenea thorace canaliculato. *gibboſa.* ✓

Bupreſtis gibboſa. Oliv. Inſ. 32 tab. 6. fig. 59.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Olivier.
Parva. Antennae nigrae. Thorax glaber, aeneus canali dorſali maculaque utrinque laterali im-

preſſis. Elytra crenato ſtriata ſtriis ſuturalibus laevioribus. Corpus nigrum.

nobilis. 66. B. elytris ſerratis viridi aenea capite thoraceque fuſco maculatis, elytris atris: faſciis tribus lineolaque apicis viridibus.

Bupreſtis nobilis. Oliv. Inſ. 32. tab. 5. fig. 43.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parva. Antennae nigrae, baſi aeneae. Caput aeneum, antice compreſſum, fuſcum. Thorax aeneus maculis duabus magnis, dorſalibus, fuſcis. Elytra laevia, atra faſciis tribus, anteriore baſeos, ſecunda interrupta, tertia retrorſum arcuata lineolaque apicis viridibus. Corpus aeneum.

cylindrica. 67. B. elytris ſerratis ſtriatis, thorace villoſo, corpore cylindrico nigro.

Habitat in Oriente Prof. Forſkahl.

Oculi teſtacei. Thorax fuſcus, cupro parum nitens. Corpus magis cylindricum quam in reliquis, nigrum.

volvulus. 68. B. elytris ſerratis flavo maculatis, thorace inaequali villoſo, corpore cylindrico.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis.

Statura & magnitudo praecedentis. Caput nigrum, cinero villoſum. Thorax inaequalis dorſo nempe canaliculato lateribusque valde impreſſis niger, cinereo villoſus. Elytra villoſa maculis mox pluribus, mox rarioribus flavis. Corpus cinereo villoſum pedibus nigris.

ſcabra. 69. B. elytris integris, fronte ſulcata, corpore ſcabro aureo.

Bupreſtis ſcabra. Oliv. Inſ. 32. tab. 3. fig. 25.

Habitat in Indiis Dr. Mallet.

Corpus totum cupreo aureum, ſcabrum, imma-

culatum. Caput ſulco profundo exaratum. Oculi teſtacei.

70. B. elytris integris aurea nitidiſſima thoracis dorſo elytris pedibusque viridibus. *Trochilus.*
Habitat in Auſtria Muſ. Dr. Schulz.
Caput aureum antennis viridi fuſcis. Thorax aureus dorſo coeruleo: linea media viridi. Elytra laevia viridia. Corpus aureum pedibus viridibus.

71. B. elytris integris elevato ſtriatis fuſcis; punctis quinque flavis. *chryſoſtigma.*
Habitat in Auſtria Dom. Saldoner.
Thorax punctatus, nigricans, cupreo nitens. Elytra ſtriis tribus abbreviatis, elevatis nigra punctis quinque flavis: primo ſolitario, reliquis vero elytris complicatis in circulum diſpoſitis. Corpus nigro aeneum.

72. B. elytris integris: maculis quatuor albis, corpore coeruleo. Linn. Syſt. nat. 2. 659. 2. Fn. Sv. 753. *8 guttata.*
Bupreſtis 8 guttata. Oliv. Inſ. 32. tab. 4. fig. 36.
Geoff. Inſ. 1. 126. 2.
Degeer Inſ. 4. 132. 5. tab. 4. fig. 20.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 7.
Schaeff. Icon. tab. 204. fig. 4.
Habitat in Europae nemoribus.

73. B. elytris integris ſtriatis: punctis faſciculato piloſis, corpore hirſuto inaurato. Linn. Syſt. nat. 2. 661. 12. Muſ. Lud. Ulr. 90. *faſcicularis*
Oliv. Inſ. 32. tab. 4. fig. 38.
Seb. Muſ. 2. tab. 20. fig. 5.
Sulz. Inſ. tab. 6. fig. 4.
Degeer Inſ. 7. tab. 47. fig. 6.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 9.
Wulf. Inſ. capenſ. tab. 1. fig. 12.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Variat corpore nigro faſciculisque fulvis flavisque.

variolaris. 74. B. elytris integris obſcuris: punctis impreſſis numeroſis, thorace carinato.
Bupreſtis variolaris. Oliv. Inſ. 82. tab. 8. fig. 85. Pall. Icon. tab. D. fig. 2.
Habitat in Onopordine & Echinope Ruſſiae.
Caput & thorax ſcabra obſcure nigra linea dorſali thoracis elevata. Elytra ſcabra, nigra punctis plurimis impreſſis, cinereo villoſis. Corpus hirtum, cupro paullo nitens.

Onopordi. 75. B. elytris integris obſcure aeneis: ſulcis albo villoſis, thorace ſcabro.
Habitat in Barbariae Onopordine Prof. Vahl.
Corpus aeneum, albo villoſum. Thorax ſcaber. Elytra aenea ſulcis punctisque pluribus magnis, impreſſis, albo villoſis. Pedes cuprei.

hirta. 76. B. elytris integerrimis, pedibus ferrugineis, corpore hirto. Linn. Syſt. nat. 2. 661. 13. Muſ. Lud. Ulr. 91.
Bupreſtis hirta. Oliv. Inſ. 32. tab. 3. fig. 18. 19.
Habitat in Africa, Barbaria.

auſtriaca. 77. B. elytris integris ſulcatis aeneis, capite thoraceque viridibus. Linn. Syſt. nat. 2. 661. 9,
Oliv. Inſ. 32. tab. 10. fig. 113.
Habitat in Auſtria Dom. Scopoli.

ſibirica. 78. B. elytris integris atris: vittis duabus impreſſis cinereo tomentoſis.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 11.
Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.
Corpus atrum, ſubtus cinereo villoſum. Caput, thorax ſcabra. Elytra glabra, atra vittis duabus impreſſis cinereo tomento repletis, inte-

riore obliqua a margine exteriore baſeos ad ſuturam apicis ducta, exteriore marginali.

79. B. elytris integris viridibus: margine omni aureo lineisque tribus elevatis. *ſplendens.*
Habitat in China.
Corpns viride, nitens elytrorum margine & ſutura aureis.

80. B. elytris integris obſcure fuſcis, ſubtus aenea abdomine punctis lateralibus fulvis. *fuſca.*
Bupreſtis fuſca. Oliv. Inſ. 32. tab. 8. fig. 88.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Caput rugoſum, fuſcum oculis flaveſcentibus, fuſco maculatis. Thorax obſcure fuſcus lateribus impreſſis, ſcabris. Elytra punctato ſtriata, fuſca. Corpus aeneum utrinque linea punctorum fulvorum.

81. B. elytris emarginatis ſtriatis obſcure aeneis. *ruſtica.*
Linn. Syſt. nat. 2. 660. 8. Fn. Sv. 756.
Cucujus Geoff. Inſ. 1. 126. 3.
Degeer Inſ. 4. 130. 4. tab. 4. fig. 10.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 1.
Oliv. Inſ. 32. tab. 3. fig. 22.
Habitat in Europae nemoribus.
In altero ſexu anus ſive ultimum abdominis ſegmentum prominet maculis duabus flavis.

82. B. elytris integris obſcura abdomine ſubtus canaliculato: ano quadridentato. *canaliculata.*
Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. Dom. Banks.
Caput fuſcum antennis nigris. Thorax punctatus, fuſcus lateribus obſcure aeneo nitentibus lunulaque impreſſis. Elytra obſcura, punctata lineis elevatis: exterioribus abbreviatis. Abdomen ſupra cyaneum, in medio canaliculatum anoque quadridentato. Pectus & femora aenea.

✓ ***acuminata.*** 83. B. elytris integris attenuato acuminatis obſcuris, corpore cupreo.

Bupreſtis acuminata. Oliv. Inſ. 32. tab. 5. fig. 46.

Degeer Inſ. 4. 128. tab. 4. fig. 18.

Petiv. Gazoph. tab. 2. fig. 2.

Pall. Icon. tab. D. fig. 10.

Habitat in Ruſſia meridionali Dom. Boeber.

Diſtincta elytris poſtice elongatis, attenuatis. Thorax cupreus, nigro macularus.

excavata. 84. B. elytris integris nigra obſcura thorace macula baſeos utrinque impreſſa.

Bupreſtis excavata. Oliv. Inſ. 32. tab. fig.

Bupreſtis impreſſa Mant. Inſ. 1. 182. 61.

Habitat Tranquebariae Dr. Pflug.

Thorax antice prominens, poſtice utrinque macula magna impreſſa. Elytra punctata ſtriisque quatuor elevatis, poſtice coeuntibus.

moeſta. 85. B. elytris integris truncatis ſupra obſcura, ſubtus cuprea thorace rugoſo.

Habitat in Saxonia Doſſ. Hybner.

Statura & magnitudo B. lugubris at alia & diſtincta. Corpus ſupra obſcure nigrum, minime nitidum, ſubtus cupreum. Thorax rugoſus. Elytra truncata punctisque aliquot majoribus, oblongis.

✓ ***lugubris.*** 86. B. elytris integris ſtriatis obſcuris nigro ſcabris, corpore ſubtus cupreo.

Bupreſtis plebeja Mant. Inſect. 1. 182. 60. vix differt.

Bupreſtis lugubris. Oliv. Inſ. 32. tab. 10. fig. 106.

Bupreſtis oxyptera. Pall. Icon. tab. D. fig. 11.

Habitat in Europa auſtraliori Muſ. Dom. Schulz.

Caput obſcurum, griſeum antennis nigris. Thorax laevis, griſeus margine auro pauco nitidulo. Elytra griſea punctis oblongis elevatis ſcabra. Corpus cupreum.

Faemina aculeo brevi ſerrato ani.

87. B. elytris integris atra antennis albis, thorace varioloſo. *carioſa.* ✓

Bupreſtis carioſa. Oliv. Inſ. 32. tab. 7. fig. 68.

Bupreſtis brutia Petagn. Spec. Inſ. Calabr. inf. 22. 108. tab. 1. fig. 20.

Habitat in Ruſſia auſtraliori. Dom. Boeber.

Duplo major B. Tenebrionis. Corpus nigrum, atomis albis adſperſum. Elytra ſubſtriata. Thorax maculis plurimis, elevatis, glabris.

88. B. viridi aenea elytris integris apice obſcuris: ſtrigis undatis albis. *undata.*

Habitat in Germania Muſ. Dr. Schulz.

Caput & thorax immaculata. Elytra baſi viridi aenea ſtrigis aliquot fere obſoletis, albis, apice nigricantia ſtrigis albis diſtinctis, valde undatis.

89. B. elytris integris ſubſtriatis obſcura abdomine ſubtus cyaneo auro punctato. *tenebricoſa.* ✓

Bupreſtis tenebricoſa. Oliv. Inſ. 32. tab. 5. fig. 48.

Bupreſtis Tenebrionis. Roſſ. Fn. Etr. 1. 184. 459.

Habitat in Gallia meridionali Muſ. Dom. Olivier.

Statura omnino B. Tenebrionis. Antennae nigrae. Thorax obſcurus punctis aliquot elevatis, atris. Elytra ſtriata, obſcura punctis atris irrorata. Abdomen ſubtus cyaneum punctis parvis, aureis, numeroſiſſimis.

90. B. elytris integris truncatis atra thorace dilatato varioloſo. Linn. Syſt. nat. 2. 661. 11. *Tenebrionis* ✓

Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 16.

Oliv. Inſ. 32. tab. 6. fig. 16.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 185. 459.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 15.
Cyrilli Ent. neapol. 1. tab. 1. fig. 13.
Habitat in Europa, Africa.
Thorax punctis elevatis, planis, nitidis, diſtinctis angulo rotundato utrinque prominet.

Rubi. 91. B. elytris integris: faſciis cinereis undatis, corpore cylindrico nigro. Linn. Syſt. nat. 2. 602. 14.
Bupreſtis Rubi. Oliv. Inſ. 32. tab. 4. fig. 29.
Habitat in Europae Rubo.

aurulenta. 92. B. elytris integris: margine aureo, ſupra obſcure viridis, ſubtus cuprea.
Bupreſtis aurulenta. Oliv. Inſ. 32. tab. 5. fig. 51.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Antennae nigrae. Caput & thorax laevia, viridia, obſcura. Elytra obſcuriora margine exteriori laete aureo. Corpus cupreum.

terſata. 93. B. elytris integris viridis thorace punctato, pedibus apice cyaneis.
Habitat in Marocco Dom. de Seheſtedt.
Caput & thorax punctata, viridia. Antennae nigricantes. Elytra punctata concolora ſulco marginali, aurulento, villoſo, impreſſo. Corpus nitidulum. Pedes cuprei, apice cyanei, nitidi. Affinis videtur B. aurulentae.

cyanicornis 94. B. elytris integris obſcure viridibus, thorace lineis duabus obſcurioribus, antennis coerulis.
Bupreſtis cyanicornis. Oliv. Inſ. 32. tab. 2. fig. 11. tab. 3. fig. 20.
Bupreſtis Stephanelli Petag. ſpec. Inſ. Cal. 23. 110.
Bupreſtis femorata Villars Ent. 1. 338. 34. tab. 1. fig. 40.

Habitat in Gallia meridionali Muſ. Dom. Olivier.
Affinis praecedenti videtur. Antennae coeruleae.
Thorax ſcaber, rufo nitidulus lineis duabus latis, obſcurioribus. Elytra viridia, immaculata.
Corpus ſubtus aeneum, nitidum femoribus poſticis incraſſatis.
Alter ſexus thorace aureo lineis duabus fuſcis femoribusque ſimplicibus.

95. B. elytris integris ſtriatis: macula rubra, corpore fuſco viridi. Linn. Syſt. nat. 2. 662. 16. Muſ. Lud. Ulr. 92. *bimaculata.* ✓
Sulz. Hiſt. Inſ. 57. tab. 6. fig. 15.
Habitat in India.
Macula magna rubra in medio elytrorum.

96. B. elytris integris viridis thorace poſtice elytrisque maculis duabus aureis. *4 maculata.*
Bupreſtis 4 maculata. Oliv. Inſ. 32. tab. 10. fig. 110.
Habitat in India Dr. Fottergill.
Thorax viridis, poſtice late aureus. Elytra viridia maculis duabus magnis aureis.

97. B. elytris integris marginatis, corpore cupreo, abdomine punctis decem nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 662. 18. Muſ. Lud. Ulr. 93. *ſtriſtis.*
Habitat in Indiis.
Abdomen in ſingulo ſegmento utrinque puncto nigro.

98. B. elytris integris, thoracis lateribus ſcabris, ſcutello tuberculari, corpore cupreo. Linn. Syſt. nat. 2. 662. 20. Muſ. Lud. Ulr. 94. *cuprea.*
Habitat in America.
Thoracis latera depreſſa, ſcabra. Scutellum puncto elevato prominet.

99. B. elytris integris coeruleſcentibus, corpore obſcure aeneo nigro. *tarda.* ✓
clypeata Pkl

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Praecedente paullo minor. Corpus totum nigro aeneum, obſcure nitidum elytris ſolis obſcure coeruleſcentibus.

metallica. 100. B. elytris integris ſubſtriatis, corpore aeneo immaculato.
Habitat in Gallia meridionali.
Statura & magnitudo B. aeneae at elytra integra, ſubſtriata: ſtriis laevibus. Corpus aeneum, obſcure nitidum.

nobilitata. 101. B. elytris integris: ſtrigis duabus undatis inauratis, corpore fuſco. Linn. Syſt. nat. 2. 662. 21.
Bupreſtis nobilis Mant. Inſ. 1. 183. 72.
Habitat in Indiis.

appendiculata. 102. B. elytris integerrimis ſubacuminatis, corpore laevi atro immaculato. *Mono Pkl.*
Habitat in Germania D. Schneider.
Magnitudo & ſtatura praecedentis at tota atra, immaculata.

bicolor. 103. B. elytris integris ſubſtriatis ſupra aenea ſubtus cuprea.
Bupreſtis barbara. Oliv. Inſ. 32. tab. fig.
Habitat in Barbaria Dom. Vahl.
Caput & thorax laevia, obſcure aenea. Elytra ſubſtriata, concolora. Subtus cuprea.

umbellatarum. 104. B. elytris integris laevibus, corpore obſcure cupreo immaculato.
Bupreſtis umbellatarum. Oliv. Inſ. 32. tab. 3. fig. 23.
Habitat in Barbariae floribus umbellatis D. Vahl.
Corpus totum obſcure cupreum, minime nitidum absque ullo charactere.

morio. 105. B. elytris integris laevibus, corpore nigro immaculato.

Habitat Hafniae Dom. Lund.
Statura omnino B. 4. punctatae at thorax laevis. Corpus totum ſupra nigrum, immaculatum, minime nitidum, ſubtus aeneum.

106. B. elytris integris punctatis, thorace punctis quatuor impreſſis, corpore obſcuro. Linn. Syſt. 2. 662. Fn. Sv. 759. *4 punctata.* ✓
Degeer Inſ. 4. 134. 8.
Oliv. Inſ. 32. tab. 10. fig. 117.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 17.
Habitat in Europae floribus frequens in Caltha paluſtri.

107. B. coleoptris integerrimis aureis: punctis duobus cruceque poſtica nigris. *cruciata.*
Bupreſtis cruciata. Oliv. Inſ. 32. tab. 7. fig. 74.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Caput canaliculatum, aureum antennis nigris. Thorax aureus, nitens. Corpus aureum.

108. B. elytris integris ſubſtriatis obſcure aenea thorace ſtriis impreſſis albidis. *lineata.*
Habitat in Barbaria Muſ. Desfontaines.
Parva. Caput aeneum, obſcurum. Thorax obſcure aeneus lineis tribus longitudinalibus, impreſſis, villoſo albis. Elytra ſubſtriata. Corpus aeneum.

109. B. elytris integris obſcuris, thorace aureo: ſtriis duabus nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 1067. 10. *manca.* ✓
Cucujus aeneus, elytris fuſcis, thorace rubro faſciis fuſcis Geoff. Inſ. 1. 127. 4.
Bupreſtis manca. Oliv. Inſ. 32. tab. 2. fig. 12.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 18.
Habitat in Europae nemoribus.

110. B. elytris integris cyaneis, capite thoraceque aeneis nitidis. *pygmaea.* ✓

Bupreſtis pygmaea. Oliv. Inſ. 32. tab. 4. fig. 34.
Habitat in Barbariae umbellatis Dom. Vahl.
Caput & thorax laevia, aenea, nitidiſſima. Elytra cyanea, immaculata. Corpus obſcurum.

minuta. 111. B. elytris integris transverſe rugoſis, thorace ſubtrilobo laevi, corpore ovato nigro. Linn. Syſt. nat. 2. 663. 24. Fn. Sv. 760.
Cucujus fuſco cupreus triangularis: faſciis undulatis villoſo albidis. Geoff. Inſ. 1. 128. 6.
Oliv. Inſ. 32. tab. 2. fig. 14.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 19.
Habitat in Europae Corylo.

meditabunda. 112. B. elytris integris fuſco nitidis, capite thoraceque cupreis, corpore aeneo.
Bupreſtis meditabunda. Oliv. Inſ. 32. tab. 10. fig. 107.
Habitat in America boreali Muſ. Dr. Hunter.
Paullo major B. viridis. Caput & thorax viridia lateribus depreſſis. Elytra fere linearia, integra, fuſca puncto majori baſeos aliquotque obſoletis dorſalibus impreſſis. Corpus aeneum.

atomaria. 113. B. elytris integris linearibus: linea media elevata, corpore aeneo: atomis numeroſis cineraſcentibus.
Habitat Surinami Muſ. Dom. Boſc.
Statura B. viridis at triplo major. Antennae nigrae. Caput aeneum atomis cineraſcentibus fronte valde impreſſa. Thorax viridi aeneus atomis cinereis irroratus. Elytra linearia, viridi aenea atomis numeroſis cineraſcentibus. Linea dorſalis in medio elytrorum elevata, baſi flexuoſa.

114. B. elytris integris linearibus punctatis, corpore viridi elongato. Linn. Syſt. nat. 2. 663. 25. *viridis.*
Fn. Sv. 162.
Cucujus viridi cupreus oblongus. Geoff. Inſ. 1. 127. 5.
Degeer Inſ. 4. 133. 6. tab. 5. fig. 1.
Oliv. Inſ. 32. tab. 11. fig. 124.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 21.
Habitat in Europae Betula alba.
Variat corpore obſcuriore & cupreo.

115. B. elytris integris linearibus viridibus: puncto albo, abdomine cyaneo: punctis utrinque tribus albis. *2 guttata.*
Oliv. Inſ. 32. tab. 7. fig. 75.
Roſſ. Fn. Etr. 191. 473.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 22.
Habitat in Anglia Dom. Yeats.
Variat corpore coeruleo & viridi.

116. B. elytris integris linearibus viridibus, capite thoraceque obſcure aureis. *linearis.*
Habitat in Dania Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Statura & affinitas B. viridis. Antennae aeneae. Caput & thorax obſcure aurea, margine poſtico ſinuata. Elytra punctata, viridia. Corpus aeneum.

117. B. elytris integris linearibus, corpore elongato atro. Linn. Syſt. nat. 2. 663. 26. *atra.*
Habitat in Germania.
Simillima B. viridi, ut vix diſtinguatur niſi colore.

118. B. elytris integris linearibus, corpore elongato aureo nitido. *elata.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura oblonga B. atrae, at minor & tota aenea, nitida.

pavida. 119. B. elytris integris linearibus coeruleo fuſca, ſubtus aenea.
Habitat — — Dom. de Seheſtedt.
B. atra duplo minor. Thorax canaliculatus. Corpus ſupra fuſcum, cyaneo nitidum, ſubtus aeneum, immaculatum.

emarginata 120. B. elytris integris linearibus atra, capite ſulcato.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
B. atra quadruplo minor, linearis, tota atra, immaculata. Caput ſulcatum.

ruficollis. 121. B. elytris integris linearibus nigra, thorace cupreo.
Bupreſtis ruficollis. Oliv. Inſ. 32. tab. 9. fig. 101.
Habitat in America Muſ. Dr. Hunter.
Corpus totum obſcure nigrum, mimime nitidum thorace ſolo obſcure cupreo. Pedes atri.

feſtiva. 122. B. elytris integris: maculis ſex coeruleis, corpore elongato viridiſſimo. Linn. Syſt. nat. 2. 663. 27.
Bupreſtis feſtiva. Oliv. Inſ. 32. tab. 9. fig. 100.
Habitat in Africa.
Thorax punctis duobus, elytris ſex coeruleis.

nitidula. 123. B. elytris integris, thorace marginato utrinque depreſſo, corpore viridi nitido. Linn. Syſt. nat. 2. 662. Fn. Sv. 757.
Oliv. Inſ. 32. tab. 11. fig. 122.
Schaeff. Icon. tab. 50. fig. 7.
Herbſt Arch. tab. 28. fig. 20.
Habitat in Europae plantis.

laeta. 124. B. elytris integris viridibus, capite thoraceque aureis.
Bupreſtis laeta. Oliv. Inſ. 32. tab. 5. fig. 50.
Habitat Halae Dom. Schaller.

Caput & thorax rubro aurea, nitida. Elytra viridia ſutura aurea. Pedes ruſeſcentes.

125. B. elytris integris viridis nitens coleoptris aureis baſi viridibus. *Salicis.*
Oliv. Inſ. 32. tab. 2. fig. 13.
Herbſt Arch. tab. 46. fig. 5.
Schrank Inſ. 195. 365.
Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 12.
Habitat in Europae Salice Muſ. Dr. Schulz.
Caput viride antennis fuſcis. Thorax depreſſus, marginatus, viridis maculis duabus cyaneis, impreſſis. Elytra ruſa a baſi imprimis ad ſuturam viridibus. Subtus viridis, immaculata.

126. B. elytris integerrimis ſupra viridis ſubtus nigra, abdomine ſupra aureo. *Sophorae.*
Habitat in Guineae Sophora occidentali Dr. Iſert.
Parva. Caput, thorax, elytra viridia, nitida. Abdomen ſupra aureum. Corpus ſubtus nigrum, obſcurum, immaculatum.

127. B. elytris integris aenea villoſa elytorum diſco teſtaceo. *diſcoidea.*
Oliv. Inſ. 32. tab. 7. fig. 65. tab. 10. fig. 65.
Habitat in Barbariae plantis umbellatis D. Vahl.
Thorax canaliculatus, aeneus, cinereo villoſus. Elytra teſtacea limbo omni aeneo. Corpus villoſum, aeneum.
Variat diſco elytrorum teſtaceo, faſcia aut ſtriis aeneis.

128. B. elytris integris rugoſis, corpore cyaneo. *cyanea.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Schaller.
Corpus totum cyaneum, nitidum oculis teſtaceis.

79. ELATER. *Palpi* ſecuriformes.

Maxilla unidentata, obtuſa.

Labium bifidum.

Antennae filiformes.

flabellicornis. 1. E. fuſcus antennarum faſciculo flabelliformi. Linn. Syſt. nat. 2. 651. 1.
Oliv. Inſ. 31. tab. 3. fig. 28.
Drury Inſ. 3. tab. 47. fig. 1.
Voet. Coleopt. 1. tab. 45. fig. 34.
Habitat in India.
Corpus maximum, totum fuſcum. Faſciculus antennarum e lamelis octo magnis, nigris.

faſcicularis 2. E. thorace murino, elytris pallidis fuſco undatis, antennarum faſciculo flabelliformi.
Elater faſcicularis. Oliv. Inſ. 31. tab. 5. fig. 56.
Habitat in America Muſ. Dr. Hunter.
Antennae nigrae. Caput & thorax laevia, murina, nitida. Elytra ſtriata, palleſcentia baſi ſtriga unica, apice plurimis, undatis, fuſcis. Corpus murinum. Pedes picei.

ſpecioſus. 3. E. albus nigro maculatus. Linn. Syſt. nat. 2. 652. 2.
Oliv. Inſ. 31. tab. 7. fig. 70.

Elateris corpus elongatum, ſubcylindricum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotundato, inferto, oculis globoſis, lateralibus, haud prominulis, antennis longitudine thoracis, ſerratis, diſtantibus, ſub oculis infertis, thorace plano, angulo poſtico utrinque prominulo, acuto, pectorisque dente e fovea abdominis reſiliente, ſcutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, tarſis quinquearticulatis, colore vario, ſaepius obſcuro.

Habitat in India.
Antennae breves, nigrae.

4. E. cinereo tomentoſus elytris ſubſtriatis, plantis fuſcis. *luridus.*
Elater luridus. Oliv. Inſ. 31. tab. 5. fig. 57.
Habitat in Coromandel Muſ. Dom. Banks.
Corpus magnum, obſcurum, cinereum plantis ſolis fuſcis. Thorax punctatus. Elytra ſubſtriata.

5. E. niger thorace punctis duobus impreſſis albis, elytris ſtriatis. *foveatus.*
Habitat in Guinea Dom. Iſert.
Magnus, totus niger. Thorax laevis at punctis duobus magnis, dorſalibus, albidis impreſſus. Elytra ſtriata, immaculata. Corpus nigrum pedibus fuſcis.

6. E. thorace ocellis duobus atris, corpore nigro albo maculato. Linn. Syſt. nat. 2. 651. 3. *oculatus.*
Elater oculatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 3. fig. 34.
Petiv. Gazoph. tab. 10. fig. 4.
Act. Angl. 246. 396. 13. & 271. 841. 32.
Voet. Coleopt. 1. tab. 45. fig. 33.
Degeer Inſ. 4. 159. 1. tab. 17. fig. 28.
Habitat in America ſeptentrionali.

7. E. thorace ocellis duobus atris, corpore nigro immaculato. *luſcus.*
Elater luſcus. Oliv. Inſ. 31. tab. 6. fig. 64.
Habitat in America Dom. Drury.
Affinis E. oculato, at duplo fere minor. Ocelli thoracis absque iride & corpus immaculatum.

8. E. ater thorace maculis duabus ocellaribus, elytris ſtrigis duabus arcuatis punctoque poſtico ferrugineis. *coecus.*
Habitat in Africa Dom. Lee.
Caput atrum, laeve, nitidum, immaculatum. Thorax ater utrinque ocello coeco ſive annulo

magno, oblongo, ferrugineo. Elytra laevia, atra ſtrigis duabus, anteriore antrorſum, poſteriore retrorſum arcuata, poſtice punctum oblongum, obſcurius.

lineatus. 9. E. ater thorace elytrisque rufo lineatis.
Elater lineatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 6. fig. 63.
Habitat in Braſilia Muſ. Regis Galliae.
Magnus. Corpus atrum capite thoracis elytrorumque lineis rufis.

√ *noctilucus.* 10. E. thoracis lateribus macula flava glabra.
Elater noctilucus. Linn. Syſt. nat. 2. 657. 4. Muſ. Lud. Ulr. 82.
Oliv. Inſ. 31. tab. 2. fig. 14.
Degeer Inſ. 4. 160. 2. tab. 18. fig. 1.
Brown. Jamaic. 432. tab. 44. fig. 10.
Sloan. Jamaic. 2. 206. tab. 237. fig. 1.
Voet Coleopt. 1. tab. 43. fig. 16.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis.

√ *phoſphoreus.* 11. E. thorace poſtice maculis duabus flavis. Linn. Syſt. nat. 2. 652. 5.
Elater phoſphoreus. Oliv. Inſ. 31. tab. 2. fig. 20. & fig. 14. b.
Degeer Inſ. 4. 161. 3. tab. 18. fig. 2.
Habitat in Americae Inſulis.
Nimis praecedenti affinis, quamvis duplo minor.

√ *ignitus.* 12. E. fuſcus thorace nigro: margine flavo.
Elater ignitus. Oliv. Inſ. 31. tab. 8. fig. 78.
Elater indicus. Herbſt Arch. tab. 27. fig. 3.
Voet. Coleopt. 1. tab. 43. fig. 18.
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Praecedentibus minor & diſtinctus. Corpus totum fuſcum. Thorax niger margine inprimis poſtico flavo. Elytra ſtriata.

√ *fuſcipes.* 13. E. ater antennis pedibusque fuſcis.
Elater fuſcipes. Oliv. Inſ. 71. tab. 3. fig. 21.

Habitat in India orientali Dr. Koenig.
Magnus, totus ater ſolis antennis pedibusque fuſcis. Elytra ſtriata.

14. E. cinereus thorace punctis quatuor, elytris faſciis duabus nigris. *4maculatus*
Elater quadrimaculatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 8. fig. 79.
Elater faſciatus. Drury Inſ. 3. tab. 57. fig. 2.
Habitat in Africa aequinoctiali.
Antennae nigrae. Scutellum nigrum.

15. E. nigricans griſeo maculatus thoracis limbo elytrorumque macula magna pallidis. *rubiginoſus*
Habitat in Sierra Leon. Africae Dr. Pflug.
Caput nigrum fronte ſordide pallida. Thoracis limbus pallidus margine rufeſcente lineaque dorſali nigra. Elytra nigra atomis griſeis. Ad baſin punctum magnum ferrugineum & pone medium macula magna pallida, fere faſciam conſtituens. Pectus nigrum lateribus rubiginoſis. Abdomen nigrum ſegmentis tribus baſeos utrinque macula rubiginoſa punctoque marginali albo. Pedes nigri.

16. E. ferrugineus elytris mucronatis, antennis nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 652. 7. Amoen. acad. 6. 395. 24. *ligneus.*
Elater ligneus. Oliv. Inſ. 31. tab. 2. fig. 15.
Drury Inſ. 3. tab. 47. fig. 4.
Voet. Coleopt. 1. tab. 42. fig. 9.
Habitat in America meridionali.

17. E. ferrugineus capite thoraceque obſcurioribus. *ruſus.*
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura magna E. ferruginei. Caput fuſcum, antice retuſum. Antennae ferrugineae. Thorax fuſcus lateribus ferrugineis. Scutellum ferru-

gineum. Elytra ſtriata. Corpus & pedes ferruginea.

ferrugineus 18. E. thorace elytrisque ferrugineis, thoracis margine poſtico corporeque nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 654. 20. Fn. Sv. 729.
Elater thorace elytrisque rubris. Geoff. Inſ. 1. 130. 1. tab. 2. fig. 4.
Elater ferrugineus. Oliv. Inſ. 31. tab. 3. fig. 35. Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 1.
Habitat in Europa.

porcatus. 19. E. viridi aeneus elytris ſulcatis: ſulcis villoſo albis. Linn. Syſt. nat. 2. 652. 6.
Elater porcatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 7. fig. 74. Drury Inſ. 3. tab. 47. fig. 6.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 7.
Habitat in America meridionali.
Sutura atra, nitida.

ſulcatus. 20. E. villoſo albidus elytris ſtriis tribus elevatis glabris.
Elater ſulcatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 2. fig. 10.
Habitat in America meridionali Dom. Spengler.
Affinis certe praecedenti, attamen diſtinctus videtur. Caput atrum. Thorax villoſo albidus, antice nigricans. Pectoris ſutura glabra, atra. Elytra villoſo albida ſulcis tribus elevatis, atris, nitidis. Corpus albo villoſum.

virens. 21. E. villoſus nigro viridis antennis nigris.
Elater virens. Oliv. Inſ. 31. tab. 2. fig. 19. tab. 9. fig. 55.
Voet Coleopt. 1. tab. 42. fig. a.
Habitat in Americae Inſulis Muſ. Dr. Hunter.
Corpus totum nigro viride, villoſum, immaculatum. Elytra ſtriata.

fulgens. 22. E. cyaneo nitidus ſubtus cupreus elytris acuminatis.

Elater fulgens. Oliv. Inſ. 31. tab. 4. fig. 43.
Habitat in India Muſ. Britann.
Magnus. Caput viridi aeneum, nitidum antennis nigris. Thorax cyaneus lateribus aeneis. Elytra glabra, laevia, cyanea, nitida, apice valde acuminata. Corpus cupreum pedibus fuſcis.

23. E. cyaneo niger thorace inaequali, elytris ſtriatis rubris. *inaequalis.*
Habitat in Italia Muſ. Dom. Boſc.
Paullo major E. aterrimo. Antennae atrae. Caput & thorax cyaneo nigra, immaculata. Thorax canaliculatus ſcutello obſcuro. Corpus cyaneo nigrum.

24. E. thorace atro nitido, elytris ſtriatis nigris. *aterrimus.*
Linn. Syſt. nat. 2. 653. 17. Fn. Sv. 726.
Elater totus niger nitidus. Geoff. Inſ. 1. 136. 73.
Elater aterrimus. Oliv. Inſ. 31. tab. 5. fig. 53.
Habitat in Europae hortis.

25. E. niger opacus elytris ſtriatis, antennis pedibusque concoloribus. *niger.*
Elater niger thorace laevi, elytris pedibus corporeque nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 656. 36. Fn. Sv. 743.
Oliv. Inſ. 31. tab. 6. fig. 65.
Habitat in Europae hortis.
Statura & ſumma affinitas praecedentis. Color totius corporis niger, minime nitidus antennis pedibusque concoloribus.

26. E. thorace obſcure cinereo, elytris cinereo nebuloſis, plantis rufis. Linn. Syſt. nat. 2. 655. 22. Fn. Sv. 738. *murinus.*
Oliv. Inſ. 31. tab. 2. fig. 9.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 6.

Voet. Coleopt. 1. tab. 44. fig. 26.
Habitat in Europae hortis frequens.

holoſericeus 27. E. obſcurus thorace elytrisque cinereo fuſcoque nebuloſis ſubholoſericeis.
Elater niger elytris villoſo murinis. Geoff. Inſ. 1. 135. 10.
Oliv. Inſ. 31. tab. 3. fig. 33. tab. 7. fig. 69.
Voet. Coleopt. tab. 44. fig. 27.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Summa affinitas E. murini at minor & alius. Supra totus cinereo fuſcoque varius. Corpus nigrum.

teſſellatus. 28. E. elytris aeneis: maculis pallidioribus confertis, unguibus rubris. Linn. Syſt. nat. 2. 659. 22. Fn. Sv. 738.
Elater teſſellatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 3. fig. 22.
Geoff. Inſ. 1. 135. 9.
Herbſt Arch. tab. 27. fig. 5.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 7.
Voet. Coleopt. 1. tab. 44. fig. 27.
Degeer Inſ. 4. 148. 7.
Habitat in Europae hortis.
Scutellum pallidum.

faſciatus. 29. E. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigricantibus: faſcia undulata alba. Linn. Syſt. nat. 2. 655. 27. Fn. Sv. 737.
Elater faſciatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 5. fig. 46.
Panz. Naturf. 24. 32. 45. tab. 1. fig. 46.
Habitat in Europae hortis.

varius. 30. E. niger thoracis margine elytrorumque baſi faſciaque poſtica villoſo flaveſcentibus.
Elater varius. Oliv. Inſ. 31. tab. 3. fig. 26. tab. 7. fig. 68.
Herbſt Arch. tab. 27. fig. 11.
Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.

Diſtinctus omnino ab E. faſciato duplo minor. Caput nigrum antennis obſcure ferrugineis. Thorax canaliculatus, niger lateribus villis denſis, flaveſcentibus tectis: Elytra nigra baſi parum villoſo flaveſcentia faſciaque lata apicis. Corpus nigrum pedibus obſcure ferrugineis.

31. E. thorace elytrisque aeneis, antennis ſimplicibus nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 655. 31. Fn. Sv. 740. *aeneus.*

Elater aeneus. Oliv. Inſ. 31. tab. 8. fig. 83.
Degeer Inſ. 4. 149. 8.
Act. nidroſſ. 3. tab. 4. fig. 6.
β. Elater germanus thorace elytrisque atro coeruleis, corpore toto pedibusque nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 555. 36. Fn. Sv. 730.
Elater Germanus. Oliv. Inſ. 31. tab. 2. fig. 12.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 8.
Habitat in Europae hortis.

32. E. pubeſcens niger thorace linea dorſali punctisque duobus impreſſis, elytris ſtriatis aeneo nitidulis. *impreſſus.*

Habitat in Suecia Dom. Schneider.
Praecedente magis oblongus. Thorax niger, obſcure nitidus linea dorſali inprimis poſtice punctoque utrinque linea dorſali approximato impreſſis. Scutellum retuſum. Elytra ſtriata, aeneo colore nitida. Corpus nigrum.

33. E. thorace elytrisque aeneis, antennis maris pectinatis. Linn. Syſt. nat. 2. 655. 42. Fn. Sv. 741. *pectinicornis.*

Elater fuſcus viridi aeneus. Geoff. Inſ. 1. 133. 7.
Elater pectinicornis. Oliv. Inſ. 31. tab. 1. fig. 4. tab. 6. fig. 4.
Sulz. Inſ. tab. 5. fig. 36.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 4.

Degeer Inſ. 4. 145. 2. tab. 5. fig. 3.
Habitat in Europae hortis frequens.

furcatus. 34. E. thorace ferrugineo: linea dorſali nigra, coleoptris attenuatis teſtaceis: ſtriis quinque nigris, capite furcato.
Habitat in India Muſ. Britann.
Medius. Caput ferrugineum labio antico furcato vel bifido: mucronibus porrectis acutis. Thorax glaber, laevis, ferrugineus, nitidus linea dorſali atra. Elytra attenuata, punctato ſtriata, teſtacea, futura, vitta media margineque exteriori poſtice coeuntibus, nigris. Margo baſi flavus. Corpus flavum.

futuralis. 35. E. thorace utrinque unidentato ferrugineo: linea dorſali nigra, coleoptris teſtaceis: vittis tribus atris.
Elater futuralis. Oliv. Inſ. 31. tab. 1. fig. 3.
Elater angulatus. Drury Inſ. 3. tab. 47. fig. 5.
Habitat in Senegalia Muſ. Dom. Olivier.
Affinis videtur praecedenti. Caput atrum labio furcato vel bifido mucronibus porrectis, acutis. Thorax utrinque ante medium unidentatus, ferrugineus, nitidus linea dorſali lineaque parva, dorſali, approximata atris. Elytra ſubſtriata, attenuata, baſi puncto parvo impreſſo, apice acutiſſima, teſtacea futura communi margineque exteriori baſin haud attingente atris. Abdomen teſtaceum utrinque vitta atra, quae poſtice coeunt, at anum haud attingunt. Scutellum atrum.

vittatus. 36. E. fuſcus elytrorum vitta pedibusque teſtaceis.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Medius. Antennae piceae. Caput & thorax ſubvilloſa, fuſca. Elytra ſtriata, fuſca vitta in

medio lata, fere obſoleta, obſcure teſtacea. Abdomen ferrugineum.

37. E. cupreus elytris dimidiato flavis. *cupreus.*
Elater cupreus. Oliv. Inſ. 31. tab. 5. fig. 50.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 2.
Habitat in Anglia.
Antennae pectinatae, nigrae. Elytra ſtriata, baſi teſtacea, apice cuprea.
Variat antennis ſimplicibus corporeque aeneo.

38. E. thorace nigro: lateribus ferrugineis, coleoptris flavis margine cruceque nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 653. 12. Fn. Sv. 722. *cruciatus.*
Elater cruciatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 4. fig. 40.
Geoff. Inſ. 1. 133. 6.
Degeer Inſ. 4. 149. 9.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 10.
Voet. Coleopt. 2. tab. 43. fig. 12.
Habitat in Europae hortis.

39. E. thorace rufo, elytris faſcia duplici alba, corpore nigro. Linn. Syſt. nat. 2. 653. 11. *ſyriacus.*
Muſ. Lud. Ulr. 83.
Habitat in Oriente.
Minor. Faſcia elytrorum, altera ad baſin, altera in medio.

40. E. thorace teſtaceo pubeſcente, elytris flavis apice nigris, corpore nigro. Linn. Syſt. nat. 2. 654. 18. Fn. Sv. 727. Geoff. Inſ. 1. 132. 4. *caſtaneus.*
Oliv. Inſ. 31. tab. 3. fig. 25. & tab. 5. fig. 51.
Degeer Inſ. 4. 153. 15.
Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 9. tab. 31. fig. 4.
Habitat in Europae campis.

41. E. niger thorace glaberrimo rubro, elytris teſtaceis. Linn. Syſt. nat. 2. 654. 19. Fn. Sv. 728. *livens.*
Elater livens. Oliv. Inſ. 31. tab. 5. fig. 52.
Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 8.

Habitat in Europae hortis.

meſomelus. 42. E. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore elytrisque nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 653. 16. Fn. Sv. 725.
Elater meſomelus. Oliv. Inſ. 31. tab. 5. fig. 54.
Habitat in Europae hortis.
Larva hexapoda, filiformis, duriuſcula caudae ſcuto corneo: lateribus dentatis, ſubtus tuberculo conico, pediformi, tubuloſo.
Forte mera varietas ſexus praecedentis.

linearis. 43. E. thorace ruſo: medio fuſco, elytris linearibus teſtaceis. Linn. Syſt. nat. 2. 655. 15. Fn. Sv. 723.
Elater linearis. Oliv. Inſ. 31. tab. 7. fig. 67.
Degeer Inſ. 4. 154. 17.
β. Elater marginellus thorace nigro: margine ferrugineo, elytris teſtaceis. Mant. Inſ. 1. 114. 51.
Habitat in Europa.
Caput, corpus & ſcutellum nigra. Os antennarum baſis, & tibiae pallidae.

obſcurus. 44. E. piceus thorace elytrisque obſcure nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 655. 25. Fn. Sv. 735.
Elater obſcurus. Oliv. Inſ. 31. tab. 8. fig. 76.
Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 2.
Habitat in Europae hortis frequens.

flavipes. 45. E. thorace obſcure nigro, elytris ſtriatis fuſcis, pedibus teſtaceis.
Elater flavipes. Oliv. Inſ. 81. tab. 2. fig. 17.
Habitat in America Dom. von Rohr.
Simillimus E. obſcuro, pedibus tamen flaveſcentibus facillime diſtinguitur.

caſtaneus. 46. E. fuſcus cinereo ſubvilloſus antennis tibiisque teſtaceis.
Habitat in Inſula Guadeloupe Dom. de Badier.

Medius. Caput, thorax, elytra obſcura, pilis cinereis tomentoſa. Elytra ſtriata. Antennae & pedes teſtaceae.

47. E. ferrugineus elytris nigro punctatis. *maculatus.*
Elater maculatus. Oliv. 31. tab. 2. fig. 18.
Habitat in America meridionali.
Antennae nigrae. Thorax ferrugineus macula media, triangulari, nigra. Elytra ferruginea punctis quatuor nigris. Pedes fuſci.

48. E. cinereo fuſcus immaculatus. *filiformis.*
Elater filiformis. Oliv. Inſ. 31. tab. 4. fig. 41.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Corpus E. obſcuro duplo minus, filiforme, cinereo fuſcum, immaculatum.

49. E. thorace atro nitido, elytris baſi margineque exteriori lividis. Linn. Syſt. nat. 2. 655. 26. Fn. Sv. 736. *triſtis.*
Elater triſtis. Oliv. Inſ. 31. tab. 4. fig. 39.
Schaeff. Icon. tab. 194. fig. 1.
Habitat in Europae ligno putreſcente.

50. E. thorace fuſco, elytris teſtaceis: margine undique nigro. Linn. Syſt. nat. 2. 655. 26. Fn. Sv. 736. *marginatus.*
Elater marginatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 8. fig. 29.
Act. nidroſſ. 3. 16. tab. 6. fig. 6.
Habitat in Europae plantis.

51. E. niger thorace toto rufo. *thoracicus.*
Elater niger thorace rufo. Geoff. Inſ. 1. 132. 5.
Elater thoracicus. Oliv. Inſ. 31. tab. 3. fig. 24.
Voet. Coleopt. 1. tab. 42. fig. 6.
Habitat in Anglia, Gallia.

52. E. niger thorace poſtice rubro nitido. Linn. Syſt. nat. 2. 655. 14. Fn. Sv. 724. *ruficollis.*
Elater ruficollis. Oliv. Inſ. 31. tab. 6. fig. 61.
Degeer Inſ. 4. 153. 16.

Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 3.
Habitat in Europae graminoſis.

brunneus. 53. E. thorace rufo: medio nigro, elytris corporeque ferrugineis. Linn. Syſt. nat. 2. 653. 10. Fn. Sv. 721.
Elater brunneus. Oliv. Inſ. 31. tab. 3. fig. 30.
Schaeff. Icon. tab. 151. fig. 5. 6.
Herbſt Arch. tab. 27. fig. 6.
Habitat in Europae plantis.

haematodes 54. E. niger thorace pubeſcente fulvo, elytris ſtriatis ſanguineis.
Elater haematodes. Oliv Inſ. 31. tab. 1. fig. 6.
Elater purpureus. Herbſt Arch. tab. 27. fig. 10.
Elater ſanguineus. Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 9.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 6.
Habitat in Germania.
Antennae nigrae. Scutellum nigrum.

ſanguineus 55. E. ater elytris ſtriatis ſanguineis immaculatis. Linn. Syſt. nat. 2. 654. 21. Fn. Sv. 731.
Elater niger, elytris rubris. Geoff. Inſ. 1. 131. 2.
Elater ſanguineus. Oliv. Inſ. 31. tab. 1. fig. 7. tab. 5. fig. 48. a.
Degeer Inſ. 4. 151. 13.
Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 7.
Habitat in Europae hortis.
Larva Stroem in Actis Nidroſienſibus 2. tab. fig.
Variat major thorace magis fulvo pubeſcente, elytris magis coloratis lituraque obſoleta baſeos nigra.

ephippium. 56. E. ater elytris ſtriatis ſanguineis: macula communi dorſali nigra.
Oliv. Inſ. 31. tab. 5. fig. 48. b.
Herbſt Arch. tab. 27. fig. 9.
Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 5.
Voet. Coleopt. tab. 43. fig. 11.

Habitat in Germaniae Pinis putrefcentibus.
Statura & fumma affinitas praecedentis. Differt tamen thorace pube nigra toto coleoptrisque macula magna dorfali communi nigra, alias fimillimus.

57. E. ater elytris ftriatis fanguineis apice nigris. *praeuftus.*
Habitat in Germaniae Pinis putrefcentibus Dom. Smidt.
Forte mera varietas praecedentium. Differt tantum elytrorum apicibus nigris.

58. E. niger elytris ftriatis pedibusque teftaceis. *teftaceus.*
Habitat in Germania D. Schneider.
Paullo major fequente. Caput, thorax, corpus nigra, obfcura. Elytra ftriata, teftacea. Pedes teftacei.

59. E. elytris antice dimidiato rufis, corpore nigro. *balteatus.*
Linn. Syft. nat. 2. 654. 22. Fn. Sv. 732.
Oliv. Inf. 31. tab 8. fig. 77.
Degeer Inf. 4. 152. 14.
Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 2.
Voet. Coleopt. 1. tab. 43. fig. 10.
Habitat in Europae hortis.

60. E. ater elytris teftaceis apice nigris. *elongatulus.*
Elater elongatulus. Oliv. Inf. 31. tab. 6. fig. 58.
Habitat in Auftria Dom. Saldoner.
Praecedenti affinis. Corpus atrum. Elytra punctato ftriata, teftacea, apice nigra. Pedes apice teftacei.

61. E. fanguineus capite thoracis linea dorfali elytrorumque apicibus nigris. *melanocephalus.*
Elater melanocephalus. Oliv. Inf. 31. tab. 4. fig. 36.
Elater melanocephalus. Thunb. nov. fp. 3. 63.
Habitat in Coromandel Muf. Dom. Banks.

Caput & antennae nigra, immaculata. Thorax laevis, nitidus, ſanguineus linea dorſali nigra, quae tamen baſin haud attingit. Elytra punctato ſtriata, ſanguinea, apice nigra. Corpus ſanguineum abdominis apice nigro. Pedes ſanguinei.

ſputator. 62. E. thorace fuſco nitido, elytris cinereis, corpore nigro. Linn. Syſt. nat. 2. 654. 24. Fn. Sv. 734.

Elater ſputator. Oliv. Inſ. 32. tab. 4. fig. 31.

Degeer Inſ. 4. 151. 11.

Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 2.

Habitat in Europae hortis frequens.

analis. 63. E. niger elytris ano pedibusque teſtaceis.

Habitat in Germania.

Statura E. piloſi. Antennae nigrae baſi teſtacae. Caput & thorax nigra, nitidula, immaculata. Elytra ſtriata, teſtacea. Corpus nigrum ano pedibusque teſtaceis.

elegans. 64. E. niger thoracis marginibus elytrorumque vitta pedibusque teſtaceis.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom. Smidt.

Caput nigrum antennis teſtaceis. Thorax niger, nitidus margine laterali & poſtico teſtaceo. Elytra nigra vitta lata ante margirem margineque ipſo tenuiſſime teſtaceis. Corpus piceum pedibus pallide teſtaceis.

variabilis. 65. E. thorace fuſco obſcuro, elytris ſtriatis teſtaceis.

Habitat in Germaniae truncis emortuis Dom. Smidt.

Statura & ſumma affinitas E. ſputator, at paullo major. Caput & thorax fuſca, minime nitida, nec canaliculata. Elytra ſtriata, teſtacea, immaculata.

Variat rarius elytris fuſcis.

66. E. fuſcus cinereo ſubvilloſus elytris ſtriatis. *piloſus.*
Elater piloſus Leſk. Itin. 1. pag. 11. 1. tab. A. fig. 1.
Habitat in Luſatiae montibus. Prof. Leſke.
Parvus, totus obſcurus, villo parvo cinereo tectus. Elytra ſtriata.

67. E. tomentoſus livens thorace elytrisque obſcurioribus. *longicollis.*
Elater longicollis. Oliv. Inſ. 31. tab. 8. fig. 81.
Habitat in Gallia.
Indiſtinctus. Antennae teſtaceae. Caput & thorax villoſa, obſcura. Elytra crenato ſtriata, livida. Corpus nigrum pectore utrinque nigro.

68. E. fuſcus elytris ſtriatis, antennis pedibusque flavis. *pallipes.*
Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.
Parvus, fuſcus antennis pedibusque flavis. Simillimum e Suecia miſit Dom. de Paykull.

69. E. niger elytris fuſcis. *striatus.*
Elater lineatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 3. fig. 32.
Habitat in Suecia.
Caput & thorax obſcure nigra. Elytra fuſca lineis quatuor pallidis, ad apicem coeuntibus. Antennae ferrugineae. Pedes fuſci.

70. E. ater thorace nitido, elytris ſtriatis, pedibus rufis. *rufipes.*
Elater rufipes. Oliv. Inſ. 31. tab. 7. fig. 72.
Elater niger pedibus rufis. Geoff. Inſ. 1. 136. 14.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura & ſumma affinitas E. minuti. Caput & thorax atra, nitida, immaculata. Elytra ſtriata, nigra. Pedes omnes rufi digitis nigris.

71. E. thorace atro nitido, elytris pedibusque nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 656. 34. Fn. Sv. 744. *minutus.*

Elater minutus. Oliv. Inſ. 31. tab. 6. fig. 62.
Habitat in Europa.
Corpus parvum, nigrum, nitidum.

pallens. 72. E. ater elytris ſtriatis pedibusque teſtaceis.
Geoff. Inſ. 1. 139. 19.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Statura omnino E. limbati, at elytra immaculata. Thoracis margo anticus parum pallidus. Caput & thorax atra, nitida.

limbatus. 73. E. thorace atro nitido, elytris teſtaceis: limbo nigro.
Elater limbatus. Thunb. nov. ſp. 3. 64.
Elater limbatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 7. fig. 73.
Habitat Kiliae Dom. Lund.
Statura & magnitudo E. minuti, cui valde affinis, at elytra teſtacea margine omni nigro.

riparius. 74. E. nigro aeneus elytris ſtriatis, pedibus rufis.
Habitat in Lapponia ad ripas aquarum D. de Paykull.
Statura & magnitudo praecedentium totus obſcure aeneus, pedibus ſolis rufis.

advena. 75. E. ater elytris ſtriatis pedibusque obſcure cinereis.
Habitat ad Bizerta Hiſpaniae Dom. Vahl.
Parvus. Caput & thorax atra, parum nitida. Elytra acuminata, ſtriata, obſcure cinerea. Abdomen nigrum pedibus cinereis.

nitidulus. 76. E. elytris ſtriatis: maculis duabus, antennis pedibusque flavis.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Triplo minor E. pulchello. Caput & thorax ſubpubeſcentia, atra, immaculata. Elytra ſtriata, nigra, maculis duabus magnis flavis, anteriore baſeos majore. Antennae & pedes flavae.

77. E. capite thoraceque atris, elytris nigris: maculis flaveſcentibus, pedibus flavis. Linn. Syſt. nat. 2. 656. 35. Fn. Sv. 745. *pulchellus.*
Elater pulchellus. Oliv. Inſ. 31. tab. 4. fig. 38.
Herbſt Arch. tab. 27. fig. 7.
Habitat in Europae hortis.

78. E. niger elytris ſtriatis: macula media rufa. 2 *guttatus.*
Elater 2 guttatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 6. fig. 59.
Habitat in Gallia meridionali Muſ. Dom. Olivier.
Statura E. pulchelli paullo major. Caput & thorax atra, nitida, immaculata. Elytra ſtriata, nigra macula media ad marginem rufa. Corpus nigrum.

79. E. niger elytris teſtaceis apice nigris: puncto albo. 2 *maculatus*
Elater 2 maculatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 5. fig. 10.
Roſſ. Fn. Etruſc. 1. tab. 3. fig. 10.
Habitat in Gallia meridionali Dom. Olivier.
Magnitudo omnino E. pulchelli. Corpus nigrum. Elytra ſtriata, teſtacea, in medio macula transverſa, marginali, nigra. Apex late niger puncto magno, diſtincto, albo.

80. E. niger elytris ſtriatis teſtaceis: maculis tribus nigris. 3 *maculatus*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura & magnitudo omnio E. pulchelli. Caput & thorax nigra, immaculata. Elytra ſtriata, teſtacea macula magna baſeos communi. In medio macula magna ad marginem exteriorem, quae fere cum macula poſtica coit. Corpus nigrum pedibus flaveſcentibus.

81. E. ſupra niger thoracis limbo maculisque duabus elytrorum teſtaceis. 4 *maculatus*
Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura & magnitudo omnino E. pulchelli. Caput nigrum antennis teſtaceis. Thorax glaber, laevis, in medio obſcure nigricans limbo omni teſtaceo. Corpus obſcurum pectore, ano pedibusque teſtaceis.

politus. 82. E. ater nitidus elytris ſtriatis, pedibus anticis pallidis.

Habitat in Dahlikarliae montibus de Paykull.

E. minuto duplo minor & affinis. Thorax nitidus. Elytra ſtriata. Pedes antici pallidi.

6guttatus. 83. E. laevis ater elytris punctis tribus albis.

Elater 6 guttatus. Thunb. nov. ſp. 3. 65. fig. 75.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei.

Corpus minimum, atrum, nitidum.

bupreſtoides 84. E. cylindricus niger immaculatus capite retracto.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus medium, cylindricum, nigrum, minime nitidum. Caput intra thoracem retractum. Elytra vix ſtriata.

Ab E. bupreſtoides. Linn. omnino diverſus.

pygmaeus. 85. E. niger obſcurus tibis piceis.

Habitat in Germaniae truncis putreſcentibus Dom. Smidt.

Minutus, totus niger, obſcurus, minime nitidus. Tibiae ſolae piceae.

notatus. 86. E. thorace rufo nigro bimaculato, elytris baſi rufis apice nigris: maculis duabus albis.

Elater notatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 4. fig. 37.

Habitat in Coromandel Muſ. Dom. Banks.

Caput atrum fronte villis cinereis. Thorax ruſus antice maculis duabus magnis, atris, annulo cinereo tomentoſo cinctis. Elytra ſtriata, baſi ruſa, ultra medium nigra maculis duabus, transverſis, albis. Abdomen nigrum, cinereo nitidulum. Femora nigra tibiis palleſcentibus.

87. E. thorace ferrugineo, elytris atris: faſciis duabus flavis. *feſtivus.*

Elater feſtivus. Thunb. nov. ſpec. 3. 64. fig. 74.

Habitat in Aegypto Prof. Forſkahl.

Parvus. Caput fuſcum. Thorax rufeſcens. Elytra ſtriata, nigra faſciis duabus flavis, altera verſus apicem.

88. E. niger nitidus elytris puncto baſeos rubro. Linn. Syſt. nat. 2. 642. 9. Geoff. Inſ. 1. 136. 15. 2 *puſtulatus.*

Elater 2 puſtulatus. Oliv. Inſ. 31. tab. 2. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 104. fig. 6.

Herbſt Arch. tab. 27. fig. 8.

Voet. Coleopt. 1. tab. 44. fig 22.

Habitat in Germaniae nemoribus.

Variat interdum elytrorum baſi rufa ſutura tamen ſemper nigra.

89. E. niger elytris ſtriatis: punctis duobus teſtaceis. 4 *puſtulatus*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Minutus. Caput & thorax nigra, immaculata. Elytra nigra maculis duabus, diſtinctis, teſtaceis. Corpus nigrum, pedibus teſtaceis.

80. LUCANUS. *Penicilli* duo ſub labio palpigeri. *Antennae* pectinato fiſſiles.

Alces. 1. L. mandibulis exſertis apice quadridentatis.
Oliv. Inſ. 1. 8. 1. tab. 2. fig. 3.
Petiver. Gazoph. tab. 57. fig. 15.
Habitat in Aſia.
Caput magnum, depreſſum, atrum, utrinque ſinuatum. Mandibulae capite longiores, apice compreſſae, quadridentatae, & in medio interno dente validiſſimo armatae.

Cervus. 2. L. Mandibulis exſertis unidentatis apice biſurcatis, labio deflexo: ruga transverſa elevata.
Linn. Syſt. nat. 2. 559. 1. Fn. Sv. 405. Geoff. Inſ. 1. 61. 1. tab. 1. fig. 1.
Roeſſ. Inſ. 2. Scarab. 1. tab. 4. 5.
Degeer Inſ. 4. tab. 12. fig. 1 & 7.
Schaeff. Icon. tab. 133. fig. 1.
β. Lucanus Dorcas Myll. Zool. Dan. 444.
Platycerus fuſcus. Geoff. Inſ. 1. 60. 2.
Roeſſ. Inſ. 2. tab. 5. fig. 8.
Schaeff. Icon. tab. 133. fig. 2.
Oliv. Inſ. 1. 8. 1. tab. 2. fig. 3. 6.
Habitat in Ligno putreſcente Europae.

Lucani corpus magnum, oblongum, depreſſum, glabrum, immarginatum, tardum, capite magno, plano, exſerto, fere quadrato, mandibulis ſaepius exſertis, corniformibus, oculis rotundatis, marginalibus, antennis diſtantibus, ſub apice capitis prominulo inſertis, longitudine thoracis, thorace transverſo, utrinque deflexo, ſcutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, pedibus validis, curſoriis, tarſis quinquearticulatis, colore nigro.

Faemina β. mare multo minor mandibulisque haud exſertis. Cornua officinalia maris mandibulae exſertae ad dimicandum.
Larva obeſa, albida capite pedibusque ferrugineis. Coſſum veteram credit Roeſel.

3. L. mandibulis exſertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo conico. *Elaphus.*
Oliv. Inſ. 1. 12. 4. tab. 3. fig. 7.
Habitat in Virginia.
Capitis margo poſticus valde elevatus, emarginatus. Simillimus L. cervo at minor. Faemina minor absque mandibulis exſertis.

4. L. mandibulis exſertis: denticulis mediis diſformibus apice bifurcatis. Linn. Syſt. nat. 2. 560. 2. Amoen. acad. 6. 391. 4. Muſ. Lud. Ulr. 30. *capreolus.*
Lucanus Capra. Oliv. Inſ. 1. 12. 3. tab. 1. fig. 12.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 2. fig. 1.
Habitat in Germania.
Lucano Cervo duplo fere minor. Mandibulae exſertae, capite longiores, in medio denticulis duobus, craſſis, approximatis, lobatis. Corpus nigrum.

5. L. mandibulis exſertis intus bidentatis longitudine capitis. *Dama.*
Degeer Inſ. 4. tab. 19. fig. 11. 12.
Oliv. Inſ. 1. 15. 8. tab. 3. fig. 14.
Habitat in Virginia.
Mandibulae arcuatae apice integrae dente poſtico minutiſſimo. Femora ferruginea.

6. L. mandibulis exſertis tridentatis niger femoribus ferrugineis. Oliv. Inſ. 1. 17. 10. tab. 4. fig. 10. *femoratus.*
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Banks.
Mandibulae valde exſertae intus denticulis tribus, baſeos valido, medio minori, apicis validiori

acuto. Caput planum labio vix ullo. Thorax obſcurior margine antico fulvo ciliato, poſtico utrinque bidentato. Scutellum fulvo holoſericeum. Femora omnia ferruginea.

Biſon. 7. L. mandibulis exſertis multidentatis, thoracis elytrorumque margine rubro.
Lucanus Biſon. Olivier Inſ. 1. 13. 5. tab. 3. fig. 6.
Voet Coleopt. tab. 30. fig. 6.
Habitat in America meridionali.
Thoracis margo rufus lineola nigra.

Gazella. 8. L. mandibulis intus bidentatis ater elytrorum margine teſtaceo. Oliv. Inſ. 1. 13. tab. 4. fig. 13.
Habitat in Siam Muſ. Dom. Banks.
Mandibulae breves, intus tridentatae. Caput planum lamella ante oculos auctum. Thoracis margo poſticus utrinque emarginatus. Elytra margine late teſtaceo. Tibiae angulato ſulcatae, nigrae.

Lama. 9. L. mandibulis exſertis tridentatis capite brevioribus, thorace angulato.
Lucanus Lama. Oliv. Inſ. 1. 14. 7. tab. 3. fig. 8.
Habitat in India orientali.
Similis L. Ceruo feminae at multo major.

ſuturalis. 10. L. mandibulis exſertis baſi dentatis teſtaceus: linea dorſali atra.
Lucanus futuralis. Oliv. Inſ. 1. 16. 9. tab. 5. fig. 12.
Habitat — — —
Parvus. Mandibulae baſi interiori tridentatae. Caput teſtaceum margine lineaque dorſali apice biſida, cum mandibulis coeunte, atris. Thorax teſtaceus linea dorſali punctoque utrinque baſeos atris. Corpus brunneo atrum.

11. L. mandibulis dente laterali elevato, corpore depresso. Linn. Syst. nat. 2. 561. 6. *parallelipipedus.*
Platycerus niger. Geoff. Inf. 1. 62. 3.
Oliv. Inf. 1. 17. 11. tab. 4. fig. 9.
Voet. Scarab. tab. 29. fig. 7.
Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 7.
Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 9.
Habitat in Europae sylvis.
Alter sexus mandibulis minoribus punctoque duplici capitis prominente.

12. L. mandibulis incurvis: intus dente incrassato difformi, elytris punctatis subpubescentibus. *cancroides.*
Oliv. Inf. 1. 18. 12. tab. 3. fig. 11.
Habitat in Terra Diemenii Mus. Dom. Banks.
Thorax parum canaliculatus. Tibiae serratae.

13. L. mandibulis lunatis unidentatis ater thorace marginato, elytris subtriatis. *tenebroides.*
Habitat in Russia Dom. Boeber.
Paullo major L. caraboides. Abdomen piceum.

14 L. coerulescens mandibulis lunatis, thorace marginato. Linn. Syst. nat. 2. 561. 7. Fn. Sv. 407. *caraboides.*
Geoff. Inf. 1. 63. 4. Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 8. tab. 75. fig. 7.
Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 11.
Oliv. Inf. 1. 20. 14. tab. 2. fig. 2.
Habitat iu Europae locis suffocatis.
Variat virescens abdomine pedibusque rufescentibus, at vix distinctus.

81. PASSALUS. *Palpi* quatuor filiformes.

Maxilla cornea, arcuata, dentata, apice acuta.

Antennae arcuato lamellatae.

Interruptus. 1. L. niger vertice ſpina recumbente.

Lucanus interruptus. Mant. Inſ. 1. 218. Linn. Syſt. nat. 2. 560. 4. Muſ. Lud. Ulr. 53.

Oliv. Inſ. 1. tab. 3. fig. 5.

Degeer Inſ. 4. tab. 19. fig. 13.

Sulz. Inſ. tab. 2. fig. 2.

Voet. Scarab. tab. 29. fig. 1.

Brown. Jamaic. 429. tab. 44. fig. 7.

Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 7.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis ſub ſaccharo putreſcente.

Os palpis maxillisque. Palpi quatuor inequales, filiformes, anteriores parum longiores, quadri-

---

Paſſali corpus elongatum, depreſſum, planum, glabrum, immarginatum, capite magno, transverſo, angulo antico prominulo, acuto, oculis parvis, globoſis, marginalibus, vix promihulis, antennis diſtantibus, ſub capitis apice inſertis, thorace breviori bus, thorace plano, canaliculato, ſubtus tomentoſo, ab abdomine remoto, ſcutello nullo, elytris rigidis, planis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, tarſis quinquearticulatis, colore nigro, nitido.

articulati: articulis aequalibus; ultimo ovato ad. haerentes maxillae dorso, posteriores breviores, triarticulati: articulo secundo longiori adnati labii medio. Mandibula valida, cornea, arcuata, dentata, apice fissa. Maxilla porrecta, cornea, arcuata dentibus duobus, uno post alterum, validis, apice acuta. Labium crassum, fere quadratum, corneum, apice sinuatum. Antennae articulis fere moniliformibus: secundo longiori, ultimis tribus lamellatis.

Thorax elytraque rufo ciliata.

2. P. capite multidentato, thoracis lateribus punctatis. *dentatus.*

Lucanus striatus. Oliv. Inf. 1. tab. 4. fig. 14.

Habitat in Insula Guadeloupe Americae meridionalis Dom. de Badier.

Nimis affinis praecedenti at triplo minor. Corpus depressum, totum atrum. Caput denticulis plurimis, elevatis, brevibus. Thorax glaber, nitidus, in medio sulcatus lateribus punctis impressis, nec ciliatus. Elytra remota, plana, sulcata sulcis subcrenatis. Pedes breves.

3. P. ferrugineus elytris testaceis. *minutus.*

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom. Smidt.

Corpus depressum, planum, at minutum, vix pediculo majus. Caput & thorax glabra, laevia, ferruginea mandibulis exsertis, brevibus, inermibus, acutis. Elytra vix striata, testacea.

82. PRIONUS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla cylindrica, integra.
Labium breviſſimum, membranaceum.
Antennae ſetaceae.

longimanus 1. P. thorace ſpinis mobilibus, elytris baſi unidentatis apiceque bidentatis, antennis longis.
Prionus longimanus. Oliv. Inſ. 60. tab. 3. fig. 12. tab. 4. fig. 12.
Cerambyx longimanus. Linn. Syſt. nat. 2. 621. Muſ. Lud. Ulr. 64.
Degeer Inſ. 5. 102. 6.
Sloan. Jamaic. 2. 209.
Grew. Muſ. 161. tab. 13.
Roeſ. Inſ. 2. Scarab. 2. tab. 1. fig. 2.
Aub. Miſcell. tab. 64. fig. 1.
Habitat in America meridionali.

fuliginoſus 2. P. thorace crenato marginato unidentato ater elytris apice crenato dentatis, thorace canaliculato.
Habitat in America Muſ. Britann.
Statura & ſumma affinitas P. lineati uti ſuadent antennae, pedes & gibber ſterni. Differt

---

Prioni corpus magnum, oblongum, depreſſum, glabrum, tardum, capite magno, transverſo, plano, inferto, oculis transverſis, reniformibus, marginalibus, antennis diſtantibus, elongatis, ſupra mandibulas inſertis, thorace plano, marginato: margine ſaepius dentato, ſcutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, immarginatis, longitudine abdominis, pedibus longiuſculis, curſoriis, tarſis quadriarticulatis, colore obſcuro.

tamen dente thoracis magis verſus poſteriora inſerto & corpore atro, immaculato ſola linea thoracis dorſali impreſſa, villoſa, alba. Pedes & antennae mox nigrae, mox rufae.

3. P. thorace marginato unidentato rufo, mandibulis inflexis acutis, ſterno ſpinoſo. *roſtratus.*
Habitat in Siam Muſ. Dom. Banks.
Caput atrum, canaliculatum. Mandibulae magnae, inflexae, os obtegentes, acutae, atrae. Antennae piceae, corpore breviores: articulis ultimis valde ſerratis. Thorax utrinque in medio obtuſe dentatus, glaber, rufus, nitidus. Elytra obtuſa, nigra. Pectus rufum ſterno ſpina erecta, acuta. Pedes rufi.

4. P. thorace marginato crenato unidentato niger albo vittatus elytris apice crenato dentatis. *lineatus.*
Cerambyx lineatus. Linn. Syſt. nat. 2. 624. 14.
Sloan. Jam. 209. tab. 237. fig. 34.
Brown Jam. 430. tab. 43. fig. 7.
Herbſt Arch. tab. 32. fig. 1.
Habitat in America Muſ. Britann.
Mandibulae breves, inermes. Thorax niger lineis tribus villoſis, albis. Elytra nigra vitta media lata & parva marginali albis. Sternum antice gibbere elevato, obtuſo, poſtice bifidum. Pedes ferruginei.

5. P. thorace marginato crenato unidentato cyaneo aeneus elytris cupreis. *nitidus.*
Prionus nitidus. Oliv. Inſ. 66. tab. 12. fig. 48.
Habitat in Braſilia Muſ. Dr. Hunter.
Antennae longae, cyaneae. Caput canaliculatum, viridiaeneum. Thorax planus: valde marginatus, crenatus denteque medio porrecto, acuto, arcuato, obſcure aeneus. Elytra punctata, rufo

cuprea, obtuſa. Pectus cyaneum. Abdomen viridi, æneum, nitidum. Pedes cyanei.

Faber. 6. P. thorace marginato utrinque unidentato, elytris piceis, antennis mediocribus.
Cerambyx Faber. Linn. Syſt. nat. 2. 622. 6. Fn. Sv. 646.
Friſh. Inſ. 13. 22. tab. 17.
Schaeff. Icon. tab. 72. fig. 3. tab. 111. fig. 1.
Habitat in Europa rarius.
Mas thorace magis laevi margine crenato absque dente.

ſcabricornis 7. P. thorace ſubmarginato unidentato ſubvilloſus nigricans elytris fuſcis: lineis duabus elevatis, antennis mediocribus.
Prionus ſcabricornis. Scopol. Carniol. 174.
Cerambyx ſcabricornis. Oliv. Inſ. 66. tab. fig.
Cerambyx ſcabricornis. Fyeſl. Inſ. Helv. 13. 241. tab. 1. fig. 3.
Leptura nigra thorace ſubcylindrico. Geoff. Inſ. 1. 210. 6.
Habitat in Europa auſtraliori Muſ. Dom. Olivier.
Reliquis anguſtior. Thorax vix marginatus, ſubvilloſus, in altero ſexu fere inermis.

depſarius. 8. P. thorace ſubmarginato unidentato pubeſcente, corpore nigricante, antennis brevibus rubris.
Cerambyx depſarius. Linn. Syſt. nat. 2. 624. 12.
Schaeff. Icon. tab. 67. fig. 3.
Habitat in Suecia Muſ. Dom. Zſchuck.
Minor anguſtiorque P. coriario.

mucronatus 9. P. thorace marginato bidentato, elytris mucronatis rufis.
Habitat in America Dom. Drury.
Corpus P. cervicorni paullo minus, Frons retuſa antennis brevibus, compreſſis. Thoracis dorſum

bituberculatum. Elytra rufescentia, holosericea, acuminata.

10. P. thorace bidentato: dentibus arcuatis niger, elytris obtusis testaceis. *arcuatus.*

Habitat in Terra Diemenii Mus. Dom. Banks.

Antennae compressae, mediocres, nigrae. Thorax niger utrinque dentibus duobus validis, retrorsum arcuatis. Elytra testacea, basi obscuriora. Abdomen subtus ferrugineo holosericeum. Pedes picei, antici nigri.

11. P. thorace marginato tridentato niger elytris cinereo maculatis. *maculatus.*

Prionus maculatus. Oliv. Ins. 66. tab. 4. fig. 14.

Habitat in Senegalia Mus. Regis Galliae.

Major P. coriario. Mandibulae exsertae, dentatae. Antennae longitudine corporis nigrae. Thorax acute tridentatus. Elytra cinereo fere variegata.

12. P. thorace marginato utrinque tridentato, mandibulis porrectis extus unispinosis, antennis brevibus. *cervicornis.*

Prionus cervicornis. Oliv. Ins. 56. tab. 2. fig. 8.

Cerambyx cervicornis. Linn. Syst. nat. 2. 6. 22. 3. Mus. Lud. Ulr. 65.

Sloan. Jam. 2. tab. 237. fig. 6.

Merian Surin. tab. 48.

Roes. Ins. 2. scarab. 2. tab. 1. fig. 8.

Brown Jamaic. tab. 44. fig. 8.

Aubent. Miscell. tab. 90. fig. 3.

Habitat in Americae ligno bombacis.

Larva edulis in deliciis.

Mandibulae magnae, intus dentatae, extus versus apicem spina unica, valida, acuta.

13. P. thorace utrinque tridentato ater nitidus antennis brevibus: articulis ultimis apice spinosis. *spinicornis.*

Habitat — — Muſ. Britann.

Medius. Mandibulae exſertae, forcipatae, nigrae medio interiori dente valido, acuto. Antennae mediocres, piceae, baſi nigrae: articulis ſpina apicis valida, acuta longitudine articuli ſequentis. Oculi maximi, aeneo nitiduli. Thorax anguſtus, acute unidentatus, obſcure ferrugineus. Elytra apice parum ad ſuturam acuminata.

buphtalmus 14. P. thorace utrinque tridentato ater nitidus antennis brevibus: articulis ultimis apice ſpinoſis.

Huſſarus Ceylonenſis. Voet. Scarab. 2. tab. 3. fig. 11.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Mandibulae exſertae, breves, arcuatae, medio interiori unidentatae, acutae. Antennae breves articulis obconicis: ultimis uniſpinoſis. Oculi maximi fronte inter oculos ſulcata. Thorax ater, nitidus antice dentibus duobus validis, acutis tertioque minori, potius margine poſtico tantum prominulo. Elytra glabra, atra, nitida, omnino inermia. Corpus nigrum pectore rufo. Baſis abdominis acuta prominet.

coriarius. 15. P. thorace marginato tridentato, corpore piceo, antennis brevibus.

Prionus coriarius. Oliv. Inſ. 66. tab. 1. fig. 1.

Prionus. Geoff. Inſ. 1. 198. tab. 3. fig. 9.

Cerambyx coriarius. Linn. Syſt. nat. 2. 622. 7. Fn. Sv. 647.

Cerambyx Prionus. Degeer Inſ. 5. 59. tab. 3. fig. 5.

Roeſ. Inſ. 2. Scarab. 2. tab. 1. fig. 1. 2.

Schaeff. Elem. tab. 102.

Icon. tab. 67. fig. 3. tab. 9. fig. 1.

Frisch Inf. 13. tab. 9.
Habitat in Europae Betulis putridis.
Cerambyx imbriconis. Linn. Syst. nat. 2. 624. 5.
mera hujus varietas.
Lucanus tridentatus. Linn. Syst. nat. 2. 560. 3.
hujus specimen mutilatum videtur.
Ova magna, oblonga, flavescentia.

16. P. thorace utrinque bidentato, corpore nigro, elytris ferrugineis, antennis brevibus. *giganteus.*
Cerambyx giganteus. Linn. Mant. 1. 531.
Oliv. Inf. 66. tab. 6. fig. 21.
Aubent. Miscell. 1. tab. 64. fig. 2.
Habitat Cajennae.

17. P. thorace marginato tridentato obscurus pectore abdomineque ferrugineis, antennis brevibus. *cylindricus*
Cerambyx unicolor. Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 1.
Habitat in America boreali Dom. Blackburn.
Antennae compressae. Caput & thorax nigra.
Elytra picea. Pectus & abdomen ferruginea.
Corpus magis cylindricum quam in reliquis.

18. P. thorace marginato utrinque quadridentato, elytris ferrugineis nigro marginatis. *armillatus*
Prionus armillatus. Oliv. Inf. 66. tab. 5. fig. 17.
Cerambyx armillatus. Linn. Syst. nat. 2. 622. 4.
Petiv. Gazoph. 525. tab. 15. fig. 6.
Habitat in India.
Maximus. Frons retusa. Mandibulae emarginatae.
Thorax lateribus rufescens. Elytra apice acuminata.

19. P. thorace marginato multispinoso, mandibulis porrectis unidentatis apice bifidis, pedibus anticis elongatis. *Luzonum.*
Petit. Gazoph. tab. 74. fig. 1.
Habitat in Insulis Luzonum Mus. Britann.

Antennae mediocres, nigrae: articulo 2. 3. 4. 5. ſubtus aculeatis. Mandibulae prominentes, baſi unidentatae apiceque bifidae. Thorax glaber, niger margine ſpinis duodecim ciliato. Elytra mucronata, pallide ferruginea, baſi ſubpunctata. Pedes antici ſcabri, ſubtus aculeati.

ſerripes. 20. P. thorace marginato multiſpinoſo, mandibulis porrectis apice tridentatis, pedibus ſpinoſo ſerratis.

Habitat in Africa aequinoctiali D. Banks.

Caput nigrum ore intus barbato. Mandibulae validae, baſi unidentatae, apice tridentatae. Antennae mediocres: articulo ſecundo ſubtus ſcabro. Thorax ater, ſcaber margine ſpinis duodecim. Elytra ſubferruginea. Pedes omnes valde ſerrati.

damicornis. 21. P. thorace marginato denticulato, mandibulis porrectis bidentatis, antennis brevibus.

Cerambyx damicornis. Linn. Mant. 1. 532.

Degeer Inſ. 5. 97. 2.

Drury Inſ. 1. tab. 38. fig. 1.

Habitat in America.

Larva Americanis edulis.

bifaſciatus. 22. P. thorace marginato denticulato, corpore nigro, elytris rubris: faſciis duabus atris, antennis brevibus. Linn. Syſt. nat. 2. 624. 16.

Gronov. Zooph. 532. tab. 14. fig. 4.

Habitat in America.

Faſcia elytrorum altera in medio, altera poſtica, terminalis.

Thomae. 23. P. thorace marginato crenulato, corpore nigro, elytris glabris ferrugineis: margine luteo.

Cerambyx Thomae. Acta Soc. Berol. 4. tab. 7. fig. 9.

Habitat in Inſula St. Thomae America.

Elytra apice rotundata.

24. P. thorace marginato crenato albo bilineato, elytris ferrugineis: atomis albis margineque luteo. *bilineatus.*

Habitat in America Dom. v. Rohr.

Affinis praecedenti, a quo tamen differt thoracis dorso lineis duabus albis, elytris atomis albis irroratis apice subspinosis.

25. P. thorace marginato crenato, capite submandibulis spinoso scabro, mandibulis tridentatis. *spinibarbis.*

Cerambyx spinibarbis. Linn. Syst. nat. 2. 624. 4. Mus. Lud. Ulr. 67.

Merian Surinam. 24. tab. 24.

Habitat in America meridionali.

Mandibulae magnae, crassae, intus tridentatae, apiceque emarginatae.

26. P. thoracis lateribus scabris multidentatis: dente posteriori palmato, antennis brevibus. *palmatus.*

Habitat in Guinea Mus. Dom. Banks.

Statura & magnitudo P. spinibarbis. Caput canaliculatum, nigrum. Antennae breves, compressae, obscure piceae. Thoracis dorsum planum, laeve, nitidum, lateribus scabris: margine multidentato; dente tertio ante apicem majori, palmato. Elytra laevia, picea, ad suturam apice mucronata. Pedes intus serrati.

27. P. thorace marginato crenato, mandibulis porrectis intus hirsutis quadridentatis. *maxillosus.*

Prionus maxillosus. Oliv. Ins. 66. tab. 1. fig. 3.

Cerambyx maxillosus. Drury Ins. 1. tab. 38. fig. 3.

Habitat in America Mus. Britann.

Minor P. melanopo, totus ater, nitens. Mandibulae porrectae, acutae, intus hirsutae,

apice tridentatae baſique unidentatae. Elytra apice mucronata.

canaliculatus. 28. P. thorace marginato crenato: canali dorſali albo villoſo, antennis brevibus.
Habitat in Americae Inſulis Muſ. Dr. Hunter.
Antennae breves, compreſſae, nigrae. Caput canaliculatum, nigrum, immaculatum. Thoracis dorſum canali albo villoſo. Scutellum albo villoſum. Elytra ſubſcabra. Pedes nigri.

cinnamomeus. 29. P. thorace marginato denticulato, mandibulis porrectis tridentatis.
Cerambyx cinnamomeus. Linn. Syſt. nat. 2. 623. 10. Muſ. Lud. Ulr. 66.
Oliv. Inſ. 66. tab. 5. fig. 18.
Drury Inſ. 1. tab. 40. fig. 2.
Sulz. Inſ. tab. 5. fig. 2.
Merian Surinam tab. 24.
Habitat in America meridionali.
Duplo minor P. cervicorni.

melanopus. 30. P. thorace marginato dentato, mandibulis porrectis multidentatis, elytris mucronatis.
Cerambyx melanopus. Linn. Syſt. nat. 2. 623. 8.
Cerambyx crenulatus. Drury Inſ. 1. tab. 38. fig. 2.
Merian Surinam. tab. 24. fig. 1.
Habitat in America meridionali.
Affinis P. maxilloſo.

ſpinoſus. 31. P. thorace multidentato nigro, elytris unidentatis teſtaceis.
Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.
Caput canaliculatum. Antennae breves, compreſſae, nigrae. Thorax vix marginatus, ſubtus cinereo hirtus dorſo canaliculato.

barbatus. 32. P. thorace marginato integro, mandibulis ferrugineo hirſutiſſimis, antennis mediocribus.

Habitat in America meridionali Muſ. Dom. Banks.
Antennae ſcabrae: articulo ultimo compreſſo, laevi. Caput atrum mandibulis porrectis labiisque ferrugineo hirſutiſſimis. Elytra picea. Abdomen villoſo album. Pedes nigri.

33. P. thorace ſubmarginato mutico teſtaceus, antennis brevibus pectinatis. Oliv. Inſ. 66. tab. *pectinicornis.*
Habitat in Senegalia Muſ. Geoffroy.
Reliquis minor & thorax minus marginatus, muticus, totus teſtaceus. Antennae corpore breviores, valde pectinatae. Mandibulae exſertae, in medio unidentatae.

83. CERAMBYX. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla obtuſa, unidentata.
Labium bifidum.
Antennae ſetaceae.

1. C. thorace ſpinoſo viridis nitens antennis mediocribus cyaneis. *moſchatus.*
Cerambyx moſchatus. Linn. Syſt. nat. 2. 627. 34. Fn. Sv. 652.
Cerambyx moſchatus. Oliv. Inſ. 67. tab. 2. fig. 7.
Cerambyx odoratus. Degeer Inſ. 5. 64. 2.
Geoff. Inſ. 1. 103. 5.

Cerambycis corpus oblongum, anguſtum, depreſſiuſculum, glabrum, immarginatum, tardum, capite ovato, inſerto, oculis parvis, rotundatis, lateralibus, antennis elongatis, inter oculos inſertis, thorace rotundato, plano, inaequali, utrinque ſpinoſo, ſcutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus longiuſculis, curſoriis, femoribus compreſſis, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

Geoff. Inf. 1. 103. 5.
Frifh. Inf. 13. tab. 11.
Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 7. tab. 55. fig. 1.
Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 14.
Habitat in Europae Salice.

virens. 2. C. thorace rotundato ſpinoſo, corpore viridi, femoribus rufis.
Cerambyx virens. Linn. Syſt. nat. 2. 627. 33.
Oliv. Inf. 67. tab. 11. fig. 78.
Drury Inf. 1. tab. 40. fig. 1.
Brown Jamaic. tab. 43. fig. 8.
Habitat Larva in truncis Amyris balſamiferae. Imago Eugeniam Jambos ſpirat. Dr. Schwarz.
Variat antennis corpore longioribus & brevioribus, femoribus dentatis & muticis.

nitens. 3. C. thorace rotundato ſubſpinoſo viridi nitens femoribus clavatis: clava anticorum rufa.
Cerambyx nitens. Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 107.
Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 15.
Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. Dom. Banks.
Antennae corpore duplo longiores, nigrae. Thorax ſubſpinoſus. Corpus totum viride, nitens. Pedes nigri femoribus omnibus clavatis, clava quatuor anteriorum ferruginea. Tibiae poſticae compreſſae.

afer. 4. C. thorace rotundato ſpinoſo, corpore viridi, antennis pedibusque rufis.
Cerambyx afer. Linn. Mant. 532.
Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 4.
Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 141.
Habitat in Africa Dr. Solander.
Duplo minor C. virente. Frons retuſa. Antennae corpore vix longiores, rufae. Thorax ſpinoſus, rugoſus. Elytra attenuata, viridia futura niti-

diore. Pedes omnes rufi femoribus quatuor anticis clavatis.

5. C. thorace ſpinoſo viridi, elytris violaceis baſi viridibus, femoribus ferrugineis unidentatis. *feſtivus.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 7. fig. 44. tab. 18. fig. 44.
Habitat ad fluvium Gaboon Africae Muſ. Dom. Banks.
Antennae mediocres, nigrae primo articulo rufo. Labium ſuperius ſubrufum. Thorax utrinque ſpinis duabus obtuſis: poſteriori majori. Femora unidentata, ferruginea. Tibiae fuſcae.

6. C. thorace ſpinoſo viridis nitens thorace elytrisque nigro lineatis. *vittatus.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 2. fig. 10.
Voet. Coleopt. 2. tab. 10. fig. 41.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.
Antennae mediocres, nigrae. Thorax ſpinoſus, inaequalis lineis duabus dorſalibus, atris. Elytra obtuſa, viridia lineis duabus longitudinalibus, atris. Femora inermia, rufa. Tibiae nigrae.

7. C. thorace ſpinoſo niger: vitta atra. *velutinus.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 6. fig. 41.
Voet Coleopt. 2. tab. 10. fig. 40.
Habitat in America Dr. Schulz.
Antennae mediocres. Corpus nigrum. Elytra obtuſa, nigra vitta dorſali velutina, atra. Tibiae poſticae compreſſae, apice ſpinoſae.

8. C. thorace ſpinoſo holoſericeo ater elytris futura vittaque viridibus, femoribus rufis. *ſericeus.*
Cerambyx ſericeus. Oliv. Inſ. 67. tab. 5. fig. 37.
Habitat in Braſilia Muſ. Dr. Olivier.
Antennae mediocres, nigrae. Caput & thorax, atra, velutina, viridi nitido maculata. Pedes atri femoribus rufis, poſticis tantum ad dimidium. Tibiae poſticae compreſſae.

futuralis. 9. C. thorace ſpinoſo ater elytris futura vittaque media aureis.

Oliv. Inſ. 67. tab. 6. fig. 40.

Voet. Coleopt. 2. tab. 10. fig. 42. 43.

Habitat in America meridionali Dr. Hunter.

Antennae mediocres, nigrae. Corpus atrum quaſi velutinum abdomine ſubtus coeruleſcente, nitido. Elytra atra futura dorſali vittaque media, quae poſtice coeunt, aureis. Pedes nigri femoribus clavatis, poſtici femoribus tibiisque compreſſis.

elegans. 10. C. thorace ſpinoſo capiteque viridi aeneis nitidis, elytris obſcuris, antennis longis pedibusque rufis.

Cerambyx elegans. Oliv. Inſ. 67. tab. 5. fig. 35.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Muſ. Dom. Olivier.

Statura omnino C. afer. Antennae corpore duplo longiores, rufae. Caput & thorax viridi aenea, nitida. Elytra obſcura. Corpus pubeſcens, rufo aureum. Pedes rufi poſticis compreſſis.

latipes. 11. C. thorace ſpinoſo depreſſo vireſcens elytris cupreis, tibiis compreſſo dilatatis.

Cerambyx latipes. Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 116.

Cerambyx latipes thorace ſpinoſo viridi aeneo, antennis medioribus, elytris obſcure purpureis, tibiis poſticis latiſſimis compreſſis. Degeer Inſ. 7. 655. 60. tab. 49. fig. 3.

Fyeſl. Arch. 7. 1. 169. 12. tab. 45. fig. 11.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei.

Statura C. moſchati. Antennae mediocres, vireſcentes. Elytra cuprea margine parum vireſcente.

12. C. thorace ſubſpinoſo cyaneo viridis antennis longioribus, femoribus clavatis. *longipes.*
Saperda longipes Mant. Inſ. 1. 148. 16.
Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 3.
Cerambyx ſuſiformis. Degeer Inſ. 7. 657. 62. tab. 49. fig. 7.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Antennae corpore duplo longiores, cyaneae, apice obſcurae. Pedes elongati, cyanei femoribus clavatis. Thorax & elytra magis viridia.

13. C. thorace ſpinoſo ater elytris maculis tribus linearibus albis, antennis brevibus. *interruptus*
Cerambyx interruptus. Oliv. Inſ. 67. tab. 17. fig. 133.
Habitat — — Muſ. Dr. Olivier.
Antennae corpore breviores. Corpus atrum. Elytra macula lineari baſeos duabusque in medio transverſis, albis. Pedes poſtici longiores tibiis compreſſis.

14. C. thorace ſpinoſo rugoſo niger elytris rotundatis, antennis longis. *Cerdo.*
Cerambyx Cerdo. Linn. Syſt. nat. 2. 629. 39.
Cerambyx Cerdo. Oliv. Inſ. 67. tab. 10. fig. 65.
Geoff. Inſ. 1. 201. 2.
Voet. Coleopt. 2. tab. 4. fig. 5.
Habitat in Europa.

15. C. thorace ſpinoſo rugoſo niger elytris ſubſpinoſis piceis, antennis longis. *Heros.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 1. fig. 1.
Geoff. Inſ. 1. 200. 1.
Friſh. Inſ. 1. 13. tab. 8.
Drury Inſ. 1. tab. 49. fig. 1.
Voet. Coleopt. 2. tab. 5. fig. 9.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 141. 358.
Habitat in Europae Quercu.

ſpinicornis. 16. C. thorace ſubſpinoſo niger, elytris viridibus apice ſpinoſis.

Cerambyx torridus. Oliv. Inſ. 67. tab. 14. fig. 95.

Habitat in Sierra Leon Africae Muſ. D. Banks.

Antennae longae, nigrae articulo 3. 4. 5. 6. apice ſpinoſis. Thorax niger utrinque tuberculis tribus: lateralibus obtuſis. Elytra viridia, nitida, apice ſpina acuta armata. Pedes nigri femoribus clavatis, ſubferrugineis.

ater. 17. C. thorace ſubſpinoſo ater antennis mediocribus rufo nigroque annulatis.

Oliv. Inſ. 70. tab. 3. fig. 32.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Olivier.

Praecedentibus paullo minor. Antennae mediocres articulis baſi rufis, apice nigris. Corpus atrum pectore cinereo, nitido. Pedes nigri femoribus baſi rufeſcentibus, poſtici elongati.

Batus. 18. C. thorace rugoſo ſubſpinoſo, elytris apice ſpinoſis, antennis longis uncinato aculeatis.

Cerambyx Batus. Linn. Syſt. nat. 2. 615. 20. Muſ. Lud. Ulr. 69.

Oliv. Inſ. 67. tab. 5. fig. 32.

Muſ. Petrop. 652. 154.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis.

C. Heros paullo minor, fuſcus.

ferrugineus. 19. C. thorace acute ſpinoſo rugoſo niger elytris ferrugineis, antennis longis.

Cerambyx ferrugineus. Linn. Syſt. nat. 2. 626. 25. Muſ. Lud. Ulr. 70.

Oliv. Inſ. 67. tab. 18. fig. 134.

Cerambyx gigas. Mant. Inſ. 1. 132. 20.

Habitat in India orientali Dom. de Schlanbuſch.

Corpus totum nigrum elytris ferrugineis.

20. C. thorace ſpinoſo, coleoptris faſcia maculisque quatuor atris, antennis longis. *alpinus.*
Cerambyx alpinus. Linn. Syſt. nat. 2. 628. 35.
Fn. Sv. 654.
Oliv. Inſ. 67. tab. 9. fig. 58.
Geoff. Inſ. 1. 202. 4.
Scheuhz. Itin. 1. tab. 1. fig. 5.
Sulz. Inſ. tab. 4. fig. d.
Drury Inſ. 2. tab. 31. fig. 5.
Voet. Coleopt. 2. tab. 9. fig. 38.
Habitat in Europae montoſis.

21. C. thorace ſpinoſo fuſcus: linea longitudinali alba, antennis longis. *ſcalaris.*
Habitat in America meridionali Dom. Banks.
Antennae corpore triplo longiores. Caput fuſcum orbita oculorum lineaque dorſali albis. Thorax acute ſpinoſus, fuſcus linea dorſali alba. Elytra fuſca puncto medio futuraque dentata albis. Pedes fuſci.

22. C. thorace ſpinoſo viridi aeneus elytris teſtaceis, antennis brevibus. *ebulinus.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. D. Hunter.
Antennae breves, ſerratae, nigrae. Thorax inaequalis, immaculatus.

23. C. thorace biſpinoſo rugoſo ater antennis longioribus ferrugineis. *Morio.*
Habitat Cajennae Dr. Hunter.
Antennae corpore duplo longiores articulis cylindricis, ferrugineis 1. 2. totis, 3. 4. 5. baſi nigris. Thorax rugoſus utrinque ſpinis duabus: poſteriore majore. Elytra laevia, baſi impreſſa, apice truncata.

24. C. thorace ſpinoſo niger elytris ſanguineis: macula nigra. Linn. Syſt. nat. 2. 631. 50. *Kaehleri.*
Geoff. Inſ. 1. 204. 6.

Oliv. Inſ. 67. tab. 3. fig. 13.
Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 1. tab. 153. fig. 4.
Herbſt Arch. 9. tab. 25. fig. 6.
Habitat in Europa auſtraliori.
Thorax variat immaculatus & macula laterali ruſa. Elytra apice emarginata.

Lundii. 25. C. thorace ſpinoſo ſanguineus antennis elytrorum apicibus abdomine pedibusque nigris.
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.
Statura & magnitudo praecedentis. Antennae breves, nigrae. Caput ſanguineum mandibulis nigris. Thorax gibbus, ſpinoſus, ſanguineus, immaculatus. Scutellum atrum. Elytra laevia, ſanguinea, apice late atra. Pectus ſanguineum. Abdomen nigrum tuberculo acuto, rufo inter pedes ſecundi paris. Pedes atri femoribus ſubclavatis.

Desfontainii. 26. E. thorace ſpinoſo ſanguineo nigro maculato ater elytris ſanguineis baſi apiceque atris, antennis longiſſimis.
Habitat in Barbaria Muſ. Dom. Desfontaines.
Statura omnino C. Kaehleri. Caput atrum antennis longiſſimis. Thorax ſpinoſus, ſanguineus maculis baſeos medioque interdum lineis nigris. Elytra laevia macula baſeos parva, apicis magna atris. Corpus atrum immaculatum.

ſuccinctus. 27. C. thorace biſpinoſo rugoſo, elytris faſcia flava, antennis longioribus compreſſis. Linn. Syſt. nat. 2. 627. 32. Muſ. Lud. Ulr. 72.
Cerambyx fuſco caſtaneus. Degeer Inſ. 5. 113. 14. tab. 14. fig. 5.
Oliv. Inſ. 68. tab. 7. fig. 43.
Drury Inſ. 1. tab. 39. fig. 2.
Voet. Coleopt. 2. tab. 7. fig. 17.
Habitat in America, Braſilia.

28. C. thorace ſubſpinoſo rugoſo ferrugineus elytris flavo ſtriatis, antennis longis. Oliv. Inſ. 67. tab. 10. fig. 71. *ſtriatus.*

Habitat Cajennae Muſ. Dr. Hunter.

Antennae cylindricae, corpore duplo longiores, ferrugineae, apice nigrae. Caput ferrugineum punctis tribus verticalibus nigris. Thorax rugoſus utrinque ſpinis duabus, fere aequalibus, ferrugineis, nigro punctatus. Scutellum apice nigrum. Elytra laevia, ferruginea ſtriis quatuor flavis, quae apicem haud attingunt & quinta ſuturali, abbreviata. Femora apice nigra.

29. C. thorace biſpinoſo ruſo, elytris laevibus nigris, antennis longis. *ruſipes.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 1. fig. 3. tab. 13. fig. 89.

Habitat in America meridionali Muſ. Dr. Hunter.

Antennae corpore longiores, flaveſcentes articulorum apicibus ferrugineis. Thorax biſpinoſus ſpina poſteriore validiore. Elytra glabra, nitida puncto magno baſeos impreſſo. Pedes flaveſcentes femoribus apice nigris. Abdomen nigrum.

30. C. thorace biſpinoſo rugoſo flavus nigro punctatus elytris nigris baſi flavis, antennis mediocribus. *dimidiatus.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 14. fig. 96.

Habitat Cajennae Muſ. Dr. Hunter.

Antennae flavae. Caput flavum punctis tribus verticalibus, flavis. Thorax ſpinis duabus poſteriore majore flavus, nigro punctatus. Scutellum flavum, apice nigrum. Elytra glabra, nitida, atra, baſi ad futuram flava. Corpus flavum abdomine dimidiato, atro. Pedes flavi.

bicolor. 31. C. thorace biſpinoſo tuberculatoque ferrugineus elytris ultra dimidium abdomineque atris.
Oliv. Inſ. 67. tab. 9. fig. 61.
Voet Coleopt. 2. tab. 8. fig. 24.
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Antennae mediocres, baſi ferrugineae, in medio flavae, apice fuſcae. Caput ferrugineum gula prominente, acuta. Elytra baſi ferruginea puncto magno impreſſo, apice atra. Pedes ferruginei.

depreſſus. 32. C. thorace multiſpinoſo depreſſus niger cinereo variegatus elytris acuminatis, antennis longis.
Oliv. Inſ. 67. tab. 5. fig. 30.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 5.
Voet Coleopt. tab. 13. fig. 55. 56.
Habitat in Americae Inſulis Dom. Banks.
Caput nigrum maculis impreſſis, cinereo villoſis. Thorax utrinque ſpinis quatuor ant quinque brevibus, approximatis villis cinereis variegatus. Elytra ſtriata, acuminata, nigra maculis cinereis & in his puncta atra. Pedes atri.

faſciatus. 33. C. thorace ſpinoſo cyaneus elytris faſcia flava, antennis mediocribus ante apicem flavis.
Oliv. Inſ. 67. tab. 1. fig. 4.
Pall. Inſ. tab. F. fig. 4.
Voet. Colecpt. 2. tab. 11. fig. 49.
Herbſt Arch. 5. tab. 25. fig. 3.
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.
Antennae compreſſae, cyaneae articulis quatuor penultimis flavis, ultimo cyaneo. Pedes cyanei, poſtici compreſſi.

barbicornis. 34. C. thorace ſpinoſo, antennarum quatuor primis articulis nigro barbatis, corpore teſtaceo nigro variegato. Linn. Syſt. nat. 2. 625. 18.
Oliv. Inſ. 67. tab. 7. fig. 48.

Voet. Coleopt. 2. tab. 9. fig. 37.
Habitat in India orientali.

35. C. thorace ſpinoſo, elytris punctis faſciisque nigris, antennis longioribus. Linn. Syſt. nat. 2. 627. 29. Fn. Sv. 650. *nebuloſus.*
Oliv. Inſ. 66. tab. 7. fig. 47.
Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 9.
Voet. Coleopt. 2. tab. 4. fig. 4.
Geoff. Inſ. 1. 204. 7.
Degeer Inſ. 5. 71. 8.
Sulz. Inſ. tab. 4. fig. c.
Habitat in Abietum truncis.

36. C. thorace ſpinoſo fulvo villoſo, elytris nigris: macula poſtica villoſa fulva, antennis mediocribus. *obſcurus.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.
Statura & magnitudo C. nebuloſi. Antennae longitudine corporis: articulis baſeos ferrugineis. Caput & thorax fulvo villoſa, immaculata. Elytra ſubſcabra, nigra macula poſtica villoſo fulva. Pedes nigri tibis flaveſcentibus.

37. C. thorace ſpinoſo fuſco, elytris laevibus: faſciis griſeis nigro punctatis, antennis longiſſimis. *griſeus.*
Habitat in Germania D. de Loewenſkiold.
Nimis affinis C, nebuloſo at major. Antennae corpore triplo longiores: articulis baſi cinereis, apice nigris. Caput & thorax fuſca, vix maculata. Elytra obſcura faſcia baſeos, media apicisque cinereis, nigro punctatis. Sutura punctata. Corpus cinereum. Femora nigro punctata. Tibiae apice nigrae.

38. C. thorace ſpinoſo griſeus elytris lineis elevatis nigro punctatis apice fuſcis, antennis longiſſimis. *coſtatus.*

Habitat in Germania Dom. de Loewenſkiold.
Statura & ſumma affinitas praecedentis. Antennae corpore duplo longiores, nigrae articulis baſi albidis. Caput & thorax griſea thorace uniſpinoſo. Elytra punctata lineis elevatis quatuor nigro punctatis, quae tamen apicem haud attingunt, baſi griſea, apice fuſca. Pedes griſei.

faſciculatus. 39. C. thorace ſpinoſo, elytris integris: punctis tribus hiſpidis, antennis medicoribus hirtis. Panz. Naturf. 24. 26. 34. tab. 1. fig. 44.
Habitat in Germania Dom. Hybner.
Caput & thorax fuſca. Elytra baſi pallidiora, apice omnino integra. Pedes griſei.

hiſpidus. 40. C. thorace ſpinoſo, elytris baſi albidis apice bidentatis, antennis mediocribus hirtis. Linn. Syſt. nat. 2. 627. 30. Fn. Sv. 651.
Geoff. Inſ. 1. 206. 9.
Oliv. Inſ. 67. tab. 11. fig. 77.
Schaeff. Icon. tab. 176. fig. 5.
Friſh. Inſ. 13. tab. 16.
Degeer Inſ. 5. 71. 9. tab. 3. fig. 17.
Habitat in Europa boreali.

piloſus. 41. C. thorace biſpinoſo, elytris griſeis apice unidentatis, antennis mediocribus hirtis.
Oliv. Inſ. 67. tab. 9. fig. 60.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Praecedente minor. Elytra punctis tribus elevatis hiſpidis griſea baſi parum pallidiora, apice unidentata.

balteatus. 42. C. thorace ſubſpinoſo brunneus elytris faſcia fuſca.
Cerambyx balteatus. Linn. Syſt. nat. 2, 627. 31.
Oliv. Inſ. 67. tab. 17. fig. 124.
Habitat in Luſitania.

Statura & magnitudo praecedentium. Antennae breves. Thorax ſpina obtuſa ſive potius angulo prominente. Elytra faſcia lata, fuſca.

43. C. thorace inermi rugoſiſſimo niger antennis mediocribus pedibusque piceis. *rugicollis.*

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Antennae compreſſae, piceae. Elytra nigra, apice obtuſa & fere truncata. Pedes picei.

44. C. thorace mutico rufus elytris teſtaceis: macula nigra, antennis brevibus. 2 *maculatus*

Habitat in India orientali Muſ. Dom. Lund.

Medius. Antennae villoſae, rufae, corpore breviores. Caput & thorax villoſa, rufa, immaculata. Thorax inaequalis, tuberculatus, at haud ſpinoſus. Elytra punctata, teſtacea macula magna ante medium nigro violacea. Pedes teſtacei.

45. C. thorace ſubſpinoſo rufus elytris teſtaceis baſi atro cyaneis, antennis brevibus. *ſplendidus.*

Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.

Statura & magnitudo omnino C. 2 maculati. Antennae breves, baſi rufae, medio teſtaceae, apice fuſcae. Caput punctatum, rufum, immaculatum. Thorax rotundatus, punctatus, rufus utrinque ſpina brevi, obtuſa. Elytra ſtriis tribus elevatis laevibus: teſtacea baſi late atro cyanea. Corpus villoſum, rufum abdomine ſubtus dente prominulo canali thoracis correſpondente. Pedes rufi.

46. C. thorace inermi: dorſo plano, corpore fuſco griſeoque vario, antennis longiſſimis. *longicornis*

Habitat in Coromandel Muſ. Dom. Banks.

Antennae corpore triplo longiores, nigrae articulis baſi cineraſcentibus. Caput cinereum baſi lineaque laterali nigris. Thorax omnino iner-

mis dorſo plano & fere impreſſo, fuſco cinereoque varius. Elytra punctato ſtriata. Corpus cinereum.

marginalis 47. C. thorace inermi, elytris ſubteſtaceis: margine omni nigro,
Habitat ad Cap Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Antennae mediocres, piceae. Caput fuſcum. Thorax ovatus, fuſcus margine antico & poſtico nigris. Elytra laevia, ſubteſtacea futura margineque tenuiſſime nigris. Pedes nigricantes.

brevicornis 48. C. thorace inermi viridi, elytris obſcuris, antennis brevibus nigris.
Oliv. Inſ. 70. tab. 2. fig. 22.
Habitat in Sierra Leon Africae Muſ. D. Banks.
Caput viride antennis brevibus, compreſſis, nigris. Thorax punctatus, viridis, nitens. Elytra laevia, viridia, obſcura. Pedes nigri femoribus clavatis, anticis quatuor rufis, poſticis viridibus.

invencus. 49. C. thorace inermi rugoſo, elytris acuminatis nigris lanuginoſo caneſcentibus, antennis longiſſimis. Linn. Syſt. nat. 2. 631. 53.
Habitat in America.
Antennae corpore ſeſquilongiores. Thorax valde rugoſus.

holoſericus. 50. C. thorace inermi rugoſo griſeus elytris unidentatis holoſericeis fuſco cinereoque micantibus, antennis medicoribus.
Oliv. Inſ. 62. tab. 17. fig. 127.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Lund.
Caput griſeum. Thorax inermis, rugoſiſſimus, obſcurus. Elytra uniſpinoſa, holoſericea, fuſco cinereoque micantia, nitida. Corpus ſubtus micans.

51. C. thorace inermi ſubrugoſo cinereus immaculatus antennis longiſſimis. *cinereus.*

Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.

Statura elongata praecedentium. Antennae corpore duplo longiores, cineraſcentes. Caput magnum, prominens, cinereum. Elytra apice obtuſa & fere emarginata. Corpus cinereum.

52. C. thorace inermi elongato cylindrico niger ferrugineo irroratus antennis longiſſimis. *longicollis.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 11. fig. 73.

Habitat in India orientali Muſ. Dom. Lund.

Caput fuſcum antennis corpore duplo longioribus. Thorax elongatus, cylindricus, antice parum anguſtatus, nigricans. Scutellum ferrugineum. Elytra nigra, ferrugineo irrorata. Pedes fuſci tibiis quatuor anticis apice unidentatis. Digiti antici ſubtus villoſi.

84. LAMIA. *Palpi* quatuor filiformes. *Maxillà* cornea, bifida. *Labium* corneum, bifidum. *Antennae* ſetaceae.

1. L. thorace acute ſpinoſo rugoſo, elytris cinereis: macula marginali nigra, baſi bituberculatis ſcabris, antennis longis. *gigas.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 23. fig. 91.

Lamiae corpus cylindricum, rotundatum, glabrum, immarginatum, tardum, capite magno, obtuſo, declivi, inter antennas canaliculato, oculis magnis, rotundatis, lateralibus, prominulis, antennis elongatis, approximatis, inter oculos inſertis, thorace cylindrico, ſpinoſo, inaequali, ſcutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus validis, curſoriis, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

Habitat in Guinea Muſ. Dom. Banks.

Magna. Antennae corpore duplo longiores, pallide teſtaceae. Caput magnum, obſcurum mandibularum margine laterali excavato. Thorax rotundatus, rugoſus ſpina utrinque valida, erecta, acuta. Elytra griſea macula magna laterali nigra, baſi punctis elevatis ſcabra tuberculisque duobus magnis oblongis, obtuſis, apice acuminata. Corpus fuſcum. Tibiae ſecundi paris unidentatae.

Tribulus. 2. L. thorace quadriſpinoſo, ſcutello elytrisque ſpinoſis, antennis longioribus.

Oliv. Inſ. 67. tab 14. fig. 100.

Habitat ad fluvium Gaboon Africae Dr. Solander.

Antennae corpore longiores, fuſcae articulis baſi cinereis. Caput fuſco cinereoque varium. Thorax rotundatus ſpinis quatuor erectis: lateralibus acutioribus. Puncta duo cinerea ad baſin ſpinarum intermediarum. Scutellum parvum, rotundatum denticulis duobus, brevibus, erectis. Elytra fuſco cinereoque variegata, baſi verſus marginem exteriorem gibbere biſpinoſo armata, verſus futuram ſpinae duae, validae, erectae, acutae. In medio elytri ſpina ſenſim elevata, recumbens, acuta. Apex acuminatus denticulo brevi, acuto. Pedes fuſco nigroque variegati. Tibiae intermediae apice tuberculo parvo notantur.

frontícornis 3. L. thorace ſpinoſo, frontis cornu porrecto apice emarginato recurvo, antennis longis.

Cerambyx 2 punctatus. Drury Inſ. 2. tab. 31. fig. 2.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Antennae longae, fuſcae articulis apice nigris. Caput fuſcum mandibulis atris, nitidis. Frontis cornu porrectum, craſſum, fuſcum, ſupra planum, hirtum, apice late emarginatum apicibus recurvis, atris. Thorax ſpinoſus, ſubrugoſus, fuſcus, ſupra immaculatus, ſubtus vero utrinque linea lata, alba. Elytra fuſca, glabra baſi punctis aliquot elevatis ſcabra, ante medium maculae duae ocellares, atrae, exteriori minori & pone hanc macula major, albida. Abdomen & pedes fuſca.

4. L. thorace elytrisque ſpinoſis, femoribus anticis cornutis. *pedicornis.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 119.

Habitat in nova Hollandia Muſ. D. Banks.

Caput griſeum antennis villoſis, mediocribus. Thorax rotundatus, griſeus ſpinis ſex brevibus, dorſalibus, erectis. Scutellum inerme. Elytra griſea macula marginali lunata faſciaque media cinerea. Spinae plurimae, breves, erectae, atrae ad baſin. Pedes griſei, femoribus anticis cornu elongato, arcuato, acuto.

5. L. thorace quinqueſpinoſo, elytris faſciculato piloſis, antennis mediocribus ſerratis. *hyſtrix.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 15. fig. 110.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Antennae piloſae, apice valde ſerratae, teſtaceae articulis apice fuſcis. Caput piloſum, griſeum. Thorax ſpinis quinque erectis, validis, atris: intermedia paullo minori. Praeterea tubercula duo elevata, atra ante ſpinam intermediam. Elytra faſciculato piloſa, carneo fuſcoque variegata. Corpus parvum, cinereum.

criſta. 6. L. thorace acute ſpinoſo griſea elytris baſi tuberculo compreſſo tridentato.
Oliv. Inſ. 67. tab. 14. fig. 101.
Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae corpore paullo longiores, cinereae articulis apice nigris. Thorax utrinque ſpina acuta armatus & ſub ſpina punctum fulvum. Elytra antice griſea tuberculo magno, compreſſo, tridentato, poſtice pallida ſtriga parva, obliqua, nigra. Femora clavata, nigra: clava griſea. Tibiae griſeae, apice nigrae.

ambulator. 7. L. thorace antice utrinque biſpinoſo, corpore nebuloſo.
Petiv. Gazoph. tab. 37. fig. 6.
Habitat in Inſulis Luzonum Muſ. Britann.
Antennae teſte Petiverio mediocres. Thorax caſtaneo cinereoque nebuloſus, antice ſpinis duabus brevibus una ſupra alteram armatus. Elytra cinereo caſtaneoque nebuloſa.

textor. 8. L. thorace ſpinoſo, elytris convexis atris, antennis mediocribus.
Cerambyx textor. Linn. Syſt. nat. 2. 629. 41. Fn. Sv. 656.
Geoff. Inſ. 1. 201. 3.
Oliv. Inſ. 67. tab. 6. fig. 39.
Degeer Inſ. 5. 64. 3.
Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 1.
Habitat in truncis arborum Europae.

vaginator. 9. L. thorace ſpinoſo rugoſo nigra elytris emarginatis ferrugineis, antennis mediocribus.
Habitat in India orientali Dom. Lund.
Antennae compreſſae, ferrugineae. Thorax rugoſus, acute ſpinoſus, niger. Scutellum cinereo villoſum. Elytra laevia, ferruginea, baſi gibba, apice emarginata. Subtus cinereo villoſa.

10. L. thorace ſpinoſo nigra elytris vitta ſemicir- *crucifera.*
culari punctoque marginali cinereis, antennis longis.
Oliv. Inſ. 67. tab. 10. fig. 68.
Habitat — — Muſ. Dom. Olivier.
Corpus magnum, obſcure nigrum. Antennae corpore duplo longiores. Thorax acute ſpinoſus utrinque linea obliqua, obſolete ferruginea. Elytra vitta lata cinerea, quae ad baſin incipit, in medio ad futuram excurrit & apicem tegit. Punctum parvum in medio marginis exterioris. Pedes nigricantes.

11. L. thorace ſpinoſo nigra antice faſciis poſtice *pulchra.*
punctis viridibus, elytris baſi mucronatis.
Cerambyx pulchra. Drury Inſ. 1. tab. 32. fig. 6.
Oliv. Inſ. 67. tab. 1. fig. 6.
Habitat in Africa Dom. Drury.
Pulcherrima, nitida. Antennae corpore paullo longiores, nigrae. Caput nigrum ſtriis tribus viridibus, quarum laterales oculos ambiunt. Thorax obtuſe ſpinoſus ſtrigis tribus viridibus, quarum intermedia curvata, & in curvatura ſtriga parva, abbreviata ejusdem coloris. Elytra punctata baſi denticulis duobus elevatis, truncatis mucronata, antice faſciis duabus, poſtice punctis numeroſis ſparſis viridi nitentibus. Subtus nigro viridique variegata.

12. L. thorace ſpinoſo viridi faſciato, elytris viridi *regalis.*
irroratis maculisque tribus fulvis.
Oliv. Inſ. 67. tab. 4. fig. 24.
Brown. Illuſtr. tab. 50. fig. 1.
Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.

Antennae corpore longiores, nigrae. Caput atrum, viridi lineatum maculaque ſuboculari fulva. Thorax ater faſciis tribus impreſſis, viridibus. Elytra ſubſtriata, nigra atomis numeroſiſſimis viridibus & praeterea maculis tribus fere marginalibus, fulvis. Subtus viridis abdomine utrinque linea punctorum fulvorum.

undata. 13. L. thorace mutico cinerea thorace faſcia elytris duabus undatis atris.

Oliv. Inſ. 671. tab. 4. fig. 26.

Habitat — — —

Magnitudo L. regalis. Antennae corpore longiores, nigrae. Thorax muticus, griſeus faſcia media, atra. Elytra griſea faſciis duabus undatis, atris.

irrorata. 14. L. thorace ſpinoſo fuſco ferrugineoque vario, elytris nigris ferrugineo irroratis, antennis mediocribus.

Voet. Coleopt. 2. tab. 7. fig. 18.

Habitat in India orientali Muſ. Dom. Lund.

Corpus medium. Antennae mediocres, cineraſcentes. Caput fuſco ferrugineoque varium mandibulis atris, nitidis. Thorax ſpinoſus, fuſcus, ferrugineo varius. Scutellum ferrugineum. Elytra fuſca, ferrugineo irrorata, apice acuminata. Corpus & pedes variegata.

nigricornis. 15. L. thorace mutico griſea elytris dorſo planis, antennis brevibus nigris.

Habitat in Coromandel Muſ. Dom. Banks.

Corpus griſeum, ſupra teſtaceo mixtum. Elytra dorſo plana punctis aliquot marginalibus baſeos atris, impreſſis, apice obtuſa & fere truncata.

aedilis. 16. L. thorace ſpinoſo: punctis quatuor luteis, elytris obtuſis nebuloſis, antennis longis.

Cerambyx aedilis. Mant. Inſ. 1. 130. 1. Linn. Syſt. nat. 2. 628. 37. Fn. Sv. 653.
Oliv. Inſ. 67. tab. 9. fig. 59.
Degeer Inſ. 5. 66. 5. tab. 4. fig. 1. 2.
Friſh. Inſ. 13. tab. 12.
Sulz. Inſ. tab. 4. fig. 27.
Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 7.
Habitat in Truncis arborum Europae borealis.

17. L. thorace ſpinoſo tuberculatoque cinerea elytris fuſco variis punctis elevatis nigris ſcabris, antennis longis. *atomaria.*
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura omnino L. aedilis at minor. Antennae corpore longiores, cinereo nigroque variae. Thorax ſpinoſus dorſoque quadrituberculato. Elytra cinereo fuſcoque varia lineis quatuor elevatis poſtice coeuntibus, quae tamen apicem haud attingunt punctisque numeroſis, elevatis, atris irrorata. Corpus cinereum atomis nigris, numeroſis.

18. L. thorace ſpinoſo tuberculatoque, corpore nigro cinereoque vario, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Cer. nebuloſus Pz. 4-71.* *varia.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 3. fig. 16.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 142. 360.
Habitat in Europa auſtraliori Muſ. D. Zſchuck.
Antennae cinereo nigroque annulatae. Caput fuſcum. Thorax ſpinoſus dorſoque trituberculato. Elytra rotundata. Corpus ſubtus nigrum. Femora omnia clavata, nigricantia. Tibiae atrae cinereo annulatae. Tarſi cinerei.

19. L. thorace ſpinoſo tuberculatoque, elytris poroſis, antennis longis: articulo quinto unidentato. Linn. Syſt. nat. 2. 625. 22. *araneiformis.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 5. fig. 34.

Drury Inſ. 2. tab. 35. fig. 4
Sloan. Jamaic. 2. tab. 237. fig. 24.
Voet. Coleopt. 2. tab. 9. fig. 33. 34.
Habitat in America meridionali.

punctata. 20. L. thorace ſpinoſo fuſca albo punctata.
Oliv. Inſ. 67. tab. 6. fig. 42.
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Olivier.
Statura & magnitudo omnino L. aedilis. Antennae mediocres, nigrae. Caput nigrum punctis duobus ſupra labium duobusque verticalibus, albis. Thorax ſpinoſus tuberculatusque punctis duobus majoribus utrinque ad marginem quatuorque parvis dorſalibus albis. Elytra nigra punctis albis ſparſis.

nodoſa. 21. L. thorace ſpinoſo, elytris cinereis nigro maculatis, antennis longiſſimis: articulo tertio apice nodoſo.
Oliv. Inſ. 67. tab. 14. fig. 103.
Habitat in Marylandia Muſ. Britann.
Antennae corpore quadruplo longiores: articulo tertio gibbere rotundato, obtuſo, prominente. Elytra plana, rotundata, cinerea maculis aliquot oblongis, nigris, baſi punctata.

cancriformis. 22. L. thorace multidentato: dorſo plano, elytris tibiisque anticis unidentatis.
Cerambyx puſtulatus. Drury Inſ. 2. tab. 35. fig. 1.
Habitat in Jamaica.
Antennae longiores articulo primo apice unidentato. Thorax cinereus dorſo valde explanato, margine dentibus quinque vel ſex minoribus, in duabus ſeriebus digeſtis. Elytra cinerea, punctis elevatis fuſcis irrorata, apice unidentata. Femora clavata tibiis anticis unidentatis.

23. L. thorace ſpinoſo tuberculatoque, elytris punctatis ſpinoſisque, antennis longis. *tuberculata.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 114.
Habitat in Jamaica Muſ. Dr. Hunter.
Corpus griſeum elytris faſcia angulata alba. Antennae fuſcae articulis apice cinereis. Mandibulae atrae. Thorax tuberculis plurimis, elevatis, obtuſis. Elytra punctata ſpinisque plurimis, elevatis, acutis, atris. Pedes nigri tibiis annulo albo.

24. L. thorace acute dentato: dorſo bicarinato, elytris cinereis fuſco ſtriatis maculatisque. *hebraea.*
Cerambyx hebraeus. Mant. Inſ. 1. 131. 7.
Oliv. Inſ. 67. tab. 15. fig. 106.
Habitat in America meridionali Dr. Hunter.
Antennae breves, nigrae. Thorax cinereus utrinque ſpina porrecta, valida, acuta, baſi anteriori unidentata, dorſo lineis duabus elevatis, atris, glabris. Elytra rotundata, cinerea ſutura ſtriisque tribus fuſcis & inter has ſtrias maculae plurimae, difformes ejusdem coloris. Pedes cinerei.

25. L. thorace acute ſpinoſo cinerea elytris ſpinoſis, antennis longis. *horrida.*
Cerambyx horridus. Oliv. Inſ. 67. tab. 4. fig. 29.
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Olivier.
Magnitudo & ſtatura L. Scorpio. Antennae longiores, cineraſcentes articulis apice nigris. Thorax cineraſcens ſpina valida, ſubarcuata, acuta. Elytra ſpinoſa, griſea.

26. L. thorace quadriſpinoſo, elytris tuberculato granulatis, tibiis anticis apice dilatatis. *Scorpio.*
Cerambyx Scorpio Mant. Inſ. 1. 131. 8.
Oliv. Inſ. 67. tab. 3. fig. 19.
Habitat in America meridionali Dr. Hunter.

Antennae breves, cinereae articulis apice nigris. Mandibulae atrae. Thorax cinereus ſpinis quatuor dorſalibus, elevatis, apice atris. Elytra cinerea tuberculis variis, elevatis, obtuſis, granis glabris, atris, nitidis adſperſis. Pedes breves, cinerei tibiis quatuor anticis apice dilatatis.

glauca. 27. L. thorace quinque ſpinoſo glauca: elytris muricatis latere faſciaque nigris, antennis longis.

Cerambyx glaucus. Mant. Inſ. 1. 131. 9. Linn. Syſt. nat. 2. 626. 28.

Degeer Inſ. 5. 7. 13. tab. 14. fig. 4.

Habitat in America.

Elytra apice unidentata.

bidentata. 28. L. thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis ſcabris cinereo fuſcis.

Cerambyx bidentatus. Mant. Inſ. 1. 131. 10.

Voet. Coleopt. 2. tab. 15. fig 62.

Habitat in America Dom. von Rohr.

Antennae longae, griſeae articulis apice fuſcis. Thorax inaequalis utrinque ſpina obtuſa. Elytra bidentata, punctis elevatis, acutis ſcabra. Femora clavata. Color cinereo fuſcoque nebuloſus.

ſcabra. 29. L. thorace ſpinoſo trituberculatoque, elytris baſi ſcabris apice bidentatis, antennis longiſſimis.

Oliv. Inſ. 67. tab. 17. fig. 128.

Habitat — — Muſ. Britann.

Antennae longiſſimae, baſi teſtaceae, apice cinereae. Mandibulae atrae. Thorax cinereus utrinque ſpina parva acuta & praeterea tuberculis tribus dorſalibus, elevatis. Elytra teſtacea baſi punctis elevatis, glabris. Corpus cinereum. Femora clavata.

30. L. thorace tuberculato, elytris punctatis cinereis apice bidentatis fuſcis, antennis longis. *praemorſa.*

Habitat in Inſula Guadeloupe de Badier.

Parva in hac familia. Antennae corpore duplo longiores, cinereae articulis apice fuſcis: primo elongato. Caput cinereum. Thorax punctatus, cinereus tuberculis dorſalibus tribus maculisque utrinque duabus baſeos nigris. Elytra punctata, cinerea punctisque aliquot elevatis, nigris ſcabra, apice bidentata: dente exteriori majori, fuſco. Pedes cinerei femoribus clavatis.

31. L. thorace ſpinoſo cinereo villoſa elytris bidentatis teſtaceis, antennis longis. *ſpinifera.*

Habitat in America meridionali. D. Pflug.

Media. Antennae obſcure cineraſcentes, corpore longiores. Caput & thorax villoſo cinerea thorace acute ſpinoſo. Scutellum ſubflaveſcens. Elytra laevia, teſtacea, apice acute bidentata. Corpus villoſo cinereum.

32. L. thorace mutico griſea elytris baſi tuberculis duobus apice ſpinoſis, antennis brevibus villoſis. *griſator.*

Habitat Tranquebariae Dom. de Schlanbuſch.

Elytra griſea baſi tuberculis duobus elevatis, compreſſis, apice pallidiora ſpinis aliquot elevatis, brevibus ſuturaque elevata, ſerrata. Abdomen & pedes griſea.

33. L. thorace ſpinoſo tuberculatoque griſea elytris baſi bituberculatis, antennis mediocribus. *aedificator.*

Habitat in India orientali Muſ. D. Lund.

Media. Antennae piloſae articulo primo elongato, craſſiori. Caput canaliculatum, cinereum labio rotundato, flaveſcente. Thorax utrinque ſpinoſus tuberculisque duobus. Elytra apice

truncata, pubeſcentia, griſea baſi angulo parum elevato, compreſſo, tuberculoque medio parvo, obtuſo. Pedes griſei.

amputator. 34. L. thorace ſpinoſo, elytris cinereis nigro irroratis maculisque numeroſis teſtaceis.

Habitat in Americae Inſulis ramos etiam craſſiores abſcindere dicitur. Muſ. Banks.

Media. Antennae longae, cinereae. Thorax ruga media elevata cinereus. Elytra cinerea punctis parvis, ſubelevatis, atris irrorata maculisque numeroſis, teſtaceis adſperſa. Corpus cinereum.

ſternutator. 35. L. thorace ſpinoſo, elytris baſi poroſis, antennis mediocribus.

Habitat in Inſula Barbados Dom. Drury.

Antennae nigricantes articulo ultimo acuto. Thorax inaequalis. Elytra obtuſa, nigra baſi punctis majoribus, inaequalibus adſperſa. Subtus tomento flavo tecta.

ſpinator. 36. L. thorace ſpinoſo elytrisque baſi daedaleis apice griſeis, antennis mediocribus.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.

Affinis certe praecedenti. Antennae nigrae, apice cinereae. Caput atrum. Thorax utrinque acute ſpinoſus: dorſo ſinubus daedaleis exarato. Elytra baſi nigra punctis majoribus daedaleis exarata, apice tomentoſa, griſea. Corpus griſeo nigrum.

guttutator. 37. L. thorace ſpinoſo, elytris teſtaceis albo irroratis: baſi punctis elevatis glabris.

Oliv. Inſ. 67. tab. 13. fig. 92.

Habitat in Africa Muſ. Britann.

Caput teſtaceum linea longitudinali nigra, glabra. Thorax teſtaceus ruga media transverſali, elevata. Elytra obtuſa, teſtacea atomis flavican-

tibus irrorata basi punctis aliquot elevatis, glabris, rubris.

38. L. thorace inermi ferrugineo nigro lineato, elytris fusco ferrugineoque variis: macula marginali cinerea, antennis mediocribus. *nebulosa.*

Oliv. Ins. 67. tab. 3. fig. 15.
Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 4.
Habitat in Germania Mus. Dom. Banks.
Antennae nigrae articulis basi cinereis. Caput & thorax ferruginea, nigro lineata. Elytra punctata, ferrugineo fuscoque varia macula magna cinerea in medio marginis exterioris. Pedes fusci.

39. L. thorace spinoso obscura elytris fascia postica repanda albida: basi punctis elevatis atris. *repandator.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Statura & magnitudo praecedentium. Antennae corpore longiores, fuscae. Caput & thorax obscura, immaculata. Elytra obscura basi punctis plurimis glabris, elevatis, atris anguloque parum elevato. In medio fascia postice repanda, albida. Abdomen albidum.

40. L. thorace spinoso lineato, elytris fuscis: linea semicirculari alba. *variolator.*

Habitat in Indiis.
Antennae corpore longiores. Thorax fuscus linea dorsali lateralique albis. Elytra obtusa, fusca linea alba, quae ab angulo humerali incipit, in medio cum sutura coit & versus apicem ad marginem exteriorem excurrit.

41. L. thorace spinoso, elytris atris ferrugineo maculatis, scutello luteo, antennis longissimis. *sutor.*

Cerambyx sutor. Linn. Syst. nat. 2. 628. 38.
Fn. Sv. 655.
Oliv. Ins. 67. tab. 3. fig. 20.

Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 1.
Degeer Inſ. 5. 65. 4.
Sulz. Inſ. tab. 5. fig. 4.
Habitat in Europae ſylvis.

ſartor. 42. L. thorace ſpinoſo niger ſcutello flavo, elytris immaculatis, antennis longiſſimis.
Habitat Dresdae in Aeſculo Hippocaſtano Muſ. Dom. Zſchuck.
Affinis praecedenti at major. Frons inter antennas valde canaliculata.

dentator. 43. L. thorace ſpinoſo fuſco cinereoque varia.
Habitat in Carolina.
Statura & magnitudo L. Sutor. Antennae corpore triplo longiores, ferrugineae, baſi nigrae. Corpus totum fuſco cinereoque varium. Tibiae intermediae compreſſae verſus apicem dente parvo dorſali.

reticulator. 44. L. thorace ſpinoſo nigra thorace elytrisque fulvis, thorace nigro lineato, elytris reticulatis. Oliv. Inſ. 67. tab. 12. fig. 85.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Banks.
Caput atrum, immaculatum. Antennae mediocres, ferrugineae primo articulo toto nigro, ſecundo baſi apiceque clavato, villoſo, nigro. Thorax ſupra fulvus lineis duabus dorſalibus, nigris. Elytra fulva, nigro reticulata, apice emarginata. Corpus nigrum.

ſcalator. 45. L. thorace acute ſpinoſo atra elytris ſtrigis numeroſis interruptis albis, antennis mediocribus.
Habitat in Louiſiana Muſ. Dom. Boſc.
Magnitudo & ſtatura L. reticulator. Antennae mediocres, atrae. Caput atrum faſcia ſupra clypeum orbitaque oculorum albis. Thorax ater lateribus lineisque duabus latis albis.

Elytra atra, nitida margine futuraque albis, e quibus exeunt ramos plurimos ſtrigas conſtituentes, interruptas. Corpus cinereo villoſum. Pedes nigri.

46. L. thorace ſubſpinoſo obſcure cinerea fuſco maculata elytris apice ruſis. *molator.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 14. fig. 99.

Habitat Cajennae Dr. Hunter.

Antennae mediocres, fuſcae. Caput cinereum fronte rufa. Thorax obſcure cinereus punctis plurimis fuſcis, margine antico poſticoque ruſis. Elytra laevia, obſcura maculis punctisque plurimis fuſcis, apice obtuſa, ruſa. Abdomen rufeſcens.

47. L. thorace ſpinoſo, elytris cinereo fuſco glaucoque nebuloſis, antennis longiſſimis ruſis. *titillator.*

Oliv. Inſ. 61. tab. 15. fig. 109.

Habitat in Carolina Muſ. Britann.

Antennae rubrae articulo primo fuſco. Thorax antice tuberculis duobus minutiſſimis. Elytra punctata, cinerea maculis fuſcis glaucisque inordinatis, ſparſis. Tibiae ruſae, ſecundi paris gibbere parvo notatae.

48. L. thorace ſpinoſo, elytris cinereo pulverulentis: vittis duabus flavis nigro marginatis. *vittator.*

Cerambyx incanus. Forſt. nov. ſp. Cent. 1, 38.

Oliv. Inſ. 67. tab. 15. fig. 104.

Petiv. Gazoph. tab. 24. fig. 6.

Habitat ad littora ſinus Campechiani Muſ. Britann.

Antennae mediocres, cinereo fuſcoque variegatae. Caput cinereo pulverulentum lineis duabus glabris, atris. Thorax cinereus lineis tribus longitudinalibus, atris. Elytra cinerea vittis duabus flavis, marginibus elevatis atris.

Maculae aliquot ſparſae, atrae ad baſin elytrorum.

oculator. 49. L. thorace ſpinoſo nigra elytris maculis quatuor flavis ſubocellaribus, antennis longis.
Cerambyx oculatus. Degeer Inſ. 7. 654. tab. 49. fig. 1.
Oliv. Inſ. 67. tab. 2. fig. 11.
Voet Coleopt. 2. tab. 7. fig. 21.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Thorax antice poſticeque ſtrigis duabus tenuiſſimis, flavis, impreſſis. Elytra ſubſtriata maculis quatuor flavis, annulo albo cinctis, quarum prima baſeos rotundata, major, ſecunda ad marginem exteriorem, tertia in medio, quarta verſus apicem orbicularis.

capenſis. 50. L. thorace biſpinoſo nigra elytris faſciis quatuor rufis, antennis mediocribus.
Cerambyx capenſis. Linn. Syſt. nat. 2. 628. 32.
Oliv. Inſ. 67. tab. 8. fig. 51.
Drury Inſ. 1. tab. 39. fig. 3.
Petiv. Gazoph. tab. 3. fig. 8.
Voet. Scarab. 2. tab. 8. fig. 25.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.

hottentotta. 51. L. thorace ſpinoſo rufo, elytris nigris: faſcia maculisque duabus marginalibus ſanguineis.
Cerambyx hottentotta. Brown. Illuſtr. 118. tab. 49. fig. 1.
Oliv. Inſ. 67. tab. 4. fig. 27.
Voet. Scarab. 2. tab. 8. fig. 26.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Yeats.
Antennae mediocres. Thorax ſcaber, obſcure rufus. Elytra aeneo tincta. Pedes nigri.

ferrugator. 52. L. thorace ſpinoſo obſcure ferruginea elytris obſcure vireſcentibus: ſtriga interrupta ſanguinea, antennis longis.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Spengler.
Antennae nigrae. Thorax ſubrugoſus utrinque denticulo parvo. Elytra punctata, obſcura, viridi nitidula, ante medium ſtriga interrupta, ſanguinea. Margo exterior apice ſanguineus. Corpus ferrugineum. Pedes ferruginei tarſis nigris tibiisque intermediis extus ſubdentatis.

53. L. thorace ſpinoſo, elytris flavis nigro faſciatis antice mucronatis. *humeralis.*
Habitat — — — Dom. Drury.
Antennae corpore longiores, nigrae. Caput flavum lineis quatuor nigris. Thorax flavus faſciis tribus nigris, baſi utrinque emarginatus. Elytra flava faſciis variis, paſſim confluentibus, nigris, baſi mucronata. Sternum porrectum, apice bidentatum.

54. L. thorace biſpinoſo nigra elytris faſciis quinque rubris, antennis mediocribus. *faſciata.*
Habitat in Guinea Dr. Iſert.
Statura omnino praecedentium. Antennae nigrae. Thorax ſcaber, niger ſpinis utrinque duabus, brevibus. Elytra baſi ſcabra, nigra faſciis tribus tenuioribus, rufis. Corpus nigrum.

55. L. thorace ſubſpinoſo atra elytris faſciis tribus flavis, antennis mediocribus. *trifaſciata.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 121.
Herbſt Arch. tab. 45. fig. 10.
Habitat ad Sierra Leon Africae Dr. Solander.
Thorax ater tuberculo tantum obſoleto utrinque notatus. Elytra abdomine ſubbreviora, atra faſciis tribus latis flavis. Pedes atri tibiis intermediis apice tuberculatis.

56. L. thorace ſpinoſo poſtice ſinuato, elytris flavis: faſciis duabus maculaque rhombea cyaneis. *bifaſciata.*
Habitat in Jamaica Muſ. Britann.

Antennae corpore paullo longiores, atrae. Caput flavum orbita oculorum cyanea. Thorax flavus poſtice faſcia cyanea ſinubusque duobus eroſus. Scutellum baſi apiceque cyaneum. Pedes lutei femoribus cyaneis.

nobilis. 57. L. thorace ſpinoſo atro: margine flavo, elytris atris: faſciis tribus flavis punctisque duobus albis.

Habitat Cajennae Muſ. Dr. Hunter.

Antennae mediocres, atrae. Caput atrum macula frontali duabusque pone oculos flavis. Thorax holoſericeus, ater margine flavo, baſi albo. Spina verſus baſin atra. Elytra holoſericea, atra faſcia baſeos interrupta, media ſinuata, apicis abbreviata. Puncta duo alba inter faſciam 2. 3.

aethiops. 58. L. thorace ſpinoſo atra elytris faſciis duabus punctoque apicis luteis, antennis mediocribus.

Oliv. Inſ. 67. tab. 1. fig. 2.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Britann.

Antennae nigrae. Caput canaliculatum. Thorax ſubrugoſus. Elytra holoſericea, atra faſciis duabus flavis, quae tamen futuram haud attingunt punctoque parvo apicis luteis. Pedes compreſſi, atri.

Punctum apicis interdum deeſt.

variegator. 59. L. thorace ſpinoſo cinerea thorace elytrisque fuſco variis, antennis longis.

Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 112.

Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.

Antennae fuſcae. Caput, thorax, elytra fuſca, cinereo variegata coloribus mixtis, indiſtinctis ore nigro.

curculioides. 60. L. thorace mutico fuſca thorace coleoptrisque ocellis quatuor atris.

Cerambyx curculionoides. Linn. Syſt. nat. 2. 63. 4. 48.
Oliv. Inſ. 67. tab. 10. fig. 69.
Geoff. Inſ. 1. 210. 5.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 1.
Habitat in Europa auſtraliori.

61. L. thorace ſpinoſo rugoſo nigra ferrugineo irrorata elytris baſi macula ocellari atra, antennis longiſſimis. *luſca.*
Habitat in Siam Muſ. Dom. Banks.
Antennae atrae. Caput nigrum punctis aliquot ferrugineis. Thorax ſubrugoſus, niger utrinque linea punctorum ferrugineorum. Elytra obtuſa & fere truncata, ferrugineo irrorata maculaque ſubocellari in ipſa baſi. Pedes nigri tibiis intermediis dorſo unidentatis.

62. L. thorace ſpinoſo obſcura elytris punctis duobus approximatis atris. *notata.*
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Antennae mediocres. Corpus ſupra fuſcum, ſubtus nigrum. Thorax ſtriga punctorum impreſſorum. Elytra punctata, fuſca, pone medium ad ſuturam punctis duobus atris, approximatis.

63. L. thorace acute ſpinoſo nigra elytris ſcabris ferrugineo obſolete punctatis, antennis longiſſimis. *lugubris.*
Habitat in Italia Dom. de Schlanbuſch.
Statura omnino L. funeſtae at triplo major. Antennae corpore duplo longiores, nigrae. Corpus ſcabrum, nigrum elytris punctis parvis, obſoletis, ferrugineis. Pedes nigri tibiis quatuor anticis dente parvo apicis elevato, obtuſo.

64. L. thorace ſpinoſo fuſca elytris ſcabris: maculis duabus atris, antennis mediocribus. *triſtis.*

Cerambyx triſtis. Linn. Syſt. nat. 2. 629. 42.
Oliv. Inſ. 67. tab. 9. fig. 62.
Herbſt Arch. tab. 25. fig. 7,
Habitat in Ligno cupreſſi Galliae auſtralioris.
Variat ſexu antennis longitudine corporis & duplo longioribus.

funeſta. 65. L. thorace ſpinoſo fuſca elytris laevibus: maculis duabus atris, antennis brevibus.
Oliv. Inſ. 67. tab. 9. fig. 63.
Panz. Naturf. 24. 26. 36. tab. 1. fig. 36.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 145. 366.
Habitat in Galliae Sambuco Dr. Brouſonet.
Duplo minor praecedente. Elytra haud ſcabra.

punctator. 66. L. thorace ſpinoſo atra elytris albo punctatis, antennis longis.
Cerambyx farinoſus. Drury Inſ. 2. tab. 31. fig. 4.
Cerambyx punctator. Oliv. Inſ. 67. tab. 7. fig. 49.
Cerambyx Chinenſis. Forſt. nov. ſpec. Cent. 1. 39.
Habitat in China Dr. Fothergill.
Antennae nigrae articulis baſi pallidis. Elytra baſi ſcabra. Pedes atri.

eriſpa. 67. L. thorace ſpinoſo, elytris lineis tribus elevatis ſerrulatis, corpore cinereo, antennis mediocribus.
Oliv. Inſ. 67. tab. 3. fig. 18.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Lee.
Thorax inaequalis, acute ſpinoſus. Elytra lineis tribus acute ſerrulatis.

faſciculata. 68. L. thorace ſpinoſo hirtoque, elytris punctis piloſo criſtatis.
Lamia faſciculata. Oliv. Inſ. 67. tab. 17. fig. 131.
Habitat Cajennae Muſ. Dr. Olivier.

Media. Antennae mediocres, nigrae articulo primo villoso, flavo. Thorax acute spinosus pilis densis pallescentibus tectus. Elytra fusca puncto uno alterove albido, linea suturali elevata, atra, praeterea cristae tres e pilis elevatis fuscis ad basin, quarum exterior brevissima. Versus apicem duo paria cristarum approximatarum. Pedes variegati.

69. L. thorace spinoso cinerea elytris subfasciatis, antennis mediocribus. *rotator.*

Oliv. Ins. 67. tab. 17. fig. 126.
Habitat in India Mus. Dom. Banks.
Antennarum articuli cinerei, apice fusci. Caput sulcatum, cinereum palpis nigris. Elytra cinerea, fusco subfasciata.

70. L. thorace spinoso nigra elytris bicarinatis albo lineatis, pedibus ferrugineis, antennis brevibus. *Glycyrrhizae.*

Cerambyx ovatus. Sulz. Hist. Ins. tab. 5. fig. 9.
Cerambyx Glycyrrhizae. Oliv. Ins. 67. tab. 16. fig. 115.
Pallas Iter. 2. 723. 60.
Habitat in Sibiria Mus. Dom. Banks.
Caput atrum litura baseos albida. Antennae breves, nigrae articulo primo ferrugineo, apice nigro. Thorax lineis tribus albis. Sutura alba. Pedes ferruginei, apice albi.

71. L. thorace spinoso nigra coleoptris cruce media alba. *cruciata.*

Cerambyx cruciatus. Pall. Icon. tab. F. fig. 5.
Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.
Antennae breves, nigrae. Caput nigrum. Thorax niger linea dorsali alba. Coleoptra nigra sutura lata fasciaque media, abbreviata albis. Pedes nigri.

fuliginator. 72. L. thorace ſubſpinoſo nigra elytris cineraſcentibus, antennis brevibus.
Cerambyx fuliginator. Linn. Syſt. nat. 2. 539. 43.
Geoff. Inſ. 1. 205. 8.
Olivier Inſ. 67. tab. 4. fig. 21.
Friſh. Inſ. 13. tab. 19.
Degeer Inſ. 5. 70. 7.
Voet. Scarab. tab. 8. fig. 30.
Habitat in Europa auſtraliori.
Variat aetate tota nigra.

cineraria. 73. L. thorace ſpinoſo cineraſcens antennis brevibus.
Pallas Icones tab. F. fig. 11.
Habitat in Ruſſia meridionali Dom. Hybner.
Praecedente duplo minor & tota cineraſcens.

carinata. 74. L. thorace ſpinoſo nigra elytris piceis: carina laterali elevata albida, antennis brevibus.
Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.
Antennae breves, craſſae, nigrae. Caput & thorax punctata lineaque media impreſſa, nigra. Elytra obtuſa, picea linea laterali elevata, villoſo albida. Corpus ſubtus albidum.

Coquus. 75. L. thorace ſubſpinoſo hirſuta elytris obtuſis ſulcatis atris antice ferrugineis, antennis mediocribus. Linn. Syſt. nat. 2. 630. 44.
Habitat in America boreali.
Spinae thoracis minutiſſimae.

ruſpator. 76. L. thorace ſpinoſo fuſco: maculis duabus ferrugineis, elytris fuſcis cinereo variegatis.
Oliv. Inſ. 67. tab. 17. fig. 129.
Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.
Antennae mediocres, fuſcae. Caput fuſcum. Scutellum ferrugineum. Elytra punctata obtuſa, fuſca, cinereo varia, qui color poſtice faſciam conſtituit. Corpus fuſcum.

77. L. thorace ſpinoſo quadripunctatato, elytris rufis: maculis quatuor nigris, antennis brevibus. *tornator.*

Cerambyx tetrophtalmus, Forſter Cent. 1. 41.
Oliv. Inſ. 67. tab. 8. fig. 52.
Herbſt Arch. tab. 32. fig. 4.
Habitat in America boreali.
Antennae nigrae. Caput rufum puncto elevato atro ad baſin antennarum. Thorax utrinque obtuſe ſpinoſus, rufus punctis quatuor dorſalibus, nigris. Elytra obtuſa puncto ad marginem exteriorem baſeos, duobus approximatis in medio, quartoque verſus apicem. Subtus nigra, cinereo nitens.

78. L. thorace ſpinoſo griſea elytris ferrugineo irroratis faſciisque duabus cinereis. *Bankii.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 15. fig. 111.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Parva. Antennae mediocres, fuſco cinereoque variae. Thorax antice utrinque ſpinis duabus, anteriore breviſſima, ferrugineo irroratus. Elytra faſciis duabus, altera ad baſin fere obſoleta, altera in medio obliquaſuturam haud attingente.

79. L. thorace inermi griſea elytris faſciis duabus macularibus abbreviatis ſtrigaque poſtica punctata niveis, antennis brevibus. *ſaltator.*

Habitat. — — —
Parva. Thorax linea dorſali alba. Elytra punctata, obtuſa faſcia ante medium abbreviata, nivea e lineolis tribus: intermedia breviori punctoque interiore conſtans. Pone medium faſcia altera itidem lineolis tribus exteriore minore punctoque interiore. Verſus apicem ſtriga obſoleta e punctis quatuor.

hiſtrio. 80. L. thorace inermi flaveſcens: punctis numeroſis niveis ſparſis, antennis brevibus.

Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.

Statura praecedentis. Antennae breves, griſeae. Caput punctatum, flaveſcens punctis obſoletis albidis. Thorax rotundatus, inermis, obſcure flaveſcens punctis plurimis niveis, diſtinctis. Elytra punctata, flaveſcentia punctis numeroſis, niveis. Corpus flaveſcens.

teſtator. 81. L. thorace ſpinoſo cornuque brevi recumbente, corpore teſtaceo, antennis brevibus apice nigris.

Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 122.

Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.

Corpus parvum, breve, villoſum, teſtaceum. Caput magnum fronte plana. Thorax in medio dorſi cornu brevi, recumbente, lato, apice retuſo. Elytra villoſa, ſtriata, immaculata.

pedeſtris. 82. L. thorace ſpinoſo atra: vitta integra alba, antennis mediocribus.

Cerambyx pedeſtris. Linn. Syſt. nat. 2. 631. 51.

Oliv. Inſ. 67. tab. 4. fig. 23.

Roſſ. Fn. Etr. 1. 146. 368.

Habitat in Europa auſtraliori.

ruſipes. 83. L. thorace ſpinoſo nigra elytrorum ſutura alba, antennarum baſi pedibusque rufis.

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Statura & magnitudo praecedentis. Antennae compreſſae, nigrae primo articulo rufo. Caput & thorax rufa, immaculata. Elytra laevia, atra ſutura alba. Pedes rufi.

morio. 84. L. thorace ſpinoſo nigra elytris unicoloribus, antennis brevibus.

Oliv. Inſ. 67. tab. 10. fig. 67.

Herbſt Arch. tab. 25. fig. 10.
Scopoli Ent. carniol. 169.
Habitat in Germania auſtrali Muſ. Dom. Zſchuck.
L. pedeſtri paullo major & elytra unicolora, mox nigra, mox teſtacea. Antennae nigrae articulo primo interdum teſtaceo. Pedes mox nigri, mox teſtacei.

85. L. thorace ſpinoſo atra elytris marginibus lineisque duabus utrinque coeuntibus albis. *lineata.*
Cerambyx Scopoli. Herbſt Arch. tab. 25. fig. 11.
Habitat in Germania Dom. Schneider.
Statura & magnitudo L. pedeſtris. Caput & thorax atra linea dorſali alba. Elytra atra margine, ſutura lineisque duabus, antice poſticeque coeuntibus albis. Pedes nigri.

86. L. thorace ſpinoſo fuſca: vittis tribus integris albis, antennis mediocribus. *molitor.* v ?
Oliv. Inſ. 67. tab. 12. fig. 84.
Roſſ. Fn. Etruſc. 1. 147. 369.
Habitat in India Muſ. Britann.
Corpus ſupra fuſcum vittis tribus albis, a capite ad apicem elytrorum ductis; intermedia in thorace ſubdidyma per ſuturam elytrorum excurrit. Lineola parva ad baſin elytrorum inter vittas. Thorax tuberculo laterali notatus.

87. L. thorace mutico griſea coleoptris baſi bituberculatis maculisque duabus communibus albis, antennis brevibus. *tuberculator.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 120.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Antennae cinereae. Coleoptra tuberculis duobus baſeos elevatis, compreſſis juxta ſuturam. Maculae praeterea duae magnae, communes, albidae, altera ad baſin, altera verſus apicem.

nutator. 88. L. thorace mutico lineato cinereo villoſa antennis pedibuſque teſtaceis.
Oliv. Inſ. 67. tab. 14. fig. 102.
Habitat in Otaheite Muſ. Dom. Banks.
Antennae mediocres. Thorax utrinque linea pallida. Elytra punctata, obtuſa.

Rubus. 89. L. thorace ſpinoſo bimaculato, elytris baſi ſcabris baſi apiceque mucronatis.
Cerambyx Rubus. Linn. Syſt. nat. 2. 625. 21.
Oliv. Inſ. 67. tab. 7. fig. 57.
Degeer Inſ. 5. 106. 7. tab. 13. fig. 16.
Habitat in India.

8 maculata. 90. L. thorace ſpinoſo bimaculato, elytris albo maculatis baſi ſcabris mucronatis apice bidentatis.
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.
Affinis certe praecedenti, cujus varietatem olim credidi. Corpus paullo minus. Antennae corpore longiores, ſcabrae, nigrae. Thorax inaequalis, acute ſpinoſus maculis duabus dorſalibus, lunatis, flaveſcentibus, impreſſis. Scutellum albidum. Elytra cinerea baſi punctis elevatis nigris ſcabra anguloque mucronata, apice bidentata. In medio maculae quatuor albae, ſecunda majori lunata, quarta minima, orbiculata. Latera alba.

ſpinicornis. 91. L. thorace ſpinoſo rugoſo, elytris truncatis griſeis, antennis compreſſis: articulis apice ſpinoſis.
Oliv. Inſ. 67. tab. 5. fig. 33.
Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.
Antennae mediocres, compreſſae: articulis apice exteriori acute ſpinoſis. Caput nigrum. Thorax valde rugoſus, griſeus. Elytra laevia, apice truncata, ſubſpinoſa.

92. L. thorace ſpinoſo ſubteſtacea elytris punctis baſeos atris ſcabris. *ſcabrator.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 3. fig. 14. a. b.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Banks.
Antennae mediocres articulis apice nigris. Elytra apice ſubemarginata, ad ſuturam acuminata. Subtus & pedes concolora.

93. L. thorace ſpinoſo tuberculatoque cinerea elytris ſcabris: maculis duabus lateralibus atris. *Spengleri.*
Habitat in America meridionali D. Spengler.
Antennae longae, cinereae articulis apice fuſcis. Thorax utrinque obtuſe ſpinoſus tuberculisque tribus dorſalibus. Elytrorum macula poſterior ſtrigam emittit. Elytra apice acuminata.

94. L. thorace biſpinoſo tuberculatoque, elytris apice tridentatis griſeis: faſcia cinerea. *fuſcator.*
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.
Media. Antennae corpore vix breviores, griſeae. Thorax inaequalis, griſeus utrinque ſpinis duabus: anteriore majori, recurva, ſupra ſpinas tuberculum magnum, obtuſum. Elytra griſea ſive cinerea punctis numeroſis ferrugineis irroratis. Pone medium faſcia ſinuata cinerea, diſtincta, apice bidentata. Pedes griſei.

95. L. thorace acute ſpinoſo griſea elytris apice bidentatis. *bidens.*
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae longae, fuſcae. Pedes inermes.

96. L. thorace mutico cinereo nigro punctato, elytris pallide teſtaceis apice bidentatis cinereis nigro maculatis. *Cantor.*
Habitat in China Dom. de Schlanbuſch.
Antennae mediocres, atrae. Caput cinereum punctis duobus lineolaque baſeos nigris. Scu-

tellum nigrum margine cinereo. Elytra pallide teſtacea, baſi punctata, apice bidentata, cinerea, nigro maculata. Corpus & pedes nigra, cinereo villoſa.

Solandri. 97. L. thorace ſubſpinoſo nigra elytris bidentatis fuſcis cinero irroratis.

Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 118.

Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Antennae mediocres, nigrae. Thorax ſubrugoſus, niger, utrinque ſpinula antica, acuta. Scutellum nigrum. Elytra punctata, nigra, cinereo irrorata, baſi punctata, humeri gibbo, apice bidentata. Pedes nigri plantis fuſcis.

cornutor. 98. L. thorace obtuſe ſpinoſo, mandibulis baſi cornutis, antennis longiſſimis.

Oliv. Inſ. 67. tab. 17. fig. 132.

Habitat in America Muſ. Britann.

Antennae nigrae. Caput canaliculatum, nigrum mandibulis porrectis, acutis, baſi tuberculo elevato, valido, corniformi. Thorax niger, immaculatus. Elytra punctata, nigra, flavo maculata, baſi mucrone parvo, inflexo armata, apice rotundata, inermia.

leproſa. 99. L. thorace ſpinoſo, elytris baſi varioloſis cinereis: macula laterali nigra, antennis longis.

Habitat in America Dom. Drury.

Antennae obſcure rufae. Thorax dorſo inaequali. Elytra baſi punctis majoribus concatenatis impreſſa, poſtice laevia, cinerea, puncto parvo in medio, macula magna laterali & puncto parvo apicis nigris. Macula niyea utrinque ad baſin abdominis. Pedes cinerei.

85. STENOCORUS. *Palpi* quatuor.
antici filiformes.
poſtici clavati.
Antennae ſetaceae.

1. S. thorace ſubſpinoſo cyaneus elytris baſi flavis. *cyaneus.*
Cerambyx palliatus. Forſt. nov. ſp. Cent. 1. 40.
Habitat in India.
Antennae breves, cyaneae articulis clavatis.
Thorax antice anguſtatus, poſtice ſubſpinoſus.

2. S. thorace ſpinoſo pubeſcente, elytris faſtigiatis *lamed.*
lividis: taenia obſcura longitudinali ſinuata.
Cerambyx lamed. Linn. Syſt. nat. 2. 630. 46.
Fn. Sv. 649.
Geoff. Inſ. 1. 226. 6.
Habitat in Europae floribus.

3. S. thorace ſpinoſo, elytris bidentatis griſeis: ma- *garganicus*
cula flava, antennis longiſſimis.
Oliv. Inſ. 67. tab. 13. fig. 105.
Drury Inſ. 1. tab. 37. fig. 6.
Degeer Inſ. 5. tab. 14. fig. 3.
Habitat in Marylandia Muſ. Britann.
Antennae fuſcae. Elytra in medio lunula albida.

4. S. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis *feſtivus.*
viridibus: linea laterali lutea.
Cerambyx feſtivus. Linn. Syſt. nat. 2. 623. 11.

Stenocori corpus ſubcylindricum, glabrum, immarginatum, tardum, capite rotundato, oculis magnis, reniformibus, lateralibus, antennis elongatis: articulis apice ſaepius ſpinoſis, in ſinu oculorum inſertis, thorace rotundato, ſcutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, apice ſaepius bidentatis, pedibus curſoriis, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 113.
Drury Inſ. 1. tab. 37. fig. 5.
Voet. Coleopt. 2. tab. 16. fig. 66.
Herbſt Arch. tab. 25. fig. 12.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 5. fig. 6.
Degeer Inſ. 5. 100. 4. tab. 13. fig. 14.
Habitat in America.

marylandicus. 5. S. thorace depreſſo tuberculato mutico, elytris bidentatis fuſco cinereoque nebuloſis, antennis mediocribus.
Callidium marylandicum. Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 5.
Habitat in Marylandia Muſ. Britann.
Antennae ſubaculeatae. Corpus totum cinereo fuſcoque variegatum.

ſpinicornis. 6. S. thorace inermi tuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis biſpinoſis, corpore variegato.
Cerambyx ſpinicornis. Oliv. Inſ. 67. tab. 17. fig. 130
Drury Inſ. 1. tab. 41. fig. 4.
Voet. Coleopt. 2. tab. 24. fig. 131.
Habitat in America.
Corpus cineraſcens punctis elevatis fuſcis.

bidens. 7. S. thorace inermi ſubtuberculato, antennarum articulis biſpinoſis, corpore teſtaceo.
Cerambyx bidens. Oliv. Inſ. 67. tab. 7. fig. 125.
Habitat in America meridionali D. de Paykull.
Statura omnino praecedentis, at minor & corpus minus variegatum.

ſemipunctatus. 8. S. thorace ſpinoſo inaequali, elytris bidentatis baſi punctatis apice glabris.
Oliv. Inſ. 67. tab. 2. fig. 19.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Caput atrum palpis poſticis ferrugineis. Antennae mediocres, fuſcae articulis intermediis, apice ſpinoſis. Thorax tomentoſus, ater, tuberculatus. Elytra baſi nigro flavoque variegata, punctata, apice atra, glabra, nitida macula flava. Pedes fuſci.

9. S. thorace mutico inaequali, elytris apice bidentatis albo irroratis, antennis longis aculeatis. *irroratus.*
Cerambyx irroratus. Linn. Syſt. nat. 2. 633. 62.
Oliv. Inſ. 67. tab. 19. fig. 145.
Drury Inſ. 1. tab. 41. fig. 3.
Habitat in America.

10. S. thorace mutico cinereo: linea glabra fuſca, elytris bidentatis. *glabratus.*
Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom. Rohr.
Antennae mediocres, fuſcae articulis tribus ſpinoſis. Thorax griſeus linea dorſali glabra, fuſca. Elytra griſeo fuſcoque varia.

11. S. thorace ſpinoſo piceus elytris punctis ſparſis farinoſis, antennis longis. *farinoſus.*
Cerambyx farinoſus. Mant. Inſ. 1. 134. 35.
Linn. Syſt. nat. 2. 626. 24.
Oliv. Inſ. 67. tab. 7. fig. 46.
Drury Inſ. 2. tab. 31. fig. 4?
Degeer Inſ. 5. 108. 9. tab. 13. fig. 17.
Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 12.
Habitat in Radice Argemonae mexicanae.
Larva albicans capite caudaque nigris.

12. S. thorace ſpinoſo ferrugineo, elytris acuminatis: maculis tribus flavis. *6maculatus*
Cerambyx ſexmaculatus. Oliv. Inſ. 67. tab. 15. fig. 108.
Habitat Cajennae Muſ. D. Olivier.

Magnitudo omnino & Statura S. 4 maculati. Antennae mediocres, villoſae, ferrugineae. Thorax ferrugineus utrinque ſpina parva, nigra. Elytra maculis tribus magnis, oblongis, flavis, apice ſpina nigra.

5 *maculatus* 13. S. thorace ſubſpinoſo rufo: maculis quatuor flavis, elytris bidentatis rufis: punctis duobus lineaque apicis albis, antennis longiſſimis.

Habitat in Inſula Guadeloupe Dr. Iſert.

Statura omnino 4 maculatae. Antennae ferrugineae. Caput ferrugineum orbita oculorum cinerea. Thorax ſcaber linea laterali maculisque quatuor dorſalibus, pallidis. Scutellum albidum. Elytra ferruginea macula ante medium albida, in medio geminata, flava, glabra, apicebidentata linea longitudinali albida. Corpus ſubtus albidum.

4 *maculatus* 14. S. thorace ſpinoſo ſcabro, elytris bidentatis: maculis duorum parium glabris.

Cerambyx quadrimaculatus. Linn. Syſt. nat. 2. 27.
Oliv. Inſ. 67. tab. 19. fig. 144.
Sloan. Jamaic. 2. tab. 237. fig. 21.
Drury Inſ. 1. tab. 37. fig. 3.
Voet. Coleopt. 2. tab. 15. fig. 65.
Habitat in America meridionali.
Femora quatuor poſtica apice ſpinoſa.

maculoſus. 15. S. thorace ſpinoſo fuſcus elytris bidentatis: maculis duorum parium glabris, antennis mediocribus nigris.

Cerambyx maculoſus. Oliv. Inſ. 67. tab. fig.
Habitat in America meridionali Muſ. Dr. Olivier.
Praecedente minor. Caput fuſcum labio ferrugineo. Thorax ſpinoſus, fuſcus, immaculatus. Elytra pallidiora maculis duorum parium. Pedes nigri femoribus rufis.

16. S. thorace mutico nigro: macula utrinque rufa, elytris nigris: maculis duorum parium glabris, antennis longiſſimis. *geminatus.*

Habitat in Sierra Leon Africae Dr. Pflug.

Antennae nigrae. Caput rufum fronte puncto nigro. Maculae elytrorum, altera ad baſin, altera in medio. Elytra apice truncata, cinereo nitidula. Pedes nigri femoribus rufis, poſticis quatuor apice ſpinoſis.

17. S. thorace mutico pallidus elytris uniſpinoſis: punctis tribus nigris, antennis longis. *pallens.*

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dr. Iſert.

Medius. Antennae longae, pallide teſtaceae. Thorax rufus. Elytra pallide teſtacea punctis tribus nigris, parvis. Pedes pallidi.

18. S. thorace mutico antice attenuato ferrugineus elytris pallidis. *ſtrepens.*

Cerambyx ſtrepens. Oliv. Inſ. 67. tab. fig.

Habitat in Galloprovincia noctu volitans cum ſtrepitu Muſ. Dom. Olivier.

Statura S. 4. maculati. Antennae compreſſae, mediocres, ferrugineae. Caput canaliculatum. Elytra laevia, pallide flaveſcentia, immaculata. Corpus ferrugineum.

19. S. thorace mutico atro, elytris bidendatis baſi teſtaceis apice atris: faſcia pallida. *faſciatus.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 14. fig. 98.

Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. D. Banks.

Antennae mediocres, nigrae. Caput flavum baſi lineisque tribus atris: lateralibus ſub oculis. Thorax ſupra ater, ſubtus flaveſcens. Elytra baſi punctata, teſtacea, truncata faſcia ante apicem pallida. Abdomen teſtaceum macula utrinque baſeos flava apiceque atrum.

circumflexus. 20. S. thorace mutico ferrugineus elytris unidentatis teſtaceis: punctis duobus ſtrigaque undata fuſcis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae mediocres, ferrugineae. Elytra teſtacea punctis duobus oblique poſitis verſus baſin, in medio ſtriga angulata margines haud attingens & apice dente unico, elongato, acuto fuſcis. Pedes ferruginei.

nanus. 21. S. thorace rotundato mutico griſeus pedibus teſtaceis.

Habitat — — Muſ. Dom. Lund.

Parvus. Antennae mediocres, villoſae, cinereae. Caput & thorax griſea, immaculata. Elytra griſea lineis duabus longitudinalibus, abbreviatis, nigris. Pedes teſtacei femoribus incraſſatis.

annulatus. 22. S. thorace lineato, elytris unidentatis, antennis longis: annulis tribus albis.

Cerambyx annulatus. Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 117.

Cerambyx hirtipes. Degeer Inſ. 5. 116. 19. tab. 14. fig. 10.

Habitat — — Muſ. Dom. Banks.

Antennae ferrugineae faſcia alba in articulo tertio, quinto & penultimo. Caput fuſcum lineis duabus albis. Thorax griſeus lineis quatuor albis. Elytra griſea, apice fuſca margine albo, truncata, unidentata. Pedes fuſci, cinereo annulati.

10 maculatus. 23. S. thorace ſubſpinoſo quadrimaculato, elytris bidentatis ferrugineis flavo cinereoque maculatis.

Oliv. Inſ. 67. tab. 12. fig. 86.

Habitat in America Muſ. Dom. Banks.

Antennae longiores, ferrugineae. Thorax utrinque tuberculis duobus lateralibus. Elytra obſolete bidentata, ferruginea macula glabra, ſolitaria, flava ad baſin, dein macula orbiculata, cinerea. In medio maculae duae approximatae, glabrae, flavae, & tandem linea cinerea, apice bifidâ ab apice elytri fere ad medium ducta.

24. S. thorace ſpinoſo ferruginea elytris acuminatis teſtaceis: lineolis tribus glabris flavis. *lineola.*

Oliv. Inſ. 69. tab. 2. fig. 17.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.

Caput ferrugineum. Antennae corpore longiores. nigrae primo articulo ferrugineo. Elytra apice uniſpinoſa, teſtacea lineola baſeos duabusque in medio approximatis: exteriori longiori, flavis, glabris. Pedes nigri femoribus flavis: poſticis quatuor apice ſpina valida, nigra.

25. S. thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis cinereo fuſco flavoque variis: angulo baſeos compreſſo. *varius.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Parvus, cinereus. Antennae corpore longiores, cinereae articulis apice fuſcis. Thorax nigro lineatus punctisque flaveſcentibus. Elytra angulo baſeos elevato, compreſſo & apice emarginato bidentata.

26. S. thorace ſpinoſo ater elytris apice uniſpinoſis baſi teſtaceis, antennis longis. *pubeſcens.*

Cerambyx pubeſcens. Oliv. Inſ. 67. tab. 18. fig. 135.
Habitat Cajennae.
Minor. Antennae corpore longiores, nigrae articulis ſpinoſis. Thorax ſpinoſus, tubercula-

tus, ater, nitidus. Scutellum griſeum. Femora rufa.

villoſus. 27. S. thorace mutico obſcurus cinereo villoſus elytris bidentatis.

Habitat in Carolina.

Medius, tenuis, obſcurus, villis rarioribus tectus.

Drurii. 28. S. thorace ſubſpinoſo, elytris truncatis bidentatis ferrugineis cinereo faſciatis, antennis brevibus.

Habitat in America Dom. Drury.

Antennae corpore breviores, piceae. Thorax utrinque ſpina parva armatus & dorſo lineis quibusdam elevatis, transverſis. Elytra apice truncata, bidentata, ſpina exteriori majori, ferruginea faſciis tribus cinereis, ad ſuturam connatis. Pectus ferrugineum maculis utrinque duabus majoribus, albis. Abdomen utrinque punctis tribus albis.

undatus. 29. S. thorace ſpinoſo cinereus elytris bidentatis: faſciis duabus undatis nigris.

Habitat in America Dom. Drury.

Caput cinereum oculis nigris. Antennae mediocres, villoſae, nigrae articulis apice cinereis. Thorax cinereus maculis aliquot dorſalibus, glabris, nigris. Elytra punctata: cinerea faſciis duabus valde undatis, nigris, poſteriore craſſiore.

ruſticus. 30. S. thorace ſpinoſo ferrugineo fuſcus elytris bidentatis pallidioribus, antennis longis.

Oliv. Inſ. 69. tab. 2. fig. 16.

Habitat in India orientali Muſ. Dom. Banks.

Medius. Antennae corpore longiores, fuſcae. Caput & thorax obſcura, ferrugineo puboſcentia. Elytra laevia, multo pallidiora, apice bidentata.

86. CALOPUS. *Palpi* quatuor:
antici clavati.
poſtici filiformes.
Maxilla bifida.
Labium membranaceum, bifidum.
Antennae filiformes.

1. Calopus. *ferraticornis.*
Cerambyx ſerraticornis thorace mutico ſubovali, corpore lurido fuſco, antennis compreſſis antice ſerratis mediocribus. Linn. Syſt. nat. 2. 634. 65. Fn. Sv. 665.
Degeer Inſ. 5. 79. 16.
Habitat in Europa boreali.
Animalculum elongatum, cylindricum, obſcurum.

87. RHAGIUM. *Palpi* quatuor capitati.
Maxilla unidentata.
Labium membranaceum, bifidum.
Antennae ſetaceae.

1. R. thorace ſpinoſo griſeum elytris nebuloſis te- *mordax.*
ſtaceo ſubfaſciatis.
Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 2.
Habitat in Germania Dom. Schneider.

Rhagii corpus oblongum, glabrum, immarginatum, tardum, capite magno, ovato, prominulo, oculis rotundatis, lateralibus, prominulis, antennis elongatis, approximatis, inter oculos inſertis, thorace anguſto, cylindrico, utrinque ſpinoſo, ſcutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, thorace multo latioribus, longitudine abdominis, pedibus curſoriis, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

Corpus majus R. inquiſitore haud nigrum ſed griſeo villoſum.

inquiſitor. 2. R. thorace ſpinoſo nigrum elytris nebuloſis teſtaceo ſubfaſciatis.

Cerambyx inquiſitor. Linn. Syſt. nat. 2. 630. 49. Fn. Sv. 659.
Geoff. Inſ. 1. 223. 2.
Friſh. Inſ. 13. tab. 14.
Oliv. Inſ. 69. tab 2. fig. 12.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 10.
Degeer Inſ. 5. 126. 2. tab. 4. fig. 1.
Habitat in Europae truncis arborum.
Larva hexapoda, nuda, alba, capite collarique corneis fuſcis, dorſo canaliculato Stroem. Act. Hafnienſia 1.

indagator. 3. R. thorace ſpinoſo cinereum elytris lineis tribus elevatis: atomis faſciisque duabus nigris.

Degeer Inſ. 5. tab. 4. fig. 7.
Habitat in Germania Dr. Schulz.
Antennae nigrae, in medio piceae. Caput planum, cinereo villoſum. Thorax cinereo villoſus. Elytra cinerea atomis faſciisque duabus nigris. Pedes nigri.

curſor. 4. R. thorace ſpinoſo, elytris rufis: ſutura lineaque nigris.

Cerambyx curſor. Linn. Syſt. nat. 2. 630. 45. Fn. Sv. 658.
Degeer Inſ. 5. 127. 3.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 5. fig. 7.
Habitat in Europa boreali.
Margo exterior rufus.

5. R. thorace ſpinoſo nigrum elytris ſubferrugineis: faſcia flava, femoribus poſticis unidentatis. *cinctum.*

Habitat in Auſtria Dom. Saldoner.

Antennae mediocres, ferrugineae, apice compreſſae. Thoracis lobus anticus diſtinctus. Scutellum pube flaveſcente. Elytra punctata. Corpus ſubtus pube aurea. Pedes ferruginei femoribus quatuor poſticis intus ante apicem unidentatis.

6. R. thorace ſpinoſo nigrum antennarum baſi ferruginea. *Noctis.*

Cerambyx Noctis. Linn. Syſt. nat. 2. 630. 48.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 2.

Habitat in Europa boreali.

Nimis affinis R. Curſor. Differt tantum colore toto nigro.

Variat ſexu elytris nigris & teſtaceis.

7. R. thorace ſpinoſo, elytris faſciis duabus obliquis flavis. *bifaſciatum.*

Leptura mordax. Degeer Inſ. 5. 124. 1. tab. 4. fig. 6.

Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 5. fig. 8.

Oliv. Inſ. 69. tab. 1. fig. 6.

Schaeff. Elem. tab. 118. fig. 1.

Icon. tab. 8. fig. 1. 3.

Herbſt Arch. 170. tab. 45. fig. 12.

Geoff. Inſ. 1. 222. 1.

Habitat in Europa boreali.

Antennae ferrugineae primo articulo nigro. Caput canaliculatum. Thorax ſubcanaliculatus.

Elytrorum faſciae margines haud attingunt. Pedes nigri femorum baſi tibiisque rufis.

clathratum. 8. R. thorace ſubſpinoſo nigrum elytris flavo ſubreticulatis, pedibus rufis.

Habitat in Auſtria D. Schneider.

Statura omnino R. Noctis at minor. Caput & thorax atra. Elytra nigra in medio flavo ſubtiliſſime reticulata. Pedes omnes rubri.

ornatum. 9. R. thorace ſpinoſo nigrum elytris faſcia lata flava.

Habitat in Penſylvania Muſ. Dom. Banks.

Antennae ſubferrugineae. Caput nigrum oculis teſtaceis. Thorax niger ſpina utrinque acuta, recurva. Elytrorum margo exterior ſubferrugineus. Pedes ferruginei femoribus baſi nigris.

minutum. 10. R. thorace ſpinoſo, elytris elevato ſtriatis cinereis nigro undatis.

Oliv. Inſ. 69. tab. 1. fig. 3.

Habitat Kiliae.

Corpus R. inquiſitore triplo minus.

muticum. 11. R. thorace mutico rufo nigro bimaculato, elytris fuſcis rufo ſtriatis apice bidentatis.

Habitat in Suecia Muſ. Dom. Lund.

Parvum. Caput cinereum antennis longitudine corporis, fuſcis, baſi albo annulatis. Thorax omnino muticus, rufus maculis duabus dorſalibus, nigris. Elytra ſubpunctata, fuſca, rufo ſtriata apiceque rufa emarginato bidentata: dente interiori breviſſimo. Corpus cinereum. Pedes ferruginei.

88. SAPERDA. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla membranacea, bifida.
Labium cordatum, truncatum.
Antennae ſetaceae.

1. S. corpore griſeo nigro punctato, antennis mediocribus. *carcharias.*
Cerambyx carcharias. Linn. Syſt. nat. 2. 631. 52. Fn. Sv. 660. Oliv. Inſ. 68. tab. 2. fig. 22.
Leptura cinerea. Geoff. Inſ. 1. 308. 1.
Drury Inſ. 1. tab. 41. fig. 5.
Schaeff. Icon. tab. 152. fig. 4.
Degeer Inſ. 5. 73. 10. tab. 3. fig. 19.
Habitat in Europae ſylvis.

2. S. coleoptris linea ſuturali dentata punctisque flavis, antennis mediocribus. *ſcalaris.*
Cerambyx ſcalaris. Linn. Syſt. nat. 2. 632. 55. Fn. Sv. 697. Oliv. Inſ. 68. tab. 1. fig. 7.
Friſch. Inſ. 12. 29. tab. 3. fig. 3.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 5.
Degeer Inſ. 5. 77. 14.
Habitat in Europae Populo.

3. S. alba thorace coleoptrisque fuſcis: vittis duabus albis. *candida.*
Habitat — — Muſ. Dr. Hunter.

Saperdae corpus elongatum, cylindricum, glabrum, immarginatum, agile, capite rotundato, transverſo, inſerto, oculis lateralibus, reniformibus, antennis elongatis, in oculorum ſinu inſertis, thorace brevi, rotundato, inermi, ſcutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, curſoriis, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

Elytra obtuſa, laevia.

detrita. 4. S. nigra cinereo villoſa thorace linea dorſali, elytris vitta albis, antennis brevibus.
Habitat in Barbaria Dom. Desfontaines.
Magnitudo & ſtatura S. ſcalaris. Antennae vix longitudine corporis, nigrae. Caput nigrum vitta oculorum alba. Thorax niger linea dorſali ſcutelloque albis. Elytra punctata, rotundata, nigra vitta lata, dorſali, alba, verſus baſin parum detrita. Corpus cinereo hirtum.

irrorata. 5. S. atra elytris albo punctatis, antennis longis.
Habitat in Africae plantis Dom. Vahl.
Antennae nigrae articulis baſi albis primo craſſiori, unicolore, ſecundo piceo. Thorax linea laterali, interrupta, alba. Elytra laevia.
Variat elytris immaculatis forte aetate.

modeſta. 6. S. nigra capite thorace anoque ferrugineis.
Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. Dom. Banks.
Caput & thorax immaculata. Elytra punctato ſtriata, apice emarginata. Abdomen tomento cinereo nitidulum ano ferrugineo.

atricornis. 7. S. ferruginea antennis abdominisque apice ſupra nigris.
Habitat in China Dom. de Seheſtedt.
Affinis videtur praecedenti. Antennae nigrae longitudine fere corporis. Caput & thorax laevia, glabra, rufa, immaculata. Pectus rufum. Abdomen ſupra baſi rufum, apice nigrum ano ſive ultimo ſegmento lineolis duabus albis. Subtus baſi tomento argenteo villoſum, apice rufum. Elytra punctato ſtriata, obſcuriora, apice emarginata. Alae ferrugineae, apice nigrae.

oculata. 8. S. thorace luteo: punctis duobus atris, elytris nigris.

Cerambyx oculatus. Linn. Syſt. nat. 2. 633. 60. Fn. Sv. 664. Oliv. Inſ. 68. tab. 1. fig. 4. Schaeff. Icon. tab. 128. fig. 4. Degeer Inſ. 5. 74. 11. tab. 3. fig. 20. Huffnag. Inſ. tab. 13. Habitat in Europae ſylvis.

9. S. ferruginea elytris bidentatis punctato ſtriatis virescentibus, antennis mediocribus nigris. *tricolor.*
Habitat in India orientali Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Paullo minor S. oculatae. Antennae longitudine corporis, nigrae. Caput rufum oculis nigris. Thorax rufus baſi punctis tribus parvis, obſoletis. Elytra ſtriato punctata, virescentia, apice emarginata. Corpus rufum pedibus apice nigris.

10. S. ferruginea griſeo villoſa ſcutello orbitaque oculorum fulvis. *hirta.*
Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae fuſcae longitudine corporis. Caput griſeum maculis quatuor baſeos flavescentibus. Elytra pilis griſeis hirta, apice obtuſa. Pedes griſei.

11. S. teſtacea antennis pedibusque concoloribus, antennis longis. *unicolor.*
Habitat in Inſula Amſterdam Muſ. Dom. Banks.
Antennae teſtaceae. Thorax punctatus, in quibusdam linea cinerea laterali. Scutellum griſeum. Elytra uti & pedes teſtacea.

12. S. cylindrica nigra pedibus luteis, antennis mediocribus. *linearis.*
Cerambyx linearis. Linn. Syſt. nat. 2. 632. 58. Fn. Sv. 663. Oliv. Inſ. 68. tab. 2. fig. 13. Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 6. Herbſt Arch. tab. 26. fig. 1.

Habitat in Europae Corylo.

nigripes. 13. S. cylindrica nigra thoracis lineis duabus ſcutelloque cinereis, pedibus nigris.
Habitat in Hungaria Dom. Smidt.
Statura omnino S. cylindricae at paullo major. Antennae corporis fere longitudine, nigrae. Elytra rotundata, punctata, immaculata. Pedes omnes nigri.

cylindrica. 14. S. cylindrica nigra pedibus anticis luteis.
Cerambyx cylindricus. Linn. Syſt. nat. 2. 633. 59. Fn. Sv. 662. Oliv. Inſ. 68. tab. 2. fig. 111.
Roeſ. Inſ. 2. Scarab. 2. tab. 3.
Geoff. Inſ. 1. 208. 2.
Degeer Inſ. 5. 75. 12.
Habitat in Pyri, Pruni ramis.

tripunctata. 15. S. cylindrica atra thorace ſupra ferrugineo: punctis tribus nigris.
Habitat in Virginia.
Statura & magnitudo omnino S. cylindricae. Antennae mediocres, villoſae, nigrae. Corpus totum atrum, immaculatum thorace ſolo ſupra ferrugineo punctis tribus atris, duobus in medio & tertio in medio baſeos. Elytra punctato ſtriata.

melanocephala. 16. S. thorace rufo, corpore nigro, pedibus rufis.
Habitat in Africa Dom. Vahl.
Antennae mediocres, nigrae. Caput, corpus, elytra nigra. Thorax & pedes rufi.

pilicornis. 17. S. violacea antennarum articulo primo ſecundoque clavato piloſis.
Pall. Icon. tab. F. fig. 12.
Habitat in America meridionali Dom. Hybner.
Antennae corpore paullo longiores: articulo primo incurvo, clavato, hirto, ſecundo baſi ſubferrugineo apice clavato, hirto, nigro, reli-

quis baſi ferrugineis apice nigris. Pedes nigri.

18. S. capite thoraceque rufis, elytris cyaneis, antennis mediocribus ante apicem barbatis. *barbicornis.*
Habitat — —
Media. Caput rufum antennis nigris articulo nono faſciculato piloſo. Elytra laevia. Corpus nigrum ano ſternoque rufis.

19. S. thorace villoſo rufa antennis pectore elytrisque nigris. *erytrocephala.*
Cerambyx erytrocephalus. Schrank Auſtr. 270.
Habitat in Germania Dom. Hybner.
Caput rufum mandibulis antennisque mediocribus, nigris. Thorax valde villoſus margine antico poſticoque nigris. Elytra glabra, nigra. Pectus nigricans. Abdomen rufum baſi nigrum. Pedes rufi.

20. S. thorace villoſo rufa antennis elytrisque fuſcis. *ruficollis.*
Habitat in Virginia.
Magnitudo & ſtatura omnino praecedentis at diſtincta. Caput rufum antennis mediocribus, nigris. Thorax villoſus, rufus, immaculatus. Elytra villoſa, fuſca. Corpus rufum. Pedes rufi, tibiis fuſceſcentibus.

21. S. thorace ſubſpinoſo cyanea elytris faſciis duabus flavis. *faſciata.*
Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.
Antennae mediocres, nigrae. Corpus totum violaceum, ſubtus paullo cinereo nitidum.

22. S. viridis elytris maculis tribus flavis. *clavicornis.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks. 86.7.657.49.4.
Caput viride antennis fuſcis, corpore longioribus, extrorſum ſubcraſſioribus. Thorax viridis. Elytra laevia, viridia maculis tribus flavis,

quarum prima totam baſin occupat, reliquae duae marginales.

latipes. 23. S. nigra femoribus clavatis apice violaceis, tibiis poſticis compreſſis, antennis longis.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Prof. Leſke.

Antennae corpore longiores articulo primo ſecundoque craſſioribus, nigris, reliquis rufis apice nigris, ultimis totis nigris. Pedes antici quatuor rufi femoribus clavatis: clava violacea, poſtici violacei femoribus clavatis, baſi rubris tibiisque compreſſis.

vittata. 24. S. griſea vittis tribus dentatis albis, antennis longis.

Cerambyx trilineatus. Linn. Mant. 352.

Drury Inſ. 1. tab. 41. fig. 1.

Oliv. Inſ. 67. tab. 19. fig. 142.

Habitat in America Dom. Drury.

Antennarum articulus primus & ſecundus ſubtus ſubtiliſſime barbatus. Caput nigrum linea laterali alba dorſalique duplicata, flava. Elytra apice unidentata, nigra, flavo irrorata margine exteriori ſuturaque albis.

6punctata. 25. S. nigra elytris punctis tribus flavis.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. de Paykull.

Corpus parvum, nigrum, cyaneo nitidum. Antennae longitudine corporis. Elytra ſcabra, nigra punctis tribus flavis. Pedes cyanei femoribus omnibus clavatis.

lateralis. 26. S. nigra thoracis lateribus elytrorumque vitta laterali ferrugineis.

Habitat in America boreali Muſ. Dom. Banks.

Antennae nigrae longitudine corporis. Thorax lateribus ferrugineis, qui color in capite coit. Elytra nigra vitta laterali ferruginea margine tamen ipſo nigro. Pedes nigri.

27. S. thorace atro: puncto utrinque ferrugineo, elytris griſeis acuminatis. *lyncea.*

Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.

Caput nigrum antennis fuſcis longitudine corporis. Scutellum ferrugineum. Elytra griſea, baſi punctato ſtriata, apice acuminata, divergentia. Corpus atrum abdomine utrinque punctis quatuor ferrugineis. Pedes fuſci femoribus clavatis.

28. S. griſea ſcutello margine, elytris lineolis flaveſcentibus. *griſea.*

Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.

Antennae fuſcae, corpore paullo longiores. Elytra ſubvilloſa, griſea lineolis aliquot breviſſimis flavis, baſi punctis impreſſis, apice vix acuminatis. Pedes fuſci femoribus clavatis.

29. S. teſtacea elytrorum apicibus anoque nigris. *analis.*

Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. Dom. Banks.

Antennae mediocres, nigrae, interdum articulis apice teſtaceis. Caput teſtaceum, mox immaculatum, mox linea, mox punctis baſeos nigris. Thorax itidem teſtaceus, mox immaculatus, mox punctis quatuor aut ſex nigris. Elytra ſulcata: ſulcis ſtriato punctatis, teſtacea, apice nigra. Corpus teſtaceum ano nigro.

30. S. thorace rotundato: punctis quatuor nigris flava, elytris apice bidentatis nigris. *bidentata.*

Habitat in Aquapim Guineae Dr. Iſert.

Parva. Antennae longitudine corporis nigrae articulo tertio quartoque flavis. Caput flavum mandibulis punctoque frontali nigris. Thorax rotundatus punctis quatuor. Elytra punctato ſtriata, flava, apice bidentata, nigra. Corpus & pedes flava.

nigricornis. 31. S. fuſca thorace lineato, ſcutello flavo, antennis longis.
Cerambyx Cardui. Linn. Syſt. nat. 2. 632. 56.
Oliv. Inſ. 68. tab. 1. fig. 5.
Herbſt Arch. tab. 26. fig. 2.
Habitat in Europae auſtralioris Carduis.
Corpus fuſcum, flavo irroratum lineis tribus flavis in thorace.

futuralis. 32. S. cinerea thorace lineato, elytris fuſcis unicoloribus, antennis mediocribus.
Habitat Lipſiae Prof. Leſke.
Antennae mediocres, nigrae. Thorax niger lineis tribus albidis, lateralibus abbreviatis. Elytra laevia, fuſca, unicoloria. Corpus cineraſcens.

annulata. 33. S. thorace rotundato lineato vireſcens elytris acuminatis: ſutura alba.
Oliv. Inſ. 68. tab. 2. fig. 16.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 152. 379.
Habitat in Africae plantis Dom. Prof. Vahl.
Antennae mediocres articulis baſi albis apice nigris, primo toto nigro. Caput obſcurum. Elytra glabra, vireſcentia, haud rotundata ſed acuminata.

lineata. 34. S. thorace rotundato ſubſpinoſo, antennarum articulis baſi albis.
Habitat in America meridionali Muſ. Dom. Lund.
Media. Antennae longitudine corporis, fuſcae articulo primo ſecundoque unicoloribus, reliquis baſi niveis. Caput & thorax fuſca, ferrugineo villoſa, thoracis ſpina laterali parva. Elytra & pedes fuſca.

triſtis. 35. S. thorace rotundato nigro albo lineato, elytris bidentatis teſtaceis albo lineatis.
Habitat Tranquebariae Muſ. Dom. Lund.

Antennae breves, fuſcae. Thorax ſpinis quatuor mediis obtuſis, lateralibus majoribus acutis. Elytra laevia, acuta.

37. S. thorace flavo lineato, elytris punctis quatuor flavis, antennis mediocribus. *populnea.*
Cerambyx populneus. Linn. Syſt. nat. 2. 632. 57. Fn. Sv. 661. Oliv. Inſ. 68. tab. 1. fig. 1.
Geoff. Inſ. 1. 208. 3.
Schaeff. Icon. tab. 48. fig. 5.
Habitat in Americae, Europae Populetis.
Variat minor & punctis minoribus albis.

38. S. viridis thorace punctis duobus, elytris quatuor nigris. *tremula.*
Schaeff. Icon. tab. 101. fig. 1.
Habitat Halae Dr. Schreber.
Antennae mediocres.

39. S. viridis punctis nigris numeroſis, antennis mediocribus. *punctata.*
Cerambyx punctatus. Linn. Syſt. nat. 2. 1067. 7.
Oliv. Inſ. 68. tab. 1. fig. 9.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 5. fig. 10.
Habitat in Europa auſtrali.
Antennae & pedes nigrae.

40. S. thorace villoſo cinereo, elytris ſubattenuatis viridibus. *virescens.*
Oliv. Inſ. 68. tab. 2. fig. 11.
Panz Naturf. 24. 28. 37. tab. 1. fig. 37.
Habitat in Italia Dr. Allioni, in Galliae Sambuco Dom. Brouſſonet.

41. S. fuſca pedibus teſtaceis, antennis longiſſimis nigris: annulo albo. *longicornis.*
Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. Dom. Banks.
Antennarum articulus nonus albus. Elytra apice bidentata. Pedes teſtacei apice nigri.

femorata. 42. S. thorace antice fuſco poſtice teſtaceo, elytris faſciis tribus nigris teſtaceisque, antennis longiſſimis.

Habitat — — Muſ. Britann.

Media. Caput nigrum antennis longis flavis articulis apice ſubſpinoſis. Elytra obtuſa faſciis tribus nigris teſtaceisque alternis: faſcia prima nigra; puncto flavo. Pedes flavi femoribus incraſſatis apice unidentatis.

volvulus. 43. S. ſupra nigra thoracis elytrorumque margine cinereo.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae longae, nigrae: articulis ultimis baſi pubeſcentibus. Caput nigrum. Thorax niger margine latè cineraſcente. Elytra margine late cinereo. Corpus cinereum pedibus nigris.

ferruginea. 44. S. thorace ſubſpinoſo ferruginea antennis pedibusque nigris.

Cerambyx cantharinus. Linn. Syſt. nat. 2. 637. 82.

Habitat in Germania Dom. de Hattorff.

Antennae mediocres, nigrae. Thorax utrinque parum prominens, ferrugineus. Pedes nigri femoribus clavatis.

brunnea. 45. S. thorace ſubſpinoſo ferruginea antennis pedibusque concoloribus.

Habitat in Germania Dom. Prof. Helwig.

Nimis affinis praecedenti at triplo minor.

teſtacea. 46. S. nigra elytris teſtaceis.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Antennae mediocres, nigrae. Corpus totum nigrum ſolis elytris teſtaceis. Thorax rufo villoſus.

violacea. 47. S. corpore violaceo immaculato.

Oliv. Inſ. 68. tab. 2. fig. 12.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Antennae mediocres, nigrae. Thorax ſubpubeſcens. Elytra rugoſa. Pedes nigri.

48. S. nigra elytris flavis apice nigris. *praeuſta.*
Leptura praeuſta. Linn. Syſt. nat. 2. 641. 24.
Leptura nigra. Geoff. Inſ. 1. 209. 4.
Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 8.
Habitat in Europa auſtraliori.

49. S. nigra thoracis linea dorſali ſcutelloque ei- *ephippium.*
nereis, femoribus ferrugineis.
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.
Affinis certe S. lineola at paullo major. Antennae corporis longitudine, nigrae. Caput nigrum luna cineraſcente. Thorax niger linea dorſali ſcutelloque cinereis. Elytra obſcura. Pedes nigri femoribus apice rufis.

50. S. picea antennis pedibusque ferrugineis. *picea.*
Habitat in America ſeptentrionali D. Lund.
Parva tota obſcure picea ſolis antennis pedibusque ferrugineis.

51. S. nigra hirta antennis longis. *hirta.*
Saperda Filum. Roſſ. Fn. Etr. 1. 152. 380. tab. 5. fig. 10.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Statura & magnitudo omnino S. lineola at alia & diſtincta. Antennae corpore longiores, nigrae, piloſae.

52. S. thorace ſubſpinoſo nigra antennis elytris *ſcutellata.*
pedibusque cineraſcentibus, ſcutello albo.
Habitat in Germania Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Paullo S. lineola major. Antennae corpore breviores, griſeae articulis baſi ferrugineis apice nigris: primo toto nigro. Caput nigrum. Thorax ſubſpinoſus, niger lineola ad ſcutellum brevi, albida. Scutellum album. Elytra laevia, cineraſcentia. Tibiae obſcure ferrugineae.

lineola. 53. S. nigra thoracis linea dorſali femoribusque apice rufis.

Herbſt Arch. tab. 26. fig. 4.

Habitat in Italia Dom. Allioni.

Parva. Corpus cylindricum, nigrum. Antennae longitudine corporis. Femora omnia apice uti & tibiae anticae rubrae.

89. CALLIDIUM. *Palpi* quatuor clavati. *Maxilla* membranacea, bifida. *Labium* bifidum: laciniis tenuiſſimis. *Antennae* ſetaceae.

obſcurum. 1. C. thorace ſubvilloſo fuſco, elytris teſtaceo cinereoque variis, antennis mediocribus.

Habitat in Terra Dimenii Muſ. Dom. Banks.

Antennae pubeſcentes, fuſcae. Elytra baſi obſcuriora. Pedes teſtacei.

bajulus. 2. C. thorace villoſo: tuberculis duobus, corpore fuſco.

Cerambyx bajulus. Linn. Syſt. nat. 2. 636. 76. Fn. Sv. 672.

Oliv. Inſ. 70. tab. 3. fig. 30.

Friſh. Inſ. 13. tab. 10.

Callidii corpus planiuſculum, ſaepius pubeſcens, depreſſiuſculum, immarginatum, tardum, capite ovato, obtuſo, inſerto, oculis lateralibus, reniformibus, antennis thorace longioribus in ſinu oculorum inſertis, thorace plano margine rotundato prominulo, ſcutello parvo, triangulo, elytris rigidis, fornicatis longitudine abdominis, pedibus elongatis, curſoriis, femoribus ſaepius clavatis, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

Schaeff. Icon. tab. 68. fig. 1. Elem. tab. 76. fig. 4.
Habitat in Europae truncis.
Elytra in altero ſexu pallida.

3. C. thorace tuberculato rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus. *fennicum.*
Cerambyx fennicus. Linn. Syſt. nat. 2. 636. 77. Fn. Sv. 664.
Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 9.
Leptura atra. Geoff. Inſ. 1. 219. 19.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 12.
Herbſt Arch. tab. 26. fig. 8.
Habitat in Europae truncis.

4. C. thorace ſubcylindrico ſpinoſo rufo nigra elytris violaceis, antennis mediocribus piceis. *ruficolle.*
Saperda ruficollis. Mant. Inſ. 1. 150. 36.
Oliv. Inſ. 70. tab. 2. fig. 27.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Caput nigrum antennis mediocribus piceis. Thorax hirtus, rufus. Pedes nigri femoribus ſubclavatis.

5. C. thorace tuberculato nigrum elytris violaceis. *ebulinum.*
Cerambyx ebulinus. Linn. Syſt. nat. 627. 83.
Habitat in Africae plantis Dom. Vahl.
Antennae mediocres, ferrugineae articulo primo craſſiori, nigro. Corpus nigrum. Elytra laevia, violacea, nitida. Femora clavata.

6. C. fuſcum thorace elytrisque viridi aeneis, femoribus ferrugineis. *aeneum.*
Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 46.
Habitat in India Muſ. Dr. Hunter.
Antennae nigrae. Thorax absque tuberculis pubeſcens, aeneus. Elytra pubeſcentia, nitida. Corpus nigrum. Pedes nigri femoribus ſubcompreſſis, rufis geniculis tamen nigris.

clavipes. 7. C. nigrum opacum femoribus omnibus clavatis, antennis longioribus.
Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 33.
Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 9.
Habitat in Germania Dom. de Hattorff.
Femora omnia valde clavata.

ſpinoſum. 8. C. thorace ſpinoſo nudo atrum antennis brevibus.
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.
Magnitudo & ſtatura omnino praecedentis. Antennae nigrae. Caput canaliculatum. Thorax planus, nudus, laevis, ater, immaculatus utrinque ſpina acuta. Elytra laevia, glabra, atra. Pedes nigri femoribus craſſis, at haud clavatis.

violaceum. 9. C. thorace ſubpubeſcente, corpore violaceo, antennis brevibus.
Cerambyx violaceus. Linn. Syſt. nat. 2. 635. 70. Fn. Sv. 667.
Friſh. Inſ. 12. tab. 3.
Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 2.
Herbſt Arch. tab. 26. fig. 10.
Habitat in Europae Sylvis.

femoratum. 10. C. thorace nudo, corpore atro opaco, femoribus rubris, antennis mediocribus.
Cerambyx femoratus. Linn. Syſt. nat. 2. 634. 69.
Oliv. Inſ. 70. tab. 7. fig. 77.
Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 7.
Degeer Inſ. 5. 93. 81.
Habitat in Germaniae nemoribus.

fulcratum. 11. C. thorace nudo nitido, corpore atro, femoribus rufis, antennis mediocribus.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura & ſumma affinitas praecedentis. Differt tamen paullo major thorace nitido ely-

trisque ſubſtriatis. Femora omnia compreſſa, rufa.

12. C. pubeſcens cyaneum pedibus rufis: femoribus clava atra. *amethyſtinum.*
Habitat in America boreali Prof. Helwig.
Corpus parvum, pubeſcens, cyaneum, nitidum. Antennae breves, nigrae, baſi rufae. Pedes ferruginei femoribus omnibus clavatis: clava magna atra.

13. C. thorace pubeſcente atrum elytris faſciis duabus rufis. *faſciatum*
Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 42.
Habitat in America meridionali Dom. Banks.
Antennae mediocres articulis apice biſpinoſis. Thorax bituberculatus. Pedes nigri femoribus ſubclavatis.
Variat interdum loco faſciae poſticae macula marginali rubra.

14. C. thorace verrucoſo nigricante, elytris acuminatis viridibus: ſutura cyanea. *acuminatum.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Lee.
Caput fuſcum. Antennae mediocres, fuſcae articulis apice ſpinoſis. Thorax rotundatus, niger tuberculis plurimis, elevatis. Elytra viridia, nitida ſutura cyanea, apice acute acuminata. Pedes nigri femoribus clavatis: clava rubra.

15. C. thorace verrucoſo nigrum elytris teſtaceis: macula media apiceque nigris. *ruſſicum.*
Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 49.
Habitat in Ruſſia Dom. Lee.
Caput nigrum antennis mediocribus. Pedes mutici, nigri.

16. C. thorace glabro, corpore fuſco aeneo, antennis pedibusque fuſcis. *variabile.*

Callidum ungaricum. Herbſt Arch. tab. 26. fig. 12.
Cerambyx variabilis. Linn. Syſt. nat. 2. 635. 75. Fn. Sv. 669.
Degeer Inſ. 5. 89. 25.
Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 354.
Friſch. Inſ. 12. tab. 6. fig. 3. 4.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 12.
Habitat in Europae nemoribus.

ſericeum. 17. C. thorace holoſericeo cinereo, elytris teſtaceis: punctis elevatis rubris, ſcutello niveo.
Callidium holoſericeum. Roſſ. Fn. Etr. 1. 153. 382. tab. 1. fig. 6.
Oliv. Inſ. 70. tab. 3. fig. 38.
Habitat in Barbaria Dom. Vahl.
Antennae mediocres, ſericeae. Corpus totum cinereo holoſericeum elytris magis teſtaceis: punctis plurimis ſparſis, elevatis, rufis.

tenebroſum. 18. C. thorace tuberculato obſcure rufo: linea dorſali nigra, elytris depreſſis cineraſcentibus: lineis duabus elevatis atris.
Oliv. Inſ. 67. tab. 18. fig. 139.
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Olivier.
Corpus parvum, nigrum, cinereo ſubtus nitidulum. Antennae mediocres, nigrae. Thorax obſcure rufus linea dorſali nigra. Elytra depreſſa, cineraſcentia ſutura lineisque duabus abbreviatis, atris. Pedes elongati atri femoribus ſubclavatis.

ruſticum. 19. C. thorace nudo, corpore lurido, antennis brevibus. Linn. Syſt. nat. 2. 634. 67. Fn. Sv. 666.
Oliv. Inſ. 70. tab. 3. fig. 39.
Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 6.

Sulz. Inſ. tab. 4. fig. 29.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 13. fig. 1.
Habitat in Europae ſylvis.

20. C. thorace rotundato nudo, elytris ferrugineis: vitta media nigra, antennis corpore longioribus. *vittatum.*
Habitat in Guinea Dom. Iſert.
Statura & magnitudo praecedentis. Antennae corpore longiores, ferrugineae articulo ſecundo longiori, incurvo, apice ſubſpinoſo. Caput obſcure ferrugineum. Thorax rotundatus, inermis, niger dorſo obſcure ferrugineo. Elytra plana, ferruginea: vitta nigra. Corpus obſcurum. Femora clavata.

21. C. thorace nudo nigrum elytris ſtriatis fuſcis, antennis brevibus. *agreſte.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Duplo minus C. ruſtico & elytra ſtriata, fuſca.

22. C. thorace punctato, corpore atro, elytris laevibus: ſtigmate albo. *ſtigma.*
Cerambyx ſtigma. Linn. Syſt. nat. 2. 625. 72.
Oliv. Inſ. 70. tab. 2. fig. 21.
Voet. Coleopt. 2. tab. 25. fig. 134. 135.
Degeer Inſ. 5. 109. 22. tab. 14. fig. 13.
Habitat in America.

23. C. thorace hirto fuſcum antennarum articulis baſi rufis. *fugax.*
Callidium fugax. Oliv. Inſ. 70. tab. fig.
Habitat in Gallo provincia Muſ. Dom. Olivier.
Corpus parvum, totum hirtum, fuſcum. Antennae corpore breviores articulis baſi rufis, apice fuſcis. Femora clavata. Tibiae teſtaceae.

24. C. thorace nudo, corpore fuſco, antennis longis flaveſcentibus. *pygmaeum.*
Saperda minuta. Mant. Inſ. 1. 150. 39.

Habitat in Italia, Anglia.

Antennae corpore longiores, flavae. Pedes femoribus clavatis.

equeſtre. 25. C. thorace mutico nudo atrum nitidum coleoptris faſcia interrupta rubra.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Antennae compreſſae, nigrae, mediocres. Corpus glabrum, laeve, atrum elytris faſcia media rufa, quae tamen ſuturam haud attingit.

fulvicolle. 26. C. thorace mutico fulvo nigrum antennis longiſſimis.

Habitat Surinami Muſ. Dom. Boſc.

Parvum. Antennae corpore fere duplo longiores. Caput porrectum, in medio parum anguſtatum. Thorax rotundatus, laevis, ruſus. Elytra obſolete ſcabra.

hirtum. 27. C. thorace rotundato hirto, elytris acuminatis pallide teſtaceis.

Oliv. Inſ. 70. tab. 5. fig. 62.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Antennae compreſſae, mediocres, nigrae, apice piceae. Thorax cinereo hirtus. Elytra glabra, pallide teſtacea, baſi obſcuriora, apice acuminata. Pedes nigri.

pubeſcens. 28. C. thorace rotundato pubeſcente teſtaceo, elytris vireſcentibus baſi teſtaceis.

Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 75.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Olivier.

Statura & magnitudo omnino C. teſtacei. Antennae mediocres, teſtaceae. Caput nigricans. Thorax depreſſus, pubeſcens, teſtaceus. Corpus pubeſcens, teſtaceum pedibus nigris.

barbatum. 29. C. thorace rotundato ſubtus utrinque macula tomentoſa ferruginea, antennis longis barbatis.

Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 41.

Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

Antennae corpore longiores, nigrae, tomento ferrugineo barbatae. Ad latera pectoris utrinque macula ocellaris e tomento ferrugineo. Corpus nigrum.

30. C. thorace rotundato pubescente, corpore obscure cinereo, antennis brevibus. *griseum.*

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Statura omnino C. barbati paullo tamen minus. Antennae testaceae, cinereo villosae, corpore breviores. Caput obscurum. Thorax rotundatus, vix tuberculatus, obscurus, cinereo pubescens. Elytra cinereo pubescentia, dilutiora. Pedes subtestacei.

31. C. thorace laevi obscure nigrum antennis longis pedibusque testaceis, femoribus compressis. *compressum*

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 44.

Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.

Caput, thorax, elytra, corpus laevia, obscura, nigra. Abdomen testaceum. Pedes omnes testacei femoribus valde compressis.

32. C. thoracis dorso glabro atro: lineis quatuor albis, elytris flavo irroratis. *variegatum.*

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 58.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres, nigrae: articulis ultimis duobus ferrugineis. Caput nigrum: lineis duabus strigaque transversali albidis. Thorax lateribus flavo irroratis. Elytra lineolis tribus subelevatis atra atomis flavescentibus numerosissimis. Abdomen atrum utrinque punctis flavis. Pedes nigricantes femoribus elongatis, posticis annulo albo.

33. C. thorace lineis duabus elytris quatuor albis: mediis coeuntibus abbreviatis. *lineatum.*

Oliv. Inſ. 70, tab. 4. fig. 50.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae breves, fuſcae articulo primo ferrugineo. Caput nigrum lineis duabus albis. Labium albicans lineis tribus nigris. Oculi ſinu albicante impreſſi. Scutellum albidum. Elytra obtuſa, ferruginea linea impreſſa, villoſo alba ad marginem exteriorem, duabus in medio ante apicem coeuntibus, & quarta ſuturali. Abdomen albidum, medio nigrum. Pedes ferruginei geniculis nigris.

ſulcatum. 34. C. thorace tomentoſo cinereo, elytris albo nigroque ſtriatis.
Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 48.
Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae breves, fuſcae. Caput cinereum linea frontis elevata, glabra, atra. Thorax villis cinereis tectus. Elytra ſulcata lineis elevatis glabris, atris, ſulcis quatuor villoſis albis. Pedes griſei.

√ *ſanguineum* 35. C. thorace ſubtuberculato elytrisque ſanguineis, antennis mediocribus.
Cerambyx ſanguineus. Linn. Syſt. nat. 2. 636. 80.
Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 1.
Geoff. Inſ. 1. 220. 21.
Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 1.
Habitat in Europae ſylvis.

√ *teſtaceum.* 36. C. thorace ſubtuberculato, corpore teſtaceo, antennis mediocribus fuſcis.
Cerambyx teſtaceus. Linn. Syſt. nat. 2. 635. 75. Fn. Sv. 670. Geoff. Inſ. 1. 218. 18.
Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 11.
Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 6.
Habitat in Europae ſylvis.

Elytra paullo pallidiora.

37. C. thorace ſubtuberculato ferrugineo, elytris teſtaceis, antennis mediocribus villoſis, femoribus clavatis. *pilicorne.*

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dr. Iſert.

Medium. Antennae mediocres, villoſae, teſtaceae. Caput & thorax ferruginea. Elytra glabra, laevia, teſtacea. Pedes teſtacei femoribus valde clavatis.

38. C. thorace ſubtuberculato teſtaceum elytris apice violaceis. *praeuſtum.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Forte mera varietas C. teſtacei. Antennae mediocres, apice fuſcae. Femora clavata.

39. C. thorace tuberculato villoſo nigrum elytris rubris: macula apiceque violaceis. *ligneum.*

Habitat — — — Dr. Schulz.

Corpus nigrum. Antennae mediocres. Thorax planus, villoſus, niger tuberculis elevatis, glabris. Elytra rufa macula media apiceque violaceis. Pedes nigri femoribus compreſſis.

40. C. thorace rotundato pubeſcente ferrugineum, pedibus teſtaceis. *flavipes.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.

Parvum. Antennae corpore paullo longiores ferrugineae. Caput ferrugineum oculis nigris. Thorax rotundatus, cinereo pubeſcens, ſubtuberculatus, ferrugineus. Elytra paullo pallidiora. Pedes omnes teſtacei femoribus parum incraſſatis.

41. C. thorace ſubtuberculato nudo nigrum elytris laevibus teſtaceis. *luridum.*

Cerambyx luridus. Linn. Syſt. nat. 2. 634. 68. Oliv. Inſ. 70. tab. 7. fig. 78.

Habitat in Europae ſylvis.

fuſcum. 42. C. thorace ſubtuberculato canaliculato nudo nigrum elytris ſtriatis obſcure teſtaceis, antennis mediocribus.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Antennae fuſcae. Pedes nigri femoribus brevibus, craſſis, compreſſis.

4 maculatum. 43. C. thorace villoſo fuſcum elytris maculis duabus ferrugineis, antennis longioribus.

Habitat in Inſula Guadaloupe Dom. de Badier.

Corpus parvum, obſcurum. Antennae corpore longiores, ſubferrugineae, baſi fuſcae. Caput & thorax villoſa, fuſca. Elytra fuſca maculis duabus ferrugineis: altera ante medium, altera ante apicem, lineari. Pedes obſcure ferrugnei femoribus clavatis.

triſte. 44. C. thorace ſubtuberculato nudo, elytris ſubſtriatis, corpore lurido immaculato.

Callidium arvenſe. Panz. Naturf. 24. 30. 21. tab. 1. fig. 41.

Habitat in Saxoniae Quercu Dom. Hybner.

Triplo minus C. ruſtico & elytra magis ſtriata.

raucum. 45. C. thorace laevi obſcure ferrugineo, elytris teſtaceis.

Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. D. Banks.

Antennae mediocres, ferrugineae. Caput & thorax plana, laevia, obſcure ferruginea. Elytra glabra, laevia, teſtacea. Abdomen conicum, teſtaceum.

hafnienſe. 46. C. thorace ſubvilloſo nigro: lineis quatuor albis; intermediis abbreviatis, antennis brevibus.

Cerambyx liciatus. Linn. Syſt. nat. 2. 636. 78. Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 8.

Panz Naturf. 24. tab. 1. fig. 38.

Habitat Hafniae.
Affine praecedenti at thorax nitidus & elytra haud ſtriata.

47. C. thorace laevi nitido, elytris violaceis, tibiis rufis, antennis brevibus. *rufipes.*
Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 66.
Habitat in Germania Dom. de Hattorff.
Antennae fuſcae baſi ferrugineae. Caput & thorax laevia, violacea, nitida. Abdomen aeneum. Pedes violacei tibiis rufis. Femora poſtica clavata baſi rufa.

48. C. thorace glabro, corpore nigro, elytris ſtriatis, antennis brevibus. *ſtriatum.* ✓
Cerambyx ſtriatus. Linn. Syſt. nat. 2. 635. 73. Fn. Sv. 668.
Oliv. Inſ. 70. tab. 2. fig. 24.
Herbſt Arch. tab. 26. fig. 13.
Degeer Inſ. 5. 90. 26.
Habitat in Europae ſylvis.

49. C. thorace glabro flaveſcente, capite elytrisque virescentibus, antennis mediocribus nigris. *bicolor.*
Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 4.
Habitat in America meridionali.
Praecedentibus paullo minus. Thorax planus, laevis, flavus. Elytra laevia, viridia. Pedes nigri.

50. C. thorace rotundato ſubſpinoſo villoſo nigrum elytris macula ſubdidyma fulva. *lynceum.*
Cerambyx lynceus. Oliv. Inſ. 67. tab. 12. fig. 97.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Yeats.
Thorax utrinque ſpina parva armatus. Elytra verſus baſin macula magna fulva, interne didyma.

51. C. thorace tuberculato ſpinoſoque rufum pectore elytrisque nigris. *Salicis.* ✓

Rhagium etruſcum. Roſſ. Fn. Etr. 1. 149. 373. tab. 1. fig.

Stenocorus ruficollis. Herbſt Arch. tab. 25. fig. 13.

Habitat in Lipſiae ſalicibus Dom. Zſchuck.

Antennae breves, rufae. Thorax tuberculis duobus dorſalibus ſpinaque utrinque acuta. Elytra vix ſtriata, nigra. Abdomen & pedes rufa. Faemina elytris teſtaceis, immaculatis.

cyaneum. 52. C. thorace plano tuberculato villoſum violaceum abdominis penultimo ſegmento ferrugineo, antennis mediocribus.

Habitat in Italia.

Corpus parvum, totum villoſum. Antennae mediocres, nigrae. Thorax planus tuberculis tribus elevatis. Elytra laevia, violacea. Pedes nigri, femoribus clavatis.

puſillum. 53. C. thorace rotundato nigrum antennis tibiisque teſtaceis.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Antennae corpore longiores, teſtaceae. Pedes femoribus clavatis, nigris tibiis teſtaceis.

2 maculatum. 54. C. thorace rotundato villoſo fuſcum elytris maculis duabus ferrugineis.

Oliv. Inſ. 70. tab. 5. fig. 61.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Antennae mediocres. Corpus villoſum, fuſcum, obſcurum. Macula altera elytrorum in medio, altera ad apicem. Femora ſubclavata.

flavum. 55. C. thorace ſubrotundo, corpore flavo, femoribus clavatis, antennis mediocribus.

Habitat in America Muſ. Tottianum.

Antennae flavae. Oculi nigri. Femora omnia valde clavata.

56. C. thorace tuberculato, elytris nigris: faſciis undatis duabus albis, antennis brevibus. *undatum.*
Cerambyx undatus. Linn. Syſt. nat. 2. 636. 79.
Fn. Sv. 675.
Oliv. Inſ. 70. tab. 3. fig. 36.
Voet. Coleopt. 2. tab. 19. fig 87.
Degeer Inſ. 5. 91. 28.
Habitat in Europae truncis.

57. C. thorace rotundato, elytris lividis: faſciis tribus fuſcis, antennis brevibus. *colonum.*
Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 67.
Habitat in Carolina.
Thorax ferrugineo fuſcus. Elytra truncata, livida, faſciis tribus fuſcis, quarum ultima vix futuram attingit.

58. C. thorace rotundato ruſo, elytris nigris baſi rufis: faſciis duabus albis. *varium.*
Oliv. Inſ. 71. tab. 5. fig. 55.
Habitat in America boreali Dom. Yeats.
Antennae mediocres, nigrae. Caput rufum. Elytra laevia baſi rufa: faſciis duabus albis. Pedes nigri femoribus clavatis, rufis. Abdomen atrum.

59. C. thorace rotundato flavo faſciato, elytris faſciis ſeptem flavis: anticis antrorſum poſticis retrorſum arcuatis. *flexuoſum.*
Leptura Robiniae Forſt. Cent. 1. 43.
Leptura picta. Drury Inſ. 1. tab. 41. fig. 2.
Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 76.
Voet. Coleopt. tab. 91. fig. 91.
Habitat in Americae Robinia.
Antennae & pedes ferruginea. Caput nigrum faſciis tribus flavis. Thorax niger etiam faſciis tribus flavis, ſemicircularibus.

minutum. 60. C. teſtaceum elytris faſcia abbreviata alba.
Oliv. Inſ. 70. tab. 5. fig. 56.
Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae mediocres: articulo primo teſtaceo, reliquis baſi albis, apice nigris. Caput teſtaceum oculis fuſcis. Elytra ante medium faſcia alba, quae futuram haud attingit. Pedes teſtacei femoribus valde clavatis baſi albis.

florale. 61. C. thorace globoſo albo faſciato, elytris nigris: faſciis quinque albis; ſecunda tertiaque lunatis.
Callidium faſciatum. Herbſt Arch. tab. 26. fig. 17.
Cerambyx floralis. Pall. Iter. 2. 724. 63.
Oliv. Inſ. 70. tab. 5. fig. 53.
Voet. Coleopt. 2. tab. 19. fig. 93.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Corpus nigrum antennis ferrugineis. Thorax niger faſciis duabus albis. Elytrorum faſcia prima baſeos, quinta apicis.

fulminans. 62. C. thorace globoſo maculato, elytris nigris: faſciis undato angulatis albis.
Oliv. Inſ. 70. tab. 5. fig. 63.
Habitat in America boreali Muſ. Dom. Banks.
Antennae breves, cinereae. Thorax cinereus: maculis tribus atris; inter media majori. Scutellum nigrum margine cinereo. Corpus fuſcum.

atomarium. 63. C. thorace globoſo cinereo maculato, elytris punctis ſtrigaque poſtica flexuoſa albidis.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Corpus magnum, nigrum. Antennae nigrae. Caput nigrum lineis duabus albidis. Thorax niger lineis duabus anticis, punctis duobus dorſalibus lateribusque cinereis. Elytra nigra baſi punctis albidis & verſus apicem ſtriga

undata albida. Apex albicat. Subtus nigrum segmentorum margine albido. Pedes nigri.

64. C. thorace rotundato, elytris faſciis quatuor flavis: prima interrupta, reliquis retrorſum arcuatis. *arcuatum.*

Leptura arcuata. Linn. Syſt. nat. 2. 640. 21. Fn. Sv. 696.
Oliv. Inſ. 70. tab 2. fig. 16.
Herbſt Arch. tab. 26. fig. 14.
Geoff. Inſ. 1. 2. 12. 10.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 6. tab. 107. fig. 2. 3.
Habitat in Europae hortis.
Callidium lunatum. Mant. Inſ. 1. 155. 47. hujus mera varietas.

65. C. thorace rotundato nigro, elytris nigris: faſciis flavis; ſecunda antrorſum arcuata, pedibus totis ferrugineis. *arietis.*

Leptura arietis. Linn. Syſt. nat. 2. 640. 23. Fn. Sv. 695.
Oliv. Inſ. 70. tab. 2. fig. 20.
Geoff. Inſ. 1. 214. 11.
Herbſt Arch. tab. 26. fig. 15.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 7. tab. 107. fig. 3.
Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 6.
Friſh. Inſ. 12. tab. 3. fig. 5.
Habitat in Europae hortis.
Thorax antice poſticeque flavus, at in medio interruptus. Antennae & pedes omnes ferruginei. Faſcia elytrorum ſecunda cum ſcutello ad ſuturam coit.

66. C. thorace rotundato nigro, elytris nigris: faſciis flavis; ſecunda antrorſum arcuata, pedibus ferrugineis: femoribus nigris. *Gazella.*

Habitat Kiliae.

Nimis affinis C. arietis & forte mera varietas. Antennae baſi ferrugineae, apice nigrae. Thorax niger margine antico & poſtico haud interruptis flavis. Elytra ſimillima, at faſcia ſecunda haud uti in C. arietis ad ſuturam antice dilatata cum ſcutello fere juncta. Femora nigra.

plebejum. 67. C. thorace globoſo immaculato, elytris nigris: ſtrigis tribus punctoque humerali albis.

Callidium pallidum. Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 72.
Leptura ruſtica. Linn. Syſt. nat. 2. 639. 17. Fn. Sv. 692.
Geoff. Inſ. 1. 215. 12.
Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 5.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 7.
Habitat in Europae nemoribus.
Punctum humerale magnum ſtriga arcuata incluſa. Pectus albo maculatum.

maſſilienſe. 68. C. thorace globoſo immaculato, elytris nigris: ſtrigis tribus albis; anteriore incurva.

Leptura Maſſilienſis. Linn. Syſt. nat. 2. 640. 19.
Geoff. Inſ. 1. 215. 12.
Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 70.
Habitat in Germania.
Affine C. plebejo at duplo minus. Caput, antennae, thorax nigra. Elytra nigra ſtrigis tribus absque puncto humerali. Corporis latera albo maculata. Pedes nigri.

mucronatum. 69. C. thorace rotundato maculato, elytris mucronatis nigris: ſtrigis tribus arcuatis flavis baſi ferrugineis.

Oliv. Inſ. 70. tab. 3. fig. 34.
Habitat in America Dr. Solander.
Caput fuſcum lineis duabus flavis. Antennae breves, ferrugineae, apice fuſcae. Thorax ſtriga antica flava & utrinque macula ferruginea.

Scutellum fuſcum margine flavo. Elytra baſi ferruginea, dein faſciae tres flavae, quarum anterior antrorſum, poſteriores retrorſum arcuatae.

70. C. thorace rotundato muricato, elytris mucronatis: maculis tribus dorſalibus punctoque medio flavis. *angulatum.*
Habitat — — Muſ. Britann.
Medium. Caput fuſcum maxillis antennisque teſtaceis. Thorax lineolis parvis, transverſis, elevatis muricatus, obſcure teſtaceus margine omni flavo. Elytra laevia, teſtacea maculis tribus dorſalibus, communibus, flavis & inter 1. 2. in medio punctum parvum. Corpus rufeſcens maculis lateralibus albis.

71. C. thorace rotundato ſubſpinoſo, elytris bidentatis fuſcis: ſtrigis quatuor flavis, femoribus clavatis compreſſis. *erythrocephalum.*
Oliv. Inſ. 70. tab. 5. fig. 60.
Habitat in America Dr. Solander.
C. mucronato duplo minus. Caput, thorax, antennae obſcure ferruginea. Thorax tuberculis aliquot dorſalibus, elevatis, acutis. Elytra nigra ſtrigis quatuor rectis, flavis, apice bidentata. Pedes ferruginei femoribus clavatis, compreſſis.

72. C. thorace rotundato flavo faſciato, elytris nigris: faſciis quinque flavis, pedibus ferrugineis. *detritum.*
Leptura detrita. Linn. Syſt. nat. 2. 646. 20. Fn. Sv. 694.
Oliv. Inſ. 70. tab. 2. fig. 17.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 9. tab. 64. fig. 3.
Geoff. Inſ. 1. 216. 13.
Habitat in Europae hortis.

glaucum. 73. C. thorace rotundato nigrum elytris glauceis baſi nigro maculatis.
Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 68.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Banks.
Corpus nigrum pube glauceſcente.

fasciatum 74. C. atrum thorace faſciis duabus, elytris quatuor flavis.
Habitat Muſ. Britann.
Caput nigrum lineis duabus longitudinalibus albis. Thorax potius flavus faſcia lata media nigra. Elytra glabra, laevia: faſciis quatuor 1. 2. ad ſuturam coeuntibus. Corpus atrum albo maculatum.

trifaſciatum. 75. C. thorace globoſo ferrugineo, elytris nigris: faſciis tribus albis; prima annulari.
Oliv. Inſ. 70. tab. 5. fig. 59.
Habitat in Luſitania Dr. Grey.
Caput atrum antennis rufis. Thorax rufus tomento cinereo. Abdomen ſubtus annulis albis.

Verbaſci. 76. C. thorace rotundato nigro trimaculato, elytris rotundatis ſubvireſcentibus: faſciis tribus abbreviatis nigris; prima lunari.
Leptura verbaſci. Linn. Syſt. nat. 2. 640. 22.
Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 5. tab. 6. fig. 15.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 5. fig. 12.
Herbſt Arch. tab. 26. fig. 19.
Habitat in Europae auſtralioris Verbaſco.

ornatum. 77. C. thorace rotundato: faſcia nigra, elytris vireſcentibus: faſciis tribus integris nigris; prima annulari.
Callidium ornatum. Herbſt Arch. tab. 26. fig. 16.
Stenocorus duplex Scop. Fl. Inſ. tab. 20. fig. 5.
Habitat in Germania Dom. Smidt.

Paullo minus. C. verbaſci. Differt tantum faſcia thoracis faſciisque elytrorum marginem futuramque attingentibus.

78. C. thorace rotundato vireſcens elytris punctis quatuor. *4punctatum*

Leptura Geoff. Inſ. 213. 8.

Habitat in Gallia haud infrequens.

Medium. Caput fuſcum antennis brevibus. Thorax pubeſcens, immaculatus. Elytra punctis quatuor 2. 1. 1. Corpus cinereo tomentoſum.

79. C. thorace rotundato nigro maculato, elytris bidentatis ſubvireſcentibus: faſciis tribus nigris; prima annulari. *annulare.*

Callidium annulare. Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 74.

Habitat in Siam Muſ. Dom. Banks in India Muſ. Dom. Lund.

Antennae breves, nigrae. Caput vireſcens ore nigro. Thorax macula dorſali ramoſa nigra. Elytra vireſcentia baſi annulo magno, in medio lunula & poſtice faſcia nigris, apice bidentata. Pedes cinerei.

80. C. thorace rotundato ferrugineo, elytris cineraſcentibus: faſciis tribus fuſcis; prima annulari. *aegyptiacum.*

Habitat in Oriente Dom. Prof. Forſkahl.

Duplo minus C. verbaſci & thorax ferrugineus.

81. C. thorace rotundato, elytris fuſcis: faſciis apiceque cinereis baſi rufis. *myſticum.*

Leptura myſtica. Linn. Syſt. nat. 2. 639. 18. Fn. Sv. 693.

Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 14.

Geoff. Inſ. 1. 217. 15.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 9.

Voet Coleopt. 2. tab. 26. fig. 8.

Habitat in Europae hortis.

Variat elytris apice ſpinoſis baſique minus rufis.

virens. 82. C. thorace rotundato vireſcens antennis nigris, pedibus teſtaceis.
Habitat in Barbaria Muſ. Dom. Desfontaines.
Statura & magnitudo praecedentium. Antennae nigricantes. Corpus totum tomentoſum, vireſcens.

gibboſum. 83. C. thorace rotundato nigrum elytris cinereo faſciatis baſi bituberculatis apice acuminata.
Oliv. Inſ. 70. tab. 2. fig. 18.
Habitat in Italia Dom. Daldorf.
Antennae mediocres, ſubferrugineae. Elytra faſcia lata ante medium apiceque cinereis. Tubercula duo baſeos elevata, compreſſa & apice margo exterior excurrit in ſpinam validam.

unifaſciatum. 84. C. thorace rotundato brunneo, elytris nigris: faſcia media nivea baſi brunneis.
Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 12.
Habitat in Gallo Provincia Dom. Olivier.
Parva. Antennae mediocres. Caput & thorax brunnea. Elytra baſi brunnea, in medio faſcia nivea, quae tamen futuram vixattingit, apice nigra. Abdomen nigrum. Femora clavata.

picipes. 85. C. thorace globoſo atrum elytris ſtriga obliqua alba.
Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 43.
Habitat — — Muſ. Dr. Hunter.
Antennae mediocres, piceae. Elytra laevia, in medio ſtriga abbreviata, obliqua, alba. Pedes picei femoribus clavatis nigris.

Alni. 86. C. thorace rotundato nigrum elytris faſciis duabus albis, elytrorum baſi antennis tibiisque ferrugineis.

Leptura Alni. Linn. Syſt. nat. 2. 689. 19.
Oliv. Inſ. 70. tab. 3. fig. 7.
Herbſt Arch. tab. 26. fig. 21.
Scopol. Fn. Inſ. tab. 20. fig. 3.
Habitat in Europa, Anglia.
Quadruplo minus C. myſtico.

90. LEPTURA. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla unidentata, apice ſetoſa.
Labium membranaceum, bifidum.
Antennae ſetaceae.

1. L. nigra elytris rufis: puncto medio nigro. *unipunctata.*
Oliv. Inſ. 73. tab. 1. fig. 9.
Habitat Dresdae Dom. Romanus.
Elytra ſola rufa puncto medio nigro. Pedes nigri.
2. L. atra elytris rubris: apice ſuturaque media nigra. *haſtata.*
Oliv. Inſ. 73. tab. 1. fig. 5.
Geoff. Inſ. 1. 226. 6.
Sulz. Inſ. tab. 5. fig. 11.
Habitat in Europa auſtraliori.
Elytra in omnibus rubra & ſutura a medio ad apicem nigra, verſus apicem tamen color niger

---

Lepturae corpus oblongum, antice poſticeque attenuatum, ſaepius tomentoſum, immarginatum, tardum, capite exſerto, ovato, oculis globoſis, prominulis, marginalibus, antennis thorace longioribus, approximatis, inter oculos inſertis, thorace rotundato, anguſto, antice anguſtiore, inermi, ſcutello parvo, triangulo, elytris rigidis, fornicatis, ſaepe emarginatis, longitudine abdominis, pedibus longiuſculis, curſoriis, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

anguſtatus. Abdominis ſegmenta margine villis argenteis ſplendent.
Mas minor abdomine magis rufeſcente.

2 punctata. 3. L. nigra villoſa elytris lividis: ſutura puncto medio apiceque nigris.
Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.
Corpus nigrum tomento cinereo villoſum. Elytra livida, rarius teſtacea ſutura, puncto medio apiceque nigris. Elytra apice rotundata.

tomentoſa. 4. L. thorace villoſo aureo, elytris teſtaceis apice nigris. Geoff. Inſ. 1. 227. 8.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Differre videtur a L. melanura major. Caput cum antennis nigrum. Thorax tomento aureo tectus. Elytra laevia, teſtacea, apice ſubemarginata, nigra. Corpus nigrum abdomine argento villoſo, ano emarginato. Pedes atri.

melanura. 5. L. nigra elytris rubeſcentibus lividisve: ſutura apiceque nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 637. 2. Fn. Sv. 671. Geoff. Inſ. 1. 226. 7. tab. 4. fig. 1.
Petiv. Gazoph. tab. 30. fig. 5.
Degeer Inſ. 5. 137. 14.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 4.
Habitat in Europae floribus frequens.

laevis. 6. L. nigra elytris pedibusque lividis, elytris ſutura apiceque nigris.
Habitat Kiliae.
Affinis certe videtur praecedenti at alia & minor. Antennae nigrae articulo primo apice livido. Caput & thorax nigra, villoſa. Corpus nigrum, argento nitidulum. Pedes lividi.

livida. 7. L. nigra elytris teſtaceis immaculatis, pedibus nigris.
Herbſt Arch. tab. 26. fig. 23.
Habitat in floribus Kilonienſibus Muſ. D. Lund.

Statura omnino L. melanurae. Elytra apice rotundata, haud emarginata. Pedes nigri.

8. L. nigra elytris teſtaceis: vitta nigricante. *ſtrigilata.*
Habitat in Suecia Dom. Com. de Souza.
Parva. Caput, antennae, thorax, corpus nigra. Elytra ſubemarginata, teſtacea: taenia obſoleta, nigra. Pedes nigri.

9. L. atra elytris purpureis apice emarginatis nigris. *emarginata*
Habitat Cajennae Dr. Hunter.
Corpus atrum, immaculatum. Elytra ſubholoſericea, purpurea, apice late emarginata, atra. Abdomen atrum ſegmentis baſi argento nitentibus, apice bidentatum.

10. L. nigra elytris ſanguineis. Linn. Syſt. nat. 2. 638. 4. Sv. 679. *ſanguinolenta.*
Oliv. Inſ. 73. tab. 2. fig. 13.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 9.
Habitat in Europae floribus.
Mas elytris teſtaceis apice nigris.
Variat elytrorum margine nigro.

11. L. thorace ſubſpinoſo, elytris faſtigiatis, pectore nitente. *meridiana.*
Cerambyx meridianus. Linn. Syſt. nat. 2. 630. 47. Fn. Sv. 648.
Stenocorus meridianus. Mant. Inſ. 1. 143. 1.
Schaeff. Icon. tab. 82. fig. 4. tab. 279. fig. 3.
Habitat in Europae floribus.
Mas nigricans, faemina teſtacea.
Larva pedibus longiſſimis Raj.

12. L. ferruginea antennis elytris pectoreque fuſcis. *villica.*
Schaeff. Icon. tab. 69. fig. 1.
Habitat in Anglia Muſ. Britann.
Antennae nigrae articulo primo rufo. Caput rufum oculis nigris. Thorax rufus angulis

posticis acutis. Abdomen & pedes ferruginea.

rubra. 13. L. nigra thorace elytris tibiisque purpureis. Linn. Syst. nat. 2. 638. 3. Fn. Sv. 500.
Frisch. Inf. 12. tab. 3. tab. 6. fig. 6.
Sulz. Inf. tab. 5. fig. 30.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 2.
Habitat in Europa.

testacea. 14. L. nigra elytris testaceis, tibiis rufis, thorace postice rotundato. Linn. Syst. nat. 2. 638. 5. Fn. Sv. 680.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 3.
Habitat in Europae floribus.
Mas praecedentis, saepius copula junctae inveniuntur.

pubescens. 15. L. nigra cinereo villosa: costa alarum basi testacea.
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Affinis L. testaceae. Corpus totum nigrum, cinereo villosum sola costa alarum basi testacea.

virens. 16. L. fericeo virescens antennis fusco viridique variis. Linn. Syst. nat. 2. 638. 7. Fn. Sv. 682.
Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 111.
Panz. Naturf. 24. 31. 42. tab. 1. fig. 42.
Degeer Inf. 5. 131. 6.
Habitat in Europae arboribus.

smaragdula 17. L. fericeo virescens antennis pedibusque nigris.
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Differt manifeste a praecedente. Corpus duplo minus, fericeo virescens antennis pedibusque totis nigris.

atra. 18. L. corpore toto nigro. Geoff. Inf. 1. 228. 10.
Oliv. Inf. 73. tab. 1. fig. 4.
Habitat in Europae floribus.

Tota nigra. Abdomen ſerico albo nitet.
Variat pedibus nigris & teſtaceis.

19. L. nigra humeris abdomineque ferrugineis. *humeralis.*
Habitat in Germania Dom. Schneider.
Statura L. 4. guttatae at duplo fere major. Pedes nigri.

20. L. nigra elytris puncto baſeos lineaque media flavis. *exclamationis.*
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Parva, Caput & thorax atra, nitida, immaculata. Elytra truncata, nigra puncto baſeos lineolaque media lunata flavis. Abdomen argento villoſum. Pedes nigri.

21. L. cinerea elytris teſtaceis: ſutura nigra. *futuralis.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Antennae teſtaceae, apice nigrae. Caput, thorax, abdomen cinereo villoſa. Elytra laevia, teſtacea ſutura ſola atra. Pedes rufi geniculis nigris.

22. L. nigra ſcutello albo. *ſcutellata.*
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Corpus nigrum ſolo ſcutello albo aut fulvo. Elytra apice emarginata. Abdomen ſerico albo nitet.

23. L. ferruginea elytris teſtaceis. *lurida.*
Habitat in ſylvis Herciniae Dom. Helwig.
Praecedentibus minor. Caput & thorax rufa, immaculata. Elytra teſtacea. Corpus rufum femoribus apice nigris.

24. L. nigra femoribus baſi rufis. *femorata.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Caput, thorax, elytra, corpus nigricantia, minime nitida. Pedes nigri femoribus baſi rufis. Tibiae anticae etiam rufae.
Variat pedibus omnibus nigris femorum annulo tantum rufo.

ruficornis. 25. L. nigra antennis pedibusque rufis.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Corpus nigrum, pube flaveſcente ſericeum. Antennae & pedes rufae femoribus poſticis apice nigris.
Variat femoribus omnibus apice nigris.

marginata. 26. L. nigra elytrorum margine tibiisque poſticis rufis.
Habitat in Norwegia Muſ. Dom. Lund.
Corpus totum nigrum, obſcurum ſolo margine elytrorum tibiisque poſticis rufis.

nigra. 27. L. elytris attenuatis, corpore nigro nitido, abdomine rubro. Linn. Syſt. nat. 2. 639. 14. Fn. Sv. 687.
Stenocorus niger nitidus abdomine rubro. Geoff. Inſ. 1. 227. 9.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 7.
Degeer Inſ. 5. 144. 24.
Habitat in Europae floribus.

praeuſta. 28. L. aureo pubeſcens capite elytrorumque apicibus nigris.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Antennarum primus articulus ferrugineus. Thorax, elytra, pectus, abdomen tomento aureo tecta. Pedes rubri.

4 guttata. 29. L. fuſca elytris nigris: punctis duobus baſeos ferrugineis. q. cunda
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Thorax cinereo pubeſcens. Femora baſi ferruginea.

roſtrata. 30. L. obſcure aenea pedibus flavis.
Habitat in Ammi majus Africae Dom. Vahl.
Caput obſcure aeneum ore porrecto cylindrico. Antennae obſcurae baſi flaveſcentes. Thorax

& elytra laevia, obſcure aenea. Pedes omnes flavi.

31. L. lutea thorace lineis duabus, elytris faſciis quatuor nigris. *luteicornis.*
Habitat in Carolina Muſ. Britann.
Caput cum antennis luteum. Thorax antice attenuatus. Pedes flavi femoribus poſticis annulo nigro.

32. L. nigra elytris teſtaceis: maculis duabus nigris. *4 maculata.*
Oliv. Inſ. 73. tab. 1. fig. 7.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura omnino L. 8 maculatae, at duplo fere major. Corpus totum nigrum, minime nitidum elytris ſolis teſtaceis maculis duabus magnis nigris. Pedes nigri.

33. L. nigra elytris maculis duabus remotis ferrugineis. *4 puſtulata.*
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Macula elytrorum altera ad baſin, ubi adhuc puncta duo minuta, marginalia, altera verſus apicem fere faſciam conſtituens. Abdomen auro ſericeum.

34. L. nigra elytris lividis: maculis quatuor nigris. *8 maculata.*
Linn. Syſt. nat. 2. 633. Fn. Sv. 684.
Schaeff. Elem. tab. 118. 2. Icon. tab. 1. fig. 7.
Habitat in Europae floribus.

35. L. nigra elytris flavis: linea longitudinali arcuata maculisque quatuor marginalibus nigris. Linn. Fn. Sv. 685. *interrogationis.*
Habitat in Suecia Muſ. Dom. de Souza.
Statura omnino praecedentis. Linea longitudinalis elytrorum ad ſuturam, maculae ad marginem exteriorem. Maculae 1. 3. interdum linea arcuata connexae.

marginella. 36. L. nigricans elytris futura maculis duabus marginalibus apiceque flavis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura & ſumma affinitas praecedentis. Caput & thorax nigra tomento cinereo rariori tecta. Elytra glabra, nigra futura, maculis duabus marginalibus apiceque flavis. In apice punctum nigrum.

6maculata. 37. L. nigra elytris teſtaceis: faſciis tribus dentatis nigris; anteriore ſubinterrupta. Linn. Syſt. nat. 2. 638. 11. Fn. Sv. 686.

Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 9.

Degeer Inſ. 5. 133. 9.

Habitat in Europae hortis.

7punctata. 38. L. nigra thorace teſtaceo: puncto nigro, coleoptris teſtaceis: punctis ſeptem.

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Corpus parvum, tenue uti L. roſtratae. Antennae nigrae. Caput nigrum macula magna, frontali, teſtacea. Thorax teſtaceus puncto medio nigro. Coleoptra laevia puncto antico in medio, communi, tunc duobus paribus ultimisque apicis. Corpus nigrum abdomine teſtaceo. Pedes nigri.

12maculata 39. L. nigra elytris flavis: maculis ſex nigris.

Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.

Paullo major L. ſex maculata. Corpus totum nigrum. Elytra laevia, glabra, flava maculis ſex nigris 1 ad ſcutellum 2 ad marginem exteriorem 3 ad marginem interiorem major, oblonga, 4 ad marginem exteriorem, 5 in medio & 6 ad apicem. Pedes nigri.

attenuata. 40. L. elytris attenuatis: faſciis quatuor nigris, pedibus teſtaceis. Linn. Syſt. nat. 2. 639. 13. Fn. Sv. 688.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 6.
Habitat in Europae floribus.
Abdomen rufum, apice nigrum. Variat tamen abdomine toto nigro.

41. L. nigra coleoptris attenuatis flavis: faſciis quatuor nigris; anteriore punctata, ſecunda interrupta, tibiis poſticis bidentatis. *calcarata.*
Geoff. Inſ. 1. 226. 1.
Habitat in Germania Dom. Smidt, in America.
Statura & magnitudo L. attenuatae. Antennae nigrae articulis baſi flavis. Thorax ſubſpinoſus. Coleoptra flava faſcia anteriore e punctis quinque: intermedio in ſutura, ſecunda in medio interrupta, ultimis duabus integris. Pedes quatuor antici flavi tarſis nigris, poſtici nigri tibiis flavis, ante apicem interne bidentatis. Femora poſtica baſi flava.

42. L. nigra coleoptris teſtaceis: faſciis quatuor nigris; anteriore punctata, antennis pedibusque flavis. *ſubſpinoſa.*
Leptura armata. Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 24.
Habitat Kiliae.
Statura & magnitudo omnino praecedentis at omnino diſtincta. Antennae flavae articulis apice parum nigris. Caput nigrum faſcia frontali fulva. Thorax ſubſpinoſus, niger. Coleoptra emarginata, teſtacea faſciis quatuor: prima e punctis quinque, ultimis tribus integris. Pedes flavi femoribus poſticis apice nigris. Corpus nigrum, auro nitidulum abdominis ſegmentis tribus flavis.

43. L. nigra elytris maculis duabus punctisque duobus flavis. *ſinuata.*
Habitat Kiliae.

Statura & magnitudo omnino praecedentium. Antennae nigrae articulis baſi flavis. Elytra laevia, nigra macula baſeos magna, medio interiori ſinuata, flava, ſecunda in medio adhuc majore, marginem exteriorem attingente, ad ſuturam dilatata. Puncta praeterea duo flava, altera verſus apicem maculae ſecundae, altera in medio elytrorum verſus apicem. Corpus nigrum abdomine ſegmentis tribus flavis. Pedes flavi femoribus poſticis apice nigris.

4faſciata. 44. L. nigra elytris teſtaceis: faſciis quatuor dentatis nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 639. 12. Fn. Sv. 687.
Oliv. Inſ. 73. tab. 2. fig. 17.
Schaeff. Icon. tab. 59. fig. 6.
Degeer Inſ. 5. 132. 8. tab. 4. fig. 11.
Habitat in Europae floribus.

aurulenta. 45. L. atra thoracis margine antico poſticoque aureis, elytris teſtaceis: faſciis quatuor ſimplicibus nigris.
Habitat Kiliae.
Nimis affinis L. 4 faſciatae paullo minor. Thorax niger margine antico & poſtico villis aureis ciliato. Elytra laevia, teſtacea faſciis quatuor haud dentatis, atris, apice emarginata. Corpus atrum abdominis ſegmentis margine albis. Pedes picei femoribus baſi nigris.

dubia. 46. L. nigra ſubvilloſa elytris teſtaceis nigro punctatis, pedibus nigris.
Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.
Corpus totum nigrum, tomento fulvo nitidulum. Elytra glabra, teſtacea antice punctis tribus parvis: intermedio anteriore, in medio puncto majusculo & verſus apicem altero paullo minore. Pedes nigri.

47. L. nigra elytris maculis tribus flavis. *ſexguttata.*
Herbſt Arch. tab. 26. fig. 25.
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.
Elytrorum macula anterior baſeos ad ſuturam, reliquae duae in medio.

48. L. atra elytris faſciis tribus flavis: anteriore interrupta. *trifaſciata.*
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 10.
Habitat in Suecia Dom. Lund.
Statura praecedentium. Antennae cineraſcentes, baſi nigrae. Caput & thorax atra. Elytra nigra faſciis tribus, anteriore e punctis duobus conſtante, ſecunda dentem antrorſum emittente, tertia lunata. Pedes nigri.

49. L. viridi coerulea elytris ſubfaſtigiatis. Linn. Syſt. nat. 2. 638. 8. Fn. Sv. 683. *ſericea.*
Schaeff. Icon. tab. 84. fig. 1.
Habitat in Europae floribus.

50. L. thorace orbiculato, corpore toto atro nitido. *Morio.*
Habitat in Suecia Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Statura omnino L. collaris ideoque omnino a L. atra diſtincta. Differt inprimis thorace orbiculato, gibbo.

51. L. thorace globoſo abdomineque rubris, elytris nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 639. 16. Fn. Sv. 691. *collaris.*
Geoff. Inſ. 1. 228. 11.
Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 9.
Degeer Inſ. 5. 143. 22.
Habitat in Europae floribus.

52. L. thorace globoſo nigro, elytris violaceis, abdomine rufo. Linn. Syſt. n. 2. 639. 15. Fn. Sv. 690. *virginea.*
Oliv. Inſ. 73. tab. 2. fig. 24.
Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 8.
Degeer Inſ. 5. 144. 23.
Habitat in Europae floribus.

91. NECYDALIS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla unidentata.
Labium membranaceum, late emarginatum.
Antennae filiformes.

thalaſſina. 1. N. thorace canaliculato, corpore viridi, pedibus nigris.
Habitat Kiliae.
Duplo major N. viridiſſima. Thorax utrinque gibbus, in medio canaliculatus. Corpus totum viridi aeneum, haud nitidum pedibus omnibus nigris.

viridiſſima. 2. N. thorace teretuiſculo, corpore viridi, pedibus anticis teſtaceis.
Cantharis viridiſſima. Linn. Syſt. nat. 2. 650. 23. Fn. Sv. 717.
Cicindela viridi coerulea. Geoff. Inſ. 1. 177. 14.
Degeer Inſ. 5. 15. 4. tab. 1. fig. 13.
Habitat in Europae hortis frequens.

coeruleſcens 3. N. thorace teretiuſculo, corpore coeruleo ſubopaco.
Cantharis coerulea. Linn. Syſt. nat. 2. 650. 22. Fn. Sv. 716.
Telephorus villoſus violaceo coeruleus, antennis pedibusque nigris. Degeer Inſ. 4. 76. 8.

Necydalis corpus oblongum, anguſtum, tomentoſum, immarginatum, agile, capite ovato, inſerto, oculis globoſis, prominulis, marginalibus, antennis thorace longioribus, approximatis, inter oculos infertis, thorace rotundato: dorſo inaequali, ſcutello brevi, rotundato, elytris rigidis, attenuatis, incumbentibus, longitudine abdominis, pedibus longioribus, tenuibus, femoribus poſticis ſaepius clavatis, tarſis anticis quinque poſticis quadriarticulatis, colore vario.

Habitat in Europa cum praecedente.

4. N. thorace inaequali, corpore virescenti obscuro, antennis pedibusque nigris. *virescens.*

Cantharis virescens thorace teretiusculo, corpore virescenti fusco, femoribus posticis clavatis. Linn. Syst. nat. 2. 650. 24.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura omnino N. thalassinae at paullo minor. Caput virescens, obscure nitidum antennis nigris. Thorax utrinque impressus. Elytra obscuriora lineis duabus elevatis: interiore abbreviata. Pedes nigri femoribus posticis in altero sexu clavatis, in altero simplicibus.

5. N. thorace ovato cyanea antennis pedibusque nigris. *cyanea.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo omnino praecedentis. Caput cyaneum antennis nigris. Thorax ovatus, planus, vix utrinque impressus, laevis, cyaneus, nitidus. Elytra aequalia, laevia, cyanea, immaculata. Corpus cyaneum pedibus nigris, femoribus cyaneis.

6. N. thorace teretiusculo rufo, corpore fusco. *sanguinicollis.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Caput cum antennis fuscum. Thorax punctis duobus impressis. Elytra lineis tribus elevatis striata, fusca.

Variat femoribus posticis incrassatis.

7. N. thorace inaequali virescens elytris apice pedibusque flavescentibus. *barbara.*

Habitat in Barbaria Musc. Dom. Desfontaines.

Statura praecedentium. Differt tantum elytris apice flavescentibus. Pedes flavi femoribus posticis nigris, in altero sexu incrassatis.

ſeladonia. 8. N. thorace inaequali, corpore viridi nitidulo, elytris apice incraſſatis coeruleis.

Habitat Kiliae.

Paullo minor N. vireſcente. Caput viride ore atro, nitido. Antennae nigrae. Thorax inaequalis, viridis, nitidulus. Elytra vireſcentia lineis tribus elevatis, apice ſubcraſſioribus, coeruleis. Corpus vireſcens. Pedes nigri femoribus viridibus.

ruficollis. 9. N. thorace teretiuſculo abdomineque rufis, capite elytrisque viridi aeneis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura N. coeruleſcentis. Caput viride, nitidum antennis nigris. Thorax teretiuſculus, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra viridia. Abdomen rufum. Pedes nigri.

triſtis. 10. N. nigra thorace teretiſculo femorumque baſi rufis.

Habitat in Terra Diemenii Muſ. Dom. Banks.

Caput atrum. Elytra laevia, nigra. Corpus nigrum femoribus baſi rufis.

atra. 11. N. elytris ſubulatis atra femoribus omnibus clavatis. Linn. Syſt. nat. 2. 64. 65.

Habitat in Europa Auſtraliori.

Segmentorum abdominis margo ſubtus ad latera albus. Alter ſexus femoribus ſimplicibus.

humeraſis. 12. N. elytris ſubulatis nigris baſi flavis.

Cantharis humeralis. Oliv. Inſ. tab. fig.

Cantharis nigra, elytris attenuatis antice flavis. Geoff. Inſ. 1. 342. 2.

Necydalis muralis. Forſt. nov. ſp. Cont. 1. 48. 48.

Habitat in Anglia.

Corpus nigrum. Elytra absque lineis aut margine elevatis. Pedes ſimplices nigri.

uſtulata. 13. N. nigra elytris baſi ſuturaque late teſtaceis.

Necydalis uſtulata. Herbſt Arch.
Habitat in Germaniae plantis.
Statura omnino praecedentis.

14. N. nigra thorace elytrisque teſtaceis: his apice nigris. *melanura.*
Habitat in Hiſpaniae plantis Dom. Vahl.
Corpus nigrum thorace elytrisque teſtaceis. Elytra apice nigra.

15. N. capite thoraceque ferrugineis, elytris teſtaceis apice nigris. *notata.*
Habitat in Germania Dom. Hybner.
Statura & magnitudo omnino N. melanurae. Caput ferrugineum. Antennae mihi deſunt. Thorax ſubangulatus, ferrugineus, immaculatus. Elytra teſtacea apice nigra. Abdomen nigrum. Pedes ferruginei.

16. N. atra thorace anoque fulvis, elytris ſubcoeruleſcentibus. *fulvicollis.*
Habitat in Germania Muſ. Dom. Lund.
Paullo major N. melanura. Caput atrum antennis nigris. Thorax ſublaevis, rufus, nitidus, immaculatus. Corpus nigrum ano rufo. Pedes nigri.

17. N. elytris ſubulatis nigra femoribus omnibus clavatis, elytris antennisque rufis. Linn. Syſt. nat. 2. 642. 6. *rufa.*
Leptura nigra elytris pedibusque rubeſcentibus lividis, coleoptris attenuatis. Geoff. Inſ. 1. 220. 22.
Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 8.
Habitat in Europa.
Elytra baſi puncto nigro. Scutellum album. Thorax baſi apiceque albus. Abdomen maculis lateralibus albis.

praeuſta. 18. N. atra elytris teſtaceis apice nigris, femoribus omnibus clavatis.

Habitat in Barbaria Muſ. Dom. Desfontaines.
Statura omnino praecedentis, a quo tamen diſfert magnitudine minore, antennis nigris, thorace toto nigro, elytris apice nigris. Abdomen atrum maculis lateralibus ſupra albis. Pedes mox nigri, mox teſtacei.

coerulea. 19. N. elytris ſubulatis coerulea femoribus poſticis clavatis arcuatis.

Necydalis coerulea. Linn. Syſt. nat. 2. 642. 4.
Cantharis viridi coerulea. Geoff. Inſ. 1. 342. 3.
Necydalis ceramboides. Forſter nov. ſp. Cent. 1. 47.
Sulz. Hiſt. Inſ. 48. tab. 6. fig. 2.
Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 7.
Habitat in Oriente, Europa auſtraliori.
Variat pedibus ſimplicibus.

Podagrariae. 20. N. elytris ſubulatis teſtaceis, corpore nigro, femoribus poſticis clavatis baſi teſtaceis. Linn. Syſt. nat. 2. 642. 9.

Cantharis nigra, elytris attenuatis fulvis, femoribus poſticis globoſis. Geoff. Inſ. 1. 343. 4.
Necydalis flaveſcens. Degeer Inſ. 5. 155. 4.
Necydalis flaveſcens. Linn. Syſt. nat. 2. 642. 8. vix diſtincta videtur.
Habitat in Europae hortis.

bicolor. 21. N. coeruleſcens thoracis margine abdomine pedibusque teſtaceis.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. de Paykull.
Antennae obſcurae. Thorax rufus linea dorſali lata, coeruleſcente. Elytra vix ſtriata, coeruleſcentia, immaculata. Abdomen teſtaceum. Pedes teſtacei femoribus poſticis valde clavatis.

22. N. nigra elytris attenuatis virescentibus, femoribus posticis incrassatis arcuatis. *flavipes.*

Habitat Kiliae.

Praecedentibus duplo minor. Caput nigrum, immaculatum. Thorax utrinque impressus, viridi niger, nitidulus. Elytra virescentia, obscura linea elevata sesquialtera. Corpus nigrum. Pedes nigri tibiis anticis femoribusque posticis clavatis, arcuatis.

23. N. nigra thorace elytrisque testaceis, pedibus rufis. *testacea.*

Habitat in Germania.

Statura omnino praecedentium. Caput fuscum antennis nigris. Thorax planus, testaceus, immaculatus. Elytra attenuata, paullo pallidiora. Corpus nigrum pedibus rufis.

24. N. elytris subulatis glaucis, corpore nigro, abdominis incisuris albis. *glaucescens*

Necydalis glaucescens. Linn. Syst. nat. 2. 642. 7.

Schaeff. Icon. tab. 49. fig. 6.

Habitat in Europa australi.

25. N. elytris subulatis testaceis, pedibus simplicibus. Linn. Syst. nat. 2. 643. 10. *simplex.*

Habitat in Europa.

Forte varietas sexus N. Podagrariae.

26. N. elytris subulatis, abdomine pedibusque flavescentibus. *Quercus.*

Habitat in Daniae Quercu Mus. Dom. Lund.

Minuta. Antennae nigrae articulo primo flavo. Caput nigrum ore flavo. Thorax niger, immaculatus. Elytra fusca. Abdomen & pedes flava.

92. MOLORCHUS. *Palpi* quatuor inaequales, filiformes. *Maxilla* membranacea, bifida. *Labium* membranaceum, bifidum. *Antennae* ſetaceae.

abbreviata, 1. M. elytris dimidiatis ferrugineis immaculatis, antennis brevibus

Necydalis major. Linn. Syſt. nat. 2. 641. 1.

Leptura abbreviata. Mant. Inſ. 1. 100. 35.

Muſca cerambyx major. Schaeff. Monogr. 1753. fig. 12. Elem. tab. 13. fig. 2. Icon. tab. 10. fig. 10. 11.

Degeer Inſ. 5. 148. 1. tab. 5. fig. 1.

Habitat in Europae floribus.

Genus affine certe Lepturis maxilla bifida tamen diſtinctum. Palpi quatuor breves, inaequales, incurvi anteriores paullo longiores, quadriarticulati: articulo ultimo ovato, obtuſo adhaerentes maxillae dorſo, poſteriores breviores: articulo ultimo ovato, obtuſo adnati labii baſi exteriori. Mandibula cornea, arcuata, edentula. Maxilla brevis, membranacea, bifida: laciniis

---

Molorchi corpus oblongum, anguſtatum, glabrum, immarginatum, agile, capite ovato, declivi, inferto, oculis reniformibus, vix prominulis, marginalibus, antennis thorace longioribus, approximatis, inter oculos infertis, thorace rotundato, anguſto: dorſo canaliculato, elytris rigidis, fornicatis, abbreviatis, alis plicatis, abdomine incumbentibus, fere longitudine abdominis, abdomine elongato, margine utrinque reflexo, pedibus longiuſculis, femoribus clavatis, tarſis quadriarticulatis, colore teſtaceo.

ſubaequalibus. Labium breve, membranaceum, bifidum: laciniis rotundatis.

2. M. elytris abbreviatis, abdomine atro: faſciis fulvis. *variegata.*

Leptura variegata. Mant. Inſ. 1. 108. 30.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae fuſcae longitudine corporis. Caput atrum fronte flaveſcente. Thorax niger margine antico & poſtico lineaque dorſali fulvis. Scutellum fulvum. Elytra fuſca, ad ſuturam griſea, apice nigra. Pectus atrum, fulvo maculatum. Abdomen atrum ſupra faſcia baſeos, pone hanc ſubtus faſcia, verſus apicem annulus totum abdomen cingens; pone hunc faſcia dorſalis & tandem anus puncto fulvo terminatus. Pedes ferruginei plantis fuſcis.

3. M. elytris dimidiatis teſtaceis apice lineola alba, antennis longis. *dimidiata.*

Leptura dimidata. Mant. Inſ. 1. 100. 37.
Necydalis minor. Linn. Syſt. nat. 2. 641. 2. Fn. Sv. 837.
Muſca cerambyx minor. Schaeff. Mon. 1753. fig. 6. 7. Icon. tab. 95. fig. 5.
Sulz. Inſ. tab. 7. fig. 51.
Degeer Inſ. 5. 151. 2.
Habitat in Europae hortis.

4. M. elytris dimidiatis teſtaceis immaculatis, antennis longis. *umbellatarum.*

Leptura umbellatarum. Mant. Inſ. 1. 100. 38.
Necydalis umbellatarum. Linn. Syſt. nat. 2. 641. 3.
Schaeff. Icon. tab. 95. fig. 4.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 1.
Habitat in Germaniae umbellatis.
Praecedente duplo minor.

93. SPONDYLIS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla conica, crassa, integra.
Labium corneum, bifidum.
Antennae moniliformes.

bupreſtoides, 1. Spondylis.
Attelabus bupreſtoides. Linn. Syſt. nat. 2. 621. 3.
Friſh. Inſ. 13. 23. tab. 19.
Degeer Inſ. 5. 34. 21. tab. 5. fig. 21.
Habitat in Europae ſylvis.

94. SYNODENDRON. *Palpi* filiformes, inaequales.
Maxilla unidentata.
Labium filiforme, corneum, apice palpigerum.
Antennae lamellatae.

cylindricum. 1. S. thorace antice truncato quinque dentato, capitis cornu erecto.
Scarabaeus cylindricus. Mant. Inſ. 1. 6. 41.
Linn. Syſt. nat. 2. 544. 11. Fn. Sv. 380.
Oliv. Inſ. 1. 3. 47. 54. tab. 9. fig. 80.
Degeer Inſ. 4. tab. 10. fig. 2.
Voet. Scarab. tab. 20. fig. 131.
Lucanus cylindricus Laichart Inſ. 4. 4.

Lucanus tenebroides. Scop. Intr. Hiſt. nat. 5 75.
Habitat in Pruni Cerafi truncis Europae borealis.
Faemina mutica.

2. S. thorace muricato gibbo, elytris ante apicem bifpinoſis. *muricatum.*
Dermeſtes muricatus niger elytris poſtice retuſis dentatis, thorace muricato. Linn. Syſt. nat. 2. 562. 6.
Dermeſtes bidentatus. Mant. Inſ. 1. 37. 8.
Oliv. Inſ. 77. tab. 1. fig. 1.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 38. 92.
Habitat in Europae auſtralioris, Africae lignis.
Elytra obſcure teſtacea, poſtice retuſa denticulo elongato, hamato, nigro ad ſuturam & alio minori ad marginem. Antennae lamellatae, teſtaceae.

3. S. elytris integris nigris, thorace antice ſcabro. *capucinus.*
Boſtrichus capucinus. Mant. Inſ. 33. 5.
Habitat in Coromandel Koenig. Muſ. Banks.
Praecedente duplo minus. Corpus nigrum. Thorax antice denticulis elevatis, numeroſis. Elytra laevia, apice retuſa.

4. S. laeve nigrum obſcurum elytris ſtriatis, pedibus piceis. *Dominicum.*
Habitat in America meridionali Dom. Pflug.

Synodendron corpus cylindricum, glabrum, immarginatum, antice poſticeque obtuſum, tardum, capite parvo, ovato, plano, oculis, parvis, rotundatis, marginalibus, antennis brevibus, reflexis, ſub oculis inſertis, thorace gibbo, antice truncato, muricato aut inaequali, ſcutello parvo, triangulari, elytris rigidis, fornicatis, abdomen includentibus, apice ſaepius retuſis, dentatis, pedibus brevibus, validis, tibiis anticis dentatis, tarſis quinquearticulatis, colore obſcuro.

Parvum. Caput atrum, nitidum, ſub thorace inflexum. Thorax niger, obſcurus, antice prominens, laevis. Elytra integra, ſtriata, nigra, obſcura. Pedes picei.

95. APATE. *Palpi* filiformes, aequales.
Maxilla unidentata.
Labium membranaceum, truncatum.
Antennae perfoliatae.

muricatus. 1. A. elytris reticulatis poſtice retuſis dentatis, thorace muricato gibbo.
Ligniperda terebrans. Pall. ſpecil. Zol. 9. tab. 1. fig. 3.
Habitat in Americae meridionalis ſacharo.
Corpus magnum, cylindricum elytris reticulatis.

cornutus. 2. A. thorace antice utrinque ultra caput porrecto ferrato hirto.
Boſtrichus cornutus. Oliv. Inſ. 77. tab. 1. fig. 5.
Habitat in Madagaſcar Muſ. Dom. Olivier.
Caput parvum, planum. Thorax utrinque ultra caput protenſus, ſerratus, hirſutie ferruginea tectus. Elytra ſtriata: ſtriis punctatis.

hamatus. 3. A. elytris ante apicem uniſpinoſis, thoracis margine antico bihamato dentato.
Habitat in Saxoniae lignis Prof. Leſke.

Apate corpus cylindricum, ſubtomentoſum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotundato, inflexo, oculis globoſis, parvis, marginalibus, antennis diſtantibus, brevibus, ſuboculis inſertis, thorace rotundato, gibbo, antice ſaepius muricato, ſcutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, tarſis quadriarticulatis, colore obſcuro.

Minor A. muricato. Caput fuſcum ore pubeſcente, ferrugineo. Thorax rotundatus, antice ſubtus ſcaber margine antico utrinque humo valido, denticulato, capitis baſin tegente. Elytra punctata, fuſca ante apicem dente valido, porrecto, obtuſo.

4. A. elytris obtuſis, thorace gibbo truncato. *Monachus.*
Ligniperda cornuta. Pall. ſpicil. Zool. 9. 8. tab. 1. fig. 4.
Habitat in Americae Inſulis.
Minor A. muricato. Caput atrum fronte pilis denſis, elongatis, rufis. Thorax globoſus, truncatus antice ad latera denticulis brevibus, elevatis, numeroſis. Elytra obtuſa, integra. Abdomen piceum.

5. A. elytris integris varioloſis, thorace antice truncato. *Jeſuita.*
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae nigrae, apice ferrugineae. Thorax rotundatus, antice denticulis plurimis, elevatis, acutis muricatus. Elytra punctis latioribus ſtriata baſique puncto elevato, gibbo.

6. A. elytris retuſis cylindricus ater femoribus anticis incraſſatis. *femoralis.*
Habitat in Inſula St. Crux Americae Muſ. D. Lund.
Statura & magnitudo omnino A. Jeſuita. Corpus totum cylindricum, atrum, nitidum. Caput & thorax punctata antennis perfoliatis, flaveſcentibus. Elytra laeviſſima, nitida, poſtice retuſa margine prominulo. Pedes breves, obſcure ferruginei. Femora antica craſſa, compreſſa, ſubtus emarginata, apice dilatata, rotundata. Tibiae baſi ſinuatae, anguſtatae, apice unguiculatae.
Varietas minor an diſtincta antennarum clava craſſiori elytrisque punctatis.

capucinus. 7. A. niger elytris abdomineque rufis, thorace emarginato retuſo.

Boſtrichus capucinus. Mant. Inſ. 1. 36. 1.
Dermeſtes capucinus. Linn. Syſt. nat. 2. 562. 5.
Fn. Sv. 416.
Boſtrichus. Geoff. Inſ. 1. 302. 1. tab 5. fig. 1.
Schaeff. Elem. tab. 28. Icon. tab. 189. fig. 1.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 2. fig. 5.
Roſſ. Fn. Etr. 36. 87.
Habitat in Europae truncis emortuis.

2maculatus 8. A. thorace gibbo ſcabro: utrinque macula poſtica alba nigro punctata, elytris poſtice uniſpinoſis.

Boſtrichus bimaculatus. Oliv. Inſ. 77. tab. 2. fig. 14.
Habitat in Gallo provincia Muſ. Olivier.
Medius. Thorax gibbus, muricatus, niger macula magna, poſtica, alba punctis duobus nigris. Elytra reticulata, nigra, ante apicem ſpina magna, elevata, obtuſa.

ſinuatus. 9. A. thorace gibbo muricato, elytris apice retuſis ſinuatis.

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Minor praecedente. Antennae perfoliatae, flavae. Thorax elevatus, niger, nitidus, antice muricatus. Elytra obſcuriora, apice retuſa, ſinu magno eroſa.

tridens. 10. A. elytris retuſis dentatis piceus thorace antice gibbo dentato.

Habitat in Inſula St. Thomas Americae D. de Seheſtedt.
Statura & ſumma affinitas praecedentium. Caput parvum, ſub thorace inflexum antennis flaveſcentibus, uti videtur, perfoliatis. Thorax piceus, antice gibbus denticulis plurimis, recur-

vis. Elytra laevia, picea, poſtice retuſa denticulis tribus.

11. A. ater thorace gibbo antice ſcabro, tibiis teſtaceis. *diſpar.*
Habitat in Germaniae truncis Dom. Daldorf.
Praecedentibus minor. Thorax gibbus, ſcaber, ſubvilloſus. Elytra ſtriata, integra. Pedes nigri tibiis teſtaceis.
Mas duplo minor thorace planiore.

12. A. niger thorace teſtaceo: punctis duobus lineolaque media nigris, elytris pallidis: linea poſtica nigra. *ſignatus.*
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Duplo minor A. capucino. Thorax villoſus, teſtaceus lineola media, abbreviata punctoque utrinque nigro. Elytra punctato ſtriata lineola poſtica, abbreviata, nigra. Sutura nigra.

13. A. ater elytris integris pallidis: margine omni nigro. *limbatus.*
Dermeſtes domeſticus. Linn. Syſt. nat. 2. 643. 13. Fn. Sv. 424.
Boſtrichus limbatus. Herbſt Arch. tab. 20. fig. 11.
Habitat Kiliae ſub cortice Fagi. Daldorf.
Parvus. Thorax gibbus, ferrugineo hirtus.

14. A. ater laevis nitidus elytris laeviſſimis, pedibus piceis. *volvulus.*
Habitat in Gallia.
Parvus, omnino cylindricus. Antennae perfoliatae. Elytra atra, nitida, laeviſſima.

15. A. niger elytris integris piceis, thorace antice ſcabro. *minutus.*
Habitat in nova Zelandia Muſ. Banks.
Minutus. Antennae perfoliatae, flaveſcentes. Thorax rotundatus, gibbus, antice niger, punctis elevatis ſcaber. Elytra integerrima, laevia, teſtacea. Pedes teſtacei.

96. BOSTRICHUS. *Maxillae* cornea.

Labium cylindricum, integrum, apice palpigerum.

Antennae clava ſolida.

flavicornis. 1. B. rufus elytris nigris apice ſpinoſo dentatis, antennis flavis.

Habitat in America boreali.

Medius, totus cylindricus. Caput nigricans antennis flavis, clava compreſſa. Thorax cylindricus. Elytra ſubſtriata, apice vix retuſa, denticulata: denticulo poſtico elongato in ſpinam validam, acutiſſimam. Pedes uti corpus ſubtus brunnei.

cylindrus. 2. B. cylindricus ater elytris ſtriatis apice villoſis dentatis, pedibus compreſſis teſtaceis.

Habitat in Germaniae Quercu D. Helwig.

Statura praecedentis cylindrica. Caput fere retuſum, nigrum antennis flavis, clava magna, compreſſa, ſolida. Thorax ater, immaculatus. Elytra ſtriata, nigra, apice parum retuſa, rufo villoſa denticulis brevibus. Pedes breves, compreſſi, teſtacei.

Boſtrichi corpus parvum, cylindricum, tomentoſum, immarginatum, utrinque obtuſum, tardum, capite parvo, rotundato, recondito, oculis rotundatis, marginalibus, antennis brevibus, diſtantibus, ſub antennis inſertis, thorace rotundato, cylindrico, ſcutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, pallidis, tarſis quadriarticulatis, colore obſcuro, plerumque nigro.

3. B. teſtaceus piloſus elytris ſtriatis retuſis praemorſo dentatis. *typographus.*
Dermeſtes typographus. Linn. Syſt. nat. 2. 562. 7. Fn. Sv. 418.
Degeer Inſ. 4. tab. 6. fig. 1. 2.
Sulz. Inſ. tab. 2. fig. 4
Act. Holm. 14. 163.
Schaeff. Icon. tab. 259. fig. 3.
Habitat intra cortices arborum labyrinthos daedaleos pulvere repletos formans. Variat colore & magnitudine.

4. B. niger elytris retuſis praemorſo dentatis, pedibus piceis. *Laricis.*
Habitat ſub cortice Pini Laricis Germaniae Dom. Helwig.
Affinis praecedenti at diſtinctus & alius magis glaber, totus niger pedibus ſolis piceis.

5. B. ater elytris praemorſo dentatis ruſis. *chalcographus.*
Dermeſtes chalcographus. Linn. Syſt. nat. 2. 562. 8. Fn. Sv. 417.
Habitat intra arborum cortices.
Triplo minor B. Typographo.
Variat colore. Vidi nigros & teſtaceos, vix tamen diſtinctos.

6. B. nigricans elytris glaucis obtuſiuſculis. *polygraphus.*
Dermeſtes polygraphus. Linn. Syſt. nat. 2. 562. 10. Fn. Sv. 420.
Herbſt Arch. tab. 20. fig. 9.
Habitat in Europa ſub arborum corticibus.

7. B. nigricans thorace rufo, elytris apice retuſo dentatis. *monographus.*
Habitat in Germaniae arboribus Dom. Knoch.
Parvus. Corpus cylindricum, obſcurum ſive nigricans, nitidum, ſubvilloſum. Thorax rufus,

immaculatus. Elytra parum retuſa dentibus minutis. Pedes rufeſcentes.

micrographus. 8. B. ferrugineus elytris integris teſtaceis.
Dermeſtes micrographus. Linn. Syſt. nat. 2. 562. 11.
Habitat in Europae ligno.
Parvus. Frons tomento argenteo. Elytra teſtacea.

Scolytus. 9. B. glaber nigricans elytris truncatis integris, abdomine retuſo, fronte villoſo cineraſcente.
Scolytus. Geoff. Inſ. 1. 350. 1. tab. 5. fig. 5.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 2. fig. 13.
Schaeff. Icon. tab. 112. fig.
Habitat in Angliae Ulmos Dom. Lee.
Caput & thorax laeviſſima, atra, nitida longitudine elytrorum. Elytra ſtriata, picea, apice truncata, integra, abdomine paullo longiora. Abdomen valde retuſum, nigrum.

crenatus. 10. B. glaber ater elytris integris crenato ſtriatis.
Habitat in Germania Dom. Schneider.
Affinis B. ſcolyto, at diſtinctus. Caput & thorax laevia, atra, immaculata. Elytra integra, picea, crenato ſtriata. Pedes picei.

oleiperda. 11. B. villoſus fuſcus elytris ſtriatis griſeis, pedibus teſtaceis.
Habitat in Gallia meridionali Oleam deſtruens Muſ. Dom. Boſc.
Parvus. Caput & thorax villoſa, fuſca. Elytra ſtriata, griſea. Pedes teſtacei.

Oleae. 12. B. villoſus griſeus antennarum clava elongata.
Habitat in Galliae meridionalis Olea Muſ. Dom. Boſc.
Parvus, cylindricus, totus griſeus, diſtinctus antennarum clava elongata, cylindrica, flaveſcente.

13. B. ater nitidus elytris integris rufis, abdomine retuſo. *pygmaeus.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura omnino B. ſcolyti, at triplo minor & elytra rufa.

14. B. villoſus nigricans tibiis quatuor poſticis ſerratis. *ligniperda.*
Habitat in Germaniae ligno Dom. Hybner.
Paullo major B. piniperda. Caput nigricans antennis teſtaceis. Thorax, elytra, abdomen villoſa, nigricantia. Elytra ſtriata, apice ſubretuſa. Pedes breves, validi, teſtacei tibiis quatuor poſticis ſerratis.

15. B. villoſus niger elytris laevibus piceis. *abietinus.*
Habitat in Germaniae Abiete Dom. Smidt.
Duplo major B. piniperda. Corpus totum villoſum, nigrum elytris ſolis teſtaceis, nullo modo ſtriatis.

16. B. villoſus piceus pedibus teſtaceis. *villoſus.*
Habitat in Germaniae arboribus Dom. Helwig.
Duplo minor B. ligniperda. Corpus totum piceum, pilis rufeſcentibus hirtum. Elytra ſtriata, integra. Pedes teſtacei.

17. B. ſubvilloſus niger elytris crenato ſtriatis, plantis rufis. *piniperda.*
Dermeſtes piniperda. Linn. Syſt. nat. 2. 562. 9.
Fn. Sv. 421.
Degeer Inſ. 4. tab. 6. fig. 8. 9.
Habitat in ramulis Pini inferioribus, quos perforat, exſiccat, deſtruit.

18. B. glaber teſtaceus elytris laevibus longitudine abdominis. *teſtaceus.*
Habitat in Pini truncis Dom. Zſchuck.
Corpus oblongum, teſtaceum, immaculatum. Variat rarius corpore nigricante.

pubeſcens. 19. B. villoſus niger antennis pedibusque flaveſcentibus, fronte villoſa.
Habitat in Germaniae ligno Dom. Helwig.
Minor B. piniperda. Caput nigrum fronte cinereo villoſa. Thorax & elytra pubeſcentia, integra, nigra. Antennae & pedes flaveſcentes.

ater. 20. B. glaber ater nitidus elytris laevibus, pedibus piceis.
Ips cylindrica. Oliv.Inſ. 2. 18. 9. 10. tab. 2. fig. 16.
Habitat in Sueciae ligno D. de Paykull.
Statura cylindrica praecedentium. Corpus totum atrum, glabrum, nitidum pedibus ſolis piceis. Elytra laeviſſima.

melanocephalus. 21. B. villoſus griſeus capite nigro, pedibus flaveſcentibus.
Habitat in Daniae ligno Dom. Lund.
Parvus. Caput nigrum, immaculatum. Thorax & elytra griſea interdum litura aut punctis nigris. Pedes flaveſcentes.

vittatus. 22. B. ſubvilloſus fuſcus elytris vitta abbreviata cinerea.
Habitat in Holſatiae ligno Dom. Daldorff.
Minutus. Caput nigrum. Thorax fuſcus, immaculatus. Elytra fuſca vitta a baſi usque ad medium futurae ducta cinerea.

minutus. 23. B. elytris integris glaber ater immaculatus.
Habitat Kiloniae in Boleto verſicolore.
Corpus minimum, atrum, glabrum, immaculatum. Antennae clava ſolida, obtuſa. Elytra laevia, glabra, integra. Pedes nigri.

bidens. 24. B. fuſcus elytris apice retuſis ante apicem unidentatis.
Habitat in Kiliae ligno.
Minutus. Corpus totum fuſcum, diſtinctum elytrorum dente unico, porrecto ante apicem. Pedes teſtacei.

97. BRUCHUS. *Palpi* aequales, filiformes.
Maxilla membranacea, bifida.
Labium acuminatum.
Antennae filiformes.

1. B. griſeus thorace elytrisque ſpinoſis. *Spinoſus.*
Habitat in Jamaica Dom. Drury.
Reliquis major. Antennae filiformes longitudine dimidii corporis. Thorax rotundatus, antice anguſtatus, griſeus ſpinis tribus dorſalibus, elevatis, acutis. Elytra longitudine fere abdominis, griſea ſpinis ſparſis, erectis, brevibus. Corpus & pedes griſei.

2. B. cinereus elytris ſtriatis, femoribus poſticis ovatis dentatis. *Nucleorum.*
Herbſt Arch. tab. 20. fig. 16.
Habitat in Indiae Nucleis.
Major B. Bactris &. diſtinctus. Elytra ſtriata at haud punctata. Femora poſtica ovata, ſerrata dente medio parum longiori. Tibiae ſtriatae, incurvae.

3. B. cinereus elytris ſublaevibus, femoribus poſticis ovatis, tibiis incurvis. Linn. Syſt. nat. 2. 605. 4. Amoen. acad. 6. 392. 6. *Bactris.*
Habitat in Bactris nucleis.

Bruchi corpus ovatum, parvum, gibbum, glabrum, immarginatum, tardum, capite inflexo, obtuſo, ovato, inſerto, oculis lateralibus, rotundatis, vix prominulis, antennis brevibus, ſerratis, ante oculos inſertis, thorace ovato, gibbo, ſcutello parvo, triangulari, elytris rigidis, fornicatis, abdomine brevioribus, ano prominulo, pedibus brevibus, validis, tarſis quadriarticulatis, colore vario, obſcuro.

Antennae valde ſerratae. Femora ovata, mutica. Elytra punctato ſubſtriata.

umbellatarum. 4. B. ſquamoſus ſupra griſeus ſubtus cinereus.
Habitat in Barbariae umbellatis Dom. Prof. Vahl.
Magnus in hoc genere. Corpus totum ſquamis parvis, ſupra griſeis, ſubtus cinereis irroratum, immaculatum. Aetate glaber & niger evadit.

Piſi. 5. B. elytris nigris albo maculatis, podice albo: punctis binis nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 604. 1. Muſ. Lud. Ulr. 35.
Mylabris fuſca cinereo nebuloſa abdominis apice cruce alba. Geoff. Inſ. 1. 267. 1. tab. 4. fig. 9.
Ledermyll. Microſc. tab. 99. fig. 2.
Degeer Inſ. 4. tab. 16. fig. 3. 4.
Laria Salicis Scop. Ent. carniol 63.
Habitat in America ſeptentrionali, Europa auſtrali deſtruens piſa. Devoratur a Gracula quiscula.
Caput & antennae nigra. Femora ſubdentata.

Cacao. 6. B. corpore fuſco griſeo maculato.
Habitat in Theobromae ſeminibus.
Corpus ſtatura praecedentis at paullo minus.

Robiniae. 7. B. griſeo nitidulus elytris vix abdomine brevioribus.
Habitat in Robiniae pſeudo acaciae ſeminibus Americae borealis.
Magnus in hoc genere. Corpus totum villis griſeis nitidulum. Abdomen minus quam in reliquis prominet.

gibboſus. 8. B. thorace gibboſo cupreo, elytris nigris tuberculato ſpinoſis.
Habitat in America boreali.
Caput retractum, ſubcupreum antennis filiformibus, flavis. Thorax tuberculatus, in medio gibboſus gibbere canaliculato, cupreus. Elytra

nigra tuberculis plurimis, elevatis, obtuſis ſpinoſa, poſtice obtuſa. Pedes nigricantes.

9. B. elytris griſeis nigro maculatis, pedibus rufis, *Theobromae* ſcutello albo. Linn. Syſt. nat. 2. 605. 2.
Habitat in Theobromae feminibus.
Elytra punctis ſtriatâ. Thorax ſublineatus.

10. B. niger elytris cinereis: maculis tribus nigris margine connexis. *marginellus*
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.
Antennae porrectae, nigrae. Caput & thorax atra puncto parvo, cinereo ad baſin thoracis. Elytra laevia, cinerea macula ad baſin, altera majori in medio marginis exterioris, tertiaque in ipſa apice elytri nigris. Diſcus immaculatus. Anus cinereus prominet. Pedes nigri.

11. B. ſubferrugineus elytris apice atris, ano atro: linea apicis alba. *analis.*
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Banks.
Corpus parvum. Caput teſtaceum ſupra tomento cinereo ſubvilloſum. Thorax ferrugineus macula baſeos alba. Elytra ſtriata, ferruginea, apice late atra & ante apicem macula atra, quae arcu apice nigro jungitur. Abdomen ferrugineum ano prominente atro: linea media alba.

12. B. cinereus elytris fuſcis: puncto baſeos ocellari atro. *2 punctatus.*
Bruchus 2 punctatus. Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 4. fig. 2.
Habitat in Helvetiae plantis.
Diſtinctus puncto magno ocellari nigro iride flava ad baſin elytrorum.

13. B. thorace nigro: macula baſeos pallida, elytris rufeſcentibus: macula apiceque nigris. *4 maculatus*
Habitat in Inſula St. Crux Americes Dr. Pflug.

Parvus. Caput nigrum antennis baſi rufeſcentibus. Thorax niger macula cordata baſeos cinerea. Elytra ſtriata, rufeſcentia macula magna in medio marginis exterioris apiceque nigris. Abdomen rufeſcens ano nigro. Pedes rufeſcentes.

ſcutellaris. 14. B. ferrugineus thoracis macula baſeos ſcutelloque albis.

Habitat — — Muſ. Dom. Lund.

Statura praecedentis. Corpus totum ferrugineum capite thoraceque paullo obſcurioribus. Thorax baſi macula cordata, alba. Scutellum album. Elytra ſtriata.

granarius. 15. B. elytris nigris: atomis albis, femoribus poſticis unidentatis. Linn. Syſt. nat. 2. 605. 5. Fn. Sv. 628.

Habitat in plantarum feminibus.

Antennae baſi teſtaceae. Thorax futura alba. Elytra ſtriata, abdomine breviora. Tibiae anticae teſtaceae.

Ciſti. 16. B. ater immaculatus femoribus muticis.

Habitat in floribus Ciſti Helianthemi Muſ. Dom. Banks.

Praecedentibus duplo minor.

futuralis. 17. B. niger futura elytrorum flaveſcente.

Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.

Parvus. Caput & thorax nigra, ſubpubeſcentia. Thorax poſticè utrinque angulo exſerto, flaveſcente. Elytra laevia, nigra futura flaveſcente, interdum alba aut cinerea. Corpus cinereo pubeſcens. Pedes nigri tibiis anticis interdum teſtaceis.

abdominalis 18. B. niger abdomine cinereo maculato, pedibus anticis teſtaceis.

Habitat in India orientali Muſ. Dom. Banks.

Parvus. Caput & thorax nigra lateribus cinereo villoſis. Elytra ſtriata, nigra, immaculata. Abdomen cinereo villoſum, immaculatum. Pedes quatuor antici teſtacei.

19. B. ater antennarum baſi pedibusque anticis teſtaceis, femoribus muticis. Linn. Syſt. nat. 2. 605. 6. *feminarius.*

Mylabris nigra abdomine albo ſericeo. Geoff. Inſ. 1. 268. 3.

Habitat in Angliae floribus captus d. 28 Jun. prope Henley Anglorum.

Paullo minor B. granario. Caput prominens antennis quaſi pedunculatis, craſſis, ſerratis. Thorax antice attenuatus. Elytra ſtriata, abdomine breviora. Pedes inermes.

20. B. villoſus cinereus immaculatus. *villoſus.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura parva omnino praecedentis. Corpus totum holoſericeum, cinereum, immaculatum.

21. B. niger obſcurus antennis pedibusque rufis, femoribus poſticis incraſſatis nigris. *rufipes.*

Bruchus rufipes. Oliv. Inſ. tab. fig.

Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.

Parvus, niger, minime nitidus. Antennae flavae, apice parum nigricantes. Abdomen ſubpubeſcens apice utrinque dente parvo, obtuſo. Pedes flaveſcentes, femoribus poſticis craſſioribus, nigris.

22. B. elytris punctatis teſtaceis nigro maculatis, podice griſeo: punctis binis nigris. *maculatus.*

Habitat in America Dom. von Rohr.

Antennae ſerratae, teſtaceae. Thorax teſtaceus, obſcure fuſco maculatus. Elytra punctis ſtriata, teſtacea maculis tribus magnis, fuſcis.

Mimoſae. 23. B. teſtaceus immaculatus elytris ſubſtriatis, femoribus poſticis acute dentatis.

Habitat in Mimoſae feminibus Americae meridionalis Muſ. Dom. Lund.

Paullo major B. feminario. Corpus ſupra mox obſcurius mox dilutius teſtaceum, immaculatum. Elytra ſtriata. Subtus magis cineraſcens. Femora poſtica acute dentata.

flavicornis. 24. B. antennis pectinatis flavis, corpore atro, pedibus teſtaceis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus parvum, ovatum, atrum, nitidum. Antennae valde ſerratae, flavae. Elytra laevia, immaculata. Pedes inermes, picei.

ſerraticornis. 25. B. antennis pectinatis corpore longioribus, corpore griſeo fuſco maculato.

Habitat in Oriente Prof. Forſkahl.

Antennae longitudine corporis valde ſerratae. Thorax tomento cinereo tectus, poſtice trilobus. Elytra abdomine breviora, ſulcata, cinerea. Abdomen & pedes cinerea.

pectinicornis. 26. B. antennis pectinatis corpore ferrugineo longioribus. Linn. Syſt. nat. 2. 605. 7.

Degeer Inſ. 5. 281. 2. *15-7, rufus-*

Schaeff. Elem. tab. 86. fig. 1.

Habitat in Chinae feminibus.

Simillimus praecedenti, at totus ferrugineus.

98. ANTHRIBUS. *Palpi* quatuor aequales, filiformes.
Maxilla breviſſima, bifida.
Labium bifidum.
Antennae articulis ſubaequalibus: ultimis tribus ovatis, longioribus, craſſioribus; ultimo acuto inſidentes roſtro brevi, plano.

1. A. niger fronte anoque albis, thorace tuberculato. *Albinus.* ✓
Curculio Albinus. Mant. Inſ. 1. 118. 256. Linn. Syſt. nat. 2. 616. 79. Fn. Sv. 632.
Curculio breviroſtris antennis longis rectis, corpore oblongo nigro hiſpido, capite elytrorumque apice albis, roſtro planiuſculo lato. Degeer Inſ. 5. 255. 44. tab. 8 fig. 1. Paykull. Monogr. 118. 112. Bonsd. Curc. 16. 1.
Curculio niger Udm. Diſſ. 27.
Habitat in Europa boreali.

Anthribi corpus ovatum, gibbum, ſubglabrum, immarginatum, tardum, capite ovato, antice porrecto, plano, obtuſo, inferto, oculis marginalibus, globoſis, prominulis, antennis longiuſculis, in fovea laterali ſub oculis infertis, thorace rotundato, ſcutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, apice deflexis longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, tarſis quadriarticulatis, colore vario, ſaepius obſcuro.

Os palpis quatuor aequalibus, filiformibus anticis quadriarticulatis: articulis subaequalibus; ultimo longiori cylindrico adhaerentes maxillae dorso, posteriores vix breviores, triarticulati: articulo ultimo cylindrico adnati labii inferioris basi. Mandibula crassa, cornea, acuta. Maxilla brevissima, membranacea, bifida: laciniis aequalibus, rotundatis. Labium brevissimum, membranaceum, bifidum: laciniis cylindricis.

Antennae maris longitudine corporis: articulo 3. 4. 5. 6. 7. apice albis 8. 9. totis albis, ultimis nigris, faeminae breviores, nigrae: articulo nono tantum albo.

latirostris. 2. A. rostro latissimo plano, elytris apice albis: punctis duobus nigris.

Anthribus ater, elytris apice cinerascentibus. Geoff. Inf. 1. 307. 8. tab. 5. fig. 8.

Curculio latirostris. Mant. Inf. 1. 118. 237. Paykull. Monogr. 117. 111.

Silpha oblonga. Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 17. Schaeff. Icon. tab. 89. fig. 6.

Rossi. Fn. Etr. 1. 132. 339. tab. 5. fig. 5.

Habitat Halae Saxonum.

Affinis C. Albino & forte mera ejus varietas. Rostrum latissimum, planum, album, apice nigrum. Thorax canaliculatus, niger. Elytra nigra striis interruptis, glaucis, apice alba, punctis duobus nigris. Pedes nigri, albo annulati. Abdomen album lateribus nigris. Antennae annulo albo.

albirostris. 3. A. rostro latissimo plano elytrisque postice albis nigro variis.

Curculio albirostris. Mant. Inf. 1. 119. 238. Paykull. Monogr. 120. 113.

Curculio albiroſtris breviroſtris niger, roſtro albo, elytris poſtice albis punctis nigris contiguis. Act. Hall. 1. 287.
Curculio albiroſtris. Herbſt. Arch. 80. 66. tab. 24. fig. 26.
Habitat in Saxoniae Betula Dom. Hybner.
Praecedente duplo minor. Thorax niger, immaculatus. Elytra nigra, apice alba macula magna, palmata, nigra. Pedes nigri tibiis tarſisque albo annulatis.

4. A. griſeus elytris poſtice cinereis. *griſeus.*
Ptinus gigas. Mant. Inſ. 1. 40. 1.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae filiformes, corpore longiores, apice nigrae articulo ultimo acuto. Thorax rotundatus, griſeus, lineis quatuor obſoletis, fuſcis puncto albo. Elytra griſea punctis aliquot oblongis apiceque cinereis. Abdomen & pedes cinerei.

5. A. roſtro plano latiſſimo nigro aeneus roſtro pedibusque teſtaceis. *planiroſtris.*
Curculio planiroſtris. Mant. Inſ. 1. 119. 239. 239. Paykull. Monogr. 124. 117.
Curculio fulviroſtris. Mant. Inſ. 2. App.
Attelabus ruficollis. Herbſt. Arch.
Curculio roſtratus. Degeer Inſ. 5. 252. 42.
Habitat in Holſatiae Aeſculo Hippocaſtano Dom. Daldorf.
Parvus. Roſtrum breve, latiſſimum, planum, teſtaceum. Thorax & elytra laevia, aenea, nitida, immaculata. Pedes ſimplices, teſtacei.
Variat rarius thorace rufo.

6. A. niger elytris elevato ſtriatis rufis: punctis nigris ſparſis. *ſcabroſus.*

Anthribus ovatus niger, elytris ſtriatis rubro nigroque marmoratis. Geoff. Inſ. 1. 306. tab. 5. fig. 3.

Bruchus ſcabroſus. Mant. Inſ. 1. 41. 7.

Curculio ſcabroſus. Paykull. Monogr. 121. 114.

Bruchus ſcabroſus. Herbſt Arch. tab. 20. fig. 15.

Habitat in Europae Jacea.

Thorax cinereo villoſus. Elytra rufeſcentia: ſtriis elevatis, albidis: punctis nigris holoſericeis.

undatus. 7. A. niger elytris fuſcis: ſtrigis undatis albis.

Bruchus undatus. Mant. Inſ. 1. 41. 9.

Habitat in Africae floribus Dom. Vahl.

Corpus medium, nigrum, immaculatum. Elytra laevia, fuſca ſtrigis tribus aut quatuor undatis fuſcis.

√ *varius.* 8. A. elytris nigris: punctis albis nigrisque alternis ſtriatis. DG. 5-236-16-2-Cur. fasciculatus? Linnaeus

Bruchus varius. Mant. Inſ. 1. 42. 14.

Curculio varius. Paykull. Monogr. 122. 115.

Anthribus minimus. Geoff. Inſ. 1. 307. 2.

Habitat in Sueciae Pinetis Dom. de Paykull.

Corpus nigrum, cinereo paullo micans. Elytra punctis plurimis, alternis ſtriata. Pedes nigri femoribus muticis.

√ *ſepicola.* 9. A. cinereo fuſcoque varius: punctis elevatis piloſis.

Habitat in Germaniae ſepibus Dom. Schneider.

Magnitudo praecedentium. Roſtrum breve, apice incraſſatum. Thorax & elytra fuſco cinereoque variegata thorace punctis duobus, elytris pluribus elevatis, holoſericeis. Pedes pallidi, nigro punctati.

99. BRACHYCERUS. *Palpi* quatuor brevissimi.
antici biarticulati.
Labium rotundatum, corneum.
Antennae breves, extrorsum crassiores, rostro insidentes.

1. B. thorace spinoso: cruce impressa, elytris ferrugineo punctatis. *apterus.* ✓
Brachycerus apterus. Oliv. Inf. 3. 82. tab. 1. fig. 3.
Curculio apterus. Mant. Inf. 1. 121. 267.
Curculio apterus breviroſtris, pedibus muticis, corpore atro, thorace spinoso, elytris coadunatis, abdomine punctato. Linn. Syst. nat. 2. 619. 95.
Curculio cruciatus. Degeer Inf. 5. 275. tab. 16. fig. 1.
Habitat in India.

2. B. thorace spinoso antice excavato, elytris cinereis: punctis atris subocellatis. *ocellatus.*
Brachycerus ocellatus. Oliv. Inf. 3. 82.

Brachyceri corpus ovatum, gibbum, glabrum, immarginatum, tardum, capite parvo, inserto, antice producto in rostrum crassum, planum, obtusum, inaequale, oculis parvis, oblongis, marginalibus, antennis brevibus, sub medio marginis rostri insertis, thorace transverso, inaequali, saepius spinoso, scutello nullo, elytris connatis, rigidis, fornicatis, apice deflexis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, tarsis quadriarticulatis, colore obscuro.

Curculio ocellatus. Mant. Inſ. 1. 121. 268.
Habitat in Madagaſcar Muſ. Britannicum.
Corpus magnum B. barbari. Roſtrum breve, craſſum, obtuſum, uniſulcatum. Thorax utrinque acute ſpinoſus, antice fovea lata excavatus, ſcaber, fuſcus lineis tribus longitudinalibus, griſeis. Elytra griſea punctis elevatis, glabris, nitidis ſtriata. Puncta duarum ſtriarum ſubſpinoſa. Femora fuſca annulo albo.

ſcalaris. 3. B. thorace ſpinoſo inaequali ater elytris ſtriis ruſis denticulatis.
Curculio ſcalaris. Mant. Inſ. 1. 120. 255. Gen. Inſ. 228.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Schulz.
Roſtrum planum, craſſum, obtuſum. Thorax acute ſpinoſus, ſulcis tribus punctisque quatuor baſeos impreſſis. Elytra connata, laevia, atra ſtriis octo ſecundum totam longitudinem denticulis ruſis.

obeſus. 4. B. thorace ſpinoſo inaequali ater elytris rubris: punctis nigris confertis.
Brachycerus obeſus. Oliv. Inſ. 82. tab. fig.
Curculio obeſus. Mant. Inſ. 1. 220. 254.
Curculio tuberculatus. Degeer Inſ. 7. 658. 63. tab. 49. fig. 8.
Cuculio oedematoſus. Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 4. fig. 10.
Cuculio ater. Wulf. Inſ. cap. tab. 1. fig. 11.
Herbſt Arch. tab. 45. fig. 8.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Os maxillis palpisque. Palpi quatuor breviſſimi, filiformes, antici biarticulati: articulis globoſis; primo paullo craſſiori, ſecundo obtuſo adhaerentes maxillae medio, poſtici parum longiores, triarticulati: articulis globoſis, ſubaequalibus adnati ſub labii apice. Mandibula brevis, craſſa, cornea, apice tridentata. Maxilla brevis, mem-

branacea, piloſa, integra. Labium breve, corneum, rotundatum, truncatum.

5. B. thorace ſpinoſo quinqueſulcato, elytris laevibus. *globoſus.*

Brachycerus globoſus. Oliv. Inſ. 82. tab. fig.
Curculio globoſus. Mant. Inſ. 1. 120. 253.
Curculio globoſus. Drury Inſ. 1. tab. 32. fig. 4.
Habitat in Indiis Dom. Drury.
Roſtrum biſulcatum. Thorax ſulcis quinque: lateralibus in ipſa baſi ſpinarum. Femora annulo pallido.

6. B. fuſcus capite thoraceque cylindricis anguſtioribus, elytris poſtice ſpinoſis. Oliv. Inſ. 82. tab. 1. fig. 4. *roſtratus.*

Curculio roſtratus. Mant. Inſ. 1. 119. 245.
Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. Dom. Banks.
Spina brevis, acuta ſub antennis. Caput canaliculatum ore atro. Thorax ſulcatus, griſeo fuſcus. Elytra griſeo fuſca, immaculata, poſtice lineis duabus ſpinarum erectarum. Pedes fuſci.

7. B. aeneo niger elevato punctatus elytris poſtice verrucoſis. Oliv. Inſ. ~~n.~~ 82. t. 1. f. 2. *verrucoſus.*

Curculio verrucoſus. Mant. 1. 119. 241. Linn. Syſt. nat. 2. 618. 90. Muſ. Lud. Ulr. 60.
Curculio verrucoſus. Drury Inſ. 1. tab. 32. fig. 5.
Habitat in Aethiopia.
Totus aeneus, minime ſplendens. Elytra ſtriis tribus elevatis & inter has ſtriae duae punctorum impreſſorum.

8. B. thorace ſubſpinoſo, elytris angulo duplici criſpato. Oliv. Inſ. 82. t. 1. f. 6. *barbarus.*

Curculio barbarus. Mant. Inſ. 1. 120. 250. Linn. Syſt. nat. 617. 87.
Habitat in Africa.
Varietas duplo minor in Gallia meridionali.

✓ *inaequalis.* 9. B. thorace ſcabro, elytris lineis elevatis criſpatis, capite bidentato. Oliv. Inſ. 82. tab. 2. fig. 12.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dr. Olivier.
Magnus. Os craſſum. Caput dentibus duobus elevatis ante oculos. Pedes antici elongati.

criſpatus. 10. B. niger thorace ſpinoſo canaliculatoque, elytris cinereis: angulo exteriori criſpato dentato.
Habitat in Barbaria Muſ. Dom. Desfontaines.
Statura & magnitudo omnino B. Algiri. Caput nigrum orbita oculorum elevata. Thorax punctatus, niger utrinque ſpina valida, obtuſa, dorſo valde canaliculato: linea media parum elevata. Elytra griſea angulo exteriori valde elevato, criſpato, poſtice dentato & praeterea linea media elevata, abbreviata, ſublaevi. Corpus nigrum.

✓ *cornutus.* 11. B. cinereus thorace elytrisque ſubſpinoſis elytrorum ſpinis faſciculato piloſis.
Brachycerus cornutus. Oliv. Inſ. 82. tab. 2. fig. 14.
Curculio cornutus. Mant. Inſ. 1. 120. 257. Linn. Syſt. nat. 2. 618. 91. Muſ. Lud. Ulr. 57.
Habitat in Indiis.
Thorax ſpinoſus. Elytra punctis elevatis ſtriata adjecto faſciculo pilorum.

algirus. 12. B. cinereus thorace ſpinoſo ſulcato, elytris angulo duplici ſpinoſis. Oliv. Inſ. 82. tab. 2. fig. 16.
Curculio algirus. Mant. Inſ. 1. 120. 151.
Habitat in Africa Dom. Vahl.
B. barbaro triplo minor. Elytra lineis elevatis duabus, ſpinoſis & inter has punctis elevatis ſcabra.

retuſus. 13. B. griſeo fuſcus elytris poſtice retuſis dentatis.
Brachycerus retuſus. Oliv. Inſ. 82. tab. 1. fig. 6.
Curculio retuſus. Mant. Inſ. 1. 120. 259.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Roſtrum craſſum, inaequale, emarginatum. Thorax inaequalis, inermis. Coleoptra ſtriis ſubelevatis, dentatis, fere obſoletis, griſeo fuſca macula communi dorſali, obſcura, poſtice utrinque retuſa dentibus acutis, prominulis.

14. B. fuſcus thorace elytrisque globoſis. *ſpectrum.*
Brachycerus ſpectrum. Oliv. Inſ. 82. tab. 1. fig. 5.
Curculio ſpectrum. Mant. Inſ. 1. 119. 246.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Corpus parvum ſingularis ſtaturae. Roſtrum breve, craſſum, inaequale. Thorax brevis, elytris anguſtior, globoſus. Coleoptra connata, ſtriata punctisque elevatis, acutis ſubſpinoſa, fere globoſa. Pedes griſei.

15. B. thorace ſpinoſo ſulcato niger obſcurus elytris lineis tribus elevatis crenatis. *muricatus.*
Brachycerus muricatus. Oliv. Inſ. 82. tab. 1. fig. 19.
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.
Statura & magnitudo B. algiri totus obſcure niger, minime nitidus. Roſtrum apice emarginatum. Elytra lineis tribus approximatis, elevatis, crenatis ſive ſubdentatis: interſtitiis laevibus, apice obtuſa & fere retuſa.

16. C. thorace ſpinoſo inaequali, elytris tuberculis elevatis obtuſis numeroſis. *Uva.*
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. de Paykull.
Medius. Thorax ſpinoſus, inaequalis, ater macula utrinque ſupra ſpinam & alia ſub ſpina fulvis. Elytra atra tuberculis numeroſiſſimis, elevatis, obtuſis. Pedes atri femoribus ſubtus macula magna e pilis fulvis.

100. ATTELABUS. *Palpi* filiformes.

Maxilla bifida.
Labium corneum, palpos tegens.
Antennae moniliformes, roſtro inſidentes.

Coryli. 1. A. niger elytris rufis reticulatis. Linn. Syſt. nat. 2. 619. 1. Fn. Sv. 638.
Curculio excoriato ruber. Degeer Inſ. 5. 257. 46. tab. 8. fig. 3.
Curculio Avellanae. Paykull. Monogr. 128. 121.
Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 8.
Sulz. Inſ. tab. 4. fig. 1.
β. Attelabus Avellanae niger elytris thorace pedibusque rubris. Linn. Syſt. nat. 1. 619. 2.
Rhinomacer thorace elytrisque rubris, capite parce elongato. Geoff. Inſ. 1. 237. 11.
Schaeff. Icon. tab. 56. fig. 5. 6.
Habitat in Coryli foliis, quae in cylindrum voluit & utrinque claudit.

ſpecioſus. 2. A. ater nitidus elytris maculis duabus rubris.
Habitat Tranquebariae Dom. de Seheſtedt.
Sequentibus major. Antennae porrectae, atrae articulis cylindricis. Caput poſtice attenuatum,

---

Attelabi corpus ovatum, parvum, glabrum, immarginatum, tardum, capite exſerto, ovato, poſtice attenuato, antice porrecto, oculis globoſis, marginalibus, ante roſtrum inſertis, antennis brevibus, approximatis, roſtri baſi inſertis, thorace rotundato, ovato, ſcutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, tarſis quadriarticulatis, colore vario plerumque obſcuro.

atrum, nitidum oculis prominulis. Thorax rotundatus, ater, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, atra, nitida maculis duabus fulvis, altera baseos ad marginem crassiorem, altera pone medium. Corpus atrum.

3. A. ater elytris macula baseos rufa. *2 pustulatus*
Habitat in America septentrionali Dom. Yeats.
Statura A. curculionoides. Corpus atrum, nitidum elytris macula magna baseos rufa. Pedes atri femoribus anticis intus unidentatis.

4. A. niger elytris rufis: fascia media apicisque nigra. Linn. Syst. nat. 2. 620. 5. *pensylvanicus.*
Habitat in America boreali.
Statura omnino praecedentium.

5. A. ferrugineus: tuberculis nigris sparsis. *gemmatus.*
Attelabus gemmatus. Thunb. nov. sp. 3. 68. fig. 80.
Habitat ad Cap. Bon. Spei.
Caput attenuatum.

6. A. obscure ferrugineus elytris flavo notatis, pedibus flavis. *notatus.*
Habitat in India Dom. de Paykull.
Statura omnino A. Coryli. Caput obscure ferrugineum, postice valde angustatum. Thorax obscure ferrugineus, immaculatus, antice angustatus. Elytra striata striis punctatis ferruginea basi in duplici serie flavo notata. Pedes flavi.

7. A. piceus elytris apice retusis, pedibus anticis elongatis: femoribus unidentatis. *longimanus*
Habitat in Senegalia Dom. de Paykull.
Paullo major A. longimano. Caput & thorax laevia, glabra, nigricantia. Elytra vix striata, picea, apice retusa gibberedque parvo notata. Corpus piceum. Pedes picei, antici valde elongati femoribus clavatis denteque valido armatis.

nigripennis 8. A. ferrugineus elytris laeviſſimis atris.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. de Paykull.
Statura omnino A. coryli at paullo minor. Antennae fuſcae. Caput poſtice parum anguſtatum. Corpus ferrugineum, nitidum elytris ſolis laeviſſimis, atris.

fuſcicornis. 9. A. ferrugineus antennis tarſisque fuſcis, elytris punctato ſtriatis.
Habitat in Senegalia Dom. de Paykull.
Duplo minor A. Coryli. Caput poſtice valde anguſtatum, ferrugineum antennis apice fuſcis. Thorax antice anguſtatus, ferrugineus, immaculatus. Elytra punctato ſtriata. Pedes ferruginei tarſis omnibus fuſcis.

ſpinoſus. 10. A. ferrugineus thorace elytrisque ſpinoſis.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. de Paykull.
Corpus parvum, totum ferrugineum. Caput poſtice attenuatum. Thorax poſtice tuberculis duobus elevatis, obtuſioribus. Elytra ſpinis plurimis, validis, acutis, apice nigris.

indicus. 11. A. ferrugineus capite elytrorum baſi faſciaque media cyaneis. Thunb. nov. ſp. 3. 68. fig. 81.
Habitat in India orientali.
Statura & magnitudo omnino A. penſylvanici.

curculionoides. 12. A. niger thorace elytrisque rubris. Linn. Syſt. nat. 2. 619. 3.
Rhinomacer niger thorace elytrisque rubris, proboſcide longitudine capitis. Geoff. Inſ. 1. 273. 10.
Curculio nitens. Paykull. Monogr. 130. 122.
Schaeff. Icon. tab. 56. fig 7.
Sulz. Inſ. tab. 4. fig. 12.
Habitat in Europae Corylo, Salice.
Alium vidi ſimillimum at vix diſtinctum thorace nigro.

13. A. ferrugineus coleoptris angulatis: disco nigro. *angulatus.*
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput ferrugineum oculis nigris. Thorax ferrugineus macula magna baseos fusca. Coleoptra striata, nigra margine omni ferrugineo. Angulus acutus utrinque versus basin. Corpus ferrugineum pectore nigro.

14. A. violaceus hirtus rostro atro. *pubescens.*
Curculio pubescens. Syst. Ent. 131. 19.
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.
Corpus totum violaceo hirtum rostro solo nigro, magis elongato quam in reliquis.

15. A. aureus rostro plantisque nigris. *Bachus.*
Curculio Bachus. Mant. Inst. 1. 99. 29. Linn. Syst. nat. 2. 611. 38. Paykull. Monogr. 133. 124.
Rhinomacer niger, elytris rubris, capite thoraceque aureis, proboscide longitudine corporis. Geoff. Inst. 1. 270. 4.
Curculio purpureus. Degeer Inst. 5. 250. 38.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 18.
Sulz. Inst. tab. 4. fig. 4.
Habitat in Vite, Corylo.

16. A. corpore viridi aurato subtus concolore. *Betuleti.*
Curculio Betulae. Mant. Inst. 1. 99. 30. Linn. Syst. nat. 2. 611. 39. Fn. Sv. 605.
Rhinomacer viridi coeruleus. Geoff. Inst. 270. 2.
Curculio Populi. Paykull. Monogr. 131. 123.
Degeer Inst. 5. 248. 5. tab. 7. fig. 25.
Habitat in Betula alba, in Vite folia contorquens. Alter sexus thoracem antrorsum spinosum gerit.
Variat saepe colore coeruleo.

Populi. 17. A. corpore viridi ignito, ſubtus atro coeruleſcente.
Curculio Populi Mant. Inſ. 1. 99. 31. Linn. Syſt. nat. 2. 511. 40. Fn. Sv. 606. Paykull. Monogr. 132. 123. 8.
Rhinomacer viridi auratus, ſubtus nigro violaceus. Geoff. Inſ. 270. 3.
Degeer Inſ. 5. 249. 38.
Habitat in Betula, Populo.
Thorax in altero ſexu antrorſum ſpinoſus.

bicolor. 18. A. niger capite thorace elytrisque rubris, roſtro longitudine corporis atro.
Curculio bicolor. Mant. Inſ. 99. 32.
Habitat in America Muſ. Dr. Hunter.
Statura A. Bachi. Caput rufum roſtro atro. Thorax & elytra rufa, immaculata.

hungaricus. 19. A. villoſus ater thorace elytrisque rufis: ſutura atra.
Curculio Hungaricus. Herbſt Arch. tab. 24. fig. 10.
Habitat in Hungaria.
Statura & magnitudo A. Bachi. Roſtrum elongatum, cylindricum, atrum. Antennae atrae clava oblonga. Thorax villoſus, rotundatus, ruber, immaculatus. Elytra villoſa, ſubſtriata, rubra ſutura nigra ad baſin dilatata. Pedes atri.

aequatus. 20. A. cupreo niger elytris rufis.
Curculio aequatus longiroſtris aeneus, elytris rubris, roſtro nigro. Linn. Syſt. nat. 2. 607. 9. Paykull. Monogr. 135. 126.
Geoff. Inſ. 1. 270. 4.
Habitat in Europae plantis.
Statura omnino A. Bachi at minor. Caput cupreo nigrum roſtro longo, cylindrico, atro. Thorax magis cupreus, obſcurus. Elytra punctato

ſtriata, rubra, immaculata. Corpus cupreo nigrum.

21. A. violaceus nitens thorace elytrisque teſtaceis. *coeruleocephalus.*
Curculio coeruleocephalus. Mant. Inſ. 199. 33. Herbſt. Arch. tab. 24. fig. 11.
Act. Hallenſ. 1. 282.
Habitat in Saxoniae Crataego Dom. Hybner.
Caput pubeſcens, violaceum. Thorax & elytra pubeſcentia, nitida, teſtacea. Corpus & pedes violacea.

22. A. obſcure aeneus ſubtus obſcurior. *cupreus.*
Curculio cupreus. Mant. 1. 100. 34. Linn. Syſt. nat. 2. 608. 21. Fn. Sv. 593. Paykull. Monogr. 134. 125.
Habitat in Europae borealis hortis.

23. A. niger elytris aeneis. *aeneus.*
Curculio aeneus. Mant. Inſ. 1. 100. 36. Payk. Monogr. 142. 134.
Habitat in Anglia Muſ. Dr. Hunter, in Hyſſopo officinali Paykull.
Parvus. Corpus nigrum elytris ſolis aeneis.

24. A. griſeus pedibus rufis, roſtro femoribusque baſi nigris. *fuſciroſtris.*
Curculio fuſciroſtris. Mant. Inſ. 1. 100. 41.
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.
Parvus. Roſtrum elongatum, nigrum. Thorax & elytra ſtriata, griſea lineis duabus aut tribus albis ad futuram. Pedes rufi femoribus baſi nigris.

25. A. viridi aeneus elytris ſtriatis, roſtro cupreo. *cupriroſtris.*
Curculio cupriroſtris. Mant. Inſ. 1. 100. 43.
Curculio viridi ſericeus. Geoff. Inſ. 1.
Habitat in Saxoniae Betula D. Zſchuck.
Roſtrum arcuatum, cupreum. Thorax viridi aeneus, nitidus. Elytra ſtriata, concolora. Pedes fuſci.

rufiroſtris. 26. A. niger roſtro dimidiato pedibusque rufis.
Curculio rufiroſtris. Mant. Inſ. 1. 100. 46.
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.
Caput fuſcum roſtro atro, nitido. Thorax gibbus, viridis lineis duabus dorſalibus fuſcis. Elytra tomentoſa, viridia, immaculata. Pedes fuſci.

Alliariae. 27. A. pubeſcens cyaneus elytris ſtriatis.
Curculio Alliariae. Mant. Inſ. 1. 101. 35. Linn. Syſt. nat. 2. 506. 4. Fn. Sv. 580.
Friſh. Inſ. 9 35. tab. 18.
Degeer Inſ. 5. 251. 39.
Habitat in Eryſimo Alliaria.

Craccae. 28. A. niger obſcurus elytris ſtriatis obſcure coeruleis, roſtro apice depreſſo. Linn. Syſt. nat. 2. 506. 6. Paykull. Monogr. 140. 131.
Curculio viciae. Degeer Inſ. 5. 253. 83. tab. 6. fig. 31. 32.
Habitat in hortis Holſatiae.
Statura oblonga praecedentis. Roſtrum elongatum, cylindricum, apice depreſſum. Thorax cylindricus, antice parum anguſtatus, baſi vix canaliculatus. Elytra ovata, ſtriata, at haud punctata, obſcure coerulea. Corpus nigrum, obſcurum.

Sorbi. 29. A. ater elytris ſtriatis obſcure coeruleſcentibus, roſtro arcuato longitudine corporis.
Curculio laevigatus. Paykull. Monogr. 141. 138.
Habitat in Germaniae arboribus.
Statura omnino praecedentium. Roſtrum elongatum, arcuatum, atrum, longitudine corporis. Thorax ovatus poſtice puncto medio impreſſo niger, obſcurus. Elytra ovata, ſtriata

nullo modo punctata, obscure coerulescentia.
Corpus nigrum.

30. A. ater elytris cyaneis nitidulis. *cyaneus.*
Curculio cyaneus. Mant. Inf. 1. 101. 55. Linn. Syst. nat. 2. 506. 5. Fn. Sv. 581.
Herbst Arch. tab. 24. fig. 5.
Habitat in Europae Malva.
Thorax utrinque tuberculo elevato. Corpus minutum.

31. A. gibbus supra ater subtus cinereus. *globosus.*
Curculio Craccae. Mant. Inf. 1. 101. 56.
Curculio Hypoleucos. Paykull. Monogr. 75. 72.
Quenz. Diss. Inf. 16. Ins. Lec. Lon. 3 p. 264–26.
Habitat in Europae arena.
Parvus, fere globosus, supra glaber, ater, subtus subvillosus, pallidus.

32. A. griseus elytris pedibusque testaceis. *Malvae.*
Curculio Malvae. Mant. Inf. 1. 101. 67.
Curculio Pineti. Paykull. Monogr. 61. 58.
Habitat in Angliae Malvis.
Thorax & abdomen pilis cinereis grisea. Elytra testacea.

33. A. ater femoribus luteis. *flavipes.*
Curculio flavipes. Mantiss. Inf. 1. 102. 63.
Paykull. Monogr. 143. 135.
Rhinomacer niger striatus femoribus rufis. Geoff. Inf. 1. 272. 8.
Habitat primo vere frequens locis apricis, calidioribus.

34. A. purpureus nitens rostro longissimo. *purpureus.*
Curculio purpureus. Mant. Inf. 1. 102. 64.
Linn. Syst. nat. 2. 607. 14. Fn. Sv. 585.

Degeer Inſ. 5. 250. 38.

Bergſtr. nomencl. 1. 16. 12. tab. 2. fig. 12.

Habitat in Europae plantis.

An ſatis a ſequente diſtinctus mihi haud rite notus.

frumentarius. 35. A. ſanguineus elytris crenato ſtriatis.

Curculio frumentarius. Mant. Inſ. 1. 102. 65. Linn. Syſt. nat. 2. 608. Fn. Sv, 586. Payk. Monogr. 139. 130.

Act. Holmenſ. 1750. 186. 1.

Act. Nidroſ. 3. 391.

Loewenh. Arcan. 183. aug. 6. 83. fig. 3.

Degeer Inſ. 5. 251. 48.

Habitat in frumento diutius aſſervato.

vernalis. 36. A. nigricans elytris cinereis: faſciis duabus nigris, pedibus rufis.

Curculio vernalis. Paykull. Monogr. 138. 129.

Habitat in Holſatiae Urtica primo vere.

Statura & magnitudo omnino A. flavipedis. Roſtrum elongatum, cylindricum, nigricans puncto apicis atro. Thorax cylindricus, nigricans linea media impreſſa. Elytra ſtriata, cinerea faſciis duabus latis, fuſcis, obliquis. Pedes omnes rufi.

Betulae. 37. A. pedibus ſaltatoriis, corpore atro. Linn. Syſt. nat. 2. 620. 7. Fn. Sv. 640.

Curculio Betulae. Paykull. Monogr. 127. 120.

Curculio excoriato niger. Degeer Inſ. 5. 209. 47.

Habitat in Betulae foliis, quae rodendo pulchre criſpa reddit.

101. RHINOMACER. *Palpi* quatuor extrorsum crassiores: articulo ultimo truncato. *Antennae* setaceae, rostro insidentes.

1. R. villoso griseus antennis pedibusque nigris. *curculioides*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino Curculionis. Antennae longitudine thoracis, setaceae articulo ultimo acuto, nigrae. Rostrum crassiusculum, planum, in medio impressum. Thorax elytraque grisea, laevia, immaculata. Subtus cinereus. Pedes cinerei.

2. R. villoso piceus antennis pedibusque testaceis. *attelaboides*

Curculio Rhinomacer. Paykull. Monogr. 126. 119.

Habitat in Sueciae plantis Dom. de Paykull.

Praecedente minor. Rostrum porrectum, elevatum antennis setaceis, obscure testaceis. Thorax elytraque tomentoso picea. Corpus cinereum pedibus testaceis.

Rhinomacer corpus parvum, ovatum, villosum, immarginatum, tardum, capite inserto, antice rostro brevi, plano, oculis globosis, marginalibus, antennis longitudine thoracis in medio rostri insertis, thorace ovato, scutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus longiusculis, tenuibus, tarsis quadriarticulatis, colore obscuro.

102. CURCULIO. *Palpi* quatuor filiformes.

Maxilla cylindrica, unidentata.

Antennae clavatae: articulo primo longiſſimo, inſidentes roſtro corneo.

* *Longiroſtres femoribus ſimplicibus.*

gigas. 1. C. longiroſtris thorace elytrisque ſcabris, antennis apice albis.

Curculio gigas. Oliv. Inſ. 83. tab. 12. fig. 146.

Curculio Elephas longiroſtris fuſcus thorace elytrisque varioloſis, elytris poſtice ſpinoſis. Mant. Inſ. 1. 97. 7.

Habitat in Japonia Muſ. Britann.

Roſtrum cylindricum, elongatum, arcuatum, antice fuſcum, poſtice cinereum. Thorax rotundatus inprimis lateribus punctis elevatis, acutis, ſcaber, fuſcus dorſo cineraſcente. Elytra connata, ſcabra, obſcure griſea punctis fuſcis albisque ſparſis. Femora ſcabra. Antennae clavatae, apice albae.

Curculionis corpus oblongum, ovatumque, immarginatum, tardum, capite rotundato, inferto, antice porrecto in roſtrum rotundatum, oculis globoſis, prominulis, lateralibus, antennis longitudine thoracis, diſtantibus, medio roſtri utrinque inſertis, thorace ſaepius rotundato, ſcutello brevi, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, lateribus deflexis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, curſoriis, femoribus ſaepe dentatis, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

2. C. longiroſtris ater thorace ſupra plano, elytris abbreviatis ſtriatis. *Palmarum.*

Curculio Palmarum. Oliv. Inſ. 2. 83. tab. 2. fig. 16.
Linn. Syſt. nat. 2. 506. 1. Muſ. Lud. Ulr. 242.
Degeer Inſ. 5. 269. tab. 15. fig. 26.
Rumph. Amb. 1. 79. tab. 17. fig. 9.
Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 5.
Gronov. Zooph. 578. tab. 16. fig. 4.
Merian. Surin. tab. 48. fig. 3.
Sulz. Inſ. tab. 3. fig. 20.
Habitat in Indiae Palmis.

3. C. longioſtris ater thorace lineis elytrisque punctis duobus ferrugineis. *cruentatus.*

Curculio cruentatus. Oliv. Inſ. 33. tab. 12. fig. 147.
Habitat in Carolina Muſ. Dom. Banks.

C. Palmarum minor. Roſtrum elongatum, compreſſiuſculum, arcuatum, atrum. Antennarum clava ferruginea. Thorax planus, ater lineis duabus dorſalibus, ſubflexuoſis, ſanguineis. Elytra abbreviata, ſtriata, holoſericea, atra punctis duobus diſci ſanguineis. Pedes atri. Tibiae apice ſpina valida, acuta, arcuata.

4. C. longiroſtris nigricans elytris ferrugineis, roſtro emarginato, pedibus anticis longioribus. *longipes.*

Curculio longipes. Oliv. Inſ. 83. tab. 15. fig. 191.
Voet. Coleopt. 2. tab. 36. fig. 10.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lee.

Magnitudo fere C. Palmarum. Roſtrum cylindricum, apice emarginatum. Antennarum clava truncata. Thorax in altero ſexu niger, in altero rufus macula nigra, glaber, laevis. Elytra abbreviata, ſtriata, ferruginea. Pedes antici elongati. Tibiae incurvae, anticae intus hirtae.

Coloſſus. 5. C. longiroſtris nigricans elytris brunneis aut cinereis, pedibus elongatis.
Curculio Coloſſus. Oliv. Inſ. 83. tab. 3. fig. 32.
Curculio longipes. Drury Inſ. 2. tab. 33. fig. 3.
Voet. Coleopt. 2. tab. 36. fig. 9.
Habitat in India orientali.
Corpus magnum, nigricans elytris in altero ſexu brunneis, in altero cinereis. Roſtrum elongatum in altero lineis duabus tuberculorum elevatorum. Pedes elongati, nigri.

Indus. 6. C. longiroſtris ater thorace ſubovato excavato punctato, elytris rugoſo ſulcatis, tibiis ſpinoſis. Linn. Syſt. nat. 2. 506. 2. Muſ. Lud. Ulr. 43.
Degeer Inſ. 5. 15. 22.
Habitat in India.
Magnitudo C. Palmarum.

paganus. 7. C. longiroſtris griſeus thoracis dorſo fuſco: arcubus cinereis, roſtro biſulcato.
Habitat in Indiis Dom. Torſtenſon.
Duplo major C. Pini. Roſtrum craſſum, capite duplo longius, fuſcum ſulcis duobus exaratum. Antennae griſeae, baſi nigrae. Thorax lateribus griſeis, dorſo fuſco, arcubus quatuor lineolaque media cinereis. Elytra obtuſa, immaculata. Femora mutica.

ferrugineus. 8. C. longiroſtris obſcure purpuraſcens elytris abbreviatis, femoribus mediis ciliatis.
Curculio ferrugineus. Oliv. Inſ. 83. tab. 2. fig. 16.
Sulz. Hiſt. Inſ. 4. tab. 4. fig. 11.
Habitat in Braſilia.

hemipterus. 9. C. longiroſtris obſcure purpuraſcens, elytris abbreviatis maculatis. Linn. Syſt. nat. 2. 506. 3. Muſ. Lud. Ulr. 44.
Curculio hemipterus. Oliv. Inſ. 83. tab. 1. fig. 4.

Curculio rufofaſciatus. Degeer Inſ. 5. tab. 15. fig. 25.

Habitat Cajennae Muſ. Dom. Olivier.

Diſtinctus omnino a praecedente triplo minor. Colore variat ſemper tamen elytris obſcurius maculatis.

10. C. longiroſtris rufo nigroque varius roſtro apice nigro. *variegatus.*

Curculio variegatus. Oliv. Inſ. 83. tab. 13. fig. 158.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lee.

Roſtrum elongatum, cylindricum, ferrugineum, apice nigrum. Thorax ferrugineus lineis tribus nigris: lateralibus abbreviatis. Pectus nigrum lineis tribus ferrugineis. Elytra ſtriata, nigra lineolis aliquot ferrugineis. Pedes nigri femoribus ferrugineis: annulo nigro.

11. C. longiroſtris cinereus coleoptris macula communi cordata fuſca. Linn. Syſt. nat. 2. 608. 18. Muſ. Lud. Ulr. 45. *melanocardius.*

Sulz. Hiſtor. Inſ. tab. 4. fig. 11.

Habitat in India.

Antennae nigrae.

12. C. longiroſtris nigricans thoracis elytrorumque margine rufo. *limbatus.*

Curculio limbatus. Oliv. Inſ. 83. tab. 2. fig. 22.

Habitat in Senegallia.

Magnus. Roſtrum longum, nigrum. Thorax niger margine ferrugineo. Elytra ſtriata, nigra margine ferrugineo.

13. C. longiroſtris niger thorace ſubſpinoſo: lineis elytris poſtice cruce albis. *cruciatus.*

Curculio cruciatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 131.

Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Caput nigrum faſcia baſeos cinerea. Roſtrum thorace longius, cylindricum, inflexum antennis

nigris. Thorax ovatus punctis elevatis acutis, subspinosus, niger linea laterali albida. Elytra itidem punctis elevatis, acutis, numerosissimis subspinosa, nigra lineola baseos cruceque postica albis. Pedes nigri femorum apice tibiarumque basi puncto albo.

sanguinolentus. 14. C. longirostris ater elytris fascia baseos sanguinea.

Curculio sanguinolentus. Oliv. Inf. 83. tab. 10. fig. 116.

Habitat in Insula Tabago Americes Dom. Lee.

Duplo minor C. cruentato. Fascia elytrorum marginem haud attingit.

fasciatus. 15. C. longirostris ater elytris striatis: fascia media sanguinea.

Curculio fasciatus. Oliv. Inf. 83. tab. 11. fig. 136.

Habitat —— Mus. D. Francillon.

Magnitudo praecedentis. Fascia elytrorum marginem haud attingit.

striatus. 16. C. longirostris niger elytris holosericeo striatis.

Curculio striatulus. Oliv. Inf. 83. fig. 140.

Habitat in Insula Terra neuve Mus. D. Banks.

Rostrum longum, ferrugineum, apice nigrum. Thorax rotundatus, scaber, niger. Elytra nigra striis elevatis, holosericeis e punctis albis nigrisque alternis. Pedes ferruginei.

rubetra. 17. C. longirostris ater antennis apice griseis, femoribus sulcatis.

Curculio gagates. Oliv. Inf. 83. fig. 104.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Magnitudo C. Pini. Corpus totum atrum, laeve, nitidum. Thorax laevis. Elytra subtilissime punctato striata. Femora canaliculata, atra.

gagates. 18. C. longirostris ater glaber nitidus rostro subcompresso.

Habitat Cajennae de Paykull.
Praecedente triplo minor, totus ater, nitidus, laevissimus, gibbus. Roſtrum compreſſiuſculum.

19. C. longiroſtris ovatus cineraſcens elytris ſtriatis. *mendicus.*
Curculio mendicus. Oliv. Inſ. 83. tab. 9. fig. 108.
Habitat in Inſula Madagaſcar Muſ. Regis Galliae.
Magnitudo omnino praecedentis totus cinereus.

20. C. longiroſtris niger elytris ſtriatis albo maculatis. *Pineti.*
Curculio confuſus. Paykull. Monogr. 35. 33.
Habitat in Sueciae Pino Dom. de Paykull.
Statura omnino C. Abietis at paullo major & femora inermia. Elytra maculata, ſive potius punctis nigris albisque alternis ſtriata: albis majoribus.

21. C. longiroſtris elytris rufeſcentibus: faſciis nebuloſis. Linn. Syſt. nat. 2. 608. 19. Fn. Sv. 589. Paykull. Monogr. 36. 34. *Pini.*
Curculio Pini. Oliv. Inſ. 83. tab. 4. fig. 42.
Curculio caſtaneus. Degeer Inſ. 5. 222. 15.
Friſh. Inſ. 11. tab. 23. fig. 5.
Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 7.
Habitat in Sueciae Pino.

22. C. longiroſtris niger cinereo villoſus roſtro atro: utrinque ſulco abbreviato baſeos. *Onopordi.*
Habitat in Africae Onopordine Prof. Vahl.
Affinis ſequenti at major & alius. Roſtrum reliquis brevius, nitidum, baſi utrinque ſulco parvo exaratum. Thorax ſcaber & elytra nigra villis vel potius ſquamis cinereis tecta.

23. C. longiroſtris ferrugineo fuſcus albo lineatus roſtro nigro: utrinque ſulco abbreviato baſeos. *Urſi.*
Curculio vittatus. Mant. Inſ. 1. 18. 16.
Habitat in Italia Dom. Allioni.

Roſtrum cylindricum, nigrum inter oculos ſulcis duobus abbreviatis. Thorax ferrugineo fuſcus lineis quinque albis. Elytra laevia margine lineaque media albidis.

Jacea. 24. C. longiroſtris niger cinereo irroratus elytris puncto baſeos diſtincto.
Geoff. Inſ. 1. 281. 8.
Habitat in Cantaurea Jacea Prof. Hermann.
Roſtrum craſſiuſculum, cylindricum, nigrum. Thorax ovatus, niger, cinereo irroratus. Elytra nigra atomis cinereis, villoſis adſperſa & puncto diſtincto baſeos verſus ſcutellum.
Aetate magis glaber & niger evadit.

planus. 25. C. longiroſtris niger immaculatus roſtro cylindrico, elytris ſtriatis.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura omnino C. Jaceae at minor. Roſtrum breve, cylindricum, obtuſum at nullo modo incraſſatum. Antennae nigrae clava albo annulata. Thorax niger, obſcurus, immaculatus. Elytra ſtriata, nigra apice parum cinereo maculata. Pedes nigri.

punctulatus 26. C. longiroſtris flavo fuſcoque varius, abdomine cinereo nigro punctato.
Habitat in America Muſ. Dom. Romani.
Paullo minor C. Jaceae. Corpus totum villoſum, flavo fuſcoque varium. Antennae nigrae. Thorax inaequalis. Abdomen ſubtus cinereum punctis plurimis, elevatis, atris, nitidis. Pedes cinerei.

ocularis. 27. C. longiroſtris nigro vireſcens roſtro ferrugineo: orbita oculorum nivea.
Habitat in Barbaria Muſ. Desfontaines.
Medius. Antennae cinereae articulo primo longiori, nigro. Roſtrum elongatum, cylindricum

ferrugineum, aetate nigrum evadit. Caput nigrum orbita oculorum nivea. Thorax & elytra ſcabra, nigra, viridi ſubvilloſa. Pedes nigri, antici parum elongati.

28. C. longiroſtris niger vireſcenti irroratus roſtro nigro ſubcarinato. *Cynarae.*
Curculio Cardui. Roſſ. Fn. Etr. 1. 111. 284. tab. 5. fig. 11.
Panz. Naturf. 24. 18. 25. tab. 1. fig. 25.
Habitat in Cynarae floribus Africae D. Vahl.
Affinis C. Jaceae at duplo fere major. Roſtrum nigrum linea media elevata. Thorax planus, ſcaber linea laterali vireſcente. Elytra punctato ſtriata atomis plurimis, villoſo vireſcentibus irrorata. Subtus cinereus.

29. C. longiroſtris griſeus elytris puncto albo. *Colon.*
Paykull. Monogr. 33. 32.
Curculio Colon. Linn. Mant. 531. Oliv. Inſ. 83. fig. 76. Geoff. Inſ. 1. 280. 6.
Curculio paluſtris Scop. carn. 104.
Herbſt Arch. tab. 24. fig. 1.
Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 9. & tab. 62. fig. 10.
Habitat in Germania.

30. C. longiroſtris fuſcus elytris puncto cinereo, roſtro pedibusque atris. 2 *maculatus*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Paullo minor C. Colon. Roſtrum incurvum, atrum, nitidum. Thorax fuſcus linea laterali cinerea. Elytra laevia, fuſca puncto diſtincto cinereo. Pedes nigri.

31. C. longiroſtris ater elytris ſtriatis: puncto medio albo, antennis pedibusque rubris. *punctum*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Praecedentibus duplo minor. Roſtrum elongatum, arcuatum, atrum. Antennae ferrugineae

clava fuſca. Thorax gibbus, ſubpunctatus linea media glabra, ater, immaculatus. Elytra ſtriata, atra puncto parvo pone medium albo. Pedes ferruginei.

biguttatus. 32. C. longiroſtris niger elytris puncto elevato, abdomine pedibusque poſticis flavis.

Habitat in America Muſ. Dr. Hunter.

Caput nigrum. Thorax cylindricus, niger, immaculatus. Elytra laevia, nigra puncto magno, elevato, globoſo, flaveſcente ad baſin. Abdomen flavum. Pedes antici elongati, nigri, reliqui flavi.

bilineatus. 33. C. longiroſtris fuſcus elytris lineis duabus punctorum alborum.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Roſtrum craſſiuſculum, nigrum. Thorax niger lineis tribus albis. Elytra ſtriata, nigra lineis duabus e punctis quadratis, albis, quarum altera ad marginem, altera ad ſuturam. Pedes nigri.

ſordidus. 34. C. longiroſtris niger obſcurus immaculatus elytris ſtriatis.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dr. Pflug.

Corpus medium, nigrum, obſcurum, minime nitidum, immaculatum. Elytra ſtriata.

ſuillus. 35. C. longiroſtris obſcurus thorace ſcabro, elytrorum ſtriis piloſis.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom. Smidt.

Magnitudo & ſtatura praecedentis. Roſtrum arcuatum, nigrum antennis obſcuris. Thorax obſcure cinereus, punctis elevatis ſcaber. Elytra piloſa, ſtriata ſtriis ſcabris.

36. C. longiroſtris cinereus elytris apice ſtriis albis nigro punctatis. *teſſellatus.*
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.
Medius. Caput & antennae fuſca. Thorax & elytra griſea, at elytra apice ſtriis quinque albis & in his puncta diſtincta, atra.

37. C. longiroſtris ater thorace plano punctato, elytris abbreviatis ſubſtriatis. *abbreviatus*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Quadruplo minor C. Palmarum. Antennae nigrae, apice cineraſcentes. Roſtrum incurvum. Thorax planus, punctatus linea media parum elevata. Elytra obſcura, ſubſtriata.

38. C. longiroſtris ater nitidus thorace plano laevi, elytris ſtriatis. *nitens.*
Habitat in Gallia meridionali. *Barnco & ad mare Caſp. in Aſia*
Minor C. abbreviato & alius. Corpus totum atrum, nitidum antennarum clava apice cineraſcente. Thorax planus, laevis, nitidus. Elytra ſtriata longitudine abdominis.

39. C. longiroſtris thorace laevi, elytris muricatis nigris: punctis duobus apiceque albis. Herbſt Arch. tab. 24. fig. 2. Paykull. Monogr. 39. 36. *Equiſeti.*
Curculio nigrogibboſus. Degeer Inſ. 5. 224. 17.
Curculio ſcaber. Linn. Syſt. nat. 2. 609. 22. Fn. Sv. 592.
Habitat in Angliae Equiſito aruenſi.
Roſtrum atrum. Thorax niger, vix tuberculatus lateribus albis. Elytra muricata lateribus apiceque albis, in parte anteriori nigra puncta duo, parva, alba.

40. C. longiroſtris niger elytris ſubſtriatis rufis. *dimidiatus.*
Curculio dimidiatus. Oliv. Inſ. 83. tab. 1. fig. 5.
Habitat — — —

Duplo major C. atriroſtris.

Bufo. 41. C. longiroſtris fuſcus elytris ſubreticulatis: faſcia media alba.

Curculio Bufo. Oliv. Inſ. 83. fig. 118.

Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.

Roſtrum elongatum, inflexum, fuſcum litura dorſali, cinerea antennisque piceis. Thorax fuſcus dorſo plano punctis duobus minutiſſimis, albis. Scutellum lateraque albida. Elytra plana, fuſca, rufo ſubvilloſa faſcia in medio lata, communi, albida, ad apicem litura alba.

atriroſtris. 42. C. longiroſtris cinereus roſtro arcuato atro. Paykull. Monogr. 40. 37.

Habitat Lipſiae Muſ. Prof. Leſke.

Magnitudo & ſtatura C. Equiſeti. Corpus totum obſcure cinereum, poſtice obtuſiuſculum roſtro ſolo, arcuato, atro.

brunniroſtris. 43. C. longiroſtris griſeus roſtro pedibusque ferrugineis.

Habitat in Daniae plantis Dom. Lund.

Medius. Roſtrum elongatum, incurvum, ferrugineum, nitidum. Antennae ferrugineae, apice cinereae. Thorax elytraque griſea, immaculata. Pedes brunnei.

feſtivus. 44. C. longiroſtris aeneo nitidus elytris baſi angulo obtuſo, roſtro apice antennisque fuſcis.

Habitat Surinámi.

Magnitudo praecedentis. Roſtrum cylindricum, aeneum, apice fuſcum. Antennae fuſcae. Thorax gibbus, aeneus, nitidiſſimus. Elytra punctato ſtriata, aenea, nitidiſſima margine baſeos angulato. Pedes virides.

Tragiae. 45. C. longiroſtris aeneus roſtro pedibusque ſubconcoloribus.

Curculio Tragiae. Oliv. Inſ. 83. fig. 112.

Habitat in Tragiae volubilis feminibus Braſiliae Muſ. Dom. Banks.
Parvus. Caput paullo obſcurius. Thorax aeneus, obſcurus. Elytra aenea. Pedes obſcuriores.

46. C. longiroſtris niger elytris aeneis. *aeneus.*
Habitat in Anglia Muſ. Dr. Hunter.
Minutus. Corpus nigrum elytris ſolis aeneis.

47. C. longiroſtris ater nitidus roſtro arcuato. *curviroſtris.*
Curculio curviroſtris. Oliv. Inſ. 83. fig. 115.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Thorax punctatus. Elytra ſtriata.

48. C. longiroſtris ater antennis tibiisque piceis, elytris oblongis ſtriatis. *Aethiops.*
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Difficilius diſtinguitur. Magnitudo & ſtatura omnino C. Ceraſi, at femora mutica & color totus, ater, nitidus antennis tibiisque piceis. Elytra oblonga, ſtriata.

49. C. longiroſtris fuſcus elytris ſubſtriatis ferrugineo irroratis. *Scirpi.*
Habitat in Galliae Scirpo Muſ. Dom. Boſc.
Affinis certe praecedenti at diſtinctus colore magis fuſco, elytris minus ſtriatis atomis ferrugineis, antennis pedibusque nigris.

50. C. longiroſtris ater antennis ferrugineis, thorace bituberculato. Linn. Syſt. nat. 2. 507. 12. Paykull. Monogr. 137. 128. at antennae omnino hujus generis. *Pruni.*
Habitat in Ceraſi foliis.
Valde diſtinctus utrinque tuberculo elevato thoracis. Elytra ſtriata.

51. C. longiroſtris ater immaculatus elytris crenato ſtriatis. *Armeniaca.*
Habitat Kiliae.

Statura & magnitudo omnino praecedentis. Corpus totum atrum, minime nitidum. Antennae & pedes nigri. Thorax dorso plano. Elytra crenato striata.

Camelus. 52. C. longirostris fuscus thorace elytrisque tuberculatis, rostro apice rufo.

Habitat in Germaniae hortis Dom. Smidt.

Medius. Rostrum reliquis brevius, fuscum, apice obscure rufum. Antennae clava ferruginea. Thorax fuscus, obscurus tuberculis aliquot elevatis, acutis. Elytra obscura, striata: striis tuberculis plurimis, elevatis, acutis. Corpus fuscum, obscurum.

4 tuberculatus. 53. C. longirostris thorace quadrituberculato nigro, elytris striatis cinereo variegatis.

Curculio quadricornis. Payk. Monogr. 71. 69.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Parvus. Rostrum atrum. Corpus cinereum. Pedes cinerei femoribus posticis nigris.

teter. 54. C. longirostris depressus villosus fuscus rostro atro.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura & magnitudo C. Campanulae, at supra magis planus. Antennae fuscae. Thorax planus, villosus, fuscus, immaculatus. Elytra striata, villosa, fusca. Corpus fuscum.

Campanulae. 55. C. longirostris ovatus niger elytris striatis obtusis. Linn. Syst. nat. 2. 506. 7. Paykull. Monogr. 28. 27.

Degeer Inf. 5. 236. 23.

Habitat in Campanulae rotundifoliae pericarpiis.

Corpus totum nigrum, postice obtusum.

56. C. longiroſtris viridis roſtro atro. Paykull. *nigriroſtris.*
Monogr. 56. 53.
Roſſ. Fn. Etruſc. 1. 114. 292.
Herbſt Arch. tab. 24. fig. 3.
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.
Caput fuſcum roſtro cylindrico, atro, nitido. Thorax gibbus, rotundatus, viridis lineis duabus dorſalibus, fuſcis. Elytra tomentoſa, viridia, immaculata. Pedes fuſci.

57. C. longiroſtris ſubteſtaceus thorace viridi lineato, roſtro apice fuſco. *variabilis.*
Curculio nigriroſtris β. Paykull. Monogr. 57. 53. β.
Habitat Hamburgi Dr. Schulz.
Medius. Caput pallide teſtaceum roſtro apice fuſco. Antennae rufeſcentes clava cinerea. Thorax obſcurus lineis tribus diſtinctis, viridibus. Elytra pallide rufeſcentia, polline vireſcenti adſperſa. Pedes rufi.

58. C. longiroſtris oblongus niger argento-holoſericeus roſtro dimidiato pedibusque piceis. Paykull. Monogr. 63. 60. *piciroſtris.*
Habitat Hafniae Dom. Lund, in capitulis Trifolii Paykull.
Caput nigrum roſtro dimidiato piceo. Pedum geniculi nigri.

59. C. longiroſtris niger antennarum baſi coleoptrorum diſco tibiisque teſtaceis. *Salicariae.*
Curculio Lythri. Paykull. Monogr. 74. 48. β.
Habitat in Lythro Salicaria Angliae Dom. Banks.
Corpus parvum, nigrum. Roſtrum ſtriatum & thorax nigra, immaculata. Coleoptra ſtriata diſco teſtaceo, margine omni nigro. Pedes teſtacei femoribus apice fuſcis.

floralis. 60. C. longiroſtris obſcure griſeus elytrorum ſutura pallida.
Habitat in Sueciae floribus Dom. de Paykull.
Corpus parvum. Roſtrum arcuatum, nigrum. Thorax tuberculatus. Elytra ſtriata ſutura albida.

Pſeudacori. 61. C. longiroſtris ſupra niger thoracis lateribus ferrugineis, elytris ſtriatis: ſutura baſi alba.
Habitat in Galliae Pſeudacoro Muſ. Dom. Boſc.
Affinis certe ſequentibus at diſtinctus & duplo major. Roſtrum longum, arcuatum, nigrum, baſi ferrugineum. Thorax ſupra niger, ſubtus lateribusque inprimis antice ferrugineus. Corpus cinereum pedibus nigris.

Caſtor. 62. C. longiroſtris ovatus thorace tuberculato, coleoptris ſtriatis: ſutura baſi albida, pedibus rufis.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura omnino C. pericarpii & ejus varietas teſte Paykull. Roſtrum craſſiuſculum, atrum. Thorax tuberculatus, fuſcus lateribus pallidioribus. Elytra ſtriata, interdum variegata, interdum obſcura, ſemper tamen ſutura baſi albida. Pedes rufi.

pericarpius. 63. C. longiroſtris ſubgloboſus nebuloſus elytrorum ſutura baſi alba. Linn. Syſt. nat. 2. 609. 31. Fn. Sv. 602. Paykull. Monogr. 67. 65. Herbſt Arch. tab. 24. fig. 4.
Habitat in Scrophulariis.
Totus ſupra obſcure fuſcus ſutura baſi alba, ſubtus cinereus. Femora clavata. Pedes picei.

quercicola. 64. C. longiroſtris ater thorace tuberculato, elytris ſtriatis: ſutura baſi alba, pedibus nigris. Payk. Monogr. 70. 68.
Habitat in Sueciae Quercu Dom. de Paykull.
Affinis certe C. caſtor at minor & pedes nigri.

65. C. niger thorace bituberculato canaliculatoque, elytris ſtriatis. Paykull. Monogr. 69. 67. *aſſimilis.*
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Paullo minor C. pericarpio cui affinis.

66. C. longiroſtris albo fuſcoque varius elytris puncto baſeos elevato atro, roſtro nigro. Paykull. Monogr. 55. 52. *Siſymbrii.*
Habitat in Siſymbrio amphibio Kiliae lectus die XX Maj.
Parvus. Roſtrum elongatum, nigrum. Antennae fuſcae. Thorax albidus macula fuſca, in qua linea dorſalis, albida. Elytra albo fuſcoque varia & ad baſin puncto parvo, atro. Corpus albidum.

67. C. longiroſtris coleoptris faſciis duabus abbreviatis albis. *capreae.*
Habitat in Salice caprea Angliae Dom. Banks.
Parvus. Caput, thorax, corpus atra. Thorax linea dorſali cineraſcente. Elytra ſtriata, atra faſciis duabus ſinuatis, albis, quae tamen marginem exteriorem haud attingunt. Pedes nigri.

68. C. longiroſtris villoſus cinereus elytris macula media fuſca. Paykull. Monogr. 58. 55. *bipunctatus*
Curculio 2 punctatus longiroſtris cinereus elytris macula nigra, tibiis flaveſcentibus. Linn. Syſt. nat. 2. 609. 28. Fn. Sv. 599.
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Parvus. Antennae teſtaceae. Supra totus villoſus, cinereus macula elytrorum media, fuſca. Subtus obſcurior vel nigricans tibiis teſtaceis.

69. C. longiroſtris villoſus vireſcens roſtro nigro, pedibus teſtaceis. *Carpini.*
Curculio Carpini Knoch. Beytr.
Habitat in Germaniae Carpino Dom. de Seheſtedt.

Statura & ſumma affinitas praecedentis. Differt tantum elytris immaculatis pedibusque totis teſtaceis.

Eryſimi. 70. C. longiroſtris niger thorace bituberculato viresſcente, elytris cyaneis. Paykull. Monogr. 76. 73.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Praecedentibus magis gibbus. Roſtrum nigrum. Thorax obſcure viridis tuberculo utrinque elevato. Elytra ſtriata, cyanea. Pedes nigri.

4 maculatus 71. C. longiroſtris nigricans coleoptris maculis quatuor albidis. Linn. Syſt. nat. 2. 609. 29. Fn. Sv. 600.

Curculio cinereus elytrorum puncto quadruplici albo. Geoff. Inſ. 1. 187. 22.

Habitat in Europae plantis.

unifaſciatus. 72. C. longiroſtris ſupra fuſcus elytris faſcia media cinerea.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Medius. Caput fuſcum roſtro nigro. Thorax ſupra fuſcus, cinereus. Elytra ſubſtriata faſcia in medio lata, cinerea. Litura ad apicem cinerea. Pedes nigri femoribus albidis.

Lythri. 73. C. longiroſtris ater elytris faſcia media abbreviata punctoque poſtico albis, pedibus flavis. Paykull. Monogr. 74. 71.

Habitat in Lythri floribus Uplandiae Dom. de Paykull.

Parvus. Caput & thorax atra, nitida. Elytra nigra faſcia media alba, quae tamen marginem haud attingit. Pone faſciam punctum parvum, oblongum. Pedes flavi genubus nigris.

bifaſciatus. 74. C. longiroſtris niger elytris faſciis duabus cinereis, baſeos majore undata.

Habitat Kiliae Dom. Lund.

Roſtrum atrum. Thorax rotundatus, ater linea dorſali pallidiore. Scutellum cinereum. Elytra ſtriata faſciis duabus undatis, cinereis, vix marginem exteriorem attingentibus, quarum baſeos ad ſuturam major, altera in medio anguſtior. Pedes nigri. Affinis C. Salicis at pedes mihi haud ſaltatorii videntur.

75. C. longiroſtris niger antennis pedibusque piceis, abdomine ovato. Linn. Syſt. nat. 2. 507. 13. Fn. Sv. 584. Paykull. Monogr. 50. 47. Degeer Inſ. 5. 235. 22. Herbſt Arch. tab. 24. fig. 12. Habitat frequens in floribus tetradynamis. Elytra punctato ſtriata. *acridulus.*

76. C. longiroſtris fuſcus thorace tuberculato, elytris ſcabris, pedibus piceis. Habitat in Germania Dom. Smidt. Affinis ſequenti at paullo minor. Roſtrum apice atrum. Thorax in medio baſi canaliculatus, utrinque tuberculatus. Elytra ſtriata, punctisque elevatis ſcabra. Pedes picei. *ſcabratus.*

77. C. longiroſtris ſupra ater thorace bituberculato margineque antico elevato. Habitat in Germania Dom. Smidt. Statura & magnitudo omnino C. acriduli. Roſtrum arcuatum, atrum antennis nigris. Caput nigrum. Thorax in medio canaliculatus, utrinque tuberculatus margine antico elevato, acuto. Elytra ovata, ſtriata, nigra, immaculata. Corpus cinereum pedibus nigris. *alauda.*

78. C. longiroſtris elytris rubris: ſutura dimidiata nigra. Linn. Syſt. nat. 2. 608. 17. Fn. Sv. 588. Paykull. Monogr. 14. 13. at femora dentata. Curculio dorſalis. Oliv. Inſ. 83. fig. 169. *dorſalis.*

Habitat in Ranunculo Ficaria.

Parvus, nimis affinis C. Refinae at femora inermia. Tibiae flavae.

Quercus. 79. C. longiroſtris cinereus thoracis dorſo fuſco, elytris teſtaceis cinereo undatis.

Curculio Quercus. Linn. Syſt. nat. 2. 614. 59.

Curculio Rana thorace fuſco: limbo teſtaceo, elytris teſtaceis: faſciis tribus undatis cinereis. Mant. Inſ. 1. 101. 52.

Habitat in Kiliae, Sueciae Quercu.

Parvus. Corpus cinereum. Roſtrum nigrum. Thoracis dorſum fuſcum linea media pallidiori. Elytra ſtriata, pallide teſtacea faſciis 4-5 undatis, cinereis. Pedes teſtacei.

futuralis. 80. C. longiroſtris ovatus fuſcus: linea longitudinali alba.

Habitat in Germaniae Salice.

Corpus parvum. Roſtrum arcuatum, nigrum. Thorax fuſcus linea dorſali alba. Elytra ſtriata, gibba futura alba, ſubtus cinereus.

Crux. 81. C. longiroſtris ater thorace punctis duobus baſeos, elytris futura punctisque ſparſis albis.

Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

Caput atrum roſto incurvo. Thorax rotundatus, ater utrinque puncto oblongo baſeos albo. Scutellum album. Elytra ſtriata, nigra futura ad baſin punctisque plurimis, ſparſis, albis. Pedes nigri. Corpus ſubtus albidum.

Lemnae. 82. C. longiroſtris ater roſtro apice plano, elytris ſtriatis.

Habitat in Germaniae Lemna Prof. Helwig.

Minutus. Roſtrum elongatum, apice planum. Thorax punctatus. Elytra ſtriata.

exclamationis. 83. C. longiroſtris ater elytris puncto lineolaque apicis albis.

Curculio exclamationis. Oliv. Inſ. 83. fig. 167.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Parvus, ater, nitens puncto in medio & lineola ad apicem elytrorum albis.

84. C. longiroſtris fuſcus thorace elytrisque albo lineatis, pedibus teſtaceis. *venuſtus.*
Curculio albovittatus. Herbſt Arch.
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.
Parvus. Caput fuſcum antennis teſtaceis lineaque dorſali albida. Thorax fuſcus lineis tribus albidis. Elytra punctato ſtriata, dilutiora lineis duabus ſubinterruptis, albis. Pedes teſtacei.

85. C. longiroſtris elytris cinereis: macula media fuſca. Paykull. Monogr. 44. 41. *Plantaginis.*
Curculio Plantaginis. Degeer Inſ. 5. 237. 24. tab. 7. fig. 17. 18.
Habitat Halae Dom. Hybner.
Roſtrum nigrum. Thorax cinereus, medio fuſcus linea dorſali, cinerea. Elytra cinerea macula magna, media, fuſca & praeterea puncta aliquot ejusdem coloris.

86. C. longiroſtris griſeus nigro nebuloſus antennis fuſcis. Linn. Syſt. nat. 2. 613. 60. Fn. Sv. 390. Paykull. Monogr. 43. 40. *Rumicis.*
Degeer Inſ. 5. 231. 20. tab. 7. fig. 10. 11.
Raj. Inſ. 85. 36.
Habitat in Europae borealis Rumice.
Femora in noſtris ſpeciminibus mutica.

87. C. longiroſtris griſeus thorace nigro cinereo lineato, elytris punctis nigris teſſellatis. *adſperſus.*
Habitat Kiliae.
Statura & ſumma affinitas C. Rumicis. Roſtrum cylindricum, atrum, immaculatum. Thorax niger linea laterali, albida. Elytra obſcura, albo ſublineata punctisque numeroſis

nigris teſſellata punctoque majori, communi apicis. Corpus griſeum.

granarius. 88. C. longiroſtris piceus thorace punctato longitudine elytrorum. Linn. Syſt. nat. 2. 608. 16. Fn. Sv. 587. Payk. Monogr. 54. 51.
Geoff. Inſ. 1. 255. 18.
Raj. Inſ. 88.
Joblot. Obſ. Microcoſp. 1754. tab. 7. fig. 1.
Degeer Inſ. 5. 239. 25.
Devaſtat granaria. Pellitur Iſatide, Hyoſcyamo, Sambuco, Thlaſpide.

Oryzae. 89. C. longiroſtris piceus thorace punctato longitudine elytrorum, elytris punctis duobus rufis.
Curculio Oryzae. Linn. Amoen. acad. 6. 395. 19.
Curculio Oryzae. Oliv. Inſ. 83. fig. 81.
Habitat in Oryza ſaepius lectus inter grana ex Oriente adportata.
Statura & ſumma affinitus C. granarii at puncta duo in elytris ruſa.

2 tuberculatus. 90. C. longiroſtris ferrugineus thorace longitudine elytrorum punctisque duobus dorſalibus elevatis.
Curculio 2 tuberculatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 165.
Habitat in nova Zeelandia Muſ. Dom. Banks.
Statura & ſumma affinitus praecedentium. Corpus obſcure ferrugineum. Thorax punctatus punctisque duobus dorſalibus, elevatis. Elytra punctato ſtriata.

paraplecticus. 91. C. longiroſtris cylindricus ſubcinereus elytris mucronatis. Linn. Syſt. nat. 2. 610. 24. Fn. Sv. 604. It. Scan. 184. Paykull. Monogr. 53. 50.
Curculio paraplecticus. Oliv. Inſ. 83. fig. 106.
Curculio oblongus elytris villoſo cinereis, ſutura nigra. Geoff. Inſ. 1. 279.

Schreber. Sammlung. Tom. XI. 336. tab. 4.
Degeer Inſ. 5. 224. 18. tab. 7. fig. 8.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 4.. fig. 7.
Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 1.
Habitat Larva intra caulem umbellatarum aquaticarum. Paraplegiam equorum cauſſare fertur.

92. C. longiroſtris cylindricus canus fuſco lineatus. *anguinus.*
Linn. Syſt. nat. 2. 610. 35.
Curculio anguinus. Oliv. Inſ. 33. fig. 168.
Panz. Naturf. 24. 19. 26. tab. 1. fig. 26.
Habitat in Germania.
Mihi haud rite notus. Forte mera varietas ſequentis.

93. C. longiroſtris oblongus obſcurus elytris cinereis fuſco ſubſtriatis. *ſtriatellus.*
Habitat in Barbariae plantis Muſ. Dom. Desfontaines.
Magnitudo & ſtatura praecedentium. Antennae clava acuminata, cinerea. Thorax fuſcus lateribus ſtriisque obſoletis, albidis. Elytra cinerea, fuſco ſubſtriata. Corpus obſcurum.

94. C. longiroſtris thorace nigro cinereo lineato, elytris mucronatis griſeis. *umbellatarum.*
Habitat in Barbariae Umbellatis Dom. Vahl.
Duplo fere minor C. paraplectico. Roſtrum atrum, nitidum. Thorax niger, obſcurus lineis quatuor cinereis: intermediis abbreviatis. Elytra griſea, apice mucronata.

95. C. longiroſtris cylindricus cinereus fuſco lineatus elytris mucronatis. *mucronatus.*
Habitat in Barbariae plantis.
Statura & magnitudo C. paraplectici. Roſtrum utrinque linea pallida, apice nigrum. Antennae breves, inflexae, extrorſum craſſiores. Thorax cinereus dorſo fuſco lineis duabus longi-

tudinalibus, cinereis, lateribus atris: margine albo, apice mucronata. Subtus albus punctis nigris.

ferrugatus. 96. C. longiroſtris niger ferrugineo villoſus elytris obtuſis.
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.
Corpus cylindricum magnitudine C. paraplectici totum ferrugineo tomentoſum roſtro ſolo cylindrico, nigro.

gages. 97. C. longiroſtris ater nitidus elytris ſtriatis obſcuris, roſtro truncato.
Habitat in Aquapim Guineae Dr. Iſert.
Statura omnino & magnitudo C. paraplectici. Roſtrum cylindricum, reliquis brevius, truncatum, atrum. Thorax planus, laevis, ater, nitidus. Elytra parum abbreviata, ſtriata, obſcura, minime nitida. Pedes breves, atri, nitidi.

8 *lineatus.* 98. C. longiroſtris cylindricus niger thorace elytrisque lineis quatuor albis.
Curculio 8 lineatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 89.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Reg. Galliae.
Statura & magnitudo C. paraplectici at diſtinctus.

ſemipunctatus. 99. C. longiroſtris cylindricus thorace lineis elytris punctis albis.
Curculio ſemipunctatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 141.
Brentus ſemipunctatus. Mant. Inſ. 1. 96. 4.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Caput nigrum orbita oculorum alba. Thorax ater, canaliculatus lineis quinque albis. Elytra punctata, ſubſtriata, abdomine longiora, acutiuſcula, nigra punctis numeroſis albis, ſparſis. Subtus albicans punctis aliquot nigris. Pedes fuſci.

4 *puſtulatus* 100. C. longiroſtris niger elytris maculis duabus ferrugineis.

Curculio 4 puſtulatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 117.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Antennarum clava apice albida. Roſtrum cylindricum, atrum. Thorax ater macula utrinque marginali, albida. Elytra ſtriata, truncata, nigra maculis duabus ferrugineis anteriori majori.

101. C. longiroſtris cylindricus albo fuſcoque nebulosus elytris ſubmucronatis, antennarum clava teſtacea. *mixtus.*
Habitat in Barbariae plantis Muſ. Dom. Desfontaines.
Statura & magnitudo fere C. paraplectici. Roſtrum reliquis brevius, craſſiuſculum, nigricans. Antennarum clava acuminata, teſtacea. Thorax cinereo fuſcoque mixtus punctisque elevatis atris, ſcaber. Elytra vix ſtriata uti totum corpus colore fuſco cineroque mixto.

102. C. longiroſtris cylindricus ſubcinereus thorace lineis tribus fuſcis. *filiformis.*
Habitat in Italia Dom. Dr. Allioni.
Quadruplo minor C. paraplectico. Roſtrum fuſcum. Thorax cinereus lineis tribus fuſcis. Elytra cinerea, immaculata, minime punctata, obtuſa. Pedes fuſci.

103. C. longiroſtris cylindricus ſupra niger elytris acuminatis: faſcia pallida. *cylindricus.*
Curculio cylindricus. Oliv. Inſ. 83. fig. 123.
Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.
C. paraplectico minor. Roſtrum atrum antennarum clava acuminata, nigra faſcia pone medium lata, alba, quae antice ad futuram extenditur. Abdomen nigrum apice album.

104. C. longiroſtris thorace fuſco: punctis quatuor albis, elytris fuſcis: faſcia ſexquialtera teſtacea. *notatus.*

Habitat in Barbariae plantis Dom. Vahl.

Caput fuſcum, ſive obſcure rufum. Roſtrum atrum. Thorax fuſcus punctis quatuor transverſim poſitis, parvis, albis. Scutellum album. Elytra ſtriata, fuſca faſciis duabus teſtaceis: anteriore abbreviata, poſteriore ad futuram macula alba terminata. Litura alba ad futuram.

barbiroſtris. 105. C. longiroſtris niger roſtro barbato, tibiis anticis tridentatis.

Curculio barbiroſtris. Oliv. Inſ. 83. fig. 37. Seb. Muſ. 4. tab. 95. fig. 5.

Habitat in Indiis Muſ. Dom. Kramer.

Paullo major C. paraplectico. Roſtrum tenue barba laterali, denſa, ferruginea. Thorax ſcaber. Elytra profunde ſulcata ſulcis ſcabris. Femora mutica at tibiae anticae tridentatae.

anguſtatus. 106. C. longiroſtris cylindricus ater elytris obtuſis punctatis.

Curculio anguſtatus. Herbſt Arch. tab. 24. fig. 7.

Curculio pulverulentus. Roſſ. Fn. Etr. 1. 111. 283.

Habitat in Anglia.

Paullo major C. paraplectico. Thorax ſcaber. Elytra ſtriato punctata.

Bardanae. 107. C. longiroſtris cylindricus griſeo tomentoſus pedibus anticis elongatis.

Habitat in Bardana Saxoniae Muſ. Dom. Romanus.

Statura & magnitudo C. paraplectici. Junior totus griſeo tomentoſus, adultior niger & glaber. Elytra rotundata, obtuſa. Pedes antici parum elongati.

Aſcanii. 108. C. longiroſtris cylindricus ater lateribus ſubcoeruleſcentibus. Linn. Syſt. nat. 2. 610. 36.

Curculio Aſcanii. Oliv. Inſ. 83. fig. 83.
Herbſt Arch. tab. 24. fig. 8.
Habitat in Europa auſtraliori.
Paullo minor C. paraplectico.

109. C. longiroſtris cylindricus niger elytris vitta teſtacea. *lineola.*
Curculio lineola. Oliv. Inſ. 83. fig. 185.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Parvus, cylindricus, niger. Antennae fuſcae. Thoracis dorſum planum. Elytra ſtriata vitta lata, teſtacea.
Variat interdum elytris loco vittae ſolo puncto baſeos apicisque teſtaceo.

110. C. longiroſtris elongatus niger antennis pedibusque piceis, roſtro baſi attenuato. Payk. Monogr. 51. 48. *linearis.*
Habitat Strasburgi Dom. Prof. Hermann.
Statura valde oblonga & tenuis. Minor C. Aſcanii. Roſtrum mediocre, baſi valde attenuatum, apice multo craſſius. Antennae ferrugineae. Thorax oblongus, punctatus. Elytra ſtriata. Pedes picei.
Variat interdum corpore toto ferrugineo.

111. C. longiroſtris femoribus anticis ſubclavatis, corpore atro. *craſſipes.*
Habitat Strasburgi Muſ. Prof. Hermann.
Statura cylindrica C. Aſcanii. Antennae nigrae, apice fuſcae. Thorax elongatus, planus at craſſitie fere elytrorum, poſtice rotundatus. Elytra abdomine breviora, laevia, atra.

112. C. longiroſtris elongatus ater thorace nitido, elytris ſtriatis obtuſis. *Atriplicis.*
Curculio T. album. Linn. Syſt. nat. 2. 609. 23. Fn. Sv. 594. Paykull. Monogr. 52. 49.

Habitat in Atriplici littorali Florae Kilonienſis Dom. Lund.

Statura & magnitudo C. linearis. Differt tamen antennis apice haud ferrugineis, roſtro tenui, haud baſi attenuato, thorace minus punctato, nitidiori.

Lymexylon 113. C. longiroſtris elongatus griſeus thorace ſcabro, elytris ſtriatis.

Habitat in Germaniae ligno Quercino Dr. Helwig.

Statura & magnitudo omnino C. Atriplicis. Roſtrum cylindricum, griſeum, apice nigrum. Antennae breves clava ovata. Thorax & elytra griſea.

** *Longiroſtres femoribus dentatis.*

calcaratus. 114. C. longiroſtris femoribus dentatis niger elytris fuſco irroratis, tibiis anticis acute dentatis.

Oliv. Inſ. 83. tab. 15. fig. 186.

Habitat — — Muſ. Dom. Geoffroy.

Maximus in hoc ordine. Roſtrum cylindricum. Thorax depreſſus, planus, punctatus. Elytra ſubacuminata, obſcura, fuſco irrorata. Pedes antici elongati femoribus tibiisque anticis in medio acute dentatis.

bidens. 115. C. longiroſtris femoribus poſticis dentatis niger elytris uniſpinoſis.

Curculio bidens. Oliv. Inſ. 83. fig. 113.

Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.

Corpus magnitudine C. viridis. Roſtrum atrum, nitidum. Antennae fuſcae. Thorax ſubrugoſus. Elytra ſtriata ſtriis crenatis, in medio ſpina erecta, valida, acuta armata. Pedes nigri femoribus poſticis dente valido, compreſſo.

116. C. longiroſtris femoribus dentatis griſeus thorace elytrisque tuberculatis, roſtro cornubus duobus arcuatis. *Taurus.*

Curculio Taurus. Oliv. Inſ. 83. fig. 60.

Habitat in Cajennia.

Corpus magnum, griſeum tuberculis elevatis, validis. Roſtrum utrinque in medio cornu arcuato, elongato, valido. Pedes nigri.

117. C. longiroſtris femoribus dentatis thorace tuberculato, roſtro utrinque acute ſpinoſo. *cornutus.*

Curculio cornutus. Oliv. Inſ. 83. fig. 193.

Habitat Cajennae Muſ. Dom. Geoffroy.

Magnus, tuberculatus, ater roſtro utrinque ſpina media, acuta, valida.

118. C. longiroſtris femoribus dentatis fuſcus thorace elytrisque tuberculis numeroſis atris. *miliaris.*

Curculio miliaris. Oliv. Inſ. 83. fig. 83.

Habitat Cajennae Muſ. Dom. Boſc.

Magnus. Roſtrum cylindricum, arcuatum, atrum, nitidum. Thorax & elytra tuberculis numeroſiſſimis, elevatis, atris. Pedes antici parum elongati, atri.

119. C. longiroſtris femoribus dentatis oblongus nigricans thorace cyaneo: lateribus ſcabris, elytris ſtriatis. *cyanicollis.*

Curculio cyanicollis. Oliv. Inſ. 87. fig. 121.

Habitat — — Muſ. Dr. Hunter.

Magnus, oblongus. Roſtrum longum, apice obtuſum. Thorax cyaneus lateribus punctis elevatis ſcaber. Elytra ſtriata, ſcabra.

120. C. longiroſtris femoribus dentatis obſcurus ſcaber thorace utrinque faſciculato tuberculato, elytris ſtriatis. *Jamaicenſis*

Curculio Jamaicenſis. Oliv. Inſ. 83. fig. 83.

Habitat in America meridionali Muſ. D. Banks.

Magnus. Roſtrum cylindricum, incurvum, nigrum antennis cinereis. Thorax ſupra planus, obſcure griſeus punctis plurimis, elevatis, atris, nitidis irroratus, lateribus utrinque tuberculo e pilis ferrugineis angulatis. Elytra ſtriata, obſcure griſea punctis itidem elevatis, atris. Femora acute dentata tibiisque apice dentatis.

ſenegalenſis 121. C. femoribus dentatis ater elytris tuberculatis acuminatisque: maculis duabus tomentoſo aureis.

Habitat in Senegal. Paykull.

Corpus magnum, atrum. Thorax planus, nitens, inmedio tuberculis tribus, ovatis, obtuſis, poſtice pluribus, minoribus. Elytra ſtriata ſtriis punctatis tuberculisque plurimis elevatis, compreſſis: baſeos majori, apice acuminata. Maculae duae aureae, altera ad baſin, altera verſus apicem, oblonga.

validus. 122. C. longiroſtris femoribus anticis dentatis oblongus ſcaber niger tibiis anticis dentatis.

Curculio validus. Oliv. Inſ. 83. fig. 186.

Habitat Cajennae.

Corpus magnum, oblongum, nigrum thorace elytrisque ſcabris. Tibiae antice acute dentatae.

coronatus. 123. C. longiroſtris femoribus dentatis niger thorace antice ſpinis ciliato, elytris ſtriatis.

Curculio coronatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 70.

Habitat — —

Corpus magnum, oblongum, nigrum. Caput & thorax atra thorace antice ſpinis plurimis, ſubarcuatis ciliato. Elytra punctis elevatis ſtriata.

124. C. longiroſtris femoribus quatuor anticis dentatis, elytris polline flaveſcentibus ſupra apicem gibboſis. Linn. Syſt. nat. 2. 612. 49. Muſ. Lud. Ulr. 53. *mucoreus.*

Habitat in India orientali.

125. C. longiroſtris femoribus quatuor poſterioribus dentatis, elytris ſtriatis nigris: linea repanda griſea. Linn. Syſt. nat. 2. 612. 50. Muſ. Lud. Ulr. 46. *puſio.*

Habitat in India orientali.

126. C. longiroſtris femoribus dentatis niger thorace lineis duabus, elytris ſtrigis quatuor albis, tibiis anticis ſpinoſis. *ſpinipes.*

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Muſ. Dr. Hunter.

Magnus. Roſtrum cylindricum, incurvum, atrum. Thorax antice attennatus, punctatus, ater linea utrinque alba. Elytra punctis elevatis ſcabra ſtrigis tribus albis, quarum baſeos arcuata cum ſecunda ad marginem exteriorem coit. Pedes nigri. Femora omnia acute dentata. Tibiae anticae in medio dentatae.

127. C. longiroſtris femoribus dentatis ferrugineo fuſcus elytris ſtriatis: tuberculis elevatis albis. *bombina.*

Curculio bombina. Oliv. Inſ. 83. fig. 12.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Magnus. Caput fuſcum roſtro cylindrico antennisque nigris. Thorax laevis, glaber, ferrugineo fuſcus. Elytra ſtriata, ferrugineo fuſca punctis elevatis, globoſis, atris. Corpus & pedes ferrugineo fuſca femoribus dentatis.

Scorpio. 128. C. longiroſtris femoribus dentatis ater thorace plano baſi cinereo, coleoptris tuberculatis acuminatisque medio cinereis.

Curculio Scorpio. Oliv. Inſ. 83. fig. 14.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Magnus. Caput atrum roſtro plano, laevi, atro. Thorax planus, utrinque angulatus, antice lateribusque niger, poſtice cinereus. Elytra punctato ſtriata, tuberculato ſpinoſa, apice acuminata, cinerea margine atro, qui color in medio excurrit & fere faſciam latam, abbreviatam conſtituit. Corpus atrum.

Chimaris. 129. C. longiroſtris femoribus poſticis dentatis niger albo maculatus pedibus anticis longiſſimis.

Oliv. Inſ. 83. fig. 130.

Habitat in Americae meridionalis Chimaris cymoſa Dom. Iſert.

Magnus. Roſtrum elongatum, incurvum, atrum, nitidum, parum depreſſum. Thorax ſcaber, niger, albolineatus. Elytra ſtriata, nigra, albo maculata. Pedes nigri femoribus anticis valde elongatis, rectis, inermibus. Femora quatuor poſtica dentata.

guttatus. 130. C. longiroſtris femoribus ſubdentatis niger thorace maculis duabus baſeos, elytris tuberculatis: punctis albidis.

Curculio guttatus. Oliv. Inſ. 83. tab. 5. fig. 45.

Habitat Cajennae.

Corpus medium, nigrum. Caput atrum, immaculatum. Thorax maculis duabus baſeos albis. Elytra ſubacuminata, tuberculata, nigra punctis plurimis, albis, ſparſis.

faſcicularis 131. C. longiroſtris femoribus dentatis niger elytris faſciculato piloſis, pedibus cinereo variis.

Curculio faſcicularis. Oliv. Inſ. 83. tab. 1. fig. 9.
Habitat Cajennae.
Medius. Roſtrum cylindricum, incurvum, nigrum. Thorax piloſus. Elytra faſciculato piloſa; pilis nigris hinc inde cinereis. Pedes omnes cinereo variegati.

132. C. longiroſtris femoribus dentatis niger elytris crenato ſtriatis: punctis duobus albis. *Hyſtrix.*
Curculio Hyſtrix. Oliv. Inſ. 83. tab. 15. fig. 182.
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Geoffroy.
Magnitudo praecedentium. Thorax antice ſcaber. Elytra puncto baſeos alteroque pone medium albidis.

133. C. longiroſtris femoribus dentatis brunneus albo maculatus. *marmoratus*
Curculio marmoreus. Oliv. Inſ. 83. tab. 13. fig. 153.
Habitat Cajennae.
Medius. Roſtrum baſi brunneum, apice fuſcum. Orbita oculorum flaveſcens. Thorax laevius, flavo maculatus. Elytra ſtriato punctata, flavo maculata.

134. C. longiroſtris femoribus dentatis, thorace carinato, elytris ſulcatis tuberculato ſpinoſis. *ſcaber.*
Habitat Cajennae Dom. Mallet.
Magnitudo fere C. Palmarum. Roſtrum nigrum. Thorax carinatus, niger. Elytra ſulcata ſtriis elevatis tuberculisque ſubſpinoſis, ſcabra. Pedes atri femoribus acute dentatis.

135. C. longiroſtris femoribus dentatis, thorace linea laterali, elytris albo punctatis maculisque duabus brunneis. *3faſciatus.*
Habitat Cajennae Muſ. Dr. Hunter.
Roſtrum teſtaceum. Thorax punctatus, teſtaceus macula magna laterali, villoſo brunnea,

quae tamen nec baſin, nec apicem attingit. Elytra teſtacea punctis impreſſis, villoſo albis ſtriata maculisque duabus magnis holoſericeo brunneis: poſteriore biloba. Corpus teſtaceum.

cylindriroſtris. 136. C. longiroſtris femoribus dentatis, thorace ſcabro, elytris poſtice bituberculatis.

Curculio cylindriroſtris. Oliv. Inſ. 83. fig. 128.

Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Magnus. Caput nigrum roſtro cylindrico. Thorax fuſcus, punctis numeroſis, elevatis ſcaber. Elytra fuſco griſeoque varia lineis elevatis quatuor ſubſerratis interſtitiis punctato ſtriatis. Tuberculorum duo paria erecta ad apicem elytri. Pedes variegati, antici elongati femoribus acute dentatis.

ſtigma. 137. C. longiroſtris femoribus dentatis, elytris macula magna ferruginea. Linn. Syſt. nat. 2. 612. 52. Muſ. Lud. Ulr. 48.

Habitat in Indiis.

Macula magna ferruginea in medio elytrorum.

hebes. 138. C. longiroſtris femoribus ſubdentatis, thorace ſcabro, elytris ſulcatis tuberculatis, ore barbato.

Curculio hebes. Oliv. Inſ. 83. fig. 144.

Habitat in Bengalia Muſ. Dom. Banks.

Medius. Roſtrum ſcabrum, atrum ore pilis faſciculatis ferrugineis. Thorax rotundatus, punctis elevatis ſcaber, immaculatus. Elytra ſulcata ſulcis apice per paria coeuntibus, tuberculis novem 3. 3. 3. oblique poſitis, atra maculis duabus cinereis, altera ad marginem craſſiorem, altera ad apicem. Pedes atri, ſcabri femoribus ſubdentatis.

annulatus. 139. C. longiroſtris femoribus dentatis pallidus thorace elytrisque ſtrigis nigris.

Curculio annulatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 62.
Curculio annulatus. Linn. Syſt. nat. 2. 613. 54. Muſ. Lud. Ulr. 51.
Habitat in India.
Striga unica in thorace & duae in elytris.

140. C. longiroſtris femoribus dentatis, elytrorum ſtriis punctatis approximatis. *caliginoſus.*
Habitat in Anglia Muſ. Britann.
Statura oblonga C. paraplectici at paullo minor, totus ater, obſcurus, minime nitens. Thorax rotundatus, punctatus, carinatus. Elytra ſtriato punctata ſtriis profundis per paria approximatis. Femora acute dentata.

141. C. longiroſtris femoribus dentatis niger thorace laevi, elytris ſtriatis ſcabris. *dubius.*
Habitat — — Dr. Schulz.
Magnus. Roſtrum atrum, apice planum. Thorax laevis, niger, obſcurus. Elytra obtuſa, ſtriata punctisque elevatis, atris, nitidis ſcabra. Pedes antici parum elongati.

142. C. longiroſtris femoribus dentatis fulvo irroratus pedibus anticis elongatis. *roreus.*
Curculio adſperſus. Mant. Inſ. 1. 106. 105.
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Magnitudo & ſtatura omnino C. Cynarae at femora quatuor dentata. Corpus totum atomis fulvis laetis tectum. Pedes fuſci.

143. C. longiroſtris femoribus dentatis brunneus roſtro fuſco, elytris teſtaceis punctato ſtriatis. *brunneus.*
Curculio brunneus. Oliv. Inſ. 83. fig. 120.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Magnus. Caput brunneum roſtro fuſco baſi utrinque fulcato. Thorax punctatus, brunneus. Elytra ſtriato punctata ſtriis apice per paria coeuntibus, teſtacea apice puncto elevato,

gibbo. Pedes teſtacei femoribus acute dentatis.

Abietis. 144. C. longiroſtris femoribus dentatis niger elytris faſciis linearibus interruptis albis. Linn. Syſt. nat. 2. 613. 57. Fn. Sv. 615. Iter. Oeland. 26. Paykull. Monogr. 2. 2.
Degeer Inſ. 5. 205. 1. tab. 6. fig. 11.
Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 1.
Petiv. Gazoph. 14. tab. 8. fig. 9.
Habitat in Pini ſylveſtris Cortice & Reſina.

dentipes. 145. C. longiroſtris femoribus dentatis, thorace albo, elytris nigris albo ſtriatis, tibiis dentatis.
Curculio dentipes. Oliv. Inſ. 13. fig. 93.
Habitat in Senegalliae Goſſypio Muſ. Reg. Galliae.
Statura C. frigidi. Caput atrum roſtro cylindrico. Thorax albidus, poſtice trilobus. Elytra ſtriata, nigra ſtriis duabus albis, approximatis, poſtice coeuntibus. Pedes nigri femoribus tibiisque dentatis.

multiguttatus. 146. C. longiroſtris femoribus dentatis niger thorace elytrisque albo punctatis.
Curculio multiguttatus. Oliv. Inſ. 83. tab. 13. fig. 163.
Habitat — — —
Magnitudo & ſtatura C. Abietis. Caput nigrum, immaculatum roſtro cylindrico. Thorax laevis, niger punctis utrinque duobus albis: poſteriore majore. Elytra laevia punctis plurimis, albis.

papillator. 147. C. longiroſtris femoribus dentatis tuberculatus fuſcus elytris macula marginali cinerea nigro punctata.

Curculio pupillator. Oliv. Inſ. 83. tab. 15. fig. 183.
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Geoffroy.
Medius. Macula magna, cinerea, marginalis in medio elytrorum & in hac puncta tria atra, intermedio majori, lineari.

148. C. longiroſtris femoribus dentatis oblongus piceus elytris reticulatis: faſciis obliquis pallidis, tibiis anticis ſpinoſis. *reticulatus.*
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.
C. Abietis magis oblongus. Roſtrum atrum. Elytra ſubtiliſſime reticulata faſciis obliquis, pallidis. Tibiae anticae apice ſpina valida, incurva armatae.

149. C. longiroſtris femoribus bidentatis albo nigroque variis, thorace elytrisque muricatis. Linn. Syſt. nat. 608. 20. Fn. Sv. 591. Paykull. Monogr. 37. 35. *Lapathi.*
Curculio Lapathi. Oliv. Inſ. 83. fig. 69. 6.
Degeer Inſ. 5. 223. 16. tab. 7. fig. 1. 2.
Habitat in Europae Salice.
Caput albo nigroque varium roſtro nigro. Thorax ſupra fuſcus tuberculis quinque elevatis muricatus lateribusque albis. Elytra fuſco alboque variegata, muricata, alba. Abdomen nigrum. Femora omnia bidentata, alba.

150. C. longiroſtris femoribus dentatis albus: ſupra fuſcus albo maculatus femoribus albo annulatis. *irroratus.*
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Statura praecedentis. Caput albo nigroque varium roſtro atro. Thorax elytraque laevia, nigra atomis plurimis, albis irrorata. Corpus album. Pedes albi femoribus dentatis annulis duobus fuſcis.

tricinctus. 151. C. longiroſtris femoribus dentatis ater thoracis lateribus elytrorumque faſciis tribus albis, pedibus anticis elongatis.

Oliv. Inſ. 83. tab. 6. fig. 61.

Habitat in Inſula Guadeloupe de Badier.

Statura C. 6 guttati at major. Roſtrum elongatum, incurvum, atrum, nitidum. Thorax niger lateribus ſubtusque albis. Elytra punctato ſtriata, nigra faſciis tribus albidis, quae tamen ſuturam vix attingunt, anteriores duae ſubtus continuantur. Pedes atri, nitidi femoribus acute dentatis, antici elongati tibiis incurvis.

ſtatua. 152. C. longiroſtris femoribus dentatis ater elytris ſulcatis: macula communi alba, femoribus poſticis elongatis.

Habitat — — Muſ. Dom. Boſc.

Paullo minor C. Lapathi. Roſtrum apice piceum antennis nigris. Thorax ſubſcaber. Elytra ſulcata ſulcis impreſſo punctatis nigra litura humerali obſcura maculaque poſtica, transverſa, communi, alba. Pedes fuſci, cinereo annulati femoribus dentatis anticis poſticisque elongatis.

6 guttatus. 153. C. longiroſtris femoribus dentatis niger elytris maculis tribus albis.

Curculio 6 guttatus. Oliv. Inſ. 83. tab. 14. fig. 170.

Drury Inſ. 2. tab. 33. fig. 1. 2.

Habitat in America Muſ. Dr. Hunter.

Medius. Antennae nigrae. Roſtrum nigrum linea longitudinali alba. Thorax niger lateribus albis. Elytra laevia, nigra maculis tribus magnis, albis. Pedes nigri.

154. C. longiroſtris femoribus dentatis ovatus obſcure niger elytris punctato ſtriatis. Oliv. Inſ. 83. fig. 175. *luridus.*

Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Totus obſcure niger, minime nitidus. Antennae apice fuſcae. Thorax ſcaber linea dorſali glabra. Elytra punctis majoribus ſtriata, quae ſtriae poſtice per paria coeunt. Pedes dente breviſſimo.

155. C. longiroſtris femoribus dentatis fuſcus tibiis poſticis incurvis dentatis. *ſtolidus.*

Curculio ſtolidus. Oliv. Inſ. 83. fig. 145.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Caput nigrum, baſi ferrugineum. Antennae nigrae. Thorax punctis numeroſiſſimis ſcaber, niger maculis aliquot indiſtinctis, ferrugineis. Elytra ſtriato punctata, fuſca, ferrugineo ſubfaſciata. Pedes obſcuri femoribus dentatis, poſticis annulo cinereo. Tibiae poſticae breves, incurvae, apice denticulis duobus obtuſis, altero interne, altero externe.

156. C. longiroſtris femoribus dentatis fuſcus elytris ſtriatis ſubtuberculatis ferrugineo variis. *frigidus.*

Curculio chinenſis. Oliv. Inſ. 83. tab. 8. fig. 97.

Habitat in Amboina Muſ. de Paykull.

Corpus fuſcum puncto ferrugineo ad baſin roſtri lineaque dorſali alba. Thorax niger linea dorſali punctoque uno alterove ferrugineis. Elytra punctato ſtriata.

157. C. longiroſtris femoribus dentatis niger elytris excavato punctatis: ſtriga abbreviata albida. *gibbus.*

Curculio gibbus. Oliv. Inſ. 83. tab. 8. fig. 88.

Habitat in Inſula Bourbon. Muſ. Reg. Galliae.

Statura praecedentis. Thorax punctis elevatis ſcaber. Elytra punctis majoribus excavata

ſtriga poſteriori albida, quae tamen futuram haud attingit.

ocellatus. 158. C. longiroſtris femoribus dentatis obſcure cinereus elytris macula ocellari atra.
Curculio ocellatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 31.
Habitat Cajennae.
Corpus medium. Macula atra, ſubocellata in medio elytrorum.

meditabundus. 159. C. longiroſtris femoribus dentatis, elytris ſtriatis poſtice acuminatis.
Curculio meditabundus. Oliv. Inſ. 83. fig. 132.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Totus obſcure niger, minime nitens. Roſtrum atrum, nitidum. Thorax ſublaevis, obſcurus. Elytra obſcura, ſtriata ſtriis poſtice per paria coeuntibus. Femora omnia acute dentata.

ſtupidus. 160. C. longiroſtris femoribus dentatis niger thoracis lateribus rotundatis, elytris ſubſpinoſis.
Curculio ſtupidus. Oliv. Inſ. 83. fig. 151.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Totus obſcure niger, opacus. Thorax latior quam in reliquis lateribus rotundatis ſcaber, obſcurus. Elytra connata punctis elevatis, acutis ſubſpinoſa. Femora dentata, ſcabra.

Mangiferae 161. C. longiroſtris femoribus dentatis obſcurus thorace ſcabro: linea dorſali alba, elytris reticulatis.
Curculio Mangiferae. Oliv. Inſ. 83. fig. 137.
Hybn. Naturf. 24. 46. 12. tab. 2. fig. 13.
Habitat in Mangiferae nucleis Indiae Orientalis Dr. Koenig.
Thorax obſcurus linea dorſali & juxta lineam puncto utrinque albo. Scutellum album. Elytra ſtriata, griſea punctis nigris ſparſis.

162. C. longiroſtris femoribus dentatis griſeus elytris macula communi lunata cinerea, roſtro atro. *ſtultus.*

Habitat in Coromandel Prof. Vahl.

Praecedente minor. Roſtrum atrum. Thorax punctis elevatis ſcaber, griſeus. Elytra ſtriata.

163. C. longiroſtris femoribus dentatis obſcurus cinereo varius thoracis lateribus rotundatis. *Araneus.*

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dr. Pflug.

Statura & magnitudo omnino C. ſqualidi. Roſtrum porrectum, piceum, nitidum. Thorax ſupra planus lateribus rotundatis, obſcurus lineis tribus obſoletis, cinereis. Elytra ſulcata, obſcura, cinereo obſolete varia. Corpus nigrum.

164. C. longiroſtris femoribus dentatis niger thorace ferrugineo lineato, elytris ſtriatis ferrugineo punctatis. *ſtrix.*

Curculio Strix. Oliv. Inſ. 83. tab. 16.

Habitat Cajennae Muſ. Dom. Olivier.

Roſtrum longum, arcuatum, atrum, baſi ferrugineo ſtriatum. Caput ferrugineum. Thorax niger margine lineisque tribus cinereis. Elytra brevia, ſtriata, griſea. Femora acute dentata.

165. C. longiroſtris femoribus dentatis villoſo griſeus roſtro teſtaceo. *ſqualidus.*

Curculio ſqualidus. Oliv. Inſ. 83. fig. 184.

Habitat Surinami Muſ. Dom. Banks.

Thorax griſeus lineis tribus cinereis. Elytra brevia, ſtriata, griſea. Femora acute dentata.

166. C. longiroſtris femoribus dentatis ater thorace punctis duobus teſtaceis. Linn. Syſt. nat. 2. 613. 58. Paykull. Monogr. 1. 1. *germanus.*

Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 4. fig. 5.
Schaeff. Icon. tab. 62. fig. 9. tab. 101. fig. 6.
Friſh. Inſ. 13. 28. tab. 26.
Habitat in Germania haud infrequens.

Scrophulariae. 167. C. longiroſtris femoribus dentatis, thorace albido, coleoptris maculis duabus atris albae connatis. Linn. Syſt. nat. 2. 614. 61. Fn. Sv. 603. Paykull. Monogr. 23. 22.
Geoff. Inſ. 1. 296. 44.
Reaum. Inſ. 3. tab. 2. fig. 12.
Degeer Inſ. 5. 208. 3. tab. 6. fig. 17. 18. 19. 20.
Habitat in Europae Scrophulariis.
Elytra lineis elevatis quatuor holoſericeis, albo nigroque variis.

Thapſus. 168. C. longiroſtris femoribus dentatis, coleoptris maculis duabus dorſalibus atris ſimplicibus.
Curculio Scrophulariae. Oliv. Inſ. 83. fig. 21.
Habitat Kiliae in Scrophulariis, Verbaſc.
Mera varietas praecedentis teſte Dom. de Paykull. Caput & thorax villoſa, cinerea, immaculata antennis ferrugineis. Coleoptra villoſa, cinerea lineis plurimis e punctis nigris albisque alternis. In medio vel in ſutura puncta duo magna, orbiculata, omnino ſimplicia. Corpus & pedes cinerea.

Verbaſci. 169. C. longiroſtris femoribus dentatis niger thoracis lateribus flaveſcentibus, elytris punctis albis nigrisque alternis ſtriatis.
Habitat Kiliae Dom. Daldorff.
Statura & ſumma affinitas praecedentium. Caput nigrum, immaculatum. Thorax flaveſcens linea dorſali ſive potius dorſo nigro. Elytra nigra punctis elevatis, holoſericeis, albis nigrisque alternis. In ſutura interdum puncta duo alba diſtincta.

170. C. longiroſtris femoribus dentatis albidus coleoptris nigro variis: macula dorſali baſeos apicisque nigris. *Blattariae.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Duplo praecedentibus minor. Roſtrum cylindricum, incurvum, atrum. Caput albidum. Thorax albidus macula media baſeos nigra, quae cum macula coleoptrorum coit. Coleoptra albida, haud punctis albis nigrisque ſtriata, ſed potius variegata macula magna ſuturali baſeos nigricante, quae & ſcutellum & thoracis baſin tegit. Verſus apicem macula altera magis atra Corpus albidum.

171. C. longiroſtris femoribus dentatis obſcurus elytris lineis elevatis nigris cinereo punctatis. *Solani.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura praecedentium at duplo minor. Caput nigrum. Thorax cinereus. Elytra ſubhiſpidula, obſcura ſtriis elevatis, nigris, cinereo punctatis. Pedes cineraſcentes femoribus acute dentatis.

172. C. longiroſtris femoribus dentatis niger elytris ferrugineo variis, femoribus canaliculatis. *gravis.*

Curculio gravis. Oliv. Inſ. 83. fig. 177.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Roſtrum atrum. Antennae piceae. Thorax punctis elevatis ſcaber. Elytra ſtriata, ſcabra, ferrugineo varia. Pedes nigri, poſtici ferruginei. Femora ſubtus late canaliculata dente valido.

173. C. longiroſtris femoribus dentatis, elytris ſutura punctisque duobus albis. Linn. Syſt. nat. 2. 614. 64. Fn. Sv. 618. Paykull. Monogr. 15. 14. *5 punctatus*

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 12.

Herbſt Arch. tab. 24. fig. 18.
Habitat in Europae plantis.
Corpus ſupra purpureum, ſubtus cinereum. Thorax linea dorſali alba.

guttula. 174. C. longiroſtris femoribus dentatis, thorace tuberculato niger, elytris ſtriatis: puncto poſtico albo.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura omnino C. litura at paullo major. Roſtrum nigrum. Thorax inaequalis linea dorſali impreſſa tuberculoque utrinque elevato, erecto. Margo anticus parum elevatus. Elytra vix ſtriata, nigra puncto apicis albo. Corpus ſubtus cinereum.

abbreviatulus. 175. C. longiroſtris femoribus dentatis fuſcus atomis griſeis irroratus elytris abbreviatis.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura omnino C. litura at paullo major. Antennae piceae. Caput cum roſtro elongato fuſcum. Thorax obſcurus, fuſcus atomis griſeis. Elytra ſubſtriata, fuſca atomis griſeis, quae hinc inde faſcias abbreviatas fere conſtituunt, abdomine paullo breviora. Pedes fuſci femoribus compreſſis, elongatis, clavatis, acute dentatis.

Echii. 176. C. longiroſtris femoribus dentatis niger thorace elytrisque albolineatis.
Curculio geographicus. Oliv. Inſ. 83. fig.
Habitat in Germaniae Echio Dom. Prof. Helwig.
Statura & magnitudo omnino praecedentis, cujus forte mera varietas. Differt tantum thorace margine antico magis elevato, thorace elytrisque lineis albis ſtriatis. Femora acute dentata annulo albo.

177. C. longiroſtris femoribus dentatis ſupra fuſcus elytris ſtriatis: macula laterali transverſa alba. Paykull. Monogr. 29. 28. *didymus.*
Habitat in Germaniae Urtica urente Dom. de Hattorf.
Parvus. Corpus ſupra fuſcum, ſubtus griſeum. Roſtrum atrum. Elytra ſtriata, obſcura: macula transverſa, laterali, alba, e punctis tribus compoſita. Femora acute dentata.

178. C. longiroſtris femoribus dentatis niger thorace tuberculato, elytris cinereo variis, roſtro arcuato atro. *Lamii.*
Habitat in Germaniae Lamio Prof. Helwig.
Parvus. Roſtrum elongatum, arcuatum, atrum. Antennae clava cineraſcente. Thorax quadrituberculatus, niger, obſcurus, minime nitidus. Elytra ſtriata, nigra, cinereo varia. Pedes nigri femoribus acute dentatis.

179. C. longiroſtris femoribus dentatis cinereo villoſus roſtro arcuato atro. *Braſſicae.*
Habitat Kiliae.
Parvus. Roſtrum elongatum, arcuatum, atrum. Antennae capitulo cineraſcente. Thorax laevis, obſcure cineraſcens. Elytra cineraſcentia, ſtriata. Pedes nigricantes femoribus omnibus dentatis.

180. C. longiroſtris femoribus dentatis cinereo villoſus tarſis rufis. *Borraginis.*
Curculio Borraginis. Oliv. Inſ. 83. fig.
Habitat in Galliae Borragine Dom. Olivier.
Paullo major C. Braſſicae, totus cinero villoſus tarſis ſolis rufis.

181. C. longiroſtris femoribus dentatis, thorace fuſco: lateribus cineraſcentibus, elytrorum ſutura apice ferruginea. *haemorrhoidalis.*

Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Parvus. Caput fuſcum. Thorax ovatus, fuſcus lateribus in mare cinereis, in faemina ferrugineis punctis aliquot fuſcis. Elytra ſtriata, obſcura futura apice ferruginea. Pedes fuſci.

trimaculatus. 182. C. longiroſtris femoribus dentatis, coleoptris nigris: maculis tribus cinereis; poſtica communi lunata. Paykull. Monogr. 26. 24.

Habitat in Alſatia Prof. Hermann.

Caput nigrum. Thorax fuſcus antice utrinque macula marginali cinerea lineaque dorſali brunnea. Elytra fuſca futura baſeos brunnea: puncto parvo albo, macula magna alba in medio marginis exterioris & altera lunata ad apicem. Pectus & abdomen cinerea. Femora fuſca annulo cinereo.

litura. 183. C. longiroſtris femoribus dentatis albo nigroque varius roſtro atro. Paykull. Monogr. 26. 25.

Habitat in Europae Carduis.

Statura praecedentis. Thorax linea dorſali nigra, antice lineola, poſtice puncto albis.

villoſus. 184. C. longiroſtris femoribus dentatis villoſus griſeus ſcutello faſciaque elytrorum poſtica albis. Herbſt Arch. tab. 24. fig. 19.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Roſtrum porrectum, atrum. Thorax griſeus linea longitudinali albicante. Scutellum album. Elytra griſea poſtice faſcia obliqua alba, quae tamen marginem exteriorem haud attingit. Pedes griſei.

Raphani. 185. C. longiroſtris femoribus dentatis nigricans thorace tuberculato, roſtro arcuato atro.

Habitat in Germaniae Raphano Dom. Smidt.

Statura & magnitudo C. litura. Antennae articulo primo ferrugineo. Roſtrum arcuatum

atrum. Thorax nigricans, utrinque tuberculatus margineque antico parum elevato. Elytra nigricantia, vix ſtriata, immaculata. Pedes nigri femoribus acute dentatis.

186. C. longiroſtris femoribus dentatis niger elytris rufis: margine omni nigro. Paykull. Monogr. 16. 15. *varians.*
Curculio Beccabungae. Mant. Inſ. 1. 108. 130.
Habitat in Sueciae Pino Dom. de Paykull.
Magnitudo & ſtatura C. Ceraſi. Roſtrum atrum. Elytra ſtriata, rufa margine omni nigro. Pedes nigri.
Variat rarius forſan aetate elytris nigris totis.

187. C. longiroſtris femoribus dentatis fuſcus thorace linea dorſali cinerea, elytris pedibusque teſtaceis. Paykull. Monogr. 30. 29. *Troglodytes.*
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.
Parvus. Caput fuſcum antennis ſubteſtaceis. Thorax fuſcus linea dorſali albida. Elytra ſtriata, ſubteſtacea ſutura nigra. Pedes teſtacei.

188. C. longiroſtris femoribus dentatis oblongus ater antennarum clava villoſa, elytris crenato ſtriatis. *carbonarius*
Curculio carbonarius longiroſtris femoribus omnibus dentatis, corpore nigro oblongo. Linn. Syſt. nat. 2. 617. 42. Fn. Sv. 614.
Habitat in Europa.
Simillimus C. Ceraſi, pro cujus varietatem olim habui at thorax inermis, ſupra planus.

189. C. longiroſtris femoribus dentatis ater thorace apice bidentato, elytris nitidis. Linn. Syſt. nat. 2. 607. 10. Fn. Sv. 582. *aterrimus.*
Habitat in Europa.
Corpus totum atrum.

Ceraſi. 190. C. longiroſtris femoribus dentatis ăter thorace apice bidentato, elytris oblongis opacis. Linn. Syſt. nat. 2. 607. 11. Fn. Sv. 583. Payk. Monogr. 8. 7.
Geoff. Inſ. 1. 299. 48.
Friſh. Inſ. 11. 31. tab. 23. fig. 1. 3.
Habitat in Ceraſi foliis.
Simillimus C. aterrimo at diſtinctus.

violaceus. 191. C. longiroſtris femoribus dentatis niger elytris ſtriatis violaceis. Linn. Syſt. nat. 2. 614. 63. Fn. Sv. 579. Paykull. Monogr. 9. 8.
Geoff. Inſ. 1. 271. 5.
Degeer Inſ. 5. 213. 5.
Bergſt. nomencl. 1. 16. 13. tab. 2. fig. 13.
Habitat in Europae borealis Pinis.

Nucum. 192. C. longiroſtris femoribus dentatis, corpore griſeo longitudine roſtri. Linn. Syſt. nat. 2. 673. 59. Fn. Sv. 616. Paykull. Monogr. 21. 20.
Roſſ. Inſ. 3. tab. 67. fig. 67.
Oliv. Inſ. 83. fig. 47.
Schaeff. Elem. tab. 55. fig. 1. Icon. tab. 50. fig. 4.
Degeer Inſ. 5. 205. 2. tab. 6. fig. 14. 15. 16.
Geoff. Inſ. 1. 295. 42.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 3. fig. 22.
Habitat in Coryli Avellanae Nucibus.

proboſcideus. 193. C. longiroſtris femoribus dentatis griſeus roſtro corpore duplo longiore.
Curculio proboſcideus. Oliv. Inſ. 83. fig. 127.
Habitat in America boreali Muſ. Dom. Banks.
Magis oblongus C. Nucum. Roſtrum ferrugineum, nitens corpore fere duplo longiore. Corpus oblongum, griſeum ſtrigis obliquis obſcurioribus.

194. C. longiroſtris femoribus dentatis obſcure brunneus pedibus teſtaceis. *guloſus.*

Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Grandchamp.

Magnitudo & ſtatura omnino C. proboſcidei. Roſtrum elongatum longitudine corporis, brunneum, apice nigrum. Thorax & elytra obſcure brunnea ſcutello paullo pallidiore. Pedes teſtacei femoribus acute dentatis.

195. C. longiroſtris femoribus dentatis ferrugineus cinereo irroratus femoribus macula nigra. *paraſita.*

Curculio paraſita. Oliv. Inſ. 83. fig. 181.

Habitat Cajennae Muſ. Dom. Geoffroy.

Statura C. Nucum. Roſtrum ferrugineum, corpore fere longius. Thorax ferrugineus linea dorſali roreque cinereis. Elytra laevia, ferruginea, cinereo irrorata. Pedes ferruginei femoribus macula magna nigra.

196. C. longiroſtris femoribus dentatis griſeus ſcutello elytrorumque maculâ poſtica albidis. *eſuriens.*

Habitat in Gallia.

Statura C. Ceraſorum & forte mera ejus varietas. Roſtrum corpore longius, arcuatum, atrum. Thorax griſeus linea dorſali albida. Elytra griſea macula magna, poſtice fere communi, albida. Pedes griſei.

197. C. longiroſtris femoribus dentatis brunneus elytris ſtriatis cinereis apice brunneis. Oliv. Inſ. 83. fig. 138. *naſutus.*

Habitat — — Muſ. Britann.

Statura omnino C. Nucum. Roſtrum cylindricum, nigrum longitudine corporis. Caput brunneum. Thorax fere obſcure griſeus. Elytra elevato ſtriata, cinerea, apice brunnea. Pedes brunnei femoribus acute dentatis.

hauſtellatus 198. C. longiroſtris femoribus dentatis caſtaneus elytris ſtriatis, roſtro corpore quadruplo longiore.

Curculio hauſtellatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 171.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lee.

Corpus C. Nucum magis oblongum roſtro longiſſimo.

varius. 199. C. longiroſtris femoribus dentatis griſeo nigroque varius roſtro pedibusque rufis.

Habitat Cajennae Dom. Mallet.

C. Nucum magis oblongus. Roſtrum cylindricum, rufum antennis tenuiſſimis. Thorax elytraque cinereo fuſcoque variegata. Pedes omnes rufi femoribus acute dentatis cinguloque nigro.

Ceraſorum. 200. C. longiroſtris femoribus dentatis fuſcus ſcutello elytrorumque faſciis obſoletis cinereis.

Paykull. Monogr. 22. 21.

Habitat in Anglia Dom. Lee.

Triplo minor C. Nucum. Roſtrum cylindricum, glabrum, atrum. Thorax fuſcus linea dorſali obſolete cinerea. Scutellum cinereum. Elytra ſtriata faſciis duabus repandis cinereis, fere obſoletis.

amoenus. 201. C. longiroſtris femoribus dentatis ater thorace punctis duobus, coleoptris quinque niveis.

Curculio amoenus. Oliv. Inſ. 83. fig. 143.

Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Triplo minor C. Nucum. Caput atrum. Antennae fuſcae. Thorax glaber, ater utrinque puncto baſeos niveo. Elytra ſtriata, nigra, in medio lineola ſaturali & poſtice punctis duobus niveis. Pedes atri.

metallinus. 202. C. longiroſtris femoribus dentatis nigro aeneus thorace punctato, elytris ſtriato punctatis.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom. Smith.

Medius. Roſtrum elongatum, arcuatum, nigrum. Thorax late punctatus, nigro aeneus. Elytra punctis majoribus ſtriata, nigro aenea, nitida. Corpus concolor. Femora omnia clavata, acute dentata.

203. C. longiroſtris femoribus dentatis griſeus capite bidentato. *bicornis.*

Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.

Corpus griſeum ſive cinereo fuſcoque mixtum. Roſtrum fuſcum. Denticuli duo erecti, breves, in fronte. Elytra ſubſtriata. Pedes fuſci.

204. C. longiroſtris femoribus dentatis niger elytris albo ſubfaſciatis, antennis rufis. *tenuiroſtris.*

Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.

Minor. C. Ceraſorum. Caput nigrum roſtro tenui, atro, glabro. Antennae rufae clava cinerea. Thorax niger pilis breviſſimis, cinereis. Scutellum cinereum. Elytra nigra faſciis plurimis, undatis, pallidioribus.

205. C. longiroſtris femoribus dentatis, elytris teſtaceis obſolete faſciatis. Linn. Syſt. nat. 2. 614. 62. Fn. Sv. 617. Paykull. Monogr. 11. 10. *Druparum.*

Curculio flaveſcens. Geoff. Inſ. 1. 296. 43.

Degeer Inſ. 5. 214. 7.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 11.

Sulz. Inſ. tab. 3. fig. 21.

Habitat in Pruni Padi nucleis.

206. C. longiroſtris femoribus dentatis ferrugineo fuſcus capite dorſoque nigris. Paykull. Monogr. 25. 23. *Fraxini.*

Curculio Fraxini. Degeer Inſ. 5. 212. 4. tab. 5.

Habitat in Sueciae Fraxino Dom. de Paykull.
Magnitudo C. Druparum. Thorax ferrugineo fuſcus dorſo nigro. Corpus ferrugineo fuſcum.

melanocephalus. 207. C. longiroſtris femoribus dentatis brunneus capite fuſco, roſtro atro.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura parva C. Fraxini. Caput fuſcum roſtro elongato, cylindrico, incurvo, atro. Thorax brunneus, immaculatus. Elytra ſtriata, brunnea margine exteriori parum nigricante. Corpus fuſcum pedibus brunneis. Femora acute dentata.

depreſſus. 208. C. longiroſtris femoribus dentatis, thorace depreſſo: lateribus obtuſe angulatis. Linn. Syſt. nat. 2. 612. 53. Muſ. Lud. Ulr. 49. Seb. Muſ. 4. tab. 95. fig. 4.
Habitat in America meridionali.

Pomorum. 209. C. longiroſtris femoribus anticis dentatis, corpore griſeo nebuloſo. Linn. Syſt. nat. 2. 612. 46. Fn. Sv. 612. Payk. Monogr. 13. 12. Friſh. Inſ. 1. 32. tab. 8.
Habitat in Pomonae floribus.

vorax. 210. C. longiroſtris femoribus dentatis griſeo fuſcoque maculatus roſtro arcuato atro.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Statura omnino C. tortrix, paullo major & diſtinctus roſtro omnino atro. Antennae teſtaceae. Pedes antici elongati.

tortrix. 211. C. longiroſtris femoribus dentatis, corpore teſtaceo, pectore fuſco. Linn. Syſt. nat. 2. 615. 67. Fn. Sv. 622. Payk. Monogr. 7. 6.
Curculio ferrugineus. Geoff. Inſ. 1. 300. 51.
Degeer Inſ. 5. 214. 6.
Habitat in Populo folia contorquens.

212. C. longiroſtris femoribus dentatis nigricans elytris ſtriatis griſeo irroratis. Payk. Monogr. 4. 4. *Tremulae.*
Habitat in Sueciae Populo Dom. de Paykull.
Roſtrum atrum. Thorax laevis, ater, nitidus, poſtice rubro nitens. Elytra crenato ſtriata, nigra atomis plurimis griſeis.

213. C. longiroſtris femoribns dentatis fuſcus cinereo lineatus pedibus pallidis. *aeſtuans.*
Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom. Smidt.
Parvus. Roſtrum obſcurum, ante apicem ferrugineum. Thorax & elytra obſcura, obſolete albo lineata linea thoracis dorſali tamen diſtinctiore. Pedes omnes pallidi.

214. C. longiroſtris femoribus dentatis, thorace nigro: margine antico poſticoque rufis, elytris pallidis nigro maculatis. Payk. Monogr. 6. 5. *taeniatus.*
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.
Minor C. tortrix. Roſtrum nigrum ore ſanguineo. Antennae teſtaceae clava cinerea. Thorax laevis, niger margine antico poſticoque rufis. Elytra ſubvilloſa, ſubſtriata, pallida, nigro maculata.

215. C. longiroſtris femoribus dentatis, thorace elongato, tibiis anticis bidentatis. *elongatus.*
Habitat in Jamaica Dom. Drury.
Elytra punctato ſtriata, nigra faſciis duabus ferrugineis. An potius ad Brentus genus emendandus.

**** Longiroſtres femoribus poſticis ſaltatoriis.*

216. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis niger coleoptris teſtaceis: maculis duabus obſcuris. Payk. Monogr. 20. 19. *Alni.*

Curculio rufus, elytris maculis quatuor nigris. Geoff. Inſ. 1. 286. 20.

Curculio Alni. Linn. Syſt. nat. 2. 611. 42. Fn. Sv. 608.

Degeer Inſ. 5. 262. 49.

Habitat in Angliae, Germaniae Alno.

Thorax teſtaceus faſcia abbreviata, nigra.

piloſus. 217. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis niger cinereo variegatus.

Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.

Corpus parvum, hirtum, nigro cinereoque variegatum. Antennae teſtaceae.

hortorum. 218. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis ater elytrorum faſcia ſesquialtera pedibusque teſtaceis.

Curculio mutillatus. Laichart. Auſtriac.

Habitat in Germania Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Corpus parvum praecedentis. Caput & thorax atra antennis teſtaceis. Elytra ſtriata, nigra faſcia media, lata, abbreviata, quae marginem exteriorem haud attingit alteraque poſteriori, adhuc minori teſtaceis. Corpus nigrum pedibus omnibus teſtaceis: femoribus poſticis nigris.

Calcar. 219. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis niger antennis plantisque teſtaceis, femoribus dentatis. Paykull. Monogr. 18. 17.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Parvus. Corpus nigrum. Elytra vix ſtriata. Femora poſtica incraſſata, unidentata.

Saliceti. 220. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis niger tibiis teſtaceis. Payk. Monogr. 66. 64.

Habitat in Sueciae Salicetis Dom. de Paykull.

Parvus, totus niger, minime nitidus tibiis ſolis teſtaceis. Elytra ſtriata.

221. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis niger coleoptris ante apicem rufis. *Beccabungae.*
Curculio Beccabungae longiroſtris fuſcus, elytris ſubſanguineis: margine anoque fuſcis. Linn. Syſt. nat. 2, 611. 41. Fn. Sv. 604.
Habitat in Sueciae Veronica Beccabunga Dom. de Paykull.
Differt omnino a C. Reſinae, quem olim Beccabungae vocavi. Corpus duplo minus, nigrum coleoptris ante apicem rufis.

222. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis, elytris atris: faſciis duabus albis. Linn. Syſt. nat. 2. 611. 43 Fn. Sv. 610. Paykull. Monogr. 64. 62. *Salicis.*
Degeer Inſ. 5. 246. 51.
Habitat in Salicis floribus.

223. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis, corpore teſtaceo. Paykull. Monogr. 19. 18. *viminalis.*
Curculio Quercus pallide flavus, oculis nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 609. Fn. Sv. 596.
Curculio Ulmi. Degeer Inſ. 5. 260. 48. tab. 8. fig. 5.
Curculio ruſus. Geoff. Inſ. 1. 286. 19.
Reaum. Inſ. 3. 31. tab. 3. fig. 17. 18.
Habitat in Europae Salice.
Nimis affinis C. Alni & forte mera ejus varietas. Differt tantum elytris immaculatis.

224. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis nigricans elytris ſtriatis cinereo variis: ſutura baſi alba. *Ilicis.*
Curculio Roboris Bonsd. Curcul. Suec.
Habitat in Uplandiae Quercu Dom. de Paykull.
Parvus. Corpus nigrum. Thorax macula dorſali, triloba, cinerea. Elytra cinereo varia ſutura baſi alba.

Iota. 225. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis ater, elytris ſtriatis: ſutura baſi alba. Paykull. Monogr. 66. 63.
Habitat in Uplandia Dom. de Paykull.
Parvus, totus ater ſola ſutura baſi alba.

Fagi. 226. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis, corpore atro, femoribus albis. Linn Syſt. nat. 2. 64. 44. Fn. Sv. 609. Paykull. Monogr. 64. 61.
Habitat in Fagi ſylvatici foliis.

Fragariae. 227. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis fuſcus antennis tarſisque teſtaceis.
Habitat in Germaniae Fragariis Dom. Smidt.
Magnitudo C. Salicis. Caput nigrum. Antennae pallide teſtaceae. Thorax & elytra fuſca, immaculata. Pedes fuſci tarſis ſolis teſtaceis.

Populi. 228. C. longiroſtris pedibus ſaltatoriis ater ſcutello albo, antennis pedibusque teſtaceis.
Habitat in Selandiae Populo Dom. de Scheſtedt.
Parvus. Antennae teſtaceae clava obſcuriore. Caput & thorax atra. Elytra ſtriata, nigra, immaculata. Scutellum album. Pedes teſtacei femoribus poſticis incraſſatis: faſcia lata, nigra.

**** *Breviroſtres femoribus muticis.*

argyreus. 229. C. breviroſtris corpore viridi argenteo auroque maculato. Linn. Syſt. nat. 2. 615. 74. Lud. Ulr. 54.
Habitat in Indiis.

ſplendidus. 230. C. breviroſtris elytris ſtriatis aureo maculatis baſi gibbis apice acuminatis.
Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.
Statura & magnitudo omnino C. imperialis. Thorax punctis elevatis atris ſcaber linea dorſali lateribusque aureis. Elytra ſtriata macu-

lis variis, aureis, nitidiſſimis. Pedes hirſutiſſimi.

231. C. longiroſtris elytris ſtriis elevatis atris ſulcisque punctatis viridi aureis alternis, baſi gibbis, apice acuminatis. *imperialis.*

Curculio imperialis. Drury Inſ. 2. tab. 33. fig. 1.

Oliv. Inſ. 83. fig. 1.

Naturf. 10. tab. 2. fig. 1.

Habitat in America meridionali, Braſilia.

232. C. breviroſtris elytris virescentibus: punctis elevatis atris baſi gibbis. *ſumptuoſus*

Curculio ſumptuoſus. Oliv. Inſ. 83. tab. 1. fig. 13.

Habitat Cajennae.

Statura & magnitudo omnino praecedentis. Thorax ater linea dorſali griſea. Elytra virescenti cinerea, ſtriata ſtriis punctis elevatis, atris.

233. C. breviroſtris albidus elytris acuminatis: faſciis duabus punctisque duobus aureis. *chryſis.*

Curculio Chryſis. Oliv. Inſ. 83. tab. 1. fig. 6.

Habitat in India orientali Muſ. Reg. Galliae.

Magnus. Antennae nigrae. Thorax albidus linea dorſali aurea. Elytra acuminata, albida, nigro punctata faſciis duabus aureis. In medio punctum aureum ad baſin & alterum verſus apicem.

234. C. breviroſtris corpore viridi ſericeo: faſciis aureis repandis. Linn. Syſt. nat. 2. 616. 75. *regalis.*

Curculio regalis Oliv. Inſ. 83. tab. 1. fig. 8.

Habitat in Indiis.

235. C. breviroſtris fuſcus elytrorum ſutura abdominisque marginibus aureis. *marginatus*

Curculio marginatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 82.

Habitat Cajennae Muſ. Dr. Hunter.

Magnus. Caput nigrum, immaculatum roſtro plano. Thorax fuſcus pectore lineis duabus aureis. Elytra punctata ſutura baſi aurea. Abdomen ſubtus nigrum lateribus aureis. Pedes nigri.

19punctatus 236. C. breviroſtris caneſcens thorace punctis nigris quatuor, coleoptris novemdecim.

Curculio 19 punctatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 25.

Habitat Cajennae Dom. Mauduit.

Statura C. regalis. Caput coeruleſcens oculis antennisque nigris. Thorax cineraſcens punctis quatuor nigris: lateralibus minoribus. Elytra cinerea punctis novem & communi baſeos 1. 2. 2. 2. 2. tertio pari majori. Punctum commune puncto minutiſſimo cinereo notatum. Pedes coeruleſcentes.

16punctatus 237. C. breviroſtris coeruleſcens thorace punctis nigris quatuor, coleoptris ſedecim.

Curculio 16 punctatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 17.

Linn. Syſt. nat. 2. 618. 92. Muſ. Lud. Ulr. 58.

Habitat in Braſilia.

Caput ſulcatum. Thoracis latera aurea. Punctum poſticum elytrorum geminatum.

decorus. 238. C. breviroſtris ſupra fuſcus thorace coleoptrisque vittis duabus viridi aureis.

Curculio decorus. Oliv. Inſ. 83. fig. 152.

Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.

Roſtrum fuſcum, apice canaliculatum. Thorax rotundatus, fuſcus lineis duabus viridi aureis, nitidis. Elytra punctata, ſtriata, fuſca vitta in medio viridi aurea. Corpus ſubtus aureum abdominis medio fuſco. Pedes fuſci femoribus clavatis, muticis.

239. C. breviroſtris viridi ſquamoſus elytris punctatis. *nitidulus.*

Curculio nitidulus. Oliv. Inſ. 83. fig. 38.

Habitat Cajennae.

Statura & magnitudo C. argentati pulcherrimus. Roſtrum ſulcatum, cinereum. Thorax & elytra punctata, holoſericea, viridi nitentia.

240. C. breviroſtris elytris ſpinoſis albis: macula laterali fuſca. *candidus.*

Habitat Cajennae Dom. Mallet.

Caput aureo nitens. Thorax dorſo fuſco lateribus albis. Elytra ſpinis paucis, ſparſis, elevatis, alba poſtice macula magna, laterali, fuſca. Pedes fuſci tibiis rufis.

241. C. breviroſtris niveus thoracis dorſo roſtroque fuſcis, elytris ſpinoſis acuminatisque. *niveus.*

Curculio niveus. Oliv. Inſ. 83. fig. 173.

Habitat Cajennae Muſ. Dr. Hunter.

Roſtrum bifidum, ciliatum, ſupra fuſcum. Thorax ſublaevis, niveus linea dorſali, lata, fuſca. Scutellum & ſutura elytrorum baſi fuſca. Elytra nivea ſtriis elevatis, ſubdentatis, quarum exterior baſi, interior apice ſpinam format. Elytra apice valde acuminata, diſtantia. Corpus niveum.

242. C. breviroſtris albus auro nitidulus elytris ſulcatis acuminatis. *lacteus.*

Curculio lacteus. Oliv. Inſ. 83. fig. 172.

Habitat in Jamaica Muſ. Dr. Hunter.

Medius. Caput album roſtro emarginato. Thorax albus, auro ſplendens lineaque laterali, aurea. Elytra ſulcata ſulcis punctatis, alba, poſtice acuminata, Pedes albi tibiis coeruleſcentibus.

pulverulentus. 243. C. breviroſtris cinereus capite plano canaliculato.

Habitat Tranquebariae Dom. de Scheſtedt.

Statura & magnitudo omnino C. ſquamoſi. Caput cum roſtro breviſſimo planum, canaliculatum, cinereum. Thorax cinerascens macula dorſali, impreſſa. Elytra punctato ſtriata, cinerascentia, immaculata.

ſquamoſus. 244. C. breviroſtris viridi ſquamoſus roſtro thoraceque canaliculatis.

Habitat in China, India orientali M. de Scheſtedt.

Medius. Roſtrum planum, depreſſum linea media, impreſſa. Thorax viridi ſquamoſus linea media, impreſſa. Elytra villoſa viridique ſquamoſa, punctato ſtriata.

Aetate ſquamae pereunt & totus glaber & niger evadit.

cretaceus. 245. C. breviroſtris albus elytris ſulcatis unispinoſis acuminatisque.

Habitat in Inſula Guadeloupe Dom. de Badier.

Nimis affinis C. lacteo. Roſtrum breve, apice biſidum. Thorax niveus, immaculatus punctis tribus dorſalibus, impreſſis. Elytra nivea, immaculata, ſulcata, quorum ſtria interior ante apicem ſpinam erectam validam format, apice acuminata. Corpus niveum.

cinerascens. 246. C. breviroſtris cinereus elytris puncto baſeos, duobusque apicis albis.

Habitat Cajennae Muſ. Dom. Gigot d'Orcy.

Statura praecedentium. Corpus totum cinereum, tomentoſum. Punctum album utrinque ad baſin elytrorum & dua verſus apicem.

ſmaragdulus. 247. C. breviroſtris vireſcens elytris punctatis: ſpina antica poſticaque erecta valida.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Paullo minor C. candido. Roſtrum emarginatum, vireſcens antennis cineraſcentibus. Thorax cylindricus, vireſcens linea transverſa, ſubimpreſſa. Elytra punctata, viridia ſpina baſeos verſus marginem exteriorem & alia majori pone medium verſus futuram. Praeterea ſpinae aliquot obſoletiores, quae cum poſteriore ſtriam formant. Corpus vireſcens.

248. C. breviroſtris cinereo fuſcoque varius coleoptris punctatis poſtice gibbis: tuberculis octo. *octotuberculatus.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Roſtrum ſubemarginatum. Thorax punctatus, cinereus lineis tribus fuſcis, lateralibus obſoletioribus. Elytra punctata, cinereo fuſcoque varia, poſtice gibba tuberculis quatuor approximatis, obtuſis. Corpus cinereum ano nigro.

249. C. breviroſtris capite thoraceque obſcure ferrugineis, elytris fuſcis: punctis maculisque albis. *ſervus.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae fuſcae: articulo primo ferrugineo. Caput ferrugineum puncto inter oculos atro. Roſtrum apice retuſum, atrum. Thorax ferrugineus, immaculatus. Elytra punctato ſtriata, fuſca, apice ferruginea punctis maculisque albis.

250. C. breviroſtris cinereus thorace elytrisque fuſco maculatis. *modeſtus.*

Curculio modeſtus. Oliv. Inſ. 83. fig. 178.

Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.

Medius, cinereus. Thorax latior quam in reliquis, planus punctis dorſalibus, fuſcis. Elytra ſtriata, fuſco maculata.

flaveſcens. 251. C. breviroſtris obſcurus thoracis elytrorumque acuminatorum lateribus flavis.

Habitat in America meridionali Dom. Schreber.

Paullo major C. viridi. Caput obſcurum. Thorax & elytra ferrugineo fuſca lateribus laete flavis. Elytra valde acuminata. Corpus flaveſcens. Pedes virides.

pollinoſus. 252. C. breviroſtris ſquamoſo flaveſcens elytris acuminatis.

Habitat in Auſtria Dom. Schneider.

Differt a C. viridi elytris omnino acuminatis. Corpus totum flavo ſquamoſum dorſo obſcuriore.

lateralis. 253. C. longiroſtris viridi ſquamoſus thoracis elytrorumque lateribus flavis.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Statura omnino praecedentis. Antennae fuſcae. Caput, thorax, elytra ſquamoſo vireſcentia lateribus late flavis. Elytra obtuſa, nullo modo acuminata.

viridis. 254. C. breviroſtris vireſcens thoracis elytrorumque lateribus flavis. Linn. Syſt. nat. 2. 616. 76. Paykull. Monogr. 107. 103. Bonsd. Curc. Suec. 22. 6.

Curculio viridis. Oliv. Inſ. 83. fig. 18.

Degeer Inſ. 5. 256. 45.

Sulz. Inſ. tab. 3. fig. 24.

Schaeff. Icon. tab. 53. fig. 6.

Habitat in Europae Pomona.

gibber. 255. C. breviroſtris vireſcenti albus elytris baſi unidentatis poſtice gibboſis.

Curculio gibber. Oliv. Inſ. 83. fig. 189.

Curculio gibber. Pall. Icon. tab. B. fig. 14.

Habitat Cajennae Muſ. Dr. Hunter.

Medius. Roſtrum canaliculatum, apice bifidum, albidum. Antennae albae clava nigra. Thorax virescenti albus, immaculatus. Elytra ſubſtriata baſi ſpina depreſſa, obtuſa & poſtice gibbere communi, elevato.

256. C. breviroſtris fulvus capite baſi pedibusque fuſcis, roſtro emarginato. *fulvus.*

Habitat in Saxonia Dom. Hybner.

Parvus. Caput fulvum, baſi fuſcum. Roſtrum apice emarginatum. Thorax gibbus, laevis, fulvus. Elytra vix ſtriata, obſcuriora. Pedes fuſci.

257. C. breviroſtris fuſcus thoracis elytrorumque margine cinereo. *palliatus.*

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Paullo minor C. viridis. Corpus ſupra fuſcum, ſubtus cinereum, quo colore & thoracis & elytrorum margo inficitur.

258. C. breviroſtris corpore ferrugineo auro maculato. *aurifer.*

Curculio aurifer. Oliv. Inſ. 83. fig. 124.

Brown. Jamaic. 429. tab. 43. fig. 3.

Drury Inſ. 1. tab. 32. fig. 1.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis.

Roſtrum planum, ferrugineum punctis duobus apicis aureis. Elytra ſtriato punctata, poſtice acuminata, ferruginea punctis lineoſisque plurimis, vagis, aureis. Pedes antici elongati.

259. C. breviroſtris albus elytris vitta abbreviata dentata pedibusque cyaneis. *cyanipes.*

Curculio cyanipes. Oliv. Inſ. 83. fig. 190.

Habitat Cajennae Muſ. Dr. Hunter.

Antennae fuſcae, cyaneo nitidae. Roſtrum album, emarginatum. Thorax albus. Elytra ſubſtriata vitta a baſi ad medium ducta, dentata, cyanea, nitida, apice obtuſa. Pedes cyaneo nitidi.

repandus. 260. C. breviroſtris thorace fuſco albo lineato, elytris cinereis fuſco faſciatis: margine corporeque viridibus nitidis.

Habitat in Italia Dom. de Schlanbuſch.

Statura omnio & magnitudo C. Tamariſci. Caput griſeum. Thorax ſupra fuſcus linea laterali dorſalique cinereis. Elytra cinerea faſciis obliquis, dentatis, repandis. Margo viridi nitens. Pedes cinerei.

Tamariſci. 261. C. breviroſtris viridi nitens elytris viridi ferrugineo nigro cinereoque variis.

Curculio Tamariſci. Oliv. Inſ. 83. fig. 71.

Habitat in Africae Tamariſco Dom. Prof. Vahl.

C. ſplendidulo duplo fere major. Caput, thorax, corpus viridia, nitida. Elytra variegata, diſtincta inprimis maculis duabus, marginalibus, cinereis.

ſplendidulus. 262. C. breviroſtris viridi nitens coleoptrorum diſco cinereo nigro faſciato.

Habitat in Siberia Muſ. Dom. Banks.

Statura omnino C. argentati at minor & femora inermia. Caput cinereum roſtro apice ſubteſtaceo. Thorax viridi nitens dorſo cineraſcente lineis duabus atris. Coleoptra limbo viridi nitente: dorſo cinereo, faſcia media angulata lituraque poſtica nigris. Corpus viridi niteus,

curvipes. 263. C. breviroſtris argento ſquamoſus, tibiis poſticis arcuatis intus dentatis ciliatis.

Curculio curvipes. Oliv. Inſ. 83. fig. 84.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Caput nigrum. Thorax & elytra ſquamis argenteis tecta. Elytra punctata. Pedes ſimplices tibiis poſticis arcuatis intus dente valido ciliisque denſis armatis.

264. C. breviroſtris thorace elytrisque fuſco cinereoque variis: punctis elevatis atris numeroſis. *morbilloſus*

Habitat in Gallia, Barbaria.

Major C. nebuloſo. Antennae breves, cinereae. Caput nigricans roſtro biſulcato. Caput & thorax fuſco cinereoque varia, obſcura punctisque numeroſiſſimis, elevatis, atris, glabris adſperſa. Abdomen itidem punctis atris. Pedes griſei.

265. C. breviroſtris canus elytris faſciis obliquis nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 617. 84. Fn. Sv. 635. Paykull. Monogr. 104. 101. Bonsd. Curc. Suec. 20. 3. *nebuloſus.*

Curculio albo nigroque varius. Geoff. Inſ. 1. 278. 1. tab. 4. fig. 8.

Degeer Inſ. 5. 241. 21.

Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 3.

Friſh. Inſ. 11. 32. tab. 23. fig. 5.

Habitat in Europae plantis.

266. C. breviroſtris oblongus nigricans elytris faſciis abbreviatis punctisque albis. *roridus.*

Curculio roridus. Pall. Icon. tab. A.

Habitat in Auſtria Dom. Schneider.

Roſtrum breve, craſſum, biſulcatum puncto utrinque ad oculos albido. Thorax ſcaber, niger utrinque cruce punctoque antico albis. Elytra ſcabra faſciis tribus abbreviatis punctisque indiſtinctis apicis albis. Corpus nigrum abdomine pedibusque cinereis.

marmoratus 267. C. breviroſtris thorace nigro ſcabro albo lineato, elytris albis: maculis nigris ſparſis ſubquadratis.

Habitat in Germania.

Statura & magnitudo C. nebuloſi. Antennae cinereae. Caput nigrum ſulcis duabus ferrugineo villoſis. Thorax ſcaber, niger, albo lineatus. Elytra albida maculis plurimis, ſparſis, nigris, ſubquadratis. Corpus & pedes cinerea.

ſulciroſtris. 268. C. breviroſtris oblongus cinereus ſubnebuloſus roſtro triſulcato. Linn. Syſt. nat. 2. 617. 85. Paykull. Monogr. 103. 100. Bonsd. Curcul. Suec. 21. 4. Degeer Inſ. 5. 240. 26.

Curculio ſulciroſtris. Oliv. Inſ. 83. fig. 24.

Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 111.

Habitat in Europae plantis.

Statura & magnitudo omnino C. nebuloſi at roſtrum triſulcatum.

porculus. 269. C. breviroſtris nigricans cinereo varius capite retuſo roſtroque carinato.

Curculio porculus. Act. Suec. 6. tab. 2. fig. 20.

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Magnus. Roſtrum craſſum in medio linea elevata carinatum, vel potius biſulcatum. Caput ante baſin roſtri valde retuſum. Antennae cineraſcentes. Thorax niger, ſubvarioloſus linea media elevata, abbreviata, glabra, atra. Elytra ſubſtriata, obſcuro cinereoque mixta, verſus poſteriora macula oblonga, atra. Corpus nigrum.

emarginatus. 270. C. breviroſtris oblongus fuſcus coleoptrorum dorſo cinereo: lineis duabus punctorum impreſſorum atrorum.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Roſtrum craſſiusculum, biſulcatum, fuſcum. Antennae apice cinereae. Thorax fuſcus linea laterali, albida. Elytra punctis elevatis, minutiſſimis ſubſtriata, fuſca, interne cinerea ſtria punctorum nigrorum. Coleoptra apice emarginata.

271. C. breviroſtris niger abdomine albo: punctis elevatis glabris arris, roſtro ſulcato. *perlatus.*

Habitat in China Dom. de Seheſtedt.

Roſtrum nigrum ſulcis duobus exaratum. Thorax punctis elevatis ſcaber, niger linea laterali albida. Abdomen villoſum, album punctis elevatis, glabris, atris.

272. C. breviroſtris griſeus elytris punctis duobus diſtinctis albidis: anteriore didymo. *diſtinctus.*

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Statura & magnitudo omnino C. perlati at diſtinctus & alius. Roſtrum cylindricum ſulcis duobus, profundis, albo villoſis. Thorax griſeus linea dorſali obſcuriore, laterali albida, interrupta. Elytra vix ſtriata, griſea futura obſcuriore. Pone medium puncta duo alba, anteriore duplicato, oblongo. Corpus nigrum pectore maculis, abdomen faſciis cineraſcentibus.

273. C. breviroſtris roſtro carinato thoraceque inaequali obſcuris, elytris glaucis: puncto poſtico elevato. *glaucus.*

Panz. Naturf. 24. 22. 30. tab. 1. fig. 30.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Roſtrum fuſcum, ſupra ferrugineum carina elevata, acuta. Antennae fuſcae clava cinerea. Thorax inaequalis, nigro cinereoque varius. Elytra glauca puncto poſtico elevato, quaſi fornicato, atro. Corpus cinereum.

obliquus. 274. C. breviroſtris cinereus elytrorum dorſo albo: ſtrigis obliquis punctoque poſtico fornicato nigris.

Habitat in Germania.

Diſtinctus elytrorum dorſo albo ſtrigis duabus obliquis, nigris. Thorax alboſtriatus.

albidus. 275. C. breviroſtris oblongus fuſcus elytris albidis: faſcia media lituraque baſeos apicisque fuſcis. Payk. Monogr. 106. 102.

Curculio niveus. Bonsd. Curc. Suec. 21. 5.

Curculio candidus. Herbſt Arch. 33. 75. tab. 24. fig. 31.

Habitat in Germaniae plantis.

Thorax antice utrinque litura albida, nigro punctata. Elytra litura baſeos, faſcia media, quae interdum abbreviata, lituraque apicis fuſcis. Abdomen albidum lineis punctorum nigrorum.

diſpar. 276. C. breviroſtris oblongus fuſcus villis cinereis maculatus.

Habitat in India orientali Prof. Abildgaard.

Statura & magnitudo omnino praecedentis totus fuſcus, villis cinereis hinc inde maculatus. Aetate villi pereunt.

Vetula. 277. C. breviroſtris griſeus elytris rugoſis nigris cinereo maculatis, roſtro atro.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Affinis videtur praccedenti. Roſtrum cylindricum, atrum. Thorax obſcurus, griſeus. Elytra rugoſa, nigricantia, cinereo maculata. Corpus griſeum.

luſitanicus. 278. C. breviroſtris oblongus ſupra fuſcus elytris macula baſeos alba.

Curculio luſitanicus. Oliv. Inſ. 83. tab. 16. fig. 202.

Habitat in Luſitania Dom. Dr. Gray.
Corpus ſupra fuſcum, ſubtus ſquamoſo aureum.
Elytra macula oblonga baſeos.

279. C. breviroſtris cinereus elytris lineis elevatis tribus crenulatis atris. *crenulatus.* ✓
Curculio crenulatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 729.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae griſeae clava fuſca. Caput cinereum dorſo fuſco. Thoracis dorſum fuſcum. Elytra lineis tribus elevatis, glabris, atris, utrinque punctis impreſſis, crenulatis. Pedes fuſci.

280. C. breviroſtris niger elytris punctis nigris albisque alternis holoſericeis ſtriatis. *punctatulus*
Curculio punctatulus. Oliv. Inſ. 83. fig. 119.
Habitat Terra nova Americae Muſ. D. Banks.
Caput nigrum, griſeo ſubpubeſcens. Thorax concolor. Elytra nigra ſtriis e punctis albis nigrisque alternis.

281. C. breviroſtris oblongus fuſcus thoracis dorſo plano. Linn. Syſt. nat. 2. 610. 81. Fn. Sv. 631. Paykull. Monogr. 102. 99. *incanus.* ✓
Curculio cinereus, ſquamoſus, alis carens, elytris ſtriatis. Geoff. Inſ. 1. 282. 10.
Bonsdorf. Curc. Suec. 41. 36.
Degeer Inſ. 5. 242. 28.
Liſt. Scarab. Angl. 394. 30.
Habitat in Europae plantis.

282. C. breviroſtris ater thorace punctato, roſtro baſi articulato. *articulatus.*
Habitat in Auſtria Schneider.
Medius. Caput globoſum, atrum roſtro breviſſimo, apice emarginato, baſi articulo inter oculos diſtincto. Thorax gibbus, punctatus. Elytra punctato ſtriata. Abdomen cinereo pubeſcens. Pedes nigri.

coſtatus. 283. C. breviroſtris cinereus thorace nigro: lineis quatuor cinereis.

Habitat in Gallia auſtraliori Muſ. Dom. Banks.

Magnitudo C. incani. Antennae baſi ferrugineae. Roſtrum nigrum dorſo cinereo. Thorax niger linea dorſali elevata, atra. Elytra pedesque cinerea.

melancholicus. 284. C. breviroſtris fuſcus elytris tibiisque teſtaceis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Paullo minor C. incano. Roſtrum breve, cylindricum antennis ferrugineis clava obſcuriore. Thorax niger linea laterali villoſa, pallida, obſoleta. Elytra ſtriata, obſcure teſtacea, immaculata. Corpus nigrum tibiis teſtaceis.

interruptus. 285. C. breviroſtris obſcurus coleoptrorum faſcia interrupta alba.

Curculio interruptus. Oliv. Inſ. 83. fig. 122.

Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Ruſticus. Orbita oculorum alba. Thorax fuſcus ſcutello albo. Elytra ſtriata, albo irrorata at pone medium faſcia albida, obliqua, ſutura interrupta. Pedes cinerei.

ſcutellaris. 286. C. breviroſtris ater elytris crenato ſtriatis, pedibus anticis elongatis.

Curculio ſcutellaris. Oliv. Inſ. 83. fig. 142.

Habitat in Terra Diemenii Muſ. Dom. Banks.

Antennae nigrae. Roſtrum ſulcatum. Thorax ſcaber, ater. Scutellum parvum, elevatum. Elytra crenato ſtriata, obtuſa, ante apicem unidentata, atra, immaculata. Pedes nigri anticis elongatis.

longimanus 287. C. breviroſtris fuſcus thoracis margine punctisque duobus ferrugineis, pedibus anticis elongatis.

Curculio longimanus. Oliv. Inſ. 83. fig. 114.

Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.

Roſtrum ſuſcum dorſo plano. Thorax globoſus lateribus margineque antico ferrugineis. Dorſum fuſcum punctis duobus ferrugineis. Elytra ſtriata, fuſca, viridi tincta. Abdomen ſubtus vireſcens. Pedes antici nigri, longiores femoribus incraſſatis, tibiisque ſerratis, quatuor poſtici ferruginei tibiis fuſcis.

Variat thorace elytrisque ferrugineis: linea nigra. Pedes nigri.

288. C. breviroſtris cinereus fuſco irroratus thorace acute ſpinoſo. *ſpiniſex.*

Habitat — — Muſ. Dr. Schulze.

Gibbus. Roſtrum planum. Thorax utrinque acute ſpinoſus, cinereus atomis fuſcis. Elytra ſtriata, cinerea, fuſco irrorata. Abdomen nigricans ſtriis tribus e punctis albidis.

289. C. breviroſtris fuſco aureus pedibus ferrugineis. *micans.*

Curculio Pyri. Paykull. Monogr. 85. 82. Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 11.

Habitat in Daniae hortis Muſ. Dom. de Seheſtedt.

Statura omnino C. Pyr. at femora omnino mutica, ſorte ſexus varietas.

290. C. breviroſtris fuſcus thorace trilineato, elytris pallido ſtriatis nigroque punctatis. *murinus.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo C. Polygoni. Roſtrum cylindricum, fuſcum puncto albido inter oculos. Thorax fuſcus lineis tribus dorſalibus, albis. Elytra ſtriis alternis obſcuris pallidisque punctis nigris. Sutura obſcura ante apicem macula pallida in ſingulo elytro punctis duobus nigris. Pedes obſcuri.

Polygoni. 291. C. breviroſtris thorace lineato, elytris cinereis: lineolis fuſcis ſuturaque nigro punctata. Paykull. Monogr. 42. 39. β.
Linn. Syſt. nat. 2. 609. 26. Fn. Sv. 597.
Curculio Polygoni. Oliv. Inſ. 83. fig. 41.
Habitat in Europae Polygono.
Roſtrum griſeum linea longitudinali, alba. Thorax griſeus lineis tribus albis. Elytra cinerea lineola baſeos duabusque aliis in medio. Sutura fuſco punctata. Pedes griſei.

griſeus. 292. C. breviroſtris ſupra griſeo fuſcus ſubtus cinereus roſtro canaliculato.
Habitat in Anglia, Italia.
C. lineato longior. Roſtrum ſulco profundiori exaratum.

3 guttatus. 293. C. breviroſtris nigricans elytris griſeis: maculis duabus albis; poſteriori majori communi.
Petiv. Gazoph. tab. 50. fig. 8.
Schaeff. Icon. tab. 43. fig. 9.
Sulz. Inſ. tab. 4. fig. 11.
Habitat in Anglia captus die VI. Maj. in ſabuletis Richmondenſibus.
Roſtrum canaliculatum & thorax fuſca. Elytra ſubſtriata, griſea puncto parvo albo in medio & macula majori communi verſus apicem.

Arundinis. 294. C. breviroſtris luteſcens, thorace lineis duabus dorſalibus fuſcis. Paykull. Monogr. 47. 44.
Curculio luteus. Knoch. Beytr. 1.
Habitat in Germaniae, Sueciae Arundine Dom. Prof. Helwig.
Statura media C. triguttati. Roſtrum cylindricum, incurvum, nigrum dorſo flaveſcente. Thorax flaveſcens dorſo lineis duabus dorſa-

libus, latis, fuſcis. Elytra ſubſtriata, luteſcentia. Corpus luteſcens pedibus fuſcis.

295. C. breviroſtris ſupra fuſco cinereus ſubtus niger roſtro ſubſulcato. *moerens.*

Habitat Halae Dom. Hybner.

Statura & magnitudo C. griſei ſupra totus fuſco cinereus, ſubtus niger. Elytra ſubſtriata.

296. C. breviroſtris griſeus capite thoraceque nigris: linea dorſali alba. *greſſorius.*

Habitat in Italia Dom. de Schlanbuſch.

Medius. Caput nigrum, canaliculatum canali albido, ſubtus cinereum. Thorax ſupra ater linea dorſali alba, ſubtus cinereus. Elytra fuſca. Abdomen cinereum. Pedes obſcuri, antici elongati.

297. C. breviroſtris cinereus thorace trilineato, elytris ſtriis numeroſis fuſcis per paria approximatis. *geminatus.*

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Medius, fere globoſus. Antennarum clava ferruginea. Roſtrum cinereum. Thorax cinereus lineis tribus latis, fuſcis. Elytra globoſa, cinera ſtriis longitudinalibus fuſcis, per paria approximatis. Pedes cinerei.

298. C. breviroſtris niger elytris ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *gramineus.*

Habitat in Germaniae Graminoſis D. Smidt.

Statura ovata praecedentis. Antennae ferrugineae clava interdum apice cineraſcente. Thorax canaliculatus, ater utrinque tuberculo parvo, elevato. Elytra crenato ſtriata, abdomine paullo breviora. Pedes omnes ruſi. Corpus ſubtus cinereo villoſum.

299. C. breviroſtris, flaveſcente villoſus roſtro apice retuſo atro. *diadema.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

C. Coryli paullo major. Antennae cinereae. Roſtrum obſcurum, apice retuſum, atrum. Thorax & elytra atomis vel villis flaveſcentibus tecta, immaculata. Pedes cinerei.

Meles. 300. C. breviroſtris griſeus thoracis dorſo fuſco: linea albida, elytris nigro punctatis: futura ante apicem albida.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Paullo minor C. Coryli. Caput griſeum roſtro cylindrico, nigro. Thorax ſupra griſeus dorſo lato, fuſco linea media griſea. Elytra ſtriata, mox griſea, mox magis ferruginea, nigro punctata futura ante apicem linea diſtincta, albida. Pedes concolores.

Coryli. 301. C. breviroſtris cinereo fuſcoque varius elytrorum futura dimiata atra.

Habitat in Angliae Corylo Capt d. XX Maj.

Roſtrum apice atrum. Thorax elytraque glabra, cinereo fuſcoque varia. Dimidia futurae pars, baſi proxima atra, glabra.

lineatus. 302. C. breviroſtris fuſcus thorace ſtriis tribus pallidioribus. Linn. Syſt. nat. 2. 616. 80. Fn. Sv. 630. Paykull. Mon. gr. 112. 108. Bonsd. Curc. Sv. 30. 16.

Geoff. Inſ. 1. 283.

Degeer Inſ. 5. 247. 35.

Schaeff. Icon. tab. 103. fig. 8.

Habitat in Europae plantis.

lunatus. 303. C. breviroſtris coleoptris elevato ſtriatis: faſcia ſemicirculari maculaque poſtica albis: lunula nigra.

Habitat in Anglia capt. die VI Maj in arenoſis Richmondenſibus.

Roſtrum cinereum puncto frontis impreſſo. Elytra lineis tribus aut quatuor elevatis, acutis, quae tamen elytri apicem haud attingunt cinerea, faſcia alba ab angulo humerali ad medium futurae ducta. Poſtice macula magna, communis, alba, in cujus medio lunula communis, nigra. Pedes fuſco faſciati.

304. C. breviroſtris fuſcus thorace lineis elytrisque brunneis. *caninus.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & ſumma affinitas C. lineati. Antennae nigrae articulo primo ruſo. Roſtrum canaliculatum oculorum orbita pallida. Thorax rotundatus, fuſcus lineis tribus brunneis. Elytra ſubſtriata, brunnea, fere immaculata. Corpus & pedes fuſca.

305. C. breviroſtris cinereus: dorſo fuſco. *cineraſcens.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura & magnitudo C. lineati. Antennae teſtaceae. Caput & thorax cinerea dorſo fuſco. Coleoptra ſubſtriata, cinerea dorſo itidem fuſco, parum cinereo lineato. Pedes pallide teſtacei.

306. C. breviroſtris tomentoſo cineraſcens pedibus teſtaceis. Paykull. Monogr. 114. 109. *fulvipes.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Roſtrum planum. Corpus pubeſcens, viride. Abdomen argento pubeſcens. Antennae fuſcae. Pedes teſtacei.

307. C. breviroſtris teſtaceus capite elytrisque ſtriatis cinereo fuſcis. *ruficollis.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Parvus. Caput fuſcum antennis rufis clava fuſca. Thorax laevis, teſtaceus. Elytra ſtriata, cinereo fuſca. Corpus teſtaceum.

fulvicornis. 308. C. breviroſtris brunneus elytris faſciis undatis cinereis.
Curculio ruficornis. Paykull. Monogr. 109. 105. Bonsd. Curcul. Suec. 27. 13.
Habitat in Europae arboribus.
Affinis ſequenti.

piloſus. 309. C. breviroſtris cinereus piloſus antennis nigris.
Habitat in Germania Dom. Schneider.
Paullo major ſequentibus. Corpus totum cinereum, obſcurum pilis erectis, numeroſis tectum. Antennae nigrae. Thorax ſublineatus.

undatus. 310. C. breviroſtris fuſcus elytris apice pallidis: ſtriga undata fuſca. Paykull. Monogr. 108. 104.
Curculio tereticollis. Bonsd. Curc. Suec. 28. 14. Degeer Inſ. 5. 246. 33.
Habitat in Europae Corylo Dom. de Hattorff.
Statura parva C. lunati.

hiſpidulus. 311. C. breviroſtris fuſcus thorace cinereo lineato, elytris hiſpidis punctis obſcurioribus ſtriatis. Paykull. Monogr. 110. 106.
Habitat in Plantis aquaticis Kiliae Dom. Lund.
Thorax punctatus, fuſcus lineis tribus longitudinalibus, cinereis: media tenuiore. Punctum utrinque laterale, cinereum. Elytra fuſca pilis albis, erectis hiſpida punctisque obſcurioribus ſtriata, interjectis pilis albis. Pedes nigricantes.

hirſutulus. 312. C. breviroſtris cinereus hiſpidus elytris ſtriatis, antennis pedibusque flaveſcentibus.
Curculio echinatus Bonsd. Curc. Suec. 33. 21. Paykull. Monogr. 92. 89.
Habitat in Germania Dom. Schmidt.
Statura & magnitudo omnino C. ſcabriculi. Roſtrum breve, obtuſum, fuſcum antennis

flaveſcentibus. Corpus totum cinereum pilis denſis, erectis, griſeis. Pedes omnes flaveſcentes. Differt a C. ſcabriculo roſtro thoraceque haud canaliculatis.

313. C. breviroſtris cinereus capite thoraceque canaliculatis, elytris hiſpidis. Linn. Mant. 351. Paykull. Monogr. 91. 88. *ſcabriculus.*
Curculio ſcabriculus. Bonsd. Curc. Suec. 32. 20.
Habitat in Sueciae arenoſis.
Magnitudo C. cervini totus cinereus. Caput & roſtrum canaliculatum. Thorax punctis elevatis ſcaber. Elytra ſtriata, hiſpida.

314. C. breviroſtris ater elytris vitta marginali ſcutelloque inauratis. *limbatus.*
Curculio lateralis. Paykull. Monogr. 95. 92.
Habitat in Europa.
Statura & magnitudo C. cervini. Caput nigrum, immaculatum oculis prominulis. Thorax rotundatus, niger. Elytra ſubſtriata, punctata, nigra vitta fere marginali, inaurata. Scutellum inauratum.

315. C. breviroſtris viridis antennis tibiisque teſtaceis. *parvulus.*
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Parvus. Antennae pallide teſtaceae. Caput, thorax, elytra viridi ſquamoſa. Fenora fuſca. Tibiae teſtaceae.

316. C. breviroſtris thorace viridi ſquamoſo, elytris ſtriatis nigris, *viridicollis.*
Habitat in Germaniae Querc. D. Prof. Helwig.
Statura omnino C. argentati. Antennae ferrugineae. Caput & thorax viridi ſquamoſa. Elytra punctato ſtriata, atra. Pedes inermes, nigricantes, interdum teſtacei.

cerulinus. 317. C. beviroſtris griſeus elytris puncto obſoleto baſeos albo, antennis baſi rufeſcentibus. Linn. Syſt. nat. 2. 615. 70. Fn. Sv. 627.
Degeer Inſ. 5. 220. 13.
Habitat in Europae plantis.

ſtriatus. 318. C. breviroſtris fuſcus elytris ſtriis cinereis nigro punctatis.
Habitat in Barbaria Dom. Prof. Vahl.
Parvus. Caput fuſcum. Thorax fuſcus linea dorſali cinerea. Elytra fuſca ſtriis tribus longitudinalibus futuraque cinereis, holoſericeis, nigro punctatis.

lacerta. 319. C. breviroſtris griſeus elytris ſtriatis, antennis apice nigris.
Habitat in India orientali Muſ. Dom. Banks.
Triplo major C. cervino. Roſtrum apice emarginatum. Antennae griſeae clava apice nigra. Thorax rotundatus, griſeus lateribus obſcurioribus. Elytra ſtriata ſtriis crenatis, poſtice coeuntibus.

velox. 320. C. breviroſtris piloſus niger elytris margine puncto baſeos faſcia interrupta punctoque apicis albis.
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Caput carinatum, atrum. Thorax ater linea laterali, alba. Elytra piloſa, ſtriata, atra margine exteriori, puncto magno baſeos, faſcia in medio interrupta punctoque apicis margine annexo albis. Pedes nigri.

ſeminulum. 321. C. breviroſtris niger immaculatus elytris ovatis punctato ſtriatis.
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.
Corpus parvum, totum ovatum, nigrum, immaculatum. Elytra valde ovata, punctato ſtriata. Pedes nigri.

322. C. breviroſtris ater antennis rufis, thorace utrinque bituberculato. Linn. Syſt. nat. 2. 616. 78. Fn. Sv. 636. *ruficornis.*
Habitat in Europae plantis.
Thoracis tubercula utrinque duo. Elytra ſtriata.

323. C. breviroſtris cylindricus niger elytris ſtriatis, antennis pedibusque rufis. Linn. Syſt. nat. 2. 617. 82. Fn. Sv. 635. Paykull. Monogr. 116. 110. *cloropus.*
Curculio breviroſtris oblongus ater antennis rufis. Linn. Syſt. nat. 2. 617. 86. Fn. Sv. 637. mera hujus varietas.
Curculio Piniperda Herbſt Arch.
Habitat in Europae Ligno quercino.
Parvus, totus cylindricus.

324. C. breviroſtris cylindricus ater pedibus rufis, thorace canaliculato. *canaliculatus.*
Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom. Smidt.
Parvus, cylindricus, totus ater, nitens pedibus ſolis obſcure rufis. Thorax imprimis baſi late canaliculatus. Elytra ſtriato punctata.

325. C. breviroſtris niger obſcurus elytris punctis plurimis griſeo albis. *multipunctatus.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Statura & magnitudo omnino C. nigritae at femora mutica. Roſtrum apice emarginatum lineaque dorſali parum elevata. Antennae nigrae. Thorax gibbus, obſcurus, immaculatus. Elytra ſubſtriata, fuſca punctis numeroſiſſimis, griſeis. Pedes nigri.

326. C. breviroſtris niger elytris ſulcatis cinereis. *triſtis.*
Habitat in Suecia, Anglia.
Medius. Caput, thorax, abdomen & pedes obſcure nigra. Elytra ſulcata, cinerea, immaculata.

raucus. 327. C. breviroſtris niger elytris ſtriatis fuſcis cinereo maculatis. Paykull. Monogr. 97. 94.
Curculio triſtis. Bonsd. Curc. Suec. 36. 27.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Magnitudo & ſtatura omnino praecedentis & forte mera ejus varietas. Antennae piceae. Caput glabrum, nigrum. Thorax ſcaber, niger, immaculatus. Elytra ſtriata, fuſca punctis plurimis cineraſcentibus, ſparſis. Corpus nigrum.

adſperſus. 328. C. breviroſtris ater elytris poſtice albo maculatis.
Curculio adſperſus. Oliv. Inſ. 83. fig. 156.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Duplo minor C. triſti, ovatus. Thorax ſubgloboſus, ater macula utrinque ad baſin obſoleta, alba. Elytra crenato ſtriata, atra, poſtice in primis albo maculata. Pedes elongati.

punctatus. 329. C. breviroſtris fuſcus elytris punctis elevatis holoſericeis. Paykull. Monogr. 111. 107.
Habitat in Suecia.
Major, ovatus. Thorax gibbus, glaber. Elytra ſtriato punctata & praeterea punctis elevatis, holoſericeis, atris albisque, alternis adſperſa.

obſcurus. 330. C. breviroſtris ovatus ferrugineo fuſcus. Paykull. Monogr. 98. 95.
Curculio murinus Bonsd. Curc. Suec. 37. 80.
Habitat in Suecia.
Totus obſcure ferrugineus. Elytra lineis elevatis, obſoletis.

maxilloſus. 331. C. breviroſtris ovatus niger mandibulis exſertis arcuatis.
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Statura & magnitudo omnino C. nigri. Roſtrum ſingulare, breviſſimum mandibulis exſertis, arcuatis. Thorax gibbus, laevis, niger, nitidulus. Elytra laevia, nigra punctis laevioribus ſtriata. Pedes nigri.

332. C. breviroſtris ovatus ſcaber niger pedibus ruſis. Paykull. Monogr. 101. 198. *niger.*

Curculio clavipes Bonsd. Curc. Suec. 40. 35.

Habitat in Germania.

Corpus totum obſcure nigrum punctis parvis, elevatis ſcabrum. Antennae nigrae. Pedes ruſi genubus plantisque nigris.

333. C. breviroſtris ater nitidus roſtro emarginato. *laevigatus.*

Habitat Kiliae ſub lapidibus.

Statura praecedentis. Antennae nigrae. Roſtrum apice emarginatum. Thorax & elytra magis globoſa, atra, nitida, laevia, immaculata. Pedes atri.

334. C. breviroſtris niger elytris punctato ſtriatis, antennis tibiisque ruſis. *rotundatus.*

Habitat in Germania Dom. Leuwenſkiold.

Parvus. Antennae ferrugineae clava fuſca. Roſtrum breviſſimum, obtuſiuſculum. Thorax cylindricus, niger, immaculatus. Elytra punctato ſtriata, nigricantia, paullo viridi nitentia. Pedes ruſi femoribus nigris.

335. C. breviroſtris niger thorace carinato varioloſo, elytris ſtriatis. *varioloſus.*

Habitat in Saxonia.

Statura C. punctati totus niger. Thorax punctis majoribus, paſſim confluentibus excavatus. Elytra connata, poſtice acuminata.

336. C. breviroſtris thorace elytrisque varioloſis nigris albo punctatis. *ſtictícus.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei.

Parvus. Caput nigrum, immaculatum. Thorax varioloſus, ater, albo punctatus. Elytra varioloſa, atra, albopunctata & verſus apicem faſcia alba. Pedes & corpus alba.

valgus. 337. C. breviroſtris ater nitens elytris punctato ſtriatis, femoribus annulo cinereo.

Habitat in America.

Medius, totus ater, nitens. Femora apice annulo obſolete cinereo.

Varietas viridi ſquamoſa in Muſ. Dom. de Seheſtedt vix diſtincta.

ſuccinctus. 338. C. breviroſtris ater elytris margine lineolisque duabus albis.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lee.

Corpus magnum, oblongum. Caput ſulcatum, atrum. Thorax punctatus, ater linea laterali, alba. Elytra poſtice gibba, punctata, atra margine lineolisque duabus albis, altera a baſi ad medium, altera a medio marginis verſus apicem ducta, reflexa. Pedes atri.

Cameleon. 339. C. breviroſtris aeneus elytris futura vittaque abbreviatis viridi aureis.

Curculio Cameleon. Oliv. Inſ. 83. fig. 166.

Drury Inſ. 2. tab. 33. fig. 4. 5.

Habitat in Jamaica Muſ. Dr. Hunter.

Major C. vittato at ejusdem ſtaturae.

vittatus. 340. C. breviroſtris ater elytris ſtriis albis rubrisque abbreviatis. Linn. Syſt. nat. 2. 610. 33.

Curculio vittatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 192.

Sloan. Jamaic. 2. 210.

Habitat in Americae Inſulis. Deſtruit larva radices Citri medicae Dr. Schwarz.

Roſtrum ſupra planum, atrum. Thorax planus, laevis. Elytra ſtriata, punctata, atra ſtria alba ad futuram & latiori rufa impreſſa in medio,

quae ambae abbreviatae ultra medium haud extenduntur. Stria multa brevior, rubra, nigro ſubpunctata ad marginem exteriorem. Apex elytrorum parum cineraſcit. Subtus ater pectore albo maculato.

341. C. breviroſtris elytris flavis: lineis glaberrimis abbreviatis atris. Linn. Syſt. nat. 2. 609. 32. *Spengleri.*
Curculio Spengleri. Oliv. Inſ. 83. fig. 82.
Act. Berolinenſ. 4. tab. 7. fig. 7.
Habitat in Americae Inſulis.
Variat elytris cinereis lineis atris, vix tamen diſtinctus.

342. C. breviroſtris niger elytris punctato ſtriatis: vitta marginali dorſalique interrupta flavis. *bivittatus.*
Curculio bivittatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 23.
Habitat in St. Thomas Americae Dr. Pflug.
Corpus atrum, immaculatum. Elytra punctato ſtriata vittis duabus, haud punctatis, villoſis, poſtice coeuntibus, flavis, altera marginali, altera dorſali, in medio interrupta. Lineola alba inter pedes ſecundi & tertii paris.
Alium nullo modo diſtinctum vidimus vittis duabus haud interruptis, dorſali vireſcente, baſi tantum flava.

343. C. breviroſtris griſeus thorace elytrisque cinereo atroque maculatis. *lividus.*
Curculio lividus. Oliv. Inſ. 83. fig. 59.
Curculio lividus Brown. Illuſtr. tab. 49. fig. 8.
Curculio hiſtrionicus Sparmann. Act. Holm. 1785. tab. 2. fig. 17.
Habitat in America meridionali.
Magnus. Roſtrum ferrugineo griſeum. Thorax griſeus lineis tribus cinereis maculisque elevatis, atris. Elytra griſea maculis cinereis elevatisque atris numeroſis.

pulcher. 344. C. breviroſtris coleoptris atris: ſtriis ſex dorſalibus approximatis abbreviatis albis.

Curculio pulcher. Oliv. Inſ. 83. fig. 130.

Curculio pulcher Brown Illuſtr. tab. 49. fig. 6.

Habitat in Jamaica Muſ. Dom. Banks.

Caput & thorax punctata, atra, nitida. Elytra punctata, atra ſtriis tribus approximatis, abbreviatis, albis & parva marginali, rubra. Apex fere obtuſus parum cineraſcit. Pedes atri.

feſtivus. 345. C. breviroſtris elytris flaveſcentibus: ſtriis abbreviatis nigris marginalique ſanguinea.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis D. Iſert.

Statura & magnitudo C. Spengleri. Roſtrum breve, biſulcatum, nigrum. Antennae nigrae. Thorax niger lateralibus punctisque numeroſis dorſalibus, impreſſis, flavis. Elytra flava vitta lata, marginali, ſanguinea, longiori, margine tamen ipſo tenuiſſime nigro. Praeterea lineae quatuor dorſales, abbreviatae, nigrae. Corpus nigrum abdominis baſi parum pallida.

hiſtrionicus. 346. C. breviroſtris griſeus thorace lineis lateralibus fulvis, elytris albis: maculis atris fulvisque.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lee.

Caput griſeum. Thorax griſeus linea laterali, lata, fulva margineque albido. Elytra alba maculis plurimis, elevatis, nigris duabusque oblongis, fulvis. Abdomen albidum utrinque linea longitudinali punctorum nigrorum. Pedes nigri.

Rohrii. 347. C. breviroſtris elytris acuminatis griſeis: margine baſeos flaveſcente.

Habitat in Americae Inſulis Dom. von Rohr.

Roſtrum biſulcatum, nigrum. Thorax fuſcus atomis albis margineque flaveſcente. Elytra apice acuminata, griſea. Pedes nigri.

348. C. breviroſtris niger thorace elytrisque punctis impreſſis albis. *impreſſus.*

Curculio impreſſus. Oliv. Inſ. 83. fig. 126.

Habitat in Jamaica Muſ. Dom. Banks.

Roſtrum atrum utrinque linea alba. Thorax ater punctis utrinque duobus lateralibus, duobusque majoribus, dorſalibus baſeos impreſſis, albis. Elytra punctato ſtriata, atra lineis duabus punctorum alborum impreſſis. Pedes nigri.

349. C. breviroſtris niger thorace angulato, elytris tuberculatis baſi apiceque albidis. *albipes.*

Curculio albipes. Oliv. Inſ. 83. tab. 9. fig.

Habitat in Madagaſcar Muſ. Reg. Galliae.

Magnitudo praecedentis. Roſtrum craſſum, nigrum orbita oculorum cinerea. Thorax utrinque angulo obtuſo niger, poſtice cineraſcens. Pedes albi femoribus baſi tarſisque nigris.

350. C. breviroſtris niger thorace rufo maculato, elytris lineis tribus impreſſis cinereis. *rivuloſus.*

Curculio rivuloſus. Oliv. Inſ. 83. tab. 11. fig. 133.

Habitat in India orientali.

Roſtrum breve, craſſum, ſulcatum. Thorax canaliculatus, rufo maculatus. Elytra crenato ſtriata ſtriis tribus impreſſis, cinereis, quarum intermedia duplici annulo notatur.

351. C. breviroſtris fuſco cinereoque varius roſtro depreſſo plano apice atro. *depreſſiroſtris.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Roſtrum breve, depreſſum, planum, baſi cinereum, apice atrum. Thorax & elytra fuſco

cinereoque varia. Elytra ſtriata, tuberculata baſi ad ſuturam parum retuſa, albida ſcutello nigro. Pedes variegati femoribus anticis elongatis, incurvis.

marginellus 352. C. breviroſtris niger thoracis elytrorumque margine albo.

Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. Banks.

Paullo minor C. verrucoſo. Caput nigrum roſtro ſulcato. Thorax punctis elevatis, majoribus ſcaber, niger margine laterali albo. Elytra connata, ſcabra, nigra margine poſtice duplicato, albo. Pedes nigri.

verrucoſus. 353. C. breviroſtris aeneo niger elevato punctatus elytris poſtice verrucoſis. Linn. Syſt. nat. 2. 618. 90. Muſ. Lud. Ulr. 60.

Curculio verrucoſus. Oliv. Inſ. 83. fig. 125. Drury Inſ. 1. tab. 32. fig. 5.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei.

Totus aeneus, minime ſplendens. Elytra ſtriis tribus elevatis punctis elevatoribus adſperſis. Inter ſtrias ſtriae duae punctorum impreſſorum. Poſtice in ſingulo elytro verruca elevata, obtuſa.

capenſis. 354. C. breviroſtris ater thorace elevato punctato, elytris ſtriato crenatis. Linn. Syſt. nat. 2. 618. 82. Muſ. Lud. Ulr. 59.

Curculio capenſis. Oliv. Inſ. 83. fig. 52.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei.

Roſtrum ſulcatum.

6vittatus. 355. C. breviroſtris niger thorace ſcabro albo lineato, elytris acuminatis.

Curculio 6 vittatus. Oliv. Inſ. 83. tab. 12. fig. 149.

Habitat — — Muſ. Dr. Hunter.

Magnitudo & ſtatura omnino C. verrucoſi. Roſtrum obtuſum. Thorax ſcaber, albo lineatus. Elytra crenato ſtriata, acuminata vittis tribus latis, apice coeuntibus, albis. Pedes nigri.

356. C. breviroſtris niger fronte bidentata, elytris uniſpinoſis. *vitulus.*

Habitat in Terra del Fuego Muſ. Dom. Banks.

Caput nigrum roſtro canaliculato. Inter oculos dentes duo elevati, acuti. Thorax rugoſus, ater antice punctis duobus elevatis. Elytra carinata, rugoſa, atra, poſtice ſpina elevata, acuta. Pedes nigri.

357. C. breviroſtris griſeus thorace inaequali antice prominulo, elytris ſulcatis poſtice bidentatis, roſtro triſulcato. *inaequalis.*

Curculio inaequalis. Oliv. Inſ. 83. fig. 164.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Roſtrum ſulcis tribus latioribus exaratum. Thorax inaequalis, canaliculatus, antice mucrone parvo, obtuſo, prominente. Elytra ſulcis ſubdentatis dentibusque duobus poſticis, majoribus, diſtinctis.

358. C. breviroſtris cylindricus fuſcus elytris apice acuminatis. *acuminatus*

Curculio acuminatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 139.

Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.

Statura longa, anguſta. Antennae fuſcae. Caput & thorax elytris anguſtiora, longiora, cylindrica, glabra, fuſca. Elytra ſtriata, fuſca terminantur poſtice in ſpinam porrectam, acutam. Pedes ferruginei.

359. C. breviroſtris fuſcus elytris acuminatis crenato ſtriatis, roſtro ſulcato. *capiſtratus*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Prof. Leſke.

Magnus. Roſtrum ſulcis plurimis exaratum, nigrum. Antennae piceae. Thorax punctis elevatis ſcaber. Elytra acuminata ſtriis plurimis, elevatis, valde crenatis exarata. Corpus & pedes nigra.

emeritus. 360. C. breviroſtris niger thorace elytrisque ſpinoſis, fronte excavata. Linn. Syſt. nat. 2. 617. 87. Muſ. Lud. Ulr. 35.
Habitat in Indiis.
Forte ad Brachyceros emendandus, mihi haud rite notus.

tuberculatus 361. C. breviroſtris ater thorace punctato, elytris ſtriatis tuberculatisque.
Habitat in India orientali Dom. Prof. Abildgard.
Antennae fractae, nigrae. Roſtrum cylindricum, ſcabrum, atrum. Thorax punctis plurimis impreſſis, ater, immaculatus. Elytra ſtriata tuberculis elevatis ſparſis 3. 3. 2. obliqne poſitis, atra maculis duabus marginalibus, cinereis. Pedes ſcabri, atri.

criſpatus. 362. C. breviroſtris thorace mutico ſcabro, elytris lineis tribus elevatis dentatis.
Curculio criſpatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 160.
Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.
Roſtrum ſulcatum. Thorax carinatus punctis magnis, elevatis ſcaber, ater. Elytra ſtriis tribus elevatis, dentatis & inter has lineolae punctorum elevatorum, nigrorum.

cultratus. 363. C. breviroſtris cinereus thorace tuberculis duobus compreſſis, elytris tuberculatis poſtice cinereis.
Curculio cultratus. Oliv. Inſ. 83. fig. 157.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Caput cinereum roſtro atro. Antennae fuſcae. Thorax ſcaber, niger margine antico cineraſcente. Antice tubercula duo approximata, elevata, compreſſa. Elytra crenato ſtriata tuberculis ſex vel ſeptem elevatis, ſparſis nigra, poſtice cinerea tuberculo nigro. Pedes griſei.

364. C. breviroſtris cinereus thorace ſcabro antice impreſſo, elytris ſpinoſis. *tribulus.*

Curculio tribulus. Oliv. Inſ. 83. fig. 161.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Caput fuſco cinereum. Thorax ſcaber, obſcure cinereus antice puncto majuſculo, impreſſo. Elytra connata ſpinis plurimis, erectis, acutis: poſticis duabus ad futuram majoribus.

365. C. breviroſtris cinereus thorace ſcabro, elytris ſpinoſis: ſpinis quatuor poſticis longioribus. *4 dens.*

Curculio 4 dens. Oliv. Inſ. 83. fig. 187.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.
Antennae cinereae articulo ultimo fuſco. Roſtrum cinereum dorſo canaliculato. Thorax punctis elevatis, obtuſiſſimis ſcaber. Elytra ſpinoſa: ſpinis quatuor poſticis longioribus. Pedes cinerei.

366. C. breviroſtris albidus elytris quadriſpinoſis, roſtro fuſco. *4 ſpinoſus.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei.
Roſtrum canaliculatum, fuſcum. Thorax rotundatus, albidus, immaculatus dorſo plano. Elytra albida ſpinis quatuor erectis, validis: ſolitaria verſus apicem. Pedes albi.

367. C. breviroſtris albicans thorace canaliculato, coleoptris ſpinoſis: lineolis tribus baſeos rubris. *clavus.*

Curculio Clavus. Oliv. Inſ. 83. fig. 168.
Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Caput cinereum roſtri dorſo canaliculato, rufeſcente. Elytra albida ſpinis plurimis nigris, duabus lateralibus baſeos & duabus dorſalibus apicis longioribus. Lineola brevis, lateralis, rubra & adhuc minor, communis in futura. Pedes albi.

noduloſus. 368. C. breviroſtris thorace lineis ſex noduloſis, elytris ſpinoſis.

Curculio noduloſus. Oliv. Inſ. 83. fig. 188.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Roſtri dorſum canaliculatum canali apice dilatato. Thorax griſeus lineis ſex e nodulis elevatis, atris, nitidis conſiſtentibus. Elytra griſea ſpinis plurimis, atris. Pedes cinerei.

rubifer. 369. C. breviroſtris cinereus thorace ſcabro, elytris ſpinis elevatis ſanguineis.

Curculio rubifer. Oliv. Inſ. 83. fig. 159.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Banks.

Statura & ſumma affinitas ſequentis at thorax magis canaliculatus & elytrorum ſpinae ſanguineae, nitidae.

globifer. 370. C. breviroſtris thorace ſcabro, elytris ſpinoſis poſtice acuminatis.

Curculio globifer. Oliv. Inſ. 83. fig. 135.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Muſ. Dom. Banks.

Roſtrum laeve, apice incraſſatum. Thorax rotundatus punctis plurimis, elevatis, obtuſis, atris. Elytra nigra ſpinis plurimis erectis, poſtice acuminata. Pedes nigri.

Variat rarius thorace utrinque uniſpinoſo.

pillularius. 371. C. breviroſtris thorace utrinque ſpinoſo noduloſo, elytris tuberculato ſtriatis apice acuminatis.

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Dom. Spengler.

Roſtrum planum. Thorax utrinque ſpinoſus, niger, globulis plurimis elevatis, glabris. Elytra nigra globulis itidem plurimis, elevatis, vix ſpinoſis, apice acuminata. Pedes nigri.

372. C. breviroſtris obſcurus thorace ſcabro, elytris lineis tribus elevatis ſpinoſis. *glandifer.*

Habitat ad Cap. Bon. ſpei Muſ. Dom. Lund.

C. rubifer duplo minor. Roſtri dorſum canaliculatum. Thorax punctis plurimis, elevatis, atris, nitidis. Elytra ſtriis tribus elevatis, acutis, ſubſpinoſis. Pedes obſcuri.

***** *Breviroſtres femoribus dentatis.*

373. C. breviroſtris femoribus dentatis, corpore viridi variegato. *ſpectabilis.*

Curculio ſpectabilis. Oliv. Inſ. 83. fig. 180.

Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Roſtrum nigro viridique varium. Antennarum clava ferruginea. Thorax elytraque reticulata, nigro viridique varia.

374. C. breviroſtris femoribus anticis dentatis gibbus nigricans thorace lineis, elytris ſtrigis duabus lineaque apicis flaveſcentibus. *pinguis.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Roſtrum cylindricum, nigrum. Thorax niger, viridi nitens lineis utrinque duabus apicem haud attingentibus, flavis. Elytra concolora, punctato ſtriata ſtrigis duabus obliquis lineolaque apicis flavis. Vitta praeterea flava a ſtriga anteriore ad apicem ducta, fere marginalis. Ad apicem elytrorum ſpina brevis, obtuſa. Pedes nigri femoribus anticis dentatis.

375. C. breviroſtris femoribus dentatis cinereus elytris dentibus tribus apiceque emarginatis. *tridens.*

Curculio tridens. Oliv. Inſ. 83. fig. 154.

Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.

Caput cinereum roſtro oculisque atris. Thorax rotundatus, inaequalis, cinereus. Elytra cinerea dentibus tribus dorſalibus, longitudinaliter poſitis, elevatis, craſſis, obtuſis. Elytra apice valde emarginata. Pedes cinerei femoribus ſpina parva armatis.

fuſcomaculatus. 376. C. breviroſtris femoribus ſubdentatis ater thorace elytrisque laevibus fuſco maculatis.

Habitat in Germania boreali.

Corpus magnum, laeve, glabrum, atrum thorace maculis lateralibus, elytris numeroſis fuſcis. Pedes nigri.

Liguſtici. 377. C. breviroſtris femoribus dentatis, corpore obſcuro. Linn. Syſt. nat. 2. 615. 68. Fn. Sv. 621. Paykull. Monogr. 80. 77.

Curculio Liguſtici. Oliv. Inſ. 83. fig. 77.

Degeer Inſ. 5. 218. 10.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 12.

Habitat in Liguſtico Leviſtico Europae.

Major obſcurus. Thorax ſcaber, cinereus.

Zebra. 378. C. breviroſtris femoribus dentatis niger elytris albo variis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Paullo minor C. nigrita. Antennae piceae. Roſtrum apice retuſum. Thorax ſcaber linea media, elevata, glabra niger lateribus albo ſubvariegatis. Elytra vix ſtriata, nigra, albo valde variegata ſutura tamen tota nigra. Pedes nigri femoribus acute dentatis.

2 *notatus.* 379. C. breviroſtris femoribus dentatis obſcurus elytris puncto poſtico cinereo.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo omnino C. Liguſtici at diſtinctus puncto parvo, diſtincto verſus api-

cem elytrorum. Corpus obſcure cinereo undatum. Aetate obſcurior evadit puncto elytrorum tamen ſemper albido.

380. C. breviroſtris femoribus dentatis griſeus elytris punctis obſcurioribus numeroſis ſubquadratis. Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 11. Payk. Monogr. 79. 76. *nubilus.*

Curculio teſſellatus. Bonsd. Diff. 38. 31.

Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

Antennae nigrae clava acuminata. Caput & thorax griſea, immaculata. Elytra punctis ſtriata punctisque plurimis vagis diſtinctis obſcurioribus. Femora poſtica annulo albo, obſoleto.

381. C. breviroſtris femoribus dentatis niger obſcurus thorace ſcabro, elytris crenato ſtriatis. *nigrita.*

Habitat in Italia.

Statura & magnitudo C. ſulcati, at elytra immaculata.

382. C. breviroſtris femoribus dentatis ater elytris ſtriatis ferrugineo maculatis. Paykull. Monogr. 81. 78. Bonsd. Curc. 40. 34. *ſulcatus.*

Habitat in Saxonia.

Major, totus ater. Elytra crenato ſtriata, teſtaceo maculata.

383. C. breviroſtris femoribus acute dentatis, antennis pedibusque rufis. *calcaratus.*

Habitat in Auſtria Schneider.

Corpus magnum, oblongum, nigrum, obſcurum elytris ſimpliciter ſtriatis. Antennae rufae clava obſcuriore. Pedes omnes rufi femoribus acute dentatis.

384. C. breviroſtris femoribus dentatis, elytris punctis viridibus. *gemmatu*

Curculio gemmatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 74.

Naturf. 6. tab. 4.
Habitat in Europae plantis.
Punctis viridibus laetis diſtinctus.

picipes. 385. C. breviroſtris femoribus dentatis griſeus elytris nebuloſis: punctis ſubocellatis ſtriatis. Paykull. Monogr. 100. Geoff. Inſ. 1. 281. 9.
Curculio notatus. Bonsd. Curc. Suec. 39. 33.
Habitat Kiloniae Dom. Lund.
Elytra punctis elevatis, albis, annulo impreſſo cinctis ſtriata.

Morio. 386. C. breviroſtris femoribus dentatis ater nitens elytris glabris, roſtro biſulcato. Paykull. Monogr. 99. 96.
Curculio Morio. Oliv. Inſ. 83. fig. 26.
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.
Magnus, totus ater, glaber, nitidus. Thorax immaculatus.

2 ſulcatus. 387. C. breviroſtris femoribus dentatis niger thorace elytrisque ſcabris, roſtro biſulcato.
Habitat in Italia Dr. Aillioni.
Roſtrum breve ſulcis duobus dorſalibus, impreſſum. Thorax ſupra niger lateribus ſubcineraſcentibus. Elytra ſcabra, nigra, margine antico & laterali in junioribus cineraſcentia.

collaris. 388. C. breviroſtris femoribus dentatis, thorace cinereo ſcabro, elytris nigris, roſtro carinato.
Habitat Kiliae.
Statura & magnitudo praecedentis. Roſtrum breve linea media elevata, nigra. Thorax cinereus, punctis nigris ſcaber. Elytra ſcabra, nigra. Pedes nigri.

Iris. 389. C. breviroſtris femoribus dentatis cinereus elytris teſſellatis.
Habitat Kiliae.

Affinis C. Pyri at totus cinereus elytris ſolis fuſco teſſellatis. Scutellum album. Pedes cinerei.
Variat duplo minor & ambae varietates femoribus dentatis & muticis.

390. C. breviroſtris femoribus dentatis viridiaeneus pedibus rufis. Linn. Syſt. nat. 2. 615. 72. Fn. Sv. 623. Geoff. Inſ. 1. 282. *Pyri.*
Curculio Pyri. Oliv. Inſ. 83. fig. 30.
Curculio aeruginoſus. Paykull. Monogr. 88. 85. Bonsd. Curcul. Suec.
Degeer Inſ. 5. 246. 34.
Sulz. Inſ. tab. 3. fig. 23.
Habitat in Pyro communi frequens.

391. C. breviroſtris femoribus dentatis niger coeruleo ſquamoſus antennis pedibusque nigris. *Alneti.*
Habitat in Germaniae Alno Dom. Smidt.
Statura & magnitudo praecedentis at paullo oblongior, totus ſquamis coeruleſcentibus tectus.

392. C. breviroſtris femoribus dentatis cinereo ſubvilloſus, ſcutello albo. *veſpertinus.*
Curculio ceruinus. Paykull. Monogr. 87. 84.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Corpus totum cinereo villoſum ſcutello ſolo niveo. Antennae pedesque fuſco cinereae, interdum rufae. Color ſupra ſaepe variat ſtriatus.

393. C. breviroſtris femoribus dentatis ſubpubeſcens fuſcus antennis pedibusque teſtaceis. Paykull. Monogr. 86. 83. *Mali.*
Curculio Padi. Bonsd. Curc. Sueciae 26. 11.
Habitat Lipſiae Dom. Prof. Leſke.

Statura & ſumma affinitas C. Pyri, at duplo fere minor. Corpus totum obſcurum, fuſcum antennis pedibusque teſtaceis.

pallidus. 394. C. breviroſtris femoribus dentatis ſquamoſo pallidus antennis tibiisque rufis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Forte mera varietas C. Mali at totus ſquamoſo pallidus. Elytra ſtriata. Antennae rufae. Pedes rufi femoribus nigris.

arboreti. 395. C. breviroſtris femoribus anticis dentatis viridi cinereus elytris punctato ſtriatis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae cinereae clava fuſca. Corpus totum cinereum, viridi paullo nitens. Elytra punctis majoribus ſtriata. Femora antica dentata, reliqua mutica.

dentifer. 396. C. breviroſtris femoribus dentatis cinereis, roſtro antice canaliculato, femoribus poſticis tridentatis.

Habitat in India orientali Dom. Prof. Abildgaard.

Statura & magnitudo omnino C. viridani. Corpus totum fuſco cinereum, vix maculatum. Roſtrum antice valde canaliculatum & fere bifidum, hirtum. Elytra ſubſtriata. Femora omnia acute dentata denteque femorum poſticorum poſtice bidentato.

curvicornis. 397. C. breviroſtris femoribus dentatis griſeus: lateribus albis, femoribus intermediis bidentatis.

Habitat in India orientali Prof. Abildgaard.

Statura praecedentis. Roſtrum canaliculatum, griſeum. Antennarum primus articulus longiſſimus, incurvus. Thorax griſeus linea dorſali lateribusque albis. Pedes griſei femo-

ribus dentatis: intermediis denticulis duobus, anteriori minori.

398. C. breviroſtris femoribus dentatis, corpore viridi argentato. Linn. Syſt. nat. 2. 615. 73. Paykull. Monogr. 89. 86. *argentatus.*
Curculio ſquamoſus viridi auratus. Geoff. Inſ. 1. 293. 38.
Curculio argentatus. Oliv. Inſ. 83. fig. 96.
Curculio Urticae. Degeer Inſ. 5. 219. 12.
Sulz. Inſ. tab. 4. fig. 9.
Habitat in Europae Betula, Urtica.

399. C. breviroſtris femoribus dentatis viridis ore antennisque nigris, oculis atris. *viridanus.*
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.
Statura & ſumma affinitas C. argentati. Corpus totum in junioribus laete viride, in adultioribus magis obſcurum. Os ſive apex roſtri antennaeque nigra. Oculi magni, atri.

400. C. breviroſtris femoribus dentatis, antennis elytris pedibusque ferrugineis. Linn. Syſt. nat. 2. 615. 21. Fn. Sv. 625. Paykull. Monogr. 90. 87. *oblongus.*
Curculio oblongus niger, elytris pedibusque teſtaceis. Geoff. Inſ. 1. 294. 39.
Curculio oblongus. Oliv. Inſ. 83. fig. 30.
Bonsd. Curcul. Suec. 25. 9.
Habitat in Europae plantis.

401. C. breviroſtris femoribus dentatis griſeus elytris ſtriis elevatis hiſpidis, antennis rufis. *muricatus.*
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Roſtrum breviſſimum, cinereum ore nigro. Antennae rufae clava cinerea. Thorax griſeus, immaculatus. Elytra griſea lineis plurimis, elevatis, hiſpidis. Pedes nigri tibiis piceis.

ovatus. 402. C. breviroſtris femoribus dentatis niger thorace ſcabro. Linn. Syſt. nat. 2. 615. 69. Fn. Sv. 626. Paykull. Monogr. 82. 79. Bonsd. Cnrc. 35. 25.

Curculio Roſae. Degeer Inſ. 5. 219. 11.

Habitat in Europae Roſis.

albolineatus 403. C. breviroſtris femoribus dentatis cinereus thorace elytrisque albolineatis, roſtro ſubtus atro.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura & magnitudo C. ovati. Antennae fuſcae. Roſtrum atrum dorſo carinato, cinereo. Thorax cinereus lineis quatuor albis. Elytra ſtriata, cinerea, vittis duabus latis, albis. Corpus cinereum. Femora acute dentata.

Picus. 404. C. breviroſtris femoribus dentatis niger elytris albo maculatis.

Habitat in Germaniae Betula Dom. Smidt.

Parvus. Antennae teſtaceae clava fuſca. Thorax rotundatus, niger linea laterali, alba. Elytra crenato ſtriata puncto uno alterove baſeos, tribus in medio, transverſim poſitis aliquotque apicis albis. Pedes nigri.

attelaboides 405. C. breviroſtris femoribus dentatis, roſtro elytrisque unituberculatis.

Curculio attelaboides. Oliv. Inſ. 83. fig. 174.

Habitat in Braſilia Muſ. Dom. Banks.

Roſtrum griſeum tuberculo magno, elevato, carinato. Frons canaliculatus, ſpina breviſſima utrinque armatus. Thorax ſcaber, griſeo fuſcoque varius, antice attenuatus. Elytra ſcabra, fuſco griſeoque varia, in medio ad ſuturam tuberculo magno, elevato, carinata. Pedes variegati femoribus clavatis, dentatis.

103. BRENTUS. *Os* roſtro porrecto, cylindrico.

Antennae moniliſormes ultra roſtri medium inſertae.

* *Femoribus ſimplicibus.*

1. B. cylindricus roſtro longiſſimo ſubtus barbato, elytris elongato clavatis. *barbicornis.*

Brentus barbicornis. Oliv. Inſ. 84. tab. 1. fig. 5. tab. 2. fig. 5.

Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.

Roſtrum corpore longius, cylindricum, apice vix incraſſatum, fuſcum, ſubtus pilis denſis barbatum. Antennae roſtro breviores verſus apicem roſtri inſertae. Oculi globoſi, atri. Thorax cylindricus, canaliculatus, niger pilis griſeis. Elytra abdomine longiora, ante apicem compreſſa, ideoque clavata, fornicata, punctato ſtriata, nigra maculis quatuor rufis, obſoletis. Pedes nigri pilis griſeis.

2. B. cylindricus roſtro apice glabro atro, elytris ferrugineo ſubfaſciatis. *aſſimilis.*

Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.

Brenti corpus elongatum, cylindricum, immarginatum, tardum, capite ovato, porrecto in roſtrum longiſſimum, cylindricum, oculis globoſis, prominulis, lateralibus, ad baſin capitis inſertis, antennis plerumque roſtro brevioribus, ante apicem roſtri inſertis, thorace ſubcylindrico, antice parum attenuato: dorſo canaliculato, ſcutello nullo, elytris rigidis, fornicatis, margine deflexo, abdomine longioribus, pedibus longiuſculis, brevibus, tarſis quadriarticulatis, colore nigro, obſcuro, flavo maculato.

Affinis certe praecedenti at duplo minor. Roſtrum corpore brevius, ad medium pilis griſeis hirtum, apice glabrum, atrum, nitidum, ſubtus laeve. Antennae piceae, apice fuſcae articulis undecim piloſis. Thorax cylindricus, canaliculatus, ater, pilis griſeis adſperſus. Elytra vix abdomine longiora, acuta, punctato ſtriata, nigra maculis quatuor rufis.

monilis. 3. B. cylindricus ater elytris acuminatis uniſtriatis.
Habitat in nova Hollandia.
Praecedentibus minor. Antennae moniliformes longitudine thoracis. Roſtrum inter oculos canaliculatum. Thorax canaliculatus, ater. Elytra acuminata, ad ſuturam uniſtriata, atra, immaculata. Pedes nigri femoribus clavatis, at inermibus.

brunneus. 4. B. oblongus brunneus elytris integris immaculatis.
Brentus brunneus. Oliv. Inſ. 84. tab. 1. fig. 3.
Habitat in Senegalia Muſ. Dom. Olivier.
Corpus reliquis minus & magis ovatum, totum brunneum. Antennae moniliformes. Roſtrum breve, cylindricum.

** *Femoribus dentatis.*

anchorago. 5. B. linearis femoribus dentatis, elytris flavo ſtriatis, roſtro antennis longiore.
Curculio Anchorago. Linn. Syſt. nat. 2. 613. 56. Muſ. Lud. Ulr. 52.
Curculio longicollis. Degeer Inſ. 5. 273. 8. tab. 25. fig. 28.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 4. fig. 6.
Brentus anchorago. Oliv. Inſ. 84. tab. 1. fig. 2.
Voet. Coleopt. 2. tab. 34. fig. I. H.
Gronoph. Zoophyl. 583. tab. 15. fig. 4.

Habitat in India orientali.

6. B. linearis femoribus dentatis, elytris flavo ſtriatis truncatis, roſtro antennis breviore. *volvulus.*

Brentus linearis. Oliv. Inſ. 84. tab. 1. fig. 4.

Habitat in Inſula Guadaloupe Dom. de Badier.

B. anchorago minor. Antennae moniliformes articulis valde prominulis, roſtro fere duplo longiores. Thorax elongatus, cylindricus, antice parum anguſtatus dorſo valde canaliculato. Elytra ſtriata lineolis tribus abbreviatis, flavis: intermedia duplicata. Ad marginem exteriorem praeterea duae minores. Apex haud elongatus, at truncatus. Pedes atri femoribus dentatis.

7. B. femoribus omnibus tibiisque anticis dentatis, thorace elongato aeneo, elytris acuminatis. *naſutus.*

Brentus naſutus. Oliv. Inſ. 84. tab. 2. fig. 7.

Habitat in Jamaica Inſula.

Paullo major B. anchorago. Antennae filiformes articulis cylindricis longitudine capitis. Caput viridi aeneum roſtro longiſſimo, apice depreſſo, craſſiori. Thorax elongatus, canaliculatus, viridi aeneus. Elytra plana, punctato ſtriata, nigra lineis, variis, abbreviatis, ferrugineis, apice valde acuminata. Pedes nigri femoribus omnibus tibiisque anticis dentatis.

8. B. femoribus dentatis linearis niger elytris rubro ſtriatis. *diſpar.*

Brentus diſpar. Oliv. Inſ. 84. tab. 1. fig. 1.

Curculio diſpar. Linn. Syſt. nat. 2. 613. 55. Muſ. Lud. Ulr. 50.

Curculio minutus. Drury Inſ. 1. tab. 42. fig. 3. 7.

Curculio anomiloceps. Pall. Inſ. tab. B. fig. 4.

Habitat in America Dom. Drury.

Thorax ovatus, ater, nitidus macula utrinque obſcure rufa, obſoleta. Elytra valde ſtriata, nigra maculis quatuor obſoletis.

cylindricornis. 9. B. femoribus dentatis, thorace rotundato nigro aeneo, elytris ferrugineis flavo ſubſtriatis.

Habitat in nova Zelandia.

Roſtrum obſcure ferrugineum. Antennae thorace duplo longiores, obſcure ferrugineae articulis cylindricis. Thorax rotundatus, nigro aeneus, nitidiſſimus, nullo modo canaliculatus. Elytra obtuſa, ſtriata, ferruginea lineolis numeroſis, flavis, quae ad baſin & apicem fere faſciam conſtituunt.

bifrons. 10. B. femoribus dentatis niger elytris ſtriatis: maculis glabris flavis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Sexus alter roſtro cylindrico, atro antennisque brevibus, moniliformibus. Thorax purpuraſcens lineis tribus atris. Sexus alter roſto porrecto, cylindrico, apice incraſſato maxillis prominulis, incurvis. Thorax canaliculatus, niger. Elytra ſtriata, nigricantia maculis aliquot glabris, flavis, poſtice truncata, acuminata.

104. COLYDIUM. *Palpi* quatuor clavati: articulo ultimo majori.
Labium membranaceum, emarginatum.
Antennae perfoliatae.

1. C. ferrugineum thorace ſulcato. *ſulcatum.*

Habitat in Germania ſub arborum corticibus.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor breves, clavati. Anteriores vix maxillae longiores, quadriarticulati: articulo ultimo ovato, majori, craſſiori adhaerentes maxillae dorſo. Poſteriores vix labio longiores, triarticulati: articulo ultimo, ovato, majori adnati labii medio. Mandibula cornea, craſſa, incurva, acuta, edentula. Maxilla membranacea, bifida: laciniis rotundatis. Labium porrectum, membranaceum, cordato emarginatum.

Thorax ſulcis duobus exaratus. Elytra laevia.

2. C. atrum pedibus ferrugineis. *elongatum.*

Boſtrichus elongatus. Mant. Inſ. 1. 36. 3.

Ips linearis. Oliv. Inſ. 2. 18. 53. tab. 2. fig. 17.

Colydii corpus parvum, cylindricum, elongatum, glabrum, immarginatum, tardum, capite ovato, plano, latitudine thoracis, inferto, oculis globoſis, lateralibus, vix prominulis, antennis brevibus diſtantibus, ſub oculis inſertis, thorace elongato, plano, dorſo canaliculato, ſcutello triangulari, elytris rigidis fornicatis, planis, longitudine elytrorum, pedibus brevibus, validis, compreſſis, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

Ips linearis. Roſſ. Fn. Etr. 50. 123. tab. 2. fig. 45.

Habitat in Europae ligno antiquo Dom. de Paykull.

Corpus medium, filiforme. Antennae breves, perfoliatae. Thorax glaber, ater, nitidus lineis tribus impreſſis: intermedia altiori. Elytra crenato ſtriata. Pedes ferruginei.

filiformis. 3. C. atrum elytris ſulcatis: baſi pedibusque ferrugineis.

Habitat Halae Saxonum in truncis Querci Dom. Hybner.

Summa affinitas praecedentis & forte mera ejus varietas. Differt inprimis elytris baſi ferrugineis.

frumentarium. 4. C. teſtaceum thorace crenato: dorſo carinato.

Anobium frumentarium. Mant. Inſ. 1. 39. 5.

Ips frumentaria fuſca thorace crenato: dorſo tricarinato. Oliv. Inſ. 2. 18. 10. 14. tab. 2. fig. 13.

Dermeſtes ſurinamenſis teſtaceus elytris ſtriatis, thorace ſtriis tribus elevatis marginibusque denticulato. Linn. Syſt. nat. 2. 562. 29.

Tenebrio ſurinamenſis alatus elongatus teſtaceo fuſcus, elytris ſtriatis, thorace ſtriis tribus elevatis marginibusque denticulato. Degeer Inſ. 5. 54. 5. tab. 13. fig. 12.

Habitat in Americae meridionalis farina diutius conſervata Muſ. Dom. Banks.

Elytra ſtriata.

Variat corpore fuſco.

105. MYCETOPHAGUS. *Palpi* quatuor inaequales. *Maxilla* membranacea, unidentata. *Labium* rotundatum, integrum. *Antennae* extrorſum craſſiores.

1. M. rufus thorace elytrisque nigris his maculis duabus rufis. *4 maculatus*

Ips 4 maculata. Mant. Inſ. 45. 8.

Dermeſtes niger coleoptris punctis rubris quaternis, elytris ſtriatis. Geoff. Inſ. 1. 106. 16.

Silphoides Boleti. Herbſt Arch. tab. 61. fig. X.

Habitat in Germaniae Boletis.

Antennae ferrugineae, ante apicem fuſcae. Elytra ſtriata, nigra macula baſeos aliaque ante apicem rufis. Corpus rufum.

2. M. niger ſubtus antennis pedibusque ferrugineis. *bicolor.*

Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dr. Pflug.

Mycetophagi corpus oblongum, glabrum, immarginatum, agile, capite parvo, rotundato, inferto, oculis globoſis, prominulis, lateralibus, antennis brevibus, diſtantibus, ſub oculis infertis, thorace transverſo, ovato, marginibus rotundatis, ſcutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, curſoriis, compreſſis, tarſis quinquearticulatis, colore plerumque nigro, rufo vario.

Media, oblonga, ſupra tota glabra, nigra, ſubtus ferruginea.

dermeſtoides 3. M. fuſcus abdomine pedibusque teſtaceis.
Habitat in Germaniae Boletis Dom. Smidt.
Statura & ſumma affinitas Dermeſtes bicoloris, at omnino hujus generis. Thorax & elytra vix ſtriata, fuſca, immaculata. Abdomen & pedes teſtacea.

atomarius. 4. M. niger elytris punctis faſciaque poſtica fulvis.
Ips atomaria. Mant. Inſ. 1. 46. 9. ♇
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Elytra ſtriata, nigra macula majori ad baſin, punctis quinque in medio, faſcia poſtica undata punctoque apicis fulvis. Pedes nigri.

multipunctatus. 5. M. rufus elytris ſubſtriatis: punctis rufis numeroſis. ♇
Habitat in Sueciae Boletis Dom. de Paykull.
Medius. Antennae & pedes picei. Caput & thorax nigra, immaculata. Elytra ſubſtriata punctis plurimis, diſtinctis, rufis.
Puncta elytrorum baſeos interdum connata in maculam majorem, lunatam.

picicornis. 6. M. ater elytris ſtriatis, antennis pedibusque piceis.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom. Smidt.
Medius. Antennae piceae. Caput & thorax laevia, atra, immaculata. Elytra ſtriata. Corpus atrum pedibus obſcure piceis.

ſanguinicollis. 7. M. ater thorace elytrorumque maculis duabus pedibusque rufis.
Ips ſanguinicollis. Mant. Inſ. 146. 10.
Silpha glabra. Act. Hall. 1. 255.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Media. Caput atrum antennis apice cineraſcentibus. Thorax glaber, rufus, nitidus, immacula-

tus. Elytra glabra, laevia, nigra maculis duabus rufis. Corpus nigrum. Pedes rufi.

8. M. niger thorace rufo, elytris ſtriatis: margine maculisque duabus flavis. ♀ *fulvicollis.*
Habitat in Germania Muſ. Dom. Lund.
Statura M. multipunctati. Pedes rufi.

9. M. piceus elytris ſtriatis nigris: baſi faſciaque poſtica ferrugineis. ♀ *piceus.*
Ips picea. Mant. Inſ. 1. 46. 11.
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.
Minor M. maculata. Caput nigricans ore antennisque piceis. Thorax utrinque puncto baſeos impreſſo. Caput & pedes picei.

10. M. piceus elytris ſubpunctatis nigris baſi ferrugineis. *punctatus.*
Habitat in Germaniae fungis Dom. Helwig.
Statura omnino M. picei at paullo minor. Thorax obſcure piceus.

11. M. flavus antennis nigris. *nigricornis.*
Ips nigricornis. Mant. Inſ. 1. 46. 12.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Antennae extrorſum craſſiores, nigrae. Corpus flaveſcens, immaculatum.

12. M. ater elytris ſtriatis antennis pedibusque caſtaneis. ♀ *caſtaneus.*
Habitat in Germania Dom. Helwig.
Parvus. Antennae caſtaneae. Caput & thorax atra, nitida, immaculata. Elytra ſtriata, caſtanea. Corpus atrum pedibus caſtaneis.

13. M. aeneus pedibus ferrugineis. *metallicus.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Antennae nigrae, baſi rufeſcentes. Corpus obſcure aeneum elytris ſubſtriatis. Pedes rufeſcentes.

14. M. teſtaceus immaculatus. *teſtaceus.*
Habitat in Germaniae Boletis Dom. Helwig.

Parvus, laevis, nitidus.

bifaſciatus. 15. M. niger elytris faſciis duabus punctoque apicis ferrugineis.

Ips bifaſciata. Mant. Inſ. 1. 47. 17.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Minutus. Corpus totum nigrum. Elytra concolora faſciis duabus punctoque apicis rufis. Pedes nigri.

106. HYPOPHLAEUS. *Palpi* quatuor aequales, clavati. *Labium* elongatum, membranaceum, integrum. *Antennae* extrorſum craſſiores, utrinque ſerratae.

caſtaneus. 1. H. laevis nitidus caſtaneus antennis nigris.

Hiſpa picipes antennis fuſiformibus atra elytris pedibusque piceis. Mant. Inſ. 1. 47. 8.

Ips taxicornis fuſco ferruginea, nitida, antennis perfoliatis. Oliv. Inſ. 2. 18. 11. 15. tab. 1. fig. 2.

Ips taxicornis. Roſſ. Fn. Etr. 49. 122. tab. 4. fig. 2.

Hypophlaei corpus elongatum, cylindricum, glabrum, immarginatum, agile, capite ovato, transverſo, inferto, oculis globoſis, prominulis, lateralibus, antennis brevibus, diſtantibus, ſub oculis inſertis, thorace elongato, planiuſculo, ſcutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, compreſſis, tarſis quinquearticulatis, colore vario.

Cemiterius. Herbſt Arch. tab. 21. fig. 6.
Habitat ſub Cortice Ulmi Dom. Helwig.
Os mandibulis palpisque. Palpi quatuor aequales, breves, clavati. Anteriores quadriarticulati: articulo ultimo ovato, craſſiori adnati labii inferioris medio exteriori. Mandibula brevis, craſſa, cornea, vix arcuata. Maxilla membranacea, medio unidentata, apice rotundata. Labium elongatum, filiforme, membranaceum, integrum.

2. H. laevis ater elytris antennis pedibusque teſtaceis. *linearis.*
Habitat ſub Pini ſylveſtris cortice Germaniae Dom. Prof. Helwig.
Praecedente minor. Antennae teſtaceae. Caput & thorax laevia, atra, nitida, immaculata. Elytra laevia, nitida, teſtacea. Corpus nigrum pedibus brevibus, teſtaceis.

3. H. laevis ater elytris teſtaceis: faſcia atra. *faſciatus.*
Habitat ſub cortice Quercus Germaniae Pr. Helwig.
Nimis praecedenti affinis. Differt tantum loco faſciaque elytrorum lata, atra.

4. H. laevis ferrugineus elytris ſubſtriatis. *depreſſus.*
Ips unicolor fuſco ferruginea, thorace laevi, antennis brevibus perfoliatis. Oliv. Inſ. 2. 18. 12. 16. tab. 2. fig. 8.
Melinus. Herbſt Arch. tab. 21. fig. B.
Habitat ſub cortice Quercus Germaniae D. Helwig.
Corpus parvum, depreſſum, totum ferrugineum.

5. H. oblongus rufus elytris teſtaceis apice atris. *bicolor.*
Ips bicolor. Oliv. Inſ. 2. 18. 12. 15. tab. 2. fig. 14.
Habitat in Gallia ſub arborum corticibus.
Statura omnino praecedentium. Caput & thorax laevia, glabra, rufa, nitida. Elytra teſtacea, po-

ſtice ultra medium atra. Abdomen teſtaceum, apice atrum. Pedes teſtacei.

bicornis. 6. H. oblongus rufus capite bicorni.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Parvus. Antennae omnino hujus generis. Caput cornubus duobus erectis, brevibus. Corpus ferrugineum, nitidum, immaculatum.

107. LYCTUS. *Palpi* quatuor breviſſimi, filiformes.
Maxilla brevis, membranacea, biſida.
Labium integrum.
Antennae clava ſolida.

Antennarum articulo unico craſſiori.

politus. 1. L. niger antennis pedibusque ferrugineis, thorace plano oblongo punctato.
Scarites clavicornis piceus, antennis clavatis. Mant. Inſ. 1. 207. 9.
Ips picipes. Oliv. Inſ. 2. 13. 77. tab. 2. fig. 12.
Tenebrio minutus alatus niger, thorace marginato antennis clavatis, pedibus piceis. Linn. Syſt. nat. 2. 1675. 12.
Habitat in Boletis arboreis Europae.
Varietatem duplo majorem e Saxonia miſit Dom. Hybner.

Lyſti corpus oblongum, depreſſiuſculum, glabrum, immarginatum, tardum, capite magno, ovato, plano, inferto, oculis parvis, lateralibus, vix prominulis, antennis brevibus, diſtantibus, ſub oculis *inſertis*, thorace ovato, planiuſculo, ſcutello minuto, elytris rigidis, fornicatus longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, compreſſis, tarſis quinquearticulatis, colore plerumque nigro.

Variat corpore toto ferrugineo.

2. L. brunneus pectore abdomineque nigricantibus, thorace oblongo plano. *depressus.*

Tenebrio brunnipes ater glaber nitidus, elytris striatis antennis pedibusque ferrugineis. Mant. Inf. 1. 212. 20.

Habitat Dresdae Dr. Heisse.

Parvus. Antennae clavatae, ferrugineae. Elytra striata, nitida, immaculata.

3. L. glaber ater elytris puncto ferrugineo. *2 pustulatus*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Parvus. Caput & thorax laevia, depressa, atra, immaculata. Elytra vix striata, atra puncto parvo, rufo ante apicem. Corpus nigrum pedibus ferrugineis.

4. L. niger thorace ovato plano utrinque dentato. *dentatus.*

Habitat in America meridionali Mus. D. Lund.

Statura omnino praecedentium. Antennae clavatae, brunneae. Caput & thorax ovatá, plana, nigra, nitida thoracis margine utrinque sex dentato. Elytra striata, picea. Pedes brunnei.

5. L. ferrugineus elytris laevibus testaceis. *brunneus.*

Habitat in Americae Insulis Dr. Pflug.

Praecedentibus minor & brevior. Antennae clavatae, brunneae. Caput & thorax laevia; glabra, brunnea, nitida. Elytra haud striata, testacea.

6. L. oblongus ferrugineus elytris punctato striatis. *terebrans.*

Ips terebrans fusco ferruginea, immaculata, elytris striatis crenatis. Oliv. Inf. 2. 18. 5. 4. tab. 1. fig. 7.

Habitat in Germania sub arborum corticibus Dom. Prof. Helwig.

Antennae crassae, moniliformes articulo ultimo crassiori. Thorax punctatus, planus margine parum reflexo.

Juglandis. 7. L. obſcurus elytris ſtriatis, antennis pedibusque teſtaceis.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Antennae teſtaceae. Caput & thorax fuſca, obſcura, immaculata. Elytra crenato ſtriata, fuſca baſi interdum tota, interdum puncto teſtacea.

hiſteroides. 8. L. ater nitidus antennis pedibusque piceis.
Habitat in Dania ſub arborum corticibus Dom. Lund.
Corpus parvum, oblongum, depreſſum. Antennae piceae clava ſolida. Elytra ſtriata, nigra. Corpus nigrum pedibus piceis.

** *Antennarum articulis duobus craſſioribus.*

crenatus. 9. L. niger thorace rugoſo, elytris ſtriato crenatis: maculis duabus rufis.
Ips crenata. Mant. Inſ. 1. 46. 15.
Ips crenata. Oliv. Inſ. 2. 18. 6. 6. tab. fig. 9.
Herbſt Arch. 4. tab. 20. fig. 20.
Habitat in Europa ſub arborum corticibus.
Variat rarius elytris totis rufis.

navalis. 10. L. ferrugineo fuſcus oculis atris.
Dermeſtes navalis elongatus ferrugineo fuſcus oculis atris. Mant. Inſ. 1. 35. 14.
Habitat in nova Zelandia Muſ. Dom. Banks.
Parvus, totus ferrugineo fuſcus elytris parum dilutioribus. Antennarum ultimi duo articuli craſſiores.

canaliculatus. 11. L. obſcurus thorace canaliculato, elytris ſtriatis brunneis.
Dermeſtes oblongus fuſcus, elytris ſtriatis. Geoff. Inſ. 1. 103. 9.
Ips oblonga. Oliv. Inſ. 2. 18. 7. 8. tab. fig. 5.
Habitat ſub arborum cortibus Dom. Lund.

Corpus medium, elongatum, cylindricum, mox teſtaceum, mox fuſcum. Antennae articulis duobus craſſioribus teſtaceae. Caput & thorax vix pubeſcentia, fuſca thoracis medio impreſſo, canaliculato. Elytra ſtriata, fuſca.

12. L. ater glaber nitidus antennis pedibusque ferrugineis. *nitidus.*

Habitat in Germania Dom. Helwig.

* Praecedente duplo major, cylindricus. Antennae ferrugineae. Caput, thorax, elytra atra, nitida, laevia, immaculata. Pedes breves, ferruginei.

13. L. oblongus ferrugineus elytris punctato ſtriatis: ſutura nigra. *contractus.*

Dermeſtes oblongus ferrugineus. Geoff. Inſ. 1. 103.
Ips contracta. Oliv. Inſ. 2. 18. 6. 5. tab. 2. fig. 10.
Habitat in Galliae arboribus ſub Cortice.

108. TRITOMA. *Palpi* anteriores ſecuriformes. *Labium* emarginatum. *Antennae* clava perfoliata.

1. T. atra elytris macula laterali coccinea. *2 puſtulata.*

Tritoma. Geoff. Inſ. 1. 335. 1. tab. 6. fig. 2.
Panz. Naturf. 24. 12. 17. tab. 1. fig. 17.
Habitat in Boletis arboreis Angliae capta d. 17 Aprilis ad Hamſtead.

Tritomae corpus ovatum, gibbum, glabrum, immarginatum, agile, capite parvo, ovato, inferto, oculis globoſis, prominulis, lateralibus, antennis brevibus, diſtantibus, ſub oculis inſertis, thorace gibbo, transverſo, ovato, ſcutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, gibbis, longitudine abdominis, apice deflexis, pedibus brevibus, compreſſis, tarſis quinquearticulatis, colore nigro rufoque nitido.

Corpus totum atrum, glabrum, nitidum. Thorax poſtice acuminatus. Elytra ſtriata baſi laterali macula magna coccinea, in qua punctum parvum fuſcum. Pedes nigri plantis pallidis.

glabra. 2. T. glabra atra antennis pedibusque piceis.
Habitat ſub arborum corticibus Sueciae Dom. de Paykull.
Caput & thorax glabra, atra, nitida. Elytra ſtriata, nitida, atra.

marginata. 3. T. atra abdominis margine ſanguineo.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis Dom. Smidt.
Paullo minor T. 2. puſtulata. Antennae piceae. Thorax ater margine antico ferrugineo. Elytra punctato ſtriata, atra. Abdomen atrum margine ſanguineo. Pedes picei.

ruſipes. 4. T. atra nitida capite thorace pedibusque rufis.
Habitat in Norwegiae, Germaniae fungis arboreis capt. d. 15 Jun. prope Swinſund.
Differt omnino ab I. ruſipes duplo fere minor & hujus generis. Caput & thorax rufa, nitida, immaculata. Elytra atra. Corpus nigrum pedibus rufis.

dubia. 5. T. nigra elytris pedibusque teſtaceis.
Habitat Kiliae Dom. Lund.
Parva forte cum ſequentibus proprii generis.
Caput & thorax cinereo ſubtomentoſa. Elytra poſtice acuta, teſtacea.

vittata. 6. T. rufa elytris nigris: vitta rufa.
Habitat in India Muſ. Dr. Hunter.
Caput obſcure rufum. Thorax glaber, obſcure rufus lateribus incraſſatis, flaveſcentibus. Elytra glabra, atra, nitida vitta lata rufeſcente, quae totam & baſin & apicem tegit. Pedes rufeſcentes.

7. T. atra holoſericea antennis pedibusque concoloribus. *morio.*
   Habitat Kiliae Dom. Daldorff.
   Statura T. dubiae. Corpus totum atrum, holoſericeum, immaculatum.
8. T. nigricans holoſericea pedibus teſtaceis. *ſericea.*
   Habitat in Germania.
   Statura omnino T. dubiae. Corpus totum pilis brevibus, cinereis holoſericeum. Antennae pedesque teſtacei.
9. T. nigra elytris pedibusque griſeis. *minuta.*
   Ciſtela minuta. Mant. Inſ. 1. 118. 13.
   Chryſomela minuta. Linn. Syſt. nat. 2. 593. 50. Fn. Sv. 533.
   Habitat in Europae aquoſis.
   Cum praecedentibus convenit, forte omnes proprii generis mihi haud rite notae.

109. TETRATOMA. *Palpi* quatuor craſſiuſculi, inaequales.
Maxilla membranacea, bifida.
Labium breviſſimum, rotundatum, integrum.
Antennae articulis quatuor ultimis clavato perfoliatis.

1. T. rufa capite elytrisque nigris. *Fungorum.*
   Habitat in Boletis arboreis Germaniae Dom. Daldorff.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, crassiusculi. Antici quadriarticulati: articulo ultimo crassiori, ovato, subtruncato adhaerentes maxillae basi, postici breviores, triarticulati: articulo ultimo ovato adnati labii medio. Mandibula brevis, crassa, cornea, apice acuta. Maxilla membranacea, bifida, apice rotundata. Labium brevissimum, membranaceum, rotundatum, integrum.

Statura omnino Tritoma rufipes. Antennae rufae articulis ultimis quatuor clavato perfoliatis, nigris. Caput atrum, nitidum. Thorax glaber, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, atra, nitida. Corpus rufum.

ancora. 2. T. capite thoraceque testaceis, coleoptris nigris: macula communi lobata alba.

Habitat in Germania Dom. Helwig.

Triplo praecedente minor. Antennae testacae articulis quatuor clavato perfoliatis, nigris. Caput & thorax testacea, immaculata. Coleoptra laevia, nigra, nitida puncto utrinque baseos futuraque in medio antice posticeque ramum emittente ideoque maculam lobatam formante, albis. Abdomen nigrum pedibus testaceis.

Tetratomae corpus oblongum, glabrum, immarginatum, tardum, capite ovato, inserto, oculis magnis, globosis, prominulis, lateralibus, antennis brevibus, distantibus, sub oculis insertis, thorace gibbo, transverso, scutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, apice deflexis, pedibus tenuibus, longiusculis, tarsis quinquearticulatis, colore nitido, atro.

110. SCAPHIDIUM- *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla bifida.
Labium corneum, rotundatum, integrum.
Antennae articulis quinque clavato perfoliatis.

1. S. atrum elytris truncatis: maculis duabus rufis. *4 maculatum.*

Scaphidum 4 maculatum. Oliv. Inf. 2. 20. tab. 1. fig. 1.

Habitat in Germaniae truncis putrefcentibus.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, filiformes. Anteriores longiores, quadriarticulati: articulo ultimo longiori, acuto adhaerentes maxillae dorfo, pofteriores triarticulati: articulis fubaequalibus; ultimo ovato, obtufo adnati labii medio. Mandibula brevis, craffa, cornea, fubarcuata, apice fiffa. Maxilla brevis, membranacea, bifida: laciniis fubaequalibus. La-

---

Scaphidii corpus ovatum, antice pofticeque acuminatum, glabrum, immarginatum, agile, capite parvo, acuto, inferto, oculis globofis, prominulis, lateralibus, antennis brevibus, diftantibus, fub oculis infertis, thorace transverfo, antice parum anguftato, fcutello minuto, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, abdomine acutiffimo brevioribus, pedibus longiufculis, teretibus, curforiis, tarfis quinquearticulatis, colore atro rufoque nitido.

bium breve, corneum, rotundatum, integrum. Antennae elongatae articulis quinque ultimis clavato perfoliatis. Corpus breve, atrum, nitidum elytris truncatis, abdomine paullo brevioribus maculis duabus transverſis, ſubſinuatis, rufis: poſteriori fere terminali. Abdomen acutum. Pedes atri.

4 puſtulatum. 2. S. atrum nitidum thoracis margine elytrorumque macula ſanguineis.

Sphaeridium 4 puſtulatum. Mant. Inſ. 1. 43. 11.

Scaphidium 4 puſtulatum. Oliv. Inſ. 2. 20. 4. 2. tab. 1. fig. 2.

Habitat in nova Hollandia Muſ. Dom. Banks.

Elytra truncata, atra macula magna rufa verſus baſin. Abdomen acutiſſimum. Pedes nigri.

agaricinum 3. S. atrum nitidum antennis pedibusque flavis.

Scaphidium agaricinum nigrum nitidum antennis pedibusque rufis. Oliv. Inſ. 2. 20. 5. 4. tab. 1. fig. 4.

Silpha agaricina ovata atra glaberrima hemiptera. Linn. Syſt. nat. 2. 670. 9.

Dermeſtes hemipterus ovatus niger villoſus antennis pedibusque fuſco teſtaceis, elytris abbreviatis. Panz. Naturf. 24. tab. 1. fig. 14.

Habitat in Europae Agaricis.

Statura omnino praecedentium at quadruplo minor. Corpus glabrum, atrum, immaculatum. Elytra truncata, abdomine breviora. Abdomen acutum.

111. IPS. *Palpi* quatuor aequales, breviſſimi: articulo ultimo ovato.
Maxilla bifida.
Labium membranaceum, conicum, emarginatum.
Antennae perfoliatae.

1. I. atra elytris faſciis duabus rufis: anteriore nigro maculata. *faſciata.*
Habitat in America boreali.
Magna, oblonga. Antennae perfoliatae, nigrae. Caput & thorax atra, nitida, immaculata. Coleoptra faſciis duabus dentatis, rufis, anteriore baſeos maculis tribus atris, intermedia majori, communi.

2. I. glabra atra elytris maculis duabus rufis. *grandis.*
Habitat in Africa aequinoctiali Muſ. Dom. Lee.
Magna in hoc genere. Caput & thorax atra, laevia, immaculata. Elytra laevia, atra maculis duabus rufis. Pedes atri.

3. I. atra elytris rufis: macula magna atra. 2 *punctata.*
Habitat in Europa auſtraliori Dom. Saldoner.
Magna. Corpus atrum elytris rufis macula magna atra. Anus rufus.

4. I. atra elytris macula baſeos rufa. 2 *puſtulata.*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Ips corpus oblongum, gibbum, glabrum, immarginatum, agile, capite ovato, planiuſculo, inferto, oculis globoſis, lateralibus, prominulis, antennis brevibus, diſtantibus, ſub oculis inſertis, thorace transverſo, ſubquadrato, ſcutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, tibiis compreſſis, tarſis quinquearticulatis, colore plerumque atro, nitido.

Antennae rufae. Corpus nigrum elytris macula magna baſeos rufa. Pedes rufi.

dorſalis. 5. I. pallida coleoptris macula media nigra.
Habitat in Europa auſtrali Dom. Vahl.
Paullo major I. 4 puſtulatae. Caput & thorax pallida, immaculata. Elytra ſtriata, pallida macula magna, communi, lunata, nigra.

4puſtulata. 6. I. nigra elytris punctis duobus ferrugineis. Naturf. 24. 12. tab. 1. fig. 18.
Silpha quadripuſtulata oblonga nigra, elytris punctis duobus ferrugineis. Linn. Syſt. nat. 2. 570. 5. Fn. Sv. 446.
Silpha nigra oblonga depreſſa, elytris ſingulis maculis duabus rubris. Degeer Inſ. 4. 185. 12. tab. 6. fig. 20. 21.
Nitidula quadripuſtulata. Oliv. Inſ. 2. 12. 8. 9. tab. 3. fig. 22.
Habitat in Europa boreali.
Palpi quatuor breves, aequales, filiformes: articulo ultimo ovato. Anteriores quadriarticulati adhaerentes maxillae dorſo. Poſteriores triarticulati adnati ante labii apicem. Mandibula brevis, cornea, arcuata, acuta. Maxilla longitudine palporum membranacea, apice rotundata, bifida: laciniis aequalibus. Labium breve, membranaceum, rotundatum, emarginatum. Antennae articulis tribus ultimis, clavato perfoliatis. Larva oblonga, hirſuta, griſea.

6puſtulata. 7. I. nigra elytris ſtriatis: maculis tribus rufis.
Habitat in Europa boreali Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Statura & magnitudo praecedentis. Caput nigrum antennis piceis. Thorax niger margine ferrugineo. Elytra ſtriata, nigra maculis tribus rufis, prima baſeos ſinuata, ſecunda in medio renifor-

mi, tertia ante apicem minori, orbiculata. Corpus ſubtus rufum.

8. I. atra nitida elytris maculis duabus albis: anteriore ſinuata. *4 guttata.*
Nitidula 4 guttata. Oliv. Inſ. 2. 12. 10. 11. tab. 3. fig. 25.
Habitat in Europa.
Macula elytrorum baſeos ſinuata, medii orbiculata.

9. I. ferruginea elytris teſtaceis. *ferruginea.*
Habitat in Germania Muſ. Dom. de Loewenſkiold.
Statura & magnitudo I. 4puſtulatae. Antennae ferrugineae articulis tribus majoribus, perfoliatis: ultimo ovato, majori. Caput & thorax glabra, laevia, ferruginea, immaculata. Elytra vix ſtriata, pallidiora. Pedes ferruginei.

10. I. rufa antennis elytris pectoreque nigris. *nigripennis.*
Silpha ruſſica. Mant. Inſ. 1. 48. 6. Linn. Syſt. nat. 2. 570. 10. Fn. Sv. 449.
Anthribus ruber. Degeer Inſ. 5. 28. 30. tab. 8. fig. 12.
Erotylus ruſſicus. Oliv. Inſ. 89. tab. 1. fig. 1.
Herbſt Arch. tab. 43. fig. 9.
Habitat in Germaniae arboribus Dom. Smidt.

11. I. rufa elytris nigris apice rufis. *hemorrhoidalis.*
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Statura omnino praecedentis at corpus totum rufum elytris ſolis nigris apice rufis.
Mas cornubus duobus erectis capitis Dom. Schneider.
An Hiſpa cornigera antennis ſerratis, thorace rufo, elytris coeruleis, capite bicorni. Mantiſſ. Inſ. 1. 47. 5.

rufipes. 12. I. atra capite thorace pedibusque ferrugineis.
Habitat in Norwegiae fungis.
Vix differt ab I. nigripenni at abdomen totum nigrum.

aenea. 13. I. coccinea elytris aeneis immaculatis.
Silpha aenea. Act. Hall. 1. 254.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Corpus medium, totum coccineum, immaculatum. Antennae nigrae. Elytra laevia, aenea, nitida, immaculata.

humeralis. 14. I. nigra capite thorace elytrorum puncto baseos pedibusque rufis.
Dermestes 2 pustulatus. Thunb. nov. sp.
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Medius. Caput cum antennis rufum, obscurum. Thorax laevis, rufus, nitidus. Elytra nigra, nitida puncto baseos rufo. Corpus nigrum pedibus rufis.

lunata. 15. I. nigra elytris puncto baseos lunulaque postica ferrugineis.
Habitat Kiliae Holsatorum.
Corpus parvum. Antennae perfoliatae, nigrae. Thorax niger margine parum ferrugineo. Elytra glabra, nigra puncto parvo baseos lunulaque versus apicem ferrugineis. Pedes ferruginei.

rufifrons. 16. I. atra fronte maculis duabus elytrorum pedibusque ferrugineis.
Tritoma rufifrons. Syst. Ent. 69. 5.
Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.
Parva. Antennae nigrae clava perfoliata, rufa. Caput nigrum fronte ferruginea. Thorax laevis, ater, immaculatus. Elytra laevia, nigra punctis duobus ferrugineis, altero ad basin, altero ad apicem.

112. UPIS. *Palpi* quatuor inaequales, clavati.
Maxilla unidentata.
Labium breve, membranaceum, emarginatum.
Antennae extrorsum craſſiores.

1. Upis. *ceramboides*

Spondylis ceramboides atra elytris rugoſis thorace latioribus. Mant. Inſ. 1. 127. 2.

Attelabus ceramboides. Linn. Syſt. nat. 2. 621. 12. Fn. Sv. 643.

Curculio maximus. Udm. Diſſ. 26. tab. 1. fig. 1.

Tenebrio varioloſus. Degeer Inſ. 5. 32. 2. tab. 2. fig. 1.

Panz. Naturf. 24. 24. 33. tab. 1. fig. 33.

Habitat in Boleto fomentario Sueciae.

E novis obſervationibus monente Domino Helwigio, Germaniae Entomologo oculatiſſimo genus hoc conſtitui omnino diſtinctum. Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, clavati. Anteriores longiores, quadriarticulati: articulis obconicis; ſecundo longiori, ultimo craſſiori, obtuſo, truncato, adhaerentes maxillae dorſo. Poſtici breviſſimi triarticulati: articulo ultimo craſſiori, truncato, obtuſo adnati labii medio. Mandibula brevis, craſſa, cornea, acuta, edentula. Maxilla membranacea, brevis, in medio unidentata. Labium breviſſimum, membranaceum, apice obtuſum, emarginatum. Antennae ſubmoniliformes, extrorſum craſſiores.

Corpus nigrum elytris rugoſis tarſisque anticis quinquearticulatis, poſticis quadriarticulatis.

113. DIAPERIS. *Palpi* quatuor ſubfiliformes.

Maxilla bifida.

Labium cylindricum, apice palpigerum.

Antennae ſecundum totam longitudinem perfoliatae: foliolis compreſſis; ultimo ovato.

Boleti. 1. D. nigra elytris faſciis tribus flavis repandis.

Diaperis. Geoff. Inſ. 1. 337. 1. tab. 6. fig. 3.

Chryſomela Boleti. Mant. Inſ. 1. 69. 34.

Chryſomela Boleti. Linn. Syſt. nat. 2. 591. 36. Fn. Sv. 52. 7.

Tenebrio Boleti alatus ovatus gibbus niger, elytris faſciis tribus transverſis undatis fulvis. Degeer Inſ. 5. 49. 9. tab. 3. fig. 3.

Diaperis Schaeff. Elem. tab. 58. Icon. tab. 77. fig. 6.

Habitat in Boletis arborum Europae.

Cs maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, ſubfiliformes. Anteriores parum longiores, quadriarticulati: articulis brevibus, ſubgloboſis; ultimo majori, ovato adhaerentes maxillae dorſo.

Diaperis corpus ovatum, gibbum, glabrum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotundato, deflexo, inſerto, oculis globoſis, prominulis, lateralibus, antennis brevibus, diſtantibus, ſub oculis inſertis, thorace transverſo margine rotundato, ſubreflexo, ſcutello minuto, triangulo, elytris rigidis, fornicatis, apice deflexis longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, tarſis anticis quinque, poſticis quadriarticulatis, colore vario, nitido.

Posteriores breviores, triarticulati: articulo ultimo ovato, crassiori adnati labii apice. Mandibula brevis, cornea, acuta, apice fissa: lacinia interiori breviori. Maxilla fere longitudine palpi anterioris, membranacea, bifida, lacinia exteriori majori, rotundata, interiori minori, acuta. Labium porrectum, corneum, cylindricum, apice palpigerum. Antennae secundum longitudinem persoliatae: foliolis compressis, articulo secundo globoso, ultimo ovato. Variat junior nuper excluſa capite thoraceque pallide ferrugineis, elytrisque flavescentibus absque fasciis Dom. Daldorf.

2. D. nigro cyanea antennis apice ferrugineis. *violacea.*
Habitat in Germaniae Boletis Dom. Helwig.
Antennae omnino hujus generis nigrae: articulo ultimo ferrugineo. Corpus totum cyaneo nigrum plantis solis ferrugineis. Elytra punctato striata. Magnitudo D. Boleti at minus gibba.

114. MELOE. *Palpi* quatuor subfiliformes.
Maxilla recta, bifida.
Labium corneum, emarginatum.
Antennae moniliformes.

1. M. corpore violaceo. Linn. Syst. nat. 2. 679. 1. *proscarabaeus.*
Fn. Sv. 826.
Geoff. Inf. 377.
Frisch. Inf. 6. tab. 6. fig. 5.
Oliv. Inf. 45. tab. 1. fig. 1.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 5.
Degeer Inf. 5. 3. 1. tab. 1. fig. 1.
Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 54.

Habitat in Europae campis apricis, arenoſis.
Animalculum molle, tardum, oleum limpidiſſimum, flavicans e poris praeſertim pedum geniculis ex ſudat. Mas faemina triplominor. Ova ſuaveolentia. Liſter.

majalis. 2. M. ſegmentis dorſalibus abdominis rubris. Linn. Syſt. nat. 2. 679. 2.
Friſh Inſ. 6. tab. 6. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 6.
Habitat in Europa auſtrali.
Praecedenti affinis cujus varietatem credit Friſh.

marginata. 3. M. nigra thoracis elytrorumque margine ferrugineo. Oliv. Inſ. 45. tab. 1. fig. 3.
Meloe Hungarus Schrank Beytr. 71. 19.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Paullo minor M. proſcarabaeo. Elytra abbreviata, laevia, coriacea, nigra margine exteriori ferrugineo. Abdomen & pedes nigra, obſcure nitida.

punctata. 4. M. atra thorace elytrisque varioloſo punctatis.
Meloe Tuccia. Roſſ. Fn. Etr. 1. 238. 591. tab 4. fig. 5.
Meloe Uralenſis. Pall. Iter. 2. 722. 56.
Habitat in Anglia Muſ. Britann.
Statura omnino M. proſcarabaei, vix tamen mera varietas. Differt colore magis atro corporeque ſupra punctis impreſſis, cicatriſantibus.

Meloe corpus oblongum, molle, glabrum, immarginatum, tardum, capite magno, ovato, exſerto, oculis oblongis, lateralibus, haud prominulis, antennis mediocribus, inter oculos infertis, thorace elevato, quadrato, ſcutello vix ullo, elytris coriaceis, mollibus, abdomine brevioribus, alis nullis, pedibus elongatis, compreſſis, tarſis anticis quinque poſticis quadriarticulatis, colore nigro, obſcuro.

115. STAPHYLINUS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla unidentata.
Labium membranaceum, trifidum.
Antennae moniliformes.

1. St. capite thorace elytrisque villoso aureis, abdomine nigro: fasciis cinereis. *aureus.*
Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.
Antennae nigrae: articulo ultimo ovato, testaceo. Caput magnum, villosum, ferrugineo aureum. Clypeus porrectus, rotundatus, dilatatus, integer. Thorax & elytra villosa, ferrugineo aurea. Pectus villoso aureum. Abdomen atrum fasciis duabus latis, villoso cinereis, nigro punctatis. Pedes subtestacei femoribus nigris.

2. St. hirsutus niger thorace abdomineque postice flavis. Linn. Syst. nat. 2. 683. 1. Fn. Sv. 839. *hirtus.*
Geoff. Inf. 1. 362. 7.
Payk. Monogr. 8. 1.
Schaeff. Monogr. 1754. tab. 2. fig. 12.
Icon. tab. 36. fig. 6.
Degeer Inf. 4. 20. 5.

Staphylini corpus elongatum, glabrum, immarginatum, agile, capite magno, ovato, exserto, oculis globosis, lateralibus, vix prominulis, antennis brevibus, approximatis in articulatione labii superioris insertis, thorace plano, postice rotundato, marginibus deflexis, scutello majusculo, triangulari, elytris dimidiatis, rigidis, margine deflexo, alas tegentibus, pedibus validis, tarsis quinquearticulatis, colore vario.

Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 7. fig. 16.
Habitat in Europae locis arenoſis.

nebuloſus. 3. St. pubeſcens cinereus nigro nebuloſus abdomine nigro, tibiis teſtaceis.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Affinis certe St. murino at major. Antennae nigrae articulo primo ferrugineo. Caput, thorax, elytra cinerea, nigro nebuloſa. Corpus nigrum, immaculatum. Pedes nigri femoribus apice tibiisque teſtaceis.

murinus. 4. St. pubeſcens cinereus nigro nebuloſus abdomine atro, pedibus nigris. Linn. Syſt. nat. 2. 683. 2. Fn. Sv. 840.
Paykull. Monogr. 14. 8.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 11.
Degeer Inſ. 4. 12. 1. tab. 1. fig. 1.
Habitat in Cadaveribus, Fimo.
Elytra ſubtus coerulea, nitida.
Larva hexapoda, nuda, pallida, capite abdominisque ſegmentis tribus anterioribus brunneis, cauda ſetis duabus articulatis ſubtus tuberculo pediformi cylindrico. Strom. Act. Hafn. 1.

pubeſcens. 5. St. pubeſcens cinereus nebuloſus abdomine ſubtus villoſo argenteo.
Staphylinus pubeſcens. Paykull. Monogr. 16. 9.
Geoff. Inſ. 1. 303. 8.
Degeer Inſ. 4. 17. 2.
Habitat in Suecia Dom. Com. de Souza.
Statura & magnitudo omnino St. murini ejusdemque coloris. Caput griſeum, villoſum ſtriga antica flaveſcente. Antennae nigrae. Abdomen ſubtus totum pube argentea tectum. Pedes nigri femoribus apice ferrugineis.

olens. 6. S. niger opacus immaculatus capite thorace latiore.

Staphylinus olens. Paykull. Monogr. 9. 4.
Geoff. Inf. 1. 360. 1. tab. 7. fig. 1.
Myl. Zool. Dan. 97. 1090.
Degeer Inf. 4. 22. 3.
Habitat in Europae cadaveribus.

7. St. ater nitidus elytris obſcuris, capite thorace latiore. *ſimilis.*
Staphylinus ſimilis. Paykull. Monogr. 10. 5.
Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 12.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura omnino praecedentis at minor. Caput & thorax punctata, atra, nitida, immaculata linea dorſali elevata. Elytra breviſſima, nigra, obſcura. Corpus cum pedibus nigrum.

8. St. ater nitidus elytris piceis. *picipennis.*
Habitat in Germania Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Statura omnino St. ſimilis at caput & thorax atra, laeviſſima, nitida. Caput minus latum & elytra picea, obſcura, minime nitida.

9. St. pubeſcens niger faſciis cinereis. Linn. Syſt. nat. 2. 683. 3. Fn. Sv. 841. Paykull. Monogr. 5. 2. *maxilloſus.*
Geoff. Inf. 1. 360. 1. tab. 7. fig. 1.
Schaeff. Icon. tab. 20. fig. 1.
Degeer Inf. 4. 18. 4. tab. 1. fig. 7. 8.
Habitat in Europae ſylvis victitans rapina. Adultior totus glaber & niger evadit.

10. St. ater nitidus capite utrinque macula fulva. *oculatus.*
Habitat in nova Hollandia, Zelandia Muſ. Dom. Banks.
Totus ater, glaber, nitens capite utrinque macula magna fulva, quae ſubtus faſciam conſtituit.

11. St. ater opacus thorace elytrisque coeruleſcentibus, Geoff. Inf. 1. 361. 21. *cyaneus.*

Staphylinus cyaneus. Payk. Monogr. 13. 7.
Habitat in Italia Dr. Allioni.
Statura & magnitudo St. maxillosi. Caput thorace latius & thorax laevia, coeruleſcentia. Corpus atrum.

dilatatus. 12. St. thorace marginato atro nitidulo, elytris fuſcis, antennis ſerratis.
Habitat Halae Saxonum Prof. Leſke.
Antennae valde ſerratae, piloſae, nigrae. Caput laeve, atrum mandibulis forcipatis. Thorax lateribus poſticeque valde dilatatus, ater margine inprimis variis coloribus nitidulo. Elytra fuſca. Abdomen atrum. Pedes nigri tarſis anticis brevibus, dilatato piloſis.

fulgens. 13. St. cyaneus nitidus antennis apice nigris.
Habitat Cajennae Muſ. Dom. Boſc.
Magnus at tenuis. Caput magnum, ovatum, coeruleum, magis obſcurum. Antennae primo articulo longiſſimo, cyaneo, ultimis brevibus, nigris. Thorax antice anguſtatus. Elytra corpusque cyanea, nitidiſſima. Pedes cyanei.

erythropterus. 14. St. ater elytris antennarum baſi pedibusque rufis. Linn. Syſt. nat. 2. 683, 4. Fn. Sv. 842. Paykull. Monogr. 7. 3.
Geoff. Inſ. 1. 364. 9.
Friſh. Inſ. 5. 49. tab. 29.
Degeer Inſ. 4. 21. 6.
Stroem. Act. nidroſ. 3. 404. tab. 3. fig. 8.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 2.
Habitat ſaepius in ſimo.
Variat paullo minor ſcutello aureo villoſo.

aeneocephalus. 15. St. niger aeneo nitidus elytris pedibusque teſtaceis, antennis fuſcis. Paykull. Mongr. 11. 6.
Degeer Inſ. 4. 22. 8.
Habitat in Germania Dom. Smidt.

Nimis certe praecedenti affinis & forte mera ejus varietas. Corpus minus. Antennae fuscae. Caput & thorax nigra, aeneo nitida. Scutellum nigrum. Elytra testacea. Corpus nigrum pedibus rufis.

16. St. niger capite thoraceque obscure piceis, elytris aureis, tarsis anticis dilatatis. *fossor.*
Habitat in Germania Mus. Dom. de Seheſtedt.
Paullo minor St. erythrocephalo. Caput obscurum antennis nigris. Thorax villosus, obscure piceus linea media baseos paullo elevata. Elytra aurea. Corpus atrum maculis aliquot dorsalibus, aureis. Pedes ferruginei femoribus nigris. Tarsi antici breves, dilatati.

17. St. ater capite rufo, elytris violaceis. *erythrocephalus.*
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.
Antennae nigrae. Caput magnum, rufum ore punctoque frontali nigris. Thorax glaber, ater, nitidus margine antico in medio rufo. Scutellum atrum, Elytra cyanea. Abdomen & pedes atra.

18. St. pilosus niger abdomine fusco, elytris scabris. *pilosus.*
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.
Corpus parvum, breve, crassum. Caput & thorax pilosa, nigra, cyaneo nitida antennis fuscis. Elytra punctis elevatis scabra, nigra. Pedes compressi, fusci.

19. St. capite thoraceque laevissimis atris, elytris aeneis nitidulis, capite thorace latiore. *splendens.*
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Paullo major St. polito, cui valde affinis. Differt tamen capite multo latiore, thorace nullo modo punctato elytrisque aeneo colore nitidulis. Corpus atrum.

politus. 20. St. niger thorace elytrisque nitidis, thorace lineis punctorum impreſſorum. Linn. Syſt. nat. 2. 683. 5. Fn. Sv. 843. Paykull. Monogr. 42. 31.
Geoff. Inſ. 1. 361. 3.
Degeer Inſ. 4. 22. 7.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 12.
Habitat in Europae cadaveribus.
Odorem ſpargit ambroſiacum.

triſtis. 21. St. niger thorace obſcure aeneo, elytris pubeſcentibus obſcurioribus.
Habitat in Dania Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Paullo major St. polito. Antennarum articulus primus apice ferrugineus. Caput laeve, atrum. Thorax laevis, nigro aeneus, nitidulus. Elytra pubeſcentia, obſcuriora. Corpus nigrum.

varians. 22. St. ater nitidus punctatus alis albis.
Staphylinus varians. Payk. Monogr. 45. 33.
Habitat in Selandia Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Minor St. polito. Antennae nigrae articulorum apicibus parum palleſcentibus. Caput thorace anguſtius, punctatum, atrum, nitidum. Thorax rotundatus, punctatus, ater, nitidus. Elytra laevia, obſcuriora, rarius picea. Alae albae. Corpus nigrum.

brunnipes. 23. St. niger pedibus antennarum baſi apiceque ferrugineis.
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.
Antennae nigrae articulo primo & ultimis duobus ferrugineis. Caput & thorax atra, nitida oculis albis. Elytra & abdomen atra at obſcuriora. Pedes rufi.

nitidus. 24. St. ater nitidus elytris teſtaceis. Paykull. Monogr. 40. 30.
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Nimis affinis St. polito. Corpus totum atrum, nitidum elytris ſolis teſtaceis.

25. St. ater nitidus elytris plantisque teſtaceis, ano ſubferrugineo. *fulgidus.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo omnino St. politi. Caput atrum antennis nigris. Thorax ater, nitidus. Elytra teſtacea. Abdominis ſegmenta tenuiſſime anusque teſtacea. Pedes nigri plantis teſtaceis.

26. St. nigricans thorace marginato, elytris crenato ſtriatis. *crenatus.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo ſequentis. Antennae ferrugineae. Thorax mox ferrugineus, mox nigricans margine prominulo, pallidiore. Elytra ferruginea, crenato ſtriata. Corpus mox obſcure ferrugineum, mox nigricans pedibus ruſis.

27. St. niger thorace canaliculato, elytris ſtriatis. *ſtriatulus.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo St. ſulgidi. Caput nigrum, nitidum antennis fuſcis. Thorax canaliculatus ſive linea media impreſſa. Elytra ſtriata. Corpus nigrum pedibus piceis.

28. St. niger thorace marginato, elytris teſtaceis. *ſtrumoſus.*

Habitat Halae Dom. Hybner.

Medius. Antennarum ultimus articulus acutus. Caput nigrum. Thorax canaliculatus lateribus valde marginatis, fuſcus. Elytra laevia, teſtacea. Corpus fuſcum.

29. St. ater nitidus elytris cyaneis. *cyanipennis.*

Habitat Pariſiis Muſ. Dom. Boſc.

Statura omnino St. marginati. Caput ovatum, thorace anguſtius, atrum, nitidum. Thorax ater, nitidus lineis duabus punctorum impreſſorum. Elytra laevia, nitida, cyanea. Corpus atrum.

marginatus 30. St. ater thoracis lateribus pedibusque flavis.
Paykull. Monogr. 44. 32.
Act. Nidrof. 4. 3321. 33.
Habitat in Anglia, in Norwegia.
Paullo minor St. polito, totus ater, glaber, nitens, at thoracis latera & pedes omnes flavescentes.

fulvipes. 31. St. ater nitidus elytris pedibusque testaceis, thorace ovato.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura & magnitudo St. marginati. Antennae nigrae, basi testaceae. Caput & thorax laevia, atra, nitida. Scutellum nigrum. Elytra testacea. Corpus nigrum pedibus testaceis.

flavescens. 32. St. ater pedibus rufis, elytrorum margine flavo.
Linn. Syst. nat. 2. 684. 9. 830.
Habitat in Europa.
Statura praecedentium.

alpinus. 33. St. ater antennarum basi elytris pedibusque lividis.
Habitat in Betula & Salice in summis alpibus Lapponiae Dom. de Paykull.
Reliquis magis depressus. Antennae nigrae, basi pallidae. Caput & thorax atra. Elytra livida. Abdomen atrum. Pedes lividi.

2 *pustulatus* 34. St. niger elytris puncto postico ferrugineo. Linn. Syst. nat. 2. 685. 16. Fn. Sv. 847.
Habitat in Europa.

analis. 35. St. ater nitidus antennis elytris ano pedibusque testaceis. Paykull. Monogr. 47. 34.
Habitat Kiliae Dom. Daldorff.
Praecedente major. Caput & thorax atra, nitida. Elytra laevia, nitida, testacea. Abdomen atrum segmentorum marginibus anoque testaceis. Antennae & pedes testacei.

36. St. niger elytris puncto albido, oculis prominulis. Linn. Syſt. nat. 2. 685. 15. Fn. Sv. 851. — *guttatus.*
Staphylinus Juno. Paykull. Monogr. 33. β.
Staphylinus Juno. Geoff. Inſ. 1. 371. 24. β.
Habitat ad littora maris baltici.
Varietas ſequentis teſte D. de Paykull.

37. St. niger immaculatus thorace rotundato laevi, antennis extrorſum craſſioribus. — *clavicornis.*
Staphylinus Juno. Payk. Monogr. 33. α.
Staphylinus Juno. Geoff. Inſ. 1. 371. 24. α.
Habitat Kiliae Dom. Lund.
Nimis certe praecedenti affinis & forte mera varietas. Variat pedibus fuſcis & flaveſcentibus.

38. St. ater thorace ſubrotundo, elytris pedibusque piceis. Linn. Syſt. nat. 2. 685. 23. Fn. Sv. 857. — *fuſcipes.*
Habitat in Europa.
Parvus & brevis, craſſus, ater, nitidus. Elytra picea margine parum nigro.

39. St. niger elytris antennis pedibusque ferrugineis. Linn. Syſt. nat. 2. 685. Fn. Sv. 856. — *flavipes.*
Habitat in Selandia Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Parvus & diſtinctus elytris pedibusque totis ferrugineis.

40. St. thorace rufo, elytris fuſcis: puncto baſeos margineque poſtico albis. Paykull. Monogr. 49. 35. — *atricapillus*
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.
Parvus. Antennae apice fuſcae ultimo articulo ferrugineo. Caput atrum, nitidum. Thorax glaber, rufus. Abdomen ferrugineum, apice fuſcum.

anguſtatus. 41. St. filiformis ater elytris apice pedibusque teſtaceis. Paykull. Monogr. 36. 27.
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Parvus, omnino filiformis. Caput magnum, ovatum, nigrum, antennis teſtaceis. Thorax rotundatus, ater. Elytra ſubteſtacea, baſi nigra. Abdomen nigrum. Pedes teſtacei.

canaliculatus. 42. St. flavus capite abdominisque cingulo atris, thorace canaliculato. Paykull. Monogr. 31. 23.
Habitat Kiliae Dom. Daldorff.
Caput atrum antennis baſi flavis. Thorax gibbus, canaliculatus. Abdomen planum ante apicem cingulo atro. Pedes flavi.

tenuis. 43. St. ater nitidus thorace elytrorumque apicibus rufis.
Habitat in Germania Dom. de Paykull.
Statura parva praecedentium. Caput atrum, nitidum, thorace anguſtius. Thorax rufus, nitidus, immaculatus. Elytra nigra apice rufa. Corpus nigrum pedibus rufis.

gracilis. 44. St. filiformis flavus ano fuſco.
Staphylinus gracilis. Paykull. Monogr. 38. 28.
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Parvus, omnino filiformis, totus flavus ano ſolo obſcuro ſive fuſco.

punctulatus 45. St. filiformis ater nitidus capite ovato.
Staphylinus punctulatus. Paykull. Monogr. 30. 22.
Habitat in Suecia.
Statura filiformis praecedentis. Caput magnum, ovatum & thorax atra, nitida. Pedes nigri.

emarginatus. 46. St. depreſſus brunneus elytris pallidioribus, thoracis margine reflexo.
Staphylinus emarginatus. Paykull. Monogr. 56. 40.

Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Caput parvum. Thorax brunneus margine reflexo, elevato. Elytra brevia, teſtacea.

47. St. niger elytris pedibusque fuſcis. *bicolor.*
Staphylinus bicolor fuſco griſeus capite thorace abdomineque ſupra nigris. Paykull. Monogr. 21. 13.
Habitat in Galliae finetis Muſ. Dom. Boſc.
Parvus. Caput & thorax nigra, immaculata antennis fuſcis. Elytra longiora, fuſca. Corpus nigrum pedibus fuſcis.

48. St. ater nitidus elytris obſcuris, pedibus rufis. *ruſipes.*
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Medius. Antennae nigrae articulo primo rufo. Caput & thorax atra, nitida. Elytra nigra, obſcura, minime nitida. Abdomen nigrum. Pedes rufi.

49. St. ferrugineus capite atro. Paykull. Monogr. 59. 42. *melanocephalus.*
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Minutus, totus ferrugineus capite ſolo atro.

50. St. niger elytris lividis, pedibus ferrugineis, antennis extrorſum craſſioribus. *craſſicornis.*
Habitat in Dania Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Minutus. Antennae extrorſum craſſiores, ferrugineae. Caput nigrum. Thorax orbiculatus, gibbus. Elytra ſubfornicata, livida. Pedes flavescentes.

51. St. gibbus niger elytris ſanguineis, antennis extrorſum craſſioribus. Linn. Syſt. nat. 2. 685. 25. Paykull. Monogr. 39. 29. *ſanguineus.*
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.

Corpus parvum, gibbum. Antennae longitudine corporis, extrorſum craſſiores. Caput rugoſum, nigrum. Elytra baſi ſtriata, laete ſanguinea. Pedes flaveſcentes femoribus fuſcis.
Variat corpore brunneo.

floralis. 52. St. depreſſus niger pedibus flaveſcentibus, antennis extrorſum craſſioribus. Paykull. Monogr. 67. 47.
Habitat in Gallia Muſ. Dom. Boſc.
Parvus, depreſſus. Antennae extrorſum craſſiores, nigrae. Thorax planus, laevis, niger. Elytra laevia, nigra. Pedes flaveſcentes.

caraboides. 53. St. flavus immaculatus. Linn. Syſt. nat. 685. 20. Fn. Sv. 854. Payk. Monogr. 19. 11.
Staphylinus fulvus. Degeer Inſ. 4. 23. 12.
Habitat in Europa.

rugoſus. 54. St. niger thorace elytrisque rugoſis.
Habitat in Anglia.
Sequente paullo major, totus niger. Caput planum. Thorax depreſſus, longitudinaliter rugoſus. Elytra rugoſa, nigra. Pedes nigri.

piceus. 55. St. niger thorace depreſſo: lineis elevatis tribus, elytris piceis. Linn. Syſt. nat. 2. 686. 25.
Habitat in Europa.

porcatus. 56. St. niger obſcurus thorace marginato, elytris elevato ſtriatis.
Habitat in Sueciae ſtercore bovino Dom. de Paykull.
Minutus. Caput nigrum. Thorax ater margine utrinque prominulo. Elytra ſtriis tribus elevatis. Abdomen breve, obtuſum, nigrum ſegmentorum marginibus elevatis.

116. OXYPORUS. *Palpi* quatuor inaequales.
antici filiformes.
poſtici ſecuriformes.
Labium emarginatum cum mucrone.
Antennae moniliformes.

1. O. rufus capite elytrorum abdominisque poſtico nigris. *rufus.*
Staphylinus rufus. Linn. Syſt. nat. 2. 684. 6. Fn. Sv. 844.
Paykull. Monogr. 18. 18.
Geoff. Inſ. 1. 370. 22.
Schaeff. Icon. tab. 85. fig. 3.
Degeer Inſ. 4. 24. 10. tab. 1. fig. 11. 12.
Habitat in Europae Boletis.

2. O. ater elytris pallidis: angulo poſtico nigro, abdomine rufo: ano fuſco. *maxilloſus.*
Habitat in Germaniae Dom. Schneider.
Magnitudo omnino O. rufi. Caput atrum, nitidum mandibulis porrectis, forcipatis. Antennae rufae. Thorax ater, nitidus interdum maculis dua-

---

Oxypori corpus parvum, elongatum, glabrum, immarginatum, agile, capite ovato, magno, exſerto, mandibulis porrectis, forficatis, oculis globoſis, prominulis, lateralibus, antennis brevibus, diſtantibus, ſub oculis inſertis, thorace rotundato, margine deflexo, ſcutello parvo, rotundato, elytris dimidiatis, rigidis, fornicatis, alas tegentibus, pedibus longiuſculis, tenuibus, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

bus, dorſalibus, rufis. Elytra pallida margine poſtico externe nigro. Abdomen rufum ano fuſco. Pedes rufi.

lunulatus. 3. O. flavus elytris nigris baſi apiceque pallidis.
Staphylinus lunulatus. Linn. Syſt. nat. 2. 689. 7. Fn. Sv. 845. Paykull. Monogr. 49. 35.
Habitat in Europae Boletis.
Caput nigrum. Abdomen apice nigrum annulo albo.

ſubterraneus. 4. O. ater laevis nitidus elytris macula baſeos oblonga teſtacea.
Staphylinus ſubterraneus. Linn. Syſt. nat. 2. 690. 9. Paykull. Monogr. 52.
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Caput & thorax atra, laeviſſima, nitida. Elytra atra, nitida macula magna, oblonga baſeos teſtacea. Abdomen obtuſiſſimum & fere truncatum, nigrum. Pedes nigri.

cellaris. 5. O. ater thorace utrinque puncto baſeos rufo.
Habitat in Sueciae cellis ſubterraneis Dom. de Paykull.
Affinis certe O. ſubterraneo at paullo minor. Thorax utrinque puncto rufo & macula baſeos elytrorum multo minori. Pedes rufi.

marginatus. 6. O. ater nitidus thoracis margine pedibus elytrisque rufis: his ſutura maculaque marginali nigris.
Habitat in Suecia Dom. de Seheſtedt.
Statura praecedentium. Caput atrum, nitidum antennis rufis. Thorax laevis, ater, nitidus margine rufo. Elytra glabra, rufa ſutura poſtice latius maculaque magna, marginali nigris. Corpus atrum pedibus rufis.

7. O. thorace rufo, coleoptris palleſcentibus: macu- 3 *maculatus*
lis tribus nigris.
Habitat in Dania Dom. de Seheſtedt.
Statura praecedentium. Caput atrum, nitidum. Antennae rufae. Thorax laevis, rufus. Coleoptra palleſcentia macula communi baſeos duabusque magnis poſticis, nigris. Pectus atrum. Abdomen nigrum, baſi rufum.

8. O. niger elytris macula baſeos pedibusque pal- 2 *maculatus*
lidis.
Habitat in Selandia Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Parvus. Antennae nigrae, baſi apiceque ferrugineae. Caput atrum, nitidum ore ferrugineo. Thorax ater utrinque macula baſeos ferruginea. Elytra laevia, nigra macula magna baſeos pallida. Corpus nigrum pedibus ferrugineis.

9. O. ater nitidus elytris macula baſeos anoque 2 *puſtulatus*
rufis.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura & ſumma affinitas praecedentis. Differt tamen thorace omnino immaculato, elytris macula magna baſeos abdominisque ultimo ſegmento rufis. Antennae & pedes picei.

10. O. flavus elytris baſi anoque atris. *analis.*
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.
Parvus. Antennae flavae, apice fuſcae. Caput & thorax flava. Elytra flava, baſi atra. Pectus atrum. Abdomen flavum, apice atrum. Pedes flavi.

11. O. ater thorace elytris pedibusque rufis. *merdarius.*
Staphylinus merdarius. Mant. Inſ. 1. 221. 25.
Habitat in Anglia Muſ. Dom. Banks.

Parvus. Antennae ferrugineae, apice fuſcae. Caput atrum. Thorax rufus ſcutello nigro. Elytra rufa. Corpus nigrum pedibus rufis.

thoracicus. 12. O. nigricans thorace rufo, elytris fuſcis baſi albis.
Staphylinus brunneus. Paykull. Monogr.
Habitat in Holſatiae Boletis Dom. de Seheſtedt.
Antennae baſi pallidae, apice nigrae. Caput atrum. Elytra fuſco albida margine tamen craſſiori fuſco. Abdominis ſegmenta picea ſive potius baſi nigra apice rufeſcentia. Pedes flavi.

pygmaeus. 13. O. nigricans thorace elytrisque pallidis.
Habitat in Kiloniae Boletis Dom. de Seheſtedt.
Caput atrum, nitidum. Thorax obſcure pallidus. Elytra pallida margine craſſiori fuſco. Abdomen magis nigrum.

flavipes. 14. O. niger elytris pedibusque fuſcis.
Habitat in Europa boreali.
Affinis praecedentibus at paullo minor.

chryſomelinus. 15. O. ater thorace rufo, elytris teſtaceis: margine baſeos atro.
Staphylinus chryſomelinus. Mant. Inſ. 1. 221. 28. Linn. Syſt. nat. 2. 685. 21. Fn. Sv. 855. Geoff. Inſ. 1. 368. 18.
Staphylinus diſpar. Paykull. Monogr. 77. 54.
Staphylinus obtuſus. Mant. Inſ. 221. 17.
Habitat in Europae Boletis.
Variat colore.

melanocephalus. 16. O. teſtaceus capite abdomineque atris.
Habitat in Daniae Selandia Dom. de Seheſtedt.
Minutus. Caput atrum, nitidum. Thorax laevis, ferrugineus, nitidus. Elytra laevia, teſtacea.

Abdomen nigrum. Pedes flavi. Nimis affinis O. pygmaeo, an ſatis diſtinctus?

17. O. rufus abdomine atro nitido. *abdominalis.*
Habitat in Norwegia Muſ. Dom. Lund.
Reliquis paullo minor.

18. O. teſtaceus abdomine obſcuriore. *teſtaceus.*
Habitat in Germania Dom. Smidt.
A praecedentibus omnino diſtinctus. Corpus totum laeve, glabrum, teſtaceum abdomine ſolo parum obſcuriore. Pedes teſtacei.

19. O. brunneus capite thoracisque medio atris. *brunneus.*
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Minutus. Antennae brunneae. Caput atrum, nitidum. Thorax in medio ater lateribus brunneis. Elytra brunnea. Abdomen obſcurum.

20. O. nigricans elytris pallidis. *minutus.*
Habitat in Selandia Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Minutus. Caput atrum antennis baſi ferrugineis. Thorax niger margine parum pallido. Elytra albida vitta marginali nigra. Abdomen nigricans. Pedes pallidi.

21. O. ater nitidus pedibus rufis. *rufipes.*
Staphylinus rufipes. Mant. Inſ. 1. 222. 31. Linn. Syſt. nat. 2. 6. 85. 21. Fn. Sv. 855. Geoff. Inſ. 1. 368. 18.
Habitat in Europa boreali.

22. O. ater nitidus thoracis margine elytris pedibusque teſtaceis. *hypnorum.*
Staphylinus Hypnorum. Mant. Inſ. 1. 221. 23.
Staphylinus nitidus. Mant. Inſ. 1. 221.
Habitat in Anglia.
Corpus atrum, glabrum, nitidum. Thoracis latera in primis baſi teſtacea. Elytra immaculata ſcutello tamen nigro.

marginellus 23. O. ater nitidus thoracis elytrorumque marginibus ferrugineis.

Staphylinus marginellus. Mant. Inſ. 1. 221. 27.

Habitat Kiliae.

Parvus. Antennae nigrae primo articulo ferrugineo. Caput atrum, nitidum. Thorax ater, nitidus margine laterali & poſtico ferrugineis. Elytra glabra, nitida, atra margine omni tenuiſſime ferrugineo.

117. PAEDERUS. *Palpi* quatuor inaequales.
antici clavati.
poſtici filiformes.
Labium lineare, integrum.
Antennae moniliformes.

riparius. 1. P. rufus elytris coeruleis, capite abdominisque apice nigris.

Staphylinus riparius. Linn. Syſt. nat. 2. 684. 8. Fn. Sv. 846. Geoff. Inſ. 1. 369. 21. Paykull. Monogr. 27. 19.

Schaeff. Icon. tab. 71. fig. 3.

Degeer Inſ. 4. 28. 14. tab. 1. fig. 18.

Habitat in Europa.

Paederi corpus elongatum, filiforme, glabrum, immarginatum, agile, capite ſubgloboſo, exſerto, oculis globoſis, prominulis, lateralibus, antennis mediocribus, diſtantibus, ſub oculis inſertis, thorace cylindrico: margine deflexo, ſcutello minuto, elytris dimidiatis, rigidis, fornicatis, alas tegentibus; pedibus brevibus, tarſis quadriarticulatis, colore vario.

2. P. niger thorace rufo, elytris cyaneis. *ruficollis.*
Staphylinus ruficollis. Paykull. Monogr. 26. 18. Herbſt Arch. tab. 48. fig. 5.
Habitat ſub lapidibus ad littora maris baltici Dom. de Seheſtedt.
Praecedente paullo minor. Caput atrum. Thorax rotundatus, gibbus, rufus. Elytra brevia, glabra, cyanea, nitida. Abdomen & pedes atra.

3. P. niger elytris poſtice pedibusque fulvis. *elongatus.*
Staphylinus elongatus. Linn. Syſt. nat. 685. 14. Paykull. Monogr. 25. 17.
Habitat in Europa.

4. P. ater nitidus elytris totis pedibusque teſtaceis. *fulvipennis*
Habitat Kiliae.
Affinis certe P. elongato at paullo major. Antennae breves, ferrugineae: articulo primo longiori, incurvo. Caput & thorax atra, nitida. Elytra omnino teſtacea. Abdomen atrum ano ſubferrugineo. Pedes teſtacei.

5. P. niger pedibus teſtaceis. *brunnipes.*
Habitat in Holſatia.
Statura & ſumma affinitas P. elongati at elytra tota nigra. Antennae obſcurae.

6. P. ater nitidus elytris plantisque teſtaceis, capite punctulato. *fulgidus.*
Staphylinus fulgidus. Mant. Inſ. 1. 220. 14. Paykull. Monogr. 22. 14.
Habitat Kiliae Dom. Daldorff.
Diſtinctus capite punctis plurimis, impreſſis. Plantae teſtaceae.

7. P. ater antennis thoraceque rufis, elytris pedibusque teſtaceis. *tricolor.*
Staphylinus tricolor. Mant. Inſ. 1. 221. 30. Paykull. Monogr. 23. 15.

Habitat in Daniae Boletis Muſ. Dom. de Scheſtedt.
Parvus. Caput atrum antennis obſcure rufis. Thorax rufus, nitidus. Elytra teſtacea. Abdomen nigrum. Pedes teſtacei.

filiformis. 8. P. filiformis niger pedibus piceis.
Staphylinus quadratus. Paykull. Monogr. 29. 21.
Habitat in Germania Dom. Smidt.
Statura omnino praecedentium at magis filiformis. Caput magnum, ovatum. Antennae piceae articulo primo magno, incurvo. Thorax cylindricus, ater, nitidulus. Elytra nigra. Corpus nigrum pedibus piceis.

orbiculatus. 9. P. filiformis niger capite orbiculato.
Staphylinus orbiculatus. Payk. Monogr. 35. 26.
Habitat in Suecia rarius.
Affinis certe praecedenti, attamen diſtinctus videtur.

melanocephalus. 10. P. filiformis niger thorace pedibusque fulvis.
Habitat in Germania Dom. Schneider.
Minutus, filiformis. Caput magnum, ovatum, nigrum antennis ferrugineis. Thorax globoſus, ferrugineus. Corpus nigrum pedibus ferrugineis.