



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibliotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet.

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap som många gånger är svårt att upptäcka.

Markerings, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig.

### Riktlinjer för användning

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags miss bruk. Vi har bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor.

Vi ber dig även att:

- Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke

Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för enskilt, ideellt bruk.

- Avstå från automatiska frågor

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, textigenkänning eller andra områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov.

- Bibehålla upphovsmärket


Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den.

- Håll dig på rätt sida om lagen

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt.

### Om Google boksökning

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben på följande länk <http://books.google.com/>





600033513L

G.106. P. 38



E. BIBL. RADCL.

X X C 35 Eng.

189493

e

27  
3




—

—

—

—

—



# INSECTA SVECICA

DESCRIPTA

A

LEONARDO GYLLENHAL

EXCUB. PRAEF. ET EQUIT. AUR. ORD. DE WASA;

REG. ACAD. SCIENT. HOLMENSIS ET SOCIET.

SCIENT. UPSAL. MEMBRO, UT ET REG.

ACAD. OECON. CORRESP.

---

CLASSIS I.

COLEOPTERA

SIVE

ELEUTERATA


---

TOMI I, PARS III.

---

SCARIS

Litteris F. J. LEVERENTZ, 1813.



# AUCTORES CITATI,

## CUM EXPLICATIO<sup>E</sup>NNE ABBREVIATIONUM,

### Continuatio.

- Bonsd. Curae. . . . Diff. Acad: Historia Naturalis Curculionum Svecicæ. Auct. G. Bonsdorff; P. 1 & 2 Upsl. 1785. 4:o.
- Coquib. Illusfr. . . . J. A. Coquebert, Illustratio Iconographica Insectorum, quæ in Museis Parisiens observavit & in lucem edidit Joh. C. Fabricius. Tabularum Decades 1-3. Parisiis An. 7-12. 4:o Maj.
- Forst. Cent. . . . Novæ Species Insectorum, Centuria 2, Auct. Joh. R. Forster. Londini 1771. 8:o.
- Hoppe Inf. Erl. . . . Dav. Henr. Hoppe Enumeratione Insectorum Elytrorum circa Erlangam Indigenarum, &c. Erlangæ 1795. 8:o.
- Knoch. Beytr. . . . Beyträgezur Insecten-geschichte, von Aug. Wilb. Knoch. Leipzig 1781-83. 8:o.
- Latreille Gen. Inf. . . . P. A. Latreille Genera Crustaceorum & Insectorum, secundum Ordinem Naturalem in Familias disposita. Iconibus Exemplisque plurimis expedita. Parisiis & Argentorati, 1806-7. Tom. 1-3. 8:o.
- Linn. Mant. . . . C. Lignæi Mantissa plantarum altera, Generum Editionis VI, & specierum Edit. II, Holmiae 1771. 8:o.

*Mr. Pand. & R. Ryb.* Pandora & Flora Rybyensis;  
Dis. Acad. Praes. c. Linnæo,  
Upl. 1771. 4:o.

*Sc. Mant.* . . . . Mantissæ Insectorum, Iconibus  
illustratæ. species novas aut  
nondum depictas exhibens, fa-  
sciculus 1, Auct. God. Chr.  
Reich, Noribergæ 1797. 8:o

---

---

C L A S S I S . I.  
C O L E O P T E R A.

S E C T I O . I I I .  
T E T R A M E R A.  
*Tarfi omnes articulis quatuor.*

Familia I. Bruchelæ.

Caput infertum, deflexum, in rostrum latum depresso productum. Antennæ ante oculos insertæ, plerumque extrosum crassiores. Elytra ab domine breviora, anum non tegentia.

A N T H R I B U S.

*Palpi quatuor aequales filiformes. Labium emarginatum. Maxilla bifida. Antennæ rostro plano infidentes, articulis inferioribus simplicibus cylindricis, ultimis 3 s. 4 crassioribus remotis, apicis acuminato. Caput infertum, absque collo, nec posterius angustatum. Elytra apice inflexa. Femora postica vix vel parum incrassata.*

- I. *A. latirostris*: oblongus niger subdepressus, rostro rugoso, fronte, elytrorum  
*Ins. Svec. T, I, P, III. A.*

apice abdome que cinereo-pilosus, thorace angulato, postice striga transversa elevata.

*Fabr. Eleut. 2. 408. 16. Herbft. Col. 7. 160. 2.  
Tab. 106. f. 3. Payk. fn. 3. 159. 1. Panz.  
fn. 15. f. 12.*

*Macrocephalus latirostris.* Oliv. Ent. 4. 80. 7.  
6. Tab. 1. f. 6.

*Curculio latirostris.* Bonsd. Curt. 1. 17. 2. fig.  
2. 3.

Habitat in truncis Fagi, Alni, Betule,  
passim.

Descr. A. albino plerumque duplo major, sed variat etiam magnitudine minori. Caput magnum intum nigrum, cum rostro oblongo-quadratum, planum, inaequale, rugoso-punctatum, rostro fronteque totis pube depressa albidio-cinerea tectis; oculi globosi prominuli brunnei. Antennae thorace breviores nigro-piceæ, tenues, articulis tribus ultimis magnis compressiss. Thorax basi apiceque truncatus, lateribus pone medium in lobum sub-bidentatum dilatatus, supra depresso, valde inaequalis, profunde rugosus et punctatus; intra basin carinula transversa lunata utrinque, et paullo anterius linea elevata sub-obliqua, e lobo lateralí exiens, in medio fere interrupta. Scutellum minutum inaequale nigrum, cinereo-pubescent. Elytra thoracis basi multo latiora, et illo fere triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra dorso plana, fere impressa, nigra, sat profunde, sed minus regulariter punctato-striata; apex totus e pube densa depresso late cinereo-albidus, cum puncto fusco didymo in futura; margo anticus plagiæ albidæ undulato-dentatus; in speciminiibus illæfis

præ-

præterea fasciæ tres, valde undulatæ, et quasi maculæ, le pube fusco-cinereæ, intermixtis maculis atrosoho-sericeis; pube detrita, apex totus, ut et macula basalis, rufo-pices. Anus extra elytra, et venter subrufus. pube densa cinereo-albida, interdum nivea, tristis; corpus reliquum subtus nigrum, parvè pubescens, tenuè pubescens. Pedes mediocres nigri, fasciæ crebris cinereo-albidis variegati; femora omnia in medio crassiora, subæqualia.

2. *A. albinus*: oblongus nigro-fuscus; convexus; fronte, rostro, fascia antennarum, elytrorum macula disci apiceque albo-pilosus, thorace tri-tuberculatus.

*Fabr. Eleut.* 2. 408. 15. *Herbst. Col.* 7. 158. 7.

*Tab. 106. f. 1, 2. Payk. fn. 3. 160. 2. Panz. fn. 3. f. 16.*

*Circulio albinus. Linn. syst. 2. 616. 79. Fn. Sv. 632. De Géer Ins. 5. 255. 44. Tab. 8. f. 1. 2. Knoch. Beytr. 1. 81. 1. Tab. 6. f. 12. 7. Bonsd. Curr. I. 16. 1. fig. 1.*

*Macrocephalus albinus. Oliv. Ent. 4. 80. 5. 42. Tab. I. f. 4. a, b.*

*Habitat in truncis Quercus, Betulæ, Salicis; passim.*

*Descri. Magnitudo valde variat. Caput magnum deflexum, cum rostro latè depresso oblongo-quadrangulum, carinula media tenui, supra os bifida; nigrum, fronte tota; rostroque supra pube nivea densa depressa tectis; oculi parvi laterales prominuli brunni. Antennæ nigrae, fusco-pubescentes, articulo octavo toto, nono basi niveo-pubescentibus; ma-*

*Anthribus.*

ris saepe corpore longiores, articulo ultimo elongato acuto; feminæ aut longitudine dimidii corporis, aut breviores, exterrsum magis incrassatæ, articulo ultimo brevissimo acuto. Thorax basi apiceque truncatus, antice paullo angustior, compressus, lateribus nonnihil rotundatus, posterius et basi tenuè marginatus, supra valde convexus, crebre subtiliter rugoso-punctatus, niger, pube densa depresso-fusco-brunnea obductus, margine antico inæqualiter niveo-pilosus; in medio dorsi tubercula tria elevata, transversim posita, pilis atro-holosericeis fasciculata. Scutellum minutum punctiforme niveo-pilosum. Elytra thorace paullo latiora et triplo longiora, apice rotundata, supra valde convexa, profunde punctatostriata, nigra, pube fusco-brunnea testa; apex totus late inæqualiter niveo-pilosus, cum macula communis fusca in ipso apice; in disco antico, juxta futuram, macula lobata nivea; in disco interiori series e fasciculis 5 vel 6 atro-holosericeis pilosis. Anus extra elytra fuscus. Corpus subtus nigrum, sed thorax pube fusco-brunnea testus; pectus pube nivea variegatum; venter totus pube nivea testus, maculis marginalibus tantum denudatis. Pedes validi nigropicei; annulis niveo- et brunneo-pilosis.

3. *A. albirostris*: oblongus nigro-fuscus, rostro elytrisque postice albis nigro-variolis, oculis approximatis, thoracis striga elevata sub-recta.

*Fabr. Eleut.* 2. 408. 17. *Herbst. Col.* 7. 162.

3. *Tab. 106. f. 4. D. Payk. fu. 3. 162. 3. a.*  
Panz. *fn. 15. f. 13.*

*Macrocephalus albirostris*, *Oliv. Ent.* 4. 80. 7. 7.

*Tab. 1. f. 7. a, b.*

Habi-

Habitat in Sylvaticis Scaniæ, Savolaxie, rarius. Dom. de Paykull.

Descr. Minimis praecedentis speciei individuis adhuc minor. Caput deflexum nigrum, rostro lato elongato pleno, apice dilatato, supra pube alba seu nivea vistito, et sulculo tenui impresso; oculi magni ovati depresso brunnei, in fronte fere conniventes. Antennæ vix longitudine thoracis, nigrae, clava albido-pilosa. Thorax antice multo angustior, truncatus, lateribus obliquis sub-rectis, postice bi-sinuatus, supra modice convexus niger, sat profunde punctatus, foveolisque quatuor dorsalibus impressus, pube griseo-albida hinc inde adspersus; paullo ante basin striga transversa elevata sub-recta, ad latera antrorum arcuata. Scutellum minutum rotundatum albo-pilosum. Elytra thoracis basi parum latiora, et illo vix triplo longiora, apice rotundata, supra convexa, nigra, profunde punctato-striata; ante medium macula lobata obsoletior albo-pilosa, et in apice plaga magna niveo-pubescentia, maculam magnam palmatam nigram exterius includens; versus suturam series e fasciculis atro-villoso, saepe detritis. Corpus subtus nigrum, albido pubescens. Pedes mediocres nigri, annulis albido-pubescentibus variegati.

4. A. dorsalis: oblongus niger, rostro, thoracis lateribus, elytrorum macula communis rhombica, punctisque niveis, thoracis striga elevata arrouata.

Thunb. Mus. Upl. app. 4. 146.

*Anthribus albirostris.* Payk. fn. 3. 162. 3. var. b.

Habitat in Sveciæ australis frutetis, rarius.

**Descr.** Praecedenti dimidio major et ultra, colore et friga thoracis arcuata distinctus. Caput deflexum, rostro lato elongato plano, apice dilatato, rotundato, supra, una cum fronte et capitis lateribus pube nivea testo, vertice solo nigro; oculi minus fuscui ovati nigri, in fronte minus approximati quam in priori. Antennæ thorace longiores nigre pubescentes, clava magna tri-articulata atra. Thorax antice multo angustior, truncatus, lateribus obliquis subrectis, postice sinuatus, supra dorso parum convexus, niger, obsolete punctatus & soveolatus; latera subtus late albo pubescentia, & in dorso linea longitudinalis albida angulata; intra basin friga elevata sinuata, in medio nempe angulum posterius expittens, & versus latera utrinque arcuata. Scutellum punctiforme niveo-pilosum. Elytra thorace latiora & triplo longiora, apice rotundata, supra convexa, nigra, fat profunde punctato-striata; interstitia alterna serie e fasciculis atro-holoferiguis & albidis alternantibus tessellata, & in dorso antico plaga magna communis sub-rhombea, dense albo-pubescentia. Corpus subtus nigrum, albidò pubescentia. Pedes mediocreis nigri, annulis albidis,

**6. A. niveirostris:** oblongus nigro-fuscus, antennis ferrugineis, rostro brevissimo, elytrorum apice anque niveo-pilosus.

**Fabr. Eleut. 2. 409. 18.**

*Macrocephalus niveirostris.* Osiu. Ent. 4. 80. & 8. Tab. 1. f. 8. a, b.

*Anthribus brevirostris.* Panz. fn. 57. t. 9. Crit. Rev. 1. 122.

*Circulus brevirostris.* March. Ent. Br. 1. 296. 168.

Habi-

Habitat in *Coryletis*, ad montem Kinnakulle Westrogothicæ rarissime lectus.

descr. Statuta præcedentium, sed A. albi-rostris duplo minor, & abunde distinctus. Caput deflexum, rostro late piano brevissimo, apice rotundato, pube densa nivea tecto; oculi laterales brunnei. Antennæ longitudine thoracis, tenues ferrugineaæ, clava crassia obtusa. Thorax antice angustior, truncatus, lateribus obliquis, sub-rectis, ante basin angulum formantibus, basi truncatus, supra modice convexua, niger, fusco-pubescentia, immixtis hinc illinc pilis albidis; ante basin striga transversa recta valde elevata, & pone illam thorax declivus, angustatus, cum linea media alba. Scutellum punctiforme albo-pubescentia. Elytra thorace paullo latiora, & triplo longiora, apice rotundata, supra convexa, nigro-fusca; sat profunde punctato-striata, apice toto late albo-pubescente immaculata; interstitia alterna fasciculis atro-holofericeis & albidis tessellata. Anus extra elytra planus rotundatus albo pubescens. Corpus subtus nigro-fuscum, cinereo-pubescentia. Pedes annulis obsoletis albidis variegati, femoribus nigricantibus, tibiis tarsisque fusco-ferruginea.

6. A. cinctus: oblongo-ovatus niger, olnero-pubescentia, capite elongato, thorace striga postica elevata transversa arcuata.

*Payk. f. 3. 164. 6.*

*Anthribus marchicus. Herb. Col. N. 167. 9.  
Tab. 106. f. 8. E?*

Habitat in Svecia Australi rarius. Dom. de Paykull,

Deser. Minutus, statura A. niveirostris, sed triplo minor. Caput magnum elongatum deflexum nigrum, fronte rostroque planis, pube densa griseo-albida testis; oculi magni ovati brunnei, parum prominuli. Antennæ longitudine thoracis, fusco-piceæ, articulo primo crasso cylindrico, secundo longo ob-conico, apice incrassato, 3-8 elongatis, valde tenuibus; 9, 10, crassioribus truncatis, ultimo adhuc crassiori ovato obtuso. Thorax antice angustior, sub-rotundatus, compressus lateribus obliquis immarginatis, versus basin angulatis, postice truncatus, supra modice convexus, niger opacus, crebre obsolete punctulatus, tenue pubescens; pone medium strigæ transversa valde elevata, arcuata, & pone illam thorax valde declivus. Scutellum punctiforme cinereo-pubescentia. Elytra thorace parum latiora, sed triplo longiora, apice rotundata, supra convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, pube depresso cinerea inæqualiter variegata. Corpus subtus nigrum, obsolete punctulatum, pubescens. Pedes mediocres nigro-picei pubescentes,

Obs. Synonymon Herbftii minus certum, quoniam strigam elevatam thoracis non memorat.

7. A. *Scabrosus*: ovatus niger, elytris punctato-striatis rufis, intersticiis alternis elevatoriis, fasciculis atro-holofericeis albidisque alternantibus tessellatis.

Fabr. Eleut. 2. 411. 27. Herbft. Col. 7. 164. 5.

Tab. 106. f. 5. B. Payk. fn. 3. 163. 4. Panz. fn. 15. f. 15.

*Macroscytalus scabrosus*. Oliu. Ent. 4. 80. 14. 20. Tab. 2, f. 20. a, b, c.

Diclof

44

Var.

Var. b, Elytris nigris, macula magna humerali rufa, pedibus rufo nigroque variis.

Habitat in Rhamno Cathartico Uplandæ rarius. Dom. de Paykull.

Descr. Statura brevis ovata fere Byrrhi, & B. æneo paullo minor. Caput parvum deflexum rotundatum nigrum opacum pubescens, fronte plana rugoso punctata; os piceum; oculi parvi globosi brunnei. Antennæ thorace multo breviores nigræ, clava magna compressa obtusa tri-articulata. Thorax brevis transversus, antice in medio rotundatus, utrinque sub-emarginatus, angulis obtusis, lateribus subrectis, postice profunde bi-emarginatus, angulis retrorsum valde productis acutis; supra disco valde convexus, pulvinatus, totus niger opacus, crebre punctatus, pube cinereo-albida, saepe in lineas digesta, adspersus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thorace latiora et vix triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra valde convexa, rufa sub-opaca, profunde punctato-striata, interstitiis alternis paullo elevioribus, maculis oblongis atro holosericis & cinereo-albidis alternatis tessellatis; sutura & margo exterior ab apice ultra medium infuscata. Anus extra elytra rotundatus planus rufus, nigro-marginatus. Corpus subtus nigrum punctatum, cinereo-pubescent. Pedes breves validi nigro-picei, pilis albidis hinc inde irrorati.

Var. b, differt: elytris nigris, macula magna quadrata rufa in ipso humero; interstitia elytrorum alterna maculis cinereis tessellata; anus niger; pedes rufo-ferruginei, femoribus & tibijis basi apiceque tarsisque nigro-piceis; cætera ut in præcedentí omnino.

**s. A. varius:** ovatus nigro-fuscus opacus, thorace cinereo-lineato, elytris maculis cinereis sub-quadratis tessellatis.

*Fabr. Eleut. 2. 411. 29. Payk. fn. 3. 165. 5.*

*Panz. fn. 15. f. 16. Herbst. Col. 7. 165. 6.*

*Tub. 106. f. 6. C.?*

*Macrocephalus varius. Oliv. Ent. 4. 80. 16. 22.*

*Tab. 2. f. 22. a, b.*

Habitat in frondibus abietis paucim; etiam in floribus pratorum sylvestrium; hibernat in rimis corticis Pini abietis.

Defcr. Statura omnino praecedentis, sed plerumque duplo, imo triplo & quadruplo minor. Caput parvum deflexum oblongo-triangulare nigro-fuscum, fronte plana rugoso punctata pubescente; oculi laterales globosi brunnei. Antennæ thorace multo breviores, nigrae, articulis duobus primis magnis crassis, 3-8 parvis coarctatis, ultimis tribus iterum magnis, clavam latam compressam obtusam formantibus. Thorax antice rotundatus, angulis compressis, unde ibi multo angustior appareat, lateribus sub-rotundatus, immarginatus, postice bi-finuatus, angulis sub-acuminatis; supra valde convexus, pulvinatus, totus nigro-fuscus opacus, crebre rugolo-punctatus; in dorso lineæ tres, puncta duo disci, paria & lineolæ aliquotæ laterales abruptæ, e pilis cinereo-albidis. Scutellum parvum rotundatum, cinereo-pubescentia. Elytra thoracis basi parum latiora, & illo vix triplo longiora, sub-quadrata, apice obtuse rotundata, supra valde convexa, nigro-fusca, sat profunde striata, & in striis punctata, interstitiis planis subtilissime rugosæ; in interstitiis alternis disci maculæ sub-quadratae piggiores & cinereo-pilosæ alternantes, seriatim dis-

sep-

*spositæ. Corpus subtus nigro-fuscum punctatum, tenui pubescens. Pedes breves validi nigro-picei pubescentes.*

Obs. A. varius Herbstii l. c. forte potius var. obscura A. Scabrof.

## B R U C H U S.

*Palpi inaequales filiformes. Labium membranaceum sub-emarginatum, ciliatum. Maxilla bifida. Antennæ filiformes, plerumque serratae. Caput exsertum, postice in collum angustatum. Elytra abdomine breviora. Femora postica incrassata, saepe dentata.*

1. *B. granarius*: ovatus niger, thorace elytrisque albo punctatis, antennarum basi pedibusque anticus rufo-testaceis, femoribus posticis unidentatis.

Linn. syß. 2. 605. 5. Fabr. Elsut. 2. 399. 24. Oliv. Ent. 4. 79. II. 10. Tab. I. f. 10. a, b. Payk. fn. 3. 157. I. Panz. fn. 61. f. 8.?

*Curculio atomarius*. Linn. fn. 628.

Var. b, duplo minor, parum albo-punctatus, an mas?

Habitat in floribus, præsertim Orobii tuberosi, sat frequens.

Deser. Byrrho Scrophulariae paullo major. Collum angustum deflexum nigrum opacum, creberrime subtiliter punctulatum, collo longiori thoraci annexum; oculi lunati prominenti nigri. Antennæ vix longitudine dimidii corporis, articulis quatuor basi

*Bruchus.*

angustioribus rufo-testaceis, sequentibus multo crassioribus perfoliatis atris, ultimo ovato, oblique subacuminato. Thorax brevis transversus, antice angustior, rotundatus, lateribus immarginatus, in medio nonnihil sinuatus, & ante sinum fasciculo parvo pilorum, dentem mentientem notatus; postice bi-sinuatus, angulis acuminatis; supra modice convexus, niger opacus, subtiliter rugoso-punctatus, pilis cinereo-albidis, praesertim versus margines, adspersus; in medio dorsi puncta duo parva paria albida, & in medio baseos macula major triangularis, e pilis depresso albidis. Scutellum parvum oblongo-quadratum albido-pilosum. Elytra thorace multo latiora, & pone basin adhuc magis dilatata, apice obtuse rotundata, abdomine breviora, supra parum convexa, nigra sub-nitida, regulariter punctato-striata, interstitiis subtilissime cariaceis; in ipsa sutura pone scutellum lineola griseo-albida, & praeterea puncta plura parva albo-pilosa sparsa, praesertim posterius. Podex, sive apex abdominis pone elytra rotundatus, pubes tenui cinereo-argentea tectus, maculis duabus oblongis fuscis. Corpus subtus valde convexum, totum nigrum, subtilissime punctulatum, tenui sericeo-pubescentem. Pedes primi paris tenues rufo-testacei, femorum basi tarsisque nigro-fuscis; reliqui nigri, postici multo longiores, femoribus clavatis, subtus ante apicem dente acuminate armatis.

Var. b. duplo minor, punctis perpansis albidis in elytris notatus & podice minus pubescente diversus, cæterum simillimus.

Obs. Inter contena specimina lustrata, nullum vidi antennis totis, pedibusque etiam intermediis testaceis, adeoque var. b. Cl. Dom. Paykullii loc. cit. mihi plane ignota.

2. B. Loti: ovatus niger, griseo-pubescentis,  
antennarum basi pedibusque anticus rufo-  
testaceis, femoribus posticis uni-dentatis.

*Payk. fn. 3. 158. 2.*

Habitat in floribus Loti corniculati, in Up-  
landia, mense Junio, *Dom. de Paykull;* in  
Westrogothia, ipse.

Deser. Sratura praecedentis, & magnitudo fere  
var. b, ejus, cui valde similis & affinis, differt ta-  
men pubescens tenui æqualiter sparsa, nec in ma-  
culas condensata, ut & thoracis lateribus integris,  
&c. Capitis structura ut in praecedenti omnino,  
nigrum opacum, crebre rugoso-punctatum, pube-  
scens, ore rufo-piceo; oculi lunati prominuli nigri.  
Antennæ ut in priori, etiam quoad colorem. Tho-  
rax brevis transversus, antice angustior, rotundatus,  
lateribus integer, postice bi-sinuatus, angulis acu-  
minatis; supra convexus, niger, crebre subtiliter ru-  
goso-punctatus, pube tenui depressa, cinerea undi-  
que æqualiter obductus. Scutellum punctiforme,  
densius griseo-pubescentis. Elytrorum forma ut in  
praecedenti omnino, supra parum convexa, nigra,  
regulariter punctato-striata, interstitiis subtiliter co-  
riaceis, pube simili ac thorax adspersa; pone scutel-  
lum, in ipsa sutura, lineola e pube densiori grisea,  
sed in disco maculæ omnino nullæ. Podex niger,  
tenue pubescens, immaculatus. Corpus subtus ni-  
grum subtilissime punctulatum, ventre pube densio-  
ni sericea vestito. Pedes ut in praecedenti omnino.

3. B. Cisti: ovatus niger, tenue griseo-pube-  
scens, antennis longioribus basi obscure  
ferrugineis, femoribus muticis.

*Fabr.*

*Fabr. Eleut.* 2. 400. 26. *Oliv. Ent.* 4. 79. 22;  
30. *Tab.* 3. f. 30. a, b. *Payk. fn.* 3. 159. 3.  
*Panz. fn.* 66. f. 15.

*Bruchus ater.* *Marjh. Ent. Br.* 1. 236. 4.

Habitat in floribus Cisti Helianthemi, passim;

¶ Descr. Magnitudo, statuta & facies præcedentia, sed differt antennis longioribus, pedibus totis nigris, femoribus muticis. Caput quoad structuram ut in præcedentibus omnino; nigrum opacum, creberrime subtiliter punctulatum, tenue pubescens. Antennæ longitudine dimidii corporis; extrosum crassiores nigrae, articulis quatuor baseos tenuioribus obscure ferrugineis, supra fuscis. Thorax brevis transversus; antice angustior, rotundatus, lateribus obliquis integris, postice bi-sinuatus, angulis prominulis acutis; supra modice convexus; totus niger, crebre rugoso-punctatus, pube tenuissima grisea adspersus. Scutellum minutum, densius griseo pubescens. Elytra ut in prioribus, tota nigra, punctato-striata, interstitiis subtiliter coriaceis, pube subtilissima grisecentia, nullibi condensata, adspersa. Podex & corpus subtus nigra, subtilissime punctulata, tenue griseo-pubescentia. Pedes omnes toti nigri, postici multo longiores & crassiores, femoribus omnino muticis.

¶ *B. seminarius:* oblongo-ovatus niger; pube grisea sub-variegatus, antennarum basi, genubus tibiisque anterioribus rufotestaceis, femoribus muticis.

*Linn. syst.* 2. 605. 6. *Fabr. Eleut.* 2. 400. 26.

*Oliv. Ent.* 4. 79. 12, 12. *Tab.* 2. f. 12. a;

*b. Marjh. Ent. Br.* 1. 236. 3;

Habi-

**Habitat in floribus Hollandiae, Scaniæ, ratiū.**

Descr. Parvus, proxime præcedentibus angustior, sed non brevior, oblongo-ovatus, & vere distinctus. Caput oblongum deflexum, collo longo & crasso thoraci adnexum, totum nigrum subnatum, creberrime subtiliter punctulatum, ore pieo; oculi lunati brunnei prominuli. Antennæ longitudine dimidii corporis, articulis quatuor baseos angustioribus rufo-testaceis, squalentibus multo latioribus compressis nigris. Thorax latitucine baseos parum brevior, antice multo angustior, rotundatus, lateribus obliquis integris, postice bisinuatus, angulis prominulisi; supra modice convexus, totus niger, crebre rugolo-punctatus, pube grisea depressa, in lobo medio baseos magis condensata, adspersus. Scutellum minutum nigrum, parum griseo-pubescentia. Elytrorum forma ut in prioribus, supra parum convexa, nigra, punctato-striata, interstitiis subtiliter costiaceis, pube longiori grisea depressa obducta. Podex & corpus subtus nigra, creberrime punctulata, pube grisea subnitida obducta. Pedes quatuor anteriores tenues rufo-testacei, femoribus a basi ultra medium nigris, tarsis fulco-ferrugineis, posticii multo longiores & crassiores, toti nigri, femoribus muticis.

---

**Familia 2:da Curculionites.**

**Caput in rostrum, saepe valde elongatum corneum, productum. Os parvum, in apice rostri situm. Palpi minuti, articulo**

lo ultimo conico. Antennæ rostro insidentes, longe ante oculos insertæ. Corpus convexum, plerisque durum.

### Sect. i. Recticornes.

Antennarum articulo primo sequentibus parum longiori, nec angulatim tracto.

### A T T E L A B U S.

*Palpi filiformes, articulo ultimo conico acuminato. Maxilla brevis lata membranacea bifida. Antennarum clava oblonga perfiliata, articulis coarctatis. Caput exsertum elongatum, plerumque postice attenuatum; rostrum breve crassum. Tibiae anticae apice spinis armatae.*

i. *A. Coryli*: niger glaber, thoracis margine postico, elytrisque crenato-striatis totis rufis, rostro, capite thoraceque sulcatis.

Linn. *syft.* 2. 619. 1. *Fn. Sv.* 638. *Fabr. Eleut.* 2. 416. 1. *Herbst. Col.* 7. 143. 1. *Tab. 105. f.* 5. *Payk. fn.* 3. 168. 1.

Var. *b*, Thorace supra rubro, macula antica oblonga nigra.

*Curculio ex-coriato-ruber.* *De Gler Ins.* 5. 257. 46. *Tab. 8. f.* 3. 4.

Var. *c*, Thorace supra rubro, macula obsoleta nigro-fusca, femoribus basi rufescens-tibus.

Var. *d*.

**Var. d.**, Thorace supra rufo-testaceo immaculato, femoribus rufis, apice nigris.  
*Fabr. Payk. Herbst. loc. cit. var. b.*

*Attelabus Avellanæ. Linn. syst. 2. 619. 2.*

*Attelabus Coryli. Pánz. Ín. 100. f. 8.*

Habitat in fructetis, praesertim in *Coryli* foliis; var. b; frequens; a & c, rarius occurunt.

Descr. Major in hoc genere. Caput oblongum; posterius valde angustatum, fere ob-conicum; collo tenui thoraci adnexum, totum nigrum nitidum, obsolete strigosum, fronte tenue canaliculata; oculi globosi prominuli Brunnei; rostrum capite brevius; crassum; arcuatum, supra late canaliculatum, punctatum, nigrum; ore piceo. Antennæ capite parum longiores; nigrae, articulo primo crassiori ob-conico; 2 brevi nodoso; 3-7 ob-conicis, sensim paullo crassioribus; ultinis quatuor adhuc paullo majoribus; coarctatis, clavam oblongam acuminatam formantibus. Thorax fere conicus vel triangulärus, antice valde angustatus; basi truncatus; supra parum convexus; niger nitidus, sub-inæqualis; obsolete strigosus, in margine postico late rufo-ferrugineo; in medio dorsi canalicula abbreviata & intra basin striga transversa profunde impressa. Scutellum semi-orbiculatum nigrum depresso. Elytra thorace ferè duplo latiora; humeris prominulis, & illo triplo longiora, oblongo-quadrata; apice singulatim rotundata dehiscentia; supra convexa, ante medium dorfi impressa; tota rubra vel rufo-testacea; parum nitida, sat profunde crenato-striata; interstitiis sub-rugosis; sutura tota, ut & interstitium secundum quartumque a sutura antice elevata; Corpus subbasinigrum sub-nitidum, confertissimum

tissime & sat profunde punctatum. Pedes elongati nigri, femoribus clavatis, interdum macula piceo-ferruginea oblonga notatis.

Var. b differt, thorace supra rubro, margine antico, & macula oblonga disci majori vel minori, nigredine apicis connexa, nigris.

Var. c. similima var. b. sed macula thoracis minor, obsoletior, tantum fusca, & femora magis ferrugineo-tincta, praesertim versus basin.

Var. d. thoracem gerit totum rufo-testaceum im-maculatum & femora etiam rufo testacea, genibus plus minusve nigris; ceterum omnes quoad minimm punctum simillimi,

2. A. Curculionoides: niger glaber, thorace, elytris, antennarumque basi rufis, capite cylindrico, elytris subtilissime punctato-striatis.

Linn. Syſt. 2. 619. 3. Fabr. Eleut. 2. 420. 22.  
Herbst. Col. 7. 145. 2. Tab. 105. f. 6. Payk.  
fn. 3. 169. 2. Panz. fn. 100. f. 9.

Habitat in Scaniæ Quercu, rarius. Dom.  
de Paykull.

Deser. Praecedenti similis, sed paullo minor, capite postice non angustatato, elytrisque subtilissime tantum punctato-striatis abunde distinctus. Caput ob-longum sub-cylindricum, posterius non angustatum, totum nigrum nitidum, pone oculos & in fronte ob-solete rugoso-punctatum; juxta oculos linea impressa arcuata utrinque; oculi globosi prominuli brunnei; rostrum capite paullo brevius, crassum, arcuatum, profunde punctatum, obsolete canaliculatum, nigrum, ore piceo. Antennæ capite parum longiores, stru-

ctura

Stora ut in præcedenti, nigrae, articulis 2-6 ferrugineis. Thorax sub-quadratus, antice tamen paulo angustior, compressus, basi apiceque truncatus, supra modice convexus, totus saturate rufo-testaceus nitidus, æqualis, omnium subtilissime punctulatus, & intra basin strigosus. Scutellum rotundatum nigropiceum læve. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, humeris prominulis, & illo triplo longiora, sub-quadrata, apice singulatim rotundata, dehiscentia, supra convexa, æqualia, tota saturate rufo-testacea nitida, subtiliter punctato-striata, interstitiis adhuc subtilius parco punctulatis. Corpus subtus nigrum, crebre punctatum, abdomine interdum piceo. Pedes elongati nigri, femoribus clavatis, anticis interdum plaga rufescente utrinque notatis.

## RHYNCHITES.

*Instrumenta Cibaria ut in Attelabo. Rostrum plerumque capite longius, versus os dilatum. Antennarum articuli tres, ultimi majores, remoti. Tibiae antice inermes.*

1. R. Betuleti: supra viridi-sericeus nitidus glaber, corpore, pedibus rostroque viridi-aureis, fronte parum impressa.

Var. b; forte femina, thorace utrinque spinosa porrecta acuta armato.

*Herbst. Col. 7. 128. 2. Tab. 104. f. 2.*

*Attelabus betuleti. Fabr. Eleut. 2. 421. 28.*

*Panz. fn. 20. f. 6.*

*Circulus betulae. Linn. Syst. 2. 611. 39. Fn.*

Sv. 605. *De Gér. Inf.* 5. 248. 36. *Tab.* 7.  
*f.* 25. 26.

*Attelabus Populi.* *Payk. fn.* 3. 170. 3. a.

*Var. c*, supra cœruleo-violaceus, fimbriatus  
 cum pedibus rostroque viridi-sericeus.

*Curculio nitens.* *March. Ent. Br.* 1. 242. 10.

*Var. d*, totus supra & infra cœruleo-viola-  
 ceus.

*Attelabus Populi.* *Payk. fn.* 3. 171. var. b.

**Habitat** in frutetis, præsertim in foliis Be-  
 tulæ & Alni, non infrequens.

**Descr.** Statura fere Attel. Coryli, sed plerum-  
 que paullo minor, præsertim brevior. Caput infer-  
 tum oblongum angustum sub-cylindricum, supra vi-  
 ridi-sericeum nitidum, crebre rugoso-punctatum,  
 fronte inter oculos obsoletius impressa; regio ocu-  
 lorum & nucha cupreo-aurea; oculi laterales brun-  
 nei, parum prominuli; rostrum capite longius, cra-  
 fuscum, sub-arcuatum, apice nonnihil dilatatum,  
 supra fere planum, subtiliter rugoso-punctatum, to-  
 tum virescenti-aureum seu cupreum nitidum. Anten-  
 nae vix capite cum rostro longiores, totæ nigrae, ar-  
 ticulis 1-5 oblongis, angustioribus, 6-8 brevibus  
 truncatis, paullo crassioribus, 9, 10, determinate ma-  
 joribus perfoliatis, ultimo æque crasso, brævi, acu-  
 minato. Thorax antice angustior, truncatus, lateri-  
 bus immarginatus, pone medium dilatato-rotundatus,  
 basi sub-finiatus, supra valde convexus, viridi-seri-  
 ceus nitidus, crebre & concinne punctulatus, in me-  
 dio obsolete canaliculatus. Scutellum parvum viri-  
 di-aureum rotundatum. Elytra thoracis basi fere di-  
 midio latiora, humeris prominulis, & illo fere tri-  
 plo longiora, apice rotundata, supra convexa, dorso  
 vero

vero antico obsoleto imprimis, viridi-sericea, versus la-  
tera magis aureo micantia, creberrime & sat profun-  
de punctato-striata, striis in singulo circiter sedecim,  
quibusdam minus regularibus. Corpus subtus con-  
fertissime punctatum, tenue griseo-pubescentis, pecto-  
re cupreo-aureo, abdome viridi-aeneo. Pedes e-  
longati rubro-cuprei, femoribus clavatis virescenti-  
zneis.

Variat etiam dimidio minor.

Var. b, forte femina, differt tantum spina acu-  
ta, antrosum porrecta in utroque latere thoracis,  
ante medium.

Var. c, colore tantum differt; corpus supra co-  
eruleo-violaceum, rostro, scutello, elytrorumque la-  
teribus, ut & tota pagina inferiori, cum pedibus  
viridi-sericeis, hinc illinc parum aeneo-micantibus.

Var. d, paullo minor; corpus totum tam supra  
quam infra, cum rostro, scutello & pedibus, co-  
eruleo-violaceum unicolor; media quasi inter hanc  
& sequentem speciem, sed frons parum impressa, &  
anteriarum articulus ultimus brevior, quare ad spe-  
ciem praesentem referenda; in varietatibus indicatis  
occurruunt etiam aliæ thorace spinoso, aliæ mutico.

2. R. Populi: supra viridi-aeneus nitidus gla-  
ber, rostro, pedibus corporeaque subtus  
coeruleo-violaceis, fronte profundius ca-  
naliculata.

Var. b, forte femina, thorace utrinque spi-  
na porrecta armato.

*Herbst. Col. 7. 128. 3. Tab. 104. f. 3.*

*Attelabus Populi.* Fahr. Eleut. 2. 422. 29.  
Payk. fn. 3. 171. 3. var. c. Panz. fn. 20. f. 7.

*Curculio Populi.* Linn. Syft. 2. 611. 40. Fn.  
Sv. 606. De Geer Ins. 5. 249. 37.

Var. c, dimidio minor, thorace elytrisque  
supra rubro-cupreis.

Habitat præsertim in foliis Populi tremulae,  
sat frequens.

Descr. Præcedenti simillimus & valde affinis,  
specie tamen diversus videtur, dimidio minor, fronte  
inter oculos profundius canaliculata, antennarum  
articulo ultimo longiori, & colore paginae infe-  
rioris pedum, scutellique semper cœruleo-violaceo  
distinctus. Caput ut in præcedenti constructum,  
supra viridi-æneum, subtiliter strigosum & punctatum,  
fronte inter antenas canali profundo & lato, sed  
brevi, exarata; rostrum effam inter antenas cana-  
liculatum, basi supra viridi-æneum, apice vero &  
subtus, uti caput, nigro-cœrulescens. Antennæ ut  
in præcedenti, modo articulus ultimus paullo lon-  
gior, conicus, magis acuminatus. Thorax ut in  
priori, supra viridi-æneus nitidus, subtus cœruleo-  
violaceus. Scutellum parvum rotundatum violaceum.  
Elytra viridi-ænea, quoad formam & strias ut in  
præcedenti. Corpus subtus cœruleo-violaceum pun-  
ctulatum, ventre interdum cœruleo-virescente. Pe-  
des cœruleo-violacei, tarsis nigricantibus.

Var. b, thorace utrinque spina armato, uti var.  
a, præcedentis, unice differt; spinæ istæ longitudi-  
ne variant.

Var. c, dimidio minor & ultra; differt præterea  
colore thoracis, & præsertim elytrorum, rubro-cu-  
preo,

3. R.

3. R. Bacchus: oblongus, aureo-cupreus nitidus, longius pubescens, antennis tarsisque nigris, elytris rugoso-punctatis, obsolete striatis.

Ver. b, forte femina, virescens-cuprea, thorace utrinque spina porrecta armato.

*Herbst. Col. 7. 124. l. Tab. 104. f. i.*

*Attelabus Bacchus. Fabr. Eleut. 2. 421. 27.*

*Payk. fn. 3. 172. 4. Panz. fn. 20. f. 5. Crit. Rev. 1. 123.*

*Curculio Bacchus. Linn. Syst. 2. 611. 38.*

*Curculio purpureus. De Geer. Ins. 5. 250. 386.*  
*Linn Syst. 2. 607. 14. Fn. Sv. 585.*

Habitat in Svecia Australi rarius.

Descr. Rh. Betuleti paulo longior, sed angustior, totus pube longiori erecta fusca undique adspersus. Caput breve convexum aureo-cupreum nitidum, sat profunde punctatum; oculi globosi brunnei; rostrum thorace longius, sub-arcuatum, punctis lineisque interruptis impressum, basi fuso-cupreum, apicem versus nonnihil dilatatum nigrum. Antennae ante medium rostri insertae, & vix illo longiores, nigræ, pilosæ, structura fere ut in Rh. Betuleti. Thorax antice multo angustior, basi apiceque truncatus, lateribus pone medium dilatato-rotundatus, supra convexus, totus aureo-cupreus nitidus, crebre & profunde punctatus. Scutellum rotundatum fusco-cupreum. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, hameris gibbis, & illo fere quadrum longiora, apice singulatim rotundata, dehiscentia, supra dorso antico depressa, tota aureo-cuprea vel purpurascens nitidissima, punctis impressis, &

~~angulis transversis~~ elevatis creberrime obsita, unde striæ non nisi inspectu obliquo discernendæ. Corpus subtus cupreum, crebre punctulatum, pubescens. Pedes elongati, femoribus clavatis aureo-cupreis nitidissimis, tibiis fusco-cupreis, tarsis nigris.

Var. b. dimidio major; thorax utrinque spina porrecta armatus ut in prioribus; color virescentiæneus, minus fulgidus; forte femina.

Obs. Circuleo purpureus Cl. Linnæi loc. cit. testante inventore Cl. De Géer, forte hoc pertinet, præsertim quum in Ed. 1:a. Fn. Sv. N. 457. Cl. a. Linné illum cum Curo. Betuleti comparat.

4. *R. cupreus*: supra obscure æneus opacus, tenue griseo-pubescentia, subtus obscurior, elytris sub-quadratis, profunde punctato-striatis.

*Herbst. Col. 7. 138. 14. Tab. 105. f. 2. A.*

*Astelabus cupreus. Fabr. Eleut. 2. 423. 35.  
Payk. fn. 3. 173. 5. Panz. fn. 20. f. 9.*

*Circulio cupreus. Linn. Syst. 2. 608. 21. Fn.  
Sv. 593.*

Var. b. fusco-cupreus, elytris femoribusque purpurascenti-cupreis.

Habitat in frutetis passim, præsertim in foliis Sorbi, Coryli.

Deser. Magnitudo & fere statura Rh. Populi; variat etiam dimidio minor. Corpus totum pubescentissima erecta fusca obductum. Caput breve convexum fusco-cupreum, creberrime punctulatum, oculis globosis brunneis; rostrum capite longius, subarcuatum, sulcalis abbreviatissimum exaratum, basi fusco-

eu-

capitum, extrofum nigrum, parum dilatatum. — Antennae vix capite cum resto longiores, nigræ, strigata ut in Rh. Betuleti. Thorax oblongus angustus, fere cylindricus, anterius tamen paullo angustior, basi apiceque truncatus, supra convexus, fusco-aeneus, creberrime punctatus. Scutellum rotundatum fulcum depresso. Elytra magna, thorace duplo latiora, & fere quadruplo longiora, apice rotundata, supra convexa, obscure aenea, paullo magis nitida, profunde punctato-striata, interstitiis transversim rugulosis. Corpus subtus obscurius fusco-aeneum punctulatum, tenue pubescens. Pedes elongati fusco-aenei, femoribus clavatis nitidioribus, tarsis nigris.

Var. b, colore tantum differt; caput & thorax fusco-cuprea; elytra saturatius purpurascens.

Obs. Rhychintes punctatus Herbst. Col. 7. 131.  
7. Tab. 104. f. 7. A. secundum descriptionem forte modo var. major hujus speciei.

5. *R. aequatus*: obscure aeneus punctatissimus, fusco-pubescent, elytris rubris, profunde punctato-striatis, thorace canaliculato.

Herbst. Col. 7. 132. 3. Tab. 104. f. 8. B.

*Attelabus aequatus*. Fabr. Eleut. 2. 422. 32.

Payk. fn. 3. 173. 6. Panz. fn. 20. f. 8.

*Curelio aequatus*. Linn. Synt. 2. 607. 9.

Var. b, Antennarum medio pedibusque rufis;

*Curelio aequatus*. Marsh. Ent. Br. 1. 238. 1.)

Habitat in Salicetis rarius.

Descr. Statura & similitudo praecedentis, sed plerumque duplo minor; corpus totum pube tenui-

*erecta fusca tectum. Caput breve convexum fuscum  
seneum punctatissimum, oculis globosis brunneis; ro-  
strum capite cum thorace fere longius, tenue, arcu-  
atum, nigro-piceum, striis & punctis oblongis ex-  
aratum, apice parum dilatatum. Autenæ vix lon-  
gitudine rostri, tenues, fuscopiceæ, clava nigra.  
Thorax oblongus angustus sub-cylindricus, basi api-  
cæque truncatus, supra convexus, obscure æneus,  
confertissime punctulatus, in medio obsolete canali-  
culatus. Scutellum parvum rotundatum fuscum,  
Elytra magna, thorace duplo latiora, et fere qua-  
druplo longiora, supra convexa, saturate rubra sub-  
nitida, interdum dilutijs testacea, profunde punctato-  
striata, intersticiis subævibus; sutura astica sepe in-  
fuscata. Corpus subtus æneum sub nitidum punctu-  
latum. Pedes elongati, femoribus clavatis æneis,  
tibis fuscopiceis, tarsis nigro-fuscis.*

Var. b. differt tantum antennarum articulis 2-8  
dilutijs ferrugineis, femoribus totis, tibisque su-  
perne rufis.

6. R. *Alliariae*; ovatus cyaneus nitidus, lon-  
gius pubescens, thorace punctatissimo, e-  
lytris profunde punctato-striatis, intersti-  
ciis subtilissime seriato-punctulatis.

*Attelabus Alliariae.* Fabr. Eleut. 2. 425. 47.

Payk. fn. 3. 175. 8.

*Curculio Alliariae.* Linn. Syst. 2. 606. 4. Fn.  
Sv. 580.?

*Curculio cæruleus.* De Géer Ins. 5. 251. 39.

*Curculio nanus.* Marsh. Ent. Br. 1. 238. 3.

Habitat in Svecia Australi rarius,

Deser.

**Descr.** Statura ovata Rh. æquati, & minimis eius vix major. totus pubescentia longa erecta su-  
fca undique adspersus. Caput sub-quadratum cohve-  
xum coeruleum sub-nitidum, creberrime punctatum,  
œculis glebosis brunnneis; rostrum longitudine papi-  
tis thoracisque, arcuatum nigro piceum, spicè dilatatum, supra abrupte striatum. Antennæ vix rotuo  
longiores, nigro fasciæ, articulis 1 & 2 oblongis  
crassiusculis, 3-5 etiam oblongis tenuibus, 6-8 bre-  
vibus, fere simili crassioribus, 9, 10, crassis truncatis,  
ultimo æque crasso ovato sub-acuminato. Thorax  
basi apicè que truncatus, antice paullo angustior, lati-  
ribus pone medium rotundato-dilatatus, supra pa-  
rum convexus, totus coeruleus, consertissime pun-  
ctatus. Scutellum rotundatum depresso, obscure  
coeruleum. Elytra thoracis basi vix duplo latiora,  
& illo triplo longiora, apice rotundata, supra mo-  
dice convexa, dorso antico depresso, tota coerulea,  
magis ritida, sat profunde punctato-striata, intersti-  
tio signulo serie regulari, e puncto is minimis impres-  
sis. Corpus subitus coeruleum nitidum punctulatum.  
Pedes elongati, femoribus clavatis coeruleis, tibiis  
fusco-coeruleofuscis valde pilosis, tarsis nigra-  
cantibus.

**Obs.** Synonymon Cl. Paykullii certum; reli-  
quorum auctorum vero dubia, ob descripti num in-  
sufficientiam; Cl. Fabricii & De Geeri, ob indica-  
tem pubescentiam, huic vel in sequenti Specie tribu-  
enda; Cl. Linnaei potius ad Rh. nanum, utpote in  
Svecia frequentiore, referendum videtur.

7. **R. minutus:** ovatus virescenti-coeruleus  
sub-nitidus pubescens, thorace punctatissi-  
mo, elytris profunde punctato-striatis,  
interstitiis impunctatis.

Herbst

*Herbst. Col. 7. 135. II. Tab. 104. f. II. E.*

*Curculio aeneo-virens, Marsh. Ent. Br. I. 239. 5.*

Habitat in floribus, præsertim Rosarum & Geranii sanguinei, in Kinnakulle Westrogothiæ pluries lectus.

Descr. Præcedenti valde similis & affinis, sed plerumque dimidio minor & ultra, interstitiis striatum in elytris impunctatis, præcipue distinctus; corpus totum pube tenui fascia parcus adpersum. Caput sub-quadratum obscure cœruleoscens punctatissimum, oculis brunneis; rostrum & antennæ ut in præcedenti omnino. Thorax obscure cœruleoscens, confertissime punctulatus, structura ut in priori. Scutellum ut in præcedenti. Elytrorum forma eadem, supra convexa, cœruleo-virescentia, magis nitida, profunde punctato-striata, interstitiis angustis, nullo modo punctulatis. Corpus subtus cœruleo-virescentia punctulatum. Pedes ut in præcedenti.

8. *R. nanus*: oblongus angustior cœruleo-virescentia glaber, thorace profunde punctato, elytris sub-cylindricis punctato-striatis, interstitiis impunctatis.

*Attelabus nanus. Payk. fn. 3. 176. 9.*

Habitat in fruticibus & plantis passim, præsertim in foliis Betulæ albae.

Descr. Longitudo proxime præcedentium, sed multo angustior, variat etiam duplo, imo triplo minor; corpus totum glabrum, aut cœruleum, aut magis virescentia, nitidum. Caput breve convexum, thora in latitudine, cœruleo-virescentia, subtilissime & valde obsolete punctulatum; oculi globoſi nigro-brun-

brunnei; rostrum capite cum thorace paullo brevius, nigro subæneum nitidum; apicem versus dilatatum, supra fere planum, parum punctulatum. Antennæ vix longitudine, rostri cum capite, nigræ, structura omnino ut in proxime præcedentibus, articulis duobus baseos oblongis crassiusculis. Thorax oblongus angustus sub-cylindricus, pone medium tamen parum latior, supra convexus; hinc inde obsolete impressus, profunde, sed minus crebre punctatus, totus coeruleo-virescens. Scutellum minutum coeruleo-virescens. Elytra thorace dimidio latiora, & quadruplo longiora, sub-cylindrica, apice rotundata, supra convexa, tota coerulea vel virescentia nitida, sat profunde punctato-striata; intersticiis levibus. Corpus subtus coeruleo-virescens punctulatum. Pedes elongati coeruleo-virescentes; femoribus clavatis; tergis nigris.

9. R. Betule: ovatus ater nitidus, tenuissime pubescens, rostro brevi depresso, capite magno, collo angustiori thoraci adnexo.

Var. b, femoribus posticis crassissimis saltatoris, forte mas.

*Herbst. Col. 7. 133. 9. Tab. 104. f. 9. C.*

*Attelabus Betule. Linn. Synt. 2. 620. 7. Fñ: Su. 640. Fabr. Eleut. 2. 427. 8t. Payk. fñ. 3. 174. 7. Panz. fñ. 20. f. 15.*

*Caronius extoriato-niger. De Geer Ins. 5. 259. 47.*

*Circulio Populi. Scop. Carn. 74. Et var. b. Circulio Fagi ibid. n. 73.*

Hab.

Habitat in foliis Betuæ fréquens, quas ró-  
dendo pulchre crispa reddit.

Deser. Statura & fere magnitudo Rh. Cuprei;  
variat etiam duplo, imo triplo, minor, totus ater,  
pubes tenuissima concolori adspersus. Caput magnum  
sub quadratum atrum, cæberime punctatum, fronte  
plana, collo paullo angustior, thoraci adnexum; o-  
culi globosi brunnei; rostrum, capite vix longius,  
apice rotundato-dilatum, supra depresso, subtiliter  
rugoso-punctatum, nigrum, ore rufo piceo. Anten-  
nae longitudine capitis cum rostro, nigrae, structura  
ut in prioribus omnino. Thorax basi apiceque trun-  
catus, antice angustior, pone medium rotundato di-  
latatus, supra parum convexus, obsolete canalicula-  
rus, totus ater, confertissime punctatus. Scutellum  
parvum rotundatum atrum. Elytra thoracis postico  
dimidio latiora, humeris prominulis, & illo qua-  
druplo longiora, apice rotundata, supra convexa,  
in dorso antico depreßa, tota atra, magis nitida,  
regulariter & profunde punctata striata, interstitiis  
vix visibiliter seriatim punctulatis. Alæ amplæ fusco-  
hyalinæ. Corpus subtilis atrum sub-nitidum, obsolete  
punctatum. Pedes mediocres atri, femoribus nitidis  
elavatis; posticis longioribus arcuatis.

Var. b. differt tantum femoribus posticis maxi-  
mis incrassatis saltatoriis, forte mas.

to. R. Rhinomacer: oblongus niger, den-  
se cinereo-villosus, antennis longioribus  
pedibusque testaceis, elytris vase puncta-  
tis.

*Authribus Rhinomater.* Payk fn. 3. 166. 8.

*Rhinomacer attelaboides.* Fabr. Eleut. 2. 428. 3.  
*Atte-* *Bata*

*Attypabus. Illig. Mag. 4. 137. 3.*

Habitat in frondibus Abietis, tempore ver-

nali; paßim.

Descr. Reliquis magis oblongus; angustus, subcylindricus. Cerv. T. Albo Linn. magnitudine & statura non dissimilis; variat etiam duplo minor; corpus totum pube dense depresso cinerea, in junioribus saepe flavescente, tectum. Caput breve transversum convexum, cum oculis thorace fere latius, fusco nigrum, creberrime punctulatum, oculis globosis brunneis; rostrum capite duplo longius, apice rotundato-dilatatum, supra planum, nigrum, obsolete punctatum, ore testaceo. Antennæ ante medium rostri insertæ, longitudine fere dimidii corporis, totæ testaceæ, articulis obconicis, ultimis quatuor crassioribus remotis. Thorax oblongus angustus subcylindricus, basi apiceque truncatus, supra parum convexus, totus fusco-niger, crebre subtiliter punctulatus. Scutellum parvum rotundatum fuscum. Elytra thorace dimidio latiora, & fere quintuplo longiora, sub-linearia, apice rotundata, supra convexa; nigro-fusca, creberrime & profundius vage punctata. Corpus subtus nigro-fuscum, obsoletius punctulatum, pubescens. Pedes elongati flavo-testacei glabriores, tarsis apice dilatatis fuscis; femora interdum superne infuscata;

### APION:

*Instrumentum. Cibaria ut in præcedentibus forte. Antennæ rectæ, articulo primō tamen longiori, secundo etiam oblongo-ovato, sequentibus majori; clava ovato-acuminata triarticulata, coarctata. Rostrum tenuis cylindricum; caput ex-*

*tror-*

*torsum attenuatum. Corpus ob-pyriforme, anterius valde attenuatum, thorace sub-conico, elytris abdomineque ultra medium dilatatis.*

¶ *A. frumentarium*: pallide sanguineum opacum, oculis solis nigris, rostro breviori arcuato glabro, pedibus pallidioribus, elytris crenato-striatis.

*Herbst. Col. 7. 107. 6. Tab. 102. f. 6. F.*

*Attelebas frumentarius. Fabr. Eleut. 2. 427. 59.*

*Payk. fn. 3. 177. 10. Panz. fn. 20. f. 14.*

*Crit. Rev. i. 124.*

*Curculio frumentarius. Linn. Syst. 2. 608. 15.*  
*Fn. Sv. 386.*

*Curculio sanguineus. De Geer Ins. 5. 251. 40.*

Habitat in arenosis aridis; agris; etiam in floribus & plantis, sat frequens; nunquam in frumento mihi obvius; forte quoad habitationem cum *Calandra granaria* Fabr. recens exclusa; confusus; ut etiam autumat Cl. Dom. Illiger, in Mag. 4. 136. 59.

Descr. Medium in hoc genere; variat etiam radians magnitudine duplo majori. Corpus torum pallide sanguineum, non nitidum, pube tenuissima depressa cinereo-albida parce adspersum. Caput oblongum porrectum, parum convexum, crebreline punctatum, oculis globosis nigro-brunneis; rostrum cylindricum arcuatum glabrum nitidum; interorum capite duplo; in aliis illo parum longius; quod torte sexus differentiam indicat. Antennae longitudine capitis

pitis cum rostro, articulo primo longiori ob-conico, basi tenui, secundo oblongo-ovato crassiusculo, 3-8 parvis, tenuissim brevioribus coarctatis, clava magna ovata acuminate, triarticulata; totte rufæ. Thorax basi apiceque truncatus, antica vix capite latior, posteriorius nonnihil dilatatus, supra modice convexus, crebre punctatus, ante medium baseos lineola obsoleta impreffus. Scutellum minutum punctiforme concolor. Elytra antice thoracis basi parum latiora, at illo quadruplo longiora, ultra medium dilatata; apice rotundata, supra valde convexa, praesertim posteriorius, tota sanguinea opaca, profunda regulariter striata; & in striis coecinne punctata, interstitiis elevatis planis sub-lævibus. Corpus subtus concolor, obsoletius punctatum. Pedes elongati, plerumque pallidius sanguinei, usq; gularum apice nigricante.

2. *A vernale*: fuscō-piceum, pubē densa cinereo-albida tectum, antennis pedibusque testaceis, elytris fasciis duabus obliquis denudatis, fuscō-piceis.

*Mas*: rostro erasiusculo, thorace breviori, albido-pubescente.

*Femina*: rostro tenuiori glabro, longitudine thoracis.

*Herb.* Col. 7. 113. 12. Tab. 102. f. 12. *M.*

*Attelabus vernalis* *Fabr.* *Elenct.* 2. 427. 60.

*Payh.* fn. 3. 183. 18.

*Circulus Lythri*. *Panz.* fn. 17. f. 8.

*Circulus concinnus* *Marsh.* *Ent. Br.* 1. 248. 26.

*Habitat in Urtica dioica*, pasim,

*Defor.*

*Ins. Svec.* T. L. P. 42. C

Descr. Statura præcedentis, sed minimis ejus plus duplo minus. Caput breve potrectum fusco-piceum, griseo pubescens, crebre punctatum, oculis globosis brunneis, rostrum maris vix capite duplo longius; crassiusculum, fusco-piceum, pube depresso griseo-albida testum; feminæ longitudine capitum cum thorace, cylindricum angustum piceum nitidum glabrum. Antennæ vix longitudine thoracis, structura ut in præcedenti, testaceæ pubescentes, clava obsecuriori. Thorax oblongus, anterius paullo angustior, supra convexus; obsolete canaliculatus, crebre punctatus, nigro-piceus, pube densa depresso griseo-albida tectus. Scutellum punctiforme piceum sub-nitidum. Elytra antice thoracis basi paullo latiora, & illo plus triplo longiora, ultra medium uonnihil dilatata, supra convexa, dilatius brunnea, profunde punctato-striata. pube densa cinereo-albida testa, relictis fasciis duabus glabris brunneis, una latiore in medio, nonnihil obliqua, altera pone medium minori abbreviata. Corpus subtus nigro-piceum punctulatum, parcus pubescens. Pedes pallide testacei pubescentes, unguis fuscis.

3. *A. pallipes*: nigrum obscurum, tenui griseo-pubescentes, antennarum basi pedibusque testaceis, elytris angustioribus, rostro arcuato cylindrico.

Habitat in plantis, locis umbrosis, minus frequens.

Descr. Statura angusta A.. vernalis, illoque parum majus, sequenti quoad colores simillimum, sed differt elytris multo angustioribus, rostro magis arcuato, cylindrico, &c. Corpus totum nigrum subopacum, pube tenui depresso grisea parce adspersum. Caput sub-quadratum nigrum depresso, crebre

bre rugoso-punctatum, oculis globosis brunneis; rostrum feminæ longitudine thoracis, valde arcuatum, ex indicum glabrum nigrum nitidum; marius paullo brevius & crassius, supra griseo-pubescentes. Antennæ longitudine capitis cum rostro, basi ferruginea, extorsum nigrae pubescentes, structura ut in prioribus. Thorax antice truncatus, paullo angustior, pone apicem ab utroque latere leviter impressus, basi sub-sinuatus, supra parum convexus, tenui niger opacus, creberrime punctatus, foveola oblonga intra medium baseos impressus. Scutellum punctiforme nigrum. Elytra thoracis basi parum latiora, sed illo quadruplo longiora, in medio vix dilatata, supra vaide convexa, nigra opaca, sat profunde punctato-striata. Corpus subtus nigrum, crebre punctatum, parum pubescens. Pedes elongati pallide testacei, ipsa basi femorum tarsisque nigrofuscis.

Obs. Descriptio Attelabi atri-rostris Febr. Eleut. 2. 424. 45, huic nostro omnimode convenit, sed patria aliena.

4. A. Viciæ: nigrum obscurum, supra tenui, subtus dense albido pubescens, antennis pedibusque pallidis, elytris latioribus, rostro sub-attenuato.

*Attelabus Viciæ.* Payk fn. 3. 181. 16.

*Apion difficile.* Herbst. Col. 7. 124. 13. Tab. 103. f. 1. A.

*Circulio Trifolii.* Marsh. Ent. Br. 1. 246. 22.

Habitat in Vicia cracca, Ervo, aliisque plantis, locis umbrosis, pastis.

Descr. Præcedenti, ut dictum, quoad colores simillimum, attamen vere distinctum, elytris multo

latoribus ovatis, rostro parum arcuato, apicem versus nonnihil attenuato; & pubescentia paginæ inferioris, præsertim pectoris, multo densiore albida. Corpus totum nigrum sub-opacum, supra tenue griseo-pubescentia. Caput porrectum depresso rugoso-punctatum, oculis magnis globosis brunnescens; rectrum maris vix longitudine thoracis, sub-rectum, supra densius griseo-pubescentia; feminæ thorace fere longius, parum arcuatum, glabrum nitidum, in utroque sexu extrosrum nonnihil angustatum. Antennæ capite cum rostro vix longiores, structura ut in prioribus, pallide testaceæ, clava pleramque obscuriori. Thoracis structura ut in præcedenti omnino, niger obscurus, crebre punctatus, lineola media obsoleta impressus. Scutellum ut in priori. Elytra antice thoracis basi fere duplo laticora, in medio adhuc magis dilatata, supra valde convexa, sub-gibbosa, nigra, sat profunde sulcata, & in sulcis crenulatim punctata. Corpus subtus nigrum punctatum, pube albida, ad latera pectoris magis condensata, fere nivea, tectum. Pedes flavo-testacei, tarsis omnibus, tibiisque posterioribus plerumque nigro-fuscis.

5. A. flavigaster. nigrum glabrum, antennarum basi, femoribus tibiisque testaceis, thorace elongatō elytrisque angustis, rostro longo cylindrico.

*Herbst. Col. 7. 106. 5. Tab. 102. f. 5. E.*

*Attelabus flavigaster. Fabr. Eleut. 2. 427. 57.*

*Payk. fu. 3. 182. 17.*

Var. b, tibiis posterioribus nigro-fuscis.

*Attelabus flavigaster. Panz. fn. 20. f. 13.*

*Apion flavi-femoratum. Herbst. Col. 7. 125.  
III. Tab. 103. f. 2 B.*

Cura

*Curculio atrop*, femoribus exalbidis. Linn. fn.

Sv. Ed. 1:a N:o 469, ejus descriptio in editione secunda erronea ad *Curc Fagi*, N:o 609. allegata.

Var. c., tibiis posterioribus nigris, annulo testaceo cinctis.

Habitat in plantis & gramine ubique frequens.

Descr. Statura angusta A. Vernalis, & saepo illo vix majus; variat tamen magnitudine dimidio, imo duplo majori. Corpus totum saturate nigrum sub-nitidum, omnino glabrum. Caput oblongum porrectum nigrum, fronte inter oculos depressa, longitudinaliter striata; oculi globosi brunnei; rostrum longitudine fere thoracis cum capite, cylindricum, nonnihil arcuatum, maris paulo crassius, punctatum, feminæ tenuius, laxe, politum. Antennæ rostro parum longiores, nigro-fuscæ, articulis 3 s. 4 baseos testaceis. Thorax oblongus angustus sub-cylindricus, anterius paulo angustior, totus niger, creberime rugoso-punctatus, lineola impressa obsoletiori. Scutellum punctiforme nigrum. Elytra antice thoracis basi dimidio latiosa, & illo quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra, magis nitida, sat profunde falcata, & in sulcis punctata, interstitiis planis levibus. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes elongati pallide testacei, tarsis omnibus nigris.

Var. b, simillima, sed antennarum basis obsecuere ferruginea, & tibiæ, aut omnes, aut saltetem quatuor posteriores, nigro-fuscæ.

Var. e, ut var. b, sed tibiæ posteriores propriebus annulo testaceo cinctæ; haec varietas rarius occurrat.

6. A. Craccae: nigrum opacum, cinereo-pubescent, antennis basi ferrugineis, rostro crasso arcuato, apice attenuato, elytris gibbosis punctato striatus.

*Herbst. Col. 7. 102. 2. Tab. 102. f. 2 B.*

*Curtulio Craccae. Linn. Syst. 2. 606. 6.*

*Attelabus Craccae. Rayk. fn. 3. 177. II. Fabr. Eleut. 2. 425. 51?*

*Curculio Viciae. D'Gér. Ins. 5. 253. 43. Tab. 6. f. 31-36.*

*Curculio glaber. Marsh. Ent. Br. 1. 245. 19.*

*Mas: fere duplo minor, rostro breviori, crassiori, dense cinereo-pubescente, antennis totis ferrugineo-testaceis.*

*Curculio Craccae. Marsh. Ent. Br. 1. 245. 18.*

*Apion ruficornis. Herbst. Col. 7. 110. 8 Tab. 102. f. 8 H.*

Habitat in Vicia cracca, aliisque, frequens; etiam in foliis Coryli, locis umbrosis, sape vulgaris.

Descr. Praecedenti duplo majus, & postice magis convexum; corporis totum nigrum opacum, supra pubescentia rariori, subtus densiori cinerea adpersum. Caput oblongum porrectum nigrum, crebre punctatum, oculis magnis globosis brunneis; rostrum feminæ longitudine fere thoracis, crassum, supra arcuatum, nigrum punctatum sub-glabrum, apice tenui cylindrico laevi nitido instructum. Antennæ longitudine capitis cum rostro, crassiusculæ nigrae, articulo primo longiori ferrugineo. Thorax oblon-

oblongus, antice angustior, truncatus, postice bisinuatus, supra convexus, niger, crebre & sat profunde punctatus, lineola media tenui impressus. Scutellum parvum nigrum. Elytra magna ovata, antice thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplio longiora, supra valde convexa, præsertim posterius, tota nigra, sat profunde sulcata, & in sulcis tenue catenato-punctata, interstitiis planis subtilissime coriaceis. Corpus subitus nigrum opacum punctatum, pube densiori cinereo-albida depressa testum. Pedes elongati nigri, cinereo-pubescentes.

Mas fere duplo minor; rostrum thorace brevius, valde crassum, apice tantum attenuatum, supra totum pube densa cinereo-albida vestitum; Antennæ fere torze testaceæ vel ferrugineæ, clava paullo obscuriori; cætera ut in femina omnino.

Obs. Character & descriptio Cl. Fabricii non exacte concordant, forte tamen eandem speciem designare voluit.

7. A. Pomonæ: nigrum sub-opacum, tenuissime pubescens, antennis basi testaceis, rostro crasto apice attenuato, elytris gibbosis cœruleoscentibus.

*Attelabus Pomonæ. Fabr. Eleut. 2. 425. 48.*

*Attelabus cyaneus. Panz. fn. 20. f. 12.*

*Curculio cœruleoscentis. Marsh. Ent. Br. 1. 245. 20.*

Habitat in floribus Pomonæ, & in foliis fruticum, minus frequens.

Descr. Statura & affinitas præcedentis, sed fe-  
re duplomajus; corpus nigrum sub-opacum, pube  
subtilissima rariori grisecente adspersum, elytris  
cœruleoscentibus nitidioribus. Caput oblongum por-

C 4 rectum

rectum planum, crebre punctatum, oculis magnis brunnescens; rostrum maris capite duplo longius, crassum convexum inaequale nigrum, profunde punctatum, pubescens, antice attenuatum, apice ipso atro glabro nitido; rostrum feminæ longius, apice longiori tenui sub-cylindrico glabro nitido. Antennæ vix capite cum rostro longiores nigræ, articulis 2 & 3 primis testaceo-ferrugineis. Thorax oblongus, antice angustior, in medio nonnihil rotundatus, basi bisinuatus, supra parum convexus, niget obscurus interdum sub-coerulescens, crebre & profunde punctatus, canalicula postica profundiori impressus. Scutellum parvum oblongum nigro-coerulescens. Elytra magna antice thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, ultra medium dilatata, supra valde convexa, tota coerulecentia, magis nitida, regulariter striata, & in striis concinne punctata, intersticiis latis planis, subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum, crebre punctatum, ventre sub-coerulecente. Pedes elongati, toti nigri, pubescentes.

Obs. In figura Paozeri loc. cit. structura rostri, magnitudo & color, hanc speciem melius exprimunt, quam Ap. cyaneum.

**8. A. Aeneum:** nigrum glabrum, elytris aeneis nitidis, striis impunctatis, rostro cylindrico crassissimo, fronte canaliculata.

Herbst. Col. 7. 102. 1. Tab. 102. f. 1. A.

Attelabus aeneus. Fabr. Eleut. 2. 423. 37. Payk. fn. 3. 179 14.

Curculio Aeneus. Marsh. Ent. Br. 1. 243. 13.

Attelabus crassus. Panz. fn. 20. f. 10. Crit. Rev. 1. 124.

Var.

Var. b, Elytris cœruleo virescentibus.

*Curculio chalceus.* *Marsh. Ent. Br.* 1. 243. 12.

Habitat in Malvis Scaniæ, Hallandiae, pas-  
sim; in Hyrsopo officinali Uplandiae.

*Dom. de Paykull.*

descr. Statura angusta A. flavigeris, sed dupla  
maju & ultra; corpus nigrum, certo situ in fusco-  
zeneum vergens, glabrum, pectore & pedibus tan-  
tum pube tenuissima parce adpersis. Caput porre-  
stum depresso nigrum, crebre punctatum, fronte  
inter oculos canalicula brevi sat profunda exarata;  
oculi globosi brunnei; rostrum vix longitudine ca-  
pitis cum thorace, valde arcuatum, cylindricum,  
crassiusculum, crebre punctatum. Antennæ vix ro-  
stro cum capite longiores, crassiusculæ, nigro-piceæ,  
cinereo-pubescentes. Thorax oblongus sub-cylindri-  
cus, anterius parum angustior, supra convexus, ni-  
ger, vel fusco-sub-zeneus, sat crebre, concinpe pun-  
ctulatus, ante scutellum foveola sub-rotunda impres-  
sus. Scutellum parvum sub-rotundum fusco-zeneum.  
Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadru-  
plo longiora, supra convexa, fusco zenea nitida, re-  
gulariter, sed tenue striata, striis impunctatis, inter-  
stitiis planis vix visibiliter coriaceis. Corpus sub-  
tus nigrum punctulatum, tenue pubescens. Pedes  
elongati nigri pubescentes, femoribus crassiusculis  
fusco-zeneis nitidis laevibus, tibiis anticis longiori-  
bus arcuatis.

Var. b, differt tantum colore clytorum cœruleo-virescente.

9. A. aterrimum: nigrum, tenuissime pu-  
bescens, elytris cœruleo-virescentibus.

striis profundioribus obsolete punctatis,  
vertice transversim impresso.

*Curculio aterrimus.* Marsh. Ent. Br. 1. 244. 14.

*Attelabus aeneus.* Payk. fn. 3. 180. var. b.

Habitat in Scaniæ Malvis passim; in Car-  
dūi; Uplandiæ. Dom. de Paykull.

Descr. Statura angusta, & affinitas præceden-  
tis, sed plerumque dimidio minus, & distinctum.  
Corpus totum pilis tenuissimis rarioribus adpersum.  
Caput porrectum nigrum, creberrime rugoso-puncta-  
tum, vertice pone oculos transversim impresso, fron-  
te non canaliculata; oculi globosi brunnei; rostrum  
maris capite cum thorace paullo brevius, crassiuscu-  
lum cylindricum arcuatum nigrum, crebre punctu-  
latum, tenue pubescens; feminæ paulo longius, te-  
nuius, parcius punctatum, glabrum, magis nitidum.  
Antennæ ut in præcedenti omnino. Thora-  
cis structura eadem, supra convexus, totus niger-  
sub-opacus, tenue pubescens, creberrime punctatus;  
foveola ante-scutellaris oblonga, obsoletior. Scu-  
tellum ut in priori. Elytrorum forma eadem, supra  
convexa, cœruleo-virescentia, parum nitida, striis mul-  
to latioribus & profundioribus quam in priori exa-  
rata. & in striis sat evidenter; et si minus crebre  
punctata. Corpus subtus nigrum punctatum, atq[ue]  
piceo. Pedes elongati nigri pubescentes.

10. A. Sorbi: nigrum glabrum, elytris sub-  
globosis cœruleofuscis, rostro cylindri-  
co arcuato, longitudine corporis, thora-  
ce utrinque impresso. Femina.

Herbst. Col. 7. iii. 9. Tab. 102. f. 9. I.

[Atte]

*Apionus Sorbi.* Payk. fn. 3. 178. 12. Fabr.  
Eleut. 2. 426. 52? Panz. fn. 20 f. 11?

*Curculio viridescens.* Marsh. Ent. Br. 1. 249. 31.  
Mas: fere duplo minor, rostro paulo bre-  
viori & crassiori, elytris nigris nitidis.

*Curculio aterrimus.* Linn. Syst. 2. 607. 10. fn.  
Sv. 582.

Habitat in floribus, præsertim Sorbi; et  
jam in fruticibus & plantis paßim.

Descr. Femina Ap. Craccæ paulo major, & e-  
lytra magis globosa. Caput porrectum unigram; po-  
sterius lœve nitidum, fronte inter oculos crebre sub-  
tiliter striata; oculi brunnnei, parum prominuli; ro-  
strum cum capite longitudine fere reliqui corporis,  
cylindricum, arcuatum nigrum; vix visibiliter pun-  
ctulatum. Antennæ rostro breviores, crassiusculæ  
nigrae, extrosum pubescentes. Thorax antice angu-  
stior, lateribus prope apicem utripque impressus;  
dein rotundato-dilatatus, postice iterum paulo angu-  
stior, basi truncatus, supra convexus, totus niger;  
sat crebre & profunde punctatus; ante medium ba-  
ses fovea oblonga, anterorsum acuminata, profun-  
de impressa. Scutellum punctiforme nigrum. Ely-  
tris thoracis basi fere duplo latiora, humeris promi-  
nulis; in medio adhuc magis dilatata, thorace vix  
quadruplo longiora, supra valde convexa, nigro-coe-  
rulea nitida, interdum cœruleo-virescentia, alia vice vio-  
lacea regulariter striata, & in striis concinne punctata;  
interstitiis planis, vix visibiliter coriaceis. Corpus sub-  
fus nigrum nitidum, sat profunde punctatum. Pedes  
elongati nigri, tibiis tarisque tenue pubescentibus.

Mas duplo minor, & ultra: rostrum vix capite  
cum thorace longius, crassiusculum, valde arcu-  
tum;

tum, evidentius punctulatum, apicem versus tenuerubescens; elytra corpori concolora, tota nigra, magis tamen nitida; cætera ut in femina omnino, & cum illa sepius in copula captus.

Obs. Synonyma Cl. Paykullii, Herbstii & Marshamij indubia; Cl. Fabricii & Panzeri, ob rostri longitudinem & colores indicatos, etiam huc pertinere mihi videntur, et si Cl. Dom. Illig. in Mag. 4. 135. 52. aliter judicat.

ii. A. Astragali: viridi-cœrulescens glabrum nitidum, rostro arcuato tenui, thorace profunde punctato canaliculato, utrinque impresso, elytris punctato-striatis.

*Attelabus Astragali. Payk. fn. 3. 180. 15.*

Habitat in soliis & caulis Astragali Glycyphyllo, in Westrogothia non infrequens.

Descr. Ap. flavigredi vix majus. Caput porrectum viride nitidum, postice lave, fronte inter oculos subtiliter striata; oculi globosi brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue cylindricum, valde arcuatum, viride nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ rostro longiores, nigrae, apice pubescentes. Thorax antice angustior, truncatus, lateribus prope apicem utrinque impressus, dein nonnihil rotundato-dilatatus, basi sub-truncatus, supra parum convexus, totus aut viridis, aut cœruleo-virescens, profunde & sat crebre punctatus, canalicula media profundiori abbreviata impressus. Scutellum parvum concolor. Elytra thoracis basi dimidio latiora, humeris sub prominulis, in medio nonnihil dilatata, thorace fere quadruplo longiora, supra modice convexa, viridi-cœrulescens, rarius

rarius violacea, nitida, profunde striata, & in striis evidenter punctata, interstitiis subtiliter coriaceis. Corpus subtus plerumque viride, vel viridi-aeneum, rarius coerulescens, sat profunde punctatum. Pedes longiusculi viridi-aenei, tarsis nigro-fuscis pubescens.

12. *A. cyaneum*: nigrum glabrum, cœruleo-  
scenti-micans, rostro mediocri cylindri-  
co, thorace obsoletius punctato, canali-  
culatoque, elytris gibbois cœruleis pun-  
ctato-striatis.

*Attelabus cyaneus*. Fabr. Eleut. 2. 426. 53.

*Apion sulcifrons*. Herbft. Col. 7. 122. 25. Tab.  
103. f. 12. M.

*Curculio ater*, elytris nigro cœruleo-centibus. Linn.  
fn. Ed. 1:a N:o 467. Cujus descriptio in  
Fannæ Ed 2:da Curt. cyaneo N:o 581. per-  
peram adjecta.

Habitat in plantis & fruticibus paſſim.

Descr. Praecedenti paullo majus, & in elytris praesertim latius, statura fere Ap. Cracæ. Caput porrectum sub-quadratum nigrum, fronte inter oculos striis 3 s. 4, longitudinalibus exarata; oculi ma-  
gni globosi brunnei; rostrum feminæ longitudine fe-  
re capitis cum thorace, parum arcuatum, tenuis,  
cylindricum, nigrum nitidum sub-læve; maris patul-  
lo brevius & crassius, subtiliter punctulatum. An-  
tennæ rostro parum longiores, nigræ. Thorax ante-  
tice angustior, truncatus, lateribus prope apicem utrinque impressus, dein rotundato-dilatatus, & po-  
sterius iterum paullo angustior, supra parum conve-  
xus, fatus niger, vel nigro sub-cœrulescens, obfo-  
etiūs

reo-pubescente. Thorax parvus angustus sub cylindricus, vix antorsum angustior; supra modice convexus, totus niger sub-opacus, crebre, sed obsoletius punctatus, foveola ante-scutellari parva obsoleta. Scutellum minutum nigro-ceruleascens. Elytra antice thoracis basi duplo latiora, & illo quintuplo longiora, in medio dilatata, supra modice convexa, tota cerulea sub nitida, profunde striata, & in striis evidenter punctata, interstitiis planis subtilissime eoriaceis. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, creberrime punctatum. Pedes elongati tenues, toti nigri.

15. *A. ebeninum*: atrum glabrum nitidum, rostro crassiusculo arcuato, thorace obsoleto punctulato, elytris profunde sulcatis punctatisque, anterius angustatis.

Habitat in Orobō Vernali, aliisque, locis umbrosis, rarius.

Descr. Statura angusta, & magnitudo Ap. flavidipennis var b. Corpus totum magis quam in reliquis atrum, immaculatum, nitidum. Caput breve atrum, fronte inter oculos subtilissime punctulata, vertice laevi; oculi nigri, parum prominuli, rostrum capite duplo longius, crassum, cylindricum, valde arcuatum, atrum, subtilissime punctulatum. Antennae longitudine capitis cum rostro, crassae, nigrae, clava cinereo-pubescente. Thorax oblongus sub-cylindricus, in medio per parum dilatatus, supra convexus, totus ater nitidus, subtilissime parce punctulatus, foveola parva rotunda ante-scutellari impressus. Scutellum vix ullum. Elytra antice vix thoracis basi latiora, ultra medium dilatata, dein iterum attenuata, supra modice convexa, tota atra nitida, sulcis latis profundis exarata, & in his punctis

ta majuscula remota impressa, interstitiis angustis levibus. Corpus subtusatum nitidum, parce punctatum. Pedes minus elongati valdi, toti atri nitidi.

16. A. *Aeneo-cephalum*: nigrum glabrum; capite thoraceque fusco-aeneis, elytris depressiusculis cœruleo-virentibus; rostro tenui valde arcuato.

*Id. Dom. Kirby in litteris.*

*Apion virens.* Herbst. Col. 7. us. 18. Tab. 103. f. 6. F.?

Habitat in plantis & gramine, locis aridis, passim.

Descr. Minutum, A vernali fere minus. Caput breve potrectum, cum oculis latitudine fere thoracis, nigrum, supra plus minusve aeneo-micans, fronte subtilissime punctulata & sub-striata, collo levii; oculi magni globosi brunnei; rostrum maris capite duplo longius; nigrum, subtilissime punctulatum; apice sub-pubescentis; feminæ longitudine capitis cum thorace, magis tenue, in utroque sexu valde arcuatum. Antennæ longitudine fere capitis cum rostro; tenues nigrae, articulo primo elongato, clava pubescente. Thorax sub-cylindricus angustus, supra modice convexus, niger, plus minusve aeneo-micans, subtiliter punctulatus, foveola parva punctiformi ante scutellum impressus. Scutellum minutum nigro-virescens. Elytra antice thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, in medio nonnihil dilatata, supra antice fere plana, posterius declivia; tota aut viridia; aut cœruleo-virescentia, profunde striata, & in striis punctata; interstitiis angustis convexis tenuissime coriaceis, Cœ-

*In. Suss. T. I, P. II.* D.

pus subtus nigrum, parum virescenti-micans, nitidum, crebre & profunde punctulatum. Pedes tenuis nigri, femoribus parum virescentibus.

Obs. In Ap. virenti Cl. Herbstii l. c. rostrum parum arcuatum, & thorax absque foveola ante-scutellari describitur, quare Synonymon minus certum.

17. A. violaceum: nigrum glabrum, concinne punctulatum, elytris ovatis violaceis nitidis punctato-striatis, minus convexis, rostro crassiusculo arcuato.

Var b. Elytris cœruleis nitidis.

*Apion cyaneum.* Herbst. Col. 7. 108. 7. Tab. 102. f. 7 G.

*Curculio sub-sulcatus.* Marsh. Ent. Br. 1 249. 32.

Habitat in plantis & gramine sat frequens.

Deser. Ap. Craccae plerumque dimidio minus, & in elytris multo minus convexum; variat etiam magnitudine duplo minori, & ultra. Caput breve latum nigrum sub-nitidum, concinne punctulatum, oculis globosis brunneis; rostrum feminæ longitudine fere capitum cum thorace, validum, cylindricum nigrum nitidum, subtilissime punctulatum, maris paulo brevius & crassius, magisque arcuatum. Antennæ longitudine capitum cum rostro, nigræ, clava magna oblongo-ovata acuminata pubescente. Thorax antice paulo angustior, basi apiceque truncatus, supra modice convexus, niger sub-nitidus, concinne punctulatus, foveola parva obsoletiori ante-scutellari impressus. Scutellum parvum nigrum. Elytra ovata, antice thoracis basi parum latiora, ultra medium dilatata, supra anterius parum convexa, tota violacea nitida, regulariter sed minus profunde pun-

punctato-striata, interstitiis planis subtilissime coricatis. Corpus subitus vigrum nitidum, crebre punctatum. Pedes mediocres nigri, femoribus crassiusculis nitidis, tarolis fuscis.

Vari. b, differt tantum colore elytrotum cœruleo, rarius etiam virescente.

18. A. *Hydrolapathi*: nigrum glabrum; creberrime punctulatum, elytris ovatis subdepressis cœruleo-virescentibus, simpliciter striatis, rostro brevissimo crassiusculo.

*Curculio hydro-lapathi.* Marth. Ent. Br. 1:  
249. 33.

Habitat in Scania ratius, Dom. Fallén.

Descr. Statura & fere magnitudo Ap. ænei, à quo differt, rostro multo breviori recto, capite thoraceque confertissime punctulatis, elytris profundiis striatis, &c. Caput oblongum porrectum, cum oculis latitudine ferè thoracis, depresso nigrum opacum, confertissime subtiliter rugoso-punctulatum; oculi prominenti brunnii; rostrum maris capite vix longius, crassum, rectum, cylindricum, nigrum opacum, subtiliter rugoso-punctatum; feminæ capite paullo longius, minus crassum, extrosum nitidum. Antennæ ante medium rostri insertæ, vix longitudo rostri cum capite, crassiusculæ nigrae, clava magna acuminata picea. Thorax angustus cylindricus, anterius per-parum angustatus, supra convexus niger opacus, confertissime subtiliter punctatus; ante medium baseos soyeola oblonga impressa. Scutellam minutum nigro-cœrulescens. Elytra ovata, antice thorace dimidio latiora, in medio nonnihil dilatata, thorace quintuplo longiora, supra minus convexa, tota viridi-cœrulescens nitida, regulariter

sat profunde striata, striis sub-lævibus; dum vero oblique inspiciuntur, striæ obsolete punctatæ apparet; interstitia striarum plana, subtilissime coriacea. Corpus subtus nigrum, magis nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes mediocres nigri, femoribus validis nitidis.

19. *A. gibbirostre*: nigrum sub-glabrum, elytris nigro-cœrulecentibus punctato-striatis, antennis juxta basin rostri sub gibbere elevato insertis.

Habitat in carduis aliisque plantis, passim.

Descr. Statura fere *A. violacei*, sed fere dimidio majus. Caput breve latum nigrum depresso, crebre subtiliter rugoso-punctatum, oculis magnis globosis nigro-brunneis; rostrum longitudine fere capitum cum thorace, cylindricum arcuatum nigrum, subtilissime punctulatum; prope basio utrinque gibber vel tuberculatum obtusum laterale, antennarum basin occultans. Antennæ longitudine rostri cum capite, crassæ nigræ, juxta basin rostri sub gibbere descripto insertæ. Thorax vix capite latior, cylindricus niger, crebre & sat profunde punctatus, soveola antescutellari parva oblonga impressus. Scutellum punctiforme nigrum. E'ytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra modice convexa, nigro-cœrulecentia vel plumbea; sat profunde striata, striis evidenter punctatis, interstitiis planis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum sub-nitidum; sat crebre punctatum. Pedes mediocres toti nigri.

20. *A. brevirostre*: nigrum, tenue pubescentis, rostro brevissimo sub-recto truncato

to, thorace angusto crebre punctato, elytris punctato-striatis.

*Herbst. Col. 7. 120. 22. Tab. 103. f. 10. h.*

Habitat in floribus & plantis, locis aridis, passim.

Descr. Statura ovata depresso omnino Ap. viorlacei, & minimis ejus magnitudine æquale. Caput latum sub-quadratum depresso nigrum, crebre punctatum; oculis globosis brunneis; rostrum maris capite parum longius, crassum, sere rectum, nigrum subtilissime punctulatum & pubescens, apice truncatum; feminæ capite dimidio longius, apice lœve nitidum. Antennæ vix capite cum rostro longiores, crassæ, nigrae, clava magna acuminata. Thorax angustus, vix capite latior, sub cylindricus niger, crebre & sat profunde punctatus, foveola ante-scutellarii obsoletiori impressus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, ultra medium non-nihil dilatata, supra minus convexa, præsertim anterius, tota nigra, tenuè pubescens, sat profunde striata, & in striis punctata, interstitiis planis sub-lævibus. Corpus subtus nigrum, magis nitidum, sat profunde punctatum, parum pubescens. Pedes validi nigri.

21. *A. vorax*: nigrum pubescens, antennis tenuibus inferne testaceis, elytris plumbéo-cœruleofuscis, rostro elongato tenui, oculis prominulis.

*Herbst. Col. 7. 119. 20. Tab. 103. f. 8. H.*

*Circulio villosulus*, *Marsh. Ent. Br.*, 1, 250. 34.

Habitat in Pisis, viciis, aliisque plantis, non infrequens.

Descr. Ap. Craccae feminæ Tere majus, præser-tim longius. Caput elongatum nigrum pubescens, subtiliter punctulatum, oculis magnis globosis brunes; rostrum maris longitudine capitis thoracisque cylindricum arcuatum nigrum, longius pubescens, subtiliter punctulatum; feminæ adhuc longius & tenuius, fere glabrum lœve nitidum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, articulo primo longiori quam in plerisque hujus generis speciebus; articuli 3 f. 4 baseos pallide testacei, reliqui nigri pubescentes, clava angusta elongata acuta. Thorax parvus, antice angustior, margine sub-elevato, supra parum convexus, totus niger opacus creberim granulato punctatus, pubescens, in medio obsolete canaliculatus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, in medio nonnihil dilata, thorace quintuplo longiora, supra modice convexa, plumbea, vel nigro cœruleo-crentia sub-nitida, regulariter sat profunde striata, & in striis punctata, intersticiis planis subtiliter coriaceis, pubescentibus. Corpus subtus nigrum opacum, crebre punctatum, pectore densius albido-pubescente. Pedes elongati tenues nigri, cinereo-pubescentes.

22. A. *Aethiops*: nigrum immaculatum pubescens; capite angusto oculis depressis, rostro longissimo crassiusculo, elytris profunde punctato-striatis.

*Herbst. Col. 7. 120. 21. Tab. 103. f. 9. I.*

*Attelabus Pis. Fabr. Eleut. 2. 425. 50. ? II-lig. Mag. 4. 135. 50?*

Ha.

Habitat in viciis, aliisque plantis, sat frequens.

Descr. Statura & fere magnitudo praecedentis, sed differt capite angustiori, oculis non prominulis, rostro crassiori & longiori, ut & colore antennarum & elytrorum. Caput elongatum valde angustum, rostro parum latius, nigrum opacum pubescens, crebre punctatum, oculis brunneis perparum prominulis; rostrum maris longitudine capitis thoracisque crassum, arcuatum, cylindricum, nigrum pubescens punctulatum; feminæ adhuc longius, paullo minus crassum, minusque pubescens. Anteauæ vix capite cum rostro longiores nigrae, articulo primo basi piceo, minus elongato quam in praecedente. Thorax parvus sub-cylindricus, antrosum parum angustior, niger opacus pubescens, sat crebre punctatus, linea la ante-scutellari obsoleta impressus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, in medio nonnihil dilatata, thorace quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, vix plumbeo-micantia, sat profunde striata, & in striis punctata, interstitiis planis sub-lævibus. Corpus subtus nigrum sub-opacum punctatum, tenuem pubescens, Pedes elongati nigri, tenuem pubescentes.

Obs. Synonyma Cl. Fabricii & Illigeri minus certa, nam neque elytra globosa, nec color illarum cyaneus.

23. A. Ervi: nigrum tenuem pubescens, antennæ inferne testaceis, rostro elongato tenue arcuato, elytris nigris striato-punctatis.

*Curculio fusi-cornis*, Marsh. Ent. Br., I, 244 17.<sup>2</sup>

Har.

Habitat in Ervo, vicia, aliisque plantis celeraceis, sat frequens.

Descr. Ap. voraci quoad colores simillimum, sed plus duplo minus, Ap. Viciae æquale & simile. Caput breve latum nigrum; subtiliter striatum & punctulatum, oculis magnis globosis brunneis; rostrum maris capite plus duplo longius, tenue arcuatum, nigrum, pilis depresso-cinereo-albidis adspersum; feminæ adhuc longius & tenuius, glabrum laxe nitidum. Antennæ longitudine rostri cum capite, tenues, testaceæ, clava nigra pubescente, articulo primo minus elongato quam in Ap. voraci. Thorax sub-cylindricus, antice tamen paullo angustior, supra parum convexus, niger pubescens, sat profunde crebre punctatus, canalicula postica abbreviata exaratus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra antice vix thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, ultra medium dilata, supra valde convexa, nigra, cinereo-pubescentia, sat profunde striata, & in striis evidenter punctata, interstitiis planis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum, crebre profunde punctatum, pectore dense, abdomine parcus albido-pubescentibus. Pedes elongati nigri, cinereo-pubescentes.

24. A. Angustatum: nigrum immaculatum, tenui pubescens, capite angusto, rostro elongato tenui arcuato, antennis brevioribus crassiusculis.

*Attelabus flavipes. Payk. fn. 3. 182. 17, var. b.*  
Habitat in plantis & gramine, locis aridis, sat frequens.

Descr. Statura angusta Ap. flavigeris, sed paullo majus, pubescens, colore pedum, thorace breviori & paullo latiori distinctum. Caput elongatum angustum nigrum, subtiliter rugoso-punctatum, o-

cu-

culis nigro-brunneis parum prominulis; rostrum capite cum thorace fere longius, tenue, arcuatum, nigrum nitidum, subtilissime punctulatum, nec in trianguli individuis secundum sexum variare observavi, Antennæ vix rostro longiores, crassiusculæ nigræ, clava pubescente. Thorax latitudine vix longior, antice parum angustior, supra modice convexus, niger, crebre punctatus, foveola ante-scutellari parva oblonga angusta, sat profunde impressa. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, sed fere quintuplo longiora, in medio parum dilatata, supra modice convexa, nigra, subnitida, interdum nonnihil plumbo-micantia, sat profunde striata, & in striis punctata, intersticiis convexis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum subnitidum, crebre punctatum, tenue pubescens. Pedes mediocres nigri.

25. A. tenuius: nigrum immaculatum, longius pubescens, capite angusto, rostro elongato tenui arcuato, antennis longioribus, thorace breviori.

*Id. Dom. Kirby, in litteris.*

Habitat in plantis & gramine, locis aridis, non infrequens.

Descr. Praecedenti simillimum & valde affine; sed plus duplo minus, & ut videtur distinctum, pubescentia longiori & densiori, thorace breviori, &c. Caput & oculi ut in praecedenti; rostrum maris vix longitudine capitis cum thorace, arcuatum nigrum, subtilissime punctulatum, pubescens; feminæ capite cum thorace longius, tenue, nigrum nitidum, fere glabrum. Antennæ longitudine ferè capitis cum rostro, nigro-piceæ, minus crassæ quam in priori. Thorax longitudine latior, sub-cylindricus convexus niger,

iger, crebre punctatus, longius pubescens, foveola ante scutellari parva oblonga. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytrorum forma & punctura ut in priori, sed pubescencia longior & densior. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, crebre punctatum, pubescens. Pedes mediocres nigri pubescentes.

**26. A. superciliatum: nigrum sub-nitidum, tenue pubescens, elytris angustioribus fusco sub-aeneis punctato striatis, orbita oculorum pectoreque albido-villoso.**

Habitat in plantis & gramine, locis aridis, paucis.

Descr. Præcedenti paullo majus, magis nitidum. Caput subquadratum nigrum, subtiliter rugoso-punctatum, oculis modice prominulis brunneis; orbita oculorum in speciminiibus illæsis dente albido-villosa; rostrum maris capite duplo longius, cylindricum, arcuatum, nigrum, basi depresso, tenue pubescens & punctulatum, apice glabrum; feminæ longitudine capitis cum thorace, tenue, fere totum glabrum nitidum. Antennæ paullo ante medium rostri insertæ, longitudine rostri cum capite, tenues nigrae, clava magna pubescente. Thorax antice angustior, & posse apicem utrinque leviter impressus, basi sub-sinuatus, supra modice convexus, totus niger, tenue pubescens. crebre punctatus, foveola ante-scutellari obsoletissima. Scutellum parvum punctiforme nigrum. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, & ante medium parum dilatata, thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, nigra, parum aeneo-mixta, sub-nitida, fat profunde punctato striata, interstitiis subtiliter coriaceis. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, crebre punctulatum, tenue pubescens, pectoris lateribus densius & longius albido-villosum.

Pec.

*Pedes elongati nigri pubescentes, femoribus subclavatis.*

27. A. minimum: atrum sub-opacum, tenuissime pubescens, rostro breviori crassiusculo, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis angustis costatis.

*Herb. Col. 7. n. 15. Tab. 102. f. 3. C.*

*Habitat in floribus & plantis, locis aridis, paucis.*

Descr. Magnitudo & fere statura praecedentia, sed color magis ater, pubescencia tenuior, elytra profundius striata, interstitiis costatis, &c. Caput breve latum nigrum, subtiliter rugoso-punctulatum, oculis globosis nigro-brunneis; rostrum maris vix capite duplo longius, crassiusculum porrectum nigrum, subtilissime punctulatum & pubescens, parum arcuatum; feminæ paullo longius & tenuius, glabrum nitidum. Antennæ longitudine capitis cum rostro, crassiusculæ nigrae, paullo ante medium rostrum insertæ. Thorax antice angustior, in medio nonnihil dilatatus, supra parum convexus, totus ater opacus, tenui pubescens, creberrime & lat profunde rugoso-punctatus, foveola ante-scutellari vix illa. Scutellum punctiforme atrum. Elytra antice vix thoracis basi dimidio latiora, in medio nonnihil dilatata, thorace quadruplo longiora, supra modice convexa, alia sub-nitida, profunde striata, & in striis punctis magnis impressa, interstitiis, praesertim exteriorius, angustis elevatis, ut fere cæthrata dici queant elytra. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, obsoletius punctatum, tenui pubescens. Pedes elongati validi nigri, cinereo-pubescentes.

**28. A. Loti:** nigrum immaculatum, tenuē pubescens, thorace brevi anterius angustato, elytris magnis latis, humeris prominulis.

Habitat in Loto corniculato aliisque planctis, locis aridis, paucim.

Descr. Parvum, Ap. Ervi fere dimidio minus, præsertim brevius, reliquis magis coarctatum, humeris elytrorum latioribus prominulis. Caput breve latum nigrum opacum, subtiliter punctulatum, oculis magnis globosis nigro-brunneis; rostrum maris capite duplo longius, tenuē, arcuatum nigrum, subtilissime punctulatum & pubescens; feminæ longitudine capitis thoracisque, adhuc magis tenuē, glabrum nitidum. Antennæ longitudine rostri cum capite, crassiusculæ nigrae, prope basin rostri insertæ, clava magna ovata pubescente. Thorax latitudine baseos brevior, antice multo angustior, & pone apicem utrinque impressus, bafi bi-sinuatus, elytris arcte applicatus, supra sub-depressus, præsertim porcice, totus niger sub-opacus, crebre punctatus, tenuē pubescens, foveola ante-scutellari parva rotunda. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra magna, antice thoracis basi dimidio latiora, humeris prominulis, ante medium adhuc magis dilatata, thorace fere sextuplo longiora, supra valde convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis latissimis, subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, crebre punctulatum, tenuē pubescens. Pedes longiusculi nigri pubescentes.

**29. A. Atomarium:** nigrum immaculatum, densius pubescens, thorace brevi anterius an-

angustato, elytris minus latis, rostro valde arcuato sub-deflexo.

Habitat in plantis & gramine, locis aridis, paessim.

Deser. Praecedenti in multis simile, sed fere triplo minus, adeoque minimum mihi cognitum in hoc genere. Latridio gibbosō æquale; pubescens densior, elytris minus latis; pedibus validioribus, &c. a priori præterea distinctum. Caput breve latum nigrum pubescens, subtilissime punctulatum; oculis globosis nigro-brunneis; rostrum maris vix capite duplo longius, valde arcuatum, deflexum, nigrum, subtilissime punctulatum & pubescens; feminæ capite cum thorace fere longius, magis tenue, æque arcuatum & deflexum, glabrum nitidum. Antennæ vix rostro longiores, nigrae; basi piceæ, prope rostri barbin insertæ. Thorax brevis, postice latus, structura omnino ut in præcedenti, niger; crebre punctatus, densius pubescens; foveola ante-scutellari parva punctiformi. Scutellum ut in priori. Elytra thoracis basi parum latiora, nec in medio dilatata; thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, nigra, densius pubescens, sat profunde punctato-striata, intersticiis planis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, tenue pubescens. Pedes nigri pubescentes, femoribus crassiusculis,

### Sectio 2. Fracticornes.

Antennarum articulus primus valde elongatus, reflexus, adeo ut antennæ quasi fractæ vel geniculatae apparent;

iger, crebre punctatus, longius pubescens, foveola ante-scutellari parva oblonga. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytrorum forma & punctura ut in priori, sed pubescencia longior & densior. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, crebre punctatum, pubescens. Pedes mediocres nigri pubescentes.

**26. A. superciliatum: nigrum sub-nitidum, tenui pubescens, elytris angustioribus fusco sub-aeneis punctato striatis, orbita oculorum pectoreque albido-villoso.**

Habitat in plantis & gramine, locis aridis, passim.

Descr. Praecedenti paullo meius, magis nitidum. Caput subquadratum nigrum, subtiliter rugoso-punctatum, oculis modice prominulis brunneis; orbita oculorum in speciminiis illæsis denie albido-villosa; rostrum maris capite duplo longius, cylindricum, arcuatum, nigrum, basi depresso, tenui pubescens & punctulatum, apice glabrum; feminæ longitudine capitis cum thorace, tenui, fere totum glabrum nitidum. Antennæ paullo ante medium rostri insertæ, longitudine rostri cum capite, tenues nigrae, clava magna pubescente. Thorax antice angustior, & posse apicem utrinque leviter impressus, basi sub-sinuatus, supra modice convexus, totus niger, tenui pubescens, crebre punctatus, foveola ante-scutellari obsoletissima. Scutellum parvum punctiforme nigrum. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, & ante medium parum dilatata, thorace quinqueplo longiora, supra valde convexa, nigra, parum aeneo-mixta, sub-nitida, fat profunde punctato striata, interstitiis subtiliter coriaceis. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, crebre punctulatum, tenui pubescens, pectoris lateribus densius & longius albido-villoso.

Pec.

*Pedes elongati nigri pubescentes, femoribus subclavatis.*

27. A. minimum: atrum sub-opacum, tenuissime pubescens, rostro breviori crassifuscō, elytris profunde punctato-striatis, intersticiis angustis costatis.

*Herb. Col. 7. n. 15. Tab. 103. f. 3. C.*

Habitat in floribus & plantis, locis aridis, passim.

Descr. Magnitudo & fere statura praecedentia, sed color magis ater, pubescens tenuior, elytra profundius striata, intersticiis costatis, &c. Caput breve latum nigrum, subtiliter rugoso-punctulatum, oculis globosis nigro-brunneis; rostrum maris vix capite duplo longius, crassifuscum porrectum nigrum, subtilissime punctulatum & pubescens, parum arcuatum; feminæ paullo longius & tenuius, glabrum nitidum. Antennæ longitudine capitis cum rostro, crassifuscæ nigrae, paullo ante medium rostri insertæ. Thorax antice angustior, in medio nonnihil dilatatus, supra parum convexus, totus ater opacus, tenuè pubescens, creberrime & latè profunde rugoso-punctatus, soveola ante-scutellari vix illa. Scutellum punctiforme atrum. Elytra apico vix thoracis basi dimidio latiora, in medio nonnihil dilatata, thorace quadruplo longiora, supra modice convexa, atra sub-nitida, profunde striata, & in striis punctis magnis impressa, intersticiis, præsertim exteriorius, angustis elevatis, ut fere clethrata dici queant elytra. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, obsoletius punctatum, tenuè pubescens. Pedes elongati validi nigri, cinereo-pubescentes.

Fam. i. Femoribus mucicis.

Sect. i. Corpore oblongo ovato,  
interdum linear.

R. Articus: niger, griseo-pubescent, rostro crassissimo carinato; thorace medio dilatato, elytris puncto disci albo-pilosus.

*Curculio Arcticus* Payk. fn. 3. 221. 40.

Habitat in foliis Salicis, in Bothnia occidentali & Lapponia, passim: Dom. de Pay-hull & Grapè.

Descr. Maximus nostratum; Statura Rh. Pinei, sed plerumque dimidio major, variat tamen minor, illi æqualis. Caput parvum retractum nigrum, dense griseo-pubescent, crebre rugoso-punctatum, canalicula brevi profunda inter oculos impressum; oculi ovati brunnei sub-depressi; rostrum longitudine thoracis, crassum; parum arcuatum, nigrum opacum, griseo-pubescent, crebre rugoso-punctatum, cum carina media longitudinali elevatori, & alia utrinque tenui obsoleta. Antennæ capite cum rostro parum longiores, crassæ; nigræ, articulo primo longissimo clavato, 2, 3, ob-conicis, sequentibus quatuor paùlo longioribus, 4-7, brevibus nodosis, 8-11, multo crassioribus, clavam ovato-acuminatam, coarctatam formantibus. Thorax basi apiceque truncatus; lateribus paullo ante medium rotundato-dilatatus, supra sub-depressus; in æqualis, totus niger, opacus, pubescens, crebre rugoso-punctatus; in medio dorsi carinula elevata, basin non attingens; & in utroquo latere linea sub-abrupta e pilis cinereo-pallidis condensatis; Scutellum par-

vum-

vum elevatum nigrum lœve. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra valde convexa, tota nigra opaca, pube cinereo-albida, hinc inde in maculas irregulares condensata, adspersa, obsolete striata, & in striis punctis magnis oblongis remotis impressa; interstitiis conser-tissime rugoso-tuberculatis; in medio disibi cuiusvis e-ytri macula major rotundata albido-pilosa distincta, & intra apicem, alia obsoletior. Corpus sub-tus nigrum, subtiliter rugoso-punctatum, pubescens, ventre sub-impresso, utrinque serie e maculis qua-tuor pallido-pilosis notato. Pedes longiusculi valle-di nigri pubescentes, femoribus sub-clavatis, verius spicem annulo albicante cinctis.

2. R. Pineti: nigro-piceus sub-nitidus, pal-lido-pubescentes, rostro crassiusculo tereti, thorace sub-rugoso, clytris fasciculato-pi-losis:

*Fabr. Eleut. 2. 440. 6.*

*Cerculio Pineti. Herbft. Col. 6. 293. 264. Tab. 82. f. 10. Payk. fn. 30. 223. 41.*

Habitat in Pino Sylvestri & Abiete passim.

Descr. Rh. Abietis similia, sed plerumque di-midio major, thorax magis rugosus, elytra profun-dius striata, & femora mutica. Caput rotundatum convexum nigro-piceum, crebre punctatum, tenuis pallido-pubescentes, inter oculos puncto rotundato profundo impresso; oculi ovati brunnei, parum pro-minuli; rostrum longitudine fere thoracis, crassum, nigro-piceum, crebre subtiliter rugoso-punctatum, minime carinatum, sed ante apicem obsoletè canali-

83.

*Ins. Svec. T. I. P. III.*

E

culatum, tenui pubescens, patum arcuatum. Antennæ capite cum rostro parum longiores, nigro-piceæ, structura ut in præcedenti. Thorax antice sub-rotundatus, basi truncatus, lateribus in medio nonnihil rotundato-dilatatus, supra parum convexus, totus nigro-piceus sub-nitidus, inæqualis, crebre & profunde rugoso punctatus, pilis rigidis depresso-flavescens adpersus; in medio dorsi infernum carinula abbreviata irregularis. Scutellum oblongum elevatum nigrum nitidum lœve. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra convessa, nigro-picea sub-nitida, punctis magnis oblongo-quadratis profundis approximatis striata, interstitiis crebre granulato-rugosæ; pili rigidi depresso-pallidi vel flavescentes, fasciculatim congesti, superficiem undique commaculant. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, pilis flavescens discretis parce adspersum; pectore fortius, ventre tenui punctulatis. Pedes longiusculi validi, plerumque dilutiusrufo-picei, pubescentes, femoribus sub-clavatis.

3. R. Pini: rufo-piceus, pallido-squamofus, rostro tenui ferrugineo, elytris profunde punctato-striatis, fasciis duabus maculatis pallido-squamofis.

*Fabr. Eleut. 2. 440. 7.*

*Circulio Pini. Linn. Syst. 2. 608. 19. Fn.  
Sv. 589. Herbst. Col. 6. 147. 107. Tab. 70.  
f. 2. De Géer Ins. 5. 222. 15. Payk. fn.  
3. 225. 43. Panz. fn. 42. f. 1.*

Habitat in Arboribus refinosis, præsertim in Abietis frondibus, & ligno nuper cæso, frequens.

*Descr.*

Defcr. Medius, statura fere præcedentis, sed triplo vel quadraplo minor. Caput parvum convexum rufo-piceum, subtiliter punctulatum, fronte inter oculos impressa; oculi ovati nigro-brunnei; rostrum femineæ longitudine fere capitinis cum thorace, tenui, arcuatim, rufo-ferrugineo nitidum, subtiliter punctulatum; maris paullo brevius & crassius, evidentius punctatum. Antennæ vix rostro, cum capite longioræ, crassiusculæ rufo piceæ, clava obscuriori. Thorax antice multo angustior, sub truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, postice bi sinuatus, supra parum convexus, saturatus piceus, cerebellime rugoso-punctatus, pilis rigidis depressis griseo-albidis adspersus, obsolete carinatus; in medio dorsi puncta duo remotæ; paria, & squamis flavo-pallidis, quibus detritis loco illarum foveola duæ impressæ observantur; ante scutellum etiam foveola oblonga, squamulis ejusmodi repleta; intra marginem ut inque linea obliqua, in medio interrupta, pallido-squamosis, & extra illam adhuc punctum pallidum, radeo ut puncta quatuor dorsalia, in lineam transversalem disposita, conspicuntur. Scutellum parvum rotundatum elevatum, totum squamis albidis tectum. Erytra thoracis basi vix latiora, sed illo triplo longiora, apice attenuata, supra dorso parum convexa, ante apicem callo vel gibbere notata, plerumque dilutijs rufo-picea, striis & punctis valde profundis oblongo-quadratis exarata; interstitiis cerebellime transversim rugoso-granulatis; squamulis pallidis depresso acuminatis sparsis undique adspersa, & præterea ante medium fascia, utrinque abbreviata, & maculis tribus conflata, & altera pone medium fere transversa; subarcuata, & maculis circiter octo in singulo elytro concatenata, ambo & squamis flavo-albidis magis condensatis. Corpus subtus nigro-piceum, sat profunde punctatum, puncto singulo squama pallida, obtusa sicuto. Pedes longiusculi validi, plerumque dilutijs rufo-picei, femoribus clavatis, anticis crassioribus;

ante apicem femorum, & in medio tibiarum, annulus e squamulis angustis albidis.

Obs. Squamulis detritis, corpus totum dilutius rufo-piceum, magis nitidum evadit. Descriptio Cure. Pini in Linn. Fn. Sv. ed. 2:da loc. cit. ad Cure. Abietis pertinet, & vicissim, ut ex collatione cum editione prima Faunæ patebit, & hic error Scriptores Entomologiae plurimos in ambiguitatem de genuina Specie induxit.

4. *R. Hercyniae*: niger, pallido-squamosus, rostro tenui nigro, elytris profunde punctato-striatis, fasciis duabus macularibus albido-squamosis.

*Illig. in Panz. Crit. Rev. l. 130.*

*Circulio Hercyniae.* Herbst. Col. 6. 294. 265.  
Tab. 82. f. II.

*Circulio 4-notatus.* Panz. fn. 57. f. 12. Crit. Rev. l. 130.

Habitat in frondibus Abietis passim, minus frequens.

Descr. Præcedenti plerumque duplo, sape etiam triplo aut quadruplo minor, cæterum colore excepto simillimus & nimis affinis, auctoritate tamen auctorum allegatorum ut peculiarem speciem ad ulteriorem examinationem propono. Caput, oculi, rostrum ut in præcedenti, sed omnia nigra sub-nitida, vertex interdum dilutiori; rostrum secundum sexum ut in priori variat. Antennæ nigrae, articulo primo rufo-piceo. Thorax niger, margine antico anguste ferrugineo, cæterum quoad structuram, signaturas & omnia ut in præcedenti. Scutellum parvum elevatum.

sqm

squamulis niveis tectum. Elytra nigra, alias ut in priori constructa, etiam punctis profundis oblongo-quadratis striata; interstitia angustiora, magis elevata, quod tamen ex animalculi magnitudine minori existere videtur; fasciae maculares ut in illo plerumque albidiores & obsoletiores. Corpus & pedes ut in praecedenti, sed nigra, variat tamen pedibus dilatius rufi piceis.

5. R. notatus: rufo-piceus, pallido-squamulosus, rostro tenue nigro-piceo, elytris tenuius punctato-striatis, falcis duabus laterioribus abbreviatis pallido-squamosis.

*Illig. Mag. 4. 150. 17.*

*Curculio notatus.* *Herbst. Col. 6. 65. 29. E<sub>3</sub>.*  
*Tom. 7. 23. Tab. 97. f. 3.*

*Lixus notatus.* *Fabr. Eleut. 2. 50t. 17.*

*Var. b,* rufo-ferrugineus glaber, detritus.

*Curculio palmeus.* *Herbst. Col. 6. 169. 128. Tab. 71. f. 10.*

*Curculio castaneus.* *De Geer Inf. 5. 231. 19.*

*Curculio brunneus.* *Panz. fn. 26. f. 17. Crit. Rev. 1. 131.*

Habitat in frondibus & ligno recenti Abietis, passim.

Deser. Rh. Pini simillimus & valde affinis, plerumque tamen duplo minor & ultra, puncta striae in elytris multo minora, & fasciae latiores, alter constructae. Caput rufo-piceum, rostrum nigrum, basi plerumque dilatius piceum, structura omnino

ante spicem femorum, & in medio tibiarum, annulus e squamulis angustis albidis.

Obs. Squamulis detritis, corpus totum dilutius rufo-piceum, magis nitidum evadit. Descriptio Curc. Pini in Linn. Fn. Sv. ed. 2:da loc. cit. ad Cure. Abietis pertinet, & vicissim, ut ex collatione cum editione prima Faunæ patebit, & hic error Scriptores Entomologæ plurimos in ambiguitatem de genuina Specie induxit.

4. *R. Hercyniae*: niger, pallido-squamosus, rostro tenui nigro, elytris profunde punctato-striatis, fasciis duabus macularibus albido-squamosis.

*Illig. in Panz. Crit. Rev. 1. 130.*

*Curculio Hercyniae.* Herbst. Col. 6. 294. 265.  
Tab. 82. f. II.

*Curculio 4-notatus.* Panz. fn. 57. f. 12. Crit. Rev. 1. 130.

Habitat in frondibus Abietis paßim, minus frequens.

Descr. Praecedenti plerumque duplo, saepe etiam triplo aut quadruplo minor, cæterum colore excepto simillimus & nimis affinis, auctoritate tamen auctorum allegatorum ut peculiarem speciem ad ulteriorem examinationem propono. Caput, oculi, rostrum ut in praecedenti, sed omnia nigra sub-nitida, vertice interdum dilutiori; rostrum secundum sexum ut in priori variat. Antennæ nigrae, articulo primo rufo-piceo. Thorax niger, margine antico anguste ferrugineo, cæterum quoad structuram, signaturas & omnia ut in praecedenti. Scutellum parvum elevatum, squa-

squamulis nivis tectum. Elytra nigra, alias ut in priori constructa, etiam punctis profundis oblongo-quadratis striata; interstitia angustiora, magis elevata, quod tamen ex animalculi magnitudine minori existere videtur; fasciae maculares ut in illo plerumque albidiores & obsoletiores. Corpus & pedes ut in praecedenti, sed nigra, variat tamen pedibus dilutius rufi piceis.

5. R. notatus: rufo-piceus, pallido-squamulosus, rostro tenui nigro-piceo, elytris tenuius punctato-striatis, falcis duabus latioribus abbreviatis pallido-squamosis.

*Illig. Mag. 4. 150. 17.*

*Curculio notatus, Herbft. Col. 6. 65. 29. &*  
*Tom. 7. 23. Tab. 97. f. 3.*

*Lixus notatus. Fabr. Eleut. 2. 501. 17.*

*Var. b, rufo-ferrugineus glaber, detritus.*

*Curculio palmarum. Herbft. Col. 6. 169. 128. Tab. 96. f. 10.*

*Curculio castaneus. De Gier Inf. 5. 231. 19.*

*Curculio brunneus. Panz. fn. 26. f. 17. Crit. Rev. 1. 131.*

Habitat in frondibus & ligno recenti Abietis, passim.

Deser. Rh. Pini simillimus & valde affinis, plerumque tamen duplo minor & ultra, puncta striarum in elytris multo minora, & fasciae latiores, alter constructæ. Capit rufo-piceum, rostrum nigrum, basi plerumque dilutius piceum, structura omnino

ut in Rh. Pipi. Antennæ piceæ, basi dilutiores. Thoracis structura ut in Rh. Pipi omnino, supra coiffissime punctatus, evidenter carinatus, rufo-piceus, squamulis albidis adspersus; puncta quatuor, albo-squamosa, in medio transversim posita, ut in prioribus. Scutellum squamis niveis tectum. Elytrorum forma ut in prioribus, rufo picea, squamis crebris pallidis adspersa, punctato striata, punctis striarum interiorum quidem oblongo-quadratis, sed parvis, paucum profundis, exteriorum adhuc minoribus, obsoletis, ante medium macula transversa didyma, aut albido, aut flavescenti-squamosa & paullo pone medium fascia fere transversa, in medio antrosum dilatata, similiter squamosa. Corpus subtus nigro-piceum, squamis latioribus albis adspersum. Pedes rufo-ferruginei, albido-pilosæ & squamosæ ut in prioribus.

Var. b. tantum colore dilutius rufo-ferrugineo differt, quod ex detritu squamularum unice cauiscatur; punctula bina media thoracis, & medietas fasciæ posticæ elytrorum plerumque tenacius adhaerent.

6. *R. Piniphilus*: rufo-piceus, conciane albo-squamulosus, rostro tenui concolore; thorace sub-lævi, elytris subtiliter punctato-striatis, macula media albo-squamosa.

*Curculio Piniphilus.* Herbst. Col. 7. 24. 582.  
Tab. 97. f. 4. B.

Habitat in frondibus Abletis rariss.

Descr. Præcedentibus iterum simillimus & valde affinis, sed adhuc minor, Rh. acridulo æqualis, thorace leviori nitido, squamulis brevioribus punctiformibus, & situ maculæ elytrorum, a reliquis ma-

gis

gis diversas. Caput parvum rufo-piceum nitidam; obsolete punctulatum, puncto nigro squalula alba rotundata punctiformi tecto, ut nisi squamulis detritis, superficies omnino lœvis appareat, oculi ovati nigro-brunnei depresso; rostrum feminæ vix longitudo capitis cum thorace, tenui, arcuatum, rufo-piceum nitidam, subtilissime punctulatum, apice nigrante; maxilla paullo brevius & crassius, evidenter punctatum. Antennæ longitudine rostri cum capite, piceæ, basi dilutiores. Thorax quoad structuram ut in prioribus, supra sub-depressus, rufo-piceus nitidas, obiter inspectus lœvis, punctis albis creberrimo adspersus, sed revera subtiliter punctulatus, puncto signatio squalula punctiformi alba occultato, ut in capite; puncta quatuor paullo majora alba, in medio transversim collocata, & carinula longitudinalis elevata, ut in prioribus. Scutellum mediocre subcordatum, squamis niveis tectum. Elytrorum forma ut in prioribus, supra modice convexa, rufo-picea, punctato striata; punctis plerisque rotundis, squalula punctiformi alba fœtis, unde subocellata apparent, interstitiis angustis, rugoso-granulatis, similiter albo-squamosis, alternis plerumque elevationibus; in medio singuli elytri macula sub-transversa albida, & squamis multo majoribus ovatis. Corpus subtus nigro-piceum punctatum, squamis albidis irroratum. Pedes rufo-picei, pilis & squalulis albidis adspersi.

7. R. indigena; angustus niger, griseo-pubescent, rostro tenuissimo arcuato atro nitido, antennis, pedibus, elytrisque rufo-testaceis.

*Curculio indigena.* Herbst. Col. 6. 170, 130. Tab. 71. f. 12. Payk. fn. 3. 252, 72.

Var. b.

E 4

Var. b. Thorace aut fusco-rufescente, basi apiceque nigro, aut toto rufo-testaceo.

Var. c, corpore toto pallide testaceo, rostro oculisque solis nigris.

Habitat in Pini Sylvestris frondibus, non infrequens.

Deser. Minutus, vix Ap. vernali latior sed paullo longior, linearis. Caput breve latum nigrum, subtiliter punctulatum, pube densa griseo-flavescente tectum; oculi globoſi nigri prominuli; rostrum capite cum thorace fere longius, tenuissimum, valde arcuatum, glabrum, nigrum nitidum læve. Antennæ capite cum rostro fere longiores, tenues, rufo-testaceæ, clava apice obscuriori. Thorax antice angustior, sub-retundatus, basi bi-finaatus, supra convexus, niger, pube densa griseo-flavescente tectus, qua detrita superficies creberrime & sat profunde rugoso punctata videtur. Scutellum minutum nigrum, pube albida tectum. Elytra thoracis basi parum latiora, sed illo quinqueplio longiora, supra valde convexa, sub-cylindrica, tota rufo-testacea, parcus pubescens, profunde punctato-striata, interstitiis sublævibus. Thorax subtus & pectus nigra, punctata, dense albido-pubescentia; abdomen nigro-piceum, parcus pubescens. Pedes brevissimi validi, toti testacei pubescentes.

Var. b, differt tantum colore thoracis, aut rufo-testaceo toto, aut fusco-testaceo, basi apiceque nigro-marginato.

Var. e, tota pallidius testacea, rostro oculisque solis nigris, forte nuper exclusa.

8. R. *æthiops*: niger glaber, antennis pedibusque rufo-piceis, rostro longissimo arcuato,

cuso, thorace oblongo, elytris oblongo-punctatis striatis, interstitiis sub-laevibus,

*Fabr. Eleut.* 2. 446. 41.

*Circulio aethiops.* *Herbst. Col.* 6. 270. 241. *Tab.* 80. *f.* 10. *Payk. fn.* 3. 236. 54.

*Circulio badenfis.* *Linn. Syst.* 2. 607. 8?

Var. b, corpore toto, vel saltem elytris dilutiis rufo-piceis.

Var. c. Petibus nigris vel nigro-piceis.

*Circulio holomelanus.* *Herbst. Col.* 6. 271. 242. *Tab.* 80. *f.* 11. *teste Dom. Illig. in Mag.* 4. 141. 41.

Habitat ad ripas arenosas Bothniæ occidentalis frequens. *Dom. de Paykull & Gapse;* in pratis humentibus Westrogothiæ passim.

*Descr.* Statura Rh. Acriduli, sed fore triplo major, Rh. notato æqualis, totus glaber, & abunde distinctus. Caput parvum nigrum, crebre punctulatum, oculis depresso-brunneis; rostrum longitudine capituli cum thorace, valde arcuatum, nigrum nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, rufo-ferrugineæ, clava pubescente. Thorax latitudine longior, in medio rotundato-dilatatus, basi truncatus, supra modice convexus, sub-pulviaatus, totus niger nitidus, crebre & sat profunde punctatus, linea angusta longitudinali levè. Scutellum parvum triangulare nigrum. Elytra thoracis basi dimidie latiora, & illo triplo longiora, supra dorso antico parum convexa, tota nigra nitida, sat profunde punctata, striata, interfasciata.

tiis planis, sub oculo acute armato subtilissime obsolete punctulatis. Corpus subitus nigrum subnitidum, crebre & profunde punctatum. Pedes medios validi, aut rufo-picei, femoribus basi obscurioribus, aut toti dilutius rufo-testacei.

Var. b, differt tantum colore dilutiori, aut totius corporis, aut modo elytrorum & pedum.

Var. c, pedibus saturatius nigro-piceis tantum diversa.

9. R. bi-maculatus: niger, fusco-pubescentis, rostro longissimo arcuato atro, elytris obsolete striatis, interstitiis rugosis, puncto disci albo-piloso.

*Fabr. Eleut. 2. 442. 16.*

*Curculio bimaculatus. Herbst. Col. 6. 291. 262.*

*Tab. 82. f. 8.*

Habitat in plantis aquaticis rarius.

Descr. Magnitudo & statura praecedentis. Caput parvum nigrum nitidum laxe, subtiliter punctatum, oculis depressis brunneis; rostrum capite cum thorace fere longius, valde arcuatum atrum nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ rostro cam capite fere longiores, tenues, piceæ, extorrisque pubescentes. Thorax latitudine medii paullo brevior, antice sub-sinuatus, basi truncatus, lateribus rotundatus, supra minus convexus, niger, crebre & profunde rugoso-punctatus, pilis fusco-griseis depressis adspersus, in medio linea sub-elevata angusta laxe instructus; intra latera utrinque linea obliqua subarcuata e pilis griseis condensatis. Scutellum parvum triangulare fuscum; Elytra thoracis medio vix latio-

tiora, sed illo quadruplo longiora, supra modice convexa, nigro-fusca opaca, pilis crebris depresso-fuscis adpersa, obsolete punctato-striata, intersticiis confertissime transversim rugoso-granulatis; paulo pone medium, versus suturam, punctum parvum distinctum albido-pilosum. Corpus subtus nigrum, magis nitidum, crebre punctatum, parce pubescens. Pedes mediocres validi pubescentes, femoribus nigris, tibialis tarsisque fusco-piceis.

10. *R. acridulus*: niger, griseo-pubescentes; antennis pedibusque rufo-piceis, rostro longissimo arcuato, atro, elytris profunde punctato-striatis, intersticiis rugosis.

*Fabr. Eleut. 2. 454. 79.*

*Circulus acridulus*. *Linn. Syst. 2. 607. 13. En.*  
*Sv. 584. Herbst. Col. 6. 272. 244. Tab. 81.*  
*f. 1. De Geer Ins. 5. 235. 22. Payk. fn. 3.*  
*238: 56. Panz. fn. 42. f. 10.*

Var. b, Elytris puncto posteriori albido.

*Rhynchænus punctum*. *Fabr. Eleut. 2. 442. 17.*

*Circulus rigidus*. *Marth. Ent. Br. 1. 270. 97.*

Habitat in humidis, praesertim in plantia *Tetradynamis*, frequens.

Descr. Statura & similitudo praecedentis, sed duplo, itmo triplo minor. Caput mediocre convexus nigrum nitidum, sat profunde punctatum, oculis depresso-brunneis; rostrum capite cum thorace sere longius, arcuatum nigrum nitidum punctulatum, & in masculis striatum. Antennæ rostro cum capite longiores, rufo-ferrugineæ, extrosim fusce

*fuseo-piceæ pubescentes.* Thorax latitudine sere brevior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra minus convexus, niger vel nigro-piceus, tenuis pubescens, creberrime profunde punctatus, linea media sub-elevata lœvi. Scutellum parvum rotundatum piceum. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, & illo triplo longiora, supra dorso parum convexa, postice declivia, plerumque dilutius nigropicea, e pube densiori fuscementia, sat profunde crenato-striata, interstitiis subtilius transversim rugulosis vel coriaceis. Corpus subitus nigrum sub-nitidum, crebre & profunde punctatum, parum pubescens, ano piceo. Pedes longiusculi pubescentes, aut dilutius rufo-testacei, aut femoribus obscurens piceis.

Vár. b, in omnibus simillima, differt tantum punto piloso cinereo paullo posse medium eujusvis elytri, versus futuram,

ii. R. Festucæ: oblongus fuscus, dense cineo-squamosus, rostro longissimo tenui arcuato, pedibusque rufo-ferruginea.

*Curculio Festucæ.* Herbß. Col. 6. 327. 328.  
Tab. 85. f. 13. Payk. fn. 3. 239. 57.

*Curculio Caricis.* Thunb. Mus. Upf. App. 6.  
p. iii.

*Curculio inquisitor.* Herbß. Col. 7. 42. 600.  
Tab. 97. f. 12. G. sorte idem.

Habitat in *Caricis* acutæ floribus, allisque plantis aquaticis, in fluvialibus & lacubus passim.

Descri

Descr. Statura Rh. æthiopis, sed plerumque diffidio minor. Caput breve latum nigro-fuscum opacum, subtilissime punctulatum, pube & squamulis minutis griseis tectum, oculis magnis ovatis brunneis, parum prominulis; rostrum capite cum thorace fere longius, valde arcuaturn, tenue, rufo-ferrugineum nitidum, subtilissime punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, piceæ, clava pubescente. Thorax basi apiceque truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, supra parum convexus; fuscus opacus, creberrime subtiliter & obsolete punctulatus, lateribus & subtus squamulis minutis cinereo-albidis tectus, dorso medio longitudinaliter magis nudo fuscus, pilis tenuibus griseis adsperso. Scutellum parvum rotundatum, squamulis albidis tectum. Elytra thoracis medio vix latiora, sed illo quadruplo longiora, apicem verlus attenuata, supra dorso parum convexa, fusa opaca, obsolete punctata-striata, interstitiis subtilissime coriaceis, squamulis minutis cinereo-albidis, in illæsis iadividuis omnino tecta, saepe vero hinc inde magis denudata, unde fuscoc-variegata evadunt; in his tamen macula ovata in medio baseos, & alia obliqua paullo pone medium juxta suturam, semper densius squamuosa, unde elytra quadri-maculata appareant, ut in figura Herbstii. Corpus subtus nigro-fuscum, subtiliter crebre punctulatum, pectoris & abdominis lateribus dense albido-squamulosus, ventris medio magis nudo. Pedes elongati tenues tufo-testacei, paroe pubescentes.

12. R. nereis: linearis-elongatus fuscus, supra obscure ferrugineus, dense cinereo-squamulosus, rostro longissimo tenui, pedibusque rufo-ferrugineis, clytris antice piceis.

Cup:

*Curculio nereis.* Payk. fn. 3. 240. 58.

Habitat in plantis aquaticis Scaniæ, rarius  
Dom. Fallén.

Descr. Præcedenti duplo minor, præterim angustior, linearis, ceterum in multis simillimus & aequalis. Caput breve, latum fusco-ferrugineum punctulatum, pubes & squamulis cinereis adspersum, oculis magnis ovatis nigro-brunneis; rostrum longitudine capitis cum thorace, valde terue, arcuatum; rufo-ferrugineum sub-læve. Antennæ ante medium postri insertæ, & illo cum capite longiores, terues, fusco-ferrugineæ, clava obscuriori. Thorax hæsi apiceque truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, supra parum convexus, fusco-ferrugineus vel brunneus opacus, crebre subtiliter rugoso-punctatus, lateribus & subtus dense albido-squamulosus, dorso medio longitudinaliter denudato. Scutellum parvum rotundatum nigrum, cinereo-squamulosum. Elytra thoracis medio vix latiora, sed quadruplo longiora, angusta, apice attenuata, supra parum convexa, obsolete crenato-striata, interstitiis subtiliter coriaceis; lateribus & postice late rufo-ferruginea opaca, dense cinereo-squamulosa, plaga dorsali communis ab assi ad medium magis denudata nigro-picea. Corpus subtus fusco-piceum, creberrime punctulatum, petoris & abdominis lateribus dense albido-squamulosis, ventris medio obscuriori sub-nudo. Pedes elongati rufo-ferruginei pubescentes, femoribus subtus macula nigricante.

33. R. *Cylindrus: linearis-elongatus nigricans, cinereo-squamulosus, antennis tibiisque fusco-ferrugineis, rostro mediocri arcuato atro, elytris postice compressis.*

Cura

*Curculio cylindrus.* Payk. fn. 3. 241. 60.

Habitat in Scapiæ Lemna, aliisque plantis aquaticis passis. Dom. Fallén.

Descr. Parvus, angustus, Rh. indigena paullo longior, sed non latior. Corpus reapse nigrum, sed plerumque argilla & luto tectum, ut & squamulis vel pubescentia subtilissima adspersum, unde griseum appareat. Caput rotundatum nigrum, parum convexum, crebre subtiliter punctulatum, oculis parvis brunneis, rostrum thorace paullo brevius, deflexum, arcuatum, atrum nitidum lœve, apice piceum. Antennæ longitudine rostri cum capite, tenues, piceæ, vel fuscæ ferrugineæ. Thorax latitudine longior, juxta ipsum apicem transversim impressus, angustior, lateribus ante medium dilatatus, dein nonnihil angustatus, basi truncatus, supra parum convexus, nigro-fuscus, creberrime subtiliter punctulatus. Scutellum parvum fuscum. Elytra thoracis antico vix latiora, sed illo triplo longiora, versus apicem attenuata, compressa, supra modice convexa, nigro-fusca opaca, obsolete punctato-striata, intersticiis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum, subtiliter crebre punctulatum, squamulis cinnereis, præsertim versus latera tectum. Pedes mediocres, femoribus clavatis nigris, interdum basi fuscop-testaceis, tibiis fuscæ-ferrugineis, tarvis fuscis.

14. R. T. album: linearis elongatus niger nitidus, pectoris abdominisque lateribus subitus albo-squamosis, rostro mediocri incurvo.

*Curculio T. album.* Linn. Syft. 2. 609. 23. Fn. Sw. 594.

Cur-

*Curculio funereus.* Herbst. Col. 6. 164. 122.  
Tab. 71. f. 3.

*Curculio atriplicis.* Payk. In. 3. 243. 62.

*Curculio hypoleucus.* Marsh. Ent. Br. 1. 274.  
109.

*Curculio Geoffr.* Ins. I. 285. 17.

Habitat in plantis & gramine, locis humi-  
dis, pessim.

Descr. Longitudo fere Rh. scribuli, sed duplo angustior, linearis, statura Rh. nereidis. Caput rotundatum convexum nigrum nitidum, subtiliter punctulatum, oculis depressis nigro-brunneis; rostrum vix longitudine thoracis, deflexum, valde arcuatum, atrum nitidum laxe. Antennæ longitudine rostri cum capite, crassiusculæ nigrae, clava magna ovata apicea. Thorax latitudine fere longior, antice angustior, in medio rotundato-dilatatus, supra sub-depressus, niger nitidus, crebre & sat profunde punctatus, lineola media angusta laxe, versus latera pilis tenuissimis griseis adpersus. Scutellum minutum rotundatum nigrum. Elytra latitudine thoracis, & illo triplo longiora, linearia, apice rotundata, supra perparum convexa, nigra nitida, regulariter & sat profunde striata, striis sub-laxeibus, interstitiis planis, punctis minimis, seriatim digestis; e quovis punctulo, in illæsis individuali, setula minuta grisea enascitur, unde setulæ istæ etiam striatim positæ. Thorax subtus niger punctatissimus, parce albido-squamulosus; pectus & abdomen squamulis densis albis, interdum flavescens, testa, relicta area media longitudinali, nuda nigra nitida punctulata. Pedes mediocres toti nigri, femoribus clavatis.

Obs. Lixus atriplicis, Fahr. Elent. 2. 504. 31.  
huc non pertinet, secundum tententiam Dom. Illige-  
ri, in Mag. 4. 151. 31. 15 R.

15. R. Artemisiæ: niger nitidus glaber, rostro mediocri valde arcuato, thorace profunde punctato, elytris striatis, interstitiis seriatim punctatis.

Fabr. Eleut. 2. 456. 92.

Curculio Artemisiæ. Herbst. Col. 6. 101. 61.

Tab. 66. f. 5. Payk. fn. 3. 237. 55. Panz.  
fn. 18. f. 10.

Habitat in culmis & juxta radices Artemisiæ vulgaris; in agris arenosis Westrogothiæ paßim.

Deser. Præcedenti similis, sed brevior & latior, totus niger glaber. Caput breve conxexum nigrum, subtiliter punctulatum, oculis ovatis depresso nigro-brunneis; rostrum fere longitudine thoracis cum capite, crassiusculum, deflexum, valde arcuatum, nigrum subtiliter crebre punctulatum. Antennæ vix rostro cum capite longiores, crassiusculæ nigrae, basi piceæ; clava pubescente. Thorax antice multo angustior, coarctatus, sed mox pone apicem dilatatus, basi sat profunde bi-sinuatus, supra parum convexus. totus niger nitidus, crebre & valde profunde punctatus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thoracis basi paulo latiora, humeris prominulis, sed illo vix triplo longiora, supra modice convexa, tota nigra nitida, profunde regulariter striata, striis vix visibiliter crenato-punctatis; interstitiis latis planis, singulis serie regulari e punctis parvis impressis. Corpus sub-tus nigrum nitidum, crebre, & antice profundius punctatum. Pedes breviusculi nigri punctati, tarsis piceis.

16. R.

Ins. Svec. T. I. P. III. E

16. R. Pruni: niger sub-opacus, antennis ferrugineis, rostro breviori recto, thorace bi-tuberculato, elytris elongatis sub-cylindricis crenato-striatis.

*Fabr. Eleut.* 2. 447. 45.

*Curculio Pruni.* Linn. *Syst.* 2. 607. 12. Payk.  
fn. 3. 246. 65.

*Curculio erythroceros.* Herbst. *Col.* 6. 73. 36.  
*Tab.* 64. f. 6.

*Curculio incognitus.* Herbst. *Col.* 6. 97. 57.  
*Tab.* 65. f. 13, mas, vel var. minor.

Habitat in Pruni, Cerasi & Padi foliis  
frequens, Larva gelatinosa, Limacitor-  
mis.

Descr. - Longitudo Rh. T. albi, sed crassior,  
præsertim postice; variat etiam duplo, imo triplo  
minor. Caput magnum latum convexum nigrum,  
crebre obsoletius punctulatum fronte inter oculos  
angusta impressa; oculi magni prominuli brunnei,  
post mortem saepè albantes; rostrum vix capite  
longius, rectum, crassiusculum cylindricum nigrum  
punctulatum, apice nitidum. Antennæ rostro cum  
capite paullo longiores, crassiusculæ ferrugineæ,  
clava magna ovata cinereo-pubescente. Thorax  
longitudine latior, antice angustatus, in medio ro-  
tundato-dilatatus, basi sub-truncatus, angulis pro-  
minulis; supra parum convexus, totus niger opa-  
cus, creberrime punctato-granulatus, pilis paucis  
minutis adspersus; in medio antico canaliculæ rudi-  
mentum, & versus latera utrinque tuberculum ele-  
vatum

vix obtusum; ante basin utrinque striga abbreviata impressa. Scutellum rotundatum nigrum punctatum. Elytra magna, antice thorace fere dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, sub cylindrica; vel posterius nonnihil dilatata, apice singulatim rotundata, supra convexa, tota nigra, sub nitida, profunde crenato-striata, interstitiis angustis convexis rugosopunctulatis. Thorax subtus & pectus nigra opaca, confertissime punctata; venter magis nitidus, parce & obsolete punctulatus. Pedes mediocres nigri, tarsis piceis.

17. R. Rhina; niger sub opacus, rostro breviori recto, thorace sub mutico, elytris elongatis sub cylindricis crenato striatis, antennis nigris, clava longissima.

*Rhina Cerafi.* Lalreille in Illig. Mag. 3. 104?

Var. b. Antennis ferrugineis, clava longissima fusca.

Habitat cum praecedenti, rarus.

Deser. Praecedenti si millimus & nimis affinis, structura & colore antennarum fere unice distinctus. Caput, oculi, rostrum, ut in priori omnino. Antennæ rostro cum capite multo longiores, crassifolæ, nigrae, clava maxima fuscopubescente triarticulata, longitudinem fere dimidiam totius. Antennæ æquante. Thorax paulo brevior & latius videtur, ceterum ut in praecedenti, etiam quoad puncturam & colorem, supra subdepressus, hinc inde foveolatus, inæqualis, tuberculis lateralibus vix observandis. Scutellum ut in priori. Elytrorum forma eadem, tota nigra opaca, profunde crenato-

striata, interstitiis confertissime rugulosa; Corpus & pedes ut in praecedenti omnino.

Var. b, differt tantum antennis inferne ferrugineis, clava elongata fusca; elytra etiam paulo magis nitida, minus rugulosa.

18. R. bi-nodus: niger, dense fusco-squamulosus; rostro breviusculo arcuato, elytrorum interstitiis alternis elevationibus, posterius acute callosis, tibialis arcuatis apice ferrugineis.

*Curculio bi-nodus.* Herbst. Col. 6. 247. 211.

Tab. 77. f. 15.

*Curculio atrirostris.* Payk. fn. 3. 227. 45. var. major.

Habitat in plantis aquaticis apud nos rarius.

Descr. Magnitudo Rh. Runicis. Caput primum retractum, parum convexum, nigrum, squamulis fusco-griseis, & luto adglutinato omnino testum, crebre rugolo-punctulatum, fronte inter oculos canaliculata; oculi ovati nigri, parum prominenti; rostrum thorace fere brevius, crassum, arcuatum, nigrum sub-nitidum, crebre subtilissime punctulatum. Antennæ capite cum rostro paullo longiores, tennes, ferrugineæ, clava ovata fusca. Thorax sub-cylindricus, antice pro receptione capitis late emarginatus, paullo pone apicem transversim impressus, unde margo elevatus videtur, basi truncatus, supra parum convexus, niger, squamulis fusco-cinereis tectus, crebre subtiliter punctulatus, canalicula media obsoleta exaratus. Scutellum parvum rotun-

rotundatum; griseo squamosum. Elytra thorace fere duplo latiora, humeris prominulis, & illo fere quadruplo longiora, apicem versus attenuata, dorso antico depressa, posterius valde declivia, tota nigra, squamulis fusco-cinereis omnino testa, obsolete punctato-striata, interstitiis creberrime subtilissime coriaceis; interstitia alterna, nempe 2, 4 & 6 a sutura, magis elevata, quarum secundum pone medium in tuberculum sub-acuminatum exaltatur, & quartum apicem proprius tuberculum simile emittit; sextum antennae in humero elevato-carinatum; apex elytrorum pone tubercula valde declivus. Corpus subitus nigrum, crebre subtiliter punctulatum, squamulis & luto uti supra tectum. Pedes elongati tenues, femoribus nigris, basi valde attenuatis, apicem versus clavatis, tibiis longis valde arcuatiss., basi nigris apice ferrugineis, spina arcuata acuta armatis, tarfis elongatis rufo-piceis.

19. R. luteolus; niger, cinereo-squamulosus, pedibus ferrugineis, rostro breviusculo arcuato, elytris apice attenuatis, callo unico obtuso, tibiis arcuatiss.

*Curculio colligenensis.* Herbst. Col. 7. 50. 608.

Tab. 98. f. 7. C.?

Habitat ad ripas aquarum rarius.

Deser. Statura & summa affinitas praecedens, sed quadruplo minor, aliter squamosus, & callo elytrorum tantum uno praeditus. Caput parvum retractum nigrum, subtilissime punctulatum, cinereo-squamulosum, fronte inter oculos obsolete impressa; oculi parvi brunnei, parum prominuli; rostrum longitudine fere thoraci, crassiusculum attenuatum nigrum, subtilissime punctulatum, a basi ul-

tya medium squamulis fusco cinereis tectum, apice nudum. Antennæ rostro cum capite fere longiores, tenues, ferrugineæ, clava nigricante. Thorax latitudine brevior, prope apicem transversim profundè impressus, margine antico elevato, supra parum convexus, niger, crebre subtiliter punctulatus, in medio obfolete canaliculatus, squamulis pallide cinereis testus, lineis duabus latis dorsalibus obscurioribus approximatis. Scutellum minutum cinereo-squamulosum. Elytra thorace dimidio latiora, humeris prominulis, & illo fere quadruplo longiora, apicem versus valde attenuata, dorso antico parum convexa, postice declivia, sutura elevata-carinata; nigro-fusca, obsoletius punctato-striata interstitiis confertissime subtiliter coriaceis; interstitia alterna parum elevatione, & quartum a sutura posterius in tuberculum satis magnum elevatum; latera elytrorum inæqualiter pallidius cinereo-squamulosa, dorso longitudinaliter magis fusco. Corpus subtus nigrum, subtiliter punctulatum, squamulis cinereis omnino tectum. Pedes elongati tenues, fusco-testacei, structura omnino ut in præcedenti.

20. R. lutulentus: niger, squamulis cinereis variegatus, tibiis arcuatis ferrugineis, rostro breviuscule arcuato, elytris apice obtusis, callo obsoleto.

Var b, fusco-niger unicolor, tibiis solis ferrugineis.

*Circulus atrirostris*, var. *pygmaea*. Payk. fm. 3. 227 45  
Var. c, cinereo-variegatus, antennis inferne ferrugineis.

*Circulus tempestivus*. Herbst. Col. 246. 210.  
Tab. 77. f. 14.

Habitas in argilla & luto, juxta aquas,  
pasim. Descr.

Descr. Proxime præcedenti iterum simillimus & valde affinis, sed adhuc duplo minor & ultra, elytris apice obtusioribus, futura non carinata, callo postico minori, &c. ut videtur distinctus. Caput, oculi, rostrum, ut in præcedenti omnino. Antennæ vix rostro cum capite longiores, crasiusculæ, totæ nigrae, articulo primo apice crassiori, & clava apicis majori, quam in præcedenti. Thoracis structura ut in priori omnino, supra fuscus, linea dorsali angusta, & lateribus late pallidius cinereo-squamofis. Elytra thorace dimidio latiora, humeris prominulis, thorace vix quadruplo longiora, apice rotundata, parum attenuata, supra antice sub-depressa, apice obtuse declivia, futura non carinata, tota nigro-fusca, obsoleto punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis, versus latera late inæqualiter cinereo-squamulosa, dorso magis nudo obscuræ; interstitia alterna nonnihil elevata, & quartum & futura postice in tuberculum obsoletum desinens. Corpus subitus ut in priori. Pedum structura etiam eadem, femoribus clavatis nigris, tibiis arcatis ferrugineis, tarsis fuscis.

Var. b, differt corpore foto nigro-fusco squamulis nullis pallidius cinereis, quæ forte in his detrita; tibiæ fulco-ferrugineæ.

Var. c, omnino ut a, sed antennæ ferrugineæ, apice articuli primi, & clava terminali nigro-fuscis; femora etiam interdum basi ferruginea.

21. R. Alismatis: niger, squamis cinereo-albidis variegatus, rostro breviuseulo subrecto, thorace utrinque impresso, elytron interstitiis planis, tibiis arcuatæ testaceis.

*Cur-*

*Curculio Alijmatiſ. Marsh. Ent. Br. I. 273.  
103.*

Habitat in plantis aquaticis, præfertim aliſ-  
mate plantagine, non infrequens.

Descr. Magnitudo, statura & affinitas proxime  
præcedentis, attamen in pluribus diversus. Caput  
breve retractum nigrum, squamis cinereo-albidis o-  
mnino tectum, quibus detritis, superficies subtiliſ-  
me punctulata videtur; frons inter oculos sulco  
abbreviato profunde impressa; oculi depreſſi nigro-  
brunnei; rostrum longitudine fere thoracis, sub re-  
ctum, nigrum squamulis ſimilibus uti caput tectum,  
apice nudum, punctulatum. Antennæ vix capite  
cum rostro longiora, crenulæ, ferrugineæ, ar-  
ticulo primo apice incrassato fuſco-picco, & cla-  
va magna nigra. Thorax angustus, longitudine non  
latior, antice late emarginatus, margine sub-eleva-  
to, ſaepè pallescente, intra apicem obſoletiſſime im-  
pressus, ſupra parum convexus, crebre ſubtiliter  
punctulatus, in medio leviter canaliculatus, & ver-  
ſus medium marginis utinque foveola obſoleta im-  
pressus; totus niger, squamis denſis cinereo-albidis  
veſtitus, relictis lineis duabus latis dorsalibus ap-  
proximatis denudatis nigris. Scutellum parvum ro-  
tundatum cinereo pubefcens. Elytra thorace fere  
duplo latiora, humeris prominulis, & illo plus tri-  
plo longiora, apice ſub-attenuata, ſupra parum con-  
vexa, obſoleto punctato-striata, interſtitia ſubtiliſſi-  
me coriacea; tota nigra, squamulis cinereo-albi  
dis tefta, relictis in dorſo maculis plurimis diſfor-  
midibus nigris; in medio dorſi verſus futuram macu-  
la composita obliqua reliquis albidiōr; interſtitia ſtri-  
arum plana æqualia, ſed quartum a futura poſtice in  
tuberulum vel callum elevatum. Corpus ſubtus  
squamis denſis cinereo-albidis omnino tectum, ob-  
ſole-

folete punctulatum. Pedes elongati tenues, obscure testacei, femoribus extrorsum clavatis apice nigrantibus, tibiis valde arcuatis, saepe medio infuscatis, tarsis nigro-fuscis.

22. R. costatus; niger dense cinereo-squamulosus, rostro brevi recto, thorace tri-punctato, elytris lineis tribus elevatis, calloque didymo, tibiis rectis.

Habitat in littoribus Scaniæ rarius. Dom.  
Fallén,

Descr. Statura & similitudo præcedentium Rh. lutoso paullo minor, et distinctus. Caput parvum retractum, squamis cinereis tectum, oculis parvis brunneis; rostrum vix longitudine thoracis, crassum, rectum, punctatum, squamis cinereis tectum, apice nudo nitido. Thorax longitudine latior, antice late emarginatus, postice sub-sinuatus, supra parum convexus, pone apicem punctis tribus sat profundis, transversim positis, impressus, in medio obsoletè canaliculatus, crebre punctatus, niger, totus squamis cinereis tectus. Scutellum parvum fuscum. Elytra thorace fere duplo latiora, humeris valde prominulis, & illo plus triplo longiora, supra parum convexa, postice declivia, nigra, tota squamulis cinereis tecta, obsoletè punctato-striata, interstitiis alternis, 2, 4 & 6 a sutura, angustis, elevato-carinatis, postice in callum magnum didymum concurrentibus. Corpus totum subtus squamulis cinereo-albidis, & præterea pilis rigidis depresso-sparsis, omnino tectum. Pedes longiusculi validi fuscii, squamulis cinereis variegati, tibiis brevioribus omnino rectis.

gustata, nuda, nigra. Scutellum parvum oblongum albido-squamosum. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, humeris prominulis, & thorace triplo longiora, apice attenuata, dorso antico parum convexa, in-aequalia, posterius declivia, tota nigra opaca, evidenter punctato-striata, interstitiis confertissime subtiliter coriaceis; margo exterior ab humero versus medium inæqualiter, & apex late, ad tertiam partem totius elytri, squamis similibus uti thorax testa, relicta area magna antica communi lobata altera, interdum punctis sparsis albidis contaminata, quarum unum utrinque versus medium futuræ, oblongum, transversum, reliquis magis conspicuum; interstitia alterna, 2, 4 & 6 a futura, anterius magis elevata, sed interrupta, unde exstant tubercula oblonga, fériatim dilatata. Corpus subtus nigrum, confertissime punctulatum, pectoris lateribus late, ventris marginibus angustius albo-squamosis. Pedes mediocres, femoribus clavatis nigris, annulo albo-squamoso, tibiis obscure ferrugineis, apice albo-pilosis, tarolis nigro-fuscis.

25. R. Atri-rostris; niger, dense cinereo-squamosus, rostro longissimo atro, thoracis globosi, elytrorumque dorso antico obscurioribus.

*Fabr. Elsut.* 2. 445. 34? *Herbst. Col.* 6.  
443. 439.

Habitat in Lapponia. Dom. Forsström.

Descr. Statura & summa affinitas praecedentis, sed paullo minor, squamulis obscurius cinereis, dorsum thoracis & elytrorum etiam occupantibus, fere unice distinctus. Caput ut in praecedenti, squamis angu-

angustis cinereis tectum; oculi, rostrum & antennæ ut in præcedenti omnino. Thoracis structura & punctura eadem, subtus & lateribus squamulis densis cinereo-albidis tectus, dorso medio obscuriori squamulis paucioribus angustis piliformibus depresso. Elytrorum forma, striæ, punctura & color ut in priori, sed undique squamulis cinereis obducta, relictis tantum in area dorsali antica maculis sparsis magis denudatis fuscis, quarum nonnullæ sub-elevatæ. Corpus & pedes ut in præcedenti omnino. Vix fatis distincta species.

26. *R. brunni-rostris*: niger, squamulis & pilis cinereis tectus, rostro longissimo arcuato glabro, pedibusque obscure ferrugineis, elytris æqualibus striatis.

*Fabr. Eleut.* 2. 445. 35.

*Curculio brunnirostris.* *Herbst. Col.* 6. 444. 440.

Habitat in Scania ad Esperöd. *Dom. Fallén.*

Descr. Statura fere *Rh. Equiseti*, sed duplo minor elytris non tuberculatis, totis squamulis & pilis cinereis tectis, ut & colore rostri & pedum distinctus. Caput parvum retractum convexum nigrum, crebre punctulatum, squamulis angustis, & pube rariori cinerea adspersum, oculis ovatis depressis brunneis; rostrum longitudine dimidii corporis, valde arcuatum, rufo-brunneum, nitidum, glabrum, subtiliter punctulatum. Antennæ rostro cum capite fere longiores, tenues ferrugineæ, clava nigro-fusca acuminata. Thorax basi apiceque truncatus, lateribus æqualiter rotundatus, supra valde convexus, pulvinatus, nigro-fuscus, obsoletius granulato-punctulatus, dorso toto pube cinctus.

rea depreſſa adaspersus, lateribus & subtus squamuſis concoloribus tectus. Scutellum parvum elevatum fulcum. Elytra thoracis basi duplo latiora, humeris prominulis, & illo triplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, fulca, punctatostriata, interſtitiis æqualibus convexis ſubtiliſſime coriaceis; ſquamuſis, denuo cihereis tecta, & praeterea pilis concoloribus feriatis, adpersa. Corpus subtus nigrum opacum, confertiflme punctatum, parce ſquamulofum, ano piceo. Pedes elongati, toti ferruginei pubefcentes, femoribus clavatis.

27. *R. Ruminis*: niger, ſquamulis cinereo-albidis nitentibus variegatus, roſtro breviori ſub-recto, thorace ſub-cylindrico, lanneis duabus fulcīs,

*Fabr. Eleut. 2. 456. 93.*

*Curculio Ruminis. Linn. Syſt. 2. 614. 60. Fn. Sv. 590. De Géer Inv. 5. 231. 20. Tab. 7. f. 10-16. Herbft. Col. 6. 241. 205. Tab. 77. f. 9. Payk. Fn. 3. 229. 47.*

Var. b, dorſo elytrorum denudato nigro, macula oblonga obliqua albo-squamofa juxta ſuturam utrinque.

*Curculio Acetosæ. Panz. Fn. 42 f. 9. Criz. Rev. 1. 127.*

Var. c. Squamuſis pallide brunnens vel testaceis variegatus. Payk. loc. cit. var. b.

Var. c. Thorace elytrisque fere totis ſquamulis cinerascentibus tectis, vix vel parum fulco-variegatis. Payk. loc. cit. var. c.

Habbi-

Habitat in solis Ruminis acuti, crissi, ziliorumque, ubique vulgaris, folia subitus exedendo commaculans.

Descr. Medius, Rh. Polygoni fere aequalis. Corpus parvum nigrum, crebre punctulatum, squamulis angustioribus cinereo-albidis nitidis tectum; oculi ovati depresso-brunnei; rostrum maris thorace fere brevius, crassiusculum, rectum, nigrum, crebre punctulatum, pilis rigidis depresso-cinereis tectum; feminae paucio longius, magis nudum. Antennae capite cum thorace fere longiores, crassiusculae, obscurae ferrugineae, extrosum nigro-fuscae, clava oblongo-ovata. Thorax sub-cylindricus, lateribus parum rotundato-dilatatus, bafi apiceque truncatus, supra minus convexus, niger opacus, confertissime punctulatus, subtus & lateribus dense albido-squamulosus, dorso longitudinaliter magis denudato nigro-fusco, linea media angusta squamulosa in striae duas latus diviso. Scutellum minutum triangulare albo-squamulosum. Elytra thorace fere duplo latiora, humeris prominulis, & illo plus triplo longiora, supra parum convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis omnium subtilissime obsolete coriaceis; tota squamulis densis cinereo-albidis testa; relicta area sub-quadrata circum scutellum, ut & punctis maculisque sparsis denudatis nigris. Corpus subtus nigrum, obsolete punctulatum, pube & squamulis cinereo-albidis nitidis dense obductum. Pedes mediocres nigri, cinereo-pubescentes & squamuosi, tibiarum apice tarsisque interdum fusco-ferrugineis.

Var. b, differt tantam plaga dorsali elytrorum denudata nigra majori, cum macula distinctiori oblonga, antrosum obliqua, juxta suturam utrinque

Var.

Var. c, colore squamularum aut testaceo, aut pallide brunneo, tantum differt.

Var. d, thoracem & elytra gerit fere unicoloria, squamulis cinereo-albidis undique obducta; dorsum thoracis, & regio scutellaris elytrorum tamen obscuriora, parcus squamulosa.

Obs. Cl. a Linné Curc. cervinum forte cum hac specie confudit, dum in Systemate illi femora dentata tribuit, quarum in Fn. Sv. nulla fit mentio.

28. R. Pollux: niger; squamulis cinereo-albidis nitentibus variegatus, rostro breviori sub-arcuato, elytris lineis tribus distinctioribus albis, nigro-tesselatis.

Fabr. Eleut. 2. 457. 94.

*Curculio commaculatus.* Herbst. Col. 6. 230.  
194. Tab. 76. f. 8.

*Curculio Ruminis.* Payk. fn. 3. 229. 47. var. d.

*Curculio interruptus.* Marsh. Ent. Br. 1.  
269. 95.

Var. b, Squamulis cupro-æneis variegatus.

Habitat in plantis & gramineis pasim, non vero præcedenti mixtus.

Deser. Statura & magnitudo præcedentis, cui valde affinis, diversus tamen videtur, rostro nonnihil arcuato, thorace paullo magis dilatato, & elytrorum signaturis. Caput & oculi ut in præcedenti omnino; rostrum paullo magis arcuatum, ceterum simillimum. Antennæ ut in illo omnino. Thorax lateribus paullo magis rotundato-dilatatus videtur. alias

miss ut in priori omnino. Elytrorum forma, striae & punctura eadem, sed indumentum squamu-  
losum diversum; interstitium tertium, sive inter striae 2 &  
3 a sutura, ab apice fore ad basim usque reliquis  
magis albo-squamulosum, maculis sub-quadratis ni-  
gris tessellatum; reliqua dorsalia parcus & obscu-  
rius squamu-losa, maculis denudatis plurimi irregularibus  
sparsis; interstitium quintum basi tinctum,  
septimum & nonum vero tota magis albida, nigra  
maculata; octavum & extimum obscurius squamosa  
immaculata. Corpus subitus & pedes ut in praeces-  
tenti omnino.

Var. b, differt tantum colore squamularum capi-  
pore vel zeno, magis nitido.

29. *R. miles*: apterus niger, dense cinereo-  
pubescens & squamu-losus, rostro brevio-  
ri arcuato, thorace convexo utrinque ro-  
tundato, elytris fusco punctatis.

Femina: Elytris latioribus, posterius sub-  
depressis.

*Curculio miles*. Payk. fa. 3. 233. 37.

*Curculio suspiciosus*. Herbst. Col. 6. 265. 234.  
Tab. 80. f. 3.

*Curculio bi-teniatus*. Marsh. Ent. Br. 1. 268. 93.

Mas: paullo minor, elytris multo angu-  
stioribus.

Habitat in plantis & gramine, locis aridis,  
etiam sub lapidibus tempore vernali, si-  
frequens.

Deser. Femina Rh. Ruminis paullo major,  
latior, thorax convexior, magis dilatatus, &c. Ca-  
put breve convexum nigrum, crebre punctulatum,  
tenue griseo-pubescentia, fronte inter oculos canali-  
culatus;

*Sc. Svec. T. I. P. III.* 2

culata; oculi depresso Brunnei; rostrum vix longitudine thoracis, crassiusculum, arcuatum, nigrum, punctulatum, griseo pubescentia, apice glabrum nitidum. Antennæ capite cum rostro longiores, ferrugineæ, clava oblonga fusca. Thorax basi apiceque truncatus, lateribus valde rotundato-dilatatus, supra mandice convexus, niger, creberrime punctulatus, subtus & lateribus squamulis angustis piliformibus cinereis, saepe metallico-nitentibus tectus; dorso obscuriori magis hudo, cum linea angusta media e pilis nitidis. Scutellum minutum angustum picsum. Etra thoracis basi fere duplo latiora; humeris rotundatis, & illo triplo longiora, apice rotundata, supra anterius sub-convexa, a medio ad apicem deplacata, nigra, evidenter punctato-striata, interstitiis subtilissime obsolete coriaceis; tota squamulis, piliformibus depressis nitidis, aut cinereis, aut brunneo-metallicis tecta; in singulo elytro series quinque e maculis parvis fuscis denudatis, quarum prima juxta suturam, reliquæ in interstitiis alternis locatæ. Corpus subtus nigrum punctulatum; squamulis minutis argenteo-micantibus tectum; venter feminæ segmentis quinque constat, quarum ultimum paullo longius, apice rotundatum. Pedes validi nigri, cinereo-pubescentes, ungibus ferrugineis.

Mas: minor, praesertim multo angustior, elytris posterius compressis; rostrum apice canaliculatum; venter segmentis Sex compositus, quarum penultimum praecedentibus latius, in medio rotundato-productum, ultimum angustum sinuatum; cæterum feminæ simillimus, saepe in copula captus.

30. R. pedestris: apterus niger, pube squamulisque cinereis æqualiter obductus, rostro breviori arcuato, thorace convexo utinque rotundato.

*Curculio pedestris.* Payk. fn. 3. 233. 50.

Habitat in Scania, Hallandia, rarius.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas præcedentis, etiam secundum Sexum. Caput, oculi, rostrum, antennæ, ut in præcedenti omnino. Thoracis structura, color & punctura eadem, sed pubescens rarius, tenuior, æqualiter sparsa, versus latera vel in medio in lineas condensata. Scutellum ægre observandum, tamen adest, nisi minutissimum, elytris arte applicatum. Elytrorum forma in utroque sexu, ut & illarum color, striæ & punctura ut in priori, sed pubescens & squamulis minutiores, parviores, absqve maculis denudatis. Corpus subtus & pedes ut in præcedenti omnino.

Obs. Species dubia & obscura, vix a præcedenti distingvenda.

gr. R. elongatus: apterus niger, cinereo-pubescent, rostro breviori arcuato, thorace rotundato sub-trilineato, elytris elongatis, obsolete fulco-maculatis.

*Curculio elongatus.* Payk. fn. 3. 236. 53.

Habitat in Svecia meridionali rarius. Dom. de Paykull.

Descr. Præcedentibus iterum valde affinis, sed Rh. milite major, præsertim in elytris multo longior. Caput breve convexum nigrum, subtiliter punctulatum, tenue griseo-pubescent, fronte inter oculos plana; oculi ovati & pressi brunnei; rostrum longitudine fere thoracis, crassiusculum, sub-arcuatum, nigrum, punctulatum, obsolete carinatum, tenui pubescens. Antennæ capite cum rostro multo longiores,

res, eratiusculæ, ferrugineæ, clava oblonga acuminata nigro-fusca. Thorax basi apiceque truncatus, lateribns rotundatus, supra minus convexus, totus niger, creberime punctulatus, tenue griseo-pubescentia, in medio obsolete canaliculatus, linea media angusta. & alia lateralí latiori utrinque cinereis obsoletioribus. Scutellum parvum depresso nigrum. Elytra thoracis basi vix duplo latiora, humeris rotundatis, & illo fero quintuplo longiora, supra dorso antico depresso, posterius declivia, tota nigra, sit profunde punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis, pubescentia cinerea, & versus latera squamu is minimis coconcoloribus immixtis adpersa. punisque fuscis obsoletis, eodem ordine ac in Rh. militte notata. Corpus subtus nigrum punctulatum, tenue pubescens & squamulosum. Pedes elongati validi nigri, cinereo-pubescentes; structura ut in prioribus.

32. R. Arundinis: apterus niger, squamu lis pilisque densis lutescentibus tectus, thorace sub-cylindrico, fusco-bilineato, rostro breviori sub-arcuato.

*Circulus arundinis.* Fabr. Eleut. 2. §21. 85.  
Herbst. Col. 6. 162. 120. Tab. 71. f. 1. Payk. fn. 3. 234. 52. Panz. fn. 19. f. II.

Var. b, Squamu lis pilisque obscurioribus, griseo-lutescentibus. Payk. loc. cit. var. b.

Habitat in arundine Scafæ rarius. Dom. Quenst.

Descr. Rh. Romicis duplo major, ceterum statura & longitudine rostri illi simillimus, quare in hac serie collocandus. Caput breve convexum nigrum

grum punctulatum, squamulis cinereo-lutescentibus adpersum, fronte inter oculos impressa; oculi depresso nigro-brunnei; rostrum longitudine thoracis cylindricum, sub-arcuatum; minus incrassatum, nigrum punctulatum, supra lutescenti-pubescentes, apice glabro. Antennæ capite cum rostro parum longiores, tenues, nigrae, basi piceæ. Thorax basi apicemque truncatus, antice paullo angustior, lateribus parum rotundatus, supra minus convexus, niger, subtiliter punctulatus, subitus & lateribus squamulis pilisque lutescentibus omnino tectus, dorso magis nudo fuscescente, linea media lutescente in strias duas latae diviso. Scutellum parvum triangulare pallido-squamulosum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo fere quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, tenui punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis; tota squamulis pilisque densis lutescentibus testa; in apice suturæ macula communis fusca. Corpus subtus nigrum punctulatum, indumento simili ac supra tectum. Pedes elongati nigri, parcius cinereo-pubescentes.

Var. b, differt tantum colore squamularum magis cinereo,

33. R. Viciae; alatus niger, cinereo-squamulosus, rostro breviori sub-arcuato, thorace sub-depresso, lateribus valde dilatato, elytris seriatim fusco-maculatis.

Var. b, Squamulis metallico-nitentibus testis,

Var. c, testaceus, teneo-squamulosus, rostro nigro, thoracis dorso pedibusque fusca;

**Habitat in Vicia Sylvatica, in Kinnakullen  
& Mysleberg Westrogotiae non infrequens.**

Descr. Rh. militi quoad signaturas similis, sed duplo minor, alatus, thorace depresso lateribus magis dilatato, elytrisque convexioribus distinkus. Caput breve convexum nigrum, subtiliter punctulatum, tenue griceo pucelcens, fronte inter oculos impressa; oculi d. pressi brunnei; rostrum longitudine thoracis, crassiusculum, arcuatum, nigrum, crebre punctulatum, tenue pubescens. Antennæ capite cum rostro longiores, nigrae, basi piceæ. Thorax latitudine medii multo brevior, basi apiceque truncatus, lateribus valde rotundato-dilatatus, supra sub-depressus, niger, subtiliter punctulatus, subitus & lateribus squamulis densis cinereo-albidis nitidis tectus, dorso longitudinaliter magis denudato nigro-fusco, cum linea media albida obsoletiori. Scutellum minutum triangulare griseo-squamosum. Elytra thoracis basi fere dupla latiora, humeris rotundatis, & illo fere quintuplo longiora, apice attenuata, supra convexa, nigra, squamulis pilisque cinereo-albidis omnino testa, punctis denudatis fusis quintuplici serie adspersis, omnino ut in Rb. milite. Alæ, ip plerisque saltem, amplæ, albo-hyalinæ. Corpus subtus nigrum punctulatum, squamulis densis albo-argenteis tectum. Pedes longiusculi nigri, cinereo-pubescentes.

Var. b, differt tantum colore squamularum pallide æneo, interdum aureo, imicante.

Var. c, differt elytris, pectore abdomineque pallide testaceis, squamulis flavo-æneis-albidis obscuris; Caput, thorax & pedes obscurius siccè brunea; rostrum nigrum; signaturæ præterea variatum omnino, ut in Specie maturata,

grum punctulatum, squamulis cinereo-lutescentibus adpersum, fronte inter oculos impressa; oculi depresso nigro-brunnei; rostrum longitudine thoracis cylindricum, sub-arcuatum; minus incrassatum, nigrum punctulatum, supra lutescenti pubescens, apice glabro. Antennæ capite eum rostro parum longiores, tenues, nigrae, basi piceæ. Thorax basi apiceque truncatus, antice paullo angustior, lateribus parum rotundatus, supra minus convexus, niger, subtiliter punctulatus, subtus & lateribus squamulis pilisque lutescentibus omnino tectus, dorso magis nudo fuscescente, linea media lutescente in striae duas latas diviso. Scutellum parvum triangulare pallido-squamulosum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo fere quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, tenuè punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis; tota squamulis pilisque densis lutescentibus tecta; in apice suturæ macula communis fusca. Corpus subtus nigrum punctulatum, indumento simili ac supra tectum. Pedes elongati nigri, parcius cinereo-pubescentes.

Var. b, differt tantum colore squamularum magis cinereo;

33. R. Viciæ; alatus niger, cinereo-squamulosis, rostro breviori sub-arcuato, thorace sub-depresso, lateribus valde dilatato, elytris seriatim fusco-maculatis.

Var. b, Squamulis metallico-nitentibus testatus.

Var. c, testaceus, aeneo-squamulosus, rostro nigro, thoracis dorso pedibusque fuscis,

Habitat in Vicia Sylvatica, in Kinnakulle  
& Mysleberg Westrogotia non infrequens.

Descr. Rh. militi quoad signaturas similis, sed duplo minor, alatus, thorace depresso lateribus magis dilatato, elytrisque convexioribus distinctus. Caput breve convexum nigrum, subtiliter punctulatum, tenue griseo puceiens, fronte inter oculos impressa; oculi & pressi brunnei; rostrum longitudine thoracis, crassiusculum, arcuatum, nigrum, crebre punctulatum, tenue pubescens. Antennæ capite cum rostro longiores, nigrae, basi piceæ. Thorax latitudine mediæ multo brevior, basi apiceque truncatus, lateribus valde rotundato-dilatatus, supra sub-depressus, niger, subtiliter punctulatus, subitus & lateribus squamulis densis cinereo-albidis nitidis testus, dorso longitudinaliter magis denudato nigro-fuso, cum linea media albida obsoletiori. Scutellum minutum triangulare griseo-squamosum. Elytra thoracis basi fere dupla latiora, humeris rotundatis, & illo fere quintuplo longiora, apice attenuata, supra convexa, nigra, squamulis pilisque cinereo-albidis omnino testa, punctis denudatis fusis quintuplici serie adspersis, omnino ut in Rh. militi. Alæ, ip plerisque saltem, amplæ, albo-hyalinæ. Corpus subtus nigrum punctulatum, squamulis densis albo-argenteis testum. Pedes longiusculi nigri, cinereo-pubescentes.

Var. b, differt tantum colore squamularum pallide æneo, interdum aureo, inicante.

Var. c, differt elytris, pectore abdomineque pallide testaceis, squamulis flavo-æneis-nitidis obscuris; Caput, thorax & pedes obscurius fasciæ brunnea; rostrum nigram; signaturæ præterea variatum omnino, ut in Specie maturata,

34. R. Plantaginis: niger, cinereo-squamulosus, pedibus fusco-ferrugineis, thorace sub-depresso, utrinque valde dilatato, elytris macula magna laterali denudata.

*Fabr. Eleut. 2. 456. 91.*

*Curculio plantaginis. De Geer Ins. 5. 237. 24.*

*Tab. 7. f. 17-21. Herbft. Col. 6. 264. 233.*

*Tab. 80. f. 2. Payk. fn. 3. 231. 48. var. b.*

Var. b, elytris pectore abdomeisque testaceis, pedibus pallidioribus. *Payk. loc cit. a.*

Var. c, duplo, imo triplo minor, ceterum ut a.

Var. d, magnitudine var. e, colore ut in b.

Var. e, magnitudine var. c & d, totus testaceus, rostri apice solo nigro.

Habitat in Plantagine maiori, aliisque plantis, in pratis aridis passim.

Descri. Magnitudo praecedentis, sed in elytris magis depresso, Rh. Trifolii similis. Caput, ocelli, rostrum, omnino ut in praecedente descripta. Antennæ rostro cum capite longiores, crassiusculæ, rufo-ferrugineæ, clava pubescente nigro-fusca. Thorax latitudine modii multo brevior, basi apiceque truncatus, lateribus fere angulariter valde dilatatus, supra sub-depressus, niger, subtilissime punctulatus, subtus & lateribus squamulis cinereo-albidis, saepe metallico-micaantibus, tectus, dorso sub-nudo nigro-fusco, cum linea media distincta e pilis & squamulis albo-argenteis, interdum virecentibus, nitidis. Scutellum parvum albo-squamosum. Elytra thoracis basi duplo latiora, & illo fere quadruplo

**ga magna humeralis albidior, vix maculata. Corpus subtus squamulis densis cinereis & fuscis tectum. Pedes mediocres picei, cinereo-variegati, femoribus versus apicem annulo albo squamoſo cinctis.**

38. R. punctatus; niger obscurus, griseo-squamulosus, rostro brevi, thorace trilineato anteriusum sub-lateraliter, elytris fasciulis nigris seriatis.

*Curculio punctatus.* Fabr. Eleut. 2. 529. 133.  
Herbst. Col. 6. 505. 540. Payk. fn. 3. 306.  
129. Ross. fn. Etr. 1. 131. 335.

*Curculio medius.* Marsh. Ent. Br. 1. 302. 185.  
Var. b, Corpore, pubescentia squamulisque fusco-ferrugineis variegato.

*Curculio Austriacus.* Herbst. Col. 6. 243. 207.  
Tab. 77. f. II. Marsh. Ent. Br. 1. 302. 184.

Habitat in arenosis aridis rariis.

Descr. Statura lata & similitudo praecedentis, sed adhuc dimidio major, & vere distinctus. Caput rotundatum nigrum, dense cinereo pubescens, punctatum, oculis depresso brunneis; rostrum thorace paullo brevius, crassum nigrum arcuatum, crebre punctatum, fusco-pubescent. Antennæ copite cum rostro longiores, crassiusculæ, piceæ. Thorax anteriorius longitudine paullo latior, lateribus mox post apicem dilatatis, deinceps obliquis sub-rectis, supra parum convexus, niger, crebre punctulatus, subtus & lateribus pube squamulisque cinereis & fuscis mixtis tectus, dorso obcuriori magis nudo cum linea angustiori cinereo-squamosa, saepe obsoleta. Scutellum parvum cinereo-squamosum. Elytra ma-

gla obvata, thôræcis basi duplo latiora, hûmoris rotundatis, & illo quadruplo longiora, supra dorso sub-depressa, nigra, profunde punctato-striata, interstîtia subtiliter coriaceis; striæ dorsales per partia magis approximatae videntur, quoniam interstitia alterna paulo latiora & elevatoria, nempe suturæ proximum, tertium, quintum & septimum, quo etiam in illæsis individuis squamulis cinereis densioribus testa, interjectis punctis seriatim fusco-pubescentibus; latera elytrorum dense cinereo-squamulosa, fere immaculata. Corpus subtus nigrum punctulatum, squamulis cinereo-albidis & fusciscentibus mixtis variegata. Pedes validi nigro-fusci, cinereo-pubescentes, femoribus ante apicem annulo albidiore cinctis.

Var. b, differt præcipue colore indumenti fuscо-ferrugineo; rostrum etiam paulo longius & minus crassum videtur, vix tamen diversa Species, sed potius femina prioris.

Obs. Hic & insequens, ut & Rh. arundinis annæ descriptus, ab auctoribus plerisque inter Curculiones brevirostres collocati; sed nimia cum reliquis bujus Phalangis speciebus similitudo ac affinitas, ab illis separare non permittunt.

39. R. Polygoni: angustior niger, rostro mediocri, thorace rotundato lineis tribus albis, elytris cinereo-squamosis, sutura dentata, lineisque tribus abbreviatis nigris.

*Curculio Polygoni.* Fabr. Eleut. 2. 520. 77.

Herbst. Col. 6. 242. 206. Tab. 77. f. 10.

Payk. fn. 2. 228. 46.

*Curculio fasciatus.* De Gler Ins. 5. 234. 21.

Cur-

*Curculio lineatus*. Herbst. Col. 4. 497. 587. Tab. 95. f. 5. a, b.

Var. b, Elytris testaceis, sutura dentata lineisque brunneis. Payk. loc. cit. var. b.

*Curculio Polygoni* Linh. Syß. 2. 6. 9. 261. Fn. Sv. 597. Panz. fn. 19. f. 10.

*Curculio avator*. Linn. Mant. 2. 531. Marsh. Ent. Br. 1. 266. 871.

Habitat in aridis, præsertim in agatis & viis arenosis, ubique frequens:

Descr. Medius, Rh. Ruminis paullo longior; sed non latior. Caput rotundatum fuscum punctulatum, tessue griseo-pubescentia, fronte impressa, itaque albo-pilosa a medio rostri in verticem ducta; oculi depresso-brunnei; rostrum longitudine thoracis, crassissimum arcuatum nigrum punctulatum, supra albo-pubescentia. Antennæ capite cum rostro longiores ferruginea; clava fusca. Thorax antice angustior, emarginatus, basi truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, supra modice convexus, totus niger, creberrime punctulatus, squamulis pilisque fuscocinereis adspersus, dorso lineis tribus distinctis & squamulis albo margaritaceis, interdum virescens, alia vice pallidis, quatum laterales anterius angustitiae, media æqualis. Scutellum minutum albidoo-squamosum. Elytra thoracis basi duplo latiora, & illo fere quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, punctato-striata, intersticiis subtilissime coriaceis, squamulis densis cinereis tecta; sutura antice alba; dein punctis crebris nigro-pilosis alternantibus quasi dentata; a basi interiori stria acuminata, ante medium definens, & ab apice striæ duæ, initio connexæ, assurgunt, quarum exterior longior, oblique versus humerum directa, interior

Vix ultra medium extensa, attenuata; omnes e pilis fuscō-brunneis seu nigris; intersticia striarum alterna pullo magis elevata, & in illæsis individuis albo-lineata. Corpus subitus nigrum punctulatum, cinereo pubescens & squamulosum. Pedes mediocres nigri, cinereo-pubescentes.

Var. b, differt tantum colore elytrorum dilatiori, testaceo, signaturis brunneis; variat etiam corpore pedibusque fuscō-testaceis, forte immaturus.

40. R. Trifolii: niger, cinereo-pubescens, anterius tibialisque ferrugineis, rostro tenuiori mediocre, thorace brevi depresso trilineato, pectore aeneo-squamofo.

*Curculio Trifolii.* Herb. Col. 6. 266. 236.

Tab. 80. f. 5. Payk. fn. 3. 232, 49.

Var. b, Elytris obscure testaceis.

Var. c, Testaceus, rostro nigrō, thorace supra brunneo.

*Curculio trilineatus.* Marsh. Ent. Br. 1. 268. 90.

Var d, pallidius testaceus, rostri apice fuscō, thorace supra ferrugineo.

*Curculio Stramineus.* Marsh. Ent. Br. 1. 267. 88.

Habitat in Trifolio pratensi, in pratis aridis paucim; varietates pallidiores saepius in agris, & ad horreorum parietes, post messem, obvias.

Deser. Magnitudo, statura & affinitas Rh. Plantaginis, sed differt rostro longiori, magis tenui, & Signaturis aliis. Caput parvum rotundatum nigrum  
pub-

punctulatum, cinereo-pubescent, oculis ovaliis de pressis brunneis; rostrum thorace fere longius, minus quam in prioribus crassum, arcuatum nigrum nitidum punctulatum, fere glabrum. Antennae capite eum rostro longiores, crassissimae ferrugineae, clava cinereo-pubescente. Thorax latitudine multo brevior, basi apiceque truncatus, lateribus valde rotundato-dilatatus, supra parum convexus, niger, creberrime subtiliter punctulatus, pubescenti grisea adspersus; in medio linea angustior, & versus latera utrinque alia latior archata, & squamulis piliforibus, aut albidis, aut virescentibus nitidis. Scutellum parvum albido-pubescent. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, apice rotundata, supra parum convexa, nigra, tenui punctato-striata, intersticiis subtilissime coriaceis, pubescenti & squamulis minimis obscure cinereis tecta, fasciculis pilosis albidioribus, & lineolis abbreviatis, punctisque obscurioribus denudatis, plus minusve variegata; sutura anterior fusca, posterius albida fusco-punctata. Alae longe albo-hyalinae, stigmate flavescente, ante medium marginis sita. Corpus subtus nigrum vel nigro-piceum, creberrime punctulatum, griseo-pubescent, pectore squamulis nitidis, aut cinereo-argenteis, aut vitidi-micantibus testo. Pedes mediobrachia cinereo-pubescentes, femoribus validis nigris, tibiis tarfisque plerumque ferrugineis vel obscure testaceis.

Var. b, differt tantum colore elytrorum dilatius brunneo, aut fusco-testaceo.

Var. c, colore magis differt; rostrum nigrum, sive basi bruneum; caput & thorax supra brunnea seu fulco-ferruginea; elytra, corpus subtus cum pedibus dilutius testacea, femoribus tamen interdum fuscescentibus.

Var. d, adhuc pallidior; rostrum ferrugineum apice fuscum; caput & thorax supra ferruginea; ely-

tra testacea, ferrugineo-striata; corpus subtus paleo-  
lide testaceum; pedes toti pallidi; In omni varia-  
tate signaturae eadem ac in a; et si obsoletiores; forte  
immature, nuper exclusæ, Specie non distinguendæ.

Occurrunt etiam individua varietatis a, detrita,  
quæ tota nigra, antennæ tibialisque ferruginea;  
Squamulæ nitidæ pectoris tamen tenacius adhaerent.

4. *R. posticus*: niger, parum cinereo-pu-  
bescens, antennis, tibiis, elytrorumque  
apice ferruginea, rostro breviusculo, tho-  
race brevi depresso, pectore albido-squa-  
moso.

*Curculio haemorrhoidalis*. Herbst. Col. 6. 265. 235.

Tab. 80. f. 4.

*Curculio bi-maculatus*. Marsh. Ent. Br. 1. 266. 36.

Habitat in pratorum collibus passim.

Descr. Præcedenti simillimus, & pro ejus va-  
rietate detrita facile habendus, sed paulo major,  
præsertim longior; rostrum brevius, elytrorum a-  
pex ferrugineus, & squamulæ pectoris non metal-  
lico-mitentes. Caput & oculi ut in præcedenti; ro-  
strum thorace fere brevius, crassiusculum, arcuatum  
nigrum punctulatum glabrum. Antennæ ut in prio-  
ni. Thoracis structura etiam ut in illo, supra de-  
pressus, niger, marginæ antice sœpe rufo-piceo;  
confertissime & paullo profundius punctatus, pilis  
squamulisque cinereis, verius latera densibribus  
adspersus. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & il-  
lo fere quintuplo longiora, apice compressa, sub-  
attenuata, supra convexa, nigro-picea, apicem ver-  
sus plus minusve rufo-ferruginea, sat profunde pun-  
ctato-

punctulatum, cinereo-pubescent, oculis ovatis de preflis brunneis; rostrum thorace fere longius, minus quam in prioribus eratsum, arcuatum nigrum nitidum punctulatum, fere glabrum. Antennæ capite cum rostro longiores, crassissimæ ferrugineæ, clava cinereo-pubescente. Thorax latitudine multo brevior, basi apiceque truncatus, lateribus valde rotundato-dilatatus, supra parum convexus, niger, creberime subtiliter punctulatus, pube tenui grisea adspersus; in medio linea angustior, & versus latera utrinque alia latior arcuata, & squamulis piliforibus, aut albidis, aut virescentibus nitidis. Scutellum parvum albido-pubescent. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, apice rotundata, supra parum convexa, nigra, tenui punctato-striata, intersticiis subtilissime coriaceis, pube & squamulis minimis obscure cinereis testa, fasciculis pilosis albidiорibus, & lineolis abbreviatis, punctisque obscurioribus denudatis, plus minusve variegata; sutura anterior fusca, posterius albida fusco-punctata. Alæ longe albo-hyalinæ, stigmate flavescente, ante medium marginis sita. Corpus subtus nigrum vel nigro-piceum, creberime punctulatum, griseo-pubescent, pectore squamulis nitidis, aut cinereo-argenteis, aut viridi-maculibus testo. Pedes mediocres cinereo-pubescentes, femoribus validis nigris, tibiis tarvisque plerumque ferrugineis vel obscure testaceis.

Var. b, differt tantum colore elytrorum dilatius brunneo, aut fusco-testaceo.

Ver. c, colore magis differt; rostrum nigrum, saepe basi brunneum; caput & thorax supra brunneos seu fulco-ferruginea; elytra, corpus subtus cum pedibus diluti testacea, femoribus tamen interdum fuscescentibus.

Var. d, adhuc pallidior; rostrum ferrugineum apice fuscum; caput & thorax supra ferruginea; ely-

Descr. Parvus, Rh. Trifolii dimidio angustior. Caput parvum rotundatum nigro-brunneum punctulatum, terue griseo-virescenti pubescens, oculis depresso brunneis; rostrum vix longitudine thoracis, crassiusculum arcuatum nigrum punctulatum, basi coarctatum. Antennae rostro cum capite longiores, crassiusculæ ferrugineæ, clava obscuriori. Thorax latitudine medii vix brevior; lateribus æqualiter modice rotundatus, supra parum convexus, niger confertissime punctulatus, pitis griseo-virescentibus adspersus; in medio linea angusta recta, & versus latera utrinque alia latior arcuata, e squamulis pilisque viridi-argenteis nitidis. Scutellum parvum virescenti-pubescentis. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra modice convexa, nigra, obsoletius punctato-striata, pube squamulisque subtilissimis læte viridibus testa, interjectis pilis longioribus albido seriatim. Corpus subfuscum, crebro & profunde punctatum, tenuo cinereo pubescentis. Pedes breviusculi validi, toti rufo-ferruginei, cinereo-pubescentes.

Var. b; differt tantum colore indumenti in elytris, aut cinereo, aut obscurius fusco.

Var. c; differt elytris abdomeque testaceis, colore linearum thoracis albidiore, pedibus pallidis.

Var. d, adhuc pallidior, rostro brunneo spirce fusco, thoracis dorso ferrugineo, virescenti-lineato, elytris, corpore pedibusque pallide testaceis.

Obs. Varietates omnes, præter colorem, finimissimæ, nullo modo specie distinguendas. In Odonide arvensi varietatem duplo fere maiorem copiose legi, varietatibus c & d, cæterum finillimam.

43. R. borealis: brunneus, thoracis dorso lineis alternis griseis nigritoque pilosis, elytris

*Rhynchænus.*

statu - striata, pilis squamulisqve cinereis parcus ad. sparsa, Corpus subitus nigrum, creberrime punctatum, tenui cinereo-pubescenti, aro piceo; pectus pubes, squamulisqve cinereo-albidis, non metallico-nitentibus, testum. Pedes ut in præcedenti, femoribus nigro-piceis, tibiis tarassisqve ferrugineis.

**42. R. nigrostris:** nigro-piceus, antennis perbusque rufo-testaceis, rostro mediocri glabro, thorace longiori, lineis tribus viridibus, elytris viridi-squamulosis.

Fabr. Eleut. 2. 448. 53.

*Curculio nigri rostris.* Herbst. Col. 6. 281.

254. Tab. 81. f. 11, 12. Payk. fn. 3. 247.

67. Panz. fn. 36. f. 14.

*Curculio virescens.* Quenst. Diss. p. 16.

Var. b, Niger, thorace virescenti - vel albidu-lineato, elytris fusco-squamulosis.

Herbst. loc. cit. var. 1 & 2.

Var. c, fusco-piceus, elytris abdomine- que testaceis, thoracis lineis aut albidis aut virescentibus. Herbst. loc. cit. var. 3.

Var. d, testaceus, rostro brunneo, thoracis dorso ferrugineo, virescenti-lineato, pedibus pallidis. Payk. loc. cit. var. b. Herbst. l. c. var. 4.

*Rhynchænus variabilis.* Fabr. Eleut. 2. 449. 54.

Habitat in floribus & plantis variis, locis aridis, sat freqvens.

Defcr.

Descr. Parvus, Rh. Trifolii dimidio angustior. Caput parvum rotundatum nigro-brunneum punctatum, terue griseo-virescenti pubescens, oculis depressis brunneis; rostrum vix longitudine thoracis, crassiusculum arcuatum nigrum punctulatum, basi coarctatum. Antennæ rostro cum capite longiores, crassiusculæ ferrugineæ, clava obscuriori. Thorax latitudine medii vix brevior; lateribus æqualiter modice rotundatus, supra parum convexus, niger confluentissime punctulatus; pitis griseo-virescentibus adspersus; in medio linea angusta recta, & versus latera utrinque alia latior arcuata, e squamulis pilisque viridi-argenteis nitidis. Scutellum parvum virescenti-pubescentis. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra modice convexa, nigra, obsoletius punctato-striata, pube squamulisque subtilissimis læte viridibus testa, interiectis pilis longioribus albidis seriatim. Corpus subtus nigro-piceum, crebre & profunde punctatum, tenue cinereo-pubescentis. Pedes breviusculti validi, toti rufo-ferruginei, cinereo-pubescentes.

Var. b; differt tantum colore indumenti in elytris, aut cinereo, aut obscurius fusco.

Var. c; differt elytris abdомineque testaceis, colore linearum thoracis albidiore, pedibus pallidis.

Var. d, adhuc pallidior, rostro brunneo apice fusco, thoracis dorso ferrugineo, virescenti-lineato, elytris, corpore pedibusque pallide testaceis.

Obs. Varietates omnes, præter colorem, finimillimæ, nullo modo specie distinguendæ. In Ononide arvensi varietatem duplo sere maiorem copiose legi, varietatibus c & d, cæterum similissimam.

43. R. borealis: brunneus, thoracis dorso lineis alternis griseis nigritoque pilosia, elytris

*lytris ovatis, maeulis griseis nigrisqve variegatis.*

*Curculio borealis.* *Panz. fn. 3. 249. 68.*

Habitat in Salice arenaria ad Muonionista Bothniæ occidentalis, mense Junio. *Dom.* *Quenel.* *Mus. Dom.* *Paykull.*

Descr. Insectum in Museo Dom. de Paykull tantum visum, quare descriptionem ejus loc. cit. afferre licet. Rh. nigri rostri paullo minor. Caput brunneum, fronte griseo-pubescente; oculi depresso rigi; rostrum longitudine thoracis, orasiusculum nigrum, sub-arcuatum. Antennæ rostro longiores fuso-ferruginea, clava nigricante. Thorax longitudinis latitudinis, convexo sub-globosus, brunneus, subras. pilis rarioribus brevissimis griseo-mentibus, supra in medio linea dorsali angusta e pilis brevissimis depresso griseo-mentibus orta; tum linea utrinque paullo latior, plorū adhuc fere breviorum nigricantium; tum iterum utrinque linea pilosa grisea, cui adjacet utrinque linea angusta pilosa lateralis nigra. Scutellum punctiforme piceum. Elytra thorace multo latiora, & plus duplo longiora, convexo-ovata, callo postico nullo, subtilissime punctato-striata brunnea, macula magna sub triangulari communī baseos e pilis brevissimis nigris; postice & ad latera maculis punctisque plurimis griseis nigrisqve pilosis variegata. Alæ albo hyalinæ. Pectus, abdomen & pedes brunnea, pilis rarioribus brevissimis griseo-mentibus.

44. *R. dissimilis:* brevior niger, squamulis metallico-nitidis adspersus, antennis pedibusque rufo-testaceis, thorace breviori

dij-

Descr. Rh. nigri-rostri paullo angustior. Caput rotundatum nigro-piceum, crebre punctulatum, griseo-pubescent, oculis depresso-brunnens; rostrum longitudine thoracis, cylindricum, minus crassum quam in prioribus, rufo-testaceum nitidum sublæve, interdum basi piceum. Antennæ longitudine rostri cum capite, totæ rufo-ferrugineaæ. Thorax antice angustior, lateribus nonnihil rotundatus, basi truncatus, supra modice convexus, rufo-testaceus, crebre punctatus, pilis depressis griseo-albidis testatus, limbo interdum infuscato. Scutellum parvum rotundatum fuscum, griseo-pubescent. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, sed quadrangularia longiora, supra convexa, rufo-testacea, profunde punctato-striata, intersticiis sublævibus, pilis depressis griseo-albidis adspersa; in dorso antico macula communis nigra, aut minor, brevior, aut magna, ultra medium extensa, ut & sutura pene maculam infuscata, sed in illæsis sutura tota linea contigua e pilis densis cinereo-albidis testa, & striolæ abbreviatæ, præsertim ad basin, & hinc illinc in disco, interdum in fascias collocatae, albido-pilosæ. Pectus nigrum punctulatum, dense albido-pubescent; abdomen rufo-testaceum, basi nigrieans, tenui pubescent. Pedes breviusculi validi, toti rufo-testacei, cinereo-pubescentes.

46. R. bipunctatus: angustus niger, dense cinereo-pubescent, antennis, tibialis tarsisque testaceis, elytris utrinque macula denudata nigra, rostro mediocri.

Fabr. Elut. 2. 452. 70.

*Curculio bipunctatus*: Linn. Syst. 2. 609. 28. Fn.

Su. 592. Herbst. Col. 6. 234. 1924 Tab.

77. f. 2. Payk. fn. 3. 250. 69. Panz. fn.

43. f. 7. 152. 1822

Habitat in foliis & floribus Salicis, tempore vercali, passim.

Deser. Parvus, Rh. nigrostris minor, angustiflor. Caput rotundatum nigrum punctulatum, griseo-pubescentia, oculis nigro-brunneis, parum prominulis; rostrum thorace paullo longius, arcuatum, nigrum nitidum punctulatum, minus tenuis. Antennæ rostro cum capite vix longiores, crassiusculæ, totæ rufæ testaceæ. Thorax antice angustior, lateribus nigris rotundatus, basi truncatus, supra parum convexus, niger, crebre punctatus, pube depressa pallide cinerea tectus. Scutellum rotundatum tenuero-pubescentia. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, sed quadruplo longiora, supra convexa, nigra, sat profunde punctato-triata, intersticiis sub-lævibus, pube longiori depressa pallide cinerea tecta; in medio disci, versus futuram, macula majoris clavata deaudata nigra, postice emarginata. Corpus subtus nigrum punctatum, parcus pubescens. Femora clavata nigra; tibiæ & tarsi testacei.

ObL Macula dorsalis interdum obsoletior, pube tenuiori obducta; pubescens pagina superioris sepe detrita vel rara, tenuis, unde corpus totum magis nigrum evadit.

47. R. Carpini: niger. fib. depresso, pube cinereo-sericea nitida tectus, antennis pedibusque testaceis, rostro longissimo tenui arcuato.

Fahr. Elevt. 2. 452. 76.

Circulio Carpini. Herbst. Col. 6. 204. 165. Tab. 74. f. 3. a, b.

Habitat in floribus Salicis cinereis passim.

Deser.

Descr. Præcedenti paullo brevior, sed in elytris latior, magis depresso, rostro multo longiori & tenuiori, abunde distinctus. Caput rotundatum nigrum, subtus punctulatum & pubescens, oculis depresso nigro brunneis; rostrum longitudine fere dimidii corporis, tenue, valde attenuatum; nigrum nitidum, subtilissime punctulatum. Antennæ vix rostro longiores, crassiusculæ, toræ pallide testaceæ. Thorax antice angustior, lateribus parum rotundatus, basi truncatus, supra sub-depressus, niger, orebre punctulatus, pube densa depresso cinereo-fuscæ, vel argenteo-virescente nitida tectus. Scutellum parvum rotundatum pubescens. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, & plus triplo longiora; supra sub-depressa, nigra, punctato-striata, pube simili ac thorax obducta. Corpus subitus nigrum punctulatum, pectore densius, abdomine parcius pubescente, ano piceo. Pedes breviuseuli validi testacei, femoribus plerumque obscurius fuscæ, saltem in medio.

Obs. Occurrit etiam obscurior, pube minus densa, cinereo-albida adspersus, forte adtior, magis detritus,

48. *R. picirostris*: convexior nigro-piceus, pube fericea nitida tectus, rostro longiori attenuato, antennis, pedibus rostrique apice rufo-ferrugineis.

*Fab. Eleat.* 2. 449. 55.

*Curculio picirostris.* Payk. fn. 3. 253. 73. *Herbst.* Col. 6. 446.

*Curculio topinensis.* *Herbst.* Col. 6. 278. 290.  
*Tab. gr. f. 7.*

Var. b, obscurior, parcius cinereo-pubescentis, antennarum clava femoribusque fusco-piceis.

*Curculio cinereocinctus*, Marsh. Ent. Br. i. 248. 28.

Habitat in floribus Trifolii pratensis, sat freqvens.

Descr. Statura angusta Rh. bipunctata, sed dimidio minor, magis convexus. Caput rotundatum piceum, subtilissime punctulatum, pubescens, oculis depressis brunneis; rostrum thorace fere longius; parum arcuatum, subtiliter punctulatum, basin versus crassius, piceum, pubescens, apice attenuatum rubrum, glabrum nitidum. Antennæ vix rostro cum capite longiores, crassiusculæ, rufa-ferrugineaæ. Thorax latitudine longior, anterius angustior, & juxta apicem transversim impressus, basi truncatus, supra modice convexus, nigro-piceus, crebre punctulatus, pube depressa sericea, cinereo-virescente nitida, tectus. Scutellum parvum pubescens. Elytra thorace parum latiora, & illo triplo longiora, supra convexa, nigro-picea, posterius saepe dilutius rufa-ferruginea, sat profunde punctato-striata, interstitiis coriaceis, pube simili ac thorax tecta. Corpus subtus piceum punctulatum, squamulis densis piliformibus cinereo-albidis tectum. Pedes crassiusculi rufo-tectacei, cinereo-pubescentes.

Var. b, saepe paullo minor, pube rariori, minus nitida adspersus, antennarum clava, femoribusque obscurius fusco-piceis, forte mas.

49. R. *Beccabungæ*: niger, thoracis lateribus pectoraque albido squamolis, antenorarum basi

baffi, tibiis elytrorumque plagi rufo-testaceis, thorace brevissimo postice sinuato.

Fabr. Eleut. 2. 493. 263.

*Curculio Beccabungæ*. Payk. fn. 3. 254 74. 1

Var. b, Thorace fere toto squamuſis cinereo-albidis tecto, elytris rufo-testaceis, sutura margineqve nigro fuscis, pedibus totis testaceis.

\**Curculio Beccabungæ* Linn. Syst. 2. 61. 41.  
Fn. Sv. 607. Herb. Col. 6. 202. 164. Tab.  
74. f. 2. a, b.

Var. c, Niger, elytris ferrugineis, vix fuco-marginatis, pedibus rufo-piceis.

Var. d, Elytris nigris immaculatis, cæterum ut a.

Var. e, Elytris pedibusque totis nigris, cæterum ut a & d.

Habitat in plantis aquaticis, præsertim *Veronica Beccabunga*, mintis freqvens.

Descr. Rh. picirostri plerumque paullo major, præsertim in elytris latior, sed variat etiam multo minor. Caput breve latum nigrum punctulatum, griseo-pubescent, oculis brunneis prominulis; rostrum vix thorace longius, minus tenue, parum arcuatum, nigrum, nitidum, punctulatum. Antennæ vix longitudine rostri cum capite, crassiusculæ ferrugineæ, clava majuscula ovata nigra. Thorax brevissimus transversus, antice angustior, & juxta apicem striæ transversæ impressus, postice sub-sinuatus,

tus, supra modice convexus, niger, crebre punctatus, subtus & lateribus squamulis & pube cinereo-albidis densis tectus, dorso magis nude, pilis sparsis depresso. Scutellum rosundatum griseo pubescens. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra minus convexa, nigra, sat profunde punctato striata, pilis rigidis ciaereis subseriatim adspersa; in disco posteriori singuli elytri plaga oblonga rufa ferruginea, interdum cum apice futuræ rufa conjuncta. Corpus subtus nigrum punctatum, cinereo-pubescent, pectoris futuris densius albido squamulosis. Pedes mediocres, femoribus elevatis nigris, minime vero Saltatoriis; tibiis tarsisque rufo-testaceis.

Var. b, differt, thorace fere toto squamulis albidis tecto, area tantum antica in medio magis denudata; elytris rufo-testaceis, margine futuraque plus minusve infuscatis, pedibusque totis rufo-testaceis.

Var. c, ut a, sed elytra tota obscurius ferruginea, & pedes rufo-picei.

Var. d, omnino ut a, sed elytra nigra immaculata.

Var. e, ut a & d, sed elytra & pedes toti nigri.

50. *R. pascuorum*: niger, griseo pubescens, plaga elytrorum, antennarum basi tibiarumque ferrugineis, thorace longiori basi sinuato, rostro longissimo tenui.

*Circulio dorsalis.* Linnae. Syst. 2. 603. v7. Pl. Sv. 588?

Var. b. Elytris nigris immaculatis.  
Habitat

Habitat in plantis, locis humentibus, rarius.

Descr. Præcedenti paullo minor, & similis, sed differt rostro multo longiori, & tenuiori, thorace longiori subtus & lateribus non albido-squamoso; Rh. piei-rostri æqualis & similis, sed rostrum totum nigrum. Caput rotundatum nigrum punctulatum, tenue pubescens, oculis depresso-brunneis; rostrum capite cum thorace fere longius, tenue, parum arcuatum, nigrum nitidum punctulatum. Antennæ vix longitudine rostri cum capite, crassiusculæ ferrugineæ, clava fusca. Thorax postice vix longitudine latior, anterius multo angustior, juxta apicem striga tenui transversi impressus, basi sub-sinuatus, supra modice convexus, niger, crebre punctulatus, pilis depressis cinereis rigidis, minus crebris, adpersus. Scutellum rotundatum, densius albido-pubescentia. Elytra thoracis basi parum latiora, sed trigo longiora, supra modice convexa, nigra, sat profunde striata, & in striis punctata, intersticiis obsoleta coriacea, pilis rigidis cinereis seriatim adpersa; in disco posteriori singuli elytri plaga rufo-ferruginea obsoletior, cum rubidine apicis interdum conjuncta, in detritis individuis evidentior. Corpus subtus nigrum, crebre punctatum, cinereo-pubescentia Pedes mediocres, femoribus clavatis nigro-piceis; tibialis tarsisque ferrugineis.

Var. b, differt tantum elytris nigris immacula-tis. Rh. picirostri var. b, simillima, sed rostrum vix apice rufum.

Obs. Qvod e. dorsalis Cl. Linnæi, non idem cum Insecto ejusdem nominis reliqvorum auctorum ex descriptione in Fauna Svecica satis constat; dubium

Var. b, obscurior, parcius cinereo-pubescent, antennarum clava femoribusque fusco-piceis.

*Curculio cinereocens*, Marsh. Ent. Br. i. 243. 28.

Habitat in floribus Trifolii pratensis, sat frequens.

Descr. Statura angusta Rh. bipunctati, sed dimidio minor, magis convexus. Caput rotundatum piceum, subtilissime punctulatum, pubescens, oculis depresso-brunneis; rostrum thorace fere longius; parum arcuatum, subtiliter punctulatum, basin versus crassius, piceum, pubescens, apice attenuatum rubrum, glabrum nitidum. Antennæ vix rostro cum capite longiores, crassiœculæ, rufo-ferrugineæ. Thorax latitudine longior, anterius angustior, & juxta apicem transversim impressus, basi truncatus, supra modice convexus, nigro-piceus, crebre punctulatus, pube depresso sericea, cinereo-virescente nitida, testus. Scutellum parvum pubescens. Elytra thorace parum latiora, & illo triplo longiora, supra convexa, nigro-picea, posterius saepe dilutius rufo-ferruginea, sat profunde punctato-striata, intersticiis coriaceis, pube simili ac thorax testa. Corpus subtus piceum punctulatum, squamulis densis piliformibus cinereo-albidis tectum. Pedes crassiscutuli rufo-testacei, cinereo-pubescentes.

Var. b, saepe paullo minor, pube rariori, minus nitida adpersus, antennarum clava, femoribusque obscurius fusco-piceis, forte mag.

49. R. Beccabungæ: niger, thoracis lateribus pectoreque albido squamolis, antepanarum basi

basti, tibiis elytrorumque plagi rufo-testaceis, thorace brevissimo postice sinuato.

Fabr. Eleu. 2. 493. 263.

*Curculio Beccabungæ*. Payk. fn. 3. 254 74. 1

Var. b, Thorace fere toto squamuulis cincto-albidis recto, elytris rufo-testaceis, sutura marginaque nigro fuscis, pedibus totis testaceis.

<sup>2</sup>*Curculio Beccabungæ* Linn. Syst. 2. 611. 42.  
Fn. Sv. 607. Herb. Col. 6. 202. 164. Tab.  
74. f. 2. a, b.

Var. c, Niger, elytris ferrugineis, vix fulvo-marginatis, pedibus rufo-piceis.

Var. d, Elytris nigris immaculatis, cæterum ut a.

Var. e, Elytris pedibusque totis nigris, cæterum ut a & d.

Habitat in plantis aquaticis, præsertim *Veronica Beccabunga*, mintis freqvens.

Deser. Rh. piceostri plerumque paullo major, præsertim in elytris latior, sed variat etiam multo minor. Caput breve, latum nigrum punctulatum, griseo-pubescentem, oculis brunneis prominentibus; rostrum vix thorace longius, minus tenuis, parum arcuatum, nigrum, nitidum, punctulatum. Antennæ vix longitudine rostri cum capite, crassiusculæ ferrugineæ, clava majuscula ovata nigra. Thorax brevissimus transversus, antice angustior, & juxta apicem striga transversi impressus, postice sub-sinuatus,

*medium dilatata*, posterius attenuata, supra antice  
valde convexa, sub-gibbosa, nigra, profunde stria-  
ta, & in striis punctata, interstitiis lœvibus; ante  
medium fascia magna inæqualis communis; margi-  
nem non attingens, quasi e lineis 5 vel 6 inæquali-  
bus conflata, e pilis densis albidis, quibus detritis,  
fundus elytri sub fascia testaceus appetet; ante api-  
cem macula, e tribus lineolis similibus constans; in  
ipsa basi etiam lineolæ nonnullæ albidæ. Corpus  
fimbriatum, obsoleto punctulatum, tenui pube-  
scens, pectore dense albo squamoso. Pedes elonga-  
ti, pallidi, aut immaculati, aut genubus femoribus  
que supra plus minusve nigris.

Var. b, in omnibus simillima, sed discus ely-  
trorum latius testaceus; fascia nempe cum macula  
postica confluente; variat etiam, rarius licet, elytris  
quoad maximam partem testaceis, basi marginibus  
que nigro-fuscis; in junioribus interdum thorax te-  
staceo-variegatus;

53. *R. Ptinoïdes*: piceus, cinereo-squamosæ,  
supra spinulis erectis nigris muricatus, an-  
tennis, rostro pedibusque ferrugineis, tho-  
race oblongo.

*Curculio Ptinoïdes*. Marsh. Ent. Br. i. 258. 59.

Habitat in Westmannia, Dom Crug; in  
Scania, Dom. Fallén; rarissime tamen  
apud nos obvius; ex Anglia a Dom.  
Kirby misus.

Descr. Rh. bipunctato minor, angustior, magis  
convexus, Ptino furi facie quodammodo similis. Ca-  
put rotundatum convexum rufo-piceum punctula-  
tum, squamulis ciaereis tectum, oculis parvis de-  
presso.

is brunneis; rostrum vix longitudine capitis cum thorace, crassiusculum; arcuatum, rufo ferrugineum, punctulatum, apice depresso, nonnihil dilatatum. Antennæ capite cum rostro longiores, tenues, pallide testaceæ. Thorax latitudine postica longior, anteriorum multo angustior, basi truncatus, supra convexus, piceus, profunde punctatus, squamulis depresso cinereis variegatus, et spinulis crebris erectis nigris adpersus. Scutellum vix ulrum. Elytra ante thoracis basi parum latiora, ante medium dilata, thorace vix triplo longiora, posterius attenuata, supra valde convexa, sub-gibbosa, nigro picea, profunde et rude punctato-striata, squamulis depresso cinereis variegata, aliisque majoribus erectis nigris spiniformibus seriatim adpersa. Corpus subtus rufo-piceum punctatum, dense cinereo-squamulosum. Pedes medioeres fusco-ferruginei, dense cinereo-pubescentes & squamulosi.

54. *R. Lemnæ*: nigro-piceus, antennis pedibusque rufo-piceis, rostro crassiusculo, apice sub-depresso, elytris ovatis, profunde punctato-striatis, cinereo-nebulosis.

*Fabr. Eleut.* 2. 455. 88.

*Curculio Lemnæ*. *Payk. fn. 3.* 267. 89. *Panz.* *fn. 17. f. 10.*

*Curculio inspettatus*. *Herbst. Col. 6.* 301. 274. *Tab. 83. f. 9.*

Habitat in Lemnæ foliis, ad ripas arenosas, paucim.

Descr. Minutus, Latidio gibboſo vix major. Caput rotundatum nigro-piceum, subr. iter punctulatum, oculis depreſſis brunneis; roſtrum vix longitudine capitis cum thorace, crasiusculum nigro-piceum, arcuatū, apice nonnihil dilatatum et depreſsum, bafi punctulatum. Antennæ roſtro cum capite parum longiores, crasiusculæ, rufo piceæ, clava ovata obſcuriori. Thorax longitudine vix latior, bafi aq. ceq. truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, ſupra convexus, nigro-piceus, crebre punctulatus, interdum linea lateralī, e pube minitiflora cirerea, utrinque ornatus. Scutellum nutrum. Elytra thoracis bafi ſere duplo latiora, humeris prominulis, & illo quadruplo longiora, apice attenuata, declivia, anum obtentaria, ſupra convexa, dorſo antico ſub-depreſſa, nigro-picea, profunde ſtrata, fere fulcata, & in ſtris purata, interſtitiaſ convexis ſub-aeribus; juxta bafin & in diſco lituræ aliquot cineræ, e pube tenuiſſima fugaci oratae. & valde obſoletae. Corpus ſubtus nigro piceum punctulatum, tenuiſſime pubefcens. Pedes elongati validi rufo-picei, femoribus clavatis, verſus apicem nigro-piceis.

Sectio 2:da, Corpore breviori, ova-to vel ſub-quadrato.

Subdivisio I:a, Thorace ſub-aeruali, non tuberculato; elytris anum non tegentibus.

55. R. Campanulæ: niger ſub-depreſſus, pilis cinereo-albidis, elytrorum ſeriatis, adaspersus; thorace poſtice rotundato, roſtro cylindrico tenui.

Fabr. Elat. 2. 448. 52.

Conf.

*Circulio Campanulae.* Linn. *Syst. 2.* 607. 7.

*De Gén. Ins. 5.* 236. 23. *Herbst. Col. 6.* 161.  
*119. Tab. 70. f. 15.* *Payk. fn. 3.* 212. 29. *Nat-*  
*zén. Act. Holm. 1794. 4.* 269. 4. *Mas.*

**Habitat in floribus, præsertim Campanulae rotundifoliae, freqvens.**

Descr. Medius inter minores, Rh. Geranii ~~ac-~~  
qualis. Caput valde retractum rotundatum nigrum;  
obsolete punctulatum, tenuissime pubescent, prout  
impressa; oculi sub-depressi nigro-brunnei; rostrum  
longitudine fere dimidii corporis, tenui, arcuatum,  
nigrum nitidum, basi punctulatum. Antennæ vix capite  
cum rostro longiores, nigrae, clava pubescente.  
Thorax latitudine multo brevior, antice angustior,  
marginè elevationi, stria tenui transversa a disco  
distincta; lateribus & postice omnino rotundatus;  
supra parum convexus, niger, crebre evidenter puncta-  
tus, pilis tenuissimis cinereo-albidis depresso-par-  
ce adspersus. Scutellum oblongo-rotundatum ni-  
grum sub-læve. Elytra thorace latiora, humeris  
non nihil prominulis, & illo plus triplo longiora;  
apice obtuse rotundata, abdome breviore, supra pa-  
rum convexa, nigra, sat profunde striata, & in striis  
punctata, interstitiis confertissime rugoso-punctatis  
in singulo interstitio series duæ vel tres e pilis bre-  
vibus depresso-rigidis cinereo-albidis nitidis, unde  
elytra concinne albido striata apparent. Corpus  
subtus nigrum punctulatum, tenue cinereo-pubes-  
cens, pectoris lateribus densius albido-squamulosus;  
segmentum penultimum ventrale maris in medio  
profunde impressum, denticulis duobus validis arma-  
tum; feminae convexum muticum. Pedes elongati  
nigri, cinereo pubescentes, femoribus omnino mu-  
ticis in utroque sexu.

I.

Obs.

lator, anterius angustatus, juxta apicem striga late & sat profunda transversa impressus, postice sub-bi-sinuatus, in medio productus, supra modice convexus, squamulis ferrugineo-aureis nitidis omnino tectus, quibus deratis, subriffime punctulatus, niger. Scutellum rotundatum, similiter squamulosum. Elytra thorace parum latiora, numeris prominulis, & illo triplo longiora, supra modice convexa, obsolete punctato-striata, squamulis similibus uti thorax omnino tecta; paullo pone medium dorsi litura communis obsoleta fusca, postice albido-marginalata, & interdum etiam anterius litura una alterave pallide cinerea; saepe tamen lituræ illæ valde obsoletæ, vix conspicuæ. Corpus totum subitus squamulis densis albidis tectum, interdum anum velutina ferrugineo-tinctus. Pedes mediocres nigricantes, dense cinereo-pubescentes, tibialis tarsisque saepe fusco-ferrugineis.

**53. R. globosus;** supra niger glaber, subtus albo-squamulosus, antennis pedibusque pilosis, elytris gibbosis nigro-caerulecentibus, striis levibus, scutello albo-squamoso.

*Attelabus glebosus.* Fabr. Eleent. 2. 426. 54.  
Panz. fn. 57. f. 10.

*Curculio globosus.* Herb. Col. 6. 144. 105. Tab.  
69. f. 10. Payk. fn. 3. 264. 86.

*Curculio hypoleucus.* Quens. Diss. p. 16.

*Curculio cyanus.* Linna. Synt. 2. 606. 5. Fm.  
Sv. 581.

Habitat in arenosis aridis passim, minus frequens.

Descr.

Descr. Rh. Campanulae paullo minor, & omnibus nostris magis convexus, fere globulus. Caput intra thoracem omnino retractum, fronte solum conspicua, quae parum convexa, nigra, subtilli ne punctulata, pannis tenuibus albidis adspersa; oculi magni depresso, in fronte approximati; rostrum longitudine dimidii corporis, arcuatum, nigrum, punctatum & sub-striatum, pectori arte applicatum. Anteriora rostro cum capite longiora, evidenter periculata, fusco-ferruginea pubescentes. Thorax brevissimus transversus, antice angustior, lateribus & postice rotundatus, supra convexus, niger, saepe cinnamomeo vel violaceo-micans, subtilli ter oblongo ete punctulatus, fere glaber, lateribus & subtus squamu'is densis cinereo-albidis tectus; ante scutellum etiam squamu'æ aliquot albidæ. Scutellum elevatum rotundatum nigrum, albo squamosum. Elytra antice thoracis basi multo latiora, humeris rotundatis, & illo triplo longiora, posterius valde attenuata, apice rotundata, supra valde convexa, propositum anterius gibbosa, nigro cinnamentialia, interdum violacea nitida glabra, tenui striata, striis levibus. interstitiis latis planis, apex summus elytrorum saepe ferrugineus. Corpus subtus nigrum, vix punctulatum, squamu'is densis cinereo-albidis omnino tectum. Pedes elongati crassiusculi nigropicei, dense cinereo squamosi, tibiis tarsisque dilatius fusco-ferrugineis.

Obs. Descriptio in Linn. Fn. loc. cit. quatenus e Faunæ editione 1:2 n:o 467, desumpta, ad apion cyaneum pertinet; additamentum vero in Faunæ Ed. 2:da, ut & character in Systemate, loc. cit., speciem jam descriptam designant.

59. R. Scortillum: niger convexus, subtus albidio-squamulosus, pedibus rubris, elytris

profunde punctato-striatis apice rufis, fūtura basi albo squamosa.

*Curculio Scortillum.* Herbst. Col. 6. 418. 402.

Tab. 92. f. 13.

*Curculio Agricola.* Payk. fn. 3. 260. 81.

*Curculio inflexus.* Marsh. Ent. Br. 1. 253. 43.

Habitat in arvis pafsim.

Descr. Parvus, Rh. Lemnæ parum major. Caput rotundatum nigrum subnitidum, crebre punctatum, tenui pubescens, oculis brunneis, nonnihil prominulis; rostrum longitudine capitis cum thorace. valde arcuatum, nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ longitudine rostri, cum capite, rufo-piceæ, clava magna fusca. Thorax latitudine brevior, anterius angustior, basi bisinuatus, supra valde convexus, æqualis, niger, crebre & sat profunde punctatus, pilis minimis cinereis adpersus, lateribus & subtus dense albido squamosus. Scutellum vix ullum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris prominulis, & illo plus triplo longiora, supra modice convexa, antrosum nigra, apicem versus indeterminate, plus minusve rufa, profunde punctato-striata, interstitiis sublævibus, pilis minimis adpersa; suturæ basis plerunque albido-squamosa. Corpus subtus nigrum punctatum, dense albido-squamosum. Pedes medioctes, læte rufo-testacei, ipsa basi femorum, ungibusque fusco-piceis.

Co. R. rubicundus: niger convexus, cinereo-squamulosus, pedibus rufis, elytris profunde punctato-striatis rufo-testaceis, sutura fusca, basi albo-squamosa.

Panzl

Panz. Fn. 99. f. 12. in Tab. Rh. dumetorum  
in Textu, secundum specimen detritum de-  
scriptus.

*Curculio rubicundus.* Payk. Fn. 3. 263. 84.

*Curculio melanocephalus.* Marsh. Ent. Br. t.  
253. 44.

Var. b. *Elytris obscurius rufo-brunneis.*

Var. c, rostri apice, thoraceque rufo-ser-  
rugineis.

Habitat in foliis Betuleæ albæ, locis paludo-  
sis, passim.

Descr. Rh. Quercus magnitudine & facie simili, sed convexior, elytra multo profundius punctato striata, & color alius. Capitum convexum rotundatum retractum nigrum, crebre & profunde punctatum, cinereo squamulosum, oculis depresso brunneis; rostrum longitudine fere dimidii corporis, minus tenui, arcuatum nigrum, crebre punctulatum, saepe apice brunneum. Antennæ longitudine rostrum capite, tenues, rufo-piceæ, clava parva fusca. Thorax brevis, antice coarctatus, & ante apicem late & profunde transversim impressus, margine reflexo elevato ferrugineo; postice bisinuatus. supra convexus, niger, crebre & profunde punctatus, in medio obsolete canaliculatus. Squamulis cibero-albidis, subtus, versus latera & postice densioribus tectus, disco plerumque derasus. Scutellum parvum nigrum, albo-squamulosum. Elytra thoracis basi dimidiæ latiora, humeris prominulis, & illo quadruplo longiora, supra convexa, aut saturatius rubra, aut pallidius testacea, profunde punctato-striata, intersticiis planis sub-lævibus; sutura pleurali que, non vero semper, nigro-fusca, a basi ver-

fus medium albido. squamösa; striolæ plures longi  
tudinales ab-aptæ e squamulis albicantibus. præ-  
tim prope basin & pone medium, in illæsis inliv-  
duis elytra commaculant, facile vero deteruntur.  
Aæ longæ fuscæ-hyælinæ. Corpus subtus nigrum  
punctulatum, pectore densius, abdomine parcus. al-  
bido-squamosis. Pedes mediocres rufo-ferruginei,  
ipsæ basi femorum, tarsisque nigricantibus vel fuscis.

Var. b, differt tantum elytrorum colore obscu-  
rias brunneas.

Var. c, pallidior; rostri medietas antica rufo-  
brunnea; thorax supra ferrugineus; elytra & pedes  
fere toti rufo-testacei; anus saepe rufo piceus; ce-  
tera ut in prioribus.

61. R. Quercus: depressior, nigro-fulcus,  
cinereo-squamösus, pedibus fuscō-ferru-  
gineis, elytris obsoletius punctato striatis  
testaceis, fasciis undulatis cinereo squa-  
mosis.

*Fabr. Eleut. 2. 455. 84.*

*Curculio Quercus. Herbst. Col. 6. 412. 394 Tab.*  
*92. f. 7. Payk. fn 3. 261. 83. Curculio pale-*  
*lens. Marsh. Ent. Br. 1. 251. 38.*

Var. b, rostri apice rufo, cætera ut in a.

*Curculio ruber. Marsh. Ent. Br. 1. 251. 39.*

Var. c, rufo testaceus, rostro nigro, pe-  
ctore abdominisque basi fuscis.

*Curculio Melanorrhynchus. Marsh. Ent. Br. 1.*  
*250. 37.*

Habitat in foliis Quereus Roboris, non im-  
freqvens.

*Dolom.*

**Deser.** Magnitudo, & fere statura depresso-rubra. Campanulæ, præcedenti alias, ut dictum; similis; variat etiam dimidio minor & ultra. Caput rotundatum fusco-nigrum, subtiliter punctulatum; griseo-squamulosum; oculis nigro-brunneis, parum prominentibus; rostrum longitudine capitis cum thorace, arcuatum nigrum punctulatum. Antennæ longitudine capitis cum thorace, tenues, medio ferrugineæ, basi apiceque fuscæ. Thorax antice coarctatus, juxta apicem stria transversa lata & profunda impressus, margine elevato reflexo ferrugineo, postice sat profunde bipinnatus, supra parum convexus, dorso nigro-fusca; obsoletius punctulatus, in medio canaliculatus, lateribus & subtus fusco-testaceus, dense cinereo-squamulosus; dorso magis nudo, cum linea squamosa in medio. Scutellum oblongum angustum fuscum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, humeris gibbis, & illo triplo longiora, supra parum convexa, minus profunde & obsoletius punctato-striata, intersticiis rugulosis; jam pallidius testacea, jam obscuriora, basin versus & ad futuram magis infuscata; fasciis tribus angustis cinereo-squamosis notata, quarum duæ priores antrosum arcuatae, tertia tetrorum curvata, cum cineritie marginali callum posticum, interdum infuscatum, circulariter inclusa. Pectus & abdomen nigra punctulata, dense cinereo-squamosa. Pedes mediocres fulco-ferruginei pubescentes, femoribus, præsertim posticis plurimumque basi & subtus nigro-fuscis.

**Var. b,** differt tantum rostri apice plus minusve rufo.

**Var. c,** pallidior; caput, thorax & anus fuscos testacea; elytra & pedes ditutius testacea; rostrum nigrum; pectus & abdomen antice fuscæ; cetera ut in prioribus.

**Obs.** Curculio Quercus Cl. Linnæi potius ad Rh. yiminalém Fabricii pertinore, mihi videatur.

**Sub-**

**Subdivisio 2:da, Thorace bi - vel  
4 - tuberculato.  
a, Rostro longiore tenui.**

62. *R. Geranii*: niger, subtus albidus-squamulosus, thorace pulvinato obsolete bi-tuberculato, antice transversim impresso, elytris striatis, interstitiis seriatim tuberculatis.

*Curculio Geranii.* Payk. fn. 3 256. 76.

Habitat in floribus Geranii pratensis, sylvestris & sangvinei, non infreqvens.

Deser. Magnitudo & fore statura Rh. didymi. Caput parum convexum nigrum opacum, creberrime rugoso-punctatum, oculis brunneis nonnihil prominens; rostrum longitudine thoracis, crassiusculum, inflexum, valde arcuatum, nigrum, creberrime rugoso-punctatum. Thorax antice angustior, & juxta apicem profunde transversim impressus, margine antico alte reflexo elevato; postice bisinuatus, supra valde convexus, pulvinatus, niger opacus, creberrime punctatus, vix visibiliter pubescens; versus latera utrinque tuberculum parvum elevatum, saepe obsoletum. Scutellum vix ullum. Elytra thoracis basi latiora, humeris prominulis, pone basin magis dilata, thorace duple longiora, apice singulatim rotundata, abdome paullo breviora, supra convexa, nigra, sat profunde & late striata, striis obsolete rugoso-punctatis, intersticio singulo serie e tuberculis elevatis squamæ-formibus, posterius majoribus; suturæ basis valde impressa. Corpus subtus nigrum, crebre & profunde punctatum, dense albidu squamosum. Pedes longiusculi validi nigri, cimoro-pubescentes.

frenes, tibialis externe nigro-ciliatis, dente obtuso ante apicem armatis.

63. *R. Assimilis*: niger, supra tenuē, sub-tus densius albido squamulosus, thorace depresso: sculo canaliculato bi-tuberculato, rostro longissimo tenui.

*Fabr. E'ent.* 2. 451. 67.

*Curculio assimilis*. *Payk. fn. 3*, 257. 77. *Panz.* *fn. 42 f. 6.*

*Curculio alauda*. *Herbst. Col.* 6 410. 392. *Tab.* 92. *f. 5.*

*Curculio obstriktus*. *Marsh. Ent. Br* 1. 255. 50.

Habitat in floribus præsertim *Brassicæ* & congenerum, sat frequens.

Deser. Præcedenti paullo minor, angustior, rostro longiori & tenuiori, thorace canaliculato sub-depresso. &c. abunde distinctus. Caput nigrum, crebre punctatum, parum pubescens, in statu quieta vel terrefacto intra thoracem retractum, rostro pectori arte applicato, ut in plerisque hujus sectionis; oculi brunnei, parum prominenti; rostrum dimidio corpore fere longius, tenuissimum, valde arcuatum, nigrum nitidum, basi sub-punctatum. Antennæ longitudine rostri cum capite, tenui, nigro-piceæ, cava pubescente. Thorax antice multo angustior, & juxta apicem transversim profunde impressus, postice bi-sinuatus, supra sub-depresso, niger, crebre punctatus, squamuvis piliformibus parce adspersus, canalicula dorsali, basi apiceque profundiori, densus albido-squamulosa, exaratus, & tuberculato-

zalj

gali transverso utrinque armatus. Scutellum nullum. Elytra thoracis basi paullo latiora, & pone basin magis dilatata, thorace triplo longiora, supra parum convexa, nigra, saepe plumbea, regulariter striata, striis obsolete rugoso-punctatis, interstitiis subtilliiter coriaceis, squamulis parvis depresso-piliformibus cinereo-albidis adspersis. Alae corpore duplo longiores, bivalvæ. Corpus subtus nigrum punctatum, squamis densis albidioribus tectum. Pedes elongati teretes nigri, cinereo-pubescentes, femoribus omnibus simplicibus.

Oef. Rh. fulcicollis, in familia sequenti sub no 133, descriptus, huic ut ovm ovo simillimus, sed femora illi dentata, & rostrum paulo erassius, basi magis punctatum; an modo Sexu distincti?

**64. R. Erysimi: nigro-aeneus sub-nitidus; costis pedibusque nigris, elytris cœruleis, præunde punctato striatis, humeris pronotinis, thorace canaliculato bicarucato.**

*Fabr. Eleut. 2. 452. 72.*

*Cuculo Erysimi. Herbft. Col. 6. 407. 388.*

*Tab. 92. f. 1. Payk. fn. 3. 265. 87. Panz. fn. 17. f. 7.*

*Vx. h. Elytris virgineis.*

*Habitat in plantis, præcipue Tetradynamis, frequens.*

*Descr. Statura omnino præcedentis, sed plus capo minor, brevior. Caput nigrum, parum aeneopiceum, crebre & sat profunde punctatum, fronte*

impresso; oculi brunnei non nihil prominuli; rostrum capite cum thorace sere longius, tenuis, valde arcuatum, nigrum nitidum, basi sub-punctatum. Antennæ longitudine capitis cum rostro, tenues nigrae, clava magna pubescente. Thorax brevis transversus, antice multo angustior, & juxta apicem profundo & late transversim impresius, margine elevato reflexo, postice bi-sinuatus, supra parum convexus, fusco-æneus sub-nitidus, profunde & sat crebro punctatus, in medio canaliculatus, tuberculo laterali obtuso utrinque armatus. Scutellum valde depresso triangulare nigrum, sub thoracis angulo medio excurrente omnino occultatum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris valde prominulis, thorace & quadruplo longiora, supra convexa, saturata cœrulea, interdum violacea, sub-nitida, profunde punctato-striata, interstitiis plavis sub lœvibus, apicem versus tuberculato-rugosis. Corpus subrufus virens, æneum sub nitidum, profunde punctatum, parce cinereo-pubescent & squamuosum. Pedes elongati tenuis nigri, parum pubescentes.

Var. b., differt tantum elytris virentibus; variat etiam colore obscuriori, fuscenscente, parum cœno-nicante.

65. R. contractus: niger sub-nitidus, elytris nigro-cœnu'scentibus profunde punctato-striatis, humeris prominulis, thorace bituberculato, obsolete canaliculato.

*Circulio contractus.* Marsh. Ent. Br. 1. 250. 36.  
Habitat in plantis & gramine, sat frequens.

Descr. Statura & summa affinitas praecedentis, sed plus duplo minor, Rh. Lemnae aequalis, totus nigrescens.

ger, elytris vix cœrulecentibus. Caput nigrum, cum oculis, rostro, antennis, omnino ut in præcedenti. Thoracis structura eadem, supra niger, profunde punctatus, obsoletius cana iculatus, bi-tuberculatus. Elytrorum forma ut in priori omnino, supra convexa, nigra, interdum nigro-cœrulecentia, profunde crenato-striata, intersticiis sub rugosis, postice tuberculatis. Corpus subitus nigrum, profunde punctatum, squamulis cinereo-albidis parce adspersum. Pedes elongati tenues nigri.

Obs. Pro varietate pygmæa obscura, præcedentis facile haberi posset, sed similes tantum cum similibus copulatos vidi.

66. R. Cochleariae: niger, cinereo-subpubescens, sururæ basi pectoreque albido-squamosis, thorace canaliculato bi-tuberculato basi hi-sinuato, disco convexo, elytris profunde punctato-striatis, humeris rotundatus.

Habitat in floribus Cochleariae officinalis, ad littora maris, in Balusia, Hallandia, plenim copiose.

Descr. Præcedenti paullo major, convexior, Rh. florali æqualis, utriusque valde similis & affinis, differt tamen, a Rh. contracto; thoracis disco elytrisque convexioribus, parce cinereo-pubescentibus; humeris rotundatis; sururæ basi pectoreque dense albido-squamosis; ab Rh. florali; Elytris convexioribus, profundius punctato-striatis, tenuius pubescentibus, humeris rotundatis, &c. Caput rotundatum nigrum, subtiliter punctulatum, tenui pubescens, oculis brunneis parum prominulis; rostrum capi-

capite cum thorace longius, tenuis, valde arcuatum, nigrum nitidum, basi punctulatum. Antennae longitudine rostrorum cum capite, tenues, nigrae, clava picea pubescente. Thorax brevis transversus, ante multo angustior, & juxta apicem late, & profunde transversim impressus, basi bi-sinuatus, supra parum convexus, niger, profunde, sed minus crebre punctatus, in medio obsoleto canaliculatus, tuberculo obtuso utrinque armatus. Elytra thoracis basi parum latiora, humeris rotundatis, pone basi & ultra medium rotundato-dilatata, thorace plus triplo longiora, supra valde convexa, nigra, profunde punctato-striata, intersticiis sub rugosis, pilis minimis depresso-cinereo-albidis percoso adspersa, sutura basi sub-depressa, dense albida, squamosa. Corpus subtus nigrum punctulatum, thorace pectore recte denso, ventre percus albido-squamatus. Pedes longiusculi tenues nigri, cinerei, pubescentes.

67. R. floralis: niger, sutura corporeaque subtus dense albido-squamosis, thorace canaliculato bi-tuberulato sub-convexo, basi bi-sinuato, elytris obsoletius crenato-striatis cinereo-lineatis, humeris prominulis.

Fabr. Eleut. a. 450. 59.

*Circulus floralis.* Payk. Fn. 3. 266. 33. Herb. Col. 6. 448.

Var. b, sutura elytrorum vix albō-squamata.

Var. c, supra niger, parum cincto-pubescentia.

Inv. Svec. T. I. P. III. K

*Curculio confertus.* Marsh. Ent. Br. 258. 61.  
Habitat in floribus freqvens.

Deser. Parvus, praecedenti æqualis, & ut distum, similissimus. Caput rotundatum convexum nigrum, creberrime subtiliter punctulatum, pubescenti griseo-pubescenti, vertice obsolete carinato; oculi nigri-brunnei parum prominuli; rostrum capite cum thorace fere longius, tenue, valde arcuatum, nigrum, nitidum, basi supra punctulatum, cinereo-pubescentem. Antennæ longitudine rostri cum capite, tenues nigrae, clava breviori ovata. Thorax brevis transversas, structure omnino ut in praecedenti descriptus, postice profunde bisinatus, supra striata apicis, canalicula media, & tuberculis lateribus, ut si proff, niger, creberrim & minus profundus punctatus, deinceps cinereus pubescens & squamulosus, praesertim versus latera. Elytra thoracis basi latiora, humeris prominulis, & illo tripli longiora, supra minus convexa, praesertim anterius, tota nigra, regulariter striata, striis obsoletius obnata punctatis, interstitiis crebre transversim rugosis; sutura fere tota dense albida squamulosa, & interstitia singula serie dorso pilis rigidis depressis cinereis approximatis adpersa, unde elytra cinereo-lineata apparent. Alæ longæ albido subopacæ. Corpus subitus nigrum punctatum, squamulis densis albidis tectum. Pedes mediocres nigri, cinereo-pubescentes.

Var. b, differt tantum elytrorum sutura disco fere concolori, vix densius albido-squamolosa.

Var. c, supra nigrior, parce cinereo-pubescent, forte adutior & magis detrita, Rh. Cochleariae simillima, sed elytris minus convexis, striis ob-

sole-

obsoletus punctulatus, humeris prominulis; &c. distincta,

68. R. depresso collis: niger, subtus depse albido-squamosis; thorace depresso obsolete canaliculato bituberculato; postice truncato, elytris obsoletius crenato-striatis cinereo-lineatis, humeris prominulis.

*Circulus nigrinus*: Marsh. Ent. Br. i. 250. 35.

Habitat in floribus sat frequens.

Descr. Statura & magnitudo praecedentis, cui primo institu ut ovum ovo simillimus, sed thoracis structura longe alia, antepennarum clava longior, et lytrorum sutura disco concolor, &c. Caput, oculi rostrum ut in praecedenti omnino. Antennæ capite cum rostro longiores, nigrae, medio piceæ, clava valde elongata acuminata pubescente. Thorax, subtransversus, antice multo angustior, & juxta apicem transversim impressus, minus tamen profunde quam in prioribus, margine antico elevato, reflexo, basi truncatus, in medio sovena angusta profunda, antrosum in canaliculato obsoletam continuata, impressus, supra depresso, praesertim posterius, totus niger, crebre punctatus, pube cjaerea depresso adspersus, utrinque tuberculo obtuso armatus. Scutellum vix ullum. Elytra quoad structuram, strias, & lineas pilosis intersticularum, omnino ut in praecedenti, sed sutura non densius pilosa. Corpus subtus nigrum, punctulatum, dense albido pubescens. Pedes longi culi tenues nigri, cinereo-pubescentes, tarsis fuscō-ferrugineis.

69. R. Ericæ: niger, virescenti-politus, suturæ basi pectoreaque albo-squamosis;

K 2 anter-

antennis, pedibus, rostroque longissimo tenui rufis, thorace sub-depresso bi-tuberculato.

Var. b, corpore toto rufo-testaceo.

Habitat in floribus Ericæ vulgaris, mentè Augusto, passim, non infreqvens.

Descr. Statq[ue] Rh. floris, & vix ille major; corpus reapse nigrum, sed plerumque polline florū virescenti dense adspersum. Caput rotundatum nigrum, crebre punctulatum, pilis & squamulis cinereis adspersum, vertice sub-carinato; oculi prominuli nigro-brunnei; rostrum longitudine dimidii corporis, tenuē, arcuatum, rubrum nitidum, apice saepe magis fuscum. Antennæ longitudine rostri cum capite, tenues, pallide rufescentes, clava ova ta pubescente. Thorax antice angustior, margine sub-reflexo, medio parum emarginato, postice sub-truncatus, vel in medio parum productus, supra sub-depressus, niger, creberrime granulato punctatus, pilis minimis cinereis parce adspersis, in medio vix canaliculatus, tuberculo parvo elevato utrinque armatus. Scutellum parvum triangulare nigrum depresso. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, sed illo vix triplo longiora, supra modice convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis tuberculato-fugosis, & pilis rigidis cinereis seriatim adspersis; sutura a basi versus medium albo-squamosa. Corpus subtus nigrum punctulatum, thorace pectoraque dense, abdomine parcius albo-squamosis. Pedes mediocres validi, toti rufo-testacei, cinereo-pubescentes.

Var. b, differt, corpore toto rufo-ferrugineo, antennis pedibusque pallidioloribus, forte nuper exclusa,

70. R.

70. R. Qverceti: niger, subtus dense, supra  
parcius albido - squamosus, antennarum  
medio, pedibus, elytrorumque apice rufo-  
testaceis, thorace acute bi - tuberculato.

Habitat in Quercetis rarijs.

Deser. Parvus, minimis Rh. Quereus individualis  
æqualis & similis, sed differt thorace bituberculato,  
colore, &c. Caput rotundatum nigrum, crebre  
punctatum, parce albido-squamulosum, oculis brun-  
neis sat prominulis; rostrum longitudine dimidiæ  
corporis, tenuis, valde arcuatum, nigrum nitidum,  
basí punctulatum. Antennæ rostro cum capite lon-  
giores, tenues, medio rufo-testaceæ. basí apicequa  
fusco piceæ. Thorax brevis transversus, antice val-  
de coarctatus, & juxta apicem transversim profunda  
& late impressus, margine elevato reflexo, saepe  
ferrugineo; basí sub-truncatus, supra niger, crebre  
punctatus, in medio transversum convexus, obsoleto  
canaliculatus, tuberculo lateralí valido acuminatus  
utrinque armatus, lateribus & subtus dense, dorso  
parcius albido-squamosus. Elytra thoracis basí di-  
mido latiora, humeris valde prominulis, & illa  
plus triple longiora, apice singulatim rotundata,  
supra nigra opaca, obsoletius punctato-striata, in-  
testititis creberrime subtiliter rugulosis, squamulis  
albidis, ad suturæ basin magis condensatis, adspersa;  
apex late rufo-testaceus. Corpus subtus ni-  
grum, crebre punctatum, pectore dense, ventre par-  
cius albido-squamosus. Pedes elongati rufo-testa-  
cei pubescentes, femoribus sub-clavatis, interdum  
obscuriорibus.

71. R. subrufus: rufo-testaceus totus, sub-  
tus albido-squamosus, thorace bi-tuber-

albido-squamosum. Pedes elongati nigri; cinereo-pubescentes, tarsis piceo-ferrugineis.

73. R. *Myriophylli*: sub-depressus niger opacus, subtus dense albo-squamulosus, supra fuliginoso-squamulosus albido-irroratus, pedibus testaceis, thorace inaequali tuberculato.

Habitat in Spicis *Myriophylli*, in aquosis Roslagitæ, rarius; Dom. *Forsström*.

Descr. Magnitudo sere præcedentis, sed multo magis depresso, Rh. 4-tuberculato quodammodo simili. Caput rotundatum nigro-piceum, subtiliter punctulatum, albido-squamulosum, oculis nigro-brunneis, parum prominulis; rostrum vix longitudine thoracis, crassiusculum, arcuatum, piceum, crebre punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, fuso-ferrugineæ, clava obcuriore. Thorax anterius paulo angustior, apice truncatus, margine parum elevato, denticulis duobus parvis remotisi armato; postice profunde bimaculatus, supra depressus, inaequalis, tuberculo valido acuminato utrinque armatus; in medio profande camaliculatus, & impressione dorsali obliqua utrinque impressus, totus niger opacus, obsolete punctulatus; supra squamulis fuliginosis tectus, lateribus & subtus dense albido-squamulosus. Scutellum parvum depresso nigrum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, humeris prominulis, & illo quadruplo longiora, supra dorso depressa, nigra opaca, obsolete striata; squamulis fuliginosis omnino tecta, immixta nubilis & squamulis griseo-albidis; latera elytrorum inflexa dense albido-squamosa, & macula alba brevior communis in futura antice, Corpus

to-

totum subtus dense albo-squamosum. Pedes elongati tenues, rufo-testacei, albido-pubescentes, genibus tarsisque nigro fuscis.

Obs. Ob rostrum brevius & crassius, haec species transitum ad seriem sequentem parat.

### b. Rostro breviori incrassato.

74. R. 4-tuberculatus: niger, supra cinctus nereo-nebulosus, subtus albido-squamulosus, tibiis testaceis, thorace depresso foveolato quadri-tuberculato.

Fahr. Elev. 2. 448. 49.

*Circulus 4-tuberculatus.* Herbst. Col. 6. 499, 390. Tab. 92. f. 3. Payk. Fn. 3. 258. 79.

Habitat in arvis passim.

Descr. Statura Rh. Didymi, sed paullo minor. Caput rotundatum depresso nigrum, crebre punctatum, pilis parvis, saepe aureo vel purpureo micantibus tectum, limbo postico albido-squamulosum; oculi nigro-brunnei sub-prominentia; rostrum capite parum longius, crassum arquatum nigrum, crebre punctatum, pilis micantibus uti caput adspersum. Antennae rostro cum capite parum longiores, crassissimae rufo-piceae, clava obscuriori. Thorax antice coarctatus, truncatus, margine vix elevato, tubercululis duobus parvis remotis, lateraliter inclinatis, armato; postice bi-sinuatus, supra sub-depresso, niger, crebre punctatus, tuberculo valido acuminato utrinque armatus, foveolisque tribus dorsalis impressus, una juxta apicem profundiori duabus in medio, paribus. Elytra thoracia basi dimidio latiora; humeris gibbis, & illo triplo longiora.

glora, supra parum convexa, nigra opaca, punctato-striata, intersticiis subtilissime coriacetis, squamulis cinereo-albidis, hinc inde congestis, nebulosa. Corpus subtus nigrum punctulatum; albido & brunneo-squamulosum. Pedes elongati tenues, cinereo-pubescentes, femoribus nigris, annulo cinereo versus apicem cinctis, tibiis tarsisque ferrugineis.

75. *R. quadricornis*: niger, subtus albido-squamulosus, antennis pedibusque totis testaceis, futuræ basi alba, thorace convexiori quadri-tuberculato.

*Curculio 4-tuberculatus.* Herbst. Col. 6. 409.  
390. var.

Habitat in arvis & campis aridis rarius.

Descr. Praecedenti valde similis & affinis, sed differt thorace convexiori non foveolato, elytris non nebulosis, sed macula alba scutellari notatis, pedibus totis testaceis, &c. Caput depresso, nigrum; crebre punctulatum, limbo postico albo-squamoso; oculi brunnei sub-præminuli; rostrum brevius quam in priori, nigrum punctulatum, apice magis incrassatum. Antennæ crassiculæ ferrugineæ. Thorax aptice angustior, compressus, transversatus, margine vix elevatiore, tuberculis duobus ut in priori armato; postice bi-sinuatus, supra modice convexus, sub-aequalis, niger, crebre & profunde punctatus, utripque tuberculo valido acuto armatus, dorso sere nudus, subtus & lateribus dense albo-squamulosus. Elytrorum forma, striæ & punctura ut in praecedenti omnino tota nigra, pilis vix visilibus cari adspersa, nebulis vero nullis cibis rebus contaminata; in basi futuræ macula ovata albo-

bo-squamofasciatus. Corpus subtus nigrum pubescens, dense albo-squamulosum. Pedes elongati tenues ferruginei, femoribus apice paullo obscurioribus.

76. R. quadri-nodosus: niger, suturæ basi corporeque albido-squamosis, pedibus rufis, thorace profunde punctato, elytris que tuberculatis.

Habitat in arenosis aridis passim.

Descr. Praecedenti iterum similis & affinis; sed fere duplo minor, thorax profundius punctatus, elytra externe tuberculata, &c. Caput nigrum, crebre & profunde punctatum, tempore cinereo-pubescentia, fronte depressa; oculi brunnei prominuli; rostrum & antennæ ut in praecedenti. Thorax ante angustior, margine, præfertim in medio adscendente, ibique sat profunde, sed non late emarginato, unde existant tubercula duo approximata, porrecta, nec lateraliter deflexa ut in prioribus; postice vix sinuatus, supra convexus, æquivalis, niger subnitidus, punctis magnis crebris profundis pertusus, & versus posteriora utrinque tuberculo parvo armatus; supra fere glaber, lateribus & subtus parce cinereo-squamulosus. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, humeris rotundatis, & illo triplo longiora, supra valde convexa, nigro picea, posterius saepè rufo picea, profunde punctato-striata; interstitiis interioribus subrugosis, exterioribus tuberculis elevatis sub-acutis seriatis armatis; versus basin suturæ lineola angusta e squamulis albidis: Corpus subtus nigrum punctatum, squamulis albidis adpersum. Pedes mediocres, saturate rufo-testacei, ipsa basi femorum nigricante.

77. R. Comari: niger, supra cinereo-variegatus, subtus albido-squamulosus, anten-nis tibiis tarisique testaceis, thorace cana-liculato obsolete bi-tuberculato.

*Curculio Comari.* Herbst. Col. 6. 411. 393. Tab. 92. f. 6.

Habitat in pratis humentibus, praesertim in  
Comaro palustri, passim.

Deser. Statuta & similitudo Rh. 4-tuberculata,  
sed paullo minor, thoracis margo anterior muticus;  
&c. Caput sub-depressum nigrum, crebre punctu-  
latum, postice cinereo-squamulosum, oculis brun-  
neis prominulis; rostrum vix capite longius, cras-  
sum nigrum opacum, confertissime punctulatum.  
Antennae capite cum rostro longiores, crassiusculæ,  
articulo primo pallido, crassiori & breviori quam  
in plerisque hujus generis, vix quartam partem to-  
tius attingente; secundo crasso ob-conico fuso,  
reliquis obscure ferrugineis, clava pubescente. Tho-  
rax antice angustior, truncatus, margine mutica,  
vix elevato, postice bi-fasciatus, supra parum con-  
vexus, niger, crebre subtiliter punctulatus, in me-  
dio canaliculatus, & tuberculo obsoleto laterali u-  
trinque armatus; subtus & lateribus squamu-lis den-  
sis albidi tectus, quæ albide in medio laterali ra-  
spulum introrsum emittit, unde discus niger in-  
versus, quasi lobatus evadit; canalicula dorsalis  
enjam squamu-lis albidi repleta. Elytra thoracis ba-  
si sere duplo latiora, humeris prominulis, & illo  
triplo longiora, supra convexa, nigra; sat profunde  
carinata, sed in striis obsolete punctata, interstitiis  
convexis subtilissime coriacis, squamu-lia cinereo-al-  
bidis, praesertim posterioris & ad latera variegata.

Cor.

**Corpus subtilis dense albido-squamosum; Pédes elongati tenues; femoribus nigris, tibiis tarsisque testaceis.**

78. **R. pericarpius:** niger, futuræ basi corporeoque albido-squamosis, antennis pedibusque ferrugineis, thorace obsolete bimaculato, elytrorum interstitiis subtiliter coriaceis.

*Fabri. Elevt. 2: 451. 6.*

*Cyclotus pericarpius. Herbst. Col. 6. 401. 381.*

*Tab. 91. f. 12. Payk. fn. 3. 255. 75.*

**Habitat in plantis variis, præsertim in foliis Rumicis, quas misere devastat, ubique frequens.**

**Descri. *Mas Rh. didymo magnitudine æqualis; sethina duplo major; cæterum ambo sexus in omnibus simillimi.*** Caput rotundatum nigrum, creberime punctulatum, pilis minimis cinereis parce adspersum, fronte inter oculos depresso; oculi brunnii sat prominuli; rostrum vix capite longius, crassum, arcuatum, nigrum, crebre subtiliter rugoso-punctatum. Antennæ rostro cum capite longiores, ferrugineæ, articulo primo pallidiori. Thorax brevis transversus, antice angustior, truncatus, margine pallido-ciliato, in medio leviter emarginato, minimè reflexo; postice bi-sinuatus, supra convexus, niger, creberime & profunde punctatus, pilis minimis cinereis parce adspersus, in medio obsolete canaliculatus, canali postice albido-squamoso; subitus & lateribus densius albido-squamosus; versus posteriora utrinque tuberculum laterale obtusum, valde obsoletum, Elytra thoracis basi vix di-

*midig*

giors, supra parum convexa, nigra opaca, punctato-striata, interstitiis subtilissime coriacet, squamulis cinereo-albidis, hinc inde congestis, nebulosa. Corpus subtus nigrum punctulatum; albido & bruno-squamulosum. Pedes elongati tenues, cinereo-pubescentes, femoribus nigris, annulo cinereo versus apicem cinctis, tibiis tarsisque ferrugineis.

75. R. quadricornis: niger, subtus albido-squamulosus, antennis pedibusque totis testaceis, futuræ basi alba, thorace conve-xiori quadri-tuberculato.

*Curculio 4-tuberculatus.* Herbst. Col. 6. 409.  
390. var.

Habitat in arvis & campis aridis rarius.

Descr. Praecedenti valde similis & affinis, sed differt thorace conve-xiori non foveolato, elytris non nebulosis, sed macula alba scutellari notatis, pedibus totis testaceis, &c. Caput depresso, nigrum; crebre punctulatum, limbo postico albo-squamoso; oculi brunnei sub-præminuli; rostrum brevius quam in priori, nigrum punctulatum, apice magis incrassatum. Antennæ crassiulæ ferrugi-neæ. Thorax aptice angustior, compresus, trans-gatus, margine vix elevatiore, tuberculis duobus ut in priori armato; postice bi-sinuatus, supra mo-dice convexus, sub-æqualis, niger, crebre & pro-funde punctatus, utriqve tuberculo valido acuto ornatus, dorso sere nudus, subtus & lateribus dense albo-squamulosus. Elytronum forma, striae & punctura ut in praecedenti omnino tota nigra, pilis vix vilibus raro adspersa, nebulis vero nullis ci-vitereis contaminata; in basi futore macula ovata albo-

bo-squamofac. Corpus subtus nigrum pubescentium,  
dense albo-squamulosum. Pedes elongati tenues fer-  
ruginosi, femoribus apice paullo obscurioribus.

76. R. quadri-nodosus: niger, suturæ ba-  
si corporeque albido-squamosis, pedibus  
rufis, thorace profunde punctato, elytri-  
que tuberculatis.

Habitat in arenosis aridis passim.

Descr. Praecedenti iterum similis & affinis; sed  
fere duplo minor, thorax profundius punctatus, e-  
lytra externe tuberculata, &c. Caput nigrum, cre-  
bre & profunde punctatum, tempe cinereo-pube-  
scens, fronte depressa; oculi brunnei prominuli;  
rostrum & antennæ ut in praecedenti. Thorax an-  
tice angustior, margine, præsertim in medio adscen-  
dente, ibique sat profunde, sed non late emargin-  
ato, unde exstant tubercula duo approximata, por-  
recta, nec lateraliter deflexa ut in prioribus; posti-  
ce vix sinuatus, supra convexus, æqualis, niger  
subnitidus, punctis magnis crebris profundis per-  
tusus, & versus posteriora utrinque tuberculo parvo  
armatus; supra fere glaber, lateribus & subtus par-  
ce cinereo-squamulosus. Elytra thoracis basi vix di-  
midio latiora, humeris rotundatis, & illo triplo  
longiora, supra valde convexa, nigro picea, poste-  
rius saepè rufo picea, profunde punctato-striata;  
interstitiis interioribus subrugosis, exterioribus tu-  
berculis elevatis sub-acutis seriatim armatis; versus  
basin suturæ lineola angusta e squamulis albidis;  
Corpus subtus nigrum punctatum, squamulis albidis  
adspersum. Pedes mediocres, saturate rufo-testacei;  
ipsa basi femorum nigricante.

77. R. Comari: niger, supra cinereo-variegatus, subtus albido squamosus, anten-nis tibiis tarsisque testaceis, thorace canaliculato obsolete bi-tuberculato.

*Curculio Comari. Herbst. Col. 6. 4ii. 393. Tab. 92. f. 6.*

Habitat in pratis humentibus, praesertim in Comaro palustri, passim.

Deser. Statuta & similitudo Rh. 4-tuberculata, sed paullo minor, thoracis margo anterior muticus, &c. Caput sub-depressum nigrum, crebre punctulatum, postice cinereo-squamulosum, oculis brunneis prominulis; rostrum vix capite longius, crassum nigrum opacum, confertissime punctulatum. Antennæ capite cum rostro longiores, crassissimæ, articulo primo pallido, crassiori & breviori quam in plerisque hujus generis, vix quartam partem totius attingente; secundo crasso ob-conico fusco, reliquis obscure ferrugineis, clava pubescente. Thorax antice angustior, truncatus, margine mutico, vix elevato, postice bi-sinuatus, supra parum convexus, niger, crebre subtiliter punctulatus, in me-dio canaliculatus, & tuberculo oblongo laterali ut quinque armatus; subtus & lateribus squamulis den-fis albida tectus, que albide in medio laterali ramulum introrsum emittit, unde discus niger inaequalis, quasi lobatus evadit; canalicula dorsalis etiam squamulis albidis repleta. Elytra thoracis basi sere duplo latiora, humeris prominulis, & illo triplo longiora, supra convexa, nigra; sat profunde striata, sed in striis obsolete punctata, interstitiis convexis subtilissime coriaceis, squamulis cinereo-albidis, praesertim posterius & ad latera variegata.

Cor-

*Corpus subtus densè albido-squamosum; Pédes e-longati tenues, femoribus nigris, tibiis tarsisque testaceis.*

78. *R. pericarpius*: niger, futurè basi corporeoque albido-squamosis, antennis pedibusque ferrugineis, thorace obsolete bì-tuberculato, elytrorum interstitiis subtiliter coriaceis.

*Faun. Elevt.* 2. 451. 65.

*Circulio pericarpius.* *Herbst. Col.* 6. 401. 381.

*Tab. 91. f. 12. Payk. fn. 3. 255. 75.*

*Habitat in plantis variis, præsertim in foliis Romicis, quas misere devastat, ubique frequens.*

*Defcr.* Mas Rh. didymo magnitudine æqualis; femina duplo major; cæterum ambo sexus in omnibus simillimi. Caput rotundatum nigrum, creberime punctulatum, pilis minimis cinereis parce adspersum, fronte inter oculos depreffâ; oculi brunnescit prominuli; rostrum vix capite longius, crassum, arcuatum, nigrum, crebre subtiliter rugoso-punctatum. Antennæ rostro cum capite longiores, ferrugineæ, articulo primo pallidiori. Thorax brevis transversus, antice angustior, truncatus, margine pallido-ciliato, in medio leviter emarginato, minime reflexo; postice bi-sinuatus, supra convexus, niger, creberime & profunde punctatus, pilis minimis cinereis parce adspersus, in medio obsolete canaliculatus, canali postice albido-squamoso; subtus & lateribus densius albido-squamosus; versus posteriora utrinque tuberculum laterale obtusum, valde obfoletum, Elytra thoracis basi vix di-

*midig*

mido latiora; humeris prominulis; & illo fere quadruplo longiora, supra convexa; nigra opaca, profunde punctato-striata; intersticiis planis subtiliter rugulosis vel coriaceis; pilis squamulisque minimis depresso-cinereis æquvaliter adpersa, nullo modo variegata; in basi suturæ macula communis oblonga, niveo squamosa. Pectus & abdomen nigra punctata; squamis densis albidis testa. Pedes validi, obscure rufo-ferruginei, cinereo pubescentes.

Obs. Cura. pericarpius Cl. Linnæi potius ad Rhynch. Castorem Fabricii referendus; C. pericarpius Panz. Fn. 42 f. 5. secundum figuram rostrum gerit longum, tenuem, quod nostro non competit.

79. *R. inconspectus*: niger, supra pube fascio-cinerea variegatus, subtus cinereo-squamulosus; antennis pedibusque ferrugineis, thorace acute bi-tuberculato.

*Circulus inconspectus*. Herbst. Col. 6. 405. 385.

Tab. 91. f. 15.

*Circulus accipitrinus*. Reich. Mant. 1, 5. 1.

Tab. 1. f. 1.

Habitat in humidis ad ripas passim, præsertim in Polygono Amphibio, quod saepe omnino devastat.

Descri. Præcedenti simillimus & valde affinis, sed major; mas prioris feminæ æquivalis, femina adhuc duplo major & ultra; præterea thorace acutus bi-tuberculato, corpore variegato, habitatione, &c. disti. etus. Caput rotundatum nigrum, crebre punctatum, pube brunnea seu cinereo pallescente censili adpersum; fronte impressa; oculi nigro-brun-

brunnei prominuli; rostrum capite vix longius, crassum, arcuatum, nigrum, fusco-pubescentes, crebre punctulatum, dorso sub-carinatum. Antennæ ut in priori omnino. Thorax latitudine brevior, anterius angustior, margine sub-elevato integro; postice bisinuatus, supra minus convexus, evidenter canaliculatus, niger, crebre & valde profunde punctatus, pube cinereo flavescente adspersus, lateribus & subtus; ut & in canalicula dorsali, squamulis flavescenti-cinereis tectus; versus posteriora utrinque tuberculum laterale elevatum, sub-acuminatum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra convexa, rude crenata, striata, intersticiis rugosis, pilis squamulisque fusco-flavescentibus variegata; futura lata subtilius coriacea, squamulis fusco-brunneis tecta. Corpus subitus nigrum punctatum, squamulis brunneo-cinereis, interdum flavescentibus, tectum. Pedes mediocres obscurè ferruginei, cinereo-pubescentes.

80. R. Castor: niger, supra cinereo-nebulosus, suturæ basi corporeaque albo-squamosis, pedibus rufo testaceis thorace bimaculato antice reflexo, intersticiis elytrorum tuberculatis.

Fabr. Elect. 2. 451. 64.

*Curculio fruticelosus.* Herbst. Col. 6. 400. 379.  
Tab. 91. f. 10.

*Curculio pericarpius.* Linn. Syst. 2. 609. 36.  
Fa. Sv. 602. diu. var. Payk. fn. 3. 255. 75.

*Curculio leucostigma* Marsh. Ent. Br. 1. 255.  
*st. & Curc. melanostigma* ibid. 256. 53.

Var

Familia 2:da, femoribus dentatis.

Sectio 1:a, Corpore oblongo.

82. *R. fusco-maculatus*: niger, thorace profundius punctato, lateribus rotundato, elytris inaequalibus, maculis plurimis flavescenti-pilosis, femoribus obsolete dentatis.

*Circulio fusco-maculatus*. Fabr. Eleut. 2. 537.  
187. Herb. Col. 6. 329. 304. Tab. 86. f. 2.

Pack. Inv. 3. 84. 1.

*Circulio Germanus*. Linn. Syst. 2. 613. 58.  
Marsh. Ent. Br. 1. 290. 153.

Habitat in Svecia Australi rarius.

Descr. Maximus fere prostratum, Rh. Arctico excepto; variat tamen magnitudine minori. Caput parvum retractum nigrum, parce punctatum, fronte lineola impressa; oculi depresso-brunnei; rostrum longitudine thoracis, crassum, nigrum, crebre punctatum, stria lateralii utrinque impressum. Antennae rostro cum capite longiores, crassiusculæ nigrae, articulo primo longissimo clavato, reliquis fulco-pilosis. Thorax basi apiceque truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, supra convexus, niger, crebre et lat protunde punctatus, in dorso tamen, præsertim antice, obsolete, lateribus vero confertissime rugoso-granulatus, ibique pilis rigidis depressis sordide flavescientibus, in maculas tres irregulares condensatis, adpersus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra antice thoraci medio vix latiora, pone basin dilatata, apice rotundata, supra valde convexa, tota nigra, subtiliter coriaceo-rugulosa, maculis plurimis e pilis rigidis depressis sordide fla-

Vescent.

vescentibus adspersa, quibus detritis, superficies fo-  
veolis crebris rotundatis obsoletis impressa videtur;  
elytra connata; absque alia. Corpus subtus fere pla-  
num nigrum, granulato punctatum, pilis sordide fla-  
vescentibus adpersum. Pedes longiusculi validi nigri,  
femoribus clavatis, anterioribus fere matieis,  
posticis dentè obsoleto armatis.

83. *R. Germanus*: niger sub-nitidus, tho-  
race subtiliter punctuato, lateribus parum  
rotundato, elytris aequalibus concinne co-  
riaceis, parum flavescenti-maculatis, fe-  
moribus acutè dentatis.

*Fabr. Eleut.* 2. 475. 180.

*Curculio Germanus*. *Herbst. Col.* 6. 328. 303.

*Tab. 86. f. 1. Payk. Fn. 3. 185. 2. Panz.  
fn. 42. f. 16.*

*Curculio Anglicanus* *Marsh. Ent. Br.* 2. 290.  
154.

Habitat in Scania, Hallandia, rarius.

Descr. Praecedenti similissimus et valde affinis, sed  
plerumque dimidio minor, magis nitidus, thorax  
subtilius punctulatus, postice vix angustior; femora  
acute dentata, etc. Caput, oculi, rostrum et anten-  
ne ut in praecedenti omnis. Thorax latitudine fe-  
re longior, basi apiceque truncatus, et pilis fla-  
vescentibus ciliatus, antice paullo angustior. lateribus  
vix vel per-partum rotundatus; adeoque basi non an-  
gustatus, supra convexus, niger sub-nitidus, dorso  
crebre, et subtiliter et copiose punctulatus, linea  
media angusta levigata; lateribus crebre subtiliter gra-  
nulatus.

**Habitat in Scania & Gotlandia, sibi lapidibus, tempore vernali, rarius. Dom. Wetterhall.**

Descr. Praecedenti similis et affinis, sed paullo brevior, posterius magis obtusus, et vere distinctus. Caput, rostrum et antennæ ut in praecedenti omnino. Thorax longitudine latior, anterius paullo angustior, lateribus nonnihil rotundatus, supra parum convexus, niger, crebre granulato-rugosus, dorso, praesertim antico carinatus, pilis squamulisque piliformibus depresso rigidis fusco cinereis parcus obductus, linea obliqua lateralī utrinque e pilis albidioribus. Scutellum ut in priori. Elytra thoracis basi paullo latiora, et illo plus triplo longiora, posterius compressa, apice rotundata, dorso, parum convexa, nigra regulariter punctato-striata, pilis squamulisque fusco-cinereis albidisque densius testa et variegata; versus posteriora, ubi callus solito exstat, punctum cuneiforme e pilis deqsis albidioribus, in singulo elytro. Corpus subtus nigrum, paullo magis nitidum, crebre punctulatum, pube cinerea parcus adspersum, absque maculis lateralibus. Pedes longiusculi validi nigri, cinereo-pubescentes, femoribus obtuse dentatis.

36. R. Abietis; nigro-piceus opacus, flavescenti-pilosus, thorace antice coarctato, elytris tenuius cancellato-striatis, intersticiis valde rugosis, fasciis macularibus flavescenti-pilosis.

Fabr. Eleut. 2. 464. 130.

Circutio Abietis. Linn. Syst. 2. 613. 57. En. Sv. 615. De Géer. Ins. 5. 204. I. Tab. 6. f. II.

f. n. - 23. Herbst. Col. 6. 149. 108. Tab. 70.

f. 3. Payk. fn. 3. 186. 3. Panz. fn. 42. f.

14.

**Curculio Pini. Marsh. Ent. Br. 1. 289. 152.**

Habitat in frondibus & ligno recenti Pinis  
& Abietis, vulgaris.

Deser, Inter majores nostratum Rh. Pini triplo major: mas, tamen semina dimidio minor et ultra. Caput breve, piceum, crebre rugoso-punctatum, pallido-pubescentes, fronte inter oculos impressa, fasciculo e pilis longioribus flavescentibus juxta oculos utrinque; oculi depresso brunnei; rostrum longitudine thoracis, crassum, arcuatum, rufo piceum, cereberrime rugoso-punctatum, dorso carinatum, tenue pallido-pubescentes. Antennae versus apicem rostrum insertae, et illo cum capite parum longiores, crassae, rufo-piceae pubescentes. Thorax latitudine longior, antice multo angustior, coarctatus, lateribus parum rotundatus, bali truncatus, supra minus convexus, nigro-piceus, confertissime profunde rugoso-punctatus, in medio obsolete carinatus, pilis longioribus depresso rigidis flavescentibus, versus latera, et linea dorsali, adspersus. Scutellum parvum triangulare nigro-piceum, tenue cinereo-pubescentes. Elytra thorace paulo latiora, et plus triplo longiora, supra convexa, nigro-picea sub-opaca, striis minus latius crebre cancellatis exarata, quarum foveolae oblongo-quadratae sat profunde impressae, interstitiis confertissime rugoso-tuberculatis, maculae plurimae e' pilis longis rigidis depresso flavescentibus; in fascias collatae, quarum una ante medium obliqua, saturata non attingit, altera pone medium arcuata, fere transversa, et aliæ abbreviatæ irregulares, e' maculis 3<sup>æ</sup> & conflatae; ante apicem callus elevatus in quovis

L.

elytro,

Var. b, Capite, thoracis fascia media, elytrorum disco, pedibusque fusco-piceis.

Fabr. Elcut. 2. 492, 253.?

*Curculio tæniatus.* Herbst. Col. 6. 271. 243.  
Tab. 80. f. 12.

*Curculio maculatus.* Marsh. Ent. Br. 1. 292.  
158.

*Curculio tumosus.* Ross. En. Etr. 1, 124. §17.

Habitat in foliis & truncis Populi tremulae,  
passim.

Defcr. Rh. tortrice magnitudine fere æqualis, paullo tamen longior, minus convexus. Caput parvum rotundatum fusco-ferrugineum, subtiliter punctulatum, cinereo-pubescentia, fronte impressa; oculi depresso brunnei; rostrum longitudine fere dimidii corporis, atrum, nitidum, valde arcuatum, obsoletius striatum. Antennæ pallide testaceæ, tenues, structura ut in pæcedenti. Thorax brevis transversus, ante parum coarctatus, obsolete transversim impressus, lateribus valde dilatato-rotundatus, basi truncatus, supra disco posteriori convexus, fusco-testaceus, aut totus, aut plaga magis fusca utrinque notatus; subtiliter punctulatus, ipso medio fere lævis, dense cinereo-pubescentia, lineis tribus magis denudatis. Scutellum parvum fusco-testaceum. Elytra thoracis medio parum latiora, sed illo quadruplo longiora, supra minus convexa, punctato-striata, fusco-ferruginea, maculis disformibus sparvis, minus confluentibus nigro-fuscis sub-nudis, aliisque cinereo-pubescentibus, crebre marm-prata. Corpus subtus fusco-ferrugineum punctulatum, cinereo-pubescentia, pectore obscuriori. Pedes mediocres rufo-ferruginei, femoribus clavatis, genuis nigro-fuscois.

Var. b,

Var. b, tantum colore obscuriori differt; Caput fuscum, thorax fusco-piceus; antice posticeque rufostaceus; elytra fusco-picea cinereo-marmorata, sutura marginaque fusco-ferrugineis; ante apicem punctata duo albidiora, unum pone alterum. Pectus & abdominis basis fusco-picea; cætera, ut in priori.

Obſ. Utrum Rh. tremulæ Cl. Fabricii loc. cit. ad varietatem nostram b, vel ad Cūrc. affinem Paykulli pertineat, ex descriptione insufficienti vix dijudicari queat; Cūrc. tæniatus Herbstii loc. cit. ob roſtri longitudinem, colorem &c. melius huic quam Rh. tæniato Fabr. concordat.

91. *R. tortrix?* pallide testaceus sub nitidus immaculatus, tenuissime pubescens, pectore fuscō, roſtro mediocri parum arcuato, elytris convexioribus.

Fabr. Eleut. 2. 491. 252.

*Curculio tortrix.* Linn. Syſt. 2. 615. 67. Phil. Sv. 622. Herbst. Col. 6. 153. 113. Tab. 703 f. 8. Payk. In. 3. 192. 9. Panz. fn. 18. f. 14.

*Curculio fulvus.* De Gler Inf. 3. 214. 6.

Var. b, corpore saturatiuſ ferrugineo, pectore nigricante. Payk; loc. cit. var. b.

Habitat in foliis & truncis Populi tremulej sat frequens.

Descri. Mediocris. Corpus totum pallide testaceum nitidum, interdum flavescent, pube tenuissima coaſ colori pareo adſpersum, Caput parvum rotundatum crebre

*Febr. Elenct. 2. 492. 255.*

*Circulio tenuiatus. Payk. fn. 3. 191 8.*

Var. b, niger, thorace rufo, parum fusco-maculato, elytris rufo-ferrugineis; fusco-cinereoque nebulosis; pedibus rufis.

Var. c, plus duplo minor; niger, cinereo-pubescent, ferrugineo fuscoque variegatus, pectore albido - villosa.

*Circulio affinis, usr. pygmaea. Payk. fn. 3. 191 8.*

Habitat in foliis Salicis, passim, minus frequens; var. c, in Salicibus Bothniæ & Lapponiæ. *Dan. Haf.*

Descr. Praecedenti simillimus & valde affinis, sed paullo minor, thorax paullo longior & postice angustior, pedes unicolores, &c. Caput parvum rotundatum fusco piceum punctatum, fronte impressâ cinereo pubescente; oculi depresso nigro-brunnei; scutellum longitudine capitis cum thorace, crassiusculum nigrum; parum arcuatum; carinatum & striato-augosum, ore rufescente. Ante pâxe rostro cum capite longiores, crassiusculæ ferrugineæ; clava fuscescente. Thorax brevis, antice non nihil coarctatus; lateribus ante medium rotundatô dilatatus, posterius angustior, supra parum convexus; in mediis transversim fusco piceus; antice angustius; postice late inæqualiter testaceus; undique obsoletius punctatus, pubes cinerea adspersus. Scutellum parvum piceum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & icti quadruplo longiora, supra parum convexa, punctato-striata; pallidius testacea; pubes depressa cinerea maculisque irregularibus fusci detudatis variegata. Corpus subtus nigro-piceum punctularum; parce pubescens, ano fusco ferrugineo. Pedes breviusculi vascuti, pallide rufi; testacei immaculati.

Vare

Var. b, colore saturiori tantum differt; caput & rostrum nigra; thorax rufo-ferrugineus, in medio plus minusve infuscatus; elytra obscure ferruginea, nigro cinereoque variegata; corpus nigrum; pedes rufo-testacei.

Var. c, magis diversa, fere triplo minor, sequenti æqualis; caput nigrum; rostrum rugosum piceum, apice rufum; thorax niger, antice & postice anguste ferrugineus, pube longiori albidiiori tectus, lineis tribus dorsalibus, punctoqve laterali utrinque, denudatis; Elytra fusco-ferruginea, plaga magna longitudinali nigra vel fusca in disco interiori, maculisqve sparsis albido-pubescentibus, variegata; petitus nigrum, dense albido pubescens; abdomen rufopiceum; pedes obscure ferruginei.

Obs. var. c, ob thoracem longiorem, posterius angustiorem, potius huic quam præcedenti speciei adiicienda; forte tamen propria species,

94. *R. majalis*: niger, cinereo-pubescentis, thorace, elytris, antennis, pedibus anōque rufo-ferrugineis, rostro crassiori rugoso, elytrorum disco fusco-nebuloso.

Var. b, thorace macula disci nigra.

Var. c, rostro dimidiato-ruso, elytris rufo-testaceis, sutura nigra.

*Curculio majalis*, Payk. fn. 3. 251. 71.

Var. d, thorace, elytris pedibusque flavescentibus, ab domine flavescente, basi fusco.

Habitat in floribus Salicis cinereæ, mense Majo & Junio, passim.

Descr.

*Ins. Svec*, T. I, P. III.

M

Descr. Parvus, Rh. bipunctato æqualis, ceterum præcedentibus simillimus, & valde affinis. Caput parvum, rotundatum, nigrum, crebre punctulatum, tenuè pubescens, oculis depresso-nigro-brunneis; rostrum longitudine capitis cum thorace, crassiusculum, parum arcuatum, nigrum, crebre rugosum, striatum, ore rufescente. Antennæ rostro cum capite paullo longiores, crassiusculæ, rufæ, clava obscuriori. Thorax latitudine brevior, basi apiceque trinotatus, lateribus rotundatus, supra parum convexus, totus undique rufo-testaceus, sat crebre punctatus, linea dorsali media sub-lævi, pube longiori cinerea depressa adspersus. Scutellum punctiforme fusco-testaceum. Elytra thoracis basi dimidio latiora & quadruplo longiora, supra modice convexa, rufo-testacea, punctato-striata, pube cinerea depressa variegata, interjectis in disco interiori cunctis elytri, maculis irregularibus fuscis denudatis. Pectus & abdominis basis nigra, punctata, pubescens, ano rufo testaceo. Pedes mediocres, toti rufo-testacei, femoribus crassis, clavatis, plerumque denticulo piloso armatis, posterioribus interdum mucicis.

Var. b, differt tantum thorace macula vel lineola media nigro-fusca notato.

Var. c, paullo pallidior; rostrum ab apice ultra medium rufum; elytrorum sutura plus minusve infuscata.

Var. d, adhuc pallidior; caput & rostrum fusco-picea; pectus & abdominis basis fusca; elytrorum discus parum fusco-irroratus; cætera omnia pallida sen flavescentia; forte nuper exclusa.

95. *R. pectoralis*; rufo-testaceus, cinereo-pubescent, pectore nigricante, rostro longiori punctato, apice fusco, elytris cinereo

reo fuscoque variegatis, femoribus clavatis acute dentatis.

*Fabr. Eleut. 2. 490. 246.*

*Curculio pectoralis. Panz. fn. 38. f. 18.*

*Curculio rubellus. Marsh. Ent. Br. 1. 293. 162.*

Var. b, rufo-testaceus totus, rostri apice oculisque tantum fusco-brunneis.

*Curculio melanophthalmus. Payk. fn. 3. 196. 13.*

Var. c, corpore toto pallido seu flavescente.

*Rhynchænus arcuatus. Fabr. Eleut. 2. 490. 248.*

*Curculio arcuatus. Panz. fn. 48. f. 6. Crit. Rev. 1. 129.*

Habitat in foliis Salicis capreæ, paucim.

Descr. Statura & affinitas præcedentium, Rh. Majali duplo major, rostro longiori, tenuiori, rufo, femoribus acute dentatis, distinctus. Caput parvum rotundatum, rufo-testaceum, obsolete punctulatum, fronte impressa cinereo-pubescente; oculi depresso brunnei; rostrum capite cum thorace longius, magis tenue quam in prioribus, arcuatum, rufo-testaceum, nitidum, basi striato-punctatum, ore fusco-brunneo. Antennæ rostro cum capite longiores, crassiusculæ, rufo-testaceæ. Thorax antice abrupte concretatus, ante apicem transversim impressus, lateribus rotundato-dilatatus, basi truncatus, supra modice convexus, totus rufo-testaceus, crebre & sat profunde punctatus, pube cinereo-testacea, depressa, adpersus. Scutellum punctiforme testaceum. Elytra thorace dimidio latiora, & illò fere quintuplo longiora, supra modice conyexa, sat profunde punctato-striata, pube densiori magis rigida, cinereo-al-

bicante variegata, & in disco maculis nonnullis fuscis denudatis obsoletis contaminata. Pectus aut nigrum-fuscum, aut fuso-piceum, punctatum, cincereo-pubescent; abdomen saturate rufo-ferrugineum, basi media plus minusve fulcescente. Pedes toti rufo-testacei, femoribus crassis, dente valido armatis.

Var. b, differt tantum pectore elytrorumque disco, reliquo corpore concoloribus.

Var. c, corpore toto pallido seu flavescente diversa, forte super exclusa; Elytra pube cinerascente variegata, ut in prioribus, ideoque descriptio Cl. Fabricii satis conveniens.

96. *R. semi-cylindricus*: linearis-elongatus niger, cincereo-pubescent, antennatum basi tarsisque ferrugineis, elytris punctato-striatis, femoribus obsolete dentatis.

*Curculio semi-cylindricus*. Marsh. Ent. Br. 1.  
294. 164.

Habitat in aridis pratorum sylvestrium, ratis.

Descr. Statura elongata & magnitudo Rh. T. albi. Caput rotundatum nigrum, subtiliter punctatum, tenui pubescens, oculis depressis brunneis; rostrum maris vix thorace longius, arcuatum, nigrum, subtiliter punctulatum; feminæ longius, magis tenui, valde arcuatum, laxe, nitidum. Antennæ capite cum rostro paullo longiores, fuscо-ferrugineæ, clava ovata nigricante. Thorax antice paullo angustior, & juxta apicem striga tenui transversa impressus, basi apiceque truncatus, supra parum convexus, aequalis, totus niger, subtiliter & obsoletius rugoso-punctatus, pube tenui depressa cinerea adpersus. Scutellum triangulare nigrum, densius cincereo-

nereō pubescens. Elytra thoracis basi vix latiora, sed triplo longiora, linearia, supra modice convexa, nigra, punctato-striata, interstitiis subtiliter rugulosis, pube cinerea depreßia adspersis; apex elytrorum interdum rufo-piceus. Corpus subitus nigrum, crebre & sat profunde punctatum, tenue cinereo pubescens. Pedes breviusculi, validi, nigri, femoribus crassis, anticis dente parvo armatis, posterioribus saepius muticis.

97. R. Violaceus: nigro-cœrulescens, subglaber, elytris posterius latioribus, cyanis, tenue punctato-striatis, interstitiis seriatō-granulatis, capite convexo, sublævi.

Fabr. Eleut. 2. 486. 227.

*Curculio violaceus*, Linn. Syst. 2. 614. 63. Fn. Sv. 579. De Gér Ins. 5. 213. 5. Herb. Col. 6. 71. 34. Tab. 64 f. 4. Payk. fn. 3. 195. 12. Panz. fn. 42. f. 20.

Var. b, elytris purpurascenti-violaceis. Payk. l. c. var. b.

Habitat in Pini Sylvestris frondibus & tusionibus non infrequens.

Descr. Magnitudo valde variat: majores Rh. Pini fere æquales; alii duplo, imo triplo minores, Rh. Pruni æquales et similes. Caput breve, rotundatum, nigro-cœrulescens, vix, vel obsoletissime subtiliter punctulatum, fronte inter oculos profunde impressa; oculi depreßi brunnei, post mortem saepè albido-glauceentes; rostrum vix longitudine capitis cum thorace, porrectum, arcuatum, tenui, nigrum,

grum, nitidum; feminæ subtilissime, maris paullo evidentius punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, basi tenues, piceæ, extrosum nigræ, clava magna oblonga-ovata. Thorax antice subito carctatus & depresso, postice profunde bisinuatus, angulis lateraliter reflexis, productis, supra posteriorius convexus, nigro-cœrulescens, opacus, crebrizime & sat profunde punctatus. Scutellum oblongum, nigro-cœrulescens. Elytra thorace vix dimidio latiora, sed illo plus triplo longiora, posterius nonnihil dilatata, apice obtuse rotundata, supra modice convexa, minus profunde punctato-striata, interstitalia planis, singulo serie simplici e tuberculis parvis, certo situ punctiformibus; aut lète cyaneæ, aut nigro-cœrulecentes. Pectus nigrum, punctatum, versus latera cinereo-pubescentes; abdomen nigro-virescens, vix, vel obsoletissime punctulatum. Pedes validi nigri, parum cœrulecentes, femoribus omnibus acute dentatis.

Var. b, differt tantum colore, præfertim elytrorum, purpurascenti-violaceo.

98. R. Phlegmaticus; nigro-cœrulescens, sub-glaber, elytris cyaneis, posterius latioribus, tenui punctato-striatis, interstitaliis crebre punctatis; capite elongato, subdepresso, punctulato.

*Curculio phlegmaticus.* Herbst. Col. 7. 4. scđ  
Tab. 96. f. 1. A.

Habitat in frutetis passim.

Descr. Magnitudo, statura & color ut in præcedenti, cui valde affinis, sed diversus videtur, capite angustiori, depresso, punctulato; thorace longiori, antice transversum impresso, margine elevato, ely-

elytrorumque interstitiis crebre punctulatis, &c. Caput oblongum angustum, sub-conicum, depresso, nigro-cœruleoſcens, creberrime subtiliter punctulatum, oculis magnis, prominulis, pallide brunneis; rostrum & antennæ ut in præcedenti. Thorax latitudine longior, antice coarctatus, & juxta apicem sat profunde transversim impressus, margine apicis elevato, sub-reflexo; postice bi-sinuatus, angulis reflexis; supra parum convexus, fere planus, nigro-cœruleoſcens, interdum virescens, creberrime punctatus. Elytrorum forma, color & striæ ut in præcedenti, sed interstitia crebre, evidenter punctulata. Corpus & pedes ut in priori omnino.

Variat rarius colore totius corporis fere nigro, lateribus elytrorum tantum cœruleoſcentibus.

99. R. Cerafi: ater opacus, thorace brevi mutico punctatissimo, elytrorum interstitiis creberrime granulato-coriaceis, rostro breviori cylindrico, femoribus obsolete dentatis.

*Curculio Cerafi.* Linn. Syft. 2. 607. II. Fn. Sv. 583. Herbh. Col. 6. 68. 32. Tab. 64. f. 1. femina. Payk. fn. 3. 193. 10. fem.?

*Rhynchænus carbonarius.* Fabr. Eleut. 2. 485. 224.

*Curculio carbonarius.* Panz. fn. 42. f. 18.?

Habitat in foliis Cerafi & Pruni, minus frequens.

Descr. Statura præcedentium, Rh. Pruni paulo major, crassior, Rh. Rhips., no. 17 antea similis; antennarum clava multo breviori, rostro longiori

giore arcuato et femoribus sub dentatis, fere unice ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, atrum, opacum, obsolete punctulatum, fronte impressa; oculi depresso brunnei; rostrum fere longitudine thoracis, crassiusculum, cylindricum, arcuatum, atrum, sub-nitidum, obsolete punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, nigrae, basi tenues, clava magna, oblongo ovata, acuminata, pubescente. Thorax brevis, transversus, antice constrictatus et depresso, lateribus valde dilatato-rotundatus, postice profunde bisinuatus, angulis exterioribus reflexis, acuminatis; supra disco fere planus, versus margines undique declivus, totus ater opacus, confertissime et sat profunde rugoso punctatus. Scutellum rotundatum depresso nigrum. Elytra antice thoracis medio vix latiora, posterius nonnihil dilatata, thorace plus triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra dense parum convexa, lateribus declivia, tota atra opaca, concinne striata, et in striis punctata, interstitiis planis confertissime granulatofugosis. Corpus subitus nigrum, opacum, crebre obsoletius punctatum. Pedes longiusculi validi nigri, femoribus clavatis, denticulo parvo, saepe obsoleto, armatis.

Obl. Synonima Cl. Linnæi et Herbstii certa mihi videntur; figura Panzeri l. c. etiam nostrum exprimit, sed dentes femorum nimis validi; Cerc. Cerafi. Payk. l. c. femina, dubie allegatus, quia femora acute dentata, et elytra sub-nitida describuntur.

100. R. *Stygius*; ater, opacus, thorace subquadrato, antice utrinque dentato, parcus punctulato; elytrorum interstitiis subtilissime coriaceis; rostro brevi, lato; femoribus acute dentatis.

*Cur-*

*Curculio Stygius.* *Marjh. Ent. Br.* 1. 294. 165.

*Rhynchænus Ceraci.* *Fabr. Eleut.* 2. 486. 226.

*Curculio Cerasi,* mas. *Herbst. Col.* 6. 68. 32.

*Tab.* 64. f. 2. *Payk. fn.* 3. 193. 10. ? *Panz.*

*fn* 42. f. 19. ?

Habitat in foliis Pruni Cerasi, rarius.

Descr. Magnitudo et statura præcedentis, cui etiam in plurimis simillimus, sed thoracis rostrique structura, ut et femorum dentes validi, nimis diffent; num ejus mas, anterior experientia docebit. Caput parvum, rotundatum, parum convexus, atrum, opacum, obsolete punctulatum, oculis magnis, depressis, glaucis; rostrum thorac brevius, crassum, apice dilatatum, supra planum, atrum, rugoso-punctatum. Antennæ rostro cum capite multo longiores, crassissimæ, piceæ; clava ovata nigra. Thorax sub-quadratus, antice ad ipsum marginem non-nihil coarctatus et transversim depresso, lateribus fere rectis, anterior juxta angulum dente majori, et crenulis 2 f. 3 minutis; armatus, postice perparum sinuatus, angulis vix prominulis; supra modice convexus, ater, opacus, subtiliter et parcus punctulatus. Elytrorum forma et color ut in priori, sed minus profunde punctato-striata, interstitiis planis subtilissime cotiaceis. Corpus subitus nigrum, obsoletè punctulatum. Pedes validi, nigri, femoribus crassis, omnibus dente valido, acuto, armatis.

Obf. Figura Panzeri antennas flavescentes, et spinam thoracis versus medium lateris sitam, representat, quod in nostro non ita.

tor. R. Carbonarius: niger, subnitidus, glaber, thoracis lateribus crenulatis; ely-

trorum striis cancellatis, interstitiis convexis sub-lævibus, femoribus acute dentatis; rostro longiori arcuato.

*Curculio Carbonarius.* Linn. *Syst.* 2. 612. 48.  
*Fn. Sv.* 614. *Herbst. Col.* 6. 70. 33. *Tab.*  
 64. f. 3. *Pugk. fn.* 3. 194. II?

*Rhynchænus aterrimus.* *Fabr. Elect.* 2. 486.  
 225.

*Curculio atramentarius.* *Marsh. Ent. Br.* 1.  
 293. 163.

Habitat in foliis Sorbi, Betule, Coryli,  
 non infreqvens.

Defcr. Status Rh. violacei; magnitudo par modo valde variat, ac in illo, Caput rotundatum nigrum, obsolete punctulatum, oculis depresso brunnescis; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, cylindricum, arcuatum, nigrum, subtiliter punctulatum. Antennæ vix rostro cum capite longiores, nigrae, bafi tenues, clava oblongo-ovata, cinereo-pubescente. Thorax in medio vix longitudine latior, apice coarctatus et transversim depresso, latèribus dilatato rotundatus, bafi bisinuatus, angulis reflexis acuminatis; supra modice convexus, sub-pulvinatus, totus niger, crebre et profunde reticulato-punctatus, linea media lævi abbreviata; ante medium marginis utrinque denticulus parvus acuminatus, et pone illum crenulæ aliquot, sensim minores, jam evidenteriores, jam minutæ et fere obsoletæ. Scutellum triangulare depresso nigrum. Elytra antice thoracis medio parum latiora, humeris prominulis, pone medium nonnihil dilatata, thorace fere quadruplo longiora, supra modice convexa, nigra, nitida, profunde

funde striata, striis cancellatis, seu punctis striarum intervallo transversali angusto, elevato, distinctis, interstitijs striarum convexis, sub levibus, vel subtilissime transversim strigosis. Corpus subitus nigrum, parce et obsoletissime punctulatum. Pedes longiusculi nigri, femoribus clavatis, dente valido armatis, praesertim in anterioribus.

Obs Curculio aterrimus Cl. Linnæi, certe Apion, et verosimile Apion Sorbi, mas, antea p. 43. n:o 10.

102 R. atratus; niger, sub nitidus, glaber, thoracia lateribus, crenulatis; elytrorum striis cancellatis, rostro brevi, crassio, apice dilatato, antennis crassis.

*Curculio aterrimus.* Herb. Col. 6. 72. 35. Tab. 64. f. 5.

Habitat in frutetis passim; praesertim in fratribus Pruni Spinosa & Crataegi oxyacanthæ.

Descr. Minoribus precedentibus individualis sequitur, et ut ouum ovo simillimus, modo anteniarum et rostri structura distinctus. Caput et oculi ut in precedentibus; rostrum capite parum longius, crassum, sub rectum, apice dilatatum, ibique supra planum, sulcula abbreviato impressum, totum nigrum, opacum, obsoleto rugoso punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, valde crassæ, nigrae, articulo primo etiam crassio, vix tertiam partem totius attinente clava valde elongata, 4-articulata, utrinque attenuata, fusca, cinereo-pubescente. Thorax, elytra corpus, pedes, quoad minimum punctum, ut in precedentibus omnino; an modo Sexu distinctus?

103. R.

103. R. Pomorum: fusco-piceus; cinereo-pubescent, elytris ferrugineis, fascia postica obliqua albida, nigro inclusa; scutello niveo; rostro tenui arcuato.

*Fabr. Eleut.* 2. 491. 250.

*Curculio Pomorum.* Linn. *Syst.* 2. 612. 46. *fn.*

*Sv.* 612. *Herbst. Col.* 6. 157. 115. *Tab.* 70. *f.*  
*u.* *Payk. fn.* 3. 199. 16.

Var. b., triplo minor, elytris obscurioribus.

*Curculio inturvis Panz* *fn.* 36. *f.* 17. *Crit.*

*Rev.* 1. 129.

Habitat in floribus Pomoneæ, quas destruit;  
hibernat sub cortice Pyri mali; var. b.,  
in foliis Pruni Padi, ad Alingsåhs Westrogothia, copiose lectus.

Descr. Rh. druparum plerumque paulo minor,  
et in Elytris minus convexus. Caput parvum rotundatum, nigro-piceum, punctulatum, dense cinereo-pubescent, fronte impressa; oculi globosi nigro-brunnei; rostrum feminæ longitudine ferè dimidii corporis, tenui, arcuatum, nigro-piceum, subtilissime punctulatum, ferè glabrum; maris paullo brevius & crassius, basi magis pubescens, evidentius punctatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, ferrugineæ; articulo primo longissimo, clava parva, fusca. Thorax antice multo angustior, & juxta apicem transversim impressus; margine sub-elevato; postice leviter bisinuatus, supra patum convexus, crebre punctatus, rufo piceus, in disco obscurior, linea lata media; aliaque utrinque laterali arcuata, dense cinereo-villosus. Scutellum parvum, valde elevatum, rotundatum, niveo-vilosum. Elytra tho-

racis

racis basi fere dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, supra parum convexa, fusco-ferruginea, punctato striata, dense cinereo-pubescentia; juxta scutellum macula oblonga fusco-brunnea; in medio fascia ejusdem coloris, denudata, valde obliqua, & posteriori alia sub-transversa, obsoletior; spatium inter fascias densius albido villosum, fasciam introsum angustatam format, punctis marginalibus, atque albidioribus utrinque notata. Corpus subtus nigrum, punctatum, longius cinereo pubescens, segmentis posterioribus ventris plerumque ferrugineo marginatis. Pedes elongati rufo-ferruginei, femoribus clavatis, in medio infuscatis, anticus longioribus & crassioribus dente maximo, valido, acuto armatis; dens reliquorum femorum multo minor, obsoletior.

Var. b, fere triplo minor; elytra magis fusca, humeris & lateribus tamen ferrugineis; fascia postica obsoletior, pube flavescente obducta; cæterum simillima, vix specie distincta.

104. R. Ulmi: rufo-testaceus, sub-pubescent; capite, rostro tenui arcuato elongato, pectoreque nigro-picis; thoracis linea media, scutello, elytrorumque fascia postica transversa, albis.

*Curculio Ulmi.* De Gér Ins 5. 215. 18. Tab. 6. f. 26 - 30. Marsh. Ent. Br. 1. 287. 145.

*Curculio pomorum.* var. Herbst. Col. 6. 158.

Var. b, fusco-picis, rostro, antennis pedibusque rufis, elytris fusco-ferrugineis, albido-fasciatis.

*Curculio fasciatus.* Marsh. Ent. Br. 1. 286. 144.

Var. 5

Var. t, capite ferrugineo; rostro rufo-testaceo, apice fusco, elytris ante fasciam albido-vatiegatis.

*Circulio pedicularius.* Linn. *Syst.* 2. 615. 66.  
*Fn.* *Sv.* 620. *Marth. Ent. Br.* 1. 286. 143.

*Circulio avarus.* Fabr. *Eleut.* 2. 488. 233.

*Circulio druparum.* var. *Herbst.* *Col.* 6. 157.  
*Tab.* 70. f. 10.

Habitat in foliis ulmi, Padi, passim; minus frequens.

Deser. Rh. Pomorum similis & valde affinis, sed minor, praesertim brevior, & in elytris convexior. Caput parvum, rotundatum, nigro-fuscum, crebre punctulatum, griseo pubescens, fronte impressa; oculari prominenti nigro-brunnei; rostrum longitudine dimidii corporis, tenui, arcuatum, nigrum, nitidum, punctulatum, basi saepe brunneum. Antennæ ut in praecedenti, Thorax anterius multo angustior, juxta apicem obsolete impressus, basi leviter bisinuatus, supra parum convexus, totus rufo-testaceus, crebre punctatus, tenui pubescens; in medio dorsi linea longitudinalis angusta, albo pilosa. Scutellum parvum, elevatum, niveo pubescens. Elytra thoracis basi dimidio latiora, humeris prominenti, & illo quadruplo longiora, supra posterius convexa, pone basin transversim obsolete impressa, rufo-testacea, sat profunde punctato-striata, tenui pubescens; in angulo elytro, ante medium, plaga magna, oblongo-quadrata, fusco brunnea; & pone illam fascia transversa, parum arcuata, albo-villosa; plaga brunnea interdum dilutior observatur, maculis albido pilosis irrorata. Corpus subtus ferrugineum, pubescentia, punctulatum, pectore fusco-piceo. Pedes ut in praecedenti omnino,

Var. b.

Var. b, paullo minor, obscurior, forte mas; caput nigro-fuscum; rostrum paullo brevius, rufo-ferrugineum, apice fuscum; thorax fuso-ferrugineus, linea dorsali albido-pilosa; elytra brunnes, basi apiceque dilutiiora, fasciis duabus irregularibus albido-pilosis. una prope basin, altera pone medium; pes etus & abdomen nigro-picea.

Var. c, similima primo, sed rostrum totum rufum, apice parum infuscatum; elytra tota rufo-testacea, absque plaga nigricante; fascia albida pone medium aut integra ut in a, aut irregularis; ante medium nebulæ pilares albido villosæ; cætera ut in a.

Variat etiam colore pallidius testaceo, pectore concolore.

105. *R. druparum*: rufo-testaceus, griseo-pubescentes, rostro tenui, sub recto, elytris convexis, fasciis duabus undato-dentatis, denudatis

*Fabr. Eleut.* 2. 439. 243.

*Curculio druparum.* *Linn. Syst.* 2. 614. 62.

*Fn. Sv.* 617. *De Gér Ins.* 5. 214. 7. *Herbst.*

*Col.* 6. 156. 114. *Tab. 70. f, g.* *Payk. Fn.*

3. 197. 14.

Habitat in *Pruni Padri* foliis & nucleis, saepe frequens.

Deser. Rh. Pomorum paullo major, & in elytris valde convexus. Caput parvum, rotundatum, rufo-testaceum, subtiliter punctulatum, tenui pubescens, fronte impressa; oculi prominuli, nigro-brunnei; rostrum longitudine dimidii corporis, tenui sere rectum, rufum, nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, pale

palea

vide rufo-testaceæ, clava elongata, angusta, obseu-  
riori. Thorax sub conicus, anterius valde angusta-  
tus, juxta apicem transversim oblolete impressus,  
basi sub-bisinuatus, supra convexus, saturate rufo-  
ferruginens, crebre subtiliter punctatus, pube longi-  
ori cinereo-flavescente, depresso, tectus. Scutellum  
oblongum, rugulum, valde elevatum, ferragineum.  
Elytra magna, thoracis basi dimidio latiora, & illo  
quintuplo longiora, supra valde convexa, præsertim  
posterioris; saturate rufo-testacea, punctato-striata, in-  
terstittiis subrufissime coriacis; pube densa, depresso,  
cinereo-flavescente, obducta; in medio elytrorum  
fascia, saturam versus latior, & altera posterior,  
magis obsoleta, utrinque dentata, ambo obscuriores,  
fere nudæ. Corpus subitus rufo-testaceum, puncta-  
tum, derse pallido pubescens. Pedes elongati, pal-  
pidius rufescentes, femoribus clavatis, anticis longi-  
oribus & crassioribus, omnibus versus apicem biden-  
tatis, dente interiori magno, recto, acuto; altero  
parvo, obsoleto.

106. R. pubescens; niger, longius cinereo-  
pubescens, thorace, elytris, pedibusque rufis,  
scutello albo, rostro elongato, arcuato, ru-  
fo, apice fuscō; femoribus sub-dentatis.

*Cucujus pubescens.* Payk. fn. 3. 198. 15.

Var. b, pallide testaceus, rostri apice capi-  
teque rantium fuscis.

Habitat in frondibus Pini abietis, præsertim  
in Svecica Boreali, passim.

Descr. Magnitudo & fere statura Rh. druparum;  
Caput parvum, rotundatum, nigrum, crebre pun-  
ctatum, pube longa cinerea tectum; oculi globosi; ni-  
obi; gro-

gro-brabnei; rostrum dimidio corpore fere longius, tenue, arcuatum, punctulatum, saturate rufum, nitidum, apice plus minusve insuscum. Antennæ longæ, tenues, rufo-testaceæ, clava elongata, fusca. Thorax antice coarctatus & transversim impressus, lateribus nonnihil rotundatus, basi bi-sinuatus, supra modice convexus, rufus, crebre & sat profunde punctatus, pube longa cinereo-albida, depressa, tectus. Scutellum parvum elevatum, dense albo-pubescent. Elytra thorace dimidio latiora & quintuplo longiora, supra valde convexa, dilutius rufa, profusè punctato-striata, pube longa tiberea, depressa, parcus adspersa. Corpus subtus nigrum, punctulatum, cinereo-pubescent, ano interdum rufo-piceo. Pedes elongati, saturate rufi, femoribus clavatis, anteriores dente parvo armatis, posticis fere muticis.

Var. b, pallidius testaceus, etiam flubtus; caput solum nigrum, & rostrum brunneum, apice fuscum.

Obs. Rhynchænus melancephalus, Fabr. Eleut. 2. 490. 245. Curculio phyllocola Herbst. Col. 6. 161. 118. tab. 70. f. 14, huic simillimus & valde affinis, sed paulo minor; rostrum totum nigrum; femora acutius dentata, & tarsi pigrae; an vere distinctus, spud nos vero non occurrit, quantum mibi innotuit.

107 R. varians: niger, longius cinereo-pubescent, elytris rufis, margine omni nigro; Scutello albo; thorace profunde punctato; femoribus acute dentatis.

Fabr. Eleut. 2. 485. 222.

Curculio varians Herbst. Col. 6. 263. 239. Tab. 89 f. 8. Payk. fn. 3. 202. 19.

Ins. Svec. T. I. P. III. N.

Var. *b*, minor, elytris totis nigris. *Payk.*  
*i. e. var. b.*

*Ceratium perforator.* *Herbst. Col. 6. 143. 103.*  
*Tab. 69. f. 8.*

Habitat in *Pini Sylvæstris* frondibus, præ-  
 tertim in Svecia boreali, passim.

Descr. Statura omnino præcedentis, sed dimidio  
 minor & ultra. Caput parvum, nigrum, profunde  
 puncatum, tenue pubescens, fronte impressa; oculi  
 nigri, prominuli; rostrum longitudine dimidi corporis,  
 tenue, arcuatum, nigrum, nitidum, sub-læve.  
 Antennæ longæ, valde tenues, testaceæ, clava fasci-  
 scente. Thorax antice coarctatus & transversim im-  
 pressus, lateribus rotundatus, basi bisinuatus, supra  
 modice convexus, niger, sat profunde sed minus  
 crebre puncatus, pube longiori cinerea depressa ad-  
 spersus. Scutellum parvum, elevatum, dense albo-  
 villosum. Etyra thoracis basi paulo latiora, humeri  
 prominulis, & illo quadruplo longiora, supra val-  
 dè convexa, rufa vel rufo testacea, sub nitida, pro-  
 funde punctato striata, parum pubescentia; margo  
 lateralis late, sutura paulo angustius, & basi obso-  
 lete nigra. Corpus tubus nigrum, puncatum, cine-  
 rō pubescens. Pedes elongati, validi, nigri, femo-  
 ribus clavatis; anticis crassioribus & longioribus;  
 dente validiori armatis; posterioribus obsoletius dem-  
 tatis; tibiæ anticæ sæpe extrosum ferrugineæ.

Var. *b*, plerumque minor, elytris totis nigris;  
 cæterum omni puncto conveniens.

108. *R. Rubi*: niger, tenue pubescens, scu-  
 tellō albo; antennarum basi, genubus tar-  
 fisque piceis; thorace confertissime subtilli-  
 ter

ger punctulato, femoribus obsolete dentatis.

*Fabr. Eleut. 2. 446. 42.?*

*Curculio Rubi. Herbst. Col. 6. 167. 126. Tabr. 71. f. 8.*

*Curculio melanopterus. Marsh. Ent. Br. 1. 289.  
151.*

Var. b, Elytris, pedibus abdomineque fusco-ferrugineis.

Habitat in Rubo idæo, cæsio, aliisque, non infrequens.

Descri. Varietati b, præcedentis, quidem valde similis, sed adhuc minor, pubescens brevior, thorax confertissime, subtiliter punctulatus, & femora minutissime dentata. Caput parvum, rotundatum, nigrum, subtilissime punctulatum, tenui pubescens, fronte impressa; oculi nigri, parum prominuli; rostrum longitudine dimidiæ corporis, arcuatum, nigrum, obsoletè carinatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, basi ferrugineæ seu piceæ, extremitate nigrae, clava oblonga. Thorax antice coarctatus & prope apicem transversim impressus, lateribus parum rotundatus, basi leviter bisinuatus, supra convexus, niger, opacus, confertissime subtiliter granulato-punctatus, pube brevi, tenui, cinerea, interdum in medio & versus latera in tres lineas obsoletas condensata, adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, pube albida tectum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, humeris prominulis, & illo fere quintuplo longiora, supra valde convexa; nigra, opaca, profunde punctato-striata, pube tenui cinerea depresso, adspersa. Corpus subtus nigrum, punctula-

N 2 tum,

tum, pubescens, ano saepe piceo. Pedes elongati, tenuis, nigri, femorum basi, genibus tarsisque fusco piceis; femora longa, sub-clavata, omnia dente parvo armata.

Var. b, differt tantum colore elytrorum, pedum & abdominalis pallidiori, & fusco-testaceo vel livido; forte nuper exclusa.

Obs. Cl. Fabricius in Rh. Rubi ut Rh. Aethiope paullo tanum minorem, femoribusque muticis, describit; Cl. Herbstii & noster Rh. Aethiope ad minimum quadruplo minor, & femora illi armata, unde vix idem.

109. R. dorsalis: niger, fere glaber, elytris rubris, margine suturaque antica dimidiatâ nigris, rostro longiusculo, crassiori, striato.

*Fabr. Eleut. 2. 454. 83.*

*Curculio dorsalis.. Oliv. Ent. 5. 83.. Tab. 14.*

*f. 169. a, b. Hier. St. Col. 6. 101. 62. Tab.*

*66. f. 6. Payk. fn. 3. 200. 17. Panz. fn.*

*17. f. 9. Crit. Rev. 1. 127.*

Habitat in frutetis, præsertim in Salice caprea, rarius.

Descr. Rh. Pomorum paullo minor, præsertim angustior. Caput rotundatum, nigrum, convexum, profunde punctatum, oculis depresso brunneis; rostrum longitudine capitis cum thorace, crassiusculum, arcuatum, nigrum, sub-carinatum, striato purpureum. Antennæ rostro cum capite longiores, crassiusculæ, ferrugineæ, clava ovata nigra. Thorax antice constrictus & transversum obsolete impressus, lateribus totum-

rotundatus, basi fere truncatus, supra parum convexus, niger, profunde punctatus, pilis minutissimis parce adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrem, lœve. Elytra thoracis medio parum latiora, sed quadruplo longiora, supra modice conyexa, saturate rubra, nitida, profunde punctostriata, intersticiis lœvibus; margo exterior a basi ultra medium niger, ut & sutura antica versus medium magis dilatata. Corpus subrufum nigrum, parce pubescens, pectore crebrius, abdomine obsolete, punctulatis. Pedes validi nigri, femoribus clavatis, anticis crassioribus, omnibus dente mediocri armatis.

Obt. Nuper exclusus multo pallidior; thorax & pectus ferruginea, elytra tota & abdomen testacea.

Rh. dorsalis Fabricii et si inter muticos collocatus, forte tamen idem ac noster, quem admodum figuræ Olivieri, Herbstii & Panzeri, ut & descriptio nem accuratissimam Paykullii, citavit; Curc. dorsalis Linnæi vero forte ad Rh. paucorum, No 50 antea descriptum, vel ad varietatem Rh. Beccabungæ, elytris pallidioribus, pertinere videtur.

No. R. 5-punctatus: niger, supra squamu lis purpurascenti-aureis, subtus niveis, testus; thoracis linea dorsali, elytrorum sutura maculisque quatuvor albo-squamosis, antennis tibiisque ferrugineis.

*Fabr. Eleut.* 2. 482. 204.

*Curculio 5-punctatus.* Linn. *Syst.* 2. 614. 64.

*Fn. Sv.* 618. *Herbst. Col.* 6. 274. 246. *Tab.*

81. *f. 3.* *Payk. fn. 3.* 201. *18.* *Panz. fn.*

84. *f. 8.*

N 3

Var.

Var. b, *Supra squamulis cinereo-argenteis tectus.*

*Habitat in floribus, praesertim Orobii tuberosi, passim.*

Deser. Rh. nigri-rostri paullo latior & convexior. Caput parvum, nigro-brunneum, crebre punctatum, vertice squamulis fusco-aureis, fronte majoribus sibis, tectis; oculi magni prominuli, nigro-brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, crassiusculum, arcuatum, nigro-piceum, squamolatum, apice attenuatum, glabrum, saepe rufo-testaceum; Antennae rostro cum capite paullo longiores, crassiusculae; rufo-ferruginea. Thorax antice coarctatus & transversim depresso, lateribus valde rotundato-dilatatus, basi truncatus, supra parum convexus, niger, crebre punctatus, supra squamulis densis fusco-aureis, saepe purpureo-scentibus omnino tectus; in medio dorsi linea, postice latior & evidenter, e squamulis albis seu niveis. Scutellum parvum, depresso, albo-squamosum. Elytra thoracis medio vix latiora, & ito triplo longiora, supra convexa, nigro-picea, posterius saepe rufescens, obsoletius crenato-striata, interstitiis subtiliter rugulosis; tota squamulis similiibus uti thorax testa; sutura fere tota late albo-squamosa; in singuli elytri humero macula major & pone medium disci alia minor, etiam albo seu niveo-squamose. Corpus subtus nigrum, punctatum, dense albo-squamosum. Pedes breviustuli, validi, femoribus clavatis nigris, rarius, rufo-piceis, albo-squamosis, omnibus acute dentatis; tibialis tarfisque fusco-ferruginea.

Var. b, differt tantum colore squamularum paginae superioris pallidiori, cinereo-argenteo, unde signature albae minus conspicuae.

III. *R. venustus*: niger, supra squamulis pilisque brunneo-cinereis, subru: albis, testis; thorace elytrisque albido-lineatis; rostri apice, antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis.

*Fabr. Eleut.* 2. 456. 90.

*Curculio venustus.* *Herbst.* 6. 163. 121. *Tab.* 71. *f.* 2. *Curc. pegojo.* *ibid. p.* 103. 63. *tab.* 66. *f.* 7. *vix differt.*

*Curculio vernalis.* *Reich. Mant.* I. 8. 4. *f.* 4. *Marsh. Ent. Br.* I. 272. 105.

*Curculio bi-vittatus.* *Marsh. Ent. Br.* I. 281. 129.

*Curculio parallellus.* *Panz. fn.* 18. *f.* 5. *Crit.* *Rev.* I. 128.

Habitat in Gotlandia rarius. Dom. *Wetter-*  
*hall.*

Descr. Statura & affinitas præcedentis, sed plerumque paullo minor, præsertim angustior. Caput parvum, retractum, nigrum, squamulis angustis-brunneo-cinereis testum, oculis globosis brunneis; rostrum longitudine capitis cum thorace, valde arcuatum, basi crassius, cinereo squamosum, pone medium nudum, nigrum, nitidum, apicem versus attenuatum, apice ipso rufo-ferrugineo. Antennæ capite cum rostro longiores, crassiusculæ, ferrugineæ, cinereo-pubescentes, clava plerumque obscuriori. Thorax longitudine latior, antice angustatus & juxta apicem stria transversa impressus, lateribus dilatato rotundatus, supra parum convexus, niger, obsolete punctatus,

latus, squamulis angustis, piliformibus, depresso-brunneo-cinereis, interdum metallico-nitentibus, alia vice pallidius cinereis, densis, tectus, linea longitudinali media, lateribus & pagina inferiori albo squamosis. Scutellum parvum, rotundatum, dense albo-squamosum. Elytra thorace latiora, & fere triplo longiora, apice rotundata, anum non perfecte occultantia, supra modice convexa, nigra, pupillato-striata, squamulis similibus uti thorax tecta; sutura tota, semper late albosquamosa; interstitia alterna, quartum & sextum, rarius etiam secundum a sutura, lineis albido-squamosis, posterius angustatis, notata, quarum exteriora saepe antice confluentia; saepe etiam margo exterior albido-squamosus. Corpus subtus piceum, squamulis brevioribus, latioribus, albis, omnino tectum. Pedes crassiusculi, femoribus clavatis, fusco-piceis, dense cinereo-squamulosis, denticulo obsoleto armatis; tibiis tarsisque fusco-ferrugineis.

112. *R. squamifer*: fusco-brunneus, convexus, cinereo-squamulosus, antennis pedibusque rufescensibus; supra squamis erectis nigris, sparsis, exasperatus; elytris connatis, profunde striatis; rostro tenui, arcuato.

*Curculio squamifer*. Payk. /n. 3, 206. 22.

Habitat in Sylvis aceriosis, rarissime; in Silva Kinnensi Westrogothice semel lectus; & altera vice, a Dom. Wetterhall, in Smolandia captus, donoque mihi missus.

Descr. Statura fere Rb, dorsalis, sed dimidio minor. Caput parvum, rotundatum, rufo-brunneum, dense cinereo-squamulosum; oculi depresso-nigri; rostrum

rostrum capite cum thorace longius, tenuie, arcuatū, rubrum, basi sub punctatum, apice nigro-fuscum, laxe. Antennæ crassiusculæ, rufo ferrugineæ, pubescentes. Thorax subglobosus, basi apiceque angustior, truncatus, lateribus rotundatus, supra convexus, pulvinatus, fuscop-brunneus, punctulatus, squamulis depressis cinereis, in linea dorsali & alia utrinque laterali magis condensatis, tectus & præterea squamis latoeis, erectis, elongatis, nigris, in lineas duas dorsales dispositis, muricatus. Scutellum nullum. Elytra antice thoracis basi dimidio latiora, ante medium magis dilatata, apicem versus attenuata, thorace fere triplo longiora, valde convexa, connotata, profunde striata, striis sub-lævibus; fuscobrunnea, squamulis depressis cinereis variegata, interstitiis singulis serie e squamis erectis, elongatis, exasperatis, quarum dorsales majores, pleræque nigrae, laterales minores, cinereæ. Corpus subtus brunneum, dense cinereo-squamosum. Pedes elongati, rufescentes, femoribus obscurioribus, clavatis, squamis cinereis annulatis, omnibus dente valido, acuto armatis.

---

Fam. 2. Sect. 2. Corpore breviori, subquadrato,

Subdivision. Thorace latiori, subæquali, non tuberculato, nec antice reflexo.

113. R. Nucum: niger, sub-depressus, dense flavescens-villosus, antennis pedibusque ferrugineis, rostro tenui, longitudine corporis,

poris, extrosum rufo; elytris sub-triangularibus.

*Fabr. Eleut.* 2. 486. 228.

*Circulio nucum.* *Linn. Syst.* 2. 613. 59. *En.*  
*Sv.* 616. *De Géer Ins.* 5. 205. 2. *Tab* 6.  
*f.* 14 - 16. *Heibst. Col.* 6. 197. 158. *Tab.* 73.  
*f.* 10. *Payk. fn.* 3. 204. 20. *Panz. fn.* 42.  
*f.* 21.

*Var. b*, *Pubes cinerea vestitus.*

*Circulio glandium.* *Marsh. Ent. Br.* 1. 284.  
 137.

*Habitat in Corylo avellana, cuius nucleos  
 larva destruit.*

*Descr.* Rh. Pini brevior, sed in medio latior.  
 Caput parvum rotundatum, convexum, nigrum, crebre punctulatum, pubes densa cinereo-flavescente testum; oculi magni, subdepressi, brunnei; rostrum maris vix longitudine corporis, ante antennarum insertionem crassius, nigro-piceum, carinatum, punctato stictatum, pubescens; extra antennas tenue, valde arcuatum, rufum, nitidum, glabrum, laxe, summo spicè nigriscente; rostrum feminæ totò corpore fere longius, valde tenue & arcuatum, rubrum, nitidum, laxe, basi apicè que parum fuscescens. Antennæ rostro cum capite parum longiores, tenues, fusco ferrugineæ, extrosum pilosæ & pubescentes. Thorax brevis, antice multo angustior & transversim obsolete impressus, basi bi-sinuatus, supra convexus, sub-carinatus, niger, creberrime punctulatus, pubes densa cinereo flavescente, depressa, vestitus. Scutellum rotundatum, elevatum, dense pallido pubescens. Elytra antice thoracis basi latiora, humeris prominulis,

nulis, & illo duplo longiora, posterius valde angustata; sub-triangularia, supra depressa, nigra, punctato striata, interstitiis crebre rugulosis; pube cinereo flavecente testa, maculisque pallidioribus, e plurimis magis condensatis; variegata. Corpus subtus nigrum, crebre subtiliter punctulatum, pube simili ac supra testum; ad latera antica pectoris lamina obliqua cuneata, pallidior, e pube magis condensata. Pedes validi, obscure ferruginei, cinereo-pubescentes, genubus fusco-piceis; femora omnia clavata, acute dentata.

Var b, differt tantum colore pubescentiae magis cinereo.

II4. *R. villosus*: niger, sub-depressus; parcus cinereo-pubescent; antennis ferrugineis; rostro tenuissimo, longitudine corporis; scutello elytrorumque fascia postica albidis.

*Fabr. Eleut.* 2. 484. 218. *Rh. esuriens*. *ibid.* 487. 232. *idem*.

*Curculio villosus*. *Herbst. Col.* 6. 195. 156. *tab. 73. f. 8.* *Archiv.* 5. 76. 41. *Tab. 24. f. 19.*  
*Payk. fn. 3.* 205. 21.

Var. 4, Scutello fasciaque elytrorum lutescentibus.

*Rhynchænus Ceraforum*. *Fabr. Eleut.* 2. 488. 238.

*Curculio Ceraforum*. *Panz. fn. 42. f. 22.* *Marjh. Ent. Br.* 1. 284. 138.

Habitat in Svecia Australi, rarius. *Don.*  
*Quenst.* *Descr.*

Descr. Statura omnino Rh. Nucum, sed plus duplo minor, femora minus valide dentata, & pubescentiae color alius. Caput parvum, rotundatum, nigrum, obsolete punctulatum, parum cinereo-pubescent; oculi magni, depresso, brunei; rostrum feminae corpore fere longius, tenuissimum, valde arcuatum, nigrum, nitidum, laxe, in medio, ante antennarum basin, rufo-brunneum; rostrum maris paulo brevius & crassius, basi substriatum. Antennæ longæ, tenues, ferrugineæ, clava cinereo-pubescente, Thorax anterius angustior ibique obsolete transversum impressus, basi binotatus, supra parum convexus, niger, crebre, obsolete punctulatus, adspersus pilis radioribus cinereis, in medio dorsi in lineam evidenterem abdito condensatis. Scutellum rotundatum, dense albo-villosum; Elytra antice thoracis basi latiora, burneris prominulis, thorace plus duplo longiora, posterius attenuata, supra sub-depressa, nigra, punctato striata, interstitiis crebre coriaceis; pube cinerea depresso, hinc iude in lituras transversiles condensata, adsparsa; pullò pone medium fascia communis albidiior, extorsam angustata, margines non attingens. Corpus subitus convexum, nigrum, obsolete punctulatum, cinereo-pubescent. Pedes nigri, cinereo pubescentes, femoribus clavatis, dente parvo, armatis.

Var. b, differt tantum scutello & fascia elytrorum, lutescentibus seu flavo-ferrugineis.

Obs. Secundum observationem Cl. Illigeri in Mag. 4. 218, 232 & 238, tres allatae Species Fabricianæ in unam reducendæ.

us. R. Cerasorum: rufo-brunneus, sub-depressus, pube pallida variegatus, rostro rufo, longitudine corporis; pedibus testaceis, femoribus obsolete dentatis.

Cer.

*Cureu'io Cerasorum. Park. fn. 3 206. 22. Herbſt.*  
*Col. 6. 196. 157. Tab. 73. f. 9.*

Habitat in Scania rathis, Dom. Quensel; in  
ſoilis Betuæ albiæ & Alni in Weltrogo;  
thia aliquoties captus.

Décr. Statura omnino præcedentium, sed par-  
vus, Rh. drupatum fere minor. Caput rotundatum,  
convexum, rufo-ferrugineum, crebre obsolete pun-  
ctatum. ſi is parvis pallidis adaspersum; oculi ma-  
gni, d. preſſi, b. unnei; roſtrum longitudine corporis,  
acutum, ruſum, nitidum, baſi subſtriatum. An-  
tennae longæ, tenues, rufo ferrugineæ, extroſum  
pubescentes. Thotax antice anguſtior, ante apicem  
transversim impressus, lateribus nonnihil rotundatus,  
baſi biſinuatus, ſupra pærum convexus, anterius ſub-  
cærinatus, totus rufo brunneus, subtiliter obſoleto  
punctulatus, pilis parvis, rigidis, depreſſis, flavescenti-  
bus ad latera & in linea dorsali media adaspersus;  
versus medium baſeos punctum parvum utrinque  
impressum. Scutellum rotundatum, dense pallido-  
pubescentes. Elytra thoracis baſi multo latiora, hu-  
meris prominulis, ſed illo vix triplo longiora, poſte-  
rius attenuata, ſubtriangularis, ſupra lue-depreſſa,  
rufo brunnea, evidenter puritate ſtrata, interſtitia ſubtiliter  
rugulofit; pilis pallidis rigidis, hinc inde int  
fascias irregulares, undulatas, collocatis, adaspersas.  
Corpus ſubrus obſoleto punctulatum, pube cinereo-  
pallescente adaspersum, pectore brunneo, ventre dilati-  
tus testaceo. Pedes rufo-testacei, femoribus elava-  
tis, omnibus dente parvo armatis.

Obſ. Rh. Cerasorum Cl. Fabricii, modo var. præ-  
cedentis ſpeciei teste Dom: Illiger, ut antea indicat-  
um; nomen Cl. Paykullii & Herbſtii ideo huic re-  
tinendum.

216. R. *Salicivorus*: niger, supra cinereo-sub-pubescent, scutello corporeque subtus albo-squamosis; antennis basi ferrugineis; rostro longissimo, arcuato, atro.

*Curculio Salicivora*s. Payh. fn. 3. 214. 32.  
Herbst. Col. 6. 200. 160. tab. 73. f. 12.

*Curculio Napo-brassicæ*. Bierkand. Act. Holm. 1780. p. 194.

*Rhynchænus brassicæ*. Fabr. Eleut. 2. 483. 211.

*Curculio arcuatus*. Marsh. Ent. Br. 1. 288. 148.

Var. b, Antennis fere totis ferrugineis.

*Curculio curvatus*. Marsh. Ent. Br. 1. 287. 147.

Habitat in foliis & floribus Salicum, passim; etiam in floribus Brassicæ, aliisque plantis oleraceis, sat frequens.

Descr. Rh. Campanulæ fere duplo minor, præsertim angustior. Caput orbiculatum, nigrum, subtiliter punctulatum, parum pubescens, oculis magnis, depresso, brunneis; rostrum feminæ longitudine separe corporis, tenue, valde arcuatum, nigrum, nitidum, sublæve; maris paullo brevius & crassius, basi striatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, articulo primo clavato, rufo-ferrugineo, reliquis fusco-piceis, pilosis. Thorax latitudine longior, antice nonnihil coarctatus, lateribus rotundatus, basi subbisinuatus, supra modice convexus, totus niger, subtiliter granulato punctatus, pube tenui cinerea adspersus; in medio baseos macula parva, triangularis, & alia longior utrinque versus latera, e. pilis albidis, magis condensatis. Scutellum rotundatum elevatum, dense

dense albido squamosum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris prominulis, & illo plus duplo longiora, posterius angustiora, supra convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis subtus liter rugulosis, singulis serie duplice squamulis minutis cinereis, depresso-filiformibus, notatis. Corpus subfuscum, punctulatum, squamulis densis albidis, rotundatis, tectum. Pedes longiusculi, nigri, femoribus clavatis omnibus acute dentatis.

Var. b, differt tantum corpore paullo minori, & antennis fere totis rufo ferrugineis, clava tantum obscuriori.

Obit Cl. Fabricius neque scutelli, nec corporis squamositatem albidae memorat, unde Synonymus eius dubium; forte tamen hoc pertinet, secundum spesimina detrita descriptus.

ii7. R. Antirrhini: niger, sub depresso, dense griseo pubescens, rostro recto, apice attenuato, antennis brevibus, crassis; femoribus obsolete dentatis.

*Curculio Atmirrhini.* Payk. fn. 3. 257. 78.  
Marsh. Ent. Br. 1. 264. 80.

*Curculio ellipticus.* Herbst. Col. 6. 171. 131. tab. 71. f. 13.

Habitat in floribus Antirrhini Linariae, passim.

Descr. Statura & magnitudo R. Campanulae, sed abunde differt, rostro crassiori, recto, apice attenuato; pubescens longiori, & densiori; antennis crassioribus, &c. Caput parvum, rotundatum, convexum, nigrum, crebre granulato-punctulatum, pilis densis glifosis.

griseis, depresso, adspersum; oculi brunnei, sat prominuli; rostrum maris vix longitudine thoracis, omnino rectum, nigrum, basi crassum, punctatum, pubescens, exterius attenuatum, sub-læve, glabrum; rostrum feminæ paullo longius & magis tenue, alias ejusdem structuræ. Antennæ vix rostro cum capite longiores, nigrae, valde crassæ, articulo primo obconico, vix tertiam partem totius antennæ efficiente, clava magna, ovata, griseo pubescente, articulis valde coarctatis. Thorax posterius longitudine paullo latior, anterius angustior, & juxta ipsum apicem friga transversa impressus; lateribus posterius rotundatus, basi etiam obtuse rotundatus, angulis omnino nullis; supra sub depresso, niger, creberrime punctatus, pube longiori, densa, grisea, adspersus. Scutellum triangulare, nigrum, pubescens. Elytra thorace paullo latiora, humeris prominulis, & illo vix triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra sub-depressa, nigra, opaca, punctato-striata, intersticiis rugulosis, pube longiori, grisea, sub seriata, adsparsa. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, dense griseo pubescens. Pedes mediocres, nigri, pubescentes, femoribus clavatis, posterioribus dente obsoleto notatis.

Obs. Rh. teteæ, Fabr. Eleut. 2. 448. 50, jam descripto simillimus & valde affinis, sed plus duplo major, rostrum feminæ longius, cylindricum, &c. neq; aptid nos indigenus.

Ug. R. Linariæ: niger, sub-depresso, parcius cinereo-pubescentes, rostro crassissimo, valde arcuato, antennis brevibus, crassis, femoribus obsolete dentatis.

*Curtulio linariae.* Panz. fn. 26. f. 18. Crit. Rev. 1. 125.

Cure

*Curtulio Ajugæ. Herbst. Col. 6. 172. 132.?*

Habitat in Antirrhino linaria, Epilobio, rarius.

Descr. Statura & semina affinitas praecedentis; plerumque tamen dimidio major, rostri structura præcipue distinctus. Caput parvum, rotundatum, nigrum, crebre granulato-punctatum; pube tenui; depressa, dilutius cinereæ, adspersum; oculi depresso, nigro-brunnei; rostrum longitudine thoracis, crassifuculum, valde arcuatum, supra sub-depressum, basi punctulatum, pubescens, apice lœve, glabrum, saepe rufo-ferrugineum. Antennæ breves, crassæ, nigræ, omnino ut in praecedenti constructæ. Thorax brevis, transversus, antice paulò angustior & striatus tenui, transversa, impressus, lateribus dilatatus, rotundatus, postice etiam obtuse rotundatus, supra sub-depressus, dorso obsoletissime carinatus, totus niger, creberrime punctatus, pilis parvis, depresso, cinereo-albidis adspersus. Scutellum obtuse triangulare, nigrum, pubescens. Elytra thoracis medio-parum latiora, sed plus triplo longiora, supra dorso depressa, tota nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis rugulosis, pube tenui, depresso, cinereo-albida adspersis. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, tenue pubescens. Pedes mediocres, nigri, femoribus clavatis, posterioribus obsolete dentatis.

Obs. Figura Panzeri, quoad rostri & antennarum structuram, nostrum exacte representat; Synonymum Herbstii minus certum, ob descriptionis insufficientiam.

119 R. collinus: niger, sub-depressus, longius griseo-pubescens; rostro mediocris,

sub-acute.

Ins. Suec. T. I. P. III. O

sub-arcuato; antennis brevibus, crassis, piceis; femoribus acute dentatis.

Habitat in collibus aridis pratorum, rarius.

Defer. Statura & summa affinitas praecedentis, plerumque paullo minor, rostro parum arcuato, pube longiori & obscuriori, femoribusque omnibus latem in masculis, acute dentatis, distinctus. Caput rotundatum, nigrum, punctulatum, pube longiori grisea fere tectum; oculi depressi, brunnei; rostrum maris vix longitudine thoracis, crassiusculum, parum arcuatum, nigrum, basi punctulatum & pubescens, apice nudum piceum; feminæ paullo longius, & tenuius, extrorsum magis glabrum, nitidum. Antennæ breves, crassiæ, fusco-piceæ, basi dilutius ferrugineæ, structura omnino ut in duobus praecedentibus. Thorax brevis, transuersus, structura omnino ut in Rh. Linariæ, supra subdepressus, obsolete carinatus, nigro-fuscus, punctulatus, pube longiori, densa, fusco-grisea ob ductus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, cinereo-pubescentes. Elytrorum forma ut in priori, supra subdepressa, nigra, punctato-striata, intersticiis subtiliter punctulatis, pube longiori grisea adspersis. Corpus subtus nigrum vel fusco-piceum, obsoletius punctulatum, dense griseo-pubescentes. Pedes meaiocres, nigri, pubescentes, tarsis fusco-ferrugineis, femoribus clavatis, in marginibus acute dentatis; in femina anticis sub-muticis, reliquis dente parvo instructis.

210 R. graminis: niger, sub-depressus, cinereo-pubescentes, rostro longiori, cylindrico, sub-arcuato; antennis longioribus, tenuioribus; femoribus posticis dentatis.

*Carelio campanulae, femina.* Payk. Fn. 3.  
212. 29. Habitat

Habitat in gramine, ad agrorum margines; rarius.

Descr. Præcedentibus iterum valde affinis, sed Rh. Linariæ adhuc major, rostrum longius, magis tenuis, parum arcuatum; antennæ longiores, tenuiores, &c. Rh. Campanulæ etiam simillimus, sed duplo major, pubescens longior, caput non ita retratum, femora crassiora & postica dentata; nec ejus semina esse possit, nam ambo illius sexus multoties in copula capti, bene cogniti, ut antea ad N:o 55. indicatum. Caput exsertum, rotundatum, convexum, nigrum, punctulatum, tenue pubescens; oculi magni, brunnei, modice prominenti; rostrum capite cum thorace fere longius, tenuis, cylindricum, parum arcuatum, nigrum, punctulatum; basi pubescens. Antennæ resto cum capite longiores, tenues, nigræ, clava oblonga, minus crassa. Thorax posterius longitudine lator, anterius angustatus & juxta apicem striata transversa, angusta, impressus, basi obtuse rotundatus, supra sub-depressus, niger, crebre punctatus, pube longiori grisea, depresso, obductus. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, pube densa, cinereo-albida, tectum, Elytra thorace parum latiora, & vix triplo longiora, supra sub-depressa, nigra, profunde punctato-striata, interstitiis obsoleta rugulosis, pube longiori, grisea, striatim digesta, adspersis. Corpus subtus nigrum, obsoletius punctatum, dense griseo-pubescentes. Pedes longiusculi, velidi, nigri, pubescentes, femoribus clavatis, anterioribus muticis, posticis dente obtuso armatis.

Fam. 2. Sect. 2. Subdivisio 2<sup>ia</sup>. Tho-  
race parvo, elytris duplo angu-  
stiori; elytris magnis, sub-qua-  
dratis; Antennis 10-articulatis,  
clava oblonga, 4-articulata.

Obs. Species hujus sub-divisionis, a Cl.  
Dom. Latreille & Gairville, in proprio ge-  
nere, sub nomine Cionus, collocatae; vix  
vero sufficunt notæ ad Genus peculiare de-  
terminandum.

121. R. Scrophulariæ: niger, thorace pecto-  
re que pilis flavescentibus tectis, elytris  
brunneis, interstitiis alternis elevationibus,  
atro alboque tessellatis, maculis duabus  
futuralibus magnis atro-holosericis.

*Fabr. Eleut.* 2. 478. 191

*Curculio scrophulariae.* Linn. *Syst.* 2. 1614. 61.

*Fn. Sv.* 603. *De Géer Ins.* 5. 208. 3. var.  
1 ♂ 2. *Tab.* 6. f. 17 - 25. *Herbst Col.* 6.

184. 147. *tab.* 73. f. 1. *Payk. fn.* 3. 207. 24.

Var. b, thoracis pectorisque pubescentia  
alba.

Var. c. thoracis dorso longitudinaliter nudo,  
nigro.

*Rhynchænus Verbasci.* *Fabr. Eleut.* 2. 479.

193. *Ilig. Mag.* 4. 146. 193.

*Curculio Verbasci.* *Herbst. Col.* 6. 139. 149.

Habitat in *Scrophularia nodosa*, lat tre-  
quens.

*Descr.*

**Descr.** **Magnitudo minoris Pisi.** Caput parvum, nigrum, obsolete punctulatum, dense pallido-pubescentia, oculis magnis brunneis, depresso; rostrum capite cum thorace longius, crassiusculum, arcuatum, nigro-piceum, crebre punctulatum. Antennæ rostro cum capite paullo longiores, fusco-ferrugineæ, clava obscura obscuriori. Thorax parvus brevissimus, anterius angustior, truncatus, basi subsinuatus, supra inæqualis, antice depresso, pone medium transversim elevatus, tuberculo obsoleto utrinque notatus; niger, subtiliter punctulatus, totus supra & subtus pilis longiusculis, rigidis, depresso, densis, pallide flavis, tectus. Scutellum oblongo rotundatum, depresso, piceum, flavo-pilosum, præsertim apice. Elytra magna, subquadrata, thoracis basi fere duplo latiora, humeris elevatis, rectangularis, thorace plus quam quadruplo longiora, supra convexa, dorso anteice tamen fere plana, aut nigro picea, aut dilutius rufa-brunnea, minus regulariter punctato-striata, interstitiis alternis elevationibus, maculis villosis, atro-holoferioëis, majoribus, aliisque minoribus albidis alternantibus, tessellatis; sutura etiam in medio simili modo tessellata; pone scutellum macula magna, communis, oblonga ovata, holofericeo-atra, postice macula contigua alba aucta; versus apicem futuræ macula altera communis, oblonga, atro-holofericea, anticè macula oblonga alba, postice alia brevi ejusdem coloris inclusa. Corpus subtus nigro piceum, punctulatum, pectore pilis densis pallidis tecto, ab domine parcius pubescente. Pedes elongati, validi, picei, pilis pallidis variegati, tarsis rufe centibus, femoribus omnibus dente valido, acuto, armatis.

**Var. b.** differt tantum colore pubescencie thoracis & pectoris albo, interdum niveo.

**Var. c.** obscurior, magis atra; thoracis dorsum virtu lata, inæquali, sub-nuda, atra, notatum, puncta alternantia in interstitiis elytrorum non alba, sed

221. *Rhynchonus* cineres; antennarum clava plerumque longior, fuscotestacea; cætera omnino conveniunt; an tamen Species distincta?

222. *R. Thapsus*: fuscobrunneus, undique cinereo-virescenti pubescens, elytris maculis denudatis, obsoletè tessellatis, duabusque suturalibus atro-holofericeis, orbiculatis, simplicibus.

*Fabr. Eleut.* 2. 479. 192.

*Curculio Thapsus.* *Herbst. Col.* 6. 187. 148.

*Tab.* 73. *f.* 2. *Marsh. Ent. Br.* 1. 277. 118.

*Curculio Serophulariae* var. *Linn. Synt.* 2. 614.

*61.* *Fn. Sv.* 603. *De Gér Inf.* 5. 208. 3.  
var. 3. *Payk. fn.* 3. 208. b.

Habitat in Verbasco Thapsus, passim.

Descr. Statura, magnitudo & summa affinitas præcedentis, differt tamen, non solum pubescens diversa, maculisque suturalibus orbiculatis, simplicibus, sed etiam intersticiis elytrorum alternis, vix vel per-parum elevatis; maculis oblongis brunneis obsoletis, dehudatis, nec atro-holofericeis, tessellatis, &c. Caput parvum, fulvo-piceum, punctulatum, pube cinereo-virescente testum, oculis magnis, depresso, brunneis; rostrum copite cum thorace longius, crassiusculum, sub-arcuatum, nigrum, opacum, creberrime granulato-punctulatum, pubescens. Antennæ ut in priori. Thoracis structura etiam ut in illo, totus fuscopiceus, subtiliter punctulatus, pubescens, cinereo-virescente, interdum flavicante, undique tectus, lineis duabus dorsalibus approximatis, punctisque duobus utrinque, magis denudatis. Scutellum

tellum totum dense pubescens. Elytrorum forma ut in priori, dilutius fusco-ferruginea seu brunnea, minus regulariter punctato-striata, pubescentio-virescenti, densa, obducta, interstitiis alternis vix elevatioribus, sed tantum maculis oblongis, seriatis, deundatis, in dorso paucis, obsoletis, versus latera cerebrioribus, tessellatis; ante medium dorsi macula magna suturalis orbiculata, atro-holofericea, absque adjacente alba macula, & ante apicem altera, paullo minor, etiam rotundata, simplex. Corpus subtus fusco brunneum, punctatum, dense pubescens. Pedes, quoad structuram, ut in priori, fusco brunnei, pubescentio-virescente variegati, tarsis & interdum tibiis anterioribus ferrugineis.

123. R. hortulanus: fusco-brunneus, undique cinereo-virescenti pubescens, elytris maculis duabus suturalibus orbiculatis, atro-holofericeis, interstitiis alternis denudato pallidoque tessellatis, rostro tenuiori.

*Curculio hortulanus.* Marsh. Ent. Br. 1, 278.  
149.

Habitat in Verbasco nigro, ad Mysseberg Westrogothiae plures lectus.

Descr. Proxime praecedenti simillimus, sed diadiso minor; rostrum magis tenue; elytra evidenter tessellata, &c. Caput & oculi ut in praecedenti; rostrum capite cum thorace longius, magis tenue quam in prioribus, maris piceum, punctulatum, pubescens; feminae rufo-brunneum, apice glabrum. Antennæ totæ ferrugineæ, structura ut in prioribus. Thorax & fentellum ut in praecedenti omnino. Elytrorum forma, punctata & maculae suturales etiam ut

in illo, sed interstitia alterna maculis denudatis brunneis, aliisque alternantibus pallidis, & pube magis quam in reliqua superficie condensata, evidenter & concinne tessellata. Corpus subitus ut in priori. Pedum structura & pubescentia etiam ut in illo, in femina fere toti testacei, in mare fusco-brunnei, tarsis dilutioribus.

124. R. Solani: fusco-brunneus, griseo-pubescentia, elytrorum interstitiis alternis sub-elevatis, maculis atro-hilosericis fasciculisque erectis albidis tessellatis, thorace brevissimo.

*Fabr. Eleut.* 2. 480, 199.

*Circulio Solani.* *Payk. fn. 3. add.* 457. 25-6.  
*Herbst. Col.* 6. 190. 151.

*Circulio pulchellus.* *Herbst. Col.* 6. 356. 330.  
*Tab.* 88. *fn. 4.*

*Circulio immunis.* *Marsb. Ent. Br.* 1. 278. 120.

*Circulio ovalis.* *Linn. Syft.* 2. 612. 47. *Fn.*  
*Sv.* 613.?

Habitat in Uplandia, Dom. de Paykull. In Scrophularia nodosa Westrogothiae, prope urbem Alingsås. Dom. Grönborn.

Deser. Præcedentibus longe minor, vix Rh. Traxini æqualis, alias similis, et si. elytra paullo longiora. Caput parvum, fusco piceum, punctulatum, pube grisea adpersum; oculi brunnei, parum prominuli; rostrum capite cum thorace paullo longius crassiusculum, parum arcuatum, piceum, crebre punctulatum. pubescentia. Antennæ rostro cum capite paullo

paullo longiores, ferrugineæ, clava ovata, fusca, Thotax brevissimus, transversus anterius angustior, truncatus, basi sub-sinuatus, supra in æqualis, ante apicem transversim impressus, disco posteriori convexus, totus fusco-piceus, subtiliter punctulatus; in dorso lineæ tres e pilis depresso cinereo-brunneis, quarum media recta, laterales arcuatae, anterius concaventes. Scutellum fuscum, griseo-pubescentia. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, humeris prominulis, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, dilutius brunnea seu ferruginea, sat regulariter punctato-striata, interstitiis alternis elevatoriis, maculis atro-holosericeis, -seriatis, fasciculisque e pilis erectis griseo-albidis alternantibus, tessellatis, pone medium suturæ plerumque litura obsoleta nigra, fasciæ formis. Corpus subtus piceum, punctatum, cinereo-pubescentia. Pedes longiusculi, ferruginei, pubescentes, femoribus clavatis, saepe in mediis iugisatis, omnibus dente valido, acuto, armatis.

125. R. Fraxini: fusco-brunneus, cinereo-squamulosus, antennis pedibusque rufo-ferrugineis; elytris rufo-ferrugineis, plaga magna, communi, antica, nigro-picea.

*Fabr. Eleut.* 2. 489. 244.

*Circulio Fraxini.* *De Geer Ins.* 5. 212. 4.

*Herbst. Col.* 6. 192. 153. *Tab. 73. f. 5.* *Payk.*  
*fn.* 3. 209. 25.

Var. b, nigro-piceus, thoracis lateribus et lytrorumque maculis flavescenti-squamulosis.

*Circulio rectangularis.* *Herbst. Col.* 6. 193. 154  
*Tab. 73. f. 6.*

Habitat in foliis Fraxini excelsioris, pa-

sim.

Descr. Statura Rh. Scrophulariae, sed plus du-

plo minor. Caput parvum, fusco-piceum, crebre

punctatum, squamulis parvis, cinereo albidis, adsperso;

oculi brunnei, modice prominuli; rostrum ca-

pite cum thorace multo longius, crassiusculum, val-

de arcuatum, sub carinatum, creberrime rugoso-pun-

ctatum, plerumque rufo-brunneum, apice nigro-pí-

ceum. Antennæ rōstro cum capite paúllo longio-

res, tenues, rufo-ferrugineæ, clava nigro-fusca.

Thorax brevis, antice angustior, truncatus, basi sub-

sinuatus, supra dorso depresso, obsolete canalicula-

tus. brunneus seu fusco piceus, margine antico late-

sibusque saepe dilutius ferrugineus, subtus & late-

ribus dense cinereo-squamulosus, æta dorsali, anterius

angustior, punctoque utriq[ue] magis denudatis, ob-

scurioribus. Scutellum oblongo-rotundatum, fusco-

piceum. Elytra magna, thoraci basi duplo latiora,

humeris elevatis, rectangulis, thorace quadruplo

longiora, supra dorso parum convexi, rufo-ferrugi-

nea, tenue punctato-striata, interstitiis subtilissime

punctulatis, squamulis cinereo-albidis, præsertim ver-

sus latera & postice, plus minusve variegata; a basi

ultra medium plaga magna, communis, nigro-picea,

& margo lateralis anterius ejusdem coloris. Corpus

subtus fusco-piceum, punctulatum, dense cinereo-

squamulosum. Pedes rufo-ferruginei, cinereo-squa-

muli, femoribus omnibus dentè valido armatis, ap-

icis saepe basi piceis.

Var. b. differt tantum colore magis nigro-piceo,

squamulis flavo brunneis adsperso; squamulis vero

alio deteruntur, unde aliena facies.

Fam. 2. Sect. 2. Subdivisio 3:a, Thorace inæquali, aut tuberculato, aut margine antico elevato, reflexo.

126 R. trimaculatus: niger, opacus, subdepressus, elytris punctato-striatis, cruce baseos apicisque, macula utrinque laterali, corporeque subtus albo-squamosis, thorace mutico.

Fabr. Eleut. 2. 484. 216.

*Curculio trimaculatus.* Payk. fa. 3. 209. 26.  
Herbst. Col. 6. 471. 482.

*Curculio cruciger.* Herbst. Col. 6. 394. 373.  
Tab. 91. f. 4. a.

Habitat in Uplandia rarius; Dom. de Paykull; in Verbasco Thapsus ad Kinnakule Westrogothie pluries legi.

Descr. Rh. Scrophulariae paullo minor. Caput rotundatum, nigrum, crebre punctatum, fronte late impressa, vertice carinato; oculi brunnei, parum prominuli; rostrum longitudine capitis cum thorace, crassiusculum, valde arcuatum, nigrum, opacum, punctulatum, dorso carinatum. Antennæ rostro cum capite longiores, medio ferrugineæ, articulo primo nigro, clava apicis fusca. Thorax brevis, antice coarctatus, & juxta apicem profunde & late transversim implexus, margine valde elevato, reflexo; lateribus rotundatus, basi sub-bifidus, supra depresso; niger, confertissime punctulatus, in mediis obsolete canaliculatus, lateribus anticus, lineaque dorsali media griseo-pilosus; subtus dense albido-squamatus.

Habitat in foliis Fraxini excelsioris, paſſim.

Descr. Statura Rh. Scrophulariae, sed plus du-  
plo minor. Caput parvum, fusco-piceum, crebre  
punctatum, squamulis parvis, cinereo-albidis, adſper-  
sum; oculi brunnei, modice prominuli; rostrum ca-  
pite cum thorace multo longius, crassiusculum, val-  
de arcuatum, sub carinatum, creberrime rugoso-pun-  
ctatum, plerumque rufo-brunneum, apice nigro-pi-  
ceum. Antennæ rostro cum capite paullo longio-  
res, tenues, rufo-ferrugineaæ, clava nigro-fusca.  
Thorax brevis, antice angustior, truncatus, basi sub-  
ſinuatus, supra dorſo depresso, obſoleto canalicula-  
tus. brunneus seu fusco piceus, marginè antico late-  
ribus denſe cinereo-squamosus, aëa dorsali, anterius  
angustiori, puncto que utrinque magis denudatis, ob-  
ſcurioribus. Scutellum oblongo-rotundatum, fusco-  
piceum; Elytra magna, thoraci basi duplo latiora,  
humoris elevatis, rectangulis, thorace quadruplo  
longiora, supra dorſo parum convexi, rufo-ferrugi-  
nea, tenue punctato-striata, interſtitiis ſubtiliſſime  
punctulatis, squamulis cinereo-albidis, praefertim ver-  
ſus latera & poſtice, plus minusve variegata; a basi  
ultra medium plaga magna, communis, nigro-picea,  
& margo lateralis anterius ejusdem coloris. Corpus  
fubtus fuſco-piceum, punctulatum, denſe cinereo-  
ſquamosum. Pedes rufo-ferruginei, cinereo-squa-  
mosi, femoribus omnibus dentè valido armatis, an-  
cillis ſepe basi piceis.

Var. b, differt tantum colore magis nigro-piceo,  
ſquamulis flavo-brunneis adſperso; ſquamulae vero  
multe deteruntur, unde aliena facies.

---

Fam:

Fam. 2. Sect. 2. Subdivisio 3:a, Thorace inaequali, aut tuberculato, aut margine antico elevato, reflexo.

126 *R. trimaculatus*: niger, opacus, subdepressus, elytris punctato-striatis, cruce baseos apicisque, macula utrinque laterali, corporeque subtus albo squamosis, thorace mutico.

*Fabr. Eleut.* 2. 484. 216.

*Curculio trimaculatus.* *Payk. fa.* 3. 209. 26.  
*Herbst. Col.* 6. 471. 482.

*Curculio cruciger.* *Herbst. Col.* 6. 394. 373.  
*Tab. 91. f. 4. a.*

Habitat in Uplandia rarius; Dom. de Paykull; in Verbasco Thapsus ad Kinnakulle Westrogothie pluries legi.

Descr. Rh. Scrophulariae paullo minor. Caput rotundatum, nigrum, crebre punctatum, fronte late impressa, vertice carinato; oculi brunnei, parum prominuli; rostrum longitudine capitis cum thorace, erassiusculum, valde arcuatum, nigrum, opacum, punctulatum, dorso carinatum. Antennae rostro cum capite longiores, medio ferrugineae, articulo primo nigro, clava apicis fusca. Thorax brevis, antice coarctatus, & juxta apicem profunde & late transversim implexus, margine valde elevato, reflexo; lateribus rotundatus, basi sub-bisinuatus, supra depresso; niger, confertissime punctulatus, in mediis obsolete canaliculatus, lateribus anticus, lineaque dorsali media griseo-pilosus; subtus dense albido squamo-

squamulosus. Scutellum minutum, immersum, nigrum. Elytra thoracis basi latiora, humeris carinato-elevata, thorace plus duplo longiora, posterius angustiora, supra subdepressa, nigra, sat profunde punctato-striata, intersticiis planis, subtiliter punctulatis, pilis squamulisque depressis, fuscis obductis; in basi suturæ linea longa, lata, albo-squamosa, cum linea breviori punctisque binis utrinque crucem formante; versus apicem suturæ etiam linea elongata; adiacente, utrinque alia brevi, & tertia extrosum, arcuatim producta, lunata; in medio laterali utrinque puncta tria, in maculam transversam coalita, omnes albo-squamosæ. Corpus subtus nigrum, punctulatum, squamis densis albido-tectum. Pedes elongati, validi, nigri, femoribus crassis, clavatis, dente magno, obtuso armatis, versus apicem annulo albidiiori cinctis; tarsi ferruginei.

127. R. viduatus: niger, opacus, sub-depressus, elytris leviter striatis, macula laterali utrinque lunula apicis corporeaque subtus albido-squamosis; thorace mutico; pedibus fusco-ferrugineis.

Habitat in plantis rariis.

Descr. Præcedenti simillimus & valde affinis, sed dimidio minor, elytrorum striæ tenuiores, vix punctatæ, macula nulla alba in basi suturæ, pedes pallidiores, &c. Caput & oculi ut in præcedenti; rostrum capite cum thorace longius, valde arcuatum, nigro piceum, opacum, creberrime punctulatum, non vero carinatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, ferrugineæ, clava fuscescente. Thoracis structura ut in præcedenti omnino, supra disco-fere planus, totus niger, creberrime punctulatus, in medio

medio basēos foveola profunda impressus, obsoletis  
fime canaliculatus & in sūcūlo albido-squamulosus,  
præsertim antice. Scutellum minutissimum, immer-  
sum. Elytra thoracis basi latiora, humeris promi-  
nulis, & illo plus duplo longiora, supra modice  
convexa, nigra, tenuē striata, striis vix punctulatis,  
interstītiis planis, confertissime granulato-coriaceis,  
squamulis miuimis fuscis obductis; suturæ basis im-  
maculata, concolor, sed in apice elytri singuli lunu-  
la transversa, cinerea albida, & pone humerum,  
ante medium lateris, macula albido-squamosa, trans-  
versa, e tribus punctis quasi coalita. Corpus subtus  
nigrum, punctulatum, squamis densis cinereis tectum.  
Pedes longiusculi, validi, ferruginei, cinereo-varie-  
gati, femoribus clavatis, omnibus dente minus lato,  
sed multo magis acuto, quam in priori, armatis,

128. R. Asperifoliarum: niger, sub-de-  
pressus, subtus albo-squamulosus, antenñis,  
tibiis tarisseque ferrugineis; thorace sub-  
mutico, elytris leviter striatis, maculis  
quatuor albo-squamosis.

*Curculio Asperifoliarum.* Dom. Kirby, in lit-  
teris.

Habitat in Cynoglosso officinali ad Kinna-  
kulle Westrogothiæ, rarius; in Sæania,  
Dom. Wetterhall.

Descr. Praecedentibus iterum similis & affinis,  
sed longe minor, vix Rh. didymo æqualis. Caput  
rotundatum, nigrum, opacum, crebre punctulatum,  
in vertice carinatum, fronte plana, albido-squamosa;  
oculi sub-globosi brunnei; rostrum capite cum tho-  
race longius, valde arcuatum, nigrum, crebre pun-  
ctulatum.

ctulatum, pubescens. Antennæ capite cum rostro longiores, obscure ferrugineæ, clava acuminata, nigricante. Thorax brevis, antice coarctatus & juxta apicem late & profunde transversim impressus, margine valde elevato, reflexo; lateribus rotundatus, margine sub-incrassatus basitruncatus. elytris arcte applicatus, supra depresso, niger, opacus, crebre punctatus, squamulis cinereis irroratus, in medio & ad latera in lineas tres obtusatas condensatis; in medio baseos foveola impressa, vix in canaliculam continuata. Scutellum minutum nigrum, oblongum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris valde prominulis, carinatis, thorace fere triplo longiora, posterius attenuata. supra parum convexa, nigra, opaca, tenue striata, striae vix punctatis, interstitiis planis, crebre subtiliter granulato-coriaceis, squamulis cinereo-albidis hinc inde adspersis; ante medium suturæ macula communis ob cordata, albo-squamosa; ante apicem linea suturalis longior; juxta illam alia brevis, obsoleta, & demum tertia utrinque, extrotum arcuata, lunata, omnes cinereo albidæ; in medio lateralí macula magna, transversa, nivio-squamosa, e tribus coalita, media minori. Corpus sub-tus nigrum, punctulatum, pectore dense, abdomine parcus albo-squamosis. Pedes elongati, cinerei-pubescentes, femoribus clavatis, nigris, dente mediocri armatis; tibiis tarvisque ferrugineis.

129. R. litura: niger, sub-depresso, squamis niveis supra variegato-maculatus, subitus omnino tectus; thorace bi-tuberculo, canaliculato; femoribus acute dentatis,  
Fabr. Eleut. 2. 484. 217.

*Circulio litura.* Payk. fn. 3. 210. 27. Herb. Col. 6. 473. 483.

ur.  
Cris

*Curculio cruciger*, var. *Herbst. Col. 8. 395.*

Habitat in Carduis; allisque, plantis, minus frequens.

Deser. Rh. trimaculato quoad signaturas similis sed triplo minor, thorax tuberculatus, elytra pallido longiora, minus attenuata. Caput rotundatum, retractum, nigrum, crebre punctulatum, dense albido, squamosum, oculis parvis, brunneis; rostrum capite cum thorace longius, valde arcuatim, nigrum, crebre punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, ferruginea, seu rufo piceæ. Thorax antice coarctatus ibique transversim profunde impressus, magine elevato, reflexo; postice sub sinuatus, supra fere planus, niger, crebre punctulatus, obsolete canaliculatus, subtus & lateribns dense albo-squamosus, plaga dorsali, antrosum angustata, magis denuo data, nigra, lieua albo-squamosa medio interrupta; versus latera utrinque tuberculum parvum, denudatum, nigrum. Scutellum minutum, nigrum, immersum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, & illo triplo longiora, posterius parum attenuata, supra sub-depressa, nigra, tenui striata, striis obsolete punctulatis, interstitiis subtiliter coriacieis; in basi futuræ linea lata, elongata, albo-squamosa, cum macula adnexa, & saepe præterea puncto libero utrinque ejusdem coloris; limbus totus lateralis & apicalis albo-squamosus, cum macula cruciformi denudata nigra utrinque ante apicem; ante medium utrinque fascia albo-squamosa, abbreviata, margini contigua. Corpus subtus nigrum, punctulatum, squamulis albis omnino tectum. Pedes mediocres, nigri, albido-squamulosi, tarsis fusco-ferrugineis, femoribus acute dentatis, ante apicem anhæno albo-squamoso cinctis.

Varist linea baseos futuræ squamulis cineris, brunneis testa,

rius angustiora, supra convexa; nigra, sed profunde striata, striis latis, crenato-punctatis, interstitiis planis, subtiliter granulato. coriaceis, squamu lis minuta tufcis aliisque albidis intermixta, obducta; suturæ basis & apex, ut & macula transversa, comparsa, in singuli elytri medio lateral i albida, e squamis condensatis; signaturæ istæ tamen facile determinantur. Corpus subfuscum nigrum, punctulatum, dense albido squamosum. Pedes cinereo squamosi, femoribus clavatis, dente parvo armatis, plurimque nigris, interdum tamen ferrugineis; tibiæ & tarsi semper ferruginei.

132. R. pollinatus: niger, sub-depressus, supra brunneo-cinereoque, subtus albido-squamosus; antennis tarsisque ferrugineis; rostro elongato, atro, arcuato, thorace canaliculato, bi-tuberculato.

*Curculio pollinarius.* Forst. Cent. N:o 33.

*Curtulio dentatus.* Marsh. Ent. Br. I. 286.  
125.

*Rhynchænus Raphani.* Fabr. Eleut. 2. 485. 221?

Habitat in Scania ad Bælteberga, rarius, Dom. Wetterhall.

Descr. Statura deppressa Rh. Bortuginis, sed magis rotundatus & plus duplo major, Rh. marginato majori æqualis. Caput parvum, angustum, nigrum, sat cerebre punctatum, squamu lis piliformibus, depressis, cinereo-albidis, adpersum, vertice sub-carinato, fronte inter oculos depresso; oculi magni, globosi, brunnei, circum circa sibò ciliati; rostrum capite cum thorace fere longius, valde arcuatum atrum, sub nitidum,

tidum, cibebit granulato-punctatum. Antennæ rotstro cum capite fere longiores, tenues, ferrugineæ, pubescentes; articulo primo apice elevato, piceo. Thorax antice valde coarctatus, & intra apicem transversim impressus, margine elevato; basi truncatus, cum angulo producto, obtuso, in medio; supra depresso, fere planus, in medio sat profunde canaliculatus, margine postico elevato; totus niger, crebre granulato-punctatus; supra squamulis ratiorebus cinereis, subtrus & lateribus densioribus, albidis adspersus; in utroque latere, paullò pone medium, tuberculum magnum, elevatum, acuminatum. Scutellum vix uthum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, & illo plus duplo longiora, apice singulatim obtuse rotundata, anæm non tegentia, supra depresso, obsoletiss striata, striis vix crenulatis, interstitiis creberrime rugoso-coriaceis; tota nigra, squamulis cinereis, hinc inde in maculas obsoletas condensatis, aliisque interjectis fusco-brunneis, submicantibus, nebulosis; ante apicem cuiusvis elytri arcus e tuberculis elevatis, & pone illum macula, densius & albidius squamosa, fere in ipso apice. Corpus subtus nigrem, obsoleto punctatum, dense albidio-squamosum. Pedes elongati, nigri, albido-squamosi, femoribus clavatis, omnibus dente valido, acute armatis, tibiarum ipso apice, tarsisque totis rufo-ferruginiis.

133. R. *Borraginii*: niger, sub-depresso, subtus cinereo-squamulosus, tarsis rufis, thorace canaliculato, bi-tuberculato, elytris cinereo-rigoratis, futuræ basi albidae.

*Fabr. Eleut.* 2. 483. 218.

*Circulio Borraginii*. *Payk. fn. 3. add.* 457  
30 - 31.

*Curculio quadridens.* Panz. fn. 36. f. 13. Crit. Rev. I. 128.

*Curculio Quercicola.* Marsh. Ent. Br. I. 280. 126.

Habitat in plantis oleraceis, Raphano, bras-  
fica, aliisque, paßim.

Descr. Statura depressa Rh. assimilis, sed plerumque paulo major. Caput rotundatum, retractum, nigrum, opacum, crebre punctulatum, dense cinereo-squamulosum; oculi brunnei, sub-depressi; rostrum capite cum thorace longius, inflexum, arcuatum, nigrum, punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, fusco-ferrugineæ. Thorax antice coarctatus, transversim late & profunde impressus, margine elevatus, reflexo; postice bi-sinuatus, supra depresso, in medio sat profunde canaliculatus, utrinque tuberculo valido, obtuso, armatus, totus niger, opacus, crebre punctatus, supra squamulis pilisque cinereis parcus adspersus; subtus & lateribus squamis densis cinereo-albido tectus; Scutellum parvum, nigrum, demersum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris carinato prominulis, thorace plus duplo longiora, supra parum convexa, nigra, opaca, tenui striata, striis sub-simplicibus, interstitiis subtiliter rugulosis; tota squamulis cinereis variegata; ad basin suturæ macula cinereo-albida, evidenter, squamulosa; ante apicem singuli elytri callus elevatus, tuberculis pluribus exasperatus. Corpus subtus nigrum, punctulatum, squamulis cinereo-albidis tectum. Pedes nigri, cinereo-pubescentes, tarsis rufo-ferrugineis, femoribus parum clavatis, dente parvo armatis.

134. R. *Sulcicollis*: niger, sub-convexus,  
subtus cinereo-squamulosus, thorace ca-  
nalicula-

naliculato, bi-tuberculato, elytris leviter striatis, pectore utrinque puncto dense albo-squamoso.

*Curculio sulcicollis.* Payk. Fn. 13. 217. 34.

*Curculio pleurostigma.* Marsh. Ent. Br. 1. 282. 131.

Var. b, corpore supra densius cinereo-squamuloso.

*Curculio affinis.* Panz. fn. 57. f. 15. Crit. Rev. I. 126.

Habitat in plantis paucim.

Descr. Rh. affinili, antea sub N:o 63 descripto, ut ibi dictum, statura & magnitudine simillimus, nisquie affinis, sed differt: corpore paullo magis convexo, femoribus crassioribus, dente parvo armatis, &c. Caput rotundatum, nigrum, crebre punctulatum, parum pubescens, vertice sub-carinato; oculi parvi brunnei; rostrum capite cum thorace longius, tenuer, valde arcuatum, nigrum, nitidum, basi punctulato-striatum. Antennae rostro cum capite longiores, tenues, nigræ, clava oblonga, fusco-pubescente. Thorax antice coarctatus, juxta apicem late & profunde transversim impressus, margine elevato, reflexo; basi bi-sinuatus, supra disco convexus, in medio sat profundè eanaliculatus, lateribus utrinque tuberculo parvo armatus, totus niger, crebre & sat profunde punctatus, subtus & lateribus squamu-lis cinereo albidis parce adspersus, supra sere glaber, pilis tantum paucis minutissimis. Scutellum miou-tum, demersum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, & illo plus duplo longiora, posterius angustata, supra modice convexa, nigra, tenuis striata, striis levibus, interstitiis planis, subti-

liter rugulosis, pilis minutissimis cinereis, depresso, parce adspersa. Corpus subtus nigrum, punctatum, pectore densius, ventre parcus, cinereo albido squamosis; lamina pectoralis, inter thoracis & elytrorum basi utrinque ascendens, apice dense albo-squamosa, punctum album referens. Pedes longitisculi, nigri, femoribus crassiusculis; dente parvo, obtuso, albo piloso, armatis.

Var. b, supra, praesertim in elytris, squamulis parvis, cinereis, densioribus, adspersa, unde color magis plumbeus, ut in Rh. assimili; sed notæ effigiales ut in a, omnino.

Obs. Varietatem, elytris nigro-aeneis, a Dom. Paykull, loc. cit. memoratam, non vidi.

135. R. Quercicola: niger, opacus, subtus cinereo-squamulosus, thorace depresso, bituberculato, basi canaliculato; elytris cinereo-variegatis, futuræ basi alba.

Fahr. Eleg. p. 451. 66.

Curculio Quercicola. Payk. fn. 3. 215. 33.

Herbst. Col. 6. 403. 383. Tab. 91. f. 13.

Habitat in Queroetis passim, minus frequens.

Descr. Parvus, Rh. Erysimi vix major. Caput retractum, nigrum, opacum, cibere punctulatum, squamulis cinereis, nitidis, adpersum, oculis brunneis, sub-prominulis; rostrum longitudine capitis cum thorace, valde arcuatum; nigrum, subtilissime punctulatum, apice laxe, nitidum. Antennæ rostro cum capite longiores, nigrae, clava oblonga, acuminate. Thorax antice valde coarctatus, juxta apicem minus

minus late & profunde transversim impressus, marginē elevato; reflexo; basi truncatus, supra depresso, in medio basēos profunde cinaliculatus, versus latera utrinque tuberculo parvo armatus, totus niger, crebre subtiliter punctulatus. supra squamulis minutis, purpurascenti metallicis, subtus cinereo-albidis densioribus obdustus. Scutellum vix ultum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominentia, & illo plus duplo longiora, apice angustatim rotundata, abdomine breviora, supra modice convexa, nigra, opaci. tenuē striata, striis sub-punctatis, interstitiis subtilissime coriaceis. squamu is parvis fuscis & cinereo albidis mixtis, absque ordine variegata; suturæ basis, fere ad medium, late albo squamosa. Corpus subtus nigrum, punctulatum, dense cinereo-squamosum. Pedes longiusculi, nigri, pilis cinereis variegati, femoribus dente parvo, in anticis sœpe obfoleto, armatis.

136. R. rugulosus: nigro-piceus, subtus cinereo-squamosus, tibiis tarfisque ferrugineis, thorace depresso; bi-tuberculato elytrisque cinereo-lineatis, macula media suturali oblonga, atra.

*Curculio rugulosus.* Herbst. Col. 6, 406. 380.  
Tab. 91, f. 16.

*Curculio Quercicola* var. Payk. fn. 3. 216. b.

*Curculio melanostictus.* Marth. Ent. Br. I. 282.  
132.

*Curculio uni-guttatus.* Marth. Ent. Br. I. 283.  
135. forte idem.

Var. b, fuscō-ferrugineus, elytris pedibusque dilutius testaceis.

Var. d, Paullo minor, thorace lineis tribus, elytris lituris variis albo-squamosis.

Habitat in pratis aridis, ad agrorum margines, passim; var. d, in Sino-landia, rarius, Dom. Liungh; in Westrogothie avis, ipse.

Deser. Parvus, praecedenti fere æqualis, Rh. diymo dimidio minor. Caput rotundatum, fusco-brunneum, crebre & profunde punctatum, cinereo-squamulosum, oculis nigro brunneis, parum prominulis; rostrum capite cum thorace multo longius, valde arcuatum, aut piceum, aut dilutius rufo-brunneum, sat profunde striato-punctatum, apice lœve. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, totæ quæ testaceæ. Thorax anterius angustatus, non vero abrupte coarctatus, ut in prioribus, ante apicem sat profunde transversim impressus, margine elevato, reflexo, in medio emarginato; basi sub-truncatus, supra modice convexus, in medio obsolete cahaliculatus, rufo-brunneus, crebre & profunde reticulato-punctatus, margine postico angusto elevato, nigropiceo; in medio linea lata cinereo-squamosa, & versus latera utrinque alia, obliqua, obsoletior; subtus plerumque saturatius fusco-brunneus, densius cinereo squamosus. Scutellum minutum, punctiforme, fuscum. Elytra thoracis basi latiora, bumeris prominulis, & illo plus duplo longiora, anum tegentia, supra modice convexa, brunnea, seu rufo ferruginea, ipsa basi & sutura obscurioribus, fuscis seu piceis; punctato striata, punctis profundis, remotis, interstitiis convexis, levibus; in singulo interstitio series regularis e squamulis parvis, erectis, albidis, & ante apicem callius elevatus, tucerculato-muricatus. Corpus subtus aut piceum, aut dilutius rufo-brunneum, pectore densius, ventre parcus albido-squamosus, Pedes

Pedes breviusculi, validi, pallide rufo testacei, femoribus evidenter dentatis.

Var. b., differt tantum corpore supra glabro, squamu's forte detritis; ad latera thoracis & versus postica elytrorum, squamulæ plerumque tenacijs adhaerent.

Var. c; pallidior; rostrum rufo-brunneum; caput, thorax & corpus rufo testacea; elytra, antennæ & pedes pallida; forte nuper exclusa.

Var. d, primo aspectu magis differt, plerumque dimidio minor; lineæ thoracis albo, vel fere niveo-squamosæ; elytra lituris variis albo-squamosis nota-ta, versus posticâ squamulis erectis, albis, seriatis, adpersa; cætera quoad minimum punctum, ut in a, omnino, ut vix Specie distingui queat.

138. R. globulus: niger, sub-opacus, linea futurali pectorisque lateribus albido-squamosis, elytris globosis, profunde sulcatis punctatisque, intersticiis angustis, crenatis.

*Curelio globulus.* Herbst. col. 6. 398. 376. tab. 91. f. 7.

Habitat in surculis Populi tremulae, locis umbrosis, Sylvaticis, in Westrogothia rarius lectus.

Descr. Rh. Troglodyta var. d, fere minor, elytra breviora, sed multo latiora, rostrum crassum, &c. Caput rotundatum, retractum, nigrum, opacum, obsolete punctatum, squamulis albidis, piliformibus, adpersum, oculis globosis nigris; rostrum longitudo fere capitis cum thorace crassiusculum, vaide arcuatum, nigrum, creberissime rugoso-punctatum,

Antennæ

tibis parvis, clava ovata, tri-articulata. Thorax parvus, antice multo angustior, basi bisinuatus, supra modice convexus, saturate rufo-testaceus, adspersus pube pallida, depressa, immixtis pilis erectis, obscuris; in dorso obsoleto canaliculatus, subtus in medio nigro-fuscus. Scutellum parvum, rotundatum, albidu pubescens. Elytra magna, thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, apice obtuse rotundata, supra parum convexa, ante apicem arcuatim impressa, rufo-testacea, regulariter punctato-striata; in dorso antico area magia, triangularis, communis, ab humero ultra medium suturæ extensa, dense pallido-pubescentia, qualis pubescentia etiam margines & apicem cingit, relicta plaga posteriori cuiusvis elytri magis denudata; saturatius ferruginea. Pectus nigrum, obsoleto punctulatum, parce pubescens; abdomen aut totum pallidus testaceum, aut segmentis 2 & 3 anticus nigricantibus. Pedes toti pallide testacei, femoribus quatuor anterioribus spinulae parvae acuta, in medio armatis; posticis maximis, subtus angustatis, a medio ad apicem canaliculatis, forie duplice e spinulis 6 vel 7 acutis notatis.

Obs. Curc. Quercus Cl. Linnæi, loc. cit. potius  
huc pertinere mihi videtur, quam ad Rh. Quercus  
fabricii, nam in illo fasciae elytrorum transversales,  
minime triangulum formantes; Cl. Dqm. Kirby et-  
iam nostrum ut C. Quercus Linnæi, secundum ejus  
museum, mihi communicavit.

140. R. Alni: niger, pubescens, thorace;  
elytris, anno tarsisque rufo-testaceis; ely-  
tris maculis quatuor nigris; femoribus po-  
sticis maximis, ferrato-ciliatis.

Fabr. Elect. s. 492, 256.

*Cur-*

*Circulio Alni. Linti. Synt. 2. 611. 42. Fn. Sv.  
608. Herbst. Col. 6. 425. 441. Tab. 93. t. 7.  
De Gér Inf. 5. 262. 49. Payk. Fn. 3. 220:  
39. Thunb. Act. Uppl. 5. 95. 14.*

Var. b., Testaceus; capite, pectore femoribusque nigric, elytrorum maculis fuscis, obsoletis. Payk. l. c. var. b.

Habitat in foliis Alni, minus frequens;

Defcr. Statuta & affinitas præcedentis, sed di-  
midio fere minor, colore & femoribus tenuius ar-  
matis, distinctus. Caput parvum, deflexum, nigrum, pu-  
bescens, oculis nigris, in fronte approximatis; rostrum  
ut in præcedenti, sed nigrum. Antennæ rufa testa-  
ceæ, basi obscurioræ, strucitura ut in priori. Thorax  
parvus, antice angustior, basi bi sinnatus, supra mo-  
dice convexus, rufo-testaceus, pubescens, subitus in-  
ter pedes nigro-fuscus; in medio dorsi interdum ma-  
culla transversa fuscæ. Scutellum parvum, rotun-  
datum, nigrum. Elytra magna, thoracis basi di-  
midio latiora, & illo quintuplo longiora, antice obtuse  
se rotundata, supra modice convexa, rufo-testacea, sat  
profunde punctato-striata, pubescentia; in medio ba-  
ses cuiusvis elytri macula oblonga, angusta, nigra  
& in media disci, versus suturam, alia, magna, ro-  
tundata; saepe cum opposita confluenta. Pectus  
& abdomen nigra, punctata, pubescentia, ani margi-  
ne testaceo. Pedes validi, nigri, tarvis testaceis; fe-  
mora postica maxima, subitus angulata, dente medio,  
& pone illum ferre e ciliis rigidis, armata.

Var. b., colore dilutioni tinctum differt; forte  
super exclusa; Caput & rostrum nigra; thorax &  
elytra pallide testacea, maculis elytrorum fuscis ob-  
soletis;

soletis; Pectus fuso-piceum; abdomen testaceum, basi fuscescens. Pedes fusco-testacei, femoribus interdum obscurioribus.

241. *R. scutellaris*: oblongus, rufo-ferrugineus, oculis, rostri apice, pectore ab domineque nigris; scutello albido-piloso, femoribus posticis magnis unidentatis.

*Fabr. Eleut.* 2. 495. 268.

*Curculio rufus.* *Schranch. Austr.* 116. 220.  
*Marth. Ent. Br.* 1. 261. 69.

*Curculio Alni var.* *Payk. fn.* 3. 221. 39. c.

Var. b, rostro, thorace, elytris pedibusque pallidis.

Habitat in foliis alni paissim, non infre quens.

Descr. Præcedentibus affinis, sed angustior, rostro tenuior, elytris profundius striatis, scutello albido, ab domine toto nigro, femoribusque posticis tantum unidentatis, distinctus. Caput parvum, rufo-ferrugineum, punctatum, pubescens, oculis nigris, in fronte magis remotis quam in prioribus; rostrum longitudine thoracis, inflexum, arcuatum, minus crassum, rufum, nitidum, parum punctularum, apice fuso piceum. Antennæ totæ rufo-ferrugineæ, struetura ut in prioribus. Thorax parvus, rotice angustior, & pone apicem transversim impressus, basi bisinuatus, supra modice convexus, in medio canaliculatus, totus rufo ferrugineus, rugoso-punctatus, pubescens; subtus inter pedes nigro fuscus. Scutellum mediocre, rotundatum, fuscum, pube densa cinereo-albida nitente tectum, Elytra magna, thorasis basi

vix

*Rhyachenus.*

141

vix dimidio latiora, sed illo quintuplo longiora, apice obtuse rotundata, supra modice convexa, saturate rufo-ferruginea, profunde crenato striata, interstiiis convexis, sub-rugosis; pube rigida, depressa, pallida, inaequaliter adspersa, unde variegata apparent. Pectus & abdomen nigra, immaculata, obsoleta rugoso-punctata, tenui pubescens. Pedes validi, saturate rufo ferruginei, pubescentes, femoribus anterioribus muticis, posticis magnis, subtus angustatis, dente unico parvo medio armatis.

Var. b, differt tantum colore pallido vel flavescente; forte nuper exclusa.

Obs. In Musæo Cœlœb. Dom. Sehestedt & Lund, hanc speciem ut genuinum Rh. scutellarem Fabricii vidi; eandem etiam ex Anglia, a Dom. Kirby, ut C. rufum Marshami, obtinui.

142. R. Ilicis: oblongo-ovatus, niger, pubescentia albida variegatus, antennis tarsisque testaceis, femoribus posticis magnis, ferrato-dentatis.

Fabr. Eleut. 2. 494. 266.

Curculio Ilicis. Payk. Fn. 3. 218. 37. Herbft. Col. 6. 431. 420.

Curculio pilosus. Herbft. Col. 6. 426. 412. tab. 93. f. 8. Marsh. Ent. Br. 1. 262. 72.

Curatio Saltator Segetis. De Gér. Ins. 5. 264. 50.

Habitat in Quercus Roboris fo'lis, passim.

Descr. Statura Rh. Viminalis, sed dimidio minor & ultra, Caput parvum, nigrum, punctatum, pubes-

Ins. Svec. T. I, P. III,

Q

*Rhynchænus Fragariae.* Fabr. Eleut. 2. 495.  
271. ? an idem?

*Curculio Fragariae.* Payk. fn. 3. 217. 35. Herbst.  
col. 6. 423. 467. Tab. 93 f. 3.

*Curculio Rhododaffylus.* Marsh. Ent. Br. 1.  
262. 74.

Habitat in foliis Fagi Sylvaticæ, in Svecia  
australi, non infrequens.

Deser. Præcedenti quidem similis, sed minor,  
angustior, & vere distinctus. Caput parvum, nigrum,  
creberrime punctulatum, oculis concoloribus, in  
fronte fere coeuntibus; rostrum longitudine thora-  
cis, arcuatum, nigrum, magis nitidum, rugoso-pun-  
ctatum. Antenæ totæ pallide testaceæ, structura ut  
in prioribus. Thorax brevis, antice angustior &  
pone apicem transversim impressus, lateribus rotun-  
datus, basi sub-triangularis, supra modice convexus,  
obsoletè canaliculatus, totus niger creberrime pun-  
ctatus, pube tenuissima fusca adspersus. Scutellum  
parvum, rotundatum, nigrum. Elytra thoracis basi  
vix dimidio latiora, sed sextuplo longiora, supra mo-  
dice convexa, nigra, regulariter, sed tenuè punctato-  
striata, intersticiis planis, sub-lævibus, pube tenuissi-  
ma fusca, interdum obscure virecente, parce adspersa.  
Corpus subtus nigrum, obsoletè punctulatum,  
tenuè pubescens. Pedes validi, nigri, tarsis pallide  
testaceis; femora quatuor anteriora subtus spinula  
parva, recta, in medio; postica magna, crassa, subtus  
angulata, spina paullo validiori, & ciliis nonnullis  
seriatim, armata.

Obs. Curculio Fagi Linn. It. Scan. certe idem  
ac nofer, sed errore quodam in Fauna Svecica &  
Systemate, Apion flavipes loco ejus descriptum fuisse  
videtur; Rh, Fagi Fabr. Eleut. 2, 495. 270, e scri-  
ptis

ptis Linnaei translatus, etiam idem; utrum Rh. Calcar Fabr. vel Rh. Fragariae, S. El. 2. 495. 271. huc pertinet, ex descriptionibus incompletis vix dijudicandum.

### Sect. 2:da Femoribus muticis.

245. R. Salicis: ovatus, niger, scutello, fasciisque dupabus eystrotum undato-flexuosis albidio-pilosus, thorace parvo, angusto, basi sub-truncato.

*Fabr. Eleut. 2. 494. 264.*

*Circulio Salicis.* Linn. *Syst. 2. 6ii. 43.* *In:*  
Sv. 610. *De Geer Ins. 5. 264. 51.* *Herbst.*  
*Col. 6. 422. 406.* *Tab. 93. f. 2.* *Payk. fn. 3.*  
*269. 91.* *Marth. Ent. Br. 1. 264. 79.*

*Circulio scrutator.* *Herbst. Col. 6. 191. 152.*  
*Tab. 73. f. 4.* *idem. vid. Tom. 7 p. 4.*

Habitat in Salicibus, Populo, frequens.

Descr. Parvus, depresso-saturate niger. Caput parvum, nigrum, profunde & crebre punctatum, oculis brunneis, in fronte approximatis; rostrum longitudine thoracis, crassiusculum, arcuatum, atrum, rugoso-punctatum. Antennæ rufo-piceæ, clava nigro-fusca, structura ut in prioribus. Thorax parvus, antice valde angustatus, basi sub-truncatus, vix sinuatus, supra sub-depresso, totus niger, opacus, cerebrime rugoso-punctatus, lines dorsali angusta, griseo-pilosa. Scutellum parvum, rotundatum, dense niveo-pubescentia. Elytra thorace plus quam dimidiatione & quintuplo longiora, supra sub depresso, vel perparum convexa, saturate nigra, sub-nitida, profunde striata, & in striis crenato-punctata, interstitiis

tris longe allo. Caput parvum, nigrum, opacum, punctulatum pubescens, oculis nigro-brunneis, in fronte coeuntibus; rostrum longitudine thoracis, arcuatum, nigrum, nitidum, sub-læve. Antennæ totæ pallide testaceæ, structa ut in prioribus Thorax brevis, transversus, antice angustior, basi evidenter bi-sinuatus, supra modice convexus, niger sub-nitidus, profunde punctatus, pube griseo-albida, depresso, maculatim adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, opacum. Elytra antice thoracis basi parum latiora, humeris rotundatis, versus medium dilatata, thorace quintuplo longiora, supra parum convexa, nigra, sub-nitida, sat profunde punctato-striata, interstitiis sub-convexis, lævibus; in ipsa futura, pone scutellum, stria elongata dense albido-pubescentia; versus medium fascia macularis, nonnihil arcuata, & paulo pone medium altera, brevior, fere recta, etiam e pilis albidis, interdum sub-flavescens. Corpus sub-us nigrum, sub-nitidum, punctulatum, tenue pubescens. Pedes validi, nigri, tarsis foliis pallide testaceis; semora postica fatis crassa, mucronata.

Obs. Synonymon Herbstii minus certum, quum colore antennarum & tarsuum pallidum, non memorat.

148. R. Jota: oblongo-ovatus, convexus, niger, scutello niveo piloso, rostro longitudine thoracis, elytris profunde crenato-striatis, interstitiis rugosis, oculis coadunatis.

Fabr. Eleut. z. 495. 269.

Curculio Jota. Payk. fn. 3. 271. 93. Herbst. Col. 6, 432, 421.

Habi-

**Habitat in foliis Salicis, Betulæ, Alni, & sat frequens.**

Descr. Rh. Scutellarii paullo minor, convexior, variat etiam duplo minor & ultra. Caput parvum, nigrum, opacum, punctulatum, oculis nigro-brunneis, in utroque sexu conniventibus; rostrum arcuatum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, maris capite cum thorace brevius, feminæ illis longius. Antennæ nigrae clava griseo-pubescente, structura fere ut in prioribus, sed articulus secundus crassior, ovatus, sit ob conicus. Thorax anterius valde angustatus, basi sub-truncatus, supra modice convexus, niger, sub opacus, creberrime rugoso-punctatus, pube subtilissima, cinerea, præsertim subtus & lateribus, adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, pube densa alba vestitum. Elytra magna, thoracis basi dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, ante medium transversim impressa, tota nigra, parum nitida, profunde punctato striata, interstitiis convexis, transversim sub-rugosis. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, crebre punctatum, tenue cinereo-pubescentes. Pedes mediares, toti nigri, cinereo-pubescentes, femoribus posticis parum incrassatis.

Obs. Dom. Fabricius erroneæ futuræ basin albam dicit, nam scutellum solum pilositate alba vestitum.

149. R. Populi: oblongo-ovatus, niger, antennis pedibusque pallide testaceis, femoribus posticis fascia nigra, pectore albido-pubescente.

*Natr. Elent.* 2. 495. 272.

Q5

*Care*

*Curculio Populi.* *Herbst.* col. 6. 423. 408. tab. 93. f. 4. *Payk.* fn. 3. 268. 90. *Panz.* fn. 18. f. 17.

Habitat in soliis Salicis Pentandræ, Populi, passim.

Descr. Statura oblonga praecedentis, sed majoribus ejus duplo minor, Rh. Fagi fere æqualis. Caput parvum, nigrum, sub-opacum, crebre punctulatum, oculis nigro-brunneis, in fronte conniventibus; rostrum vix longitudine thoracis, crassiusculum, nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ pallide testaceæ, structura, ut in Rh. viminali, clava paulo abscuriore. Thorax brevis, transversus, anterius angustior, lateribus rotundatus, basi sub-truncatus, supra in medio transversim convexus, versus apicem & basi depresso, totus niger, subtiliter crebre rugulo-punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, in illæsis individuis albido pubescens. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, supra sub-depressa, nigra, sub nitida, profunde crenata striata, interstitiis planis, tenue rugulosis. Pectus nigrum, punctatum, pube densa albida omnino tectum; abdomen nigro-piceum, punctatum, parum pubescens. Pedes mediocres, pallide testacei, femoribus posticis parum incrassatis, ante apicem annulo nigro cinctis.

250. R. Saliceti: oblongo-ovatus, niger, sub-pubescent, antennarum basi tibiisque testaceis, elytris convexis, profunde punctato-striatis, pectore albido-pubescente.

*Fabr. Eleut.* 2. 493. 262.

*Curculio Saliceti.* *Payk.* fn. 3. 271. 94. *Herbst.* col. 6. 430. 418. Var.

Var. b, femoribus anterioribus obscure testaceis.

Habitat in Salicis Cinereæ floribus, tempore vernali, passim.

Descr. Statura oblonga praecedentis, sed quadruplo minor, seqventi æqualis, & bene distinctus. Caput parvum, nigrum, opacum, subtiliter punctulatum, tenue pubescens, oculis nigro-brunneis, in fronte connexis; rostrum capite cum thorace brevius, valde arcuatum, depresso, nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ testaceæ, structura ut in prioribus, clava nigro-fusca. Thorax antice paulo angustior, lateribus rotundatus, basi sub-truncatus, supra in medio transversim convexus, versus basi & apicem depresso, totus niger sub-opacus, crebre punctulatus, tenue pubescens. Scutellum parvum rotundatum, albido-pubescentia. Elytra ovata, antice thoracis basi vix dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra modice convexa, nigra, sub-opaca, profunde punctato-striata, pube tenuissima cinerea adspersa: Pectus nigrum, pube densa cinereo-albida omnino testum; abdomen nigrum, sub-nitidum, subtiliter punctulatum, parum pubescens. Pedes mediocres, femoribus nigris, posticis modice incrassatis, tibiis pallide testaceis, tarsis paulo obscurioribus.

Var. b, differt tantum femoribus quatuor anterioribus dilutioribus, fusco testaceis.

151. *R. pulicarius*: oblongo-ovatus, niger, sub-nitidus, antennis basi testaceis, thorace antice angustato, rostro inflexo, petori applicato.

*Curculio pulicarius*. *Herbst. Col.* 6. 429. 416.

*Tab. 93. f. 12. Payk. fn. 3. 272. 95.*

*Curc.*

*Curculio Oxyacanthæ. Marsh. Ent. Br. 1. 263.*

77.

**Habitat in Betulæ albæ foliis, sat frequens,  
celerrime Saliens.**

Descr. Minimus forte in hoc genere, praecedenti adhuc fere minor, Latridio gibbosæ æquivalis, thorace antrosum valde angustato, rostro inflato, & colore distinctus. Caput minutum, angustum, nigrum, subtilissime punctulatum, oculis concoloribus, in fronte conniventibus; rostrum vix longitudine thoracis, arcuatum, depresso, nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum, semper pectori tam æcte applicatum, ut vix Rhynchænus esse videtur, sed potius pro altica habendus, nisi probe inspicatur. Antennæ paleide testacea, clava nigra, acuminata. Thorax antrosum valde angustatus, pone apicem transversim impressus, basi sub truncatus, supra parum convexus, obsoletè canaliculatus, totus niger, sub nitidus, subtiliter punctulatus. Scutellum minutum, nigrum, rotundatum. Elytra antice thoracis basi parum latiora, posterius dilatata, thorace quincuplo longiora, supra modice convexa, nigra, nitida, regulariter punctato-striata, interstitiis planis lœvibus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes toti nigri, femoribus posticis longis & crassis,

452. *R. plantaris*: ovatus, niger, convexus; antennis basi testacea, scutello pectorisque lateribus albidis, rostro brevi, crasso; oculis remotis.

*Curculio plantaris. Næzin Att. Holm, 1794. 4.  
270. 5.*

**Habi-**

Habitat in Betu'æ & Alni foliis, sat frequens; tarde saliens.

Descr. Rh. Jota similis, sed minimis ejus adhuc duplo minor, præsertim brevior, ovatus, magis convexus; rostrum multo crassius, & oculi distantes. Cacut parvum, nigrum, subtiliter punctulatum, oculis lateribus, depresso, remotis; rostrum crassum, parum arcuatum, nigrum, crebre rugoso punctatum, feminæ vix longitudine thoracis, maris adhuc brevius. Antennæ nigrae, structura ut in prioribus, articulo primo & secundo testaceis. Thorax antice paucilo angustior, basi bi sinuatus, supra convexus, obsolete carinatus, totus niger, crebre & sat profunde punctatus; pilis minutissimis, depresso, parce adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, dense albido-pubescentia. Elytra thoracis basi paulo latiora, humeris elevatis, & illo vix quadruplo longiora, supra valde convexa, tota nigra, subnitida, profunde & late crenato-striata, interstitiis planis, laevibus; pilis similiibus uti thorax, parce adspersa. Corpus subitus nigrum, subnitidum, sat profunde punctatum, pectoris lateribus densius albido-pubescentibus. Pedes mediocres, toti nigri, femoribus posticis perparum crassioribus, tarsis subitus albo-spongiosis.

153 R. sub-fasciatus: ovatus, convexus, niger, albido-irroratus, lineola scutellaris corporeque albido-squamosis, antennarum basi tibialisque testaceis, rostro brevi, crassiusculo.

Var. b, pedibus totis testaceis.

Habitat in Scaniæ frutetis, Dom. *Fallen*, in Smolandia, Dom. *Wetterhall*; raro obvius.

Descr,

Descr. Rh. bifasciato vix major, sed magis rotundus, rostro breviori, crassiori, oculis distantibus, ut & colore a reliquis distinctus. Caput nigrum, punctulatum, squamulis pilisque albidis adpersum, fronte inter oculos impressa; oculi laterales, prominuli, nigri; rostrum capite parum longius, crassum, arcuatum, nigrum, punctulatum, albido pubescens. Antennæ fusco-piceæ, basi dilatius testaceæ, clavata majuscula pubescente. Thorax sub cylindricus, anterius parum angustatus, basi bisinuatus, supra convexus, in medio obsolete canaliculatus, totus niger, crebre & profunde punctatus, subtus densius albido-squamulosus, supra tenue pubescens, linea media, aliaque lateralí utrinque, densius albido-squamofiss. Scutellum minutum, rotundatum, nigrum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris elevatis & illo vix triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra modice convexa, nigra, profunde punctata, striata, interstitiis angustis, sub rugosæ; in basi suturæ lineola communis dense albo-squamolæ, & in disco apiceque lituræ irregulares obsoletæ, e squamulis albidis, rarioribus, facile deterendis. Corpus subtus nigrum, subtiliter punctulatum, dense albido-squamosum. Pedes mediocres, albido-pubescentes, femoribus nigris, sub-clavatis, posticis perparum crassioribus, tibiis testaceis, tarolis fusco ferrugineis;

Var. b, differt tantum pedibus totis testaceis.

Obs. Et si femora postica perparum incrassata, tamen satis alte saltat, teste Dom. Fallén. Species duæ ultimæ a reliquis hujus familiæ Speciebus differunt, rostro breviore, crassiore, oculis remotiis, & femoribus posticis minus crassis, Sectioni 2:æ familiæ primæ affines, familiam ultimam cum præcedentibus conjungunt,

## C A L A N D R A.

*Mandibula lata, fornicata, truncata. Antennæ prope basin rostri insertæ, articulis 2-7, parvis, nodosis, clava truncata, articulo ultimo spongioso. Corpus sub-depressum. Thorax elongatus. Elytra abdomine breviora.*

- x. *C. granaria:* elongata, rufo picea, glabra, thorace profunde punctato, elytrorum longitudine, elytris profunde striatis, striis obsolete punctatis.

Fabr. Eleut. 2. 437. 39.

*Rhyncophorus granarius.* Herbst. vol. 6. 14. 8.  
Tab. 60. f. 7.

*Curculio granarius.* Linn. Syst. 2. 608. 16. Fn.  
Sv. 587. De Géer Ins. 5. 239. 25. Payk. fn.  
3. 245. 64. Panz. fn. 17. f. 11.

Habitat in frumento diutius asservato, valde noxius; apud nos tamen adhuc non frequens.

Descr. Magnitudo fere Cossoni chloropi, totus rufo-piceus, interdum dilutus ferrugineus. Caput parvum, piceum, sub laxe, oculis lateralibus, valde depresso; rostrum tenue, sub-rectum, rufo-piceum, sub-laxe; thorace brevius. Antennæ prope basin rostri, sub tuberculo laterali insertæ, crassissimæ, rufo-piceæ, rostro cum capite vix longiores. Thorax magnus, valde elongatus, anterius paulo angustior, basi truncatus, ibique elytris fere latior, supra sub-depressus, rufo-piceus, punctis magnis, oblongis, sat crebre perforatus. Scutellum minutum, depresso, rotundatum, piceum. Elytra thoracis basi angustio-

Deser. Rh. bifasciato vix major, sed magis rotundus, rostro breviori, crassiori, oculis distantibus, ut & colore a reliquis distinctus. Caput nigrum, punctulatum, squamulis pilisque albidis adspersum, fronte inter oculos impressa; oculi laterales, prominuli, nigri; rostrum capite primum longius, crassum, arcuatum, nigrum, punctulatum, albido pubescens. Antennæ fusco-piceæ, basi dilutius testaceæ, clava majuscula pubescente. Thorax sub cylindricus, anterius parum angustatus, basi bisinuatus, supra convexus, in medio obsolete canaliculatus, totus niger, crebre & profunde punctatus, subtus densius albido-squamulosus, supra tenue pubescens, linea media, aliaque lateraliter utrinque, densius albido-squamosus. Scutellum minutum, rotundatum, nigrum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris elevatis & illo vix triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra modice convexa, nigra, profunde punctato striata, intersticiis angustis, sub rugosissimis; in basi suturæ lineola communis dense albo-squamolosa, & in disco apiceque litoræ irregulares obsoletæ, e squamulis albidis, rarioribus, facile deterendis. Corpus subtus nigrum, subtiliter punctulatum, dense albido-squamosum. Pedes mediocres, albido-pubescentes, femoribus nigris, sub-clavatis, posticis perparum crassioribus, tibiis testaceis, tarsis fulco ferrugineis,

Var. b, differt tantum pedibus totis testaceis.

Obs. Et si femora postica perparum incrassata, tamen satis alte saltat, teste Dom. Fallén. Species duæ ultimæ a reliquis hujus familiæ Speciebus differunt, rostro breviore, crassiore, oculis remotis, & femoribus posticis minus crassis, Sectioni 2:æ familiæ primæ affines, familiam ultimam cum praecedentibus conjungunt,

C. A.

*Curculio parallellipipedus.* Herbst. col. 6. 275.

247. var.

Var. b, Aptennis, elytris, abdomine pedibusque dilutius ferrugineis. Payk. loc. cit. var. b.

*Curculio parallellipipedus.* Herbst. Col. 6. 275.

247. Tab. 84. f. 4.

Habitat in Scania & Hallandia, rarissime, Dom. Qvenel; in Westmanniae Salice Frægeli; Dom. Döß. Hall.

Deser. Statura elongata, angusta, Rhynebæni T. albi, sed plerumque dimidio major. Caput porrectum, nigrum, subtilissime punctulatum, vertice laevi; frons inter oculos foveola parva impressa; oculi laterales nigri, parum prominuli; rostrum vix capite duplo longius, arcuatum, basi angustius, extorsum valde dilatatum, nigro-piceum, crebre punctatum. Antennæ rostro cum capite paulo longiores, extra medium rostri insertæ, fuso ferrugineæ, articulo primo longo, clavato; 2-8 brevibus, crassiusculis, coarctatis, nono magno, ovato, ut videtur, in articulatio; in apice pubescente tamen futuræ obsoletæ observantur, ut forte articuli plures adsint, et si parvi, sub retracti. Thorax latitudine multo longior, subquadragulus, juxta apicem coarctatus & transversim impressus, basi truncatus, angulis rotundatis, supra parum convexus, in medio baseos obsolete impressus, totus niger, glaber sub nitidus, sat crebre & profunde punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra thorace vix latiora, sed fere duplo longiora, linearia, supra modice convexa, nigra, subnitida, profunde punctato striata, interstitiis angustis, elevatis

ra, & vix illo longiora, apice rotundata, supra parum convexa, rufo-picea, profunde striata, striis in fundo obsolete punctatis. Corpus subtus rufo-piceum, sat profunde & crebre punctatum. ano dilutiori. Pedes breviusculi, dilutius rufo ferruginei, femoribus articulis pauculo crassioribus, arcuatis.

Obs. Curculio fegetis, Linn. Syst. 2 612, 45: secundum descriptionem in Fn. Sv. n:o 611, forte idem.

### C O S S O N U S.

*Mandibula incurva, acutissima. Antennæ breves, crassiusculæ, pone medium rostri inseritæ, clava solida, oblonga, uni articulata.*

*Corpus elongatum, sub-cylindricum. Elytra anum occultantia. Tibiæ angustæ, non serratæ \*).*

2. *C. linearis:* niger, glaber, antennis pedibusque rufo-piceis, rostro longiori, apice dilatato, thorace postice in medio impresso.

Fabr. Eleut. 4. 496. 1.

*Curculio linearis.* Payk. fn. 3. 242. 60. Panz. fn. 18. f. 7.

*Cur-*

\* Obs. Species nonnullæ, hoc referendæ, rostrum gerunt valde abbreviatum, ut Curc. Chloropus anchorum, & plures exoticæ, ad Hylesinus a Dom. Fabricio relatæ; sed Hylesinus clava antennarum a iter constructa, & tibiæ dilatatae, serratæ, quibus notis facile distinguuntur.

*Cerculio paralellipipedus.* Herbst. col. 6. 275.

247. var.

Var. b, Antennis, elytris, abdomine pedibusque dilutius ferrugineis. Payk. loc. cit.  
var. b.

*Cerculib paralellipipedus.* Herbst. Col. 6. 275.

247. Tab. 84. f. 4.

Habitat in Scania & Hallandia, rarissime,  
Dom. Qvenæl; in Westmanniæ Salice Fra-  
geliæ Dom. Dñs. Hall;

Descr. Statura elongata, angusta, Rhynebæni T.  
albi, sed plerumque dimidio major. Caput porre-  
stum, nigrum, subtilissime punctulatum, vertice laevi;  
frons inter oculos foveola parva impressa; oculi la-  
terales nigri, parum prominuli; rostrum vix capite  
duplo longius, arcuatum, basi angustius, extrorsum  
valde dilatatum, nigro-piceum, crebre punctatum;  
Antennæ rostro cum capite paulo longiores, extra  
medium rostri insertæ, tufo ferrugineaæ, articulo pri-  
mo longo, clavato; 2-8 brevibus, crassiusculis, co-  
arctatis, nono magno, ovato, ut videtur, in articula-  
to; in apice pubescente tamen suturæ obsoletæ ob-  
servantur. ut forte articuli plures ad sunt, et si parvi,  
sunt retracti. Thorax latitudine multo longior, sub-  
quadragulus, juxta apicem coarctatus & transversim  
impressus, basi truncatus, angulis rotundatis, supra  
parum convexus, in medio bases obsolete impres-  
sus, totus niger, glaber sub nitidus, sat crebre & pro-  
funde punctatus. Scutellum parvum, rotundatum,  
nigrum. Elytra thorace vix latiora, sed fere duplo  
longiora, linearia, supra modice convexa, nigra, sub-  
nitida, profunde punctato striata, intersticiis angustis,

elevatis

elevatis, lăvibus. Corpus subtus nigrum, crebre, et  
videnter punctatum. Pedes breviusculi, tenues, rufo-  
picei, femoribus anticis paullo crassioribus,

Var. b, colore dilutiori tantum differt, forte ju-  
nior.

2. *C. lignarius*: nigro-piceus, glaber, an-  
tennis pedibusque dilutoribus, thorace  
subtiliter punctulato, rostro capite longio-  
ri, cylindrico.

*Curculio lignarius.* Marsh. Ent. Br. i. 275. n. 3.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,  
præsertim Populi, in Westrogothia plu-  
ries lectus.

Descr. Magnitudo & facies C. Chloropi, sed ab-  
unde distinctus, rostro multo longiori & tenuiori,  
antennis longioribus, &c. Caput porrectum, nigro-  
piceum, nitidum, subtilissime punctulatum, oculis la-  
teralibus parvis, depresso, nigris; rostrum capite  
duplo longius, cæsiutulum, cylindricum, parum ar-  
euatum, piceum, nigrum, subtiliter punctulatum.  
Antennæ extra medium rotstri, in foveola obliqua in-  
seritæ, rostro cum capite multo longiores, dilutius  
rufo-ferrugineæ, clava ovata, adhuc pallidiori, apice  
vix visibiliter annulata. Thorax latitudine longior,  
basin & apicem versus angustior, lateribus rotunda-  
tusq. supra modice convexus, obsoletissime carinatus,  
nigro piceus, nigrus, glaber, sat crebre, sed subtilis-  
sime, punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, pi-  
ceum. Elytra thoracis basi latiora, humeris sub pro-  
minulis, & illo fere tripto longiora, apice rotunda-  
ta, supra convexa, dilutius picea, sub-nitida, minus  
proiunde punctato-striata, interstitiis planis, lăvibus.

Corpus

*Corpus subtilis dilutius piceum, crebre punctulatum. Pedes breviusculi, tenues, rufo-picei, femoribus anticis crassioribus, clavatis.*

§. C. chloropus: niger, glaber, antennis brevibus, crassis, pedibusque rufo-piceis, rostro brevissimo, lato, depresso, elytrorum intersticiis obsolete ferrato-punctulatis.

*Hyletinus chloropus.* Fabr. Eleut. 2. 393. 17.

*Circulio chloropus.* Herbst. Col. 6. 56. 19. tab. 62. f. 12. Payk. fn. 3. 311. 134. Panz. fn. 19. f. 14.

*Circulio uter.* Linn. Synt. 2. 617. 86. Fn. Sv. 637. Bonsd. Cerc. 2. 31. 19. f. 20.

Habitat in ligno sicco, putrescente, frequens.

Deser. Parvus, angustus, Rh. T. albo statura finillis, sed plerumque paulo minor, niger, glaber. Caput porrectum, nigrum, subtiliter, crebre punctulatum, oculis parvis, lateralibus, nigris, prominulis; rostrum latitudine capitis, & illo vix longius, subdepressum, nigrum, crebre punctulatum, obsolete canaliculatum. Antennae extra medium rostri in fovea obliqua insertae, rostro cum capite parvum longiores, crassae, fuscoc-ferrugineae, articulo primo longo, clavato, 2-8 brevibus, crassis, coarctatis, noto paulo crassiori, ovato, pallidiori, apice pubescente, vix visibiliter annulato. Thorax latitudine multo longior, anterius sensim angustior, basi apiceque truncatus, supra modice convexus, æqualis, niger, sub-nitidus, crebre & sat profunde punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, laeve. Elytra thoracis

basi vix latiora, sed illo fere duplo longiora; sub. lichenaria, apice rotundata, supra convexa, nigra, minus nitida, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, finguulis serie regulari e punctis minutissimis, impressis. Corpus subtus nigro piceum, sub-nitidum, crebre & sat profunde punctatum. Pedes breves, tenues, rufi picei, femoribus articulis paulo crassioribus, compressis, acutatis.

Variat etiam colore totius corporis rufo-piceo.

4. C? lymexylon: fusco-piceus, sub-pubescentis, antennis brevissimis, rufescens, ante medium rostri insertis, rostro longiori cylindrico, thorace scabro, elytris profunde punctato-striatis.

*Lixus lymexylon.* Fäbr. Eleut. 2. 504. 32.

*Curculio lymexylon.* Herbst. Col. 6. 231. 195.  
Tab. 76. f. 9. Payk. En. 3. 240. 59. Panz.  
In. 18. f. II.

Habitat sub cortice arborum emortuarum;  
præsertim Quercus; apud nos rarius.

Deser. Statura fere C. chloropi, sed paulo minor, fuscus, opacus, pulvere griseo plerumque tectus. Caput porrectum, fuscum, granulato scabrum. oculis parvis, lateralibus, nigris, depresso; rostrum capite duplo longius, porrectum, crassum, sub cylindricum, in medio sub gibbosum, fusco piceum, granulato punctatum. Antennæ ante medium rostri insertæ, brevissimæ, rostro parum longiores, rufo-ferrugineaæ, articulo primo elevato, fere dimidium totius longitudinis efficiente; 3-8 perfoliatis, valde contractatis, sensim crassioribus; nono adhuc crassiori, ovato,

ovato, solido, apice pubescente, cum acumine micato, prominulo. Thorax latitudine paulo longior, antice angustior, & ante apicem transversim profunde impressus, margine apicis elevato; basi sub bistrigatus, supra modice convexus, fusco piceus, granulis elevatis, obsoletis scaber, & pube subtillissima, depresso, fusci adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, impressum, fuscum. Elytra thoracis basi laticata, & illo plus duplo longiora, apicem versus attenuata, apice rotundata, supra convexa, nigro-fusca, profunde & late crenato-sulcata, interstitiis angustis elevatis, levibus. Corpus subitus fusco-piceum, opacum, sat crebre punctatum. Pedes breves, tenues, rufo picei, femoribus anticis parum crassioribus.

Obs. Propter antenas, ante medium rostri insertas, huic generi non exakte correspondet; nec generi Lixus apte associari queat, ob antennarum clavam solidam; medius quasi inter genera Calandras & Coffoni.

### C U R C U L I O.

*Palpi quatuor brevissimi, articulo ultimo longiori, subulato. Maxilla brevis, apice dilatata, truncata. Antennæ tritæ, versus apicem lateralem rostræ insertæ, clava tri-articulata. Rostrum breviusculum, crassum, versus apicem plurimumque dilatatum.*

Fam. I. Femoribus muticis.

Sect. I. Alati, corpore plerumque oblongo.

I. *C. sulcirostris:* niger, dense cinereo-pubescent, elytris tenuè punctato-striatis,

duæ cinereo-pubescentes, interiori introrsum, exteriori extrosum arcuata. Scutellum parvum, angustum, cinereo-pubescent. Elytra thorace latiora & plus triplo longiora, apice rotundata, supra convexa, nigra, anterius inspecta, obsolete punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis, rugulis elevationibus, sub-transversis, notatis; pube cinereo-albida fasciculatim irregulariter adspersa. Corpus subtus nigrum, subtiliter coriaceum, pube rariori cinerea adspersum, relicta in ventre purctis crebris denudatis. Pedes mediocres, nigri, cinereo-pubescentes, femoribus anticis crassioribus, posticis angustis, vix longioribus.

*C. nebulosus*

3. *C. nebulosus*: elongatus niger, dense cinereo-pubescent, elytris acuminate, profundius punctato-striatis, fasciis obliquis denudatis, rostro thoraceque carinatis.

Linn. *Syst.* 2. 617. 84. *Fn. Sv.* 635. *Fabr.*

*Elenct.* 2. 514. 46. *Herbst. Col.* 8. 76. 38.

*Tab. 64. f. 8.* *Bonsd. Cyrc.* 2. 20. 3. f. 4.

*Curculio carinatus*, *De Géer. Ins.* 5. 241. 27.

Habitat in arenosis, aridis, paucim, minus frequens.

Descr. Statura elongata & magnitudo omnino C. Sulcirostris. Caput breve; nigrum, subtiliter coriaceum, pube cinerea, capite brunnecente, adspersum, fronte inter oculos carinula elevata, e rostro continuata; oculi oblongi, nigri, laterales, parum prominentes; rostrum capite vix duplo longius, crassum, sub-arcuatum, nigrum, rugoso-punctatum, pube densa, grisea, depressa, raro rufa aut ferruginea, tincta, tectum, relicta carina longitudinali nu-

da, nigra, versus caput magis elevata, inter anten-  
narum insertionem nonnihil rotundato-dilatata, pun-  
ctum majuscum impressum incidente. Antennae  
vix rostro cum capite longiores, nigrae, clava acu-  
minata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine ba-  
seus vix longior, anterius paullo angustior, apice  
late emarginatus, basi bi-sinuatus, supra modice  
convexus, niger, profunde rugoso punctatus, ab  
apice ultra medium carinula evidenter elevata nota-  
tus, postice in medio impressus; ab utroque latere  
carinula ruga longitudinalis elevata, nigra, rugoso-  
punctata, pone medium extrorsum arcuata, versus  
basin iterum introrsum flexa, spatio medio interpos-  
ita, ut & linea arcuata, rugae exterius adjacentes,  
pilis densis cinereis aut rufo-brunneis obductis.  
Scutellum nullum, sed angulus e medio thoracis  
emissus, locum ejus occupat. Elytra antice thoracis  
basi parum latiora, sed illo fere quintuplo lon-  
giora, pone basin dilatata, in medio marginis si-  
nuata, apice acuminata, praesertim in femina; supra  
convexa, nigra, evidenter punctato striata, vellere  
denso cinereo, depresso, obducta, relictis fasciis  
duabus retrosum obliquis, calloque postico denuda-  
ta, nigris; striae quatuor dorsales in singulo elytro  
per paria approximatæ, anterius scrobiæulis profundi-  
dis, oblongis, loco punctorum, exaratae; versus pos-  
tice vero, ut & in stribus exterioribus, puncta plera-  
que parva. Corpus subtilis nigrum, subtiliter coria-  
ceum, cinereo pubescens, ventre punctis obsoletis  
sub-nudis variegato. Pedes longiusculi, nigri, ci-  
nero-pubescentes, femoribus parum crassis, positi-  
cis paullo longioribus, & tarsis ejusdem paris va-  
de elongatis.

4. C. glaucus: brevior, niger, vellere cine-  
reo-brunnescente tectus, elytris sub-acu-  
minatis,

minatis, profunde punctato-striatis, fasciis arcuatis nubioribus, rostro carinato.

*Fabr. Eleut.* 2. 516. 57. *Herbst. col.* 6. 486, 506. *Tab.* 95. f. 1. *Panz. fn.* 19. f. 6?

*Curculio nebulosus.* *Payk. fn.* 3. 298. 122.

Habitat in arenosis, aridis, praesertim Eritetis, sat frequens.

Descr. Praecedenti similissimus & valde affinis, sed brevior, quare etiam Synonymon Cl. Paykullii huc referto; differt praeterea sculptura thoracis, fasciis denudatis elytrorum aliter constitutis, &c. Caput breve, nigrum, subtilissime rugoso-punctatum, vellere denso, depresso brunneo aut cinereo-rufescente tectum, fronte fere plana, in medio inter oculos foveola rotundata, profunda, impresso, posterius carinula elevata nuda nigra rotata; oculi oblongi nigri laterales depresso; rostrum quoad structuram & pubescenciam ut in praecedenti, sed carinula media elevata nigra, plerumque antice inter antennarum basin definit, ibique bifida evadit. Thoracis structura fere ut in priori, sed angulus medius baseos brevior, scutelli locum non exacte replet; supra modice convexus, niger, profunde rugoso-punctatus, in medijs baseos impressus, carinula antica valde abbreviata, saepe obsoleta; lineæ laterales arcuatæ, & impressiones variæ dorsales, pube cinereo-rufescente ut in priori obductæ. Scutellum minutum, demersum, nigrum, apice solo adscendentem, cinereo-pubescente. Elytra antice thoracis basi parum latiora, humeris rotundatis, thorace fere quadruplo longiora, apice sub-acuminata, supra convexa, simili modo ac in praecedenti striata, nigra, vellere denso cinereo, saepe pallido-brunnescente, testa, recticis fasciis duabus mediis transversis, externe abbreviatis,

vialis, antrorum arcuatis, calloque postico, magis denudatis, nigro-fuscis. Corpus subtus nigrum, subtiliter coriaceum, pube densiori cinerea obductum, relictis punctis crebris denudatis, etiam in pectore. Pedes nigri, cinereo-pubescentes, punctis nudis variegati, structula omnino ut in priori.

Obs. Dom. Illiger in Mag. 5. 244. 57. hanc speciem ut varietatem praecedentis dijudicat, at vix jure.

5. *C. albidus*: niger, albido-pubescent, thoracis dorso, elytrorum fascia maculisque quatuor denudatis, rostro bi-sulcato, carinula apice bifida.

*Fabr. Eleut.* 2. 517. 59. *Herbst. col.* 6. 80. 41.  
*tab.* 64. *f. II.* *Payk. fn.* 3. 300. 23. *Panz.*  
*fn.* 19. *f. 7.*

*Curculio niveus.* *Bonsd. curc.* 2. 21. 5. *f. 6.*

Habitat in arenosis, aridis, rariis.

Descr. Statura *C. glauci*, sed triplo minor. Caput breve, nigrum, fronte rugoso-punctata, vertice laeviori, fulvo-pubescente; oculi laterales, oblongi, brunnei; rostrum capite paullo longius, apicem versus nonnihil angustatum, nigrum, utrinque sulco, basi profundiori, impressum, carinula media elevata, apice bifida, os non attingente. Antennae capite cum rostro paullo longiores, minus crassae quam in prioribus, nigræ, basi ferrugineæ, clava acuminata cinereo-pubescente. Thorax latitudine brevior, antice nonnihil compressus, basi bi-sinuatus, supra modice convexus, profunde rugoso-punctatus, canalicula media obsoleta, postice profundiiori, impressus; subtus & lateribus pube densa albidâ.

bida, interdum brunnecente, obductus, quæ albedo supra versus apicem utrinque maculam rotundatam nigrum, denudatam, includit. Scutellum minutum, triangulare, albido: pubescens. Elytra thorace paulo latiora; & illo quadruplo longiora, apice sub-acuminata, dehiscentia, supra convexa, nigra, sit profunde punctato striata, pube densa, brevi, depressa, alba, sœpe nivea, tecta, testiculis inacula magna humerali, fascia media sinuata, maculaque minori in callo postico, denudatis, nigris, punctis sparsis albis irroratis. Corpus subtus nigrum, subtiliter coarctatum, pube densa albida, interdum flavescente, tectum, ventre posterius & ad latera maculis denudatis nigris seriatis notato. Pedes mediocres nigri, pube albida tecti, femoribus versus apicem annulo albidiori cinctis.

6. *C. palliatus*: elongatus niger, pilis squamuſque densis, superne fuscis, subtus & lateribus cinereo-albidis tectus, thorace longiori, rostro obsolete impresso.

*Fabr. Eleut.* 2. 513. 38. *Panz. fn.* 19. f. 5.

*Ilig. Mag.* 4. 153. 38.

*Curculio comescens.* *Herbst. col.* 6. 240, 204.  
*Tab.* 77. f. 8.

*Curculio diffinis.* *Marsh. Ent.* Br. 1. 309, 205.

Habitat in Scania, prope urbem Landskrona a Dom. Wetterhall rariſſime lectus.

Descr. Magnitudo & fere Statura C. incani, sed in elytris paulo latior, thorace multo longiori, rostro sub-cinaliculato, abunde distinctus. Caput breve, porrectum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, pilis rigidis griseis-fuscis adspersum, fronte depressa;

depressa; oculi laterales, nigro-brunnei, parum prominentes; rostrum latitudine fere capitis, & vix illo longius, supra planum, in medio longitudinaliter obsolete impressum, colore punctura priscque ut in capite. Antennae longitudine fere capitis cum thorace, tenues, nigrae, gliseo-pubescentes. Thorax latitudine multo longior, basi apicemque truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra parum convexus, lineola tenui, obsoleta, canaliculatus, niger, crebre rugoso-punctatus, supra pube densa, depressa, rigida, fusca, subtus & lateribus cinereo-albida, testus; in medio laterali utrinque foveola obliqua impressa, plerumque obsoletissima. Scutellum parvum, triangulare, dense albido-squamulosum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, humeris prominulis, & illo ferè triplo longitudine, apice sub-acuminata, dorso parum convexa, nigro-fusca, regulariter punctato striata, intersticiis planis, rugoso-coriaceis & squamulis piliformibus, depressis, falcis, versus latera densotibus, griseo-albidis, testa. Corpus subtus nigro-tuscam, obsolete punctulatum, squamulis minoribus, densis, cinereo-albidis, interdum metallico-nitentibus, testum. Pedes validi, nigri, pilis squamulisque densis griseo-albidis, nitidis, testi.

7. *C. viridis*: niger, supra parcius viridis-squamulosus, subtus lateribusque dense flavo-virescens, rostro carinato, elytris apice sub-mucronatis.

Linn. Syst. 2. 616. 76. Fn. Sv. 629. Fahr.

Eleut. 2. 512. 34. Herbst col. 6. 136. 95.

Tab. 69. f. 4. Payk. fn. 3. 301. 124. Bonelli curc. 2. 22. 6. f. 7. Panz. fn. 107. f. 3.

*Brachyrinus viridis*. Latreille. Gen. Ins. 2.  
255. I. Cur-

*Curculio flavo-cinctus.* De Geer Ins. §. 256.

45.

Habitat in Sveciae australis frutetis, rarius.

Descri. C. incano plerumque brevior, sed in elytris latior. Caput porrectum, breve, nigrum, obsolete punctatum, squamulis angustis, piliformibus, virescentibus, parce adspersum; oculi laterales, brunnei, prominuli; rostrum capite duplo longius, crassum, latum, nigrum, rugoso-punctatum, squamulis nitentibus uti caput adspersum, apice late emarginatum, ore piloso; in medio rostri carinula elevata glabra, ad frontem usque producta. Antennæ vix longitudine rostri cum thorace; nigrae, pubescentes, articulo primo clavato; vix tertiam partem totius attingente. Thorax latitudine baseos paulo longior, antrosum nephilis angustior; apice truncatus, basi bi-sinuatus, angulis prominulis, acuminatis; supra convexus, niger, crebre rugoso-punctatus; in medio obsolete canaliculatus; squamulis similibus uti caput parce adspersus; subtus & lateribus squamulis densis flavo-virescentibus testus. Scutellum parvum, rotundatum; flavo-virescens. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, apicem versus attenuata, apice ipso mucrone parvo, piloso, recto armata, supra modice convexa, nigra, regulariter punctato-striata, intersticiis latis, planis, subtiliter coriaceis; dorso squamulis minutis cinereo-virescentibus adspersa, versus latera vero late squamu- lis densis flavescentibus testa. Corpus subtus nigrum, punctulatum, squamis densis flavo-virescentibus testum. Pedes elongati, tenues, nigri, femoribus squamulis virescentibus, nitidis, plus minusve adspersis, tibialis antieis longioribus arcuatiss.

Obs. Curc. pollinosus Germanorum huic simili-  
tius, sed paulo minor, elytrorum mucro longior,  
tho-

thorax postice vix sinuatus, & carinula rostri brevior, obsoletior.

8. *C. flavipes*: elongatus, niger, squamulis viridi-sericeis, pilisque fuscis tectus, antennis tenuibus pedibusque pallide testaceis, rostro brevissimo.

*De Geer Ins. 5. 245. 31. Marsh. Ent. Br. 1.  
31. 21.*

*Curculio sericeus. Herbst. col. 7. 37. 595. Tabl.  
97. f. 10. F.*

Habitat in fructis paucim, minus frequens.

Descri. *C. argentato* quoad magnitudinem, statutam & colorem primo intuitu ut ovm ovo similis, sed rostro multo breviori, antennis tenuioribus & femoribus omnino muticis, abunde differt. Caput satis magnum, porrectum, nigrum, subtiliter coriaceum, squamulis minutis, rotundatis, viridi-sericeis, & pilis parvis, erectis, griseo-fuscis, omnino tectum, oculis parvis, lateralibus, brunneis, globosis; rostrum ante oculos brevissimum, vix dimidiam capitis longitudinem attingens, crassum, supra planum, apice emarginatum, indumento simili uti caput tectum. Antennae capite cum thorace longiores, valde tenues, testaceae, extrorsum paullo obscuriores, clava angusta, lanceolata. Thorax brevissimus, transversus, basi apiceque truneatus, lateribus in medio nonnihil dilatatus, supra in disco transversim convexus, intra basin & apicem depresso, niger, opacus, subtiliter granulato-coriaceus, squamulis & pube simili uti caput undique tectus. Scutellum parvum, triangulare, viridi-squamosum. Elytra magna, thorace dimidio latiora, & illo plus quam

quam. Sextuplo longiora, apice acuminata; supra convexa, praesertim posterius, tota nigra, regulariter punctata, striata, intersticiis planis, raevibus, nitidis; squamulis minutis sericeo-viridibus, & pube erecta griseo-fusca tecta, relictis fames punctis striarum, ut & aliis minimis; fere seriatis, in intersticiis, nigris, denudatis. Corpus subtus squamulis similibus & pube tenui ut supra tectum. Pedes elongati, tenues, pallide testacei seu flavescentes, unguis foliis apice fuscis; femora sub-clavata, omnino rotundata; tibiae omnes arcuatae.

9. *C. parvulus*: brevior, niger, squamulis pallide viridibus, opacis, tectus, antenpis crassiusculus, tibiis tarsisque testaceis, rostro mediocri.

*Fahr. Eleut.* 2. 528. 119. *Herbst. col.* 6. 500.

531.

*Curculio fulvipes*. *Payk. fn.* 3. 310. 133.

*Curculio argentatus*. *Bonsd. Curr.* 2. 27. 12. var. b.

*Curculio uniformis*. *Marsh. Ent. Br.* 1. 311. 210.

Var. b. Squamis coeruleo-virescentibus, antennis, tibialis tarsisque obscurius ferrugineis.

Var. c, Squamis cinereo-flavescentibus.

Habitat in urtica dioica, aliisque plantis & fruticibus, frequens.

Descr. Praecedente multo brevior, praesertim in elytris; Antennae multo crassiores, elytra postice minus

minus convexa, rostrum paullo longius & angustius, color squamularum pallidior, opacus, pubescens ereta omnino nulla, adeoque species abunde distincta. Caput satis magnum, porrectum, nigrum, subtiliter coriaceum, squamulis minutis, pallide viridibus, opacis, omnino tectum, oculis parvis, globosis, lateralibus, brunneis; rostrum capite paullo brevius & angustius, colore & squamulis similibus. Antennae vix longitudine dimidii corporis, crassiflue, testaceæ; pubescentes, clava mediocri ovato-acuminata, coarctata. Thorax brevis, transversus, paullo latior quam in priori, basi apiceque truncatus, lateribus perparum rotundatus, supra modice convexus, ante basin & apicem obsolete impressus, niger, subtiliter coriaceus, squamulis similibus uti caput tectus. Scutellum parvum, rotundatum, viridi-squamatum. Elytra thorace vix dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, regulariter punctato-striata, interstitiis planis, levibus, tota squamulis pallide viridibus, opacis, testacea, absque punctis interstitiarum denudatis. Corpus subitus nigro-piceum, subtiliter punctulatum, squamulis pallide viridibus tectum, in ventre angustioribus; minus crebris. Pedes mediocres, femoribus clavatis, nigro-piceis, viridi-squamosis, tibiis vix arcuatis; tarisque testaceis.

Var. b, differt tantum colore squamularum, aut cœruleo-virescente, aut fere plumbeo, & colore antennarum, tibiarum, tarsumque saturatius ferrugineo.

Var. c, squamis pallidioribus, cinereo-flavescientibus testa; cætera ut in a.

10. C. viridicollis: niger, nitidus, anten-nis crassifluis, tibiis tarisque ferrugineis;

*Insc. Svec. T. I. P. III. S.*

neis, thoracis lateribus pectoreque viridi-squamosis.

*Fabr. Eleut.* 2. 528. 120. *Herbst. col.* 6. 222.  
186. *Tab. 75. f. 12.* *Payk. fn. 3.* 309. 131.  
*Panz. fn. 19. f. 13.*

*Var. b.* Elytris, abdomine femoribusque rufo-castaneis.

*Habitat in collibus pratorum aridis, præsertim in Artemisia campestris, pallidum copiose.*

*Descr.* Statura & affinitas præcedentis, sed plurimque paullo minor. Caput majusculum, porrectum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, fronte depressa rostroque squamulis angustis, piliformibus, viridi-argenteis adspersis; oculi parvi, globosi, laterales, brunnei; rostrum capite paullo brevius & angustius, rugoso-punctatum, nigrum. Antennæ longitudine capitis cum thorace, crassissimæ, ferruginea, clava ovato-acuminata obscuriori. Thorax latitudine medii paullo brevior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra modice convexus, niger, crebre rugoso-punctatus, squamulis angustis, viridi-argenteis, nitidis, subtus & lateribus densioribus, tectus, in dorso rarioribus adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, dense viridi-squamosum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, apice acuminata, supra convexa, nigra, nitida, fere glabta, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, lævibus. Pectus nigrum, punctatum, dense viridi-squamosum; venter nigro-piceus, obsolete punctulatus, squamu-lis pilisque rarioribus adspersus. Pedes longiusculi, validi, femoribus clavatis nigris, viridi-squamosis, tibiis tarsisque ferruginea.

*Var. b.*

Var. b, tantum colore dilutiori differt; elytra, abdomen & femora jam saturatius, jam dilutius rufo-castanea; tibiae & tarsi pallidiores.

ii. C. Undatus: elongatus, niger, squamu-  
lis cinereo-argenteis tectus, antennis pe-  
dibusque rufis, thorace angusto, cylindri-  
co, elytris fasciis tribus undatis fusco-  
squamosis.

Fabr. Eleut. 2. 525. 109. Payk. fn. 3. 503.  
126.

*Curculio tereticollis.* De Geer Ins. 5. 246. 33.  
Bonsd. Cure. 2. 28. 14. f. 14.

*Curculio albo-fasciatus.* Herbst. col. 6. 230.  
183. Tab. 75. f. 9.

Var. b, Elytris fere unicoloribus, vel ob-  
foletissime tantum fasciatis.

Habitat in foliis Betulæ, Corylli, &c., fre-  
quens.

Descr. Magnitudo & fere statura C. argentatis  
variat etiam dimidio major & ultra. Caput porre-  
ctum, nigrum, confertissime punctatum, squamulis  
cinereo-albidis crebre adspersum; oculi laterales,  
nigro-brunnei, modice prominuli; rostrum longitu-  
dine fere capitidis, sed illo paullo angustius, nigrum,  
supra planum, confertissime punctatum, squamulis  
familibus seré tectum. Antennæ vix longitudine di-  
midii corporis, tenues, rufescentes. Thorax latitu-  
dine fere longior, sub-cylindricus, bafi apiceque  
truncatus, supra convexus, æqualis niger, opacus;  
confertissime punctatus, subtruncatus & lateribus squamu-  
lis densis cinereo-argenteis, nitidis, tectus, dorso ra-  
ctoribus,

rioribus, minusque nitidis. Scutellum parvum, tri-  
angulare, nigrum, parcè squamosum. Elytra magna,  
thorace fere duplo latiora, & illo quintuplo longi-  
ora, apice acuminata, supra convexa, præsertim po-  
sterius, nigra, nitida, sat profunde punctato-striata,  
intersticiis lœvibus; tota squamulis densis omni-  
tecta, versus latera & apicem plerumque albido-ar-  
gentella; in dorso præsertim antico, obscurius cinereo-  
albidus; præterea fasciæ tres comunes valde undu-  
latæ, & squamis jam saturatius, jam dilatius fuscis,  
quarum prima obliqua, fere ab humero versus futu-  
ram ducta, secunda in medio, tertia pone medium,  
minor, ambæ abbreviatæ, margines non attingentes.  
Corpus subtus nigrum, creberrime subtiliter punctu-  
latum, squamulis albo-argenteis nitidioribus tectum.  
Pèdes elongati rufescentes, femoribus clavatis albi-  
do, squamofisi.

Var. b, differt tantum fasciis elytrorum obsole-  
tissimis, fæpe vix discernendis.

12. *C. fulvicornis*: elongatus, rufo-brun-  
neus, cinereo-squamofus, antennis pedi-  
busque rufo-testaceis, elytris fasciis tribus  
denudatis, thorace inæquali.

*Fabr. Eleut.* 2. 525. 106. *Herbst. Col.* 6. 223.  
187. *Tab. 75. f. 13.* *Payk. fn.* 3. 304. 127.

*Curculio ruficornis.* *Bonsd. ture.* 2. 27. 13 f. 13.

Habitat in arboreis paucim, minus fre-  
quens.

Descr. Statura omnino præcedentis & minori-  
bus ejus æqualis. Caput obscure bruneum, conser-  
tissime punctatum, squamulis minutis cinereis cre-  
bæ adpersum; oculi laterales nigri, prominuli; ro-  
strum

strum capite paullo brevius, & basi illo angustius, rufo-ferragineum, crebre rugoso-punctatum, cinereo-squamulosum, supra foveolis nonnullis impressum. Antennae capite cum thorace paullo longiores, tenues, rufescentes. Thorax parvus, angustus, sub-cylindricus, vix latitudine longior, basi apice truncatus, lateribus inaequalis, bis impressus, supra in medio transversim convexas, brunnear, opacus, creberrime punctulatus, squamulis pilisque minutis cinereis adspersus; prope apicem transversim impressus, margine antico elevato; paullo pone medium utringue striga lateralis abbreviata, sat profunde impressa. Scutellum rotundatum, dense cinereo pubescens. Elytra magna, thoracis basi fere duplo latiora, & illo quintuplo longiora, apice acuminata, supra convexa, dilutius rufo-testacea, sat profunde punctato-striata, interstitiis levibus, squamulis minimis, pilisque tenuibus cinereo-albidis adspersa, relictis fasciis tribus denudatis, quarum prima obliqua, ab humero ad suturam, saepe obsoleta, secunda & tertia paullo pone medium, undatae, abbreviatæ. Pectus & abdominis basis nigro fusca, crebre punctulata, squamulis cinereis parcus adspersa, ano testaceo. Pedes elongati, tenues, dilute rufescentes.

13. *C. caninus*: niger, dense fusco-squamosus, thorace longiori, subtilissime punctulato, obscure tri-lineato, angulis posticis sub-prominulis, antennarum basi tibiisque ferrugineis.

*Fabr. Eleut.* 3. 524. 101.

*Curculio neophytis*, *Herbst. col.* 6. 218. 181. tabi. 75. f. 7.?

*Curculio lineatus*, *Payk. fil.* 3. 308. 130. ian. b.  
S 3 Var. b,

*Var. b., flavo-gestaceus, supra obscurior.*

*Curculio lineatus. Bonsd. curc. 2. 30. 16. var. b. f. 16.*

*Curculio flavescens. Marth. Ent. Br. 1. 311. 212.*

*Habitat in plantis, locis aridis, sat frequens.*

Descr. C; lineato valde affinis, sed paulo major, latior, thorax longior & aliter constructus, ut & signaturae aliæ, quare diversus mihi videtur. Caput porrectum, nigrum, subtilissime punctulatum, squamulis minutissimis, piliformibus, brunneis, certo situ cupro micantibus, omnino tectum, fronte plana, linea tenui impressa, quæ ultra medium rostri extenditur, canaliculata; oculi majusculi, nigro-brunnei, laterales, modice prominuli; rostrum capite fere brevius, & paulo angustius, supra depresso, lateribus elevatis, carinatis, colore, punctura & indumento simili ac caput, ore emarginato, piloso. Antennæ vix longitudine capitis cum thorace, ferrugineæ, clava oblonga, nigrante. Thorax latitudine mediæ paulo longior, antice truncatus, lateribus in medio nonnihil rotundatus, basi sub-emarginatus, angulis retrosum prominulus; supra modice convexus, totus niger, confertissime subtiliter punctulatus, squamulis minimis, depresso, undique omnino tectus, subtus tincteo albidis, supra fusco-brunneis; in medio dorsi linea angusta, recta, nitidior, pallidius brunea, saepe metallico-micans, & versus latera utrinque alia latior, arcuata, brunneo-flavescens; in disco inter lineas puncta quatuor parva, flavo-brunea, in tetragonum posita, saepe obsoleta. Scutellum parvum, triangulare, brunneo-pubescentia. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, & illo plus triplo longior,

ora, apice rotundata, supra minus convexa, nigra; regulatiter punctato-striata, interstitiis planis, subtillissime coriaceis; tota squamulis fusco-testaceis tecta; interdum maculis seriatim pallidioribus in interstitiis alternis variegata. Corpus subtus nigrum, subtilissime punctulatum, squamulis cinerascentibus, nitidis, tectum. Redes mediocres, cinereo-pubescentes, femoribus sub-clavatis, nigris, tibiis tarvisque ferrugineis.

Var. b, differt tantum colore pallidiore, forte super exclusus; alia vice variat obscurior, squamulis tere nigro-fuscis tectus, & dum squamulae omnino detritae, niger, glaber evadit.

14. *C. lineatus*: niger, supra fusco-, subtus cinereo-argenteo-squamulosus, thorace breviori posterius latiori, subtillissime punctulato, antennis, tibialis tarvisque ferrugineis, thorace albido-lineato.

Linn. Syft. 2. 616. 80. Fn. Su. 630. Fabr. Eleut. 2. 524. 99. Payk. fn. 3. 307. 430. Bonsd. curc. 2. 29. 16. f. 17.

*Curculio griseus*. Marth. Ent. Br. 1. 313. 217.

Var. b, Elytris etiam albido-lineatis.

*Curculio lineatus*. De Gér. Inf. 5. 247. 35, Marth. Ent. Br. 1. 309. 206.

*Curc. cineraicens*. Herbst. col. 6. 214. 176. tab. 75. f. 2. 1

*Curculio Mus.* Fabr. Eleut. 2. 524. 103.

Var. c, lineis thoracis elytrorumque viridis. Payk. loc. cit. var. c.

S 4.

Var. d,

Var. d, totus niger, squamulis nempe detritis.

*Circulio chloropus.* Linn. Syst. 2. 617. 32. Fn. Sv. 633. Bonsd. circ. 2. 31. 18. f. 19.

*Circulio ruficlavus.* Marsh. Ent. Br. 1. 312. 214.

Habitat in plantis, locis aridis, ubique frequens; var. c, vero rarius occurrit.

Deser. Præcedenti, ut dictum, paulo minor, in elytris angustior, thoracis structura præsertim distinctus. Caput, oculi, rostrum, quoad structuram & puncturam omnipot ut in præcedenti, sed squamulæ cinereæ minus condensatæ, fundum non omnimode occultant. Antennæ paulo longiores & tenuiores, dilutiæ rufescentes, clava patum obscuriore. Thorax versus basin longitudine fere latior, anteriorius angustior, basi apiceque truncatus, lateribus pone medium dilatato rotundatus, supra modice convexus, juxta apicem transversim impressus, margine apicis sub-elevato; totus niger, confertissime subtiliter punctulatus, squamulis minutis, subtus densis, cinereo-sub-argenteis, tectus, supra rarioribus, piliformibus, fusco-cinereis, adspersus, lineisque tribus subrectis, e squamulis condensatis albido ornatus. Scutellum minutum, rotundatum, dense albo-squamosum. Elytra thoracis postico dimidio latiora; & illig. quadruplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, nigra, regulariter punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime coriaceis, squamulis minutis fusco-cinereis, plus minusve densis, tecta; in basi suturæ lineola abbreviata alpidior, & alia ejusmodi versus humerum utrinque. Corpus subtus nigrum, subtiliter punctulatum, squamulis pilisque densis.

densio cinereo - sub - argenteis omnino tectum. Pedes ut in praecedenti omnino.

Var. b, differt tantum elytrorum satura, lineisque tribus in singulo elytro albioribus, continuis, quarum media cuiusvis elytri evidentior.

Var. c, simillima var. b, modo squamuæ linearum in thorace & elytris late virescentes; squamulae reliquæ etiam virescent.

Var. d, aut parce squamuosa, aut omnino nulla, squamis plus minusve detritis, unde facies aliena, sed forma & punctura omnino eadem.

Obs. Curculio lineatus. Herbst. Col. 6. 497. 527. tab. 95, f. 5. a, b, minime huc pertinet; figura potius Rhynchænum Polygoni representat.

15. C. lineellus; niger, squamulis setisque fuscis tectus, thorace albo-lineato, profundius punctato; elytris linea utrinque unica inaequali, albida, nigro-maculata.

Bonsd. eurc. 2. 30. 17. f. 18. Linn. Pl. Sv. 546. 2274. Sepos.

*Curculio lineatus.* Payk. Pl. 3. 308. 150. var. d.

Var. b, Pedibus totis pallidiis testaceis.

Var. c, thorace elytrisque squamulis & pube densioribus cinereo-albidis tectis, lineis punctisque fuscis irroratis.

*Curculio occator.* Herbst. col. 6. 219. 182. tab. 75. f. 8.

*Curculio macularius.* Marth. Ent. Br. t. 312. 215.

Var. d., duplo minor, elytris lineis pluribus albido-squamosis.

Habitat in plantis, præsertim filiformis, umbique vulgaris.

Descr. C: lineato duplo minor & ultra, præsertim brevior, capite thoraceque profundius punctatus, & signaturis aliis distinctus. Caput latum, nigrum, sat profunde punctatum, squamulis crebris fuscescentibus, pone oculos & in linea media verticis albidioribus tectum, fronte canalicula sat profunda, versus apicem rostri continuata, exarata; oculi majusculi, prominenti, nigri; rostrum capite brevius & paulo angustius, similiiter punctatum & squamosum. Antennæ capite cum thorace breviores, crassissimæ, ferrugineæ, clava obscuriori. Thorax latitudine vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus pone medium nonnihil dilatatus, supra convexus, prope apicem transversim impressus, totus niger, crebre & profunde punctatus, subtus squamulis densis cinereo-albidis, interdum metallico-nitidis, testus, supra rarioribus, minutis, fuscocinereis adspersus, lineis tribus densius squamosus, media recta, angustiori, saepe obsoleta, lateralibus latioribus, arcuatis, aut albidis, aut cupro vel argenteo micantibus, nitidis. Scutellum parvum, rotundatum, dense albido-squamosum. Elytra thorace dimidio latera, & triplo longiora, supra modice convexa, regulariter punctato-striata, nigra, squamulis minutis, setisque brevibus, crenatis, fuscocinereis, testa; a basi lineæ lateralis thoracis, fere ad apicem elytrorum, linea albò-squamosa, lata, inæqualis, ab utroque latere maculis irregularibus nigro-fuscis, subdenudatis, quasi dentata. Pectus & abdomen nigra, punctulata, squamulis densis cinereo subargenteis testa, Pedes mediocres, femoribus clavatis nigris,

bis testaceis, ante apicem annulo albido squamosa cinctis; tibiæ & tarsi rufo-testacei.

Var. b, differt tantum femoribus totis testaceis.

Var. c, densius albido-squamosa in thorace & elytris, unde in thorace lineaæ duæ obscuræ angustiores, & in elytris linea albida vix observanda, sed maculæ fusce illam cingentes melius conspicue.

Var. d, plerumque duplo minor; indumentum elytrotum magis cinereo-albidum, lineaæ plures oblique in interstitiis striarum format, maculis fasciæ vix observandæ.

16. *C. tibialis*: niger, parvus cupreo-squamulosus, thorace subtilissime punctulato, supra trilineato, pectoris lateribus linea argentea utrinque, tibialis testaceis.

*Herbst. col. 6. 217, 179. Tab. 75. f. 5.*

*Curculio sulcifrons*: Thunb. *Mus. Upj. app. 62* 113.

Var. b, elytris punctis vagis, cinereo-pilosus, adspersis.

*Curculio atomarius*. *Marth. Ent. Br. i. 312. 216.*

*Curculio campestris*. *Herbst. col. 7. 36. 594. tab. 97. f. 9. E.*

Habitat cum præcedentibus, non infrequent.

Deser. Præcedentibus iterum valde affinis, & *C. lineellus* var. d, magnitudine æqualis, a quo tamen differt, thorace subtilissime tantum punctulato, & colore alio. Caput, oculi, rostrum, quoad frumentum

curcum

eturam omnino ut in C. lineello, sed punctura subtillior, & squamulae pauciores, minutissimæ, fuscocupreæ; canalicula frontis & rostri ut in illo. Antennæ testaceo-ferrugineæ, clava acuminata, paulo obscuriori, structura ut in C. lineello. Thorax longitudine sere latior, antice sub-rotundatus, lateribus in medio dilatatus, basi truncatus, supra emarginatus, intra basin & apicem obsolete transversum impressus, niger, creberrime, sed subtilissime punctulatus, squamulis minutissimis fuscocupreis parce adspersus, sed superne in tres lineas, solito modo dispositas, etiam saepe obsoletas, magis condensatis; sub latere thoracis utrinque linea distincta & evidens, e squamulis albo-argenteis, per margines pectoris continuata, nitida. Scutellum parvum, fuscocupreo squamułosum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo plus triplo longiora, supra convexa, evidenter punctato-striata, nigra, squamulis minimis fuscocupreis, densius quam thorax, adspersa. Corpus subtus piceum, punctulatum, pectore, praeterquam in linea sub-argentea laterali, parcus, ventre vero paulo densius cinereo-squamulosus. Pedes mediocres, cinereo-pubescentes, femoribus clavatis, plerumque nigri, tibiis tarvisque ferrugineis.

Var. b, differt tantum elytris punctis parvis, sparvis, cinereo-pilosis irroratis.

37. *C. hispidulus*: niger, fuscocamosus, thorace profunde punctato, cinereo-lineato, elytris cinereo-variis, pilis erectis albidis seriatis.

*Fabr. Eleut. 2. 526. III. Payk. fo. 3. 305. 128.*

*Marsh. Ent. Br. 1. 310. 208.*

*Curculio crinitus.* Herbst. col. 6. 245. 209. tab.  
77. f. 13.

Habitat in plantis aquaticis passim, minus  
frequens.

Descr. Curc. lineello similis & affinis, sed plerumque paullo major, latior, thorace adhuc profundius punctato, elytrisque pilosis distinctus. Caput breve, nigrum, sat profunde punctatum, squamulis minutis fuscis adpersum, fronte inter oculos linea impressa, ferè ad rostrum apicem continuata, canaliculata; oculi nigro-brunnei, sub-depressi; rostrum vix capite longius, & illo parum angustius, supra planum, colore, punctura & squamulis ut in capite. Antennæ vix longitudine capitis cum thorace, ferrugineæ, clava fusca. Thorax latitudine medii vix longior, basi spicisque truncatus, lateribus in medio nonnihil rotundatus, supra parum convexus, niger, profunde, sed minus crebre punctatus, squamulis minutis fuscis adpersus, limisque tribus e squamulis densioribus cinereo-albidis, media angusta, saepe obsoleta, lateralibus latiss., sub-arcuatis. Scutellum minutum, cinereo-squamosum. Elytra vix thoracis basi dimidio latiora, sed plus triplo longiora, supra modice convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, squamulis fuscocinereis, densis, testa, & praetera setis erectis rigidis albidis seriatim hispida. Corpus subtus nigrum, punctulatum; squamulis densis testum, in thorace & pectore magis nitidis, sub-metallicis, in ventre obscurioribus, fuscocinereis. Pedes mediocres, femoribus clavatis piceis, cinereo-squamulosis; tibiis tarfisque tegitaceis.

nels, thoracis lateribus pectoreque viridi-squamosis.

*Fabr. Eleut. 2. 528. 120. Herbst. col. 6. 222.  
186. Tab. 75. f. 12. Payk. fn. 3. 309. 131.  
Panz. fn. 19. f. 13.*

*Var. b, Elytris, abdomine femoribusque rufo-castaneis.*

*Habitat in collibus pratorum aridis, præsertim in Artemisia campestris, paucim copiose.*

*Descr.* Statura & affinitas præcedentis, sed plurimque paullo minor. Caput majusculum, porrectum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, fronte depresso rostroque squamulis angustis, piliformibus, viridi-argenteis adspersis; oculi parvi, globosi, laterales, brunnei; rostrum capite paullo brevius & angustius, rugoso-punctatum, nigrum. Antennæ longitudine capitis cum thorace, crassissimæ, ferrugineæ, clava ovato-acuminata obscuriori. Thorax latitudine medii paullo brevior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra modice convexus, niger, crebre rugoso-punctatus, squamulis angustis, viridi-argenteis, nitidis, subtus & lateribus densioribus, tectus, in dorso rarioribus adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, dense viridi squamosum. Elytra thoracis basi fere dimidio laterorum, & illo quadruplo longiora, apice acuminata, supra convessa, nigra, nitida, fere glabra, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, laevibus. Pectus nigrum, punctatum, dense viridi-squamosum; venter nigro-piceus, obsolete punctulatus, squamulis pilisque rarioribus adspersus. Pedes longiusculi, validi, femoribus clavatis nigris, viridi-squamosis, tibiis tarpisque ferrugineis.

*Var. b.*

terum angustiora, thorace sextuplo longiora, supra dorso antico sub-depressa, postice declivia, tota nigra, tenui punctato-striata, interstitiis subtiliter rugosis, tota pube fusco-grisea testa. Corpus subtus nigrum, obsoletius punctatum, griseo-pubescentes. Pedes elongati fusco-picei, griseo-pubescentes, tarsis saepe dilutioribus.

19. *C. hirticornis*: fulco-brunneus, opacus, dense fusco-squamulosus, griseo-que vriegatus, subtus dilutior, thorace profunde punctato, antennis crassis, hirtis.

*Herb. col. 6. 327. 302. Tab. 85. f. 14. Payk.  
fn. 3. add. 458. 117-18.*

Habitat in frutetis passim, minus frequens.

Descr. Statura elongata, depressa, sere *C. incani*, sed quadruplo minor. Caput parvum, brunneum, subtiliter coriaceum, dense griseo-squamulosum, fronte depressa, inter oculos canaliculata, vertice transversum prominulo; oculi nigro-brunnei, parum prominenti; rostrum longitudine capitinis, apice incrassatum, supra canaliculatum, dense griseo-squamulosum, apice late emarginatum, laciinis acutis. Antennae longitudine dimidii corporis, fulco-ferrugineæ, valde incrassatae, articulo primo magno, crassio, dimidiâ sere totius longitudinem efficiente, pilis brevibus, rigidis, arcuatis, densis hirsuto; articuli sequentes pilis densis, rectis, pubescentes, clava parum crassiori, acuminata. Thorax latitudine vix longior, basi apicèque truncatus, lateribus parum rotundatus, sub-cylindricus, supra valde convexus, brunneus, profunde, sed non crebre punctatus, dorso squamulis depig. fuscis, subtus, lateribus & litura dorsali obsoleta dilutius griseis, tenuis.

ctus; Scutellum minutum, triangulare, fuscum. Elytra basi ipsa parum thoracis basi latiora, sed posse basim & ultra medium dilatata, thorace quadruplo longiora & ultra, apice rotundata, supra subdepressa, praesertim anterius, tota fusco-brunnea, regulariter punctato-striata, squamulis densis omnino tecta, dorso toto fuscis & griseis maculatum variegatis, versus latera griseis, unicoloribus. Corpus subtilius dilutius brunneum, punctulatum, squamis densis cirereis pitidis tectum. Pedes rufo-brunnei, dense cinereo-squamulosi & pubescentes, femoribus parum clavatis.

Subdivisio 2:a, Corpore breviori, ovato.

30. *C. tenebricosus*: niger, sub-nitidus, pedibus elongatis rufo-piceis, thorace angusto capiteque subtilissime coriaceis, elytris oblongo-ovatis, obsoletissime striatis, apice attenuatis, rostro emarginato, subcarinato.

*Herb. col. 6. 333. 307. tab. 86. f. 3.*

*Curculio morio. Payk. fn. 3. 294. 118.*

*Curculio clavipes. Bonsd. circ. 2. 40. 35. f. 36.*

*Curculio niger. Marsh. Ent. Br. 1. 297. 172.*

Var. b; rufo-piceus; sub-pubescent, pedibus dilutius rufo-testaceis.

Habitat in arenosis maritimis Scaniæ & Hollandiæ, rarius; ad urbem Ystad, frequenter, Dom. de Paykull.

Descr.

Descr. Longitudo fere C. Ligustici, sed angustior. Caput parvum, breve, nigrum, nitidum, crenatissime subtiliter punctatum, oculis brunneis, parum prominulis, ad lucem auro-micantibus; rostrum capite dimidio longius, spicato dilatatum, supra subdepresso, nigrum, crenatissime rugoso-punctatum, cinereo-pubescentes, carinula media, ante apicem obsolete bifida, marginibusque elevatis, ad os late marginatum & pilosum. Antennae longitudine dimidii corporis, nigrae, dense cinereo-pubescentes, articulo primo longissimo, recto, clava apicis valde angusta, oblonga. Thorax latitudine longior, angustus, sub-cylindricus, vel lateribus perparum dilatatus, basi apiceque truncatus, supra valde convexus, totus niger, sub-nitidus, consertissime subtiliter coriaceus vel granulato-punctatus, in illæsis individuis, pube tenui, depresso, cinerea, parce adspersus. Scutellum minutum, triangulare, nigrum. Elytra antice thoracis basi parum latiora; sed mox pone basin valde dilatata, thorace quadruplo longiora, verius apicem iterum elongato-attenuata, apice ipso rotundata, supra valde convexa, nigra, nitida, striis punctatis obsoletestissimis, in disco vix observandis; versus suturam & margines paullo evidentioribus, & apice in sulculas aliquot abbreviatas excurrentibus; interstitia striarum tenue & obsolete transversim rugulosa; in illæsis individuis superficies tota pilis minatis cinereis, hinc inde in maculas parvas condensatis, adspersa. Corpus subtus nigrum, crenatissime punctulatum, pube tenui cinerea adspersum. Pedes elongati, jam dilutius rufo-ferruginei, jam rufo-picei, tarsis nigricantibus, femoribus longis, basi tenuibus, extrorsum clavatis.

Var. b, modo junior videtur, colore dilutiiori differt; corpus supra brunnatum, subtus rufo-piceum; pedes rufo-testacei, tarsis fuscis.

*Ins. Sues. T. I, P. III. T.*

ObL

Obs. G unicolor, Herbst. Col. 6. 334. 303; tab. 86. f. 6. magnitudine, statura & colore huic similissimus; sed elytra in illo catenato-striata, apice minus attenuata, pedes toti semper nigri, &c.

21. C. atro-apterus: niger, sub-nitidus, pedibus rufo-piceis, thorace lateribus dilatato, capiteque subtilissime coriaceis, elytris ovatis, obtusis, obsoletissime sulcatis, granulatis, rostro carinato, sub-integro.

*De Gér. Ins. 5. 243. 29. tab. 7. f. 22-24.*

Habitat in Scaniæ & Haliandiae arenosis maritimis, passim.

Descr. Præcedenti quidem valde affinis, atamen distinctus videtur, duplo minor, thoracis lateribus magis dilatatis, elytris, apice non attenuatis, nec punctato striatis, femoribus crassius clavatis, rostro vix apice emarginato, &c. Caput breve nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum, fronte inter oculos foregla parva impressa; oculi brunnei, modice prominuli; rostrum capite paullo longius, spicè dilatatum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, carina elevata, abbreviata, longe ante apicem desinente; os perparum emarginatum. Antennæ longitudine dimidiæ corporis, crassiæ, nigræ, articulo primo longissima, clava apicis ovato-acuminata, multo crassiori quam in præcedenti. Thorax latitudine mediæ vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, supra convexus, sub-pulvinatus, ante basim & apicem transversum depressus, totus niger, sub-nitidus, crebre subtiliter punctulatus, pilis minutis griseis parce adpersus. Scutellum parvum triangulare nigrum. Elytra antice thoracia basi parum latiora, sed versus medium val-

de dilatata, posterius iterum angustiora, non vero elongato attenuata, thorace triplo longiora, supra valde convexa, nigra, sub-nitida, obsoletissime sulcata, non verb in sulcis punctata, superficie tota granulis minutis, elevatis, & pilis parvis, depresso, cinereis adspersa. Corpus subtus nigrum, sub-opacum, crebre subtiliter punctulatum, tenue pubescens. Pedes elongati, validi, rufo-picei, femoribus valde crassis, praesertim anticis.

22. C. ater: niger, pedibus rufis, tarsis genubusque nigris, thorace angusto, subtilissime coriaceo, elytris rugosis, obsoletissime luteatō punctatis

*Herbst. col. 6. 332. 306. tab. 86. f. 4.*

*Curculio niger. Päyk. fn. 3. 295. 119.*

Habitat in arenosis Hallandie rarius. Dom. Osbeck.

Defcr. Statura & similitudo C. tenebricosi, sed paullo minor, elytris multo magis rugosis, pedibus diute rufis, nigro geniculatis, &c. Caput breve, nigrum, subtilissime punctulatum, fronte depresso, oculis brunneis, parum prominulis; rostrum capite longius, apice incrassatum, totum nigrum, subtilissime crebre punctulatum, apice parum emarginatum, supra carinula elevata, apice bifida, notatum. Antennae longitudine dimidij corporis, totae nigrae, clava valde angusta, oblonga, cinereo, pubescente. Thorax latitudine vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra valde convexus, totus niger, creberrime subtiliter rugoso-punctatus, pubē tenuissima cinerea versus latera adspersus. Scutellum minutum triangulare nigrum.

T 2

Elytra

ctus; Scutellum minutum, triangulare, fuscum. Elytra basi ipsa parum thoracis basi latiora, sed posne basin & ultra medium dilatata, thorace quadruplo longiora & ultra, apice rotundata, supra subdepressa, praesertim anterius, tota fusco-brunnea, regulariter punctato-striata, squamulis densis omnino tecta, dorso toto fuscis & griseis maculatum variegatis, versus latera griseis, unicoloribus. Corpus subtus dilutius brunneum, punctulatum, squamis densis cirereis nitidis tectum. Pedes rufo-brunnei, dense cinereo-squamulosi & pubescentes, femoribus parum clavatis.

Subdivisio 2:a, Corpore breviori;  
ovato.

Sc. C. tenebricosus: niger, sub-nitidus, pedibus elongatis rufo-piceis, thorace angusto capiteque subtilissime coriaceis, elytris oblongo-ovatis, obsoletissime striatis, apice attenuatis, rostro emarginato, subcarinato.

*Herbst. col. 6. 333. 307. tab. 86. f. 5.*

*Curculio morio. Payk. fn. 3. 294. n. 8.*

*Curculio clavipes. Bonsd. circ. 2. 40. 35. f. 36.*

*Curculio niger. Marsh. Ent. Br. 1. 297. 172.*

Var. b; rufo-piceus, sub-pubescentes, pedibus dilutius rufo-testaceis.

Habitat in arenosis maritimis Scaniae & Hallandiae, rarius; ad urbem Ystad, frequenter. Dom. de Paykull.

Descr.

Descr. Longitudo fere C. Ligustici, sed angustior. Caput parvum, breve, nigrum, nitidum, creiberrime subtiliter punctatum, oculis brunneis, parum prominulis, ad lucem auro-micansibus; rostrum capite dimidio longius, spicè dilatatum, supra sub depresso, nigrum, crebre rugoso-punctatum, cinereo-pubescentes, carinula media, ante apicem obsolete bifida, marginibusque elevatis, ad os late marginatum & pilosum. Antennæ longitudine dimidii corporis, nigrae, dense cinereo-pubescentes, articulo primo longissimo, recto, clava apicis valde angusta, oblonga. Thorax latitudine longior, angustus, sub-cylindricus, vel lateribus perparum dilatatus, basi apiceque truncatus, supra valde convexus, totus niger, sub-nitidus, consertissime subtiliter coriaceus vel granulato-punctatus, in illæsis individuis, pube tenui, depressa, cinerea, parce adspersus. Scutellum minutum, triangulare, nigrum. Elytra antice thoracis basi parum latiora; sed mox pone basin valde dilatata, thorace quadruplo longiora, verius apicem iterum elongato-attenuata, apice ipso rotundata, supra valde convexa, nigra, nitida, striis punctatis obsoletestissimis, in disco vix observandis; versus suturam & margines paullo evidentioribus, & spicè in sulculas aliquot abbreviatas excurrentibus; interstitia striarum tenui & obsolete transversim rugulosa; in illæsis individuis superficies tota pilis minutis cinereis, hinc inde in maculis parvas condensatis, adspersa. Corpus subtus nigrum, crebre subtilissime punctulatum, pube tenui cinerea adspersum. Pedes elongati, jam dilutiis rufo-ferruginei, jam ruso-picei, tarsis nigricantibus, femoribus longis, basi tenuibus, extorsum clavatis.

Var. b, modo junior videtur, colore dilutiiori differt; corpus supra brunnatum, subtus ruso-piceum; pedes ruso-testacei, tarsis fuscis.

*Ins. Sues. T. I, P. III. T.*

Obl.

Obs. G unicolor, Herbst. Col. 6. 334. 303; tab. 86. f. 6. magnitudine, figura & colore huic si millimus, sed elytra in illo catenato-striatis, apice minus attenuata, pedes toti semper nigri, &c.

21. C. atro-apterus: niger, sub-nitidus, pedibus rufo-piceis, thorace lateribus dilatato, capiteque subtilissime coriaceis, elytris ovatis, obtusis, obsoletissime sulcatis, granulatis, rostro carinato, sub-integro.

*De Gér. Ins. 5. 243. 29. tab. 7. f. 22-24.*

Habitat In Scaniæ & Haliandiae arenosis maritimis, passim.

Descr. Praecedenti quidem valde affinis, atamen distinctus videtur, duplo minor, thoracis lateribus magis dilatatis, elytris, apice non attenuatis, nec punctato striatis, femoribus crassius clavatis, rostro vix apice emarginato, &c. Caput breve nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum, fronte inter oculos foveola parva impressa; oculi brunnei, modice prominui; rostrum capite paullo longius, apice dilatatum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, carina elevata, abbreviata, longe ante apicem desinente; os perparum emarginatum. Antennæ longitudine dimidi corporis, crassiusculæ, nigræ, articulo primo longissimæ, clava apicis ovato-acuminata, multo crassiori quam in praecedenti. Thorax latitudine medie vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, supra convexus, subpulvinatus, ante basim & apicem transversum depressus, totus niger, sub-nitidus, crebre subtiliter punctulatus, pilis minutis griseis paice adspersus. Scutellum parvum triangulare nigrum. Elytra antice thoracia basi parum latiora, sed versus medium val-

de

de dilatata, posterius iterum angustiora, non vero elongato attenuata, thorace triplo longiora, supra valde convexa, nigra, sub-nitida, obsoletissime sulcata, con vero in suctis punctata, superficie tota granulis minutis, elevatis, & pilis parvis, depresso, cinereis adspersa. Corpus subtus nigrum, sub-opacum, crebre subtiliter punctulatum, tenue pubescens. Pedes elongati, validi, rufo-picei, femoribus valde crassis, praesertim anticis.

22. C. ater: niger, pedibus rufis, tarsis genibusque nigris, thorace angusto, subtilissime coriaceo, elytris rugosis, obsoletissime fuligineo punctatis

*Herb. col. 6. 332. 306. tab. 86. f. 4.*

*Curculio niger. Päyk. fn. 3. 295. u9.*

Habitat in arenosis Hallandice rarius. Dom. Osbeck.

Deser. Statura & similitudo C. tenebricosi, sed paullo minor, elytrix multo magis rugosiss., pedibus diute rufis, nigro geniculatis, &c. Caput breve, nigrum, subtilissime punctulatum, fronte depresso, oculis brunneis, parum prominulis; rostrum capite longius, apice incrassatum, totum nigrum, subtilissime crebre punctulatum, apice parum emarginatum, supra carinula elevata, apice bifida, notatam. Antennæ longitudine dimidij corporis, totæ nigrae, clava valde angusta, oblonga, cinereo, pubescente. Thorax latitudine vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra valde convexus, totus niger, creberrime subtiliter rugoso-punctatus, pube tenuissima cinerea versus latera adspersus. Scutellum minutum triangulare nigrum.

T 4

Elytra

Elytra antice thoracis bafi parum latiora, sed versus medium tenim dilatata; dein iterum attenuata, thorace fere quadruplo longiora, supra convexa, nigra, subnitida, superne inspecta obsoletissime fulcata, fulcis punctis latis, sed parum profundis, notariis, interstitiis angustis transversim rugosis, praesertim versus margines, unde elytra, a latere inspecta, inordinate rugosæ apparetur. Corpus subtus nigrum vel nigro-piceum, subtilissime rugoso punctatum, tanue pubescens, segmento anali tenuissime substriato. Pedes longiplicati, validi, late rufescentes, femoribus crassis, clavatis, spicè nigris; tarsi etiam nigri, pubescentes.

Obs. Curculio niger, Fabr. Eleut. 2. 530. 137. hue non pertinet, teste Dom. Illiger in Mag. 4. 157. 137, ideoque nomen Herbstii retinendum; Curculio ater Cl. Linnæi in Cosseni genere descriptus.

23. C. laevigatus: niger, nitidus, antennis pedibusque piceis, thorace subtiliter punctulato, elytris subtilissime punctato-striatis, posterius angustatis, rostro non carinato.

Fabr. Eleut. 2. 531. 139. Herbft, edl. 6. 347. 320. tab. 87. f. 6.

Habitat sub lapidibus ad littora maris, in Bahusia, Hallandia, Scania, non infrequens.

Descr. Praecedentibus minor, brevior, C. trifasciatus plerumque paullo major, posterius magis angustatus. Caput mediocre, nigrum, nitidum, glabrum, subtiliter punctulatum, oculis parvis brunneis; rostrum capite parum longius, crassum, nigrum,

Descr. Longitudo fere C. Ligustici, sed angustior. Caput parvum, breve, nigrum, nitidum, creberrime subtiliter punctatum, oculis brunneis, parum proeminulus, ad lucem auro-micantibus; rostrum capite dimidio longius, spicè dilatatum, supra sub depresso, nigrum, crebre rugoso-punctatum, cinereo-pubescentis, carinula media, ante apicem obsolete bifida, marginibusque elevatis, ad os late emarginatum & pilosam. Antennæ longitudine dimidii corporis, nigrae, dense cinereo-pubescentes, articulo primo longissimo, recto; clava apicis valde angusta, oblonga. Thorax latitudine longior, angustus, sub-cylindricus, vel lateribus perparum dilatatus, basi apieque truncatus, supra valde convexus; totus niger, sub-nitidus, consertissime subtiliter coriaceus vel granulato-punctatus, in illæsis individuis, pube tenui, depresso, cinerea, parce adspersus. Scutellum minutum, triangulare, nigrum. Elytra antice thoracis basi parum latiora; sed mox pone basin valde dilatata, thorace quadruplo longiora, verius apicem iterum elongato-attenuata, apice ipso rotundata, supra valde convexa, nigra, nitida, striis punctatis obsoletestissimis, in disco vix observandis; versus futuram & margines paulo evidenterioribus, & spicè in sulculas aliquot abbreviatas exenantibus; interstitia striarum tenue & obsolete transversim rugulosa; in illæsis individuis superficies tota pilis minutis cinereis, hinc inde in maculis parvas condensatis, adspersa. Corpus subtus nigrum, crebre subtilissime punctulatum, pube tenui cinerea adspersum. Pedes elongati, jam dilutiis rufo-ferruginei, jam rufo-picei, tarsis nigricantibus, femoribus longis, basi tenuibus, extorsum clavatis.

Var. b, modo junior videtur, colore dilutiior differt; corpus supra brunnatum, subtus rufo-piceum; pedes rufo-testacei, tarsis fasciis.

*Ins. Sues. T. I. P. III. T.*

Obl.

gram, sub-nitidum, vertice laevi, fronte parce punctata, foveola rotundata inter oculos impressa; oculi brunnei, sub-prominuli; rostrum capite longius, crassum, nigrum, rugoso-punctatum, cinereo-pubescentis, carinula media elevata, apice bifida, notatum. Antennae longitudine fere dimidii corporis, crassiusculæ, rufo-piceæ, cinereo-pubescentes. Thorax longitudine latior, basi apiceque truncatus, lateribus dilatato rotundatus, supra modice convexus, niger, granulis rotundatis, elevatis undique confertissime obsitus, pilisque parvis cinereis adpersus. Scutellum vix ullum. Elytra antice thoracis bafi parum laetiora, sed mox pone basin dilatata, ovata, apice oblique rotundata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra, sub-nitida, regulariter, sed non profunde punctato-striata, interstitiis sub-laevibus, vel obsoletissime sub-rugosis, pilis parvis, depresso, cinereo-sub-metallicis hinc inde variegatis, quæ vero facile deteruntur. Corpus subitus nigrum, opacum, pectora fortius, ventre obsolete punctulatis, tenue pubescentibus. Pedes longiusculi, rufo-picei, pubescentes, femoribus parum clavatis, omnino muticis.

25. *C. obscurus*: nigro-piceus, dense fulco-cinereo squamosus, rostro thoraceque canaliculatis, elytris punctato-striatis, sutura postice carinata, setosa.

*Fabr. Eleut.* 2. 530. 134. *Herbst.* col. 6. 344. 317. tab. 87. f. 3. *Payk. fn.* 3. 292. 116.

*Curculio honorus*. *Herbst.* col. 7. 59. 617. tab. 100. f. 3. var. major.

*Curculio murinus*. *Bonsd: enq.* 2. 37. 30. f. 31. *Habitat*

de dilatata, posterius iterum angustiora, non vero elongata attenuata; thorace triplo longiora, supra valde convexa, nigra, sub-nitida, obsoletissime sulcata, non vero in sulcis punctata, superficie tota granulis minutis, elevatis, & pilis parvis, depresso, cinereis adspersa. Corpus subtus nigrum, sub-opacum, crebre subtiliter punctulatum, tenue pubescens. Pedes elongati, validi, rufo-picei, femoribus valde crassis, praesertim anticis.

22. C. ater: niger, pedibus rufis, tarsis genubisque nigris, thorace angusto, subtilissime coriaceo, elytris rugosis, obsoletissime sulcati punctatis

*Herbst. col. 6. 332. 306. tab. 36. f. 4.*

*Curculio niger. Payk. fn. 3. 295. 119.*

Habitat in arenosis Hallandæ rarius. Dom. Osbeck.

Descr. Statura & similitudo C. tenebricosi, sed paullo minor, elytrix multo magis rugosis, pedibus dilute rufis, nigro geniculatis, &c. Caput breve, nigrum, subtilissime punctulatum, fronte depresso, oculis brunnneis, parum prominulis; rostrum capite longius, apice incrassatum, totum nigrum, subtilissime crebre punctulatum, apice parum emarginatum, supra carinula elevata, apice bifida, notatum. Antennæ longitudine dimidij corporis, totæ nigrae, clava valde angusta, oblonga, cinereo, pubescente. Thorax latitudine vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra valde convexus, totus niger, creberrime subtiliter rugoso-punctatus, pube tenuissima cinerea versus latera adspersus. Scutellum minutum triangulare nigrum.

T 4

Elytra

26. *C. Mercurialis*: niger, squamulis fusco-cupreis adspersus, thorace carinato, elytris punctato-striatis, sutura postica interstitisque alternis elevatis, antennis tibiisque rufo-piceis.

*Fabr. Eleut.* 2. 530. 139.

*Curculio elevatus*. *Herbst. Col.* 6. 235. 199.

*Tab* 77. *f. 3.*

*Curculio lapidarius*. *Payk. fn* 3. 292. 115.

*Curculio æcidii*. *Marsh. Ent. Br.* 1. 307. 201.

Var. b, Elytrorum interstitiis vix vel parum elevatis.

*Curculio lepidotus*. *Herbst col.* 6. 233. 197.

*Curculio obtusus*. *Bonsd. curc.* 2. 37. 29. *f. 30.*

Habitat sub lapidibus, tempore vernali, & in plantis præcipue Mercurialide perenni, in umbrosis Westrogothiæ, Scaniæ, passim.

Descr. Statura fere præcedentis, sed duplo aut triplo minor, sequenti æqualis. Caput breve, nigrum, crebre subtiliter punctulatum, squamulis minutis, cupreo vel aureo-micantibus tectum, fronte inter oculos toveola parva impressa; oculi depresso-brunnei; rostrum capite longius, crassum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, linea parva, elevata, carinatum, squamulis similibus uti caput supra adspersum. Antennæ longitudine rostri cum thorace, rufo-piceæ, clava obscuriori. Thorax latitudine fere longior, anterius perparum angustior, basi apiceque truncatus, lateribus vix dilatatus, supra modice convexus,

grum, supra planum, creberrime rugoso-punctatum, non carinatum, apice emarginatum. Antennae longitudine fere dimidii corporis, rufo-piceæ, articulo primo longo, saepe saturatus nigro. Thorax latitudine medii parum longior, basi apiceque truncatus, lateribus in medio rotundato-dilatatus, supra valde convexus, niger, nitidus, glaber, dorso subtiliter crebre punctatus, lateribus & subrnis creberrime granulatus. Scutellum minutum, triangulare, nigrum, sub-læve. Elytra antice thoracis basi parum latiora, sed mox pone basin valde dilatata, a medio versus apicem attenuata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra, nitida, glabra, subtilissime punctato-striata, intersticiis planis, atque subciliis crebre & vage punctulatis. Corpus subitus nigrum, nitidum, subtiliter crebre punctulatum. Pedes elongati, jam nigli, jam saturatus vel dilutius rufo-picei, femoribus valde elevatis, nitidis, sublævibus, tibiis arcuatis scabris, tarsisque parce cinciso-pubescentibus.

24. *C. maurus*: niger, sub-nitidus, parce cinereo-pubescent, antennis pedibusque rufo-piceis, thorace confertissime granulato, elytris ovatis, punctato-striatis, intersticiis sub-lævibus.

*Curculio morio*. Bon. d. eurc. 2. 36. 28. f. 29.

*Curculio fulvatus*. Payk. fn. 3. 276. 98. var. b.

Habitat sub lapidibus, foliis deciduis, tempore vernali, passi n.

Descr. *C. lavigato paullo major*, elytris latioribus, ovatis, posterius magis obtusis, thorace evidenter granulato, &c. distinctus; Caput breve, nigrum;

Deser. Statura praecedentium; magnitudo variat. Caput breve, nigrum, fronte parce punctata, pilis griseis adspersa, vertice laevi, glabro; oculi sub depresso brunnei; rostrum capite parum longius, apice incrassatum, nigrum, crebre rugosum-punctatum, pilis griseis adspersum, carinula obsoleta, abbreviata, rotundata. Antennae longitudine fere dimidii corporis, crassae, fusco-ferruginea, pubescentes, interdum basi piceae. Thorax latitudine medii vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, supra modice convexus, niger, opacus, crebre rugoso-punctatus, fere granulatus, pilis rigidis, depresso, griseis, parce adspersus, carinula media abbreviata, angusta, rotundata. Scutellum triangulare nigrum, opacum, perumque sub thorace occultatum. Elytra ovata, antice thoracis basi vix latiora, humeris rotundatis, pone basin & ultra medium rotundato-dilatata, apicem versus attenuata, thorace triplo longiora, supra convexa, nigra, profunde & sude punctato-striata, interstitiis angustis, subtilissime coiaceis; futura postice valde elevata carinata; superficies tota pilis densis, rigidis, depressis, griseis & fuscis maculatim confluentibus, tecta & variegata, humeris & lateribus plerumque pallidius cinereis. Corpus subtus nigrum, opacum, crebre imme punctulatum, parce griseo-pubescentes, ano plerumque rufo-piceo. Pedes mediocres pubescentes, aut roti rufo-ferruginea, aut femoribus saturatius nigro-piceis, apice dilatioribus.

Var. b, differt tantum pilis elytrorum concoloribus griseis, nec fusco variegatis; versus humeros tamen & ad latera plerumque pallidioribus.

28. C. setosus: fusco-rufescens, squamula cinereo-albida variegatus, antennis pedibusque

husque dilutioribus, elytrorum interstitiis  
alternis carinatis, seriato-setiteris.

*Fabr. Eleut.* 2. 527. 115.

*Curculio Septentrionis.* *Herbst. col.* 6. 360. 333.

*Tab. 88. f. 6.* *Payk. fn.* 3. 290. 113.

*Curculio grieo-punctatus.* *De Gér. Inf.* 5.  
244. 30.

*Curculio Scaber.* *Bonsd. curc.* 2. 35. 26. f. 27.  
an id. *Linn. sys.* 2. 409. 22. *En. Sv.* 592?

Habitat præsertim in Pini Abietis frondibus;  
etiam in fruticibus & plantis aliis; non  
infrequens.

Descr. Statura fere præcedentis, sed plerumque paullo minor. Caput angustum, piceum, crebre punctatum, squamu*lis* minatis cinereis tectum, fronte inter oculos lineola impreffa; oculi depresso nigri; rostrum vix capite longius, piceum, punctatum, supra cinereo-squamulosum, apice incrassatum, sub-pudum. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassiusculæ, fusco-ferruginea*re*, pubescentes. Thorax latitudine medii longior, anterius angustatus, basi piceaque truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, supra valde convexus, fusco-piceus, crebre granulatopungosus, squamu*lis* cinereis opacis tectus. Scutellum minutum piceum. Elytra thoraci basi fere dimidio longiora, humeris rotundatis, thorace triplo longiora, posterius attenuata, supra modice convexa, fusco-rufescens, squamu*lis* cinereo-sub metallicis, hinc illinc magis condensatis, variegata, punctis profundis, remotis striata, punto singulo in medio squamu*la* majori cinerea notato, unde ocellata appearant; sutata & interstitia alterna, 2, 4

& 6. a futura, elevato-carinata, singula serie e fetis crebris, erectis, vel parum reclinatis, validis, piceis, armata. Corpus subtrus fusco-ferrugineum vel rufo-piceum, obsolete punctulatum, tenue pubescens. Pedes mediocres, dilutius rufo-ferruginei, cinereo-pubescentes, femoribus clavatis.

Obs. Num C. Scaber Cl. Lionæ huc referendus, vix certe dicendum, quoniam illum inter longirostres numerat.

29. *C. pilosellus*: niger, griseo-hirtus squamosusque, fronte canaliculata, oculis prominulis, thorace brevissimo, postice sinuato, supra cinereo quadri-lineato, elytris antice angustioribus.

*Curculio pilosus*. *Herbst*, col. 6. 237. 202. tab. 77. f. 6.

*Curculio limbatus*. *Marsh. Ent. Br.* t. 30. 183. Habitat in littoribus marinis arenosis, in Hallandia, Scania & Bahusia, passim.

Descr. *C. Coryli* quodammodo similis, sed major, praesertim multo longior, elytra angustiora, minus convexa; a *C. limbato*, cui adhuc magis affinis, differt magnitudine majori, fronte profundius canaliculata, thorace postice sinuato. & elytris antice angustioribus, &c. Caput latum, nigrum, obsolete coriaceum, squamulis cinereo-albidis fere testum, fronte plana, stria longitudinali sat profunde canaliculata; oculi laterales brunnei, valde prominenti; rostrum capite paullo longius, & æque latum, nigrum, similiter squamułosum, supra planum, basi coveota obsoleta, transversa, impressum, & in me-

do

dio lineola parva, brevi, à canalicula frontali continuata, exaratum. Antennæ capite cum thorace fore breviores, tenues, fusco-piceæ, pilosæ, clava parva, cinereo-pubescentes. Thorax brevis, transversus, antice truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, basi bi sinuatus, angulis sub-prominulis, supra modice convexus, niger, sat profunde rugoso-punctatus, pube tenui, erecta, grisea, crebre adspersus, & præterea lineis quatuor arcuatig., e squamulis cinereo-albidis, densioribus, notatus; in medio, basos foveola brevia, sat profunde impressa, & ab illa antrorsum lineola longitudinalis impressa, plerunque obsoleta. Scutellum nullum. Elytra in ipsa bafi coarctata, thorace fere angustiora, & transversum impressa; dein nonnihil latiora, oblongo-ovata, thorace quadruplo longiora, supra convexa; nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, levibus, alternis paulo angustioribus, unde striæ petaria imagia approximatae; superficies tota pube densa, erecta, tenui, grisea, adspersa, & interstitiis latiora præterea squamulis densioribus cinereo-albidis testa, unde elytra cinereo-lineata apparent. Corpus subtus nigrum, obsolete punctulatum, parcus cinereo-squamulosum. Pedes validi, nigri, cinereo-pubescentes, femoribus clavatis.

Obs Cl. Dom. Illig. in Mag. 4. 156 118. hunc sudem cum sequenti, seu C. limbato Fabr. Payk. esse credit, sed vix jute, nam thorax in illo basi truncatus, elytra antice non coarctata, &c.

30 *C. limbatus*: niger, sub-nitidus, oculis prominulis, thorace postice truncato, elytris ovatis, æquibus, futuræ basi linearque laterali argenteo-squamosis.

Fabr. Eleut. 2. 527. 118. Payk. fn. 3. 288. iii.  
Herbst. col. 6. 499. 530. Ha-

Habitat in Hallandiae arenosis, Dom. Osbeck; in Kinnakulle Westrogothiae, ipse; ratius occurrit.

Descr. Praecedenti, ut dictum; simillimus, & valde affinis; sed paullo minor, glabrior, nitidior. Caput breve, latum, nigrum, sub-nitidum, punctatum, squamulis paucis albidis adspersum; fronte minus plana, calaricula obsoletiori exata; oculi ut in praecedenti omnino; rostrum vix longitudine capitis, erissum, nigrum, crebrius & subrillus quam caput punctatum; striga transversa, atcuata, sat profunda, a fronte distinctum. Antennae ferrugineo-piceæ, structura ut in priori. Thorax brevis, transversus; basi spicque truncatus, lateribus rotundato-dilatatus; supra convexus, niger, sub-nitidus, sat crebre punctatus, lineis quatuor arcuatis e squamu- lis albido-argenteis notatus, eodem ordine ac in priori; saepe tamen detritis. Scutellum nullum. Elytra ovata, ante thoracis basi paullo latiora, nec iuxta basin coarctata vel transversum impressa, sone basin dilatata; thorace quadruplo longiora, supra convexa; nigra; sub-nitida, sat profunde punctata, interstitiis planis, sub-lævibus, aequalibus; nec alternis angustioribus; squamulis minutis albido-argenteis in disco patere adspersis; in basi futuræ manuola oblonga, & versus latera utrinque linea lata, inæqualis, e squamulis densis, albido-argenteis; ipse margo inflexus, & apex futuræ, etiam squamulis similibus decorati. Corpus subtus nigrum, punctatum, pectore densius, ventre parcus argento-squamosis. Pedes validi; nigro-picei; pubescentes.

§. C. geminatus: niger, dense fusco-squa-  
mosus; cinereo-lineatus; elytris latis, sub-  
globosis,

*globosis, albido-setosis, rostro piano, vix  
canaliculato.*

Fabr. Eleut. 2. 523. 94. Herbst. col. 6. 348.  
321. Tab. 87. f. 7. Payk. fn. 3. 289. 112.

*Curc. plagiatus.* Schall. Act. Hall. 1. 284.

*Curculio maritimus.* Marsh. Ent. Br. t. 307.  
202.

Habitat in arenosis, aridis, pallim; in area-  
na volatili ad litora maris in Hællandia,  
Scania, frequens.

Deser. Facies fere C. Coryli, sed elytra latiora, magis globosa, rostrum non-canaliculatum, &c. Magnitudo valde variat; majores C. raucum superant, alii, praesertim mares, triplo minores & ultra. Caput breve, latum nigrum, subtiliter crebre punctulatum, squamulis densis fuscis & cinereo albidis mixtis; pubescere tenui, erecta, cohectore te-  
ctum, fronte sub depresso, integra; rarius in ipso  
margin'e antico striola parva exarata; oculi parvi,  
globosi, brunnii; rostrum vix capite longius & pa-  
rum angustius, a fronte linea parva transversa; im-  
pressa, distinctam supra planum, non canalicula-  
tum, colore, punctura & indumento simili uti caput. Antennæ vix longitudine capitis cum thorace, fusco-  
ferruginea, pubescentes. Thorax brevissimus; trans-  
versus; basi aperteque truncatus; lateribus non oblique  
rotundatus, supra convexus, niger, crebre subtiliter  
rugoso punctatus, squamulis densis undique tectus,  
subtrus & in lineis duabus dorsalibus latissimis, arcuatis,  
cinereo-albidis, in interstitiis dorsalibus obscurius  
fuscus, & præterea pube terui, erecta, grisea, ob-  
tus. Scutellum parvum, angustum, nigrum. Ely-  
tra magna, abtice quidem thoracis basi partim la-  
tiora.

tiora, sed mox pone basin dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra, subtiliter punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime coricatis; tota squamulis densis omnino testa, & pube erecta, cinerea, antice tenui, posterius magis rigida, sub-setosa, adspersa; color squamulorum variat; plerumque interstitia dorsalia alterna fusca & cinereo-albida, unde elytra cinereo & fuscō lineata; latera inflexa fere semper albidiōra; interdum dorsum totum fuscō-squamosum, parum albido-variegatum; alia vice pagina tota superior albido-squamosa, vix fuscō-lineata. Corpus subtus nigro-piceum, subtiliter punctulatum, dense albido-squamulosum. Pedes crassiusculi, dense cinereo-squamulosi & pubescentes.

Obs. Occurrit saepe totus niger, sub-nitidus, indumento nempe omni, praesertim in elytris & feminoribus, detrito.

32. *C. Coryli*: niger, squamulis densis fusco-cinereisque variegatus, antennis pedibusque rufo-ferrugineis, fronte rossoque latis, sulcato-rugosis.

*Fabr. Eleut.* 2. 524. 98. *Herbst. Col.* 6. 349.  
322. *Tab. 87. f. 8. Payk. fn. 3. 287. 110.*  
*Panz. fn. 19. f. 12.*

*Circulio capitatus. De Gér Inf.* 5. 245. 32.  
*Bonsd. Cerc.* 2. 33. 23. *f. 24.*

Var. b, minor, griseus vel testaceus, cinereo-fuscoque variegatus; elytris macula baseos albida utrinque.

*Circulio Cervinus. Fabr. Eleut.* 2. 528. 121.  
*Curt.*

*Curculio retusus.* Marsh. Ent. Br. i. 306. 196.

Var. c, Corpore toto squamu*lis* concoloribus cinereis tecto.

*Curculio obesus.* Marsh. Ent. Br. i. 304. 191.

Var. d, niger, glaber, antennis pedibusque dilutius rufis; ferritus.

*Curc. trunculus.* Bonid. curc. 2. 33. 22. f. 23.

Habitat in arboribus, fruticibus & plantis; præferit in Corylo & Betula, ubique vulgaris.

Descri. Majores C, setosæ æquales, alii triplo aut quadruplo miuores. Caput breve, latum, nigrum, longitudinaliter valde rugosum, rugis sulcisque alternantibus, sulco vel canalicula media profundiori; totum squamu*lis* fusco cinereis omnino testum; oculi laterales, brunnei, valde prominuli; rostrum breve, latum, capite parum angustius, nec longius, nigrum, valde inæquale, canaliculatum & rugosum, ruga transversa a fronte distinctum, nigrum, basi squamu*lis* fusco-cinereis testum, apice magis nudum. Antennæ longitudine capitis cum thorace, tenues, rufo-ferrugineæ, cinereo-pubescentes. Thorax brevis, basi spicæque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra convexus, niger, opacus, crebre rugoso punctatus, squamu*lis* densis cinereis & pube brevissima, erecta, fusa, tectus, dorso lineis tribus obscurioribus, & squamu*lis* fuscis, notatus. Scutellum vix illum. Elvtra antice thoracis basi paulo latiora, & mox pone basin valde dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis convexis, sub-lævibus; tota squamu*lis* densis fuscis.

Inf. Syst. T. I. P. III. 

Elytra antice thoracis basi parum latiora, versus medium non nihil dilatata, thorace quintuplo longiora, supra anterius parum convexa, posterius magis gibbosa, nigra, striato-punctata, interstitiis sub-convexis, creberrime punctato-rugulosis, squamulis minimis fusco-depressis, omnino tecta, & praeterea in singulo interstitio series e squamulis latis, erectis, albidis, posterius majoribus & crebrioribus, unde evitra valde muricata. Corpus subtilis piceum, punctulatum, parce fusco-squamosum. Pedes fusco-ruginei, pubescentes, femoribus saepe obscurioribus, setosis.

Var. b, differt elytris cinereo & fusca obsolete tessellatis, & squamis erectis paucioribus, minoribus, versus posteriora tantum conspicuis.

Obs. Animalculum totum, praeter maculas densas, depressas, saepissime luto adglutinato tectum, unde canalicula rostri, foveolae thoracis & puncta striarum in elytris ante conspicua; indumento vero detrito, elytra evidenter punctato-striata, punctis majusculis, remotis.

### Familia 2·da femoribus dentatis.

#### Sectio 1·a Apteris.

36. C. Ligustici: niger, griseo-squamosus, rostro carinato, thorace granulato, elytris scabris, versus margines punctato-striatis.

Linn. Synt. 2. 615. 68. Fn. Sv. 621. Fabr.

Eleut. 2. 538. 188. Herbst. col. 6. 337. 310.

tab. 86. f. 7. De Gér. Ins. 5. 218. 10.

Payk. fn. 3. 274. 97. Bon. d. curc. 2. 38.

32. f. 33. Marsh. Ent. Br. 1. 313. 220.

Bra-

*Brachyrinus Ligustici. Latr. Gen. Inf. 2.  
257. 3.*

Var. b., Elytris maculis obsoletis cinereo-albidis variegatis.

Habitat sub lapidibus, locis aridis; etiam in plantis, præsertim Ligustico, sat frequens.

Descr. Inter maximos nostratum hujus generis. Caput breve, nigrum, rugoso-punctatum, squamulis depresso, griseis, piliformibus, adspersum, oculis brunneis, parum prominulis; rostrum capite dimidio longius, crassum, nigrum, rugoso-punctatum, a basi ultra medium carinatum, versus apicem canaliculatum, carinula nempe ibi bifida; apice emarginatum, squamulis similibus uti caput adspersum. Antennæ longitudine capitis cum thorace minus crassæ, nigro piceæ, cinereo pucecentes, articulo primo longissime, arcuato; clava apicis parva, acuminata. Thorax latitudine medii brevior, basi apiceque truncatus, lateribus valde rotundato-dilatatus, supra parum convexus, in medio dorsi longitudinaliter obsolete impressus, niger, undique tuberculis elevatis, rotundatis, in dorso majoribus, confertissime obsitus, pilisque rigidis, depresso, griseis, parce adspersus. Scutellum nullum. Elytra magna, ovata, antice thoracis basi paullo latiora, bumeris obliquis, & pone basin dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra, opaca, confertissime subtiliter granulata-tuberculata, versus margines rudo punctato-striata, pilis rigidis, vel squamulis piliformibus, depresso, griseo albidis, crebre adspersa. Corpus subtus nigrum, densius albido squamuoso. Pedes mediocrem nigri, cinereo pubescentes, femoribus elevatis, subtus versus apicem dente parvo armatis.

Var. b, rufo-brunneus seu ferrugineus, capite thoracisque disco fuscis, antennis pedibusque pallidis.

*Curculio eschinatus.* Bonsd. curt. 2. 3g. 21. f. 22.

Habitat in plantis & gramine non infrequens.

Descr. Parvus, C. lineollo brevior, sed in elytris crassior. Caput parvum, nigrum, punctatum, pilis rigidis, depressis, albidis tectum, fronte plana, non canaliculata; oculi nigri, parum prominuli; rostrum vix longitudine capitis, & illo paullo angustius, nigrum, punctatum, albido-pilosum, apice emarginatum. Antennae breves, crassi, dilute rufo-testaceæ, dense pilosæ. Thorax parvus, brevis, antice truncatus, basi bi-sinuatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra parum convexus, nigro-fusca, punctulatus, tubitus & lateribus late, margine antico & linea dorsali anguste, obsolete, albido-squamulosus, & præterea undique pilis crassis, erectis, spiniformibus, crebre adspersus. Scutellum minutum, piceum. Elytra magna, antice quidem thorace parum latiora, sed mox pone basin valde dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, sub-globosa, nigro-fusca, profunde punctato-striata, interstitiis planis, sub-lævibus, squamulis minutis, piliformibus, griseo-albidis, parce adspersa, & præterea pilis crebris, erectis, rigidis, spiniformibus, fuscis, undique muricata. Corpus subtus nigro-piceum, crebre punctulatum, parce cinereo-squamulosum. Pedes mediocres, pallide rufo-testacei, pubescentes.

Var. b, colore pallidiore tantum differt; caput, rostrum & thoracis dorsum fusca; elytra & corpus testaceo-ferruginea; antennæ & pedes dilute testacei.

35. *C. seabriculus*: ovatus, niger, dense fusco-squamulosus, antennis pedibusque fuscо-ferrugineis, thorace latiori, inaequali rostroque canaliculatis, elytris squamis erectis albidis seriatim, muricatis.

*Linn. Mant.* 2. 531. *Fabr. Eleut.* 2. 527. H4.

*Herbst col.* 6. 351. 324. *Tab.* 87. f. 10.

*Payk. fa.* 3. 285. 108. *Bonsd. curc.* 2. 32.

" 20. f. 21. *Marsh. Ent. Br.* 1. 304. 192.

Var. b. Elytris fuscо cinereoque obsolete tessellatis, posterius tantum muricatis.

*Curculio hispidulus.* *Herbst. Col.* 6. 354. 328. *tab.* 87. f. 14.

Habitat sub lapidibus & foliis deciduis, locis aridis, paucim.

Descr. Similis praecedenti, sed vere distinctas: thorace latiori rostroque canaliculatis, elytris longioribus, antice minus convexis, &c. Caput parvum, angustum, nigrum, depresso, crebre rugoso-punctatum, squamulis densis fuscis tectum; oculi nigri, sub-depressi; rostrum capite dimidio longius, sequi latum, nigrum, rugoso-punctatum, in medio sat profunde canaliculatum. Antennae breves, valde oratæ, dense pilosæ, fuscо-ferrugineæ. Thorax brevis, latus, antice angustior, truncatus, junta apicem transversim impressus, lateribus valde dilatato-rotundatus, basi sub-bispinatus, supra parum convexus, inaequalis, sat profunde canaliculatus, & versus latera utrinque foveola oblonga impressas, niger, creberrime subtiliter rugoso-punctatus, squamulis densis fuscis tectus, & præterea spinulis erectis, albidis, sparsis, muricatus. Scutellum nullum.

U 3.

Elytra

Elytra antice thoracis basi parum latiora, versus medium non nihil dilatata, thorace quintuplo longiora, supra anterius parum convexa, posterius magis gibbosa, nigra, striato-punctata, interstitiis sub-convexis, creberrime punctato-rugulosis, -squamuſis minimis fusco-depreſſis, omnino tecta, & præterea in fugo interſtitio ſeries e squamuſis latis, erectis, albiatis, posterius majoribus & crebrioribus, unde elytra valde muricata. Corpus tubiſus piceum, punctatum, parce fuſco-squamuſum. Pedes fuſco-ſerruginei, pubeſcentes, femoribus ſaepē obſcurioribus, fetofis.

Var. b, diſſert elytris cinereo & fuſco obſoleto teſſellatis, & ſquamis erextis paucioribus, minoribus, versus posteriora tantum conſpicuis.

Qbl. Animalculum totum, præter maculas denfas, depreſſas, ſaepiſſime luto adglutinato tectum, unde canalicula roſtri, foveolæ thoracis & puncti ſtriarum in elytris ante conſpicua; indumento vero detrito, elytra evidenter punctato-striata, punctis maſtuculis, remotis.

### Familia 2·da femoribus dentatis.

#### Sectio 1·a Apteri.

36. C. Ligustici: niger, grifeo-squamosus, roſtro carinato, thorace granulato, elytris ſcabris, verius margines punctato-striatis.

Linn. Syft. 2. 615. 68. Fu. Sv. 621. Fabr.

Eleut. 2. 538. 188. Herbf. col. 6. 337. 310.  
tab. 86. f. 7. De Géer Inf. 5 218. 10.

Payk. fn. 3. 274. 97. Bon. d. cur. 2. 38.  
32. f. 33. Marsh. Ent. Br. 1. 313. 220.

Bra-

*Brachyrinus Ligustici. Latr. Gen. Inf. 2.  
257. 3.*

Var. b., Elytris maculis obsoletis cinereo-albidis variegatis.

Habitat sub lapidibus, locis aridis; etiam in plantis, præsertim Ligustico, sat frequens.

Descr. Inter maximos nostratos hujus generis. Caput breve, nigrum, rugoso-punctatum, squamulis depresso-griseis, piliformibus, adspersum, oculis brunneis, parum prominulis; rostrum capite dimidio longius, crassum, nigrum, rugoso-punctatum, a basi ultra medium carinatum, versus apicem canaliculatum, carinula nempe ibi bifida; apice emarginatum, squamulis similibus uti caput adspersum. Antennæ longitudine capitis cum thorace minus crassæ, nigro piceæ, cinereo-pubescentes, articulo primo longissimo, arcuato; clava apicis parva, acuminata. Thorax latitudine medii brevior, basi apiceque truncatus, lateribus valde rotundato-dilatatus, supra parum convexus, in medio dorfi longitudinaliter obsolete impressus, niger, undique tuberculis elevatis, rotundatis, in dorso majoribus, confertissime obtusus, pilisque rigidis, depresso-griseis, parce adspersus. Scutellum nullum. Elytra magna; ovata, ante thoracis basi paullo latiora, humeris obliquis, & pone basin dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra, opaca, confertissime subtiliter granulato-tuberculata, versus margines rude punctato-striata, pilis rigidis, vel squamulis piliformibus, depresso-griseo-albidis, crebre adspersa. Corpus subtus nigrum, densius albido squamułosum. Pedes mediocres nigri, cinereo-pubescentes, femoribus elevatis, subtus versus apicem dente parvo, armatis.

Elytra antice thoracis basi parum latiora, versus medium nonnihil dilatata, thorace quintuplo longiora, supra anterius parum convexa, posterius magis gibbosa, nigra, striato-punctata, interstitiis sub-convexis, creberrime punctato-rugulosis, squamulis minimis fusca, depresso, omnino testa, & praeterea in fuguulo interstitio series e squamulis latis, erectis, albidis, posterius majoribus & crebrioribus, unde elytra valde muricata. Corpus subitus piceum, punctulatum, parce fusco-squamulosum. Pedes fusco-ferruginei, pubescentes, femoribus saepe obscurioribus, setosis.

Var. b, differt elytris cimereo & fusco obsolete tessellatis, & squamis erectis paucioribus, minoribus, versus posteriora tantum conspicuis.

Obs. Animalculum totum, praeter maculas densas, depresso, saepissime luto adglutinato tectum, unde canalicula rostri, foveolæ thoracis & puncta striarum in elytris ante conspicua; indumento vero detrito, elytra evidenter punctato-striata, punctis majusculis, remotis.

### Familia 2·da femoribus dentatis.

#### Sectio 1·a Apteris.

36. C. Ligustici; niger, griseo-squamosus, rostro carinato, thorace granulato, elytris scabris, versus margines punctato-striatis.

Linn. Synt. 2. 615. 68. Fn. Sv. 621. Fabr.

Eleut. 2. 538. 188. Herbst. col. 6. 337. 310.  
tab. 86. f. 7. De Geer. Ins. 5. 218. 10.

Payk. fn. 3. 274. 97. Bon. d. cur. 2. 38.  
32. f. 33. Marth. Ent. Br. 1. 313. 220.

Bra-

*Brachyrinus Ligustici. Latr. Gen. Inf. 2.  
257. 3.*

Var. b, Elytris maculis obsoletis cinereo-albidis variegatis.

Habitat sub lapidibus, locis aridis; etiam in plantis, præsertim Ligustico, sat frequens.

Descr. Inter maximos nostratum hujus generis. Caput breve, nigrum, rugoso-punctatum, squamulis depresso, griseis, piliformibus. adspersum, oculis brunneis, parum prominutis; rostrum capite dimidio longius, crassum, nigrum, rugoso-punctatum, a basi ultra medium carinatum, versus apicem canaliculatum, carinula nempe ibi bifida; apice emarginatum, squamulis similibus uti caput adspersum. Antennæ longitudine capitis cum thorace minus crassæ, nigro piceæ, cinereo pucescentes, articulo primo longissimo, arcuato; clava apicis parva, acuminata. Thorax latitudine medii brevior, basi apiceque truncatus, lateribus valde rotundato-dilatatus, supra parum convexus, in medio<sup>1</sup> dorsi longitudinaliter obsolete impressus, niger, undique tuberculis elevatis, rotundatis, in dorso majoribus, confertissime obsitus, pilisque rigidis, depresso, griseis, parce adspersus. Scutellum nullum. Elytra magna, ovata, ante thoracis basi paullo latiora, bumeris obliquis, & pone basin dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra, opaca, confertissime subtiliter granulato-tuberculata, versus margines rude punctato-striata, pilis rigidis, vel squamulis piliformibus, depresso, griseo albidis, crebre adspersa. Corpus subitus nigrum, densius albido squamufosum. Pedes mediocres nigri, cinereo pubescentes, femoribus clavatis, subtus versus apicem dente parvo armatis.

Var. b, differt tactum squamulis elytrorum hinc inde in maculas condensatis, unde elytra fusco- & griseo variegata apparent.

37. *C. nubilus*: niger, opacus, dense cinereo-squamulosus, antennis tenuibus ruopicis, thorace subtiliter coriaceo, sub-carinato, elytris puratato-striatis, maculis fusco-squamosis tessellatis.

Fabr. Eleut. 2. 538. 191. Herbst. col. 6. 335.

309. tab. 86. f. 7. Payk. fa. 3. 273. 96.

Panz. fn. 107. f. 5.

*Curculio tessellatus*. Bonsd. ent. 2. 38. 31. f. 32.

Var. b, paullo minor, squamulis elytrorum albidioribus, magis condensatis.

*Curculio Chrysopterus*, Herbst. col. 6. 339. 312. tab. 86. f. 10.

*Curculio floccosus*. Marsh. Ent. Br. 1. 314. 222.

Var. c, piceus, antennis, elytris pedibusque brunneis vel ferrugineis, detritus.

Habitat in plantis, locis umbriosis, passim.

Descr. Major, G. Ligustici saepe aequalis; variat tamen diuidio minor & ultra. Caput nigrum, subtiliter coriaceum, squamulis piliformibus, depresso, cinereis adspersum, fronte inter oculos sovella parva impressa; oculi brunnei, parum prominuli; rostrum capite paullo longius, apicem versus incrassatum, totum nigrum, supra planum, subtiliter coriaceum, cinereo-squamulosum. Antennae capite cum thorace paullo longiores, fenes, rufopicæ, clava obscuriori, valde acuminata. Thorax brevis, basi picea

piceque truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, supra in medio transversim convexus, niger, opacus, crebre subtiliter granulato-coriaceus, squamulis angustis, depresso, cinereis, versus latera & subtus densioribus, tub. metathoracis, tectus; in medio dorsi linea elevata, abbreviata, saepe obsoleta. Scutellum triangulare, nigrum, dense cinereo-squamulosum. Elytra magna, antice thoraci basi fere dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, apice acuminata, supra valde convexa, praesertim posterius, tota nigra, regulariter punctato striata, interstitiis subtilissime coniunctis; squamulis minutis cinereis densis tecta, & in sutura interstitiisque alterne, 2, 4 & 6 a sutura, serie e maculis fusco-squamosis tessellata. Corpus subtus nigro-piceum subtiliter coriaceum, squamulis cinereo albidis, in pectore saepe in talico-nitidis, adspersum. Pedes nigri, cinereo-pubescentes, femoribus dente parvo armatis.

Var. b, pauculo minor; squamuæ, praesertim clytrorum densiores & albidiores, unde interstitia alterna evidenter tessellata apparent.

Var. c: tantum colore dilutiori differt, ut in diagnosis dictum; saepe magis nuda, aqua & frictione, squamulis orbata.

38. *C. fulcatus*: oblongus, niger, antennæ, piceis, rostro sulcato, thorace oblongo, tuberculato, clytris profunde sulcatis, maculis sparsis pallido-pilosis.

*Kahr. Eleent. 2. 539. 197. Herbft. col. 6. 347.*

*319. tab. 87. f. 5. Marth. Ent. Br. 1. 315.  
224.*

*Curculio griseo-punctatus.* *De Gér Inf. sc  
247. 9.*

U. 5.

Habitas

Habitat in Svecia australi ratus. Dom.  
*De Geér.*

Deser. Præcedentibus parum brevior, sed angustior, & minus convexus. Caput breve nigrum, parce punctulatum & pubescens, fronte inter oculos foveola impressa; oculi brunnei, parum prominuli; rostrum capite parum longius, crassum, apice dilatatum, nigrum, rugoso-punctatum, cinereo pubescens, supra sulco lato & profundo exaratum. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassulæ, piceæ seu fusco ferrugineæ, pubescentes, clava parva, acuta. Thorax latitudine multo longior, basi apiceque truncatus, lateribus perparum rotundatus, supra subdepressus, in medio obsolete canaliculatus, totus niger, undique tuberculis crebris elevatis, subnitidis, granulatus, pilisque parvis cinereo pallidis adpersus. Scutellum minutum nigrum. Elytra thorace fere dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra dorso parum convexa, nigra, sat profunde sulcata, interstitiis sulcisque valde rugoso-tuberculatis; maculæ parvæ, irregulares, e pilis pallide ferrugineis, depressis, absque ordine undique sparsæ. Corpus subtus nigrum, obsolete punctulatum, parce cinereo-pubescentes. Pedes longiusculi, nigri, cinereo-pubescentes, femoribus obtuse dentatis.

39. *C. æneo-punctatus*: brevior, niger, cinereo-pubescentes, rostro sub-carinato, thorace breviori, granulato, elytris ovatis, obsolete sulcatis, maculis sparsis, æneo-unicantibus, femoribus acute dentatis.

*Curculio sulcatus.* Payk. fn. 3. 275. 98. Bonsd.  
*curc.* 2. 40. 34. f. 35. Habi-

## Habitat in plantis &amp; fruticibus passim.

Deser. Præcedente dimidio fere minor præser-tim brevior, convexior, & ab unde distinctus. Caput breve, nigrum, fronte plana, punctata, pilis depresso-sinereis adspersa, vertice sub-lævi, glabro; oculi ma-juscuii, brunnei, sub prominuli; rostrum capite vix longius, crassum, apice dilatatum, nigrum, supra planum, rugoso-punctatum, cinereo-pilosum, carina-ta tenui, apice bifida, rotatum. Antennæ longitudi-nine dimidiæ corporis, nigro-piceæ, extrosum fusceæ, pubescentes. Thorax latitudine mediæ non longior, basi apiceque truncatus, lateribus dilatato rotundatus, supra convexus, totus niger, tuberculis parvis, elevatis, crebre granulatus, pilis minutis, depresso-sinereis parce adspersus. Scutellum minutum, depresso-sum, nigrum, Elytra ovata, antice thoracis basi pa-rum latiora, ante medium dilatata, thorace quadru-plo longiora, supra convexa, nigra, obsolete sulcata, interstitiis creberrime tuberculato-rugosæ; pilis depresso-sinereis parce adspersa, & præterea maculis sparsis e squamulis argenteo-aeneis, interdum cupreis, ornata. Corpus subtus nigrum, obsoleta punctula-tum, pilis parvis sinereis adspersum. Pedes medi-cræs, nigri, cinereo-pubescentes, femoribus clavatis, dente valido, acuto armatis,

Obs. E Germania, sub nomine: C. Silesiacus Me-gerlei, pluries missus.

40 C. Lepidopterus: oblongus, niger, squamulis argenteo-virescentibus tectus, pedibus fusis, acute dentatis, thorace sub-globoso, granulato, elytris obsolete stria-tis, interstitiis rugosis.

*Fabr. Eleut. 2, 541. 207. Herbst. col. 6. 362.*

373.

337: tab. 88, f. 8. Payk. fn. 3. 276. 99.  
Panz. fn. 26, f. 19.

Habitat in Dalekarlia & vicinitate Alpium,  
Dom. de Paykull.

Descr. Præcedente vix brevior, sed angustior.  
Caput bréve, nigrum, fronte plana, rugoso-punctata,  
pilis depressis cinereis, & squamulis argenteo-vire-  
scéntibus testa; oculi parvi, brunnei, parum promi-  
nuli; rostrum capite longius, nigrum, rugoso-pun-  
ctatum, apice incrassatum, supra pilis & squamulis  
similibus uti caput, tectum, carinula tenui elevata,  
apice bifida, notatum. Antennæ dimidio corpore fere  
longiores, tendes, piceæ, cinereo-pubescentes. Tho-  
rax latitudine mediæ non longior, basi apiceque trun-  
catus, lateribus nonnihil rotundatus, supra valde con-  
vexus, pulvinatus, totus niger, crebre granulato-tu-  
berculatus, dorso pilis depressis cinereis parce adspers-  
sus, lateribus & subtus squamulis densis argenteo-  
virescentibus tectus. Soutellum minutum, depresso.  
Elytra oblongo-ovata, antice thoracis basi parum la-  
tiora; sed mox pone basin dilatata, thorace quadru-  
plo longiora, supra dorso antico minus convexa,  
tota nigra, obsolete striata, intersticiis crebre seria-  
tum rugoso-tuberculatis, undique squamulis argenteo-  
subvirescentibus, nitidis, densis testa. Corpus subtus  
nigrum, subtiliter rugoso-punctatum, pilis cinereis  
depressis adpersum, pectoris lateribus argenteo-squa-  
mosis. Pedes saturate rufi, genubus fuscis, femori-  
bus clavatis, omnibus dente parvo, acuto, armatis.

C. Zebra: oblongus, niger, pilis squa-  
mulisque cinereo-albidis variegatus, tho-  
race granulato, sub-carinato, elytrorum  
futura postica carinata, femoribus apticis  
crassis, dentatis. *Fabr.*

Fabr. Eleut. 2. 538. 189. Herbst. tol. 6. 361.  
336. Tab. 88. f. 7. Payk. fn. 3. 278. 101.

Habitat in Svecia Australi, rarius.

Descri. Statura & similitudo præcedentis, plerumque paullo minor, thorace longiori, elytrorumque sutura postice carinatis, femoribus anticis crassioribus, valide dentatis, &c. distinctus. Caput nigrum, rugoso punctatum, fronte cinereo pubescente, inter oculos foveola impressa; oculi majusculi, brunnei, parum prominuli; rostrum vix longitudine capitis, nigrum, rugoso punctatum, cinereo-pubescentia. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassiusculæ, fusco-ferrugineæ, pubescentes. Thorax latitudine fere longior, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus; supra modice convexus, niger crebre rugoso-punctatus, pilis depresso cinereis, & ad latera squamulis macantibus adspersus, lineola dorsali elevata, plerumque abbreviata, saepè obsoleta. Scutellum vix ullum. Elytra antice thoracis basi parum latiora, versus medium nonnihil dilatata, apice attenuata, thorace triplo longiora, supra modice concrexa, nigra, rude punctato-striata, interstitiis crebre transversim rugosis; pilis depresso cinereis adspersa, & præterea maculis irregularibus, transversis, e squamulis albidis, saepè metallico-nitentibus, variegata; sutura communis ante apicem elevato-carinata, pilosa. Corpus subtus piceum, punctulatum, cinereo-pubescentia, pectoris lateribus argenteo-squamosis. Pedes longiusculi, picei vel fusco-ferruginei, cinereo-pebescentes, femoribus anticis magnis, clavatis, dente valido, acuto armatis; posterioribus sub-maculatis.

42. C. picipes: oblongo-ovatus, piceus,  
densè fusco-cinereoque squamosus, thora-

ce granulato, elytris sulcatis, ocellato punctatis, pedibus rufo-piceis, femoribus subdentatis.

*Fabr. Eleut.* 2. 546. 201. *Herbst. col.* 6. 359.  
334. *Tab. 88. f. 5.* *Payk. fn.* 3 293. 117.

*Curculio singularis.* *Linn. suct* 2. *edd.* 1066. 3.

*Curculio notatus.* *Bonsd. curc.* 2. 39. 33. f. 34.

*Curculio Aper.* *Marsh. Ent. Br.* 1. 301. 181.

Habitat in umbrosis, sub lapidibus & foliis deciduis, etiam in plantis & fruticibus, passim, minus frequens.

*Descr.* Statura omnino C. fulcati, sed duplo minor & ultra. Caput porrectum, nigrum, fronte sub rugosa, squamulis cinereis adpersa, inter oculos foveola oblonga impressa; oculi brunnei; parum prominuli; rostrum vix longitudine capitis, crassum; piceum, sub-rugosum; cinereo-squamulosum. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassissimæ, fusco-piceæ, cinereo-pubescentes. Thorax latitudine medii fere longior, basi apiceque truncatus; lateribus rotundato-dilatatus; supra valde convexus, pieus crebre tuberculatus, squamulis fusco cinereis, subtus & ad latera densis tectus, in dorso rarioribus; in medio dorsi canalicula longitudinalis obsoleta. Scutellum nullum. Elytra ovata, antice thoracis basi parum latiora, sed pone basin dilatata, thorace triplo longiora, supra dorso antico parum convexa, pieca, squamulis densis fuscis cinereisque omnino testa; & absque ordine variegata, pilisque subelevatis hirta; in quovis elytro series decem punctorum ocellatorum, puncto singulo e squamulis pallidius grisea, orbiculata, circulo depresso cincta; constantes, & in quovis interstitio series alia e tuberculis parvis elevatis.

elevatis, glabris, piceis; indumento omni detrito, elytro late & sat profunde sulcata, sulco singulo serie e punctis majusculis impressis, interstitiis elevatis transversim rugosis. Corpus subtus piceum, punctulatum, griseo-pubescentes, pectoris lateribus cinereo-squamosis. Pedes longiusculi, dense cinereo-pubescentes, jam picei, jam dilutius ferruginei, femoribus clavatis, anticis dente obtuso armatis, posterioribus sub muticis.

43. *C. rugifrons*: niger, opacus, parce cinereo-pubescentes, elytris punctato-striatis, dorso sub-depressis, fronte rostroque longitudinaliter rugosis, femoribus dente parvo, acuto, armatis.

Var. b. rufo-piceus, pedibus dilutius ferrugineis.

Habitat sub lapidibus, in Gottlandia ad Siltö, Dom. Wetterhall; in Bahusiae, Halandiae littoribus marinis, ipse.

Defcr. Statura C. ovati, sed paullo major, opacus, fronte rugosa, antennis crassioribus, femoribus denticulo tantum parvo armatis, &c. abunde distinctus. Caput porrectum, nigrum, vertice laevi, fronte rostroque supra planis, lineis plurimis elevatis, tenuibus, irregularibus notatis, pilisque paucis cibereis depressis adspersis; oculi parvi, depresso-brunnei; rostrum vix capite longius, crassum, nigrum, apice dilatatum. Antennae longitudine fere dimidii corporis, crassiusculæ, nigrae. Thorax vix latitudine longior, basi apicèque truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, supra convexus, totus niger, opacus, crebre & rude rugoso-punctatus, lateribus fe-

re tuberculatus; pilis paucis cinereis depressis adspersus; Scutellum nullum. Elytra antice thoracis basi parum latiora, sed versus medium rotundato-dilatata, thorace fere quadruplo longiora; supra dorso antico subd. pressa; tota nigra, opaca; punctis oblongo-quadratis sticta; interstitiis rugoso-tuberculatis, pilis cinereis, suberectis; striatis, adsparsis. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, parcus pubescens. Pedes longiusculi; femoribus parum clavatis, nigris, nitidis, omnibus subtus dente parvo, acuto-armatis; tibiis tarvisque piceis, cinereo-pubescentibus.

Var. b, differt tantum colore dilutioni; brunneo vel fusco-piceo; antennis pedibusque rufo-ferrugineis.

44. *C. ovatus*: niger, subnitidus, antennis pedibusque rufo-ferrugineis, fronte rostroque subtilissime coriacis, thorace sub-globoso; rugoso; femoribus valde dentatis.

Linn. Synt. 2. 615. 69. Fn. SÜ. 626. Fabr. Ent. leut. 2. 544 224. Herbst. col. 6. 357. 331. tab. 88. f. 2. Pöyk. fn. 3 277. 100. Bonsd. Curt. 2. 35. 25. f. 26. Marsh. Ent. Br. 1. 315. 223.

*Carculio Roze*. De Geer Ins 5. 219. ii.

Var. b, ferrugineus, antennis pedibusque pallide testaceis.

Curt. pabulinus. Panz. fn. 57. f. 19. Crit. Rev. 1. 133.

Habli-

**Habitat sub lapidibus, foliis deciduis, etiam  
in plantis & fruticibus, sat frequens.**

Defer. Minor. Capitum prorectum, nigrum, verice laevi, fronte rostroque supra depresso, subtiliter rugoso-punctatis, pilis parvis cinereis parce adspersis; oculi parvi, nigri, parum prominuli; rostrum capite fere brevius, crassum, nigrum. Antennae dimidio corpore fere longiores, minus crassae, rufo-ferrugineæ. Thorax latitudine medii vix longior, basi apieequaque truncatus, lateribus rotundato dilatatus, supra valde convexus, sub-globosus, totus niger, sub-nitidus. tuberculis elevatis confertissime obsitus, in medio dorsi plerumque in rugas longitudinales confluentibus, pilis paucis, minutis, cinereis adspersus. Scutellum nullum. Elytra ovata, antice thoracis basi parum latiora, sed mox dilatata, thorace triplo longiora, supra convexa, dorso tamen antico sub-depressa, nigra vel nigro-picea, sub nitida, rude punctato-striata, interstitiis rugoso granulatis, pilis parvis cinereis parce adspersis. Corpus subtus nigro-piceum, punctulatum, parum pubescens. Pedes elongati validi, rufo-ferruginei, femoribus crassis, clavatis, praesertim anticis, omnibus dente valido, elongato, acuto armatis.

Var. b, colore dilutiori tantum differt, jath obsecruius, jam pallidius ferrugineus, antennis pedibusque adhuc pallidioribus; forte nuper exclusus.

45. *C. muricatus*: oblongo-ovatus, fusco-piceus, dense cinereo squamosus, antennis pedibusque fusco-ferrugineis, thorace brevi, angusto, elytris punctato-striatis, setis erectis hispidis.

Fabr.

*Inj. Svec. T. I. P. III.* X

*Fabr. Eleut. 2. 544. 223. Herbft. col. 6. 351.  
323. tab. 87. f. 9. Payk. fn. 3. 279. 102.*

*Curculio asperatus. Fabr. Eleut. 2. 541. 205.  
Bonsd. curc. 2. 34. 24. f. 25.*

Habitat in Sylvaticis, sub foliis deciduis,  
etiam in plantis & fruticibus, locis um-  
brofis, passim.

Deser. C. Coryli paullo major, præfertim lon-  
gior. Caput porrectum, nigro-piceum, subtiliter ru-  
goso-punctatum, squamulis cinereis nitidis omnino  
tectum; oculi brunnei, parum prominuli; rostrum  
longitudine capitis, & vix illo angustius, nigrum, ru-  
goso-punctulatum, supra planum, fere impressum,  
ultra medium squamulis cinereis tectum, apice nu-  
dum, nigrum. Antennæ longitudine dimidit corpo-  
ris, tenues, rufo-ferrugineæ, clava obscurior, acumi-  
nata. Thorax parvus, sub cylindricus, latitudine bre-  
vior, basi apiceque truncatus, lateribus perparum di-  
latatus, supra convexus, piceus, crebre subtiliter ru-  
goso-punctatus, squamulis densis cinereis nitidulis,  
versus latera & in linea media dorsali albidioribus,  
tectus. Scutellum parvum, triangulare, piceum, ci-  
nereo-squamulosum. Elytra oblongo-ovata, ante  
thoracis basi parum latiora, sed mox pone basin di-  
latata, thorace quintuplo longiora, supra convexa,  
dilutius rufo-picea, regulariter punctato striata, inter-  
stitiis sub lœvibus; tota squamulis densis fuscis tecta,  
aliisque immixtis cinereis plus minusve variegata,  
& præterea in singulo interstitio serie e pilis crebris  
erectis, rigidis, fusco cinereis muricata. Corpus sub-  
tus piceum, punctulatum, pectoris lateribus dense,  
ventre parcus cinereo squamosis. Pedes elongati, aut  
rufo ferruginei toti, aut femoribus fusco piceis; fe-  
mora longa, clavata, subtus dente parvo armata.

Sectio

## Sectio 2:da, Alati.

46. C. Pyri: oblongus, niger; squamulis angustis viridi-sericeis tectus, antennis pedibusque rufo-ferrugineis, femoribus crassis, dente valido armatis.

*Linn. Syst. 2. 615. 72. Fabr. Eleut. 2. 541. 210.*

*Herbst. col. 6. 259. 226. tab. 79. f. 2. a, b.*

*Payk. fn. 3. 280. 103. Panz. fn. 107 f. 4.*

*Circ. ærrginojns. Pensd. circ. 2. 23. 7. f. 8.*

*Circ. Cæsius. Marsh. Ent. Br. 1. 318. 232.*

Var. *b*, Corpore squamulis cœruleo-virentibus tecto, femoribus basi apiceque, tibiisque nigro-fuscis.

Var. *c*, Squamulis ut in *b*, pedibus totis nigris. *Payk. loc. cit. var. b.*

*Circ. alneti. Fabr. Eleut. 2. 542. 211. Herbst. col. 6. 260. 227. tab. 79 f. 3.*

*Circ. Cnides. Marsh. Ent. br. 1. 318. 231.*

Habitat in umbrosis humentibus, præstimum in soliis Alni, spireæ Ulmariae, &c., passim; var. *c* apud nos rarius occurrit.

Descri. Statura & affinitas C. argentati, sed duplo imo triplo major, squamulæ angustæ, piliformes, & pubescentia erecta vix illa. Caput porrectum, nigrum, subtiliter rugoso-punctatum, squamulis angustis, piliformibus, depresso, viridi-sericeis tectum, fronte obsolete carinata; oculi brunnei, sat prominenti; rostrum longitudine capitis, crassum, nigrum, similiter uti caput punctulatum & squamulosum, in-

ter antennas foveola oblonga impressum. Antennæ longitudine dimidii corporis, tenues, jam totæ dilute ferrugineæ, jam bæsi apiceque obscurius fulcæ. Thorax parvus, antice paullo angustior, bæsi apiceque truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra in medio transversim convexus, antice posticeque depresso, torus niger, crebre subtiliter rugoso punctatus seu coriaceus, squamuis similibus uti caput omnino tectus. Scutellum triangulare nigrum, viridi squamosum. Elytra elongata, thorace ad minimum sextuplo longiora, & illo dimidio latiora, humeris prominulis, supra convexa, nigra, regulariter punctato striata, interstitiis subtilissime coriacis; tota squamulis minutis, brevioribus, viridi sericeis, omnino tecta, pilis vero erectis nullis, nisi in ipsa futura, versus apicem. Aëre longæ, hyalinæ, costa antica flavescente. Corpus subtus nigrum, subtilissime coriaceum, ano rufo-piceo, pectore abdominisque bæsi dense viridi squamosis. Pedes crassiusculi, femoribus validis, saepe apice viridi-squamosis, subtus dente magno, acuto armatis; jam toti rufo-ferruginei, jam tibiis, præsertim anticus, nigro fuscis.

Var. b. obscurior, squamulis coeruleo-virescentibus, parum nitidis, testa; femora plerumque bæsi & apice ut & tibiæ & tarsi nigro-picei.

Var. c, ut var. b, sed femora tota nigra; cætera omnino convenient, adeoque vix specie distincta.

Obs. Ex comparatione cum C. argentato, in Syst. Nat. 2. 615 73. videtur Cl. a Linneum speciem jam descripsam ut C. Pyri inspexisse; in Fauna Svecica vero, N:o 623, certe C. micantem Fabricii descripsit.

47. *C. argentatus*: oblongus, niger, Squamuis rotundatis viridi-argenteis - tectus, pilis-

pilisque erectis adspersus, antennis crassiusculis, tibiis tarsisque flavescentibus, femoribus valide dentatis.

*Linn. Syst. 2. 615. 73. Fn. Sv. 624. Fabr. E. cut. 2. 543. 220. Herbst. col. 6. 260. 228. tab. 79. f. 4. Payk. fn. 3. 283. 106. Bonst. curc. 2. 27. 12. f. 12.*

*Curc. Uticæ. De Géer Ins. 5. 219. 12.*

Var. b, femoribus etiam flavo-testaceis.

*Curc. argenteatus. Marsh. Ent. br. 1. 318. 233.*

Var. c, corpore squamis pallide cinereo-argenteis tecto.

Var. d, corpore squamulis cœruleo-virescentibus tecto, antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis. *Payk. loc. cit. not.*

Var. e, ut var. d, sed tibiæ etiam nigropiceæ.

Habitat in arboribus, fruticibus & plantis, ubique frequens.

Déscr. Statura oblonga præcedentis, sed, ut dictum, duplo minor & ultra, squamulis brevibus, rotundatis, & pilositate erecta præterea distinctus. Caput oblongum, porrectum, nigrum, crebre, subtilissime coriaceum, squamulis parvis, rotundatis, viridi argenteis sive fericeis, nitidis, tectum, & præterea pilis tenuibus, erectis, pallidis adspersum; oculi nigro-brunnei, sat prominuli; rostrum capite brevius & paullo angustius, nigrum, subtiliter coriaceum, supra obsolete canaliculatum, squamulis & pilis similibus uti caput tectum. Antennæ dimidio cor-

pore fere longiores, crassissimæ pallide testaceæ sunt escentes, articulo primo longe elevato, a cuarto. Thorax parvus, brevis, b si apiceque truncatus, lateribus non iuxta dilatatus, supra in medio transversim convexus, intra basin & apicem impressus, marginæ antice posticisque sub elevato; totus niger, subrufissime coriaceus, indumento simili uti caput omnino testaceus. Scutellum rotundatum, rigrum, similiter squamułosum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris prominulis, & illo fere sextuplo longiora, supra convexa, nigra, regulariter, sed parum profunde punctato-striata, interstitiis planis, levibus; tota squamułis & pube uti caput & thorax testa. Antæ longæ fuscescentes. Corpus subtus nigro, subtilissime coriacum, squamułis & pube uti supra versus latera tectum, ventris medio & postico magis nudis. Pedes validi, femoribus crassis, clavatis, nigris, viridi-squamosis, dente valido, acuto, armatis, tibialis tarfisque pallidis vel flavescentibus.

Var. b, differt tantum femoribus etiam flavo-testaceis.

Var. c, colore squamularum pallidiori, cinereo-argenteo, differt; cætera ut in a.

Var. d, squamułis coeruleo-virescentibus testa, antennæ, tibiæ & tarsi saturatius ferruginei.

Var. e, etiam squamułis coerulecentibus, minus nitidis, testa; antennæ & tibiæ obscurius piceæ, tarsis solis dilutioribus.

Obs. In omni varietate occurunt specimina triplo aut quadruplo minora.

48. R. sericeus; oblongus, niger, squamułis rotundatis viridibus opacis tectus, antennis tenuibus, pedibusque pallide testaceis, femoribus sub-dentatis.

Schall.

*Schall. Act. Hall. l. 286.*

Habitat in Arbustis Hallandiæ, Scaniæ, ratius.

Descr. Majoribus præcedentis speciei individuis æqualis & similis, abunde tamen differt, antennis tenuioribus, femoribus minus crassis, obsolete tantum dentatis, defectu pubescentiæ erectæ corporis, &c. C. flavipedi, antea sub N:o 8 descripto, adhuc magis similis, sed rostro longiori, pubescentiæ defectu, femoribus sub-dentatis, etiam ab illo bene distinctus. Caput oblongum, porrectum, nigrum, subtiliter coriaceum, squamulis parvis, rotundatis, saturate viridibus, minus nitidis testum, fronte inter oculos foveola impressa; oculi brunnei, parum prominuli; rostrum vix longitudine capitinis, & illo angustius, rotundatum, colore, punctura & indumento simili uti caput. Antennæ longitudine dimidii corporis, pallide testaceæ, clava angusta, acuminata, nigricante; articulus primus sub rectus, clavatus, vix tertiam partem totius excedit. Thorax latitudine vix brevior, basi apiceque truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra parum convexus, sub-æqualis, versus basin & apicem obsoletissime impressus, totus niger; subtiliter coriaceus, squamulis similibus uti caput testus. Scutellum rotundatum, nigrum, laxe, viridi-squamosum. Elytra magna, thoracis basi plus quam dimidio latiora, humeris prominulis, & illo sextuplo longiora, supra convexa, præsertim posterius, ubi sutura elevata, sub-carinata; nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis sub lævibus, squamulis rotundatis, saturate viridibus, sub-opacis, testis, striis vero nudis, punctis conspicuis, nigris. Corpus subtus nigropiceum, dense viridi-squamosum, ano magis nudo, dilutius testaceo. Pedes mediocres, toti pallide testacei, femoribus parum crassis, extus viridi-squamo-  
sis, subtus dente parve, obsoletq; armatis; tibæ an-

ticæ reliquæ longioræ, arcuatæ; postice rectæ, intus longius pilosæ.

49. *R. micans*; niger, squamulis angustis, aureo-igneis adspersus, antennis brevioribus, tenuibus pedibusque rufis, femoribus posticis sub-dentatis, elytris magnis, posterius gibbosus.

*Fabr. Eleut.* 2. 519. 75. *Herbst. col.* 6. 249.  
214. *tab. 78. f. 3.* *Payk. fn. 3.* 302. 125.  
*Panz. fn. 19. f. 9.*

*Curc. Pyri.* *Linn. Fn. Sv. 623.* *De Gér Inf.*  
5. 246. 34. *Bonsd. curc.* 2. 24. 8. f. 9.

Var. b, squamulis obscurioribus, cinereo-argenteis, interdum griseis, adspersus.  
*Payk. Bonsd. loc. cit.*

Habitat in foliis Pyri, Pruni, Padi, aliisque, sœpe copiosissimus, folia commaculans, dilacerans.

Descr. C. Pyri brevior, sed in elytris latior, posterius magis gibbosus. Caput oblongum, porrectum, nigrum, crenulatum, squamulis angustis, piliformibus, depresso, aureo-igneis adspersum, oculis brunneis, modice prominulis; rostrum capite paulo brevius & angustius, colore, punctura & indumento capitis. Antennæ vix longitudine capitis cum thorace, tenues, pallide testaceæ, clava acuminata fusca. Thorax parvus, angustus, brevis, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra modice convexus, æqualis, niger, creberrime & profunde punctatus, squamulis similibus ati caput, parce

parce adspersus. Scutellum rotundatum, nigrum, aureo-squamulosum. Elytra magna, antice thoracis bafi fere duplo latiora, humeris prominulis, posterius adhuc magis dilatata, thorace sextuplo longiora, apice acuminata, supra valde convexa, præfertim posterius sub-gibbosa, aut nigra, aut dilutius rufopicea, regulariter crenato striata, interstitiis lævibus, squamulis paullo latioribus & brevioribus quam in thorace, etiam densioribus, aureo-igneis, certo situ cinereo-argenteis, micantibus fere tecta. Corpus subtrus piceum, subtilissime punctulatum, pectoris lateribus dense, ventre parcius metallico-squamulosus. Pedes mediocres, toti rufo-testacei, femoribus subclavatis, posticis dente parvo armatis.

Var. b, differt tantum squamularum colore, aut cinereo virescente, aut cinereo-argenteo, rarius tantum cinereo, parum metallico-nitente; indumento omni detrito, corpus nigrum, glabrum, ut in var. b, Bonsdorffii; latera tamen pectoris, etiam in his, metallico-squamosa.

50. *C. Rubi*: ovatus, niger, squamulis glauco-argenteis undique tectus, antennis pedibusque testaceis, femorum clava nigricante, posticorum dentata, thorace convexo, rotundato.

Habitat in Rubo Cælio Scaniæ, rarius;  
Dom Wetterhall.

Descr. Statura convexa fere C micantis, sed parvus, C. viridicollis minor. Caput breve, latum, convexum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, squamulis albido-argenteis testum; oculi parvi, branhei, pupilla prominenti; frons inter oculos impressa; rostrum breve, crassum, paullo angustius, nigrum, rugoso-

punctatum, similiter ac caput squamosum. Antennæ vix longitudine capitis cum thorace, rufo-testaceæ, extorsum fuscescentes. Thorax latitudine medijs paullo brevior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra convexus, pulvinatus, fere sub globosus, niger, crebre & sat profunde punctato-rugosus, squamis glauco-argenteis, nitidis, undique tectus. Elytra antice thoracis medio paullo latiora, humeris rotundatis, thorace plus triplo longiora, ultra medium dilatata, apice acuminata, supra valde convexa, præfertim posterius, ubi sutura carinato-elevata, tota nigra, regulariter & sat profunde punctato-striata, intersticiis planis, sub lævibus, squamis densis glauco-argenteis omnino tecta. Corpus subtus nigro-piceum, subtiliter punctulatum, squamulis minoribus glauco-albidis tectum, ano acuminato, obscure testaceo, magis nudo. Pedes elongati, obscure testacei, albido-pubescentes & squamosi, femoribus clavatis fuscis vel nigricantibus, basi testaceis, posticis, dente valido, obtuso, armatis.

51. *C. mali: oblongus, niger, squamulis angustis, cupreo-aureis adspersus, antennis crassis pedibusque testaceis, scutello albo-squamoso.*

*Fabr. Eleut. 2. 542. 213. Herbft. sol. 6. 261.  
230. tab. 79. f. 5. a, b. Payk. fn. 3. 281.  
104. Marth. Ent. br. 1. 317. 230.*

*Var. b, squamulis griseis, vix metallico-nitidis adspersus, femoribus apice piceis.*

*Curc. Padi. Bonsd. curc. 2. 26. II. f. II.*

*Curc. rufipes. var. major; Bonsd. curc. 2. 25.  
10. f. 10. forte idem, detritus.*

*Var.*

Var. c, duplo minor, parce griseo-squamulosus, pedibus pallidis.

*Curculio fulvipes.* Fabr. Eleut. 2. 525. 104 secundum Lig. Mag. 4. 156. 104.

Habitat in arboribus & plantis frequens.

Descr. C. micante parum brevior, sed multo angustior, minusque convexus, præsertim in Elytris. Caput latum, porrectum, nigrum, opacum, subtilissime, creberrime rugoso-punctatum, fronte depressa, squamulis augustis, piliformibus, depresso griseis, cetero situ aureo & cupreо micantibus, adspersum; ecu'i nigro brunnei, parum prominuli; rostrum vix longitudine capitis, & illo parum angustius, supra late, sed non profunde canaliculatum, colore, punctura & indumento capitis. Antennæ longitudine dimidi corporis, crassiusculæ, rufo-testaceæ, articulo primo valde longo & valido; clavæ apicis plerumque fusca. Thorax latitudinē brevior, anterius angustior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra in medio transversim convexus, antice posticeque depresso, totus niger subtilissime creberrime rugoso-punctatus, indumento simili uti caput adspersus. Scutellum rotundatum, nigrum, squamulis densis albidis tectum. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, humeris prominulis, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, subnitida, tenui punctato-striata, intersticiis sublævibus, squamulis paullo latioribus & densioribus, aut aureo-igneis seu cupreis, aut virecenti argenteis, fere recta. Corpus subtus, nigro-piceum, subtilissime punctulatum, pectore squamulis densis metallico-nitidis testo, ventre magis nudo, cinereo-pubescente. Pedes longiusculi, rufo-testacei, femoribus clavatis, omnibus dente mediocri acuto armatis; femora saepe versus apicem nigro-picea, ut in varietate sequente.

Var.

*Vespertinus* vero potius ad varietatem minorem præcedentis referendus.

53. *C. oblongus*: elongatus, angustus, niger, longius cinereo-pubescentis, antennis pedibusque rufis, elytris pallide ferrugineis, margine nigro.

*Linn. syst. 2. 615. 71 Fn. Sv. 625. Fahr. Ent. 2. 544. 222. Payk. fn. 3. 284. 107. Boed. curc. 2. 25. 9. Panz. fn. 19. f. 15. Marsh. Ent. br. 1. 316. 226.*

*Curc. floricola.* *Herbst. col. 6* 220. 184 tab. 75. f. 10.

Var. *b*, *Elytris brunneis, nigro-marginatis.*

*Payk. l. c. var. b.*

Var. *c*, totus pallidus, elytrorum margine solo fusco.

*Curc. rufescens.* *Marsh. Ent. br. 1. 316. 227. teste Dom. Kirby.*

Habitat in arboretis, apud nos rarissime: a *Linné*.

Descr. Minoribus præcedentis individuis angustior, sed paullo longior, fere linearis. Caput oblongum, porrectum, nigrum, crebre punctulatum; pilis longioribus cinereis, depresso-adspersum; oculi globosi, brunnei, valde prominuli; rostrum capite multo brevius & angustius; basi nigrum, punctulatum, pubescens, apice rufo-piceum, impressum. Antennæ longitudine dimidii corporis, minus fenes, pallide testaceæ, clava elongata, angusta, saturatori.

*Tho-*

*Thorax parvus*, antice paullo angustior, basi apicemque truncatus, lateribus honnihil rotundatus, supra in medio convexus, intra basin & apicem transversim impressus, niger, sat crebre punctatus, pubes longiori tenui cinerea adspersus. *Scutellum parvum*, nigrum, pubescens. *Elytra thoracis* basi fere dimidio latiora, humeris prominulis, & illo sextuplo longiora, supra modice convexa, aut saturatius ferruginea, aut dilutius testacea, sat profunde punctato-striata, interstitiis sub-levibus, pubes longiori cinerea adspersa; margo lateralis inflexus a basi ultra medium nigro-piceus. *Corpus subtus nigrum*, subnitidum, obsolete punctulatum, cinereo-pubescentia. *Pedes longiusculi*, validi, aut rufo-ferruginei, aut pallidius testacei, femoribus clavatis, dentatis, tibiis arcuatis.

Var. b, differt tantum elytrorum colore saturatius brunneo, margine laterali nigrori.

Var. c, tota pallida, margine elytrorum fulco forte nuper exclusa.

### H Y L E S I N U S.

*Palpi brevissimi*, articulo ultimo conico. *Mandibulae validae*, *cornea*, *arcuatae*, *acutae*. *Antennae brevissimae*, vix capite longiores, clava ovato acuminata, articulata. *Caput exsertum*, in rostrum breve, latum productum, postice latitudinem apicis thoracis attingens. *Thorax antice angustior*. *Tibiae compressae*, denticulatae.

- I. H. *Ligniperda*: nigro piceus, longius pubescens, antennis testaceis, clava obtusa, elytris punctato-striatis, interstitiis tubos;

tuberculato-rugosus, thorace subtiliter punctato.

*Fabr. Eleut. 2. 391. 5?*

*Bostricus ligniperda. Payk. fn. 3. 149. 7.*

*Bostrichus micans. Kugell. Schneid. Mag. 5.  
523. 12.*

Var. *b*, testaceus, capite pedumque geniculis nigris.

*Bostricus ligniperda. Herbst. col. 5. 107. 5. tab.  
48. f. 5.*

Habitat in Pini abietis truncis emortuis,  
sub cortice, in Westrogothia, Hallandia,  
Scania, rarius.

Deser. Statuta omnino H. Piniperda, sed plerumque quadruplo major, Bostr Typographum fere excdens. Corpus totum undique pube longiori, erecta, pallide ciherea, crebre adspersum. Caput magnum, crassum, nigro-piceum; vertice convexo, sub-laevi, fronte rostroque fere planis, confertissime rugoso-punctatis; lineola tenuis impressa, e vertice in frontem ducta; oculi laterales brunnei, elongati, valde angusti & depresso; rostrum vertice paulo angustius, brevissimum, in medio foveola profundiori impressum, ore rufo-piceo, colore, punctura & pubescens capitis. Antennæ brevissimæ, vix capitis longitudine, rufo-testaceæ, pilosæ, articulo primo maximo, obconico, secundo brevi, crassissculo, tertio minori, ob-conico, 4-8 brevissimæ; coarctatis, exterioribus sensim crassioribus, clava mediocri, ovata, sub-compressa, tri-articulata. Thorax latitudine baseos vix longior, anterius multo angustior, vertice æqualis, ibique in medio sub-

sub-emarginatus, basi sub sinuatus, angulis reflexis, rotundatis, supra convexus, ante apicem transversim impressus, totus nigro piceus, sat crebre punctatus; in mediob dorsi carinula obsoleta, parum elevata. Scutellum minutum piceum, valde depresso. Elytra thoracis basi non latiora, sed illo triplo longiora, antice singulatim rotundata, margine basos elevato, granulato, supra valde convexa, sub-cylindrica, nigro-picea, apicem versus saepe dilatius ferruginea, punctato striata, interstitiis crebre granulato-rugosis. Corpus subtus dilutius piceum, sub-nitidum, creberrime, subtilissime punctulatum, pubescens. Pedes breviusculi, picei, pubescentes, tibialis compressis, apicem verius dilatatis, omnibus externe ferrato-dentatis, tarsis dilutius ferrugineis.

Var. b, modo junior, colore pallidiori diversa; Caput fusco piceum; thorax & elytra testacea; Corpus & pedes pallida, genibus denticulisque tibiarum piceis.

2. *H. Piniperda*: nigro-piceus, brevius pubescens, antennis tarsisque rufo-testaceis, elytris tenue punctato-striatis, interstitiis punctulato-subrugosis, thorace subtiliter punctato.

*Fabr. Eleut.* 2. 392. 9.

*Bostrichus piniperda*. *Herbst.* col. 5. 106. 4. tab. 48. f. 4, d. *Payk. fn.* 3. 152. II.

*Ips Piniperda*. *De Gér. Inf.* 5. 194. 2. tab. 6. f. 8-10. *Marsh. Ent. br.* 1. 57. 18.

Var. b, Elytris rufo-piceis. *Payk. lot. cit.*  
var. b.

*Dermes*

*Inf. Succ. T. I. P. III. V*

*Dermestes Piniperda.* Linn. *syft.* 2. 563. II.  
*Fn. Sv.* 421.

*Bostrichus Piniperda.* Panz. *fn.* 15. *f.* 9.  
Var. c. *Nigro piceus, thorace antice, ely-*  
*tris pedibusque rotis rufis.*

Var. d. *Supra rufo-testaceus, subtus, cum*  
*pedibus, pallidus, oculis solis nigro-*  
*brunneis.* Payk. *loc. cit var. c.*

*Hylefinus testaceus.* Fabr. *Eleut.* 2. 393. 14.

*Bostrichus testaceus.* Herbft. *col.* 5. 110. 8. *tab.*  
48. *f.* 8. 9. Panz. *fn.* 66. *f.* 14. *Crit.*  
*Rev.* I. 121. *Creutz. Ent. Verl.* I. 136.

*Ips fumatus.* De Geer *Inf.* 5. 195. 3.

\* *Ips rufus.* Marsh. *Ent. br.* I. 57. 19.

Habitat in Pini Sylvestris ramulis, quos  
perforat & exsiccat; etiam in ligno &  
sub cortice, frequens.

Descr. Minor. Caput crassum, nigro-piceum, sub-  
nitidum, subtiliter punctulatum, tenue pubescens;  
oculi oblongi, brunnei, depressi; rostrum vix longi-  
tudine capitis, illoque parum angustius, nigro pice-  
um, punctulatum, cum carinula elevata, abbreviata.  
Antennæ brevissimæ, rufo testaceæ, clava sub-acumi-  
nata, triarticulata. Thorax latitudine baseos fere  
brevior, anterius multo angustior, capiti æqualis, &  
intra apicem transversum impressus, basi sub sinuatus,  
angulis rotundatis; supra parum convexus, nigro-  
piceus, nitidus, subtiliter punctatus, pubescenti, pal-  
lida, sub erecta adspersus. Scutellum minutum pi-  
ceum, valde depresso. Elytra thoracis basi non  
longiora, sed illo plus triplo longiora, subcylindrica,  
valde

valde convexa, nigro-picea, nitida, subtiliter punctato-striata, interstitiis punctato subrugosis, pube brevi, sub-erecta, pallida, parce adspersa; basis singuli elytri rotundata, elevata, crenato-muricata, ut in priori. Corpus subtus nigro-piceum, punctulatum, parum pubescens. Pedes breviusculi, nigro picei, tarsis pallide testaceis, tibiis apice dilatatis, externe ferrato dentatis.

Var. b, differt tantum elytris aut rufo - piceis,  
aut dilutius rufis.

Var. c, ut var. b, sed pedes toti pallide testacei,  
& thorax antice late rufo-testaceus, qui color  
in medio magis extenditur.

Var. d, tota pallidior, oculis solis nigro-brunneis; Caput & thorax aut rufi testacea, aut fusco-testacea; elytra pallidiora; corpus & pedes flavescentia, forte nuper exclusa; nulla essentiali nota distinguenda.

3. *H. crenatus*: brevis, niger, thorace inaequali, granulato-punctato, elytris profunde crenato-striatis pedibusque piceis, antennis ferrugineis.

Fahr. Eleut. 2. 390. 2.

*Beftrichus crenatus*. Payk. fn. 3. 150. 8.

*Ips Sulcatus*. Marsh. Ent. br. 1. 59. 26.

Var. b, Elytris rufo-ferrugineis, pedibus totis rufo-testaceis.

*Boftrichus crenatus*. Panz. fn. 15. f. 7.

Habitat sub cortice Fraxini excelsioris, rarius.

V 2

Descr.

Descr. H. Piniperda brevior, sed dimidio latior ovatus. Caput breve, crassum, nigrum, crebre subtiliter punctulatum, vix pubescens, oculis oblongis brunneis; rostrum capite brevius, latum, convexum, nigrum, punctatum, mandibulis magnis, latis, compressis. Antennæ capite paullo longiores, ferrugineæ, clava acuminata, articulata. Thorax latitudine baseos vix longior, anterius angustior, vertici æqualis, basi sinuatus, angulis rotundatis, supra convexus, niger, rugoso-punctatus, versus latera granulatus, pilis minutis, parce adspersus, in dorso postico soveolis nonnullis obsoletis impressus. Scutellum parvum triangulare, nigrum. Elytra thoracis basi vix latiora, antice singulatim rotundata, margine elevato, granulato; thorace duplo longiora, apice rotundata, supra convexa, nigro picea, profunde & rude crenato striata, intersticiis valde rugosis. Alæ longæ, fuscæ. Corpus subtus nigrum, obsoletè punctulatum, tenue pubescens. Pedes breviunculi, nigro-picei, tarsis, & interdum tibiis dilatius fusco-ferrugineis; tibiæ apice dilatatae, externæ crenatae.

Var. b, tantum colore differt; caput, thorax & corpus subtus nigra; elytra rufo picea vel ferruginea; antennæ & pedes toti rufescentes.

Obs. Bostrichus crenatus Herbst. Col. 5. 112. 10. tab. 48. f. 10. i, neque secundum figuram, nec descriptionem, hoc pertinere possit.

4. H. palliatus: brevior, nigro-piceus, subpubescens, thorace supra, elytris, tibiis, tarsis, antennarumque basi rufo-ferrugineis, thorace brevi, lateribus dilatato, supra carinato.

*Bostrichus ater.* Payk. fn. 3. 154. 12. var. b.  
Bohr

*Boftr. angustatus. var. brunnea. Herbft. col.*

5. III, 9.

Var. b, rufo-testaceus, capite solo nigro,  
antennarum clava fusca.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,  
præsertim Pini & Abietis, sat frequens.

Descr. M. Piniperda duplo minor & ultra, præ-  
sertim brevior, sequentibus duobus valde affinis,  
structura tamen thoracis, &c. bene distinctus. Ca-  
put breve, convexum, nigrum, opacum, creberrime  
& subtilissime obsolete punctulatum, oculis oblongo-  
gis, nigris, depresso; rostrum capite paullo angu-  
stius multoque brevius, & ab illo fovea arcuata  
impressa, distinctum; nigrum, opacum, similiter uti  
caput punctulatum, versus os densius, subtiliter pu-  
bescens, carinula elevata instructum, quæ tamen in  
frontem nunquam continuatur. Antennæ vix capite  
longiores, rufo-ferrugineæ, clava majuscula, ovata,  
articulata, fusca. Thorax latitudine basos fere bre-  
vior, antice multo angustior, cœparctatus, vertici æ-  
qualis, & intra apicem transversim impressus, lateri-  
bus rotundato-dilatatus, basi sub-sinuatus, supra pa-  
ram convexus, rufo-ferrugineus, creberrime rugoso-  
punctatus, in medio evidenter carinatus; subtus ni-  
ger, sub-nitidus, punctatus. Scutellum parvum,  
rotundatum, piceum. Elytra thoracis basi non latio-  
ra, sed illo triplo longiora, supra valde convexa,  
sub-cylindrica, rufo-ferruginea, sat profunde & rudo-  
crenato-striata, interstitiis convexis, creberrime rugo-  
sis, pilis parvis, depresso, cinereis adspersis; futura  
multo subtilius rugulosa, magis fusca; basis singulis  
elytri rotundatus, margine elevate, crenulato, ut in  
prioribus. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, evi-  
denter punctatum, incisuris ventralibus profunde im-  
pressus. Pedes breviusculi, cinereoq; pubescentes, se-

moribus plerumque nigro-piceis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis; tibiæ dilatatae, extus crenatae.

Var. b, colore pallidiori tantum differt; caput & antennæ ut in a; thorax, elytra, venter & pedes toti dilutius rufo-testacei; pectus paulo sureratus rufo-piceum.

5. *H. angustatus*: brevior, niger, sub-pubescentis; antennarum basi tarsisque testaceis, elytris pedibusque piceis, rostro non carinato, thorace sub cylindrico, evidenter carinato.

*Bostricus angustatus*, var. *nigra*. *Herbst* col. 5. ill. 9. Tab. 48. f. 9. h.

*Ips ater*. *Marsh. Ent. br.* 1. 59. 25.

Var. b, corpore toto rufo-testaceo, oculis solis brunneis.

Habitat sub cortice arborum emortuarum, præfertim *Abietis*, minus frequens.

descr. Praecedenti simillimus & valde affinit, sed plerumque adhuc minor, angustior; rostrum non carinatum, thorax sub-cylindricus, & color aliud. Caput, oculi, rostrum, antennæ, quoad minimum punctum, ut in praecedenti omnino, modo carinula rostri deest. Thorax latitudine longior, anterius nonnihil angustior, obsoletissime impressus, lateribus perparum rotundatus, basi truncatus, supra convexus, niger, sub-opacus, crebre punctatus, carinula longitudinali magis perspicua, nitida. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra thoracis basi vix latiora, & illo triplo longiora, supra convexa cylindrica, nigra, opaca, late & profunde crenato-

striata

friata, interstitiis angustis, crebre, subtiliter granulato rugosis, pilis parvis, depressis, cinereis parce adpersis. Corpus subitus nigrum, sub-opacum, cerebrime punctulatum, tenue pubescens. Pedes breviusculi pieej, cinereo-pubescentes, tibiis compressiss, externe crenato-dentatis, apice, tibiisque ferrugineis.

Var. b. differt tantum colore totius corporis late rufo-testaceo; oculis solis brunneis; cæterum omni puncto conveniens.

Obs. Ob magnitudinem minorem, & thoracem in medio nonnull dilatatum; B. angustatum Herbstii huic magis quam sequenti convenientem judicavi; plerique autores alias species tres præsentes ut variantes inspexerint.

6. *H. ater*: elongatus, cylindricus, niger; nitidus, fere glaber, antennis ferrugineis, rostro fronteque carinatis, thorace elongato, sub-cylindrico, vix carinato.

Fabr. Eleut. 2. 394. 19. Illig. Mag. 4. 130. 19.

*Bostrichus ater*. Payk. fn. 3. 153. 12.

*Bostr. angustatus*. Kugell. Schneid. Mag. 5. 524. 13.

*Ips niger*. Marsh. Ent. br. 1. 59. 24?

Var. b., nigro-piceus, elytris brunneis, pedibus fusco-testaceis.

Var. c., rufo-ferrugineus totus, oculis solis brunneis.

Habitat in ligno sicco & sub cortice arborum emortuarum, præsertim Pini & Abietis, sat frequens.

Descr. Præcedentibus duobus valde affinis, sed multo major, præfertim longior, *H. piniperda* fere æqualis, thorace longiori, sub-cylindrico, non carinato, &c. distinctus. Caput breve, nigrum, subnitidum, crebre punctulatum, oculis oblongis, nigris; rostrum longitudine fere capitis, sed illo paulo angustius, nigrum, punctulatum, impreffione transversa, obsoleta a capite distinctum, apice subretusum, vel foveis duabus latis, rotundatis impressum, carinula longitudinali elevata, saepe in frontem rarius ad verticem usque continuata, distinctis. Antennæ capite parum longiores, ferruginea, clava maxima pallidior. Thorax latitudine multo longior, sub cylindricus, anterius perparum angustior, margine saepe ferrugineo; basi sub sinuatus, supra convexus, niger, sub-nitidus, crebre punctatus, æqualis, nec carinatus, et si, oblique inspectus, interdum ita appareat. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra thorace non latiora, sed plus duplo longiora, supra convexa, cylindrica, nigra, saepe nigro-picea, rude crenato-striata, interstitiis planis, crebre transversim rugulosis; versus apicem elytra magis soabra, opaca, pilis parvis ciliereis adpersa. Corpus subitus nigrum, sub-nitidum, crebre punctatum. Pedes breviuscipi, compressi, nigro-picei, tibialis exterius evidenter serrato-dentatis, apice tatisque dilutiis rufo-piceis.

Var. b, differt tantum elytris dilutiis brunneis, vel rufo-piceis, & pedibus totis fusco-ferrugineis.

Var. c, corpore toto rufo-ferrugineo differt, forte nuper exclusa.

Obs. Curio, chloropo primo intuitu similis est haec species, sed major, antennarum clava crassa, tibiæ compressæ, dilatatae, serratae, &c. bene distinguuntur.

q. H. Fraxini: brevis, niger, subtus dense cinereo-pubescent, supra squamulis cinereis fuscoisque variegatus, antennis ferrugineis, clava magna acuminata fusca.

*Fabr. Eleut. 2. 390. 3.*

*Bostrichus Fraxini. Panz. tn. 66. f. 15. Crit. Rev. 1. 120. Creutz. Ent. Vers. 1. 136. 4.*

*Ips varius. Marsh. Ent. br. 1. 54. 9.*

Var. b, dilutius fusco-ferrugineus, pedibus testaceis, femoribus basi fuscis.

*Scolytus varius. Oliv. ent. 4. 78. II. 17. pl. 2. f. 17. a, b.*

*Hylesinus varius. Fabr. Eleut. 2. 391. 4?*

*Ips griseus. Marsh. Ent. br. 1. 55. 10.*

Habitat in ramulis exsiccatis Fraxini excelsioris, sub cortice, in Scania, Westro-gothia, passim.

Deser. Statura brevis fere H, crenata, sed triplo minor & ultra. Caput breve, nigrum, opacum, vix vel omnium subtilissime punctulatum, fronte plana, pube sub-erecta cinerea, in majusculis individualiter longiori & densiori, adspersa; oculi oblongi nigro-brunnei; rostrum brevissimum, capite parum angustius, nigrum, mandibulis validis, atris, nitidis. Antennae capite paulo longiores, ferruginea, clava magna, oblonga, acuminata, fusca, pubescente, sat evidenter articulata. Thorax latitudine baseos fere duplo brevior, anterius multo angustior, margine spicis sub-elevato, piceo; postice profunde bisinatus, supra convexus, sub-pulvinatus, niger, opacus, epium subtilissime granulato-punctatus, subtus, la-

teribus late, & plaga magna ante scutellari, pube minutissima, depresso-cinereo-micante tectus. Scutellum minutum, nigrum, cinereo pubescens. Elytra thoracis basi parum latiora, sed illo plus triple longiora, supra modice convexa, nigra, opaca, regulariter sed tenue punctato-striata, intersticiis anterius evidenter granulatis; tota squamulis densis, minutissimis, cinereo-albidis & nigro brunneis irregulariter & sub-fasciatim marmorata; basis singuli elytri rotundatus, elevatus, granulatus. Corpus subtus nigrum, subtiliter creberrime punctulatum, pube densa, depresso, cinereo albida tectum. Pedes breves, compressi, picci, tibialis apice dilatatis, denticulatis, tarsis ferrugineis.

Var. b, colore dilutiiori differt; caput, thoracis dorsum, pectus & femorum basis plerumque nigro-fusca; thoracis latera, elytra, anus & pedes ferruginea; cæterum priori simillimus.

Obs. H. varius Fabr. loc. cit. forte secundum specimen pallidum, immaturum, hujus varietatis determinatus.

### E C C O P T O G A S T E R.

*Antennarum clava compressa, solida, non articulata. Tibiae compressæ, vix externe serratae. Cætera ut in Hylesino.*

E. Scolytus: niger, nitidus, antennis tarsi que rufo-testaceis, thorace subtilissime punctulato, elytris truncatis, punctato-striatis, intersticiis vase punctulatis, abdome subtus retuso.

Mas: fronte pilis longis fulvis vestita.

*Herbæ,*

*Herbst.* col. 5. 125. t. tab. 49. f. 1. a.

*Hyiesinus Scolytus.* *Fabr. Eleut.* 2. 390. t.

*Bostrichus Scolytus.* *Payk. fn.* 3. 151. g.

*Scolytus destructor.* *Oliv. Ent.* 4. 78. s. 4.  
pl. 1. f. 4. a, b, c.

Var. b, Elytris pedibusque rufo-ferrugineis.

*Bostr. Scolytus.* *Panz. fn.* 15. f. 6.

*Ips Scolytus.* *Marth. Ent. br.* 1. 53. 6.

Habitat in truncis exsiccatis Betulæ albæ,  
sub cortice, paßim.

Descr. Latitudo fere Bostr. Typographi, sed  
multo brevior; variat etiam dimidio minor & ultra.  
Caput crassum, nigrum, longitudinaliter subtilissime  
rugulosum, vîrtice canaliculato, oculis brunneis, val-  
de elongatis; rostrum brevissimum, latiusine fere  
capitis, nigrum, rugulosum, medio impressum, cum  
carinula parva elevata; apice emarginatum; labrum  
pilis longis, fulvis, nitidis tectum; mandibulæ ma-  
gnæ, atræ; frons & rostrum maris pube densa, ere-  
cta, fulvo-cinerea testa. Antennæ vix capite longi-  
ores, rufo testaceæ, articulo primo magno, ob-coni-  
co, secundo crasso, globoso, sequentibus 3-8, bre-  
vissimis, valde coarctatis, clava magna, ovata, com-  
pressa, non visibiliter articulata. Thorax magnus,  
latitudine multo longior, anterius angustior, & jux-  
ta apicem transversim impressus, margine elevato fer-  
ragineo; basi truncatus, supra valde convexus, p̄f-  
fertim posterius; totus niger, nitidissimus, glaber,  
omnium subtilissime, sed minus crebre punctulatus.  
Scutellum triangulare, nigrum, valde depresso. E-  
lytra vix latitudine baseos thoracis, & illo parum  
longiora,

longiora, apice truncata, anum non exacte tegentia, supra convexa, circum scutellum impressa, nigra, saepe picea, nitida, glabra, disco interiori regulariter punctato striata, interstitiis punctis subtilissimis, vagis, interdum sub seriatis; versus latera crebrius & profundius punctata. Corpus subtus nigrum, crebre punctatum, tenui pubescens, segmento primo ventris convexo, apice valde retuso, sequentibus depresso, adeo ut abdomen posterius quasi excisum appareat. Pedes breviusculi, picei, tibiis compressis, parum dilatatis, nec externe ferratis, anticis apice dente valido, arcuato armatis; tarsi tenues, rufo testacei, articulo penultime bilobo.

Var. b, differt tantum elytris & pedibus totis rufo-ferrugineis.

2. *E. pygmaeus*: niger, nitidus, antennis testaceis, pedibus rufo-piceis, elytris rufo-ferrugineis, confertissime punctato-striatis, thorace crebrius punctulato, abdomine retuso.

*Herbst. col. 5. 127. 2. tab. 49. f. 2.*

*Hyletinus pygmaeus. Fabr. Eleut. 2. 395. 25.*

*Bostricus pygmaeus. Payk. fn. 3. 152. 10. Ross. Mant. 1. 18. 36.*

*Scolytus pygmaeus. Oliv. Ent. 4. 78. 6. 5. pl. 1. f. 5. a, b.*

*Ips multifasciatus. Marsh. Ent. br. 1. 54. 8.*

Habitat sub cortice arborum emortuarum, praesertim *Quercus*, minus frequens.

Descri:

Deter. Præcedenti simillimus & affinis, sed triplo aut quadruplo minor, thorace crebrius punctulato, elytris confertissime punctato striatis, &c. distinguis. Caput crassum, nigrum, opacum, subtillissime coriaceum, tenue pubescens, oculis oblongis brunneis; rostrum brevissimum, medio implexum, absque carinula elevata. Antennæ pallide testaceæ, omnino ut in priori constructa. Thorax ut in præcedenti, niger, nitidus, margine antico plerumque ferrugineo, & interdum plaga baseos ejusdem coloris, sed crebrius, & respectu magnitudinis insecti multo profundius punctatus, præsertim versus latera. Scutellum ut in priori. Elytrorum forma eadem, tota rufo-ferruginea vel brunnea, sub-nitida, punctato-striata, intersticio singulo serie regulari e punctis paulo minus profundis, unde elytra confertissime punctato-striata evadunt; versus latera striæ minus regulares. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, tenue pubescens. Pedes quoad structuram ut in priori omnino, femoribus rufo piceis, tibiis tarsisque dilatius taftaceis.

3. *E. poligraphus*: fusco-piceus, pubescenti-scaber, antennis pedibusque pallidis, elytris vix striatis, abdomine integro, antennarum elava acuminata.

*Dermestes Poligraphus*. Linn. Synt. 2. 562. n<sup>o</sup>: Fn. Sv. 420.

*Bostrychus poligraphus*. Fabr. Eleut. 2. 387. 12. Hérbst. col. 5. 108. 6. tab. 48. f. 6. 6. Payk. fn. 3. 155. 15. Panz. fn. 15. f. 5.

*Ips polygraphus*. De Gér. Ins. 5. 196. 5: Marsth. Ent. br. 1. 52. 3.

Habitat

**Habitat** sub cōtice arborum emortuarum  
passim, minus frequens.

Descr. Parvus, Bostr. chalcographo non longior, sed paulo crassior. Caput porrectum, nigro-piceum, subtiliter crebre punctulatum, pube brevi, cinerea adspersum, oculis oblongis, depresso nigris; rostrum brevissimum, apice emarginatum, colore & indumento capitis. Antennae vix capite longiores, flavescentes, articulo primo longissimo, clavato, mediis minutissimis, coarctatis, clava oblonga, acuminata, non visibiliter articulata. Thorax latitudine basos vix longior, anterius angustatus, capiti æqualis, basi sub-sinuatus, supra convexus; obsoletè carinatus, fusco piceus, crebre, subtiliter punctulatus, pilis brevissimis, rigidis, cinereis adspersis. Scutellum breve, latum, depresso, nigrum, punctulatum, ante basin elytrorum situm. Elytra thoracis basi non latiora, sed illo plus duplo longiora, apice rotundata, supra valde convexa, fusca, crebre granulata, punctata, pilis brevissimis, rigidis, squamulis que cinereis, dense adspersa; ad basin & apicem rudimenta obsoletissima striarum observantur, in disco vero nulla. Corpus subtus saturatius nigro-piceum, subnitidum, obsoletè punctulatum, tenue pubescens, abdomine integro, convexo. Pedes breviusculi; validi, pallide testacei, tibiis apicem versus dilatatis, externe ciliato-subferratis.

Obs. Abdomine non retuso, corpore scabro, & tibias sub-ferratis, a præcedentibus hujus generis discrepat, Hylesinis valde similis, sed antennarum clava non articulata; thorace antice angusto, a Bostrichis diversus, quare heic locavi speciem ambiguam.

Nuper exclusus, totus pallide testaceus.

BOSTRI.

## BOSTRICHUS.

*Caput parvum, deflexum. Antennarum clava rotundata, compressa, sub-solida, vel in opice obsoletissime transversim annulata. Thorax magnus gibbus, antice capite multo latior. Tibiae serrato-dentatae. Cetera ut in prioribus.*

Sect. i. *Elytris postice retusis; plerumque dentatis.*

i. *B Typographus:* nigro piceus, sub-nitidus, longius flavescenti-pilosus, elytris pro'unde striato-punctatis, apice circulatim truncato-retusis, singuli ambitu sex-dentato, dente quarto majore.

*Fabr. Eliut. 2. 385. 7. Herbst. col. 5. 81. 1. tab. 48: f. 1. a. Payk. fn. 3. 145. 1. Panz. fn. 15. f. 2.*

*Scolytus Typographus. Oliv. ent. 4. 78. 7. 7c pl. 1. f. 7. a, b.*

*Ips Typographus. De Geer. Ins. 5. 193. 1. tab 6. f. 1-7. Att. Holm. 1752. 156. tab. 3. f. 11, 12. Marsh. Ent. br. 1. 51. 1.*

Var. *b*, corpore toto pallide testaceo.

Habitat sub cortice Pini Sylvestris & Abietis, labyrinthos & characteres formans, ubique vulgaris, Pinetorum pestis.

Descr. *Magnus in hoc genere, tres lineas longus, cylindricus. Caput parvum, deflexum, retratum, piecum, opacum, crebre rugoso-punctatum, pilis*

pilis longis rufo-flavescensibus, in margine antice crebrioribus, adspersum; in medio antico, prope os, tuberculū parvum, elevatum, & paullo superius ruga vel carinula transversalis, saepe interrupta, obsoleta; mandibulæ crassæ, atræ, nitidæ; oculi valde elongati, brunnæ, depresso, antice sub-sinuati. Antennæ brevissimæ, vix longitudine capitis; testaceæ, saepe medio piceæ, articulo primo maximo, elongato, clavato; secundo etiam crasso, sed brevi, obconico; tertio parvo, obconico, basi tenui; 4-6 brevissimæ, valde coarctatis, crassiunculis; clava dilata-ta, rotundata, valde compressa, pallidiori, versus apicem striolis 2 seu 3 tenuissimis, transversis notata; articulos forte indicantibus. Thorax magnus, crassus, latitudine longior, basi apiceque truncatus, angulis rotundatis, supra valde convexus, nigro-piceus, sub-nitidus, anterius rugis tuberculisque creberim exasperatus, posterior lævior, subtiliter punctatus, præsertim in medio; antice & ad latera pilis longis, rufo-flavescensibus adspersus. Scutellum minugum, nigro-piceum, læve. Elytra a thorace spatio remota, illo fere angustiora, & parum longiora, cylindrica, lateribus inflexa, sinuata, supra valde convexa, nigro-picea, nitida, punctis majusculis, sat profundis, regulariter striata, interstitiis convexis, lævibus, nitidis; versus apicem profunde circulatim excavato-truncata, excavationis ambitu in singulo elytro 6-dentato, dente primo seu supero minuto, quarto reliquis multo majore; saepe capitato; fundus excavationis rugoso-punctatus. ejusque ambitus, ut & latera elytrorum, pilis longis, rufo-flavescensibus adspersa. Corpus subtus aut nigro-aut rufo piceum, sub-nitidum, subtiliter punctulatum, pubescens. Pedes breves, validi, pilosi. femoribus plerumque rufo-ferrugineis, nitidis, tibiis compressis, apice dilatatis, obscurius piceis; tarolis tenuibus; pallide testaceis.

Var. b.

Var. b, colore dilutiōri tantum differt, aut ferrugineus, aut pallidius testaceus, mandibulis, oculis dentibusque elytrorum semper nigro-piceis.

Obs. Opus praestantissimum Dom. Prof. Latreille „Genera Crustaceorum & Insectorum,” Parisis annis 1806-9, impressum, tandem consulere contigit; in hoc opere, tom. 2. p. 270. genus praesens, Tomicus audit, & Species descripta, Tom. Typographus, nostro in plurimis convenit, sed tubercula frontis, & forma dentium in apice elytrorum non omnimode similia. Derm. Typographus Cl. Linnæi in Syst. 2. 652. 7. Fn. Sv. 418, potius ad sequentem speciem pertinet, ob magnitudinem minorem in Fn. Sv. Derm. Piniperda squalem, & ob dentes in apice elytrorum pauciores; forte tamen primæ tres Species nostræ a Cl. Linnæo & aliis ut varietas tantum inspectæ. Nostra jam descripta Species, plures mihi e Germania, vario sub nomine missa, utut B. Stenographus Creutzeri, B. Pinastril Beckstein, B. Decumanus Illiger, &c. omnes quoad minimum punctum nostri simillimi.

2. B. octo-dentatus: nigro-piceus, subnitus, flavescenti-pilosus, elytris punctato-striatis, apice circulatim truncato-retusis, singuli ambitu 4-dentato, dente tertio majore.

Payk. fn. 3. 146. 2.

*Dermestes Typographus.* Linn. Syst. 2. 562. 7.

Fn. Sv. 418.

Var. b, Corpore aut dilutius brunneo, aut pallide testaceo.

Habitat cum precedente, sat frequens.

Inj. Svæc. T. I. P. III. Z Deser.

**Deser.** Præcedenti simillimus & valde affinis; sed plerumque triplo minor, & numero constante dentium in apice elytrorum, præcipue distinctus. Caput parvum, deflexum, retractum, nigro-piceum, opacum crebre granulato-punctatum, dense pubescens; supra os plerumque foveola parva, impressa, loco tuberculi in priori specie, nec ruga transversa superior in hac observatur; maxicibus validæ piceæ, basi dilatiores; antennæ testaceæ, in medio obscuriores, structura ut in priori, sed articulus secundus brevior, fere globulus. Thoracis structura, color, punctura & pubescens, ut in præcedenti omnino. Scutellum etiam ut in illo. Elytrorum forma eadem, plerumque dilutius brunnea, similiter punctato-striata stria suturæ proxima reliquis latiore & profundiore, crebrius crenato-punctata. quod etiam in priori ita; versus apicem simili modo profunde circulatim excavato-truncata, excavationis ambitu in singulo elyro 4 dentato, dente primo seu supero minuto, tertio reliquis majori, longiori. Corpus subtus dilutius rufo-piceum seu brunneum, nitidum, punctulatum, pubescens. Pedes rufo-testacei, structura ut in præcedenti.

Var. b, tantum colore dilutiiori differt.

3. **B. Laricis:** nigrō-piceus, sub-nitidus, pallido-pilosus, elytris longioribus punctato-striatis, apice circulatim retusis, ambitu irregulariter dentato, interstitiis striarum seriato-punctatis.

**Fabr.** Eleut. 2. 386. 10. **Herbst.** col. 5. 114. 13. tab. 48. f. 13. **Payk.** fn. 3. 147. 3. **Panz.** fn. 15. f. 3.

**Scolytus chalcographus.** Oliv. **Ent.** 4. 78. 7. 8. pl. I. f. 8. a-c. Var.

Var. b., Elytris brunneis, pedibus rufo-testaceis.

Var. c., totus aut. rufo-brunneus, aut pallide testaceus.

*Ips micrographus.* De Gér. Ins. 5. 195. 4.

Marsh. Ent. br. t. 152. 21. 1. 10. 11.

Habitat sub cortice arborum emortorum,  
sat frequens.

Deser. Præcedentibus iterum similis & valde affinis, sed B. 8 dentato iterum duplo minor & ultra, præsertim angustior, elytra longiora, apice aliter dentata, &c. Caput parvum, deflexum, piceum, punctulatum, supra os transversim obsoletè impressum, absque tuberculis; mandibulæ validæ, piceæ; Antennæ rufo-testaceæ, concolores, structura ut in priori. Thorax quoad structuram ut in prioribus; nigro-piceis, sub-nitidus, antice rugoso-granulatus, postice, versus latera crebre, in medio parcus, subtiliter punctulatus, pilis longis pallide cinereis adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, nigro-piceum, laxe. Elytra cylindrica, thorace ferre angustiora, sed longiora, lateribus inflexa, levigata, supra valde convexa, nigro-picea, nitida, apice plerumque rufo-brunnea, sat regulariter punctato-striata, interstitiis planis, punctis paullo minoribus, & multo paucioribus, remotis, seriatim, impressis; versus apicem minus profunde, nec exacte circulatiter excavato-truncata, ambitu excavationis in singulo glytro dentibus quatuor parvis, subequalibus, armato, & præterea interius in dico dentes duæ majores, remotæ, unde dentes quasi duplicitæ apparent. Corpus subtus, nigro-piceum, pubescens, obsoletè punctulatum. Pedes breves, validi, femoribus nigro-piceis, tibiis tarsisque dilatatis brunneis. Var.

Var. b. differt tantum elytris totis rufo-brunneis, pedibusque dilutius rufo-testaceis.

Var. c. coloris totius corporis dilutioni diversa; aut rufo-brunnea, aut pallidius testacea.

4. B. monographuse cylindricus, brunneo-testaceus, nitidus, pallido-pubescent, elytris subtilissime obsolete punctato-striatis, apice sub-retusis, singulo denticulis 3 aut 4, uno exteriori.

Fabr. Eleut. 2. 387. 13. Payk. fn. Sv. 3. 149. 6. Herbst. col. 5. 118. 19. Kugell. Schneid. Mag. 5. 524. 14.

*Bostrichus tuberculifer.* Herbst col. 5. 113. n. tab. 48. f. 12.

Habitat in Svecia Australi rarius; Dom. di Paykull; mihi vivus non vifus;

Descr. Statura precedentium, & B. Laricis magnitudine fere aequalis, sed abunde distinctas; thorace minus scabro, elytris subtilissime punctato-striatis, apice parum retusis, &c. Caput parvum, deflexum, retractum, testaceum seu brunneum, obsolete granulato-punctatum, supra os longiora pilociliatum, mandibulis piceis; oculi elongati nigro-brunnei. Antennae testaceae, structura ut in prioribus. Thorax quoad structuram ut in precedentibus, rufo testaceus, anterius subtiliter granulatus, subopacus, pubescens, posterius nitidus, punctis minimis parce adspersus. Scutellum minutum, rotundatum, brunneum. Elytra thorace longiora, cylindrica, rufo-brunnea, nitida, subtilissime obsolete punctato-striata, stria futuræ proxima reliquis non profundiore; versus apicem oblique retusa, minime ve-

so excavato-impressa; in singulo plerumque dentes  
tres in serie recta, non procul a sutura, supero mi-  
nuto, interdum deficiente, & juxta ultimum aliud  
exterior, parvus, obtusus. Corpus subtus rufo-te-  
staceum, obsolete punctatum. Pedes breves va-  
lidi, rufo-testacei, pubescentes.

5. *B. bidentata*: nigro-piceus, sub-nitidus, &  
griseo-pubescent, elytris crebre subtiliter  
punctato-striatis, apice circulatum truncata,  
so-retulata, singulo dente superiore elongato,  
hamato.

*Fabr. Eleut.* 2. 389, 22. *Payk. En.* 3. 148. 5.  
*Panz. fa.* 39. f. 21.

*Scolytus bidentatus.* *Oliv. Ent.* 4. 78. 16. 13.  
pl. 2. f. 13. a. b.

*Bostr. bidentatus.* *Herbst. vol.* 5. 109. 7. *Tab.*  
41. f. 7. f.

Var. b., Elytris sub-retulatis, mucicis, apice  
dilutius rufo-testaceis.

*Bostr. chalcographus.* *Payk. fa.* 3. 147. 4. 4.  
ter. Sexus.

Habitat sub cortice arborum emortuarum  
passim, minus frequens.

Descri. Magnitudo, statura, &c. affinitas *B.* Chal-  
cographi, sed magis pubescens, elytra fere tota ni-  
gra, apice determinate excavato-setosa, aliter dentata,  
frons in utroque sexu integra, nec impressa, &c.  
Caput parvum, deflexum, retractum, nigrum, sub-o-  
pacum, tenuè pubescens, fronte convexa, crebra sub-  
tiliter granulato-punctata, ore longius ciliata. An-

tempore breves, pallide testaceæ; structura ut in præcedentibus. Thorax quoad structuram ut in præcedentibus, niger, antice tuberculato scabellus, opacus, longius pubescens, in medio transversum obsolete impressus, postice glabrior, nitidior, punctulatus, in medio longitudinaliter sub carinatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, lœve. Elytra thorace paulo angustiora, sed multo longiora, cylindrica, nigro-picea, nitida, pubescentia, posterius interdum rufa picea, punctis parvis impressis crebre striata, interstitiis nempe etiam ferrato-punctatis, Atria suturalia tixiæ paratae profundiort, ante apicem circulatim excavato retusa, dente magno retrofusum hamato in margine superiore excavationis singuli elytri, & plurimum alio parvo, obtuso, versus apicem. Corpus subitus nigrum, sub-nitidum, pubescens obsolete punctulatum. Pedes breves, validi, nigro-picei, tarsis & interdum tibialis diutius rufo-piceis.

Var. b, in omnibus similima, modo apex elytorum perparum rotusa, rugicosa, atque dentibus & semper rufa ferrugin-us; forte semina, in societate cum præcedenti, plures testa, a sequenti elytris cibris punctulatis, thorace postice carinato, colore obscuriori &c. distincta.

**G. B. chalcographus;** nigro-piceus, nitidus, assennis pedibusque testaceis, elytris rufo-piceis, basi nigricantibus, apice subretusis, singulo dentibus tribus armato.

Mas: Fronte supra os proinde impressa.  
Var. b, corpore toto rufo-piceo, vel pallide testaceo.

Fahr. Elenç. s. 387. II. Herbst. col. 5. 183. 2.  
Tabac. f. 2. 3. Payk. fa. 3. 247. 4. Penz.  
M. 29. f. 20. Dorno-

*Dermestes chalcographus.* Linn. Syst. 2. 562. 8.

*Ips Spinosus!* De Gér Inf. 5. 197. 7.

Var. b, ferrugineus vel pallide testaceus totus.

*Stolytus 6-dentatus.* Olyp. Ent. 4. 78. II. 15.  
pl. 2. f. 15. a, b.

Habitat in arboribus resinosis ubique frequentissimus.

Descr. Minutus, praecedente magis glaber & nitidus, praesertim in elytris. Capit parvum, deflexum, retractum, nigro-piceum, crebre obsolete granulato-punctatum, fronte supra os in maculis late & profunde excavato impressa, in femina fere æquali, parum tantum transversim depresso; os pallido-ciliatum, Antennæ breves, testaceæ, structura ut in prioribus. Thorax quoad structuram ut in praecedentibus, nigro-piceus, antice tuberculato-scaber, in medio transversim obsoleto impressus, posterius punctulatus, nitidus, non aut vix carinatus, lateribus & antice nonnihil ciliato-pilosus. Scutellum parvum, rotundatum, piceum, laeve. Elytra thorace paullo angustiora, sed illo nonnihil longiora, cylindrica, rufo-ferruginea, nitida, quasi oleo inuncta, basi & lateribus anticis plus minusve nigra vel infascata, subtilissime punctato-striata, interstitiis laevibus, vel vix punctulo uno alterove minutissimo notatis; juxta suturam postice impresso-retusa, & in singulo ibi dentes tres in lineam positæ, supremo minuto, sequentibus majoribus, obtusis, tuberculiformibus. Corpus subitus piceum, nitidum, obsoleto punctulatum. Pedes breves validi, toti, rufo-ferruginei, tibialis crenato-ciliatis.

Var. b, differt tantum colore dilutioni, aut toto rufo-ferrugineo, aut capite thoraceque saturatis rufo-piceis.

7. *B. fuscus*: fusco-piceus, longius pubescens, thorace antice scabro, opaco, elytris longioribus, cylindricis, consertissime subtiliter punctato-striatis, apice retusis, muticis.

*Ips fuscus*. Marsh. Ent. br. I. 53. 5.

Var. b, corpore toto pallide testaceo.

Habitat sub cortice Fagi in Insula Bokö prope Allingeåhs Weltrogothiae, rarius ex Anglia a Dom. Kirby, ut *Ips fuscus* Marsh. missus.

Defcr. Minutas B. Chalcographo non crassior, sed in elytris paullo longior, multo magis pubescens, elytris crebrius & evidentius punctato-striatis. Caput parvum, deflexum, retractum, fusco-piceum, crebre subtiliter punctulatum, pilis longioribus pallescentibus adspersum, fronte superiorius convexa, versus os transversim impressa; oculi oblongi nigri; antennae breves, testaceæ, structura ut in prioribus. Thorax quoad strukturam ut in precedentibus, fusco-piceus, longius pubescens, anterior tuberculato-scaber, opacus, pône medium transversim subimpressur, posterior levior, magis nitidus, subtiliter punctulatus. Scutellum minutum, rotundatum, piceum, lave. Elytra thorace paullo angustiora, & illo fere duplo longiora, convexa, cylindrica, dilatatis rufo-picea, sub-nitida, longius pallido-pilosa, praesertim posterior, punctis seriatis creberrime striata, interstitiis nempe punctis æque crebris & profundi-

dis notatis, unde obiter intuenti vage punctata apparet; apex late, circulatim plano-retusus, absque ulla dentibus. Corpus subtus piceum, obsolete punctulatum. Pedes breves, validi, testacei; femoribus interdum obscurius rufo-piceis.

Var. b, differt tantum colore totius corporis pallido testaceo, oculis solis nigro-brunneis.

**Sect. 2:da, Elytris postice integris,  
rotundatis.**

8. *B. villosus*: brunneus, sub-nitidus, longius pallido-pilosus, thorace ovato, cereberrime aequaliter punctato, elytris profunde punctato-striatis, interstitalis subtilius secati-punctatis.

*Payk. fn. 3. 154. 13. Panz. fn. 15. f. 3. Herbß.  
col. 5. 121. 24.*

*Hylesinus villosus. Fabr. Eleut. 2. 391. 7.*

Var. b, corpore toto aut dilutius rufo-serrugineo, aut pallidius testaceo.

*Ips villosus. Martb. Ent. br. 1. 53. 4.*

*Scolytus micrographus. Oliv. Ent. 4. 74. 9. 13;  
Pl. 2. f. 12. a, b?*

*Derm. micrographus. Linu. Ep. Sv. 419.*

Habitat sub cortice arborum emortuarum, frequens.

Descr. B. Laricis paullo major. Caput deflexum, brunneum, fronte convexa, crebre punctulata, ore fulvo-ciliata; mandibulae validae, piceae; oculi oblongi levati, nigri. Antennae breves, pallide testaceae.

ceæ. structura ut in prioribus. Thorax ovatus, latitudine medii paullo longior, antice & lateribus rotundatus. basi truncatus, supra convexus, totus brunneus, sub-nitidus, pilosus, dorso toto æqualiter, crebre granulato-punctato. Scutellum parvum, rotundatum, piceum, lœve. Elytra thoracis basi latiora, & illo fere dimidio longiora, cylindrica, apice obtuse rotundata, integra, plerumque dilutius rufo-brunnea, nitida, pilis longis pallide cinereis, præsertim versus latera & apicem, adspersa, profunde punctato striata, interstitiis planis, singulia serie punctis longe minoribus notatis. Corpus subtus dilutius rufo-brunneum vel ferrugineum, nitidum, punctatum. Pedes breves, validi, testaceo-ferruginei, tibiis omnibus compressis, apice dilatatis, ferrato-dentatis.

Var. b, differt tantum colore totius corporis pallidiori, aut ferrugineo, aut testaceo.

Variat etiam duplo minor & ultra, fronte densius villosa, alias simillimus, forte mas.

2. B. micrographus: ferrugineus, nitidus, sub-pubescent, thorace oblongo, antice scabro, elytris subtilissime punctato-striatis, apice obtusis, muticis.

*Payk. fn. 3. 155. 14. Panz. fn. 66, f. 15, Febr.  
Eleut. a. 387. 15?*

Habitat sub cortice arborum, emortuarum, rarius.

Descr. Minutus B. chalcographo fere minor, ejusque var. b, simillimus & nimis affinis, elytris apice muticis tantum distinctas. Caput deflexum, ferrugineum, nitidum, punctatum, parce pubescens, oculis

scutis oblongis nigris; mandibulae apice piceae. Antennae breves, pallide testaceae, structura ut in prioribus. Thorax oblongus, omnino ut in B. chalco-grapho constructus, totus rufo-ferrugineus, antice rugoso-scaber, opacus, postice subtilissime punctulatus, versus medium baseos fere omnino laevis, nitidus. Scutellum parvum, rotundatum, ferrugineum, laeve. Elytra vix thorace angustiora, & illo fere dimidio longiora, cylindrica, ferruginea, nitida, versus latera & apicem parce pubescens, anterius subtilissime punctato-striata, posterius fere laetitia, stria suturæ proxima profunde impressa, præsertim versus apicem, ubi etiam sutura elevatior; apex elytrorum obtuse rotundatus, absque denticulis. Corpus subtus pallidius testaceum, nitidum, subtiliter punctulatum, tenue pubescens. Pedes breves, validi, pallide testacei.

Obs. Species dubia, & plerisque auctoriibus confusa; Dom. Paykull & Panzer nostrum intellectu videantur; Derm. micrographus Linn. Faun. N:o 419, forte ad B. villosum pertinet, ut etiam Scolytus micrographus Oliv. Derm. micographus Linn. Syst. 2; 562. 9. B. chalco-grapho aptius allegatur. Ips. micrographus De Geeri & Marshami, ad B. Laricis ju-  
re refertur.

io. B. dispar: nigro-piceus, longius pube-  
scens, antennis, tibiis tarsisque testaceis,  
thorace brevi rotundato, antice exaspera-  
to, elytris brunneis, punctato-striatis, api-  
ce declivibus.

Mas: Parvus, thorace depresso, sub-orbi-  
culato, elytris thorace parum longioribus.

*Adates dispar.* Fabr. Eleut. 2. 382. 22. Payk.  
fn. 3. 143. 4.

*Bostricus brevis.* Panz. fn. 34. f. 20. Crit.  
Rev. 1. 118. var. pallida.

Femina; duplo aut triplo major, thorace  
valde convexo, sub-globoso, elytris tho-  
race duplo longioribus. Illig, Payk, loc.  
cit. femina.

*Bostrichus dispar,* Herbst. col. 5. 118. II. Tab.  
48. f. II. b.

*Bostr. thoracicus.* Panz. fn. 34. f. 18. Crit.  
Rev. 1. 118.

Habitat in Blekingiae, Smoldanie, Westro-  
gothiae sylvis acerofosis, rarius.

Defcr. Mas & femina valde dissimiles; Mas par-  
vus, B. chalcographo vix longior; sed plus duplo  
latiore, ovatus. Caput parvum, deflexum, sub tho-  
racē occultatum, nigrum, sub-nitidum, punctatum,  
pubescens; mandibulis validis, atris, nitidis. Anten-  
ae capite paullo longiores, crassiusculæ, pallide te-  
stacea, structura ut in prioribus. Thorax magnus,  
sub-orbiculatus, vel latitudine medii parum longior,  
anterius paullo angustior, supra fere planus, vel per-  
parum convexus, nigro picea, sub nitidus, pilis lon-  
gis griseis adpersus, antice obsoletius tuberculato-  
scaber, postice fere laevis. Scutellum parvum, ele-  
vatum, rotundatum, nigrum, laeve. Elytra obtuse  
ovata, antice thoracis basi latiora, in medio adhuc  
magis dilatata, supra antice convexa, a medio ad a-  
picem valde declivia, rufo picea seu brunnæ, sub-  
nitida, sat profunde punctato-striata, pilis longis gri-  
seis ad latera & apicem adpersa. Corpus subtus pi-  
cum

ceum, punctulatum, pubescens. Pedes longisculpi, validi, pilosi, femoribus piceis, apice testaceis, tibias compressis, interne dilatatis, ferratis, totis, tarsisque pallide testaceis.

Femina triplo major; B. villoso fere aequalis; caput magis exsertum, fronte convexa, supra os carinula brevi notata. Antennae breviores, tenuiores. Thorax valde convexus, sub-globosus, antice fortius tuberculato scaber, postice sub-laevis. Elytra thorace fere duplo longiora, sub-cylindrica, fere a medio ad apicem valde declivia. Pedes respectu corporis breviores quam in male; rufo-testacei, femoribus basi plus minusve piceis.

ii. *B. domesticus*: cylindricus, niger, subglaber, tarsis antennarumque clava, oblique acuminate, testaceis, thorace sub-globoso, exasperato, elytris griseo-pallidis, sutura limboque nigro-fuscis.

*Dermestes domesticus*. Linn. Syst. 2. 563. 12.  
Fn. Sv. 424.

*Ips domesticus*. De Gler. Ins. 15. 196. 6.

*Apate limbatus*. Fabr. Eleat. 2. 382. 20.  
Panz. Fn. 43. f. 19. dicto var. Payk. Fn. 3.  
144. 5.

*Bostrichus limbatus*. Oliv. Ent. 4. 77. 17 22.  
pl. 3. f. 22. a, b. Herbst. col. 5. 105. 3.  
tab. 43. f. 3. c.

Habitat in truncis arborum emortuarum, præsertim Alni, passim; non solum sub cortice, sed etiam lignum ipsum perpendicularly perforans. Detrit;

Defcr. Magnitudo fere B. villosi. Caput effexum, nigrum, sub-nitidum, subi. iter punctulatum, fronte tota maris profunde impresso-excavata; feminae convexa, supra & utriusque parum impressa, in utroque Sexu carinula media parva, abbreviata. Antennae breves, testaceæ, plerumque basi obscuriores, clava magna, oblonga, compressa, apice acumine obliquo, in mare longiori, subulato, armata. Thorax longitudine fere latior, valde convexus, sub-globosus, basi tamen truncatus, totus niger, sub-opacus, antice tuberculo-exasperatus; postice subtiliter rugosus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra thorace angustiora, sed illo plus duplo-longiora, cylindrica, livida, seu griseo-pallida, nitida, glabra, tenui & obsoletius punctato-striata; interstitiis planis, vix vel obsoletissime punctulatis; stria futuræ proxime reliquis profundior, praesertim versus apicem; Sutura tota, versus apicem magis late, & margines laterales etiam late nigro-fusca. Corpus subitus nigrum, sub-nitidum, punctulatum. Pedes breviusculi, nigri, nitidi, tarsis, & interdum tibiarum apice ferrugineis.

12. *B. lineatus: cylindricus, niger, sub-pubescentia, antennis, pedibus, thoracis subglobosi, exasperati postico, elytrisque rufo-testaceis, elytrorum sutura margine lineaque media nigris, antennarum clava obtusa.*

Oliv: Ent. 4. 77. 18. 23. pl. 3. f. 23. a, b.

*Apate limbatus. Payk. fn. 3. 144. 5.*

Var. b, thorace rufo-testaceo, lateribus annulis, margine apicali; siveplusque linea media

media abbreviata nigris, elytris testaceis,  
futura, margine lituraque obsoleta posti-  
ca nigrantibus.

*Bostr. melanocephalus.* Herbst. col. 5. n. 14.  
tab. 48. f. 14. n.

Var. 2, pallidius rufo-testaceus, capite ni-  
gricante, thoracis antico pectoreque sa-  
pius suscescentibus.

*Hyletinus melanocephalus.* Fabr. Eleut. 2. 394.  
2n

*Bostrichus Serratus.* Panz. fn. 34. f. 19?

Habitat in truncis arborum emortuarum;  
præsertim Betulæ albæ, passim; lignum  
ipsuth, uti præcedens, perforans.

Descr. Præcedenti quidem similis & affinis, at-  
tamen vere distinctus, paullo minor, brevior, clava  
antennarum obtusa, thorace magis pubescente, sub-  
tilius asperato, colore thoracis, elytrorum pedumque  
&c. Caput deflexum, nigrum, sub nitidum, subtiliter  
punctulatum. pubescens, fronte maris late & pro-  
funde impressa, feminæ convexa, integra; in utroque  
carinula parva media, obsoleta, supra os notata.  
Antennæ, breves, testacea, clava ovata, compressa,  
obtusa. Thorax quoad structuram ut in præcedenti  
omnino, valde convexus, pilis erectis griseis pubé-  
scens, tuberculis, rugisque minoribus exasperatus, illi-  
ger, basi transversim plus minusve rufo-ferrugineus;  
Scutellum ut in priori. Elytrorum forma fere eä-  
dem, sed paulo minus elongata, rufo-testacea, nitida,  
parum pubescentia, evidenter punctato striata;  
margo exterior late niger; futura etiam anterius ni-  
gra, & linea media longitudinalis in singulo elytro  
spissata.

apicem non attingens, ejusdem coloris. Corpus subtas nigrum, nitidum, punctulatum, ano dilatius rufo-piceo. Pedes toti rufo-testacei, structura ut in praecedente.

Var. b, similis; modo thorax rufo-testaceus, margine antico & lateralí anterius nigris; capite et jam linea media abbreviata nigra, margini antico contigua. Elytra rufo-testaceas, margine lateralí & futurali plus minus infuscatis; lineæ medie ruditamentum in hac varietate rarius conspicuum.

Var. c, fere tota pallidius testacea, modo caput bigricans; thoracis margo anticus, ut & pectus, interdum fuscens; forte nuper exculsa.

13. B. asperatus: sub-cylindricus, niger; opacus, sub-pubescent, antennis pedibusque testaceis, thorace sub-orbiculato, tuberculato-scabro, elytris contertissime vase punctulatis, apice dilutioribus.

Habitat sub cortice arborum emortuarum, rarius.

Descr. Parvus, B. chalcographo paulo minore. Caput deflexum, nigrum, crebre subtilissime punctulatum, ore pallide testaceo, mandibulis brevibus, validis, testaceis, apice fuicis. Antennæ crassiusculæ, testaceæ, clava ovata, compresa, evidenter 4-articulata. Thorax valde convexus, fere orbiculatus, niger, opacus, pubescens, dorso fere toto tuberculis elevatis exasperato. Scutellum minutum, nigrum, laxe. Elytra thoracis medii latitudine, & illo plus duplo longiora, sub-cylindrica, anterius nigro-fusca, posterius livido-testacea, sub-opaca, tenue pubescentia, creberrime subtiliter vase punctata, punctis versus latera hinc inde sub-seriatim. Corpus subtas nigrum,

nigrum, sub-nitidum, tenue pubescens, parce & obsolete punctulatum. Pedes breviusculi, testacei, tibiis externe ciliatis.

Obs. Specimen unicum possideo, cui elytra tota nigro-picea, ante apicem sub-depressa, vel sub-retusa, callo obsoleto supero notata, & versus latera evidenter punctato-striata, cæteram in omnibus convenientis, ut vix pro specie peculiari habendum.

14. B. *Tiliæ*: sub-cylindricus, fuscus, opacus, sub-pubescentia, antennis pedibusque testaceis, thorace sub-orbiculato, medio scabro, elytris obsolete punctato-striatis, apice dilutioribus.

*Illig. Mag. 4. 129. 17.*

*Apate Tiliæ. Fabr. Eleut. 2. 383. 27. Panz. fn. 8. f. 14.*

Var. b., corpore toto pallido, capite obscuriori.

Habitat sub cortice *Tiliæ Europæ*, rarius.

Descr. Præcedenti simillimus. & valde affinis, sed duplo minor, thorax posterius minus tuberculatus, & elytra punctato-striata, &c. Caput majusculum, rotundatum, nigrum, fronte convexa, omnium subtilissime crebre punctulata, carinula parva media supra os notata, ore cinereo-ciliato. Antennæ breves, crassiusculæ, testaceæ, clava, ovata, compressa, evidenter articulata, omnino ut in priori. Thorax sub-orbiculatus, fuscus, opacus, supra valde convexus, plaga triangulare, posterius angustata, magis elevata, tuberculato scabra, sèpè tufo-picea, vel ferruginea.

*Ins. Svec. T. I. P. III. Aa*

ruginos, lateribus, postice latius, crebre punctulatis; fuscis. Scutellum minutissimum, fuscum, laxe. Elytra thoracis medii latitudine, & illo plus duplo longiora, cylindrica, apice rotundata, integra, dilutius fuso-livida, pube brevissima cinerea adspersa, sat regulariter, et si tenue & obsolete punctato-striata, intersticiis fere levibus. Corpus subtus fuscum, pubescens, subtilissime punctulatum. Pedes medioeres, toti testacei, tibialis ciliatis.

Var. b, colore dilutiori tantum differt.

15. B. cinereus: oblongus, cinereo-testaceus, sub-opacus, tenuissime pubescens, thorace ovato, subtilissime punctulato, elytris crenato-striatis.

*Herbst. col. 5. 116. 15. tab. 48. f. 15. e. Kugell.  
Schneid. Mag. 5. 524. 15.*

*Bostrichus pubescens. Marth. Ent. br. 1. 58. 23?*

*Hyletinus minimus. Fahr. Eleut. 2. 395. 28?*

Habitat sub cortice arborum emortuarum, passim.

Déscr. Minutus, B. Tiliæ adhuc minor, vix diuidium lineæ longus. Caput deflexum, rotundatum; fuso testaceum, fronte convexa, subtilissime punctulata, versus os densius pubescente. Antennæ breves, testaceæ, clava rotundata, compresa. Thorax latitudine paulo longior, ovatus, supra parum convexus, ferrugineus vel fuso-testaceus, sub-opacus; subtilissime punctulatus, versus latera tenuissime pubescens. Scutellum minutum, fuso-testaceum, laxe. Elytra thoracis latitudine, & illo duplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa; dilutius

tius cinereo-testacea, sub-opaca, set profunde crenato striata; tenuissime pubescentia. Corpus subtus ferrugineum, sub-nitidum, punctulatum. Pedes mediocres, pallide testacei, tibiae ferrato-ciliatis.

16. *B. pusillus*: oblongus, nigro-piceus, nitidus, sub-pubescent, antennis, tibiis tarsisque testaceis, thorace longiori, subtiliter punctulato; elytris punctato-striatis.  
Habitat sub cortice arborum emortuarum, frequens.

Defec. Praecedente fere adhuc minor, angustior & valde affinis, thorace paullo longiori, superficie magis nitida, elytrorum striis simpliciter punctatis, &c. distinctus. Caput parvum, deflexum-nigro-piceum, nitidum, subtilissime punctulatum, tenuissime pubescent, ore testaceo. Antenae brevissimae, pallide testaceae, clava rotundata, compressa, vix articulata. Thorax latitudine multo longior, supra parum convexus, nigro piceus, nitidus, subtilissime punctulatus, pube brevissima, erecta adspersus. Scutellum minutum, piceum. Elytra vix thoracis latitudine, sed illo duplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, plerumque dilutius rufo-picea, nitida, punctis simplicibus, seriatis, striata; vix pubescentia. Alæ longæ, albæ. Corpus subtus nigro-piceum, sub-nitidum, subtilissime punctulatum, tenue pubescent. Pedes mediocres picei, tibiae ciliatis, plerumque apice tarsisque testaceis.

Variat etiam totó corpore pallidiōri, forte im-maturus.

Obs. Species duæ ultimæ Hylefinis quidem affines; sed clava antennarum compressa, rotundata. Utrum Hyleminus minutus, Fabr. Eleent, 2, 395. 27.

2. A. sub-striatus: linearis-elongatus, nigro-piceus, opacus; pubescens, antennam apice pedibusque rufo-piceis, thorace suberculato-scabro, elytris crebre-rugosis, obsolete striatis.

*Payk. fn. 3. 142. 2.*

Habitat in truncis exsecatis. Pinis & Abietis, sub cortice, rarius.

Descri. Magnitudo variat; majores Bostr. 8. dentato longiores, sed angustiores; alii duplo, imo triplo minores. Caput breve, transversum, nigro-piceum, opacum, rugoso-punctatum, inter antennas transverse impressum, ore fulvo-ciliato, collo magno, laevissimo, nitidissimo, in thorace resonando; oculi globosi, nigri, prominuli. Antennae breves, crassifusculæ, piceæ, articulis tribus ultimis rufo-testaceis, 8:0 & 9:0 magnis, truncatis, perfoliatis, 10:0 paucis minori, rotundato, compresso. Thorax brevis, rotundatus, convexus, nigro-piceus, opacus, pubescens, supra tuberculis crebris, sub-acuminatis, anticus majoribus, exasperatus. Scutellum parvum, elevatum, nigrum, laeve. Elytra thoracis medio vix latiora, sed illo triplo longiora, lineari-cylindrica, apice rotundata, supra convexa, nigro-picea, sub-opaca, pubescentia, confertissime rugoso-tuberculata, striis, obsoletis, situ obliquo tautum dignoscendis, exarata. Corpus subtus fuscopiceum, pubescens, obsolete punctulatum. Pedes breviusculi, femoribus validis, piceis, tibiis externe denticulatis, tarfisque dilutius ferrugineis.

3. A. elongatus: linearis-elongatus, nigro-piceus, fere glaber, antennarum clava-

pe-

pedibusque rufo-piceis, thorace sub-tuber-  
culato, elytris nitidis, punctato-sub-stria-  
tis.

*Payk. fn. 3. t43. 3.*

*Apate linearis. Kugell. Schneid. Mag. 4.  
495. 4.*

**Habitat** cum præcedente, rarius.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas præcedentis, sed differt corpore fere glabro, thorace subtilius punctulato, elytris nitidis, minime rugoso-tuberculatis, modo seriato-punctatis, &c. Caput, oculi, os, antennæ, collam, ut in præcedenti omnino. Thoracis structura eadem, sed supra fere glaber, & tubercula multo minora, non acuminata. Elytrorum forma etiam ut in præcedenti, sed omnino glabra, nitida, minime rugoso-tuberculata; sed puncta parvis impressis, minus regulariter seriatis, notata. Corpus subitus & pedes ut in præcedenti omnino,

### C O R Y N E T E S.

*Palpi quatuor inæquales, sub filiformes, articulo ultimo longiori, sub-conico. Mandibula cornea, acuta, bidentata. Ligula membranacea, elongata, apice dilatata, rotundata, integra. Antennæ breviores, II-articulatae, clava triarticulata, obconica, articulo ultimo maximo, sub-quadrato, angulis rotundatis. Thorax antice truncatus, lateribus & postero rotundatus, anguste marginatus.*

I. *C. violaceus*: violaceo - sub - virescens, nitidus, fusco - villosus, antennis nigris, pedibus fusco - virescentibus, elytris rude striato - punctatis.

*Fabr. Eleut.* I. 285. 1. *Herbst. col.* 4. 150. I. tab. 41. f. 8. h. *Payk. fa.* I. 275. I. *Schönh.* synon. 2. 50. 1.

*Dermestes violaceus.* *Linn. syst.* 2. 563. 13.  
*Fn. Sv.* 422. *Panz. fa.* 5. f. 6.

*Necrobia violacea.* *Latr. Gen. Ins.* I. 274. 1.  
*Oliv. Ent.* 4. 76. bis 5. 1. pl. 1. f. 1. a, b, c.

*Clerus violaceus.* *Illig. Col. Bor.* I. 282. 2.

Habitat in cadaveribus, frequens: occurrit etiam in floribus.

Descr. Magnitudo valde variat; maiores Macchio bipustulato æquales, alii triplo minores & ultras. Color plerumque cœruleo - sub - virescens, rarius intensive cœruleo - violaceus; corpus totum supra villositate tenui, erecta, fusa, in capite & thorace longiore, vestitum. Caput sub - deflexum, rotundatum, cœruleo - virescens, punctatum, ore piceo; oculi magni, globosi, nigro - brunnei. Antennæ vix longitudine thoracis, articulo primo magno, clavato, virescente; secundo multo minori, globoso; 3:o longiori, ob - conico; 4 - 8:brevioribus, nodosis; 9, 10, magnis, latis, sed brevibus, truncatis, perfoliatis; ultimo maximo, sub - quadrato, compresso, angulis rotundatis. Thorax longitudine paulo latior, antice truncatus, lateribus, angulis posticis & basi rotundatus, anguste marginatus, supra convexus, cœruleo - virescens, crebre & sat profunde punctatus. Scutellum rotundatum, fusco - cœruleo - virescens,

gulescens, obsolete punctulatum. Elytra thorace latiora, humeris prominulis, & illo triplo longiora, spicata rotundata, supra modice convexa, coeruleo-virescentia, nitida, striatim punctata, punctis anterius majoribus, versus apicem fere evanescéntibus, interstitiis obsolete punctulatis. Corpus subtus cœruleo-virescens, obsoletius subtiliter punctulatum, cinereo-pubescentes. Pedes mediocres, nigro-virescentes, cinereo-pubescentes, tarsis omnibus quadrigartulatis.

## C. I. S. Latreille.

*Mandibulæ breves, conico-trigonæ, apice æqua-bidentatae. Palpi valde inæquales; maxillares multo majores, extrorum sensim crassiores, articulo ultimo sub-ovato; labiales minimi, subulati, articulo ultimo tenuiori, conico. Maxilla bifida, lacinia interna parva, dentiformis. Antennæ capite fere duplo longiores, articulis tribus ultimis magnis, perfoliatis. Corpus ovatum, supra convexum. Oculi globosissimoni. Thorax transversus, marginatus, antice sœpe elevatus & produbitus.*

I. C. Boletii: fusco-piceus, sub-pubescentes, antennis pedibusque testaceis, thorace inæquali, antice reflexo, lateribus late marginato, postice obtuse angulato, elytris sub-vage rugoso-punctatis.

Latreille Gen. Inj. 3. 12. 1.

*Anobium Boletii.* Fabr. Eleut. 1. 323. 7. Illig. Col. Bor. 1. 332. 8. Payk. fn. 1. 308. 7.

Aa 5

Anob.

*Asobium bidentatum*. Oliv. Ent. 2. 16. n. 9.  
pl. 2. f. 5. a, b, c.

*Dermestes picipes*. Herbst. col. 4. 137. 17. tab.  
41. f. 3. c. c.

*Bostrichus Boleti*. Kugell. Schneid. Mag. 4.  
497. ♀.

Var. b, corpore toto aut dilute brunneo,  
aut pallide testaceo.

*Dermestes variabilis*. Faby. Eleut. 1. 319. 38.  
sec. Mus. Dom. Lund.

Habitat in fungis arboreis, ubique frequens.

Descr. Major in hoc genere, Bostr. lineato  
fere aequalis, vel paullo crassior; variat tamen ma-  
gnitudine minori. Caput deflexum, piceum, sub  
thoracis lobo eminente occultatum, fronte fere pla-  
na, crebre subtiliter punctulata, in medio tubercu-  
lo obsoleto notata, marginibus in masculis alte e-  
levatis, reflexis, in medio angulariter emarginatis;  
in femina ad latera tantum parum elevatis; oculi  
prominuli, globosi, brunnei. Antennæ thorace pau-  
lio breviores, testaceæ, articulis decem, primo ma-  
gno, crasso, ovato; secundo dimidio minori, etiam  
ovato; tertio angustiori, ob-conico; 4-7, brevissi-  
mis, coarctatis, truncatis, perfoliatis; 8, 9, ma-  
gnis, truncatis, perfoliatis, ultimo magno, ovato;  
tres ultimi pubescentes, saepe obscuriores. Thorax  
brevis, transversus, antice bi-gnatus, lobo medio  
magno, porrecto, elevato, rotundato, interdum sub-  
emarginato, angulis lateralibus deflexis, prominu-  
lis, obtusis; lateribus rotundatis, margine valde di-  
lata, reflexo; basi sub-truncatus, angulis obtusis;  
supra valde convexus, hinc inde obsolete foveola-  
tus; crebre subtiliter punctulatus, tenui pubescens,  
totus

*totus fusco-piceus, sub-opacus. Scutellum parvum, rotundatum, fuscum, pubescens. Elytra latitudine medii thoracis, humeris oblique rotundatis, thora ce fere triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra valde convexa, fusa vel fusco-picea, opaca, pube brevissima, cinerea, subnitente adspersa, antefius sub-rugosa, & punctis majusculis, obsoletioribus, hiuc inde in series obsoletas dispositis, impressa, versus apicem leviora, subtilius obsolete punctulata. Corpus subtus fusco-piceum, magis nitidum, subtiliter obsolete punctulatum. Pedes breviusculi, validi, testacei, tarsum articulis anterioribus brevissimis, unguiculari magno, clavato,*

Var. b, colore pallidiori tantum differt, aut brunneus, aut ferrugineus, aut pallide testaceus.

2. *C. micans*: *fusco-piceus, pube brevissima, micante dense adspersus, antepnatum basi pedibusque testaceis, thorace aequali, ante sinuato, lateribus anguste marginato, elytris obsolete, vase, punctato-subrugosis.*

*Anobium micans*. Fabr. Eleut. I. 324. 14. Illig. col. bor. I. 331. 7. Payk. fn. I. 309. 8.

Herbst. col. 5. 64. 10. tab. 47. f. II. h.

*Ptinus villosulus*. Marsh. ent. br. I. 86. 14.

Habitat in fungis arboreis, passim, non infrequens.

Descr. Praecedenti simillimus & affinis, sed triplo minor & ultra, thoracis lateribus anguste tantum marginatis, angulis posticis rotundatis, & pube densiori, micante distinctus. Caput & oculi ut in praecedente omnino, etiam secundum Sexum; antenpa

tennarum structura eadem, stipite testaceo, clava nigra vel nigro fusca. Thorax brevis, transversus, antice bisinuatus, lobo medio supra caput nonnihil producto, rotundato, non vero elevato, angulis lateralibus subrectis, parum prominulus; lateribus & angulis posticis exacte rotundatis, anguste marginatis; basi ipsa truncatus, ibique etiam anguste marginatus; supra valde convexus, aequalis, fusco piceus, creberrime & evidentius quam in priori punctatus, pilis brevissimis, rigidis, certo ad lucem sita irideosimilans, adspersus. Scutellum ut in priori. Elytrorum forma omnino ut in praecedenti, fusco picea, rugulis punctisque impressis, vagis, anteriorius evidentioribus, & pube simili uti thorax adspersa. Corpus & pedes ut in praecedenti omnino.

Variat uti praecedens colore dilutius brunneo aut ferrugineo.

3. C. hispidus: fusco-piceus, pube brevissima, rigida adspersus, antennis pedibusque testaceis, thorace aequali, antice sinuato, lateribus anguste marginato, elytris obsolete punctato-striatis.

*Anobium hispidum.* Payk. fn. 1. 310. g.

*Anobium micans.* Panz. fn. 10. f. 8.

Var. b, capite thoraceque ferrugineis.

Var. c, corpore toto ferrugineo, aut testaceo.

Habitat in fungis arboreis passim.

Descr. Praecedentibus iterum paullo minor, exterum simillimus & valde affinis, elytris punctato-striatis praecipue distinctus. Caput & oculi ut in  
præ-

præcedentibus omnino. Antennarum structura eadem, totæ pallide testaceæ. Thorax paullo longior & minus convexus quam in C. micante, antice sub-bifinatus, lobo medio nonnihil producto, rotundato, non reflexo, angulis lateralibus parum productis, obtusis; lateribus & angulis posticis exacte rotundatus, tenue marginatus, basi truncatus, anguste marginatus, supra modice convexus, æqualis, subtilissime crebre punctulatus, fusco piceus, pilis brevissimis, rigidis, micantibus adspersus. Scutellum parvum, rotundatum piceum. Elytrorum forma fere ut in prioribus, humeris tamen paullo magis rectangulis, supra convexa, fusco picea, apicem versus dilatius ferruginea, sat regulariter, sed obsoletè, punctato striata, præsertim anterior, pube simili ut thorax adspersa. Corpus & pedes ut in prioribus,

Var. b; colore capitis thoracisque ferrugineo, tantum differt.

Var. c; aut toto corpore ferrugineo, aut pallio de testaceo, diversa.

Obs. Anobium micans Panzeri, elytris in pictura punctato striatis, huic speciei aptius allegatur.

4. C. festivus: fusco-testaceus, angustior, pube brevissima, rigida adspersus, anten-nis pedibus testeis, thorace antice truncato, lateribus tenue marginato, elytris creberrime subtiliter vage punctulatis.

*Anobium festivum. Panz. fa. 6. f. 7.*

Habitat in fungis arboreis rarius.

Descr. Præcedente adhuc minor, præsertim angustior, thorace antice truncato, elytris vage punctulatis, dilinctus. Caput transversum, minus quam

*Ptinus bidentatus.* Marsh. Ent. Br. I. 86. 17.

Femina: Capite thoraceque muticis.

*Ptinus inermis.* Marsh. Ent. Br. I. 87. 18.

Var. b, corpore toto dilutiori, aut testaceo,  
aut pallido.

Habitat in fungis arboreis perennantibus;  
præsertim Alni, passim.

Defcr. Medius, C. micante æqualis, fere glaber,  
vel pube omnium minutissima, vix visibili, adspersus;  
C. nitido multo magis convexus, thorace brevi, antice profunde bisinuato, elytrisque concinne punctulatis, abunde distinctus. Caput, maris deflexum, pi-  
çum, fronte plana, vix punctulata, marginibus la-  
teribus elevatis, antice in medio cornubus duobus  
erectis, acuminatis, armato; os ferrugineum, parum  
productum. Antenæ thorace multo breviores, te-  
stacea, structa ut in prioribus. Thorax, longitu-  
dine multo latior, antice profunde bisinuatus, angu-  
lis lateralibus productis, lobo medio prominulo, su-  
pra depresso, fere excavato, antice emarginato, cor-  
niculis duobus porrectis, jam majoribus, acuminatis,  
jam parvis, obtusis, armato; lateribus & angulis  
posticis rotundatus, ibique & postice anguste mar-  
ginatus, supra valde convexus, fere pulvinatus, ni-  
gro piceus, parum nitidus, crebre & subtiliter con-  
cinne punctulatus. Scutellum parvum, rotundatum,  
piceum, sublæve. Elytra latitudine thoracis, hu-  
meris rotundatis, thorace plus duplo longiora, apice acuminata, supra valde convexa, plerumque di-  
luti picea, parum nitida, æqualia, crebre, concin-  
ne punctulata. Alæ longæ, albidæ. Corpus subtus  
dilute piceum, obsolete punctulatum. Pedes brevi-  
pliculi, testacei, subnitidi.

E. T.  
Fem.

Femina similis; sed capitis margino anticus reflexus, sere integer, & lobus anticus thoracis aequalis, non impressus, nec corniculatus.

Var. b, differt tantum colore pallidiori, ut in plerisque hujus generis speciebus.

Obs. Aperte frontitornis Frölich, e Germania missus, postro quidem similis, sed quadruplo minor, pilis rigidis albidis adspersus; thorace etiam maris, antice integro, murico, adeoque abunde diversus.

7. C. perforatus: brevior, convexus, nigro-piceus, longius pubescens, ore, antennis pedibusque testaceis, thorace antice oblique truncato, elytris profunde vage punctatis.

Habitat in fungis arboreis rarius; in Silva Kinnensi Westrogothiae lectus.

Descr. Magnitudo & Statura convexa præcedit, paulo tamen brevior videtur. Caput deflexum, piceum, fronte depresso, subtilissime punctata, marginibus parum reflexis; os productum, ferrugineum, mandibulis piceis. Antennæ thorace breviores testaceæ, structura ut in prioribus. Thorax longitudine latior, antice oblique truncatus, lateribus & angulis posticis rotundatus, ibique & postice angustissime marginatus, supra valde convexus, sub-pulvinatus, nigro-piceus, crebre, subtiliter & obsoletius punctatus, pube tenui, erecta, cinerascente adspersus. Scutellum patrum, rotundatum, piceum, late. Elytra latitudine thoracis, & illo plus duplo longiora, apice rotundata, supra valde convexa, plurimque dilutiis rufo picea, subnitida, punctis mag-

nis,

*Ins. Svec. T. I. P. III. Bb*

nis, profunde impressis, vagis, minus crebris, undique adspersa, & pube simili uti thorax vestita. Corpus subtus piceum, crebre subtiliter punctulatum. Pedes breviusculi, validi, saturate rufo-ferruginci, tibiis apice dilatatis.

3. C. Alni: longior, minus convexus, nigro-piceus, pube brevissima, nitente adspersus, ore, antennis pedibusque testaceis, thoracis lateribus latius marginatis, elytris crebre, vase punctulatis.

Habitat in fungis arboreis, praesertim Alni, paucim.

Descr. Proxime praecedentibus longior, angustior & multo minus convexus, thoracis margine lateralii latiori, &c. præterea distinctus. Caput deflexum, piceum, fronte sub-convexa, crebre subtiliter punctulata, supra os transversim impressa, marginibus lateralibus parum reflexis; oculi prominuli nigro-brunnei; os productum, pallide testaceum. Antennæ thorace paullo breviores, basi pallide testaceæ, clava obscuriori, structura ut in prioribus. Thorax longitudine paulo latior, antice sublineatus, angulis nonanihil prominuis, lateribus rotundatus, marginibus latioribus, reflexis; basi truncatus, anguste marginatus, supra minus convexus, crebre subtiliter punctatus; piceus, margine antico, sepe in medio latius, pallide testaceo. Scutellum parvum, rotundatum, fusco testaceum. Elytra latitudine thoracis, sed illo triplo longiora, supra modice convexa, fusco-pices, crebre subtiliter & creberime punctulata, pilis brevissimis, depresso, micantibus, uti thorax adspersa. Corpus subtus piceum, sub nitidum, obsolete punctulatum. Pedes breviusculi, ferruginei.

Var.

Var. b, colore pallidiori tantum differt.

Obs. Nitidula dubia, Im. Sv. 1, 243. 33. huic generi quodammodo propinqua, sed antennarum strutura alia, &c.

### MYCETOPHAGUS.

*Palpi quatuor inaequales, articulo ultimo paulo crassiori, sub-truncato. Maxilla bifida. Ligula rotundata, integra. Antennæ vix thorace longioris, extrorsum crassiores. Corpus ovatum, minus convexum. Thorax postice latior. Tarsi filiformes, simplices.*

Sect. I. *Antennis extrorsum sensim crassioribus.*

I. *M. 4-maculatus: ferrugineus, antennarum medio, thorace elytrisque nigris, his striato-punctatis, singulo maculis duabus flavescenti-ferrugineis.*

*Fabr. Eleut. 2. 565. 2. Hellwig. Schneid. Mag. 4. 396. 1. Payk. fn. 3. 315. 1. Latr. Gen. Ins. 3. 9. 1. Panz. fn. 12. f. 9.*

*Carabus 4-pustulatus. Linn. Syst. 2. 672. 34. Fn. Sv. 811.*

*Chrysomela 4-pustulata. Linn. Syst. 2. 597. 80. Ap. Sv. 549.*

*Boletaria 4-pustulata. Marsh. Ent. Br. 1. 138. 1.*

Var. b. Elytris saturatius nigris, macula tantum baseos ferruginea.

Habitat in fungis arboreis, præsertim Quercinis, paßim; var. b, rarius occurrit.

Descr. Major reliquis nostris hujus generis, Derm. pellione latior. Caput parvum, triangulare, ferrugineum, crebre punctatum, inter antennas striæ profunda impressum; oculi globosi, nigro-brunnei. Antennæ vix thorace longiores, inferne ferrugineæ, articulis 6 - 10 nigris, sensim crassioribus, truncatis, ultimo longiori, acuminato, pallide testaceo. Thorax transversus, antice multo angustior, late sed non profunde emarginatus, lateribus rotundatus, postice bi-sinuatus, angulis productis, acuminatis; undique anguste marginatus, supra convexus, niger, pubescens, creberrime punctatus, & versus basin utrinque foveola rotundata, profunda, impressus. Scutellum mediocre, rotundatum, nigrum, punctatum. Elytra latitudine baseos thoracis, eique arcte applicata, thorace quadruplo longiora, apice rotundata, supra parum convexa, nigra, vel nigro-picea, pubescens, crebre, sed leviter & obsoletius punctata, vel potius crenato-striata, interstitiis subrugosis; in singulo macule duæ flavo-ferrugineæ, quarum una baseos, magna, inæqualis, altera pone medium, sublunata, finu apicem elytrorum respiciente. Corpus totum subtas ferrugineum, creberrime, subtiliter & obsolete punctulatum, tenui pubescens. Pedes longisculi, tenui, pallidius testacei.

Var. b, in omnibus simillima, modo elytra saturatius nigra, magis nitida, macula posteriori pallida omnino deficiente,

2. M. atomarius: fusco-ferrugineus, supra niger, elytris macula humerali, fascia postica

ftica arcuata, punctisque disci testaceis,  
antennarum articulo ultimo brevi ovato.

*Fabr. Eleat.* 2. 568. 14. *Hellwig. Schnid. Mag.*  
4. 399. 3. *Payk. fa.* 3. 317. 3. *Panz. fa.* 12. f. 10.

*Dermestes atomarius.* *Thunb. Inj. Sv.* 6. 78.

*Boletaria atomaria.* *Marsh. Ent. Br.* 1. 141. 9.

Var. b, Elytris fusco-ferrugineis vel brun-  
neis, signaturis pallidis.

Habitat in Fungis arboreis, non infrequens.

Descrip: Statura precedentis, sed dimidio minor  
& ultra. Caput parvum, triangulare, fusco-piceum.  
punctatum, oce testaceo, stria impressa a fronte di-  
stincto; oculi globosi, nigro-brunnei. Antennae lo-  
gitudine thoracis, crassifusculæ, extrorsum sensim  
crassiores, inferne fusco-ferrugineæ, articulis 3-4  
nigrioribus, ultimo ovato, brevi, pallide testaceo.  
Thorax brevis, transversus, antice angustior, trun-  
catus, lateribus rotundatus, angusto marginatus; basi  
bi-sinuatus, supra convexus, niger, vel nigro-piceus,  
tenue pubescens, crebre punctatus; versus basin ut-  
rinque foveola profunde impressa, & praeterea im-  
pressionses tres obsoletæ, una in medio basios, duas  
in disco. Scutellum orbiculatum, nigrum, punctu-  
latum, pubescens. Elytra latitudine thoracis & illo  
quadruplo longiora, supra parum convexa, nigra,  
evidenter punctato-striata, tenue pubescentia; in ipso  
humero macula magni sub-quadrata, testacea; paulo  
inferius versus suturam alia parva, rotundata,  
tum puncta 3, 4 aut 5 sparsa, in disco; dein fascia  
transversa, arcuata, abbreviata, & demum intra ap-  
icem macula rotundata, omnes testaceæ aut ferru-  
gineæ. Corpus subtus fusco-ferrugineum, creberri-  
me & subtillissime punctulatum, pubescens, ventre ple-

rumque dilutiori. Pedes tenues, fuscop-ferruginei, interdum dilutius testacei.

Var. b, differt tantum colore dilutiori; thoracis latera plerumque ferruginea; elytra brunnnea vel fuscop-ferruginea, signata pallidis; pedes testacei.

3. *M. variabilis*: piceo-ferrugineus, elytris nigro-piceis, basi maculisque ferrugineis, antennarum articulo ultimo longiori, pallido.

*Hellwig. Schneid. Mag.* 4. 397, 5.

a. Elytris fascia lata baseos, alia parva, abbreviata simplici, lunata, pone medium, punctoque intra apicem, testaceis. *Hellwig. l. c. var. d. e.*

*Mycetophagus piceus.* *Fabr. Eleut.* 2. 569. 22.  
*Panz. fn. 1. f. 22.*

*Boletaria varia.* *Marsh. Ent. br.* 1. 140. 5.

Var. b, punto in super parvo, pallido, in medio marginis elytrorum, inter fascias. *Hellw. l. c. var. c.*

*Mycetophagus piceus.* *Payk. fn.* 3. 318. 4. *ditto var. Panz. fn. 2. f. 5.*

Var. c, ut var. b, sed thorax dilutius ferrugineus.

*Mycetophagus lunaris.* *Fabr. Eleut.* 2. 568. 19.

Var. d, ut b, c, sed etiam elytra ferruginea, maculis punctisque pallidioribus.

*Myc-*

*Mycetophagus brunneus.* Panz. fn. 57 f. 21.  
Ilig. Mag. 5. 245. 22.

Var. e., ut var. b, c, sed fascia posterioris elytrorum flexuosa - undata.

*Boletaria undulata.* Marsh. Ent. br. I. 140. 6.

Var. f., fascia baseos elytrorum interne abs. rupta, posteriori fascia aut lunata, aut flexuosa.

*Mycetoph. atomarius.* Payk. fn. 3. 318. 3. var. b.

Var. g, minor, nigrior, fasciis omnino ut in var. f.

Var. h, elytris nigris, macula majori humerali, puncto marginali medio, punctis tribus loco fasciae posterioris, maculaque intra apicem, testaceis. Hellwig. loc. cit. f. var.

Habitat in fungis arboreis, praesertim Quercus, Alni, passim.

Deser. Magnitudo, statuta & summa affinitas praecedentis, articulo antennarum ultimo majori, & signaturis elytrorum praecipue distinctus. Caput oculi, os ut in precedenti omnino. Antennæ longitudine thoraci, crassiusculæ, extrosum sensum dafiiores, ferruginea, ante apicem plerumque obscuriores, articulo ultimo oblongo-ovato, pallido, multo majori quam in praecedenti. Thorax & scutellum ut in priori omnino. Elytrorum forma eadem, nigro-picea, tenui pubescens subtiliter punctato-striata; in ipsa basi fascia lata ferruginea, postice finata, versus suturam magis producta, includens maculam sub-quadratam, nigram, scutellum ambientemq. B b 4 pone

pone medium fascia abbreviata, simplex, aut lib-  
recta, aut lunata, & intra apicem macula, aut ma-  
jor, aut parva, punctiformis, omnes ferrugineæ vel  
testaceæ. Corpus subtus ferrugineum, subtilissime  
punctulatum, pubescens. Pedes tenuer, ferruginei,  
interdum pallidius testacei.

Varientates b, c, d, simillimæ, differunt modo  
notis in illarum diagnosi indicatis.

In var. e, fascia posterior elytorum flexuosa,  
antrosum angulum emittens.

In var. f, fascia baseos interne abrupta, e ma-  
cule duabus constans; humerali majori, subquadra-  
ta, altera versus futuram, paullo inferior, rotunda-  
ta, aut libera, aut priori connexa; fascia posterior  
aut simplex ut in a, b, c; aut flexuosa ut in e.

Var. g, minor, saturatius nigra, antennæ nigri-  
griseas, basi & articulo ultimo pallidioribus, fasciis  
elytrorum ut in var. f.

Var. h, quoad signaturas magis diversa, ut in  
diagnosi; ceterum varietatibus a-f, simillima.

M. Populi: rufo-testaceus, sub-pubescent,  
thorace vix punctulato, elytris pallidiori-  
bus, subtiliter punctato-striatis, fascia me-  
dia apiceque late fuscis.

*Natur. Eleut.* 2. 570. 26. *Payk. fn.* 3. 319. 5.

Habitat in fungis arboreis, præcipue in  
truncis emortuis Populi tremuleæ, rarius.

Descr. Statura præcedentis, & præfertim ejus  
var. d, similis, sed paullo minor; thorace vix pun-  
ctulato, elytris multo subtilius punctato-striatis, ali-  
ter coloratis, distinctus. Caput subtriangulare, rufo-  
testaceum, subtilissime, ut vix visibiliter, creberrime  
punctulatum, tenuis pallido-pubescent, striga trans-  
versa,

verfa, profunda, inter antennas impressum; oculi globosi, nigra brunnei. Antennae thorace parum longiores, ferrugineæ, extrosum sensim crassiores, articulo ultimo longiori, ovato. Thorax brevissimus, transversus, antice late, sed non profundè emarginatus, margine ipso emarginaturæ fuscescente; lateribus parum rotundatus, tenue marginatus, basi sub-truncatus vel vix sinuatus, supra parum convexus, rufo testaceus, tenuis pubescens, vix vel omnium subtilissime punctulatus; intra basin utrinque foveola impressa, punctiformis, multo minor quam in prioribus. Scutellum rotundatum, rufo testaceum, subtilissime punctulatum. Elytra thoracis latitudine, sed quadruplo longiora & ultra, supra parum convexa, pallidius testacea, subtiliter punctato-striata, tenui pubeſcentia; in medio fascia fusca, extrosum latior, & ad futuram etiam dilatata, pone quam fascia obliqua, abbreviata, pallida, & deinceps apex late fuscus, cum puncto pallido, obsoleto, in lingulo, fuscedo apicis plerumque ad saturam cum fascia media confluit, & interdum sutura ante fasciam, ut regio scutelli paulo obscuriora. Corpus subtus rufo-testaceum, tenuis pubescens, vix punctulatum. Pedes tenues, rufo-testacei, interdum pallidiores.

5. M. multi-punctatus: oblongus, ferrugineo-piceus; sub-pubescent, antennis pedibusque dilatioribus, thorace punctato, elytris punctato-striatis, maculis punctisque plurimis testaceis.

Var. 6, pallidior, elytrorum maculis ita dilatatis, ut interstitia obscura lineolas irregularis, anastomozantes tantum formant.

tum. Elytra thoracis medio non latiora, sed illo quadruplo longiora, supra parum convexa, nigra, sat profunde punctata striata, pube longiori, suberecta, fuscescente adspersa, margine laterali & apicis inaequaliter pallide testaceo; in fibculo elytro pectorale maculae duæ lunatae, cum margine connexæ & ejusdem coloris, altera pone humerum, satiram non attingens, altera pone medium, cum opposita fere connexa, unde fasciae duæ transversales, sub interruptæ extant. Pectus picum, profundius punctatum; ventor ferrugineus, pubescens, vix punctatus. Pedes longiusculi, pallidus rufotestacei.

*Scut. 2:da, Antennarum articulis ultimis determinate majoribus.*

7. *M. bi-fasciatus: niger, pubescens; antennarum basi pedibusque ferrugineis, elytris vage punctatis, fasciis duabus apicisque pallide testaceis.*

*Latreille Gen. Inf. 3. 10. 2.*

*Cryptophagur bifasciatus.* Herbst. col. 4. 175.

4. tab. 42. f. 12. Payk. fn. 3. 353. 2.

*Ips. bi-fasciata.* Fabr. Eleut. 2. 529. 14.

*Myctophagus signatus.* Panz. fn. 57. f. 20. Crit. Rev. 1. 135.

*Dermestes fasciatus.* Thunb. Act. Upf. 4. 5. 7.

Vat. b., pallidior, elytrorum fasciis latioribus, confluentibus.

*Ips. marginalis.* Panz. fn. 2. f. 24. Crit. Rev. 1. 135.

Habl-

fasciam irregularem formant; juxta apicem in fingu-  
lo elytro macula major, rotundata. Corpus subitus,  
aut fusco-piceum, aut dilutius fusco-ferrugineum,  
subtiliter punctulatum. Pedes longiusculi, testacei,  
interdum pallidi.

Varietates b, & c, colore pallidiori tantum di-  
finitae, ut in diagnosi indicatum, forte recentius  
exclusive, immaturae.

6. *M. fulvicollis*: oblongus, niger, lon-  
gius pubescens; thorace pedibusque rufis,  
elytris sub-depressis, punctato-striatis;  
margini fascisque duabus interruptis pal-  
lide testaceis.

Fabr. Eleut. 2. 369. et. Payk. fn. 3. 320. 6.

Panz. fn. 62. f. 4.

Habitat in Fungis arboreis, apud nos ra-  
gius; in Smolandia a Dom. Wessrim le-  
ctus.

Descr. Magnitudo & statura oblonga preceden-  
tis, sed paulo minus convexus, longius pubescens,  
quam ceterae hujus generis Species. Caput trian-  
gula, nigro-piceum, crebre punctatum, ore rufo,  
stria transversa, profunde a fronte distincto; oculi  
majusculi, globofi, nigro-brunnei. Antennae thorace  
longiores, extrosum sensim crassiores, articulis 1-6  
rufis, 7-10 nigris, undecimo breviter rotato, ferru-  
ginea, Thorax transversus, antice sub-emarginatus,  
lateribus aequaliter rotundatus, evidenter marginatus,  
basi sub-truncatus, supra parum convexus, sat  
profunde punctatus, pube longiori, praesertim versus  
margines, adspersus, totus supra & infra rufo-testa-  
ceus. Scutellum rotundatum, rufo-piceum, puncta-  
tum.

Var. b, similissima, modo pallidior, forte immatura; thorax & elytra fusco-testacea vel dilute brunnæ, signaturis albido-flavescens.

8. *M. punctatus*; pilosus, ferrugineus, elytris crebre, vage punctatis, fusco-casta-neis, basi punctoque intra apicem ferrugineis.

*Hellwig. Schneid. Mag.* 4. 401. 8. *Panz. fn.* 22. f. 12. *Crit. Rev.* 1. 135.

*Ips punctata.* *Fabr. Eleut.* 2. 579. 13.

*Cryptophagus punctatus.* *Payk. fn.* 3. 352. 2.

*Cryptophagus pilosus.* *Herbst. col.* 4. 177. 7. tab. 42. f. 15.

*Silpha humeralis.* *Marsh. Ent. Br.* 1. 123. 22.

Habitat in Fungis arboreis, præsertim Fagi, in Svecia meridionali, rarius.

Descr. Minoribus M. variabilis individuis æqualis, sed magis convexus, pube longiori, sub-erecta, cinerea, undique adspersus. Caput sub-triangulare, obscure ferrugineum, crebre & profunde punctatum, supra os striga transversa, arcuata, impressum; oculi globosi nigro-brunnei. Antennæ vix thorace longiores, ferrugineæ, pilosæ, articulis tribus ultimis determinate majoribus, ut in pliori. Thorax transversus, antice angustior, sub-emarginatus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, margine subtiliter crenulato; basi fere triangulatus, supra convexus, totus saturate ferrugineus, crebre, profunde punctatus, pubescens. Scutellum fere transversum, truncatum, ferrugineum pubescens. Elytra latitudine baseos

baseos thoracis, sed illo quadruplo longiora, & ultra, spicē rotundata, supra convexa, crebre & sat profunde, vase purata, aut nigro castanea, subnitida, aut dilutius fusco-brunnea, basi transversim inæqualiter ferruginea, & intra apicem punctum vel macula parva, ovata, ejusdem coloris, quæ tamē sepe valde obsoleta. Corpus subtus ferrugineum, pubescens, pectore obscuriori, fortius punctato, ventre subtius punctulato. Pedes mediocres, pallide ferruginei, pubescentes, tarsis ut in præcedentibus.

Obs. *Cryptophagus* in multis similis & affinis, sed tarsi in utroque Sexu 4. articulati, quantum mihi videre licuit.

9. *M. sumatus*: ferrugineus, pallido-pubescentes, oculis nigris, elytris subtiliter striato-punctatis, intersticiis rugulosis.

*Dermestes tumatus*. Linn. *sys. 2.* 564. 22. tab. Dom. Kirby, secundum Muscum Cl. a Linn. id. Marsh. Ent. Br. I. 65. II. Schönh. synon. 2. 94. 45.

*Dermestes stercoreus*. Linn. *Fn. Sv.* 432.

*Cryptophagus variabilis*, Payk. *fn. 3.* 354. 3. Müller in Illig. *Mag. 4.* 207. ♂ 216.

*Dermestes variabilis*. Herb. col. 4. 141. 22. tab. 41. f. 5.?

Habitat in quisquiliis, ad domos; etiam in fungis, floribus, sat frequens.

Debet. Statura fere præcedentis, sed longe minor, *Cryptophago Lycoperdi* æqualis. Caput subtriangulare, ferrugineum, crebre subtiliter punctatum,

tum, supra os trigona arcuata, transversa, impressum; oculi globosi, nigri. Antennæ vix thorace longiores, crassiusculæ, ferrugineæ, pubescentes, articulo primo crasso, cylindrico; 2:0 etiam crassiusculo, obtuso-conico; 3-8 brevioribus, truncatis, exterioribus sensim paulo crassioribus; 9. 10 magnis, truncatis; ultimo etiam magno, ovato. Thorax brevis, transversus, antice paullo angustior, sub-bifiduatus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, basi etiam sub-finiatus, supra modice convexus, totus ferrugineus, crebre subtiliter punctulatus, longius pallido-pubescentia, punctis parvis, seriatis, obsolete striata, intersticiis crebre, subtiliter transversim rugulosis. Corpus subtus dilutius ferrugineum, subtilissime punctatum, tenue pubescens. Pedes medioseres, pallide ferruginei.

Obs. Etiam hæc Species *Cryptophagis* valde affinis, sed tarsi semper 4-articulati, quantum mihi videre licuit, & Dom. Müller loc. cit. p. 216, etiam confirmat; *Dermestes variabilis*, Fabr. Eleut. I. 319, 38, ad Cis Boleti var. b., pertinet; *Synonymon Hæbftii* minus certum.

10. *M. testaceus*: ovatus, convexus, rufotestaceus; oculis nigris, elytris subtiliter vague punctularis, antennarum articulis quinque ultimis determinate majoribus.

*Diaperis*

Fabr. Eleut. 2. 570. 28. Hellwig. Schneid.

Mag. 4. 400. 7. Müller in Illig. Mag.  
4. 207.

*Diaperis*, an? Illig. Mag. 5. 245. 28.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,  
præsertim Quercus, in Westrogothia ra-  
zius lectus.

Descr. Minimus hujus genetis, Cryptophagò Abietis æqualis. Caput tub. triangulare, ferrugineum, subtilissime punctulatum; fronte inter antennas lat. profunde transversim impressa; oculi globosi, nigr. Antennæ vix thorace longiores, testaceæ, articulo primo majori, cylindrico; secundo minori; 3 - 6, parvis, brevibus, approximatis; 7 - 10, latis, brevibus, truncatis, perfoliatis; ultimo sequente lato, ovato. Thorax brevis, transversus, antice multo angustior, sub-bisinuatus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, basi etiam obsolete sinuatus, supra convexus, totus testaceus, crebre subtilissime punctulatus, pube tenuissima, deprecta, pallida adspersus. Scutellum sub-triangulare, testaceum, punctatum. Elytra latitudine baseos thoracis, & illo quadruplo longiora, supra convexa, tota testacea, undique creberim & subtilissime vage punctulata, pube simili uti thorax adspersa. Corpus subtus pallidus testaceum, omnium subtilissime punctulatum. Pedes mediocres, pallide testacei, tarsis, saltem potificis, certe 4-articulatis.

Obs. Oculatissimus Dom. Müller, loc. cit. tar-  
bos anteriores 5-articulatos esse contendit, unde ad  
Sectionem præcedentem pertineret hoc Insectum;  
sed vix apta Generibus Hypophloeo aut Diaperidi  
affociari queat.

NE.

Inj. Svec. T. I. P. III. Ce

## N E M O Z O M A. Latreille.

*Palpi sub-aquales, filiformes, articulo ultimo longo, sub-cylindrico. Mandibulae valida, porrectæ, elongatae, sub-dentatae. Maxillæ elongatae, simplices, membranaceæ. Ligula brevis, membranacea, sub-quadrata, acute & marginata. Antennæ capite parum longiores, clava trinervitulata. Corpus linearis-elongatum, cylindricum. Caput magnum, elongatum, thorace latius.*

i. *N. elongatum*: glabrum, nigrum, nitidum, antennis pedibusque rufis, clytris vage punctatis, basi maculaque intra apicem testaceis, fronte profunde sulcata.

Latreille Gen. Ins. 3. 13. t. tab. II. f. 4.

*Dermestes elongatus*. Linn. Synt. 2. 56t. 2. Fn. Sv. 409;

*Colydiun fasciatum*. Herb. col. 7. 281. 2. tab. 112. f. 12. Panz. fn. 31. f. 22. Crit. Rev. 1. 134.

Habitat sub cortice arborum emortuarum, apud nos rarissime; Upsalise; Dom. Uddman; in Pino Sylvestri Bahusiae, Ipse.

Descr. Corpus parvum, lineare, valde angustum, Lycto bipustulato Fabr. paullo longius, sed angustius. Caput magnum, crassum, elongatum, postremum, nigrum, nitidum, convexum, sat profunde sed minus crebre punctatum, fronte antica sulco profundo longitudinali exarata, fere fissa; os piceum; oculi parvi, laterales, depresso, nigri. Antennæ capite

capite parum longiore, ferrugineæ, articulis decem, primo crasso, ovo; secundo multo minori, brevi; 3-7 brevissimis, coarctatis, exterioribus sensim crassioribus; x, y, magnis, truncatis, perforatis, ultimo sequente crasso, ovo. Thorax vix capite longior, basi apiceque truncatus, antice latitudine capitis, posterius angustior, lateribus & bâsi anguste marginatus. Supra modice convexus, niger, nitidus, evidenter, sed minus crebre punctatus. Scutellum minutum, rotundatum, rufo-piceum. Elytra a thorace spatio remota, illius basi latiora, & illo plus triplo longiora, lineari cylindrica, convexa, vagè punctata, antice fere ad tertiam partem rufo-testacea, deinde nigra, nitida, cum macula ovata testacea intra apicem, in singulo elytro. Corpus subitus nigrum, nitidum, parce punctatum. Pedes breviusculi, valvâ, rufo-testacei,

## COLYDIUM.

*Palpi inaequales, articulo ultimo crassiori, ovo, vel sub-cylindrico. Ligula membranacea, emarginata. Labrum brevissimum, extertum, transversum, integrum. Antennæ capite parum longiores, articulis duobus basos majoribus; 3-8, parvis, brevissimis, coarctatis; y, io, latis, truncatis, ultimo etiam magno, ovo. Corpus levigato-longatum. Caput thorace brevius, antice obtusum.*

i. C. elongatum: nigrum, nitidum, antennæ pedibusque ferrugineis, thorace tricusculo, elytro singulo costis quatuor elevatis, intersticiis dupliciti serie punctulatis.

*Fabr. Eleut.* 2. 556. 5. *Latr. Gen. Inf.* 3. 21.

1. *Herbst. col.* 7. 279. 1. *tab.* 112. *f.* 11. *Payk.*  
*fn.* 3. 312. 1. *Panz. fn.* 3. *f.* 17.

*Ips linearis.* *Oliv. Ent.* 2. 18. 5. 3. *pl.* 2. *f.*  
17. *a, b.* *Ross. Fn. Etr.* 1. 50. 123. *tab.* 2.  
*f.* 45.

*Tritoma Sulcata.* *Thunb. Mus. Upf.* 3. 39.

Var. *b*, *Elytris basi rufo-ferrugineis.* *Payk.*  
1. *c. var. b.* *Kugell. Schneid. Mag.* 4. 495. 1.

*Colydium filiforme.* *Fabr. Eleut.* 2. 556. 7.  
*Panz. fn.* 104. *f.* 10.

Habitat in truncis arborum emortuariis;  
præsertim *Quercus*, *Alni*, *Abietis*, intra  
lignum, paßim.

Descr. Corpus lineare, valde angustum; mi-  
gnitudo variat; maiores longitudinem Hypophloeï  
castanei attingunt, alii longe minores, & semper  
illo angustiores. Caput porrectum, sub-quadratum,  
parum convexum, subtiliter, obsolete punctulatum,  
nigrum, nitidum, versus os rufo-ferrugineum; su-  
pra basi antennarum lineola obliqua, impressa ut-  
rinque; oculi laterales, nigri. Antennæ capite pa-  
sum longiores, obscure ferrugineæ, apice dilutio-  
res. Thorax latitudine baseos duplo longior, ante-  
rius paullo latior, basi apiceque truncatus, lateribus  
& basi marginatus, supra modice convexus, niger,  
nitidus, parce & obsoletius punctulatus, canalicula  
media profundiori, & alia utrinque tenui, margini  
parallela, exaratus. Scutellum brevissimum, trans-  
versum, elevatum, nigrum. Elytra thoracis basi pa-  
rum latiora, & illo duplo longiora, apice obtuse  
rotundata, supra convexa, nigra vel nigro picea, ni-  
tida;

tida; in singulo lineæ vel costæ quatuor longitudinales elevatae, præter costam lateralem & suturam, & in singulo interstitio series duæ e punctis parvis, impressis. Corpus suhtus dilatius piceum, sub-annatum, vix visibiliter punctulatum. Pedes breviusculi, rufo-ferruginei.

Var. b, differt tantum elytris antice rufo-ferrugineis, saepe ad tertiam partem totius longitudinis,

S I L V A N U S. Latreille.

*Palpi brevissimi, inæquales, articulo ultimo majori, sub-cylindrico. Ligula coriacea, transverso-quadrata, integra. Antennæ thorace paullo longiores, nude insertæ, articulis ita distinctis, ultimis tribus multo majoribus, clavam constituentibz. Corpus elongatum, angustum, sub-lineare, depresso. Caput anterius angustatum, sub-triangulare. Tarsi omnes 4-articulati.*

I. *S. unidentatus*: testaceo - ferrugineus, punctulatus, oculis nigris, thorace elongato, postice angustato, angulis anticis acuminato - productis, elytris punctato-striatis.

*Latr. Gen. Ins. 3. 20. I. tab. II. f. 2.*

*Dermetes unidentatus. Fabr. Eleut. I. 317. 27.  
Panz. tn. 3. f. 6.*

*Colydium unidentatum. Payk. fn. 3. 314. 3.*

*Colydium planum. Herbst. col. 7. 285. 7. tab.  
113. f. 3.*

*Lyctus unidentatus*. Kugelt. Schneid. Mag. 5.  
566. ♀ Müller Illig. Mag. 4. 204.

*Ips unidentata*. Q. in. Ent. 2. 18. 9. 12. pl. 1.  
f. 4. a. b.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,  
pallidi.

Descr. Parvus, tenuis, Lycto bipustulato minor. Caput majuscum, porrectum, sub-triangulare, convexum; crebre subtiliter punctulatum; oculis nigris, modice prominulis. Antennae longitudine thoracis, crassiusculæ, ferrugineæ, articulo primo magno, clavato; 2. 3. minoribus, ob conicis; 4-8 brevibus, nodosis; 9, 10, crassis, truncatis, perfoliatis, ultimo æque crassi, rotundato, pallidiori. Thorax elongatus, antice multo latior, sub-bistriatus, angulis prominulis, acuminatis, lateribus immarginatus, basi rotundatus, supra dorso planus, hisc iude obsoletissime impressus, totus ferrugineo-testaceus, subtilissime crebre punctulatus. Scutellum parvum, transversum, ferrugineum. Elytra a thorace spatio remota; illius basi dimidio fere latiora, & illo plus duplo longiora, linearia, apice rotundata, supra subdepressa, tota testaceo-ferruginea, subtiliter, crebre punctato-striata, pilis minutissimis parce adspersa. Alæ amplæ, niveæ. Corpus subtus ferrugineum, subtilissime punctulatum. Pedes breviusculi, ferruginei, femoribus validis.

Obs.:<sup>3</sup> *Dermestes bidentatus*, Fabr. Panz. huic proximus, sed major; thorace antice magis dilatato, dorso evidenter sulcato, distinctus; apud nos, quantum mihi innotuit, non lectus.

a. S. 6-dentatus: fusco-testaceus, pubescens,  
thorace sulcato, utrinque sex-dentato,  
elytris

*elytris punctato-striatis, interstitiis alternis elevationibus.*

*Dermestes 6-dentatus.* Fabr. Eleut. 1. 317. 25.  
Panz. fn. 14. f. II.

*Colydium 6-dentatum.* Payk. fn. 3. 313. 2.

*Colydium frumentarium.* Fabr. Eleut. 2. 557.  
u. Herbst. col. 7. 283. 4. tab. 113. f. 1. a.

*Ips frumentaria.* Oliv. Ent. 2. 18. 10, 14. pl.  
2. f. 13. a, b.

*Dermestes Surinamensis.* Linn. Syst. 2. 565. 29.

*Tenebrio Surinamensis.* De Gér. Ins. 5. 54. 5.  
tab. 13 f. 12.

*Lyctus 6-dentatus.* Knagell. Schneid. Mag. 5.  
566. 10.

*Habitat in Mercatorum tabernis, praesertim  
inter grana Oryzae.*

Deser. Statura parva, angusta præcedentis, sed paullo magis convexus. Caput magnum, porrectum, fusco-testaceum, anterius minus angustatum, supra fere planum, creberrime subtiliter punctulatum; oculi globoli nigri. Antennæ longitudine thoracis, crassiusculæ, fusco-testaceæ, structura fere ut in præcedenti. Thorax oblongus, antice sub bisinuatus, lateribus dentibus sex validis, sub-aequalibus, utripque armatus, postice paullo angustior, rotundatus; in dorso lineæ tres elevatae longitudinales, quarum media recta, laterales nono nihil arcuatæ, unde existent in dorso sulci duo-lati, paralleli, parum profundi; totus præterea fusco-testaceus, creberrime punctulatus, pube brevi, depresso, grisea, adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, fuscum. Ely-

tra a thorace remota, illius basi fere dimidio latiora, & illo plus duplo longiora; apice rotundata, supra modice convexa, fusco-testacea, pube densiori, depresso, cinerea adspersa, sat profunde punctatostriata, intersticiis alternis elevationibus, densius pubescens. Corpus subtus fusco testaceum, crebre subtiliter punctulatum. Pedes breviusculi, dilatius testacei, femoribus validis.

## L Y C T U S.

*Palpi breves, filiformes, articulo ultimo acuminato. Mandibulae exsertae, apice bifidae. Antennae longitudine fere thoracis, articulis non distinctis, ultimis duobus multo majoribus. Corpus elongatum. Caput prominulum, anteriorius angustatum. Thorax sub-quadratus, postice elytris angustior.*

L. *canaliculatus*: fusco-brunneus, opacus, pubescens, thorace sub-quadrato, lateribus denticulato, dorso sovea oblonga impresso, elytris convexo-cylindricis, striatim pilosis.

Fabr. Eleut. 2. 562. 13. Payk. fn. 3. 332. 9.  
Panz. fn. 4. f. 16.

*Lyctus oblongus.* Latr. Gen. Inf. 3. 16. 1.

*Ips oblonga.* Oliv. Ent. 2. 18. 7. 8. pl. 1. f. 5. a, b.

*Bitoma unipunctata.* Herbst. col. 5. 26. 1. tab. 46. f. 3. c.

*Silpha fusca.* Linn. Synt. 2. 573. 28.

*Synchita*

*Synchita canaliculata.* Hellwig. Schneid. Mag.

4. 405. 8.

*Dermetes linearis.* Thunb. Att. Upf. 4. 4 4.

Habitat in ligno sicco Quercus, sat frequens.

Deser. Magnitudo valde variat; majores longitudinem Colydi elongati attingunt, & illo paulo latiores; alii duplo, imo triplo minores, & ultra; color etiam variabilis, aut fuscus, aut brunneus, aut testaceus. Caput porrectum, breviter triangulare, fuscum, crebre rugoso-punctatum, pubescens, oculis magnis, globosis, nigris; Pslpi pallide testacei; mandibulae validæ, parum arcuatae. Antennæ longitudine fere thoracis, crassiusculæ, fulvo-brunneæ, pilosæ, articulo primo crasso, cylindrico; secundo rotundato, crassiusculo; 3-9, nodosis, tubæqualibus; decimo magno, truncato; ultimo etiam magno, conico, plerumque pallidiore. Thorax sub-quadratus, antice paullo latior, rotundatus, lateribus obliquis, sub-rectis, anguste marginatis, subtiliter crenulatis; basi media truncatus, angulis oblique prominulis; supra modice convexus, fuscus, opacus, crebre rugoso-punctulatus, pube densa cinereo-flavescente, depressa, adspersus; in medio dorsi fovea late, oblonga, impressa, neque basin nec apicem attinens. Scutellum parvum, rotundatum, fuscum, elevatum. Elytra thoracis basi latiora, humeris prominulis, & illo fere quadruplo longiora, linearicylindrica, convexa, obsoletius striata, striis crebre, subtiliter punctatis, interstitiis singulis serie e pilis depressis, cinereo-flavescientibus adspersis, unde cinereo-lineata apparent. Corpus subtus dilutius brunneo-testaceum, vix punctulatum, tenue pubescens. Pedes breviusculi, tenues, dilutius testacei, pubescentes.

2. *L. contractus*: ferrugineo-castaneus, glaber, thorace sub cordato, hifoveolato, elytris depresso-punctato-striatis, sutura plerumque nigra.

*Fabr. Eleut.* 2. 563. 16. *Payk. fn.* 3. 333. 10.

*Bitoma bi-punctata*. *Herbst. col.* 5. 28. 3. *tab.*  
46. *f* 5. 6

*Synchita bi-punctata*, *Hellwig. Schneid. Mag.*  
4. 405. 9.

*Tritoma calon. Rhen in Schneid. Mag.* 2. 240. 7.

Var. *b*, corpore toto ferrugineo.

*Ips contracta*. *Oliv. Ent.* 2. 18. 6. 5. *pl.* 2.  
*f.* 10. *a*, *b*?

**Habitat** sub cortice truncorum Pini, passim.

**Descr.** Præcedente paullo latior, magis depresso, cæterum simili modo magnitudine variat. Caput porrectum, castaneum, aut rufo-piceum, crebre & profunde rugoso-punctatum, versus os angustatum, oculis globosis, prominulis, nigris; mandibulæ arcuatae, apice evidenter bifidæ, lacinias sub æqualibus, acutis. Antennæ thorace breviores, ferrugineæ, articulo primo crasso, sub-globoso, subtus inciso; secundo brevi, truncato; tertio longiori, ob-conico; 4-9 brevibus, truncatis, decimo magno, lato, perfoliato, truncato; ultimo paullo minori, lenticulari. Thorax latitudine antica paullo longior, antice sub-truncatus, angulis deflexis, prominulis, lateribus posne apicem dilatato-rotundatis, dein oblique versus basin directis, vix marginatis; basi multo angustior, truncatus, angulis oblique prominulis; supra parum convexus, fusco-castaneus, vel rufo-piceus, crebre &

& profunde punctatus; in dorso antice fovea magna, profunda, irregularis, & pone illam, versus basin, alia minor, rotundata. Scutellum mediocre, rotundatum, piceum. Elytra thoracis bâti multo latiora, & illo fere triplo longiora, bâsi inæqualiter emarginata, humeris arcuato-rotundatis, prominulis; versus medium laterale magis dilatata, apice sub acuminata, supra sub deprecta, rufo-ferruginea, nitida, sutura late nigro picea; tenui punctato striata, striae suturæ proxima, profundiori, reliquis per paria magis approximatis, interstïtïis planis, laevibus. Corpus subtus plerumque nigrum vel nigro-piceum, subtiliter punctulatum. Pedes breviusculi validi, rufo-ferruginei, tarvis omnibus evidenter quadri-articulatis.

Var. b. differt tantum colore totius corporis dilutiis ferrugineo, sutura concolore.

3. L. nitidus; linearis-cylindricus, niger, glaber, nitidus, antennis, palpis pedibusque ferrugineis, clytris subtilissime punctato-striatis.

*Fabr. Eleut. 2. 563. 15. Payk. fa. 3. 331. 8.  
Panz fn. 6. f. 48.*

*Ips cylindrica. Oliv. Eat. 2. 18. 9; 10. pl. 2.  
f. 16.*

Habitat sub cortice arborum emortuarum, apud nos rarissime; Dom. de Paykall mihi non obvius, nec Insectum possideo, quare descriptionem Cl. Paykulli afferre licet.

Descr. Longitudo Lycti ferruginei Payk. (*Rhyzophagus* Herbst. Müller. & nobis), sed angustior.  
*Caput*

Caput parvum, porrectum, subtilissime punctatum; nigrum, antice rufescens, palpis pallide ferrugineis. Antennæ thorace breviores, ferrugineæ, ii. articulatæ, primo & ultimis duobus magnis. Thorax longitudine latior, convexo-cylindricus, posterius paullo angustior, niger, subtilissime punctulatus, tenue marginatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra thoracis latitudine, sed triplo longiora, nigra, convexo-cylindrica, abdomen tegentia, omnium subtilissime, ut vix visibiliter, punctato-striata. Pectus & abdomen nigro-picea, punctulata. Pedes ferruginei.

## B I T O M A.

*Palpi breves, filiformes, articulo ultimo cylindrico, obtuso. Mandibulæ absconditæ. Antennæ thorace breviores, clava bi-articulata. Caput breve, obtusum Corpus oblongum. Thorax posse latitudine fere elytrorum.*

I. *B. crenata*: nigra, opaca, antennis pedibusque rufo-piceis, elytris punctato-striatis rufis, cruce nigra, intersticiis alternis elevatis, thorace utrinque bi-carinato.

*Herbst. col. 5. 30. 4. tab. 46. f. 6. F. Latr. Gen. Inf. 3. 16. i.*

*Lyctus crenatus. Fabr. Eleut. 2. 561. 10. Payk. fn. 3. 334. II.*

*Ips crenata. Oliv. Ent. 2. 18. 6. 6. pl. 2. f. 9. a, b.*

*Monotoma crenata. Panz. fn. 1. f. 24.*

*Synchita crenata. Hellwig. Schneid. Mag. 4. 405. 7. Var.*

Var. b, Elytris nigris, macula humerali apicisque rufa.

Var. c, corpore ferrugineo, elytris pallidioribus, cruce fusca, obsoleta.

Habitat sub cortice arborum cinnamomearum, sat frequens.

Descr. Rhizophago bi-punctato paullo brevior, sed latior. Caput sub-quadratum, depresso, nigrum, opacum; crebre, obsolete punctulatum, ore ferrugineo; supra os foveolæ duæ oblongæ, impressæ; oculi parum prominuli, nigri. Antennæ capite paullo longiores, ferrugineæ, articulis duobus basèos majoribus; ob conicis; 3-8; parvis; nodosis; coarctatis; nono paullo majori, truncato; decimo lato, perfoliato, truncato, ultimo etiam magno, rotundato. Thorax sub-quadratus, antice late; sed non profunde emarginatus, angulis prominulis, lateribus sub-rectis, elevato-mARGINATIS; obsolete crenulatis, basi truncatus; angulis oblique prominulis; supra dorso medio planus; ante scutellum foveolis duabus oblongis; obsoletis, impressis; ab utroque latere costis seu carinulis duabus elevatis; margini parallelis; notatus; totus niger, opacus, creberrime subtiliter rugoso-punctatus. Scutellum parvum, transversum, elevatum nigrum. Elytra à thorace nonnihil remota; illo perparum latiora, sed plus tripli longiora, linearia; apice rotundata; supra modice convexa, rufa, sub-opaca, obsoletius crenato-striata; intersticiis alterius costato-elevatis, angustis; sutura tota anguste nigra, & in medio fascia lata, transversa, ejusdem coloris, quæ cum sutura crucem nigram format. Corpus subtus nigro-piceum, opacum, crebre subtiliter punctulatum. Pedes brevissimi, ferruginei, femoribus crassiusculis, saturati piceo-rufescensibus.

Var. b;

Var. b., differt tantum elytris, quodā maxime in partem, nigris, maculis tantum duabus rufis in singulo, una juxta humerūm, altera intra apicem.

Var. c., pallidior, forte immatura; caput, thorax & corpus piceo-ferruginea; elytra pallidius testaceæ, cruce obsoleta, fusca; antennæ & pedes pallide testacei;

B. Lunata: oblongo-ovata, supra nigro-picea, pubescens, elytris punctato-striatis, lunula dupliči dorsali cinereo-pubescente; thorace utrinque costa elevata int̄a marginem.

*Dermestes luna.* Fabr. Eleut. t. 317. 27.

Pauk. fn. 1. 288. 15. Panz. fn. 75. f. 14.

*Nitidula lunata.* Oliv. Ent. 2. 12. 19. 29. pl. 3. f. 26. a, b.

*Nitidula punctata.* Roff. Fn. Eis. J. 58. 143.

*Silpha Sphaeritz.* Marsh. Ent. Br. 1. 122. 21.

Var. b., corpore toto fusco-testaceo.

Habitat sub cortice arborum emortuarum, rarius; var. b., in Scania, a Dom. Palleni lecta.

Descri. Præcedenti paullo brevior & latior, fæcie Dermestidis, sed antenæ omnino bujus generis; magnitudo vix Derm. tomentosi. Caput parvum, depresso, rotundatum, nigro piceum, punctatum, pubescens, ore dilute testaceo; oculi laterales, prominuli, nigro-brunnei. Antennæ capite parum longiores, crassiusculæ, ferrugineæ, articulo primo magno, crasio, ob-conico; secundo paullo minori, etiam

etiam obconico; 3 9, brevibus, granulatis, exteris oribus sensim paulo crassioribus; decimo valde incrassato, perfoliato, truncato; ultimo rotundato, compresso lentiformi, vix dictimi latitudine. Thorax brevis, transversus, anterius paulo angustior, ibique late, sed non profunde emarginatus, lateribus nonnihil rotundatus, margine reflexo, subcrenato, ciliato; postice subfatuatus, supra convexus, pulvinatus, nigro-piceus, sub nitidus, pubescens, sat eterbro punctatus; intra marginem utrinque costa elevata, margini parallela. Scutellum rotundatum piceum, pubescens. Elytra thoracis basi vix latiora, sed filo quadruplo longiora, in medio dilatata, apice obtuse rotundata, supra modice convexa, nigropicea, sub nitida, pubescens, sat profunde punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis; in medio dorsi, juxta suturam, in singulo elytro, macula lunata, cinereo pubescens, sinu apicem respiciente. Corpus subtus dilatius piceum, sub nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes breviusculi, ferruginei, tenui pubescentes.

Var. b. differt tantum colore dilutiore, supra rufo-ferrugineo, subtus cum pedibus pallide testaceo; forte nuper exclusa.

### C E R Y L O N. Latreille.

*Palpi inaequales, filiformes; antici multo majoris, articulo ultimo longiori, versus apicem attenuato, truncato. Maxilla bifida, lacinia externa majori, obtrigona, interna parva, dentiformi. Mandibulae cornuta, arcuatae. Antennae thorace breviores, tu-articulatæ, articulo decimo magno, ovato, apice sub-annulato, veluti articulo parvo auctio. Corpus oblongo: evatum. Thorax sub-quadratus.*

L. C.

I. C. Juglandis: fuscus, opacus, scaber, angustus, tenuis, pedibus maculaque humerali rufo-testaceis, thorace transversim quadrangulo, undique marginato; elytris crenato-striatis, seriatim hispidis.

*Lycus Juglandis.* Fabr. Eleut. 2. 561. 8.  
Payk. fn. 3. 330. 6. Kugell. Schnid. Mag. 5. 563. 4. Panz. fn. 5. f. 17. sed antennarum clava erronea bi-articulata.

*Elophorus humeralis.* Fabr. Eleut. 1. 205. 4.  
teste Dom. Kugell.

*Monotoma striata.* Herbst. col. 5. 23. 1. tab. 46. f. 1. a.

*Synchita Juglandis.* Hellwig. Schnid. Mag. 4. 403. 2.

Var. b, thoracis limbo elytrisque fere totis testaceis.

Habitat sub cortice arborum emortuarum; praesertim Alni; in Westrogothia saepius lectus.

Descr. Statura fere bitomae crenatae, sed paulo brevior, interdum illo major, saepius vero duplo, imo triplo minor. Caput parvum, breve, nigro-fuscum, creberrime subtiliter punctulatum, ore toto labroque testaceis; Mandibulæ cornæ, tenues, valde arcuatæ; oculi majusculi, nigri, parum prominuli. Antennæ thorace multo breviores, crassissimæ, ferrugineæ, articalis duobus basos crassis, ob conicis; 3-9, brevissimis; coarctatis, exterioribus sensim paulo crassioribus; decimo magno rotunda-

to,

to, cum acumine parvo, obsoleto. Thorax longitudine latior, transversim quadrangulus, angulis obtusis, undique elevato-marginatus, margine laterali obsoleto crenulato; supra parum convexus, creberime, sed obsoletius punctatus, pilis depressis griseis adspersus, nigro-fuscus, opacus, margine antico testaceo. Scutellum parvum, rotundatum, fuscum. Elytra a thorace nonnihil remota, illo parum latiora, sed quadruplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, dilutius fusa, macula humerali, jam minori, jam magis dilatata, indeterminata, obscure testacea; sat profunde crenato-striata, pili brevissimis, rigidis, sub-erectis, pallide cinereis, seriatim adspersa. Corpus subtus fusco piceum, opacum, subtilissime punctulatum. Pedes breviusculi, ferruginei, femoribus sub-clavatis.

Var. b, differt tantum colore dilutioni; thorax fuscus, limbo plus minusve testaceo; elytra aut tota, testacea, aut dorso nonnihil infuscata.

**C. picipes:** niger, opacus, sub-hispidus, antennis pedibusque rufo-ferrugineis, thorace oblongo-quadrato, lateribus crenato, postice bi-loveolato, elytris crenato-striatis, apice truncatis.

*Monotoma picipes.* Herbst. col. 5. 24. 2. tab. 46. f. 2.

*Lygus picipes.* Payk. fil. 3. 331. 7.

*Latridioides monotomus.* Kugell. Schneid. Mag. 5. 576. 3.

*Corticaria contracta.* Marsh. Ent. Br. 1. no. 13.

Var. b, elytris castaneis.

*Inf. Syst.*, T, I, P, III, Dd Var.

Var. *a*, corpore toto pallidius testaceo.

Habitat ad domos, parietes, in fenestris,  
etiam sub cortice arborum, non infre-  
quens.

Defcr. Parvus, C. Histeroide paullo angustior,  
præsertim antice. Caput magnum, exsertum, porre-  
ctum, triangulare, antice attenuatum; nigrum, opa-  
cum, crebre punctatum; oculis globofis; prominu-  
lis; in vertice, pone oculos, utrinque angulus seu  
spinula acuminata, reflexa. Antennæ thorace brevi-  
ores, crassulculæ, ferrugineæ, articulo primo ma-  
gno, secundo paulo minore, ob-conicis; 3 - 9, bre-  
vibus, granulatis, decimo magno, globofo, spicè a-  
cuminè albido auctō. Thorax latitudine longior,  
antice truncatus, angulis acuminatis, prominulis, la-  
teribus sub rectis, subtiliter crenulatis, basi media  
truncatus, angulis oblique obtusis; supra parum con-  
vexus, niger, opacus, creberrime & sat profunde  
punctatus; iotra basin foveolæ duæ oblongæ, pares,  
sub-obliquæ, impressæ. Scutellum minutum, rotun-  
datum, nigrum. Elytra thorace latiora, bumberis  
prominalia, & illo duplo longiora, apice truncata;  
abdomine breviora, supra modice convexa, nigro-  
fuscæ, opaca, crebre sed obsoletius crenato-striata,  
interstitiis transversim rugulosis, pilis brevissimis,  
cinereis, seriatim adspersis. Corpus subtus fusco-  
piceum, subtiliter obsolete punctulatum. Pedes bre-  
visculi, pallide testacei, femoribus clavatis.

Var. *b*; differt tantum Elytris dilatius castra-  
neis.

Var. *c*, corpore toto pallidiori differt; caput  
& pectus tamen plerumque obscuriora.

**C. Histeroides:** depresso, niger, nitidus,  
glaber, antennis pedibusque rufo-testa-  
ceis,

ceis, thorace quadrato, immarginato, profunde punctato, elytris obsolete punctostriatis.

*Latreille Gen. Ins. 3. 14. 1.*

*Lyctus Histeroides.* *Fabr. Eleut. 2. 561. 9.*  
*Payk. fn. 3. 329. 5.* *Panz. fn. 5. f. 16.*

*Rhyzophagus Histeroides.* *Herbst. col. 5. 21. 3.*  
*tab. 45. f. u. L.*

*Synblita Histeroides.* *Hellwig.* *Schneid.* *Mag.*  
4. 404. 5.

*Corticaria pilicornis.* *Marjh. Ent. Br. 1. 112. 20.*  
Var. b, corpore toto aut castaneo, aut ferrugineo, aut testaceo.

Habitat sub cortice arborum emortuarum;  
sat frequens.

Dscr. Parvus, Hister flavicorni æqualis, & facie similis. Caput insertum, parvum, breve, piceum, nitidum, subtiliter punctulatum, ore angustato, toto labroque ferrugineis; oculi parvi, prominuli, nigri. Antennæ thorace paullo breviores, crassiusculæ, ferrugineæ, articulo primo magno, crasso, clavato; secundo longe minori, brevi; 3-9, parvis, coarctatis, exterioribus sensim paullo latioribus; decimo magno ovato, pallidiori, piloso, apice acumine minuto aucto. Thorax sub-quadratus, longitudine paullo latior, apice late. sed non profunde emarginatus, lateribus subrectis, immarginatis, basi obsolete bi sinuatus, elytris arcte applicatus, supra depresso, niger nitidus, crebre & profunde punctatus. Scutellum breve, transversum, nigrum, læve. Elytra antice thoracis latitudine, in medio nonnihil dilatata, thorace plus duplo longiora, ap-

ce rotundata, anum occultantia, supra perparum convexa, nigra, nitida, evidenter striata, striis obsolete punctatis. Corpus subtus, nigro-piceum, nitidum; crebre punctulatum. Pedes mediocres, aut dilute testacei, aut obscurius rufo-picei.

Var. b, colore totius corporis dilutioni, aut rufo-castaneo, aut ferrugineo, aut pallide testaceo dif- fert; saepe etiam paulo minor occurrit, & separati- m a nigris, societas numerosas format; vix tu- men species distincta, notas saltem distinctivas erue- re non valui.

Obs. Species tres sub hoc genere jam decri- ptæ, quoad antennarum structuram satis conveniunt, in cæteris vero multum discrepant, ut potius gene- ra totidem constituere debeant.

### R H Y Z O P H A G U S.

*Palpi brevissimi, filiformes. Mandibulae arcu- tæ, cornæ, apice bifidæ. Antennæ thora- ce multo breviores, articulo decima magno, rotundato, articulo parvo; obsoleto aucta. Corpus linearis-elongatum, angustum, glabrum. Thorax sub-quadratus. Elytra truncata.*

*Obj.* Tarsi, quatuor Anteriores 5-articulati, postici vero 4-articulati, ut justo observavit Dom. Müller, in Illig. Mag. 4. pag. 204. Et 213, quare hoc genus ad Sectionem præ- dentem pertinet, ibique juxta Hypophloeum Et Phaleriam, in Familia Disperialium col- locandum.

*R. ferrugineus: rufo-ferrugineus, gla- ber, nitidus, thorace sub-quadrato, pro- funde*

funde punctato, elytris profunde punctato-striatis, antennarum stipite fusco.

*Lybus ferrugineus.* Payk. fn. 3. 326. 1

*Tritoma stercorea.* Thunb. Mus. Ups. 3. 39.

Var. b, thorace supra nigro-piceo.

Habitat sub cortice truncorum piní & Abietis, sat frequens.

Descr. Sequentibus paullo major, Clivina fosso-ri sere æqualis, magnitudine parum varians, Caput exsertum, ante antennarum insertionem subito coarctatum, ibique fovea laterali instructum, totum rufo-ferrugineum, nitidum, sat crebre sed minus profunde quam thorax punctatum; oculi parvi, globoſi, nigricantes. Antennæ thorace multo breviores, basi apiceque ferrugineæ, medio fusco-piceæ, articulo primo magno, clavato; secundo multo minori, truncato; tertio ob-conico, basi angusto; 4-9 brevibus, coarctatis, exterioribus sensim paullo crassioribus; decimo magno, rotundato, piloso, cum rudimento obsoleto articuli apicalis. Thorax sub-quadratus, vel latitudine parum longior, antice truncatus, angulis sub-rectis; lateribus & basi anguste marginatus, angulis posticis oblique rotundatis, supra parum convexus, rufo-ferrugineus, nitidas, sat crebre & profunde punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, ferrugineum, laxe. Elytra latitudine thoracis, humeris prominulis, thorace vix triplo longiora, apice truncata, anum non tegentia, supra modice convexa, rufo-ferruginea, nitida, sat profunde punctato-striata. Corpus subitus rufo-ferrugineum, nitidum, sat evidenter punctatum. Pedes breviusculi, pallidius testacei, tibiis apice latioribus, spinulosis.

Var. b., differt tantum colore thoracis supra nigro-piceo.

2. R. *depressus*: rufo-ferrugineus, glaber, nitidus, sub-depressus, subitus rufo-piceus, thorace sub-quadrato, subtiliter punctulato, clytris tenui punctato-striatis.

*Lyctus depressus.* Fabr. Eleut. 2. 560. 2. Payk.  
fn. 3. 327. 2.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,  
præsertim Quercus, minus frequens.

Descr. Statura & similitudo præcedentis, sed magis *depressus*, dimidio minor, thorax multo subtilius punctulatus, &c. Caput exsertum, rufo-ferrugineum, nitidum, subtiliter punctulatum, ante antennarum insertionem minus coarctatum, oculis parvis, nigris. Antennæ totæ ferrugineæ, structura ut in præcedenti. Thoracis forma ut in priori omnino, sed supra magis *depressus*, rufo-ferrugineus, creberrime, sed subtilissime punctulatus, margine omni plerumque angustissime piceo. Scutellum parvum, rotundatum, rufo-piceum, laxe. Elytrorum structura ut in priori, sed supra magis *depressa*, rufo-ferruginea, nitida, evidenter punctato-striata, sutura plerumque saturatius rufo-picea. Thorax subitus testaceus; pectus aut totum, aut versus latera saltem, saturatius piceum, subtiliter punctulatum; venter antice piceus, aperte semper, & interdum medio-longitudinali testaceis. Pedes pallidius testacei, structura ut in præcedenti.

Variat rarius corpore toto pallidius testaceo,  
subitus sere concolore.

g. R.

3. R. politus: niger, nitidus, sub-depressus, antennis pedibusque obscure ferrugineis; thorace quadrato, subtiliter punctulato, elytris punctato-striatis.

*Lyctus politus.* Fabr. Eleut. 2. 560. 1. Panz.  
fn. 4 f. 18.

*Synchita polita.* Hellwig. Schneid. Mag. 4.  
404. 4.

*Lyctus depressus,* var. Payk. fn. 3. 328. 2. b.

*Ips picipes.* Oliv. Ent. 2. 18. 7. 7. pl. 2. f.  
12. a-d.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,  
Dom. de Paykull; mihi intra patriam non  
obvius.

Descr. Magnitudo; statura & summa similitudo præcedentis, vix tamen ejus varietas; præter colorem longe alium, etiam forma capitis diversa, lateribus ante basim antendarum profundius coarctatis, ut in Rh. ferrugineo. Caput porrectum, nigrum, nitidum, sat crebre, evidenter punctatum, ante basim antennarum subito coarctatum, ore rufo-piceo; oculi prominuli, nigri. Antennæ thorace multo breviiores, ferruginea, structura omnino ut in prioribus. Thorax quoad formam ut in præcedentibus omnino, paullo evidentius marginatus, supra depresso, niger, nitidus, subtiliter punctulatus. Scutellum parvum, rotundatum nigrum, laeve. Elytrorum strutura ut in prioribus, nigra, nitida, evidenter punctato striata. Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, subtiliter punctulatum, ano rufescente. Pedes brevisculi, validi; femoribus rufo-piceis, tibiis tarsisque dilatius testaceis.

4. *R. parvulus*: nigro-piceus, nitidus, subdepressus, antennis pedibusque ferrugineis, thorace sub-quadrato, subtiliter punctato, elytris luride testaceis, punctato-striatis.

*Lyctus parvulus*, Payk. fn. 3. 329. 4.

Habitat sub cortice arborum emortuarum; garicus.

Descr. Statura & summa affinitas Rh. depressi & politi, sed duplo minor; a priori praeterea forma capitis diversus. Caput exsertum, piceum, nitidum, subtiliter punctulatum, antice rufo-testaceum, ante basin antennarum cito coarctatum, oculis globosis nigris. Antennae thorace multo breviores, ferruginea, structura ut in prioribus. Thorax subquadratus, antice truncatus, angulis deflexis, subrectis, lateribus evidenter marginatus, basi media truncatus, angulis oblique rotundatis, supra dorso depresso, nigro-piceus, nitidus, crebre subtiliter punctulatus. Scutellum parvum, piceo-testaceum. Ieve, Elytra quoad formam opinino ut in prioribus, liva vel luride testacea, nitida, evidenter punctato-striata, limbo laterali & postico plerumque fuscescente. Corpus subtus piceum, nitidum, subtiliter punctulatum, ano rufescente. Pedes breviusculi, ferruginei, structura ut in prioribus.

5. *R. dispar*: linearis, nitidus, thorace oblongo, subtiliter punctulato, postice angustiori, elytris punctato-striatis.

Ruso-ferrugineus, elytris fascia media lata nigro-picea.

*Lyctus dispar*, Payk. fn. 3. 328. 3.

Ips.

*Ips elongata.* Oliv. Ent. 2. 18. 8. 9. pl. 2.  
f. 15. a, b.

Var. b, rufo-ferrugineus, thorace supra,  
pectore abdominisque basi nigro-piceis,  
elytris nigris, basi apiceque rufo-ferru-  
gineis. Payk. loc. cit. var.

*Rhyzophagus bipunctatus.* Herbst. col. 5. 19. 1,  
tab. 45. f. 9. i.

Var. c, paullo minor, niger, antennis pe-  
dibusque ferrugineis, elytris lunula rufa  
ante apicem. Payk. loc. cit. var. b.

*Lyctus bi-pustulatus.* Fabr. Eleus 2. 561, 4.

*Rhyzophagus clavicornis,* Herbst. col. 5. 20. 2,  
tab. 45. f. 10. k.

Var. d, ut var. c, sed elytrorum basis et  
jam rufo-ferruginea.

Var. e, corpore toto pallide testaceo.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,  
frequens.

Deser. Rh. depresso paullo longior &c conve-  
xior, non vero latior; varietates c, & d, dimidio  
minores; thorace longiori præsertim a præcedenti-  
bus distinctus. Caput exsertum, rufo-ferrugineum,  
nitidum, subtiliter punctulatum, ante basin antennarum  
plus minusve coarctatum, oculis parvis, glo-  
bosis, nigris. Antennæ vix capite dimidio longio-  
res, ferrugineæ, structura ut in prioribus. Thotax  
latitudine antica longior, posterius sensim angustior,  
antice truncatus, angulis deflexis, sub-rectis, lateri-  
bus & posse anguste marginatus, angulis baseos.

rotundatiss; supra modice convexus, rufo-ferrugineus, nitidus, subtiliter punctulatus. Scutellum parvum, rotundatum, ferrugineum, laxe. Elytra thoracis basi paullo latiora, humeris prominulis, thorace plus duplo longiora, apice truncata, abdome breviora, supra modice convexa, concione punctostriata, basi apiceque late rufo-ferruginea, in medio transversum jam latius, jam angustius nigro-picea, undique nitida. Corpus subtus rufo-ferrugineum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes mediocres, toti, rufo-ferruginei.

Var. b, colore tantum differt; caput rufo testaceum, superne interdum obscurius castaneum; thoracis dorsum, pectus & abdominis basis nigro-picea. Elytra nigra, basi & apice angustius rufo-ferruginosa.

Var. c, plerumque dimidio minor, corpore toto nigro, nitido, ore, antennis pedibusque obscurius ferrugineis; in apice cuiusvis elytri lunula obscure ferruginea, saepe obsoleta, sinu angulum posticum spectans, ad suturam & apicem angustata.

Var. d, omnino ut var. c, modo basis elytrorum etiam obscure ferruginea.

Var. e, tota pallide testacea, forte immatura; in majoribus umbra fusca in medio elytrorum interdum observatus, unde var. a, proxima.

Obs. Var. c, & d, forte speciem propriam constituant, quam separatim vivunt, & cum similibus unice copulantur, sed praeter magnitudinem minorem, & colorem, notas distinctivas eruere non valui.

## Familia 4:a, Erotylenæ.

Antennæ abrupte perfoliato clavæ. Maxillæ unguæ corneo instructæ. Mandibulæ apice fissæ aut bidentatæ. Palpi antici articulo ultimo lunato aut securiforme. *Latr.*

## P H A L A C R U S.

*Palpi sub filiformes*, articulo ultimo longiori, cylindrico ovali. *Mandibulæ angustæ*, arcuatae, apice bidentatae. *Ligula labio angustior*, cordato-jub-quadrata. *Antennæ capitulo oblongo*, tri-articulato; articulo ultimo elongato, ovali aut conico. *Corpus hæmisphæricæ-ovatum*, glabrum, sub-læve, in globum non contractile. *Thorax angulis acutis*. *Pedes compressi*. *Latreille*.

**I. Ph. corruscus:** breviter ovatus, valde convevus, niger, nitidissimus, elytris levibus, ad futuram uni-striatis, antennarum articulo ultimo elongato, acuminato.

*Payk. fn. 3. 438. 1. Schönh. synon. I. 103. 1.  
Sphaeridium fimetarium. Fabr. Eleut. I. 97. 27.*

*Dermestes fimetarius. Marsh. Ent. br. I. 74. 42.*

Habitat in floribus, sat frequens.

Descr. Statuta & fere magnitudo Sphaeridii haemorrhoidalis; variat tamen magnitudine dimidio minori. Caput parvum, triangulare, versus os angustatum, nigrum, nitidissimum, vix visibiliter pun-

punctulatum, oculis lateralibus depresso. Antennæ longitudine fere thoracis, nigræ, articulo primo crassio, sub cylindrico; secundo paullo minori; tertio elongato, tenui, extrorsum paullo crassiori; 4-8 parvis, coarctatis; 9, 10, crassis, truncatis, brevibus, ultimo his duobus longiori, sub-acuminato, cinereo-piloso. Thorax brevis, transversus, antice angustior, ibique pro receptione capitis late emarginatus, lateribus nonnihil rotundatus, anguste marginatus, basi sub-sigillatus, elytris arte applicatus & illis contiguus, angulis fere rectis; supra valde convexus, niger, nitidissimus, vix visibiliter punctulatus. Scutellum mediocfe, triangulare, nigrum, nitidissimum. Elytra latitudine baseos thoracis, & illo triplo longiora, apice rotundata, supra valde convexa, nigra, nitidissima, vix visibiliter punctulata, stria unica versus futuram impressa, anterius valde obsoleta. Alæ longæ, albæ, costa antica, fuscescente. Corpus subtus nigro-piceum, minus nitidum, vix punctulatum. Pedes breves nigri femoribus latis, compressis, tibiis brevibus, rectis, pilosis, tarsis tenuibus, cinereo pilosis.

q. Rh. sub-striatus: breviter ovatus, valde convexus, niger, nitidissimus, elytris obsolete punctato-striatis, antennarum articulo ultimo crassiori, obtuso.

*Rhalacrus corruscus.* Schönh. synon. 1. 109. 2.

*Anisotoma corruscum.* Illig. Coll. Bor. 1. 79.

10. Panz. fn. 37. f. 10. forte.

Habitat in floribus, sat frequens.

Descr. Statuta & summa similitudo praecedentis, sed dimidio, imo duplo, minor, & ultra, elytris obsolete punctato-striatis, &c. distinctus. Caput, thorax,

rax, scutellum, ut in praecedenti omnino, quoad minimum punctum. Antennæ etiam ut in illo, sed articulus ultimus crassior, apicem versus parum angustatus, obtusus. Elytrorum forma & color omnino ut in priori, sed sub oculo armato regulariter punctato-striata, striis antrorsum valde obsoletis, fere evanescibus. Corpus subtus & pedes ut in praecedenti.

Obs. Sub nomine allato Speciem hanc a Dom. Kirby ex anglia missam obtinui. Synonyma Cl. Iligeri & Panzeri, ob elytra sub-striata potius huic quam praecedenti competit; antennarum clava in figura Panzeri erroneæ picta videtur.

3. Ph. Millefolii: oblongo-ovatus, posterius sub-angustatus, minus convexus, niger, nitidissimus, subtus piceus, elytris subtilissime, crebre, punctato-striatis, antennis apice obtusis.

*Payk. fn. 3. 439. 4. Panz. fn. 103. t. 51.  
Schénh. synon. I. 109. 5.*

Habitat in floribus Achilleæ millefolii, in Svecia australi, rarius; Dom. de Paykau mihi e Germania missus.

Descr. Minoribus praecedentis Speciei individuis sub. æqualis, sed paulo longior, posterius nonnihil angustatus, & minus convexus. Caput & antennæ ut in proxime praecedenti omnino. Thoracis struetura & color etiam ut in illo, sed paulo minus convexus videtur. Elytra antice thoracis latitudine, posterius nonnihil angustata, & illo plus triplo longiora, supra minus convexa, nigra, nitidissima, punctis minimis, in strias crebrioribus quam in praecedentib[us] tollit.

collocatis, levissime striata. Corpus & pedes ut in prioribus, sed plerumque dilatius picea.

Obl. Figura Panzeri varietatem minorem praecedentis potius repræsentat; ob structuram corporis breviorem; sed specimen, a Dom. Sturm missum, nostro jam descripto omnino convenit. Sub nomine "Ph. striatus", idem hoc Insectum ex Anglia a Dom. Kirby missum.

4. *Ph. Ulicis*: ob-ovatus, convexus, niger, nitidissimus, posterius sub-angustatus, subtus piceus. elytris lœvissimis, versus suturam bi-sinuatis, antennarum articulo ultimo breviter conico.

Habitat in floribus & gramine, sat frequens; etiam ex Anglia, sub hoc nomine a Dom. Kirby missus.

Descr. Statura fere & affinitas Ph. ænei, sed triplo minor, brevior, & in elytris convexior, niger nitidissimus, vix ad æneum vergens. Caput quoad structuram ut in prioribus, nigrum, nitidissimum. Læve, ore piceo. Antennæ basi rufo-testaceæ, extrofsum fusco-piceæ, articulo ultimo basi crasso, apice acuminato, breviter conico, cæterum structura ut in prioribus. Thorax ut in praecedentibus constructus, convexus, niger, nitidissimus, lœvis. Scutellum ut in reliquis. Elytra antice latitudine baseos thoracis, & illo triplo longiora, posterius attenuata, supra valde convexa, præsertim anterius; tota nigra, nitidissima, lœvissima, striis duabus tenuissimis, antice evanescientibus, versus suturam, in singulo elytro; in disco etiam, certo situ inspecto, rudimenta obsoletissima striolarum observantur. Corpus subtus & pedes aut nigro-picei, aut dilatius rufo-brunnei, stratura ut in prioribus.

5. *Ph.*

5. *Ph. æneus*: oblongo-ovatus, convexus, virescenti-æneus, nitidissimus, posterius angustatus, subitus piceus, elytris bistratiis, antennam articulo ultimo breviter conico.

*Pyk. fn. 3. 349 Illig Mag. I. 41. 14. Schönh.  
Junon. I. 109. 4.*

*Sphæridium æneum. Fabr. Eleut. I. 98. 29.  
Payk. fn. I. 65. 15. Panz. fn. 103. f. 3.*

*Dermestes ovatus. Marth. Ent. br. I. 76. 48.*

Habitat in floribus frequens.

Descri. Medius in hoc genere. Ph. corrusco angustior, sed vix brevior. Caput breviter triangulare, æneum, nitidissimum, lœve, ore piceo. Antennæ basi ferrugineæ, extrorsum nigræ, clavæ structura omnino in proxime præcedenti. Thoracis structura omnino ut in prioribus, supra convexus. virescenti-æneus, nitidissimus, lœvissimus, subtus aut niger aut piceus. Scutellum breviter triangulare, æneum, nitidum. Elytra antice latitudine baseos thoracis; & illo quadruplo longiora, posterius attenuata, supra modice convexa, virescenti ænea, nitidissima; versus suturam in singulo elytro striæ duæ tenues, basim non attingentes. Corpus subtus nigro-piceum, vix punctatum. Pedes breves, validi, structura ut in prioribus, aut nigro-picei, aut dilutius brunnei.

6. *Ph. bicolor*: oblongo-ovatus, niger, nitidissimus, antennis, pedibus corporeoque subtus rufo-testaceis, elytris bistratiis, macula ante apicem ferruginea;

*Payk.*

*Payk. fn. 3. 439. Latr. Gen. Ins. 3. 66. L.  
Schônh. synoñ. I. 109. 3.*

*Anisotoma bicolor. Fabr. Eleut. 1. 82. 24. Illig.  
Col. Bör. I. 30. 13. Panz. fn. 103. f. 4.*

*Sphaeridium bitolor. Payk. fn. I. 65. 14.*

Var. b, macula elytrorum ferruginea apicem fere totum occupante.

Habitat in floribus, sat frequens.

Descr. Statura omnino præcedentis, & ab ejus magnitudine, ad duplo, imo triplo minorem variat. Caput breve, sub-triangulare, nigrum, nitidissimum, laxe, ore ferrugineo; antennæ totæ pallide ferrugineæ vel testaceæ, structura ut in priori omnino. Thorax & scutellum ut in præcedenti formata, nigra, nitidissima, laxis. Elytrorum forma etiam ut in illo, nigra, nitidissima, striis duabus in singulo, versus suturam, postice coeuntibus, basin vero vix attingentibus; paulo ante apicem cuiusvis elytri macula rotundata, rubra, rarius determinata & evidens, plerumque in nostris obsoletior, indeterminata. Pedes & abdomen aut dilutius rufo-testacea, aut obscurius ferruginea, tenue punctulata & pubescens. Pedes pallidius rufo-testacei, structura ut in prioribus.

Var. b, differt tantum macula elytrorum aut in apicem excurrente, aut apicem totum occupante; occurrit etiam specimina, præsertim minors, apice elytrorum latius, fere versus medium usque, rufo-testacea.

¶. Ph. testaceus: ovatus, brunneo-testaceus, nitidissimus, antennis, pedibus ely-

tto-

trorumque spicē gallidis; elytris striis unica futurali.

Schönh. Synon. I. 109. 7.

*Anisotoma testaceum*. Illig. Col. Bor. I. 80. 12.  
Panz. fn. 37. f. 12.

*Phalacrus geminus*. Illig. in Panz. Crit. Rev.  
I. 27.

*Dermestes confimilis*. Marsh. Ent. Br. & 75. 46.

Habitat in Scanie floribus ratius. Dom.  
Fallén.

Dscr. Parvus, Ph. bicolori brevior, posterius minus attenuatus; Ph. corticali Germisporum similis, sed multo minor, brevior, & elytra vix striata; &c. Caput breviter triangulare, rufo-castaneum, nitidissimum lœve, ore parvo pallide testaceo, oculi laterales, depresso, nigri. Anteapæ longitudine fere thoracis, totæ pallidæ, structura ut in proxime præcedentibus. Thorax & scutellum quoad formam ut in prioribus, castaneæ, nitidissima, lœvis, marginibus thoracis saepe pallidioribus. Elytra thoracis basi vix latiora, sed illo plus triplo longiora, posterius parum angustata, supra valde convexa, castaneæ, nitidissima, apice indeterminate flavo-pallida, juxta suturam striæ unida, tenuis, & versus humerum sudimentum unum alterumque striolæ abbreviatæ, obsoletissimæ; cæterum superficies lœvissima. Corpus subtus pallidius castaneum vel testaceum, obsolete punctulatum. Pedes breviaculi; pallide testacei, structura ut in prioribus.

## Familia 5:ta, Chrysomelinæ.

**A**ntennæ plerumque extrorsum sensim crassiores, interdum fere filiformes, sœpe moniliformes. Maxillæ inermes, lacinia interna plerisque Palpi-formi, bi-articulata. Labium breve, crassum, rotundatum, vel sub-quadratum, integrum. Corporis forma diversa, aut clypeiformis, aut orbiculata, aut sub-ovata, aut oblonga. Caput ad oculos usque thoraci intrusum.

## Subdivisione; Cassidea.

Antennarum basi sœpissime sub-thorace occultata. Caput horizontaliter sub-thorace absconditum, ore in sterno antico excipiendo. Corpus clypeiforme, sub-orbiculare, infra planum, disco sursum elevato, thorace sœpius semi-circulari; elytrorum limbo plerumque dilatato. Latreille.

## CASSIDA.

*Palpi antici clavati, postici filiformes. Labium elongatum, integrum. Antennæ sub-filiformes, extrorsum paullo crassiores.*

- C. Murræa: ovata, nigra, thorace angulato, elytris punctato-striatis, juxta suturam confertius, disco parcius nigromaculatis.

a, Tho-

a, Thorace elytrisque ferrugininis.

Linn. syſt. 2. 575. 2. Fabr. Eleut. I. 390. 14.

Illig. Col. Bor. I. 476. 1. Payk. fn. 2. 48;

5. Herbſt. col. 3. 240. 17. tab. 130. f. 12,

13. Schönh. synon. 2. 213. 17.

Var. b, Thorace elytrisque viridibus. Fabr.

Illig. Payk. Schönh. loc. cit. var.

Cassida maculata. Linn. syſt. 2. 575. 6. Dé  
Gér Inſ. 5. 175. 3.

Habitat in Carduis, allisque plantis, minus  
frequens; In Inula Salicina ad Kinnakulle  
& Mysseberg Westrogothiae, plures copio-  
se legi, vix vero a, & b, mixtos vidi.

Defcr. C. Equeſtri paullò angustior, ſed non  
brevior, magis ovata. Caput parvum, ſub thorace  
occultatum nigrum; fronte profunde punctata, oculis  
oblongis branneis. Antennæ thorace paullò lon-  
giores, nigrae, extrorſum cräftiores; articulo ultimo  
majori; acuminato. Thoracis clypeus feré ſemi-cir-  
cularis, anguſte marginatus, baſi ſinuatus; angulis  
lateralibus ſub-rectis, in medio rotundatim produ-  
ctus, ſupra disco poſteriori párum convexus, intra  
margines depreſſus, verſus baſin utrinque foveola  
profundiore impressus, rufo-ferrugineus, obſoleto  
punctatus. Scutellum triangulare, nigrum; obſoleto  
punctatum. Elytra thoracis baſi vix latiora, ſed tri-  
plo longiora, ſupra valde convexa, rufo-ferruginea,  
parum nitida, rude punctato-striata; juxta ſuturam  
series fere contigua è maculis diſformibus, inaequa-  
libus nigris; in medio baseos cujuſvis elytri ma-  
culta transverſa, nigra, cui externe adjungitur alia  
longitudinalis, arcuata, flexuosa; in disco poſteriori  
puncta 2 ſeu 3 minora, etiam nigra; margo exte-  
rior

rior late explanatus, reflexus, disco concolor. Corpus subitus fere planum, nigrum, vix punctulatum, ventris lateribus ferrugineo-maculatis. Pedes brevifusculi, nigri, spongiis cinereo-albidis.

Var. b, omni punto simillima, sed color thoracis & elytrorum late viridis; venter fuscoc-niger, lateribus late lividis vel virescentibus.

**2. C. Equestris:** breviter ovata, supra late viridis, crebre vage punctulata, thoracis angulis rotundatis, subitus nigra, abdominis limbo late, pedibusque totis late-ferruginela.

*Fabr. Eleut. t. 388. 3. Latreille Gen. Ins. 3.*

*St. t. Herbst. col. 8. 216. 2. tab. 130. f. 10.*

*Payk. fn. 2. 45. t. Panz. fn. 96. f. 5.*

*Schönh. synon. 2. 210. 3.*

*Cassida Cardui.* De Geer. Ins. 5. 174. 2.

*Cassida viridis.* Illig. Col. Bor. 1. 480. 5. Herbst.

*col. 8. 209. 1. Marsh. Ent. br. 1. 143. 1.*

*Linn. syst. 2. 574. t. En. Sv. 467?*

Habitat in plantis yatis, præcipue in Men-  
thæ Speciebus, sat frequens.

*Déscri.* Præcedenti, ut dictum, latior, brevius  
ovata. Caput parvum, nigrum, fronte subtiliter pun-  
ctata. Antennæ vix thorace longiores, pallide te-  
staceæ, apice crassiores, nigrae. Thorax brevis ante-  
c & angulis posticis rotundatus, basi sinuatus, in  
medio nonnihil proiectus, supra parum convexus,  
totus late viridis, crebre, subtiliter, & in disco ob-  
solete punctulatus. Scutellum triangulare, pallide  
virescens. Elytra antea thoracis basi latiora, & illo  
plus triplo longiora, basi sinuato-emarginata, angu-  
lis

lis valde productis, rotundatis, lateribus & apice rotundata, supra, disco anteriore modice convexa, plaga triangulari, communis, baseos declivi, fere plana; discus totus saturatius viridis, creberrime, vage punctatus; limbus lateralis & apicis latus, depresso, pallidius virens, pellucidus, punctis vagis, sub-ocellatis adspersus; in vivo Infecto linea abbreviata argentea, nitida, marginem interiorem baseos elytrorum, juxta scutellum, cingit, quae tamen cum vita perit. Pectus & abdomen nigra, sub-nitida, subtiliter punctulata & sub strigosa, ventris marginibus late luteo-ferrugineis. Pedes breviusculi, luteo-ferruginei, femoribus in vivo virescentibus.

Obs. Hæc Species a Cl. Linnæo, De Géero, Herbstio, pluribusque auctoriis cum sequenti confusa, ut ex descriptionibus ambiguis & incompletis videtur, quare nomen Cl. Fabricii retinendum judico.

5. *C. rubiginosa*: ovata, obscurius viridis, thoracis angulis acuminatis, elytris substriato-punctatis, basi rufescentibus, postice declivibus, pedibus pallidis, femoribus nigris.

*Illig. Col. Bor. i. 479. 4. Herbst. col. 8. 223.  
5 tab. 129. f. 7.*

*Cassida viridis.* Latr. Gen. Inf. 3. 52. Panz.

*fn. 96. f. 4. Payk. fn. 2. 45. 2. a. Aß.*

*Holm. 1801. 119. a. Schönh. Jynen. 2. 209. 1.*

Var. *b*, femoribus basi tantum nigris.

Var. *c*, pedibus totis pallidis.

*Cassida præfina,* Herbst. col. 8. 221. 4. tab.  
129. f. 6.

Ee 3

Var.

Var. *a*, ut var. *c*, sed basis & futura elytrorum coeruleo-colorata, pallide virentia, & in basi thoracis maculae duæ lunatae pallide.

*Cassida profina*. *Fabr. Eleut.* 1. 388. 4. *Flig. Col. Bor.* 1. 481. 6. *Schönh. synon.* 2. 211. 4.

*Cassida viridana*. *Herbst. col.* 3. 224. 6. *tab. 129. f. 8.* *Schönh. synon.* 2. 212. 8.

Var. *e*, supra pallide rufo testacea, femoribus basi nigris. *Illig. Schönh. loc. cit.* var. *b*.

Habitat in plantis variis, praesertim carduis, ferratula, aliisque, sat frequens.

Descr. Praecedente minor, minus lata, thoracis angulis posticis acuminatis, elytrorum punctis sub-seriatim, illarumque basi & futura rufescens, distincta. Caput parvum, nigrum, fronte subtiliter punctulata. Antennæ longitudine thoracis pallide testaceæ, extrosum crassiores, nigrae. Thorax brevis, transversus, antice rotundatus, angulis posticis sub-acuminatis; basi leviter sinuatus, supra parum convexus, totus viridus, undique crebre punctulatus. Scutellum triangulare, pallide virens. Elytra antice thoracis latitudine, & illo triplo longiora, basi sub sinuata, angulis perparum prominulis, supra disco antico convexa, posterius declivia, marginibus late explanatis, depresso; in vivo saturate viridis, plaga magna, trianguli, communi baseos rufescente; juxta suturam in singulo elytro, striæ duæ punctatæ, sat regulares; dein interstitium latius, sub-elevatum, laxe; tum striæ tres, minus regulares, punctis sparsis interjectis confusæ; iterum interstitium elevatum, antice extrosum flexum, postice ab-

bre-

brevistatum, & extra illud striæ 4 vel 5, parum regulares, in disco elevationi, qui circumscribitur serie e punctis majoribus, rufis; margo explanatus punctis minoribus & rugulis transversis, crebris, notatus. Pectus & abdomen nigra, nitida, subtilissime punctulata & strigosa, ventris lateribus anguste, saepe interrupte, testaceis. Pedes breviusculi, femoribus nigris, apice, cum tibiis & tarassis testaceis,

Var. b, simillima, sed femora basi tantum plus minusve nigra vel nigro-fusca.

In var. c, pedes toti pallidi vel dilute testacei.

Var. d, tota supra pallidius virens, elytroram basi & sutura concoloribus; in basi thoracis lunulae duæ oppositæ, pallidiores, lutescentes, interdum in annulum confluentes; Pedes aut toti pallidi, ut in var. c, aut femora basi nigricantia; cæterum omni puncto simillima, ut, me judice, specie distingui non possit.

Var. e, colore paginae superioris testaceo vel pallescente, differt, forte adultior.

Obi. Cl. a Linné, De Géer, aliique auctores, hanc ut præcedendis varietatem inspexerunt, ut antea indicatum, quare nomen Cl. Illigeri præferendum.

4. C. thoracica: ovata, thorace rufescente, postice ferrugineo, elytris punctato-striatis, viridibus, postice declivibus, macula baseos ferruginea, pedibus testaceis.

Fabr. Eleut. 1. 388. 2. Illig. Col. Bor. 1. 478.

3. Herbst. col. 8. 228. 10. tab. 129. f. II.

Panz. fn. 38. f. 24. Schönh. synon. 2. 210, 2.

*Cassida viridis* var. Payk. Act. Holm. 1801. 120, b.

**Habitat in plantis rariis.**

Descr. Statura, magnitudo & summa affinitas præcedentis, attamen distincta videtur, thoracis angulis magis rotundatis, elytrorum angulo humerali magis producto, & colore alio. Caput ut in præcedenti; antennarum structura eadem fere totæ pallide testaceæ. Thorax brevis, transversus, antice æqualiter, postice sinuato rotundatus, fere transversaliter ovalis, angulo obtuso fere in medio laterali situ; supra versus latera late depresso, medietate baseos magis convexo, convexitate fere ad apicem thoracia acuminatum producta; tota basi transversim late, inæqualiter, saturate rufo-ferruginea vel brunnea, pars vero anterior dilute rufescens, pellucida. Scutellum triangulare, pallide brunneum. Elytra antice profunde sinuato-emarginata, angulo humerali valde producto, exterum forma, colore & punctura ut in præcedenti omnino, præterquam quod in basi, circum scutellum, plaga magna, communis, saturate rufo-brunnea, antice lata, posterius angustior, versus medium futuræ fere producta, inæqualis, interdum interrupta. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum, ventris lateribus pallide testaceis. Pedes breviusculi, toti pallide testacei.

5. *C. vibet.: oblongo-ovata, viridis, thorace longiori, postice parum sinuato, elytris convexioribus, distincte punctato-striatis, basi interiori futuraque rufo-brunneis.*

*Linn. syst. 2. 575. 5. Fabr. Eleot. 1. 389. 6.*

*Herbst. col. 8. 218. 3. tab. 329. f. 5. c. Illig.*

*Col. Ber. 1. 477. 2. a & d. Payk. Act.*

*Holm.*

Holm. 1801. II. Pans. fn. 96. f. 6. Schönh.  
synon. 2. 211. 5.

Var. b, supra ferruginea, sutura elytrorum  
brunnea. Illig. Payk. Schönh. loc. cit. var. b.

Habitat in plantis, minus frequens.

Descr. C. rubiginosa vix brevior, sed multo an-  
gustior, in elytria magis convexa, præsertim postice.  
Caput parvum, nigrum, fronte plana, punctata; an-  
tennæ longitudine thoracis, pallidæ, extrosum cras-  
fiores, fuscae. Thorax fere semi-circularis, longitu-  
dine vix duplo latior, basi param sinuatus, angulis  
obtusis, supra in medio baseos convexus; versuè  
margines depresso; totus lète viridis, sub-nitidus,  
crebre obsoletius punctatus, marginibus sub-ferrugi-  
neis. Scutellum triangulare, pallide virescenti-brun-  
neum. Elytra antice vix thorace latiora, sed illa  
triplo longiora, supra disco valde convexa, lète vi-  
ridia, nitida, lat regulariter & profunde sed non  
crebre punctato-striata, basi plaga sub triangulari ru-  
fo-brunnea, & sutura tota, jam anguste, jam latius  
brunnea; margo lateralis depresso; minus dilatatus  
quam in prioribus, subtiliter punctulatus & rugulosus,  
marginie ipso rufo-brunneo. Thorax subtus in  
medio niger, punctatus; pectus & abdomen nigra,  
nitida, subtiliter punctulata & strigosa, ventris  
lateribus interrupte pallido-marginatis. Pedes bre-  
viusculi, pallide testacei, femoribus basi plus minus  
ve infuscatis.

Var. b, colore paginæ superioris tantum differt.

Obs. C. Vibex var. c, Payk. Act. Holm. 1801,  
pag. 119, mihi ignota, si non C. rubiginosa nostra  
var. d, eadema.

6. C. Sanguinolenta: ovata, viridis, tho-  
racice postice arcuato, elytris distincte pun-  
ctato

*Etato-striatis, plaga communi baseos sanguinea, pedibus pallidis.*

*Fabr. Eleut. t. 389. 8. Herbft. col. 8. 229 n.  
tab. 129. f. 12. Illig. Col Bor. t. 482. 7.  
Latr. Gen. Ins. 3. 52. Payk. fn. 2. 46. 3.  
Schönh. synon. 2. 212. 7.*

*Cassida cruentata. Marth. Ent. Br. t. 145. 4.*

*Habitat in aridis, sub lapidibus, rarius.*

Descr. Statura convexa fere præcedentis, sed dimidio minor & ultra. Caput parvum, nigrum, fronte plana, crebre punctulata; antennæ longitudo thoracis, pallide, extrorum paullo crassiores & obscuriores. Thorax fere semi-circularis, postice valde sinuatus, versus latera arcuatus, angulis obtusis, supra in medio inæqualiter convexus, ante scutellum foveola rotundata impressus, totus læte viridis, crebre subtiliter punctatus. Scutellum triangulare, pallide virescens. Elytra thoracis postico non latiora, sed illo fere triplo longiora, basi sinuata, angulis productis, supra in disco valde convexa, tota læte viridia, nitida, sat regulatiter & profunde punctato striata; interstitalis secundo, & quinto a sutura magis elevatis; in medio baseos, circum scutellum, plaga magna, transversa, indeterminata, læte rosea aut sanguinea; margo lateralis ut in præcedenti, vase punctulatus & subrugosus, serie arcuata e punctis magnis, profundis, a disco distinctus. Corpus subtus nigrum, nitidum, crebre subtiliter punctulatum; ventris marginibus late virescendi pallidis. Pedes breviusculi, toti pallidi vel virescentes.

7. C. nebulosa: ovata, supra griseo-flavescens, thoracis angulis rotundatis elytris nigro-

**nigro-maculatis, profunde punctato-striatis, punctis sub-ocellatis.**

**Linn. syst. 2. 575. 3. Fn. Sv. 468. Herbst.  
col. 8. 236. 15. tab. 130. f. 11. Payk. in 2.  
47. 4. Illig. Col. Bor. I. 483. 9. b. Schönh.  
Synon. 2 215. 21. b.**

**Cassida affinis. Fabr. Eleut. I. 388. 5.**

**Var. b, supra pallide virens; iunior. Payk.  
I. c. var. b. Illig. Schönh. Herbst. loc. cit. a.**

**Cassida tigrina. De Géer. Ins. 5. 168. 1. tab.  
5. f. 15 25.**

**Habitat in plantis variis, ubique frequens.**

Descr. Magnitudo & statura C. rubiginosæ, C. Murræa brevior, sed yix angustior. Caput parvum, fronte plana, pallida, subtiliter punctata, oculis magnis nigro brunneis; antennæ thorace paullo longiores, pallidæ, extrorsum crassiores, nigro-fuscæ. Thorax brevis, semi circularis, postice sinuatus, angulis rotundatis, supra, in disco posteriori inæquilatero convexus, lateribus depresso, totus griseo-flavescens, obsolete punctatus, basi media plerumque pallidior, Scutellum triangulare, pallidum, sub-læve. Elytra thorace latiora, & triplo longiora, supra in disco valde convexa, profunde punctato-striata, punctis plerisque sub-ocellatis, seu puncto centrali elevato instructis, interstitiis alternis hinc inde elevationibus; tota pallide grisea, maculis punctisque irregularibus nigris, vagis, adspersa; margo lateralis obsolete vase rugoso-punctatus, antice latior, immaculatus, posterius maculis majoribus nigris, transversis, contaminatus. Corpus subtus nigrum, subtiliter punctulato-strigosum, abdominis limbo pallido. Pedes mediocres, aut pallidi, femoribus basi infuscatis.

scatis, aut femoribus nigris, apice plus minusve pallidis.

Var. b, simillima, sed pallide virescens, ubi prior griseo flavescentia vel testacea; puncta elytrorum pleraque in hac simplicia, absque puncto centrali elevato; forte junior, nuper exclusa.

8. *C. obsoleta*: ovata, supra griseo-flavescentia, fronte pedibusque pallidis, thorace lateribus depresso, elytris profunde punctato-striatis, punctis ocellaribus, intersticiis elevatis.

*Illig. Col. Bor.* I. 484. 10. *Herbst. col. g.* 248.  
20, tab. 131. f. 5. *Schönh. synon.* 2. 215. 22.

*Cassida pallida.* *Payk. fn.* 2. 50. 8.

*Cassida flaveola.* *Thunb. Ins. Sv.* 8. p. 103.

*Cassida ferruginea.* *Marsh. Ent. Br.* I. 148. II.

Var. b, thorace postice macula fusca, elytrorum disco antico fusco-nebuloso.

*Cassida nebulosa.* *Fabr. Eleut.* I. 390. II.

Habitat in plantis, sat frequens.

Deser. Statura & affinitas praecedentis, sed duplo minor & ultra, C, nobili aequalis; thorax praetera parum sinuatus, pedes toti pallidi, &c. Caput parvum, fronte plana, pallida, oculis magnis, nigro-brunneis; antennae thorace paullo longiores, pallide, extrosum crassiores, fuscescentes. Thoracis structura fere ut in praecedenti, sed postice minus sinuatus, supra in disco postico convexus, fere laevis, lateribus depresso, crebre punctulatis; totus pallidus, sed in medio disci posterioris interdum macula oblonga.

**oblonga fusca.** Scutellum triangulare pallidum, sublæve. Elytra thoracis basi paullo latiora, & illo triplo longiora, supra in disco valde convexa, pallide grisea, profunde punctato-striata, punctis plerisque ocellaribus, seu punto centrali elevato-instructis, interstitiis 2:0, 4:0 & 6:0 paullo elevationibus; margo lateralis depresso, antice latior, undique crebre, vage & obsolete punctulatus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum, ventris limbo pallido. Pedes mediocres, toti pallide testacei.

Var. b, differt tantum macula fusca in disco posteriore thoracis semper conspicua, & disco anteriore elytrorum obsolete fusco nebuloso.

Obi. Cassida ferruginea auctorum, huic primo intuitu simillima, sed brevior, magis rotundata punctis in disco elytrorum multo crebroribus, vagis, simplicibus, lineisque elevatis evidentioribus distincta, a Dom. Prof. Thulinbergio, Ins. Sv. 8 p. 104. ut Sveciae incola allata; sed vix apud nos lecta, quantum mihi innotuit.

9. **C. nobilis:** oblongo-ovata, coriacea; griseo-flavescens, elytris profunde punctato-striatis, marginibus deflexis, intersticio secundo dorsali latiori, cœruleo-scentia argenteo, corpore femoribusque nigris.

Linn. syst. 2. 575. 4. Fn. Sv. 469. Fabr.  
Eleut. i. 396. 47. Illig. Col. Ber. ii. 485.  
ii. Herbst. col. 8. 232. id. tab. 130. f. 15.  
Payk. fn. 2. 49. 7. Schönl. Synopsis. 2. 219.  
68.

Var. b, Sutura elytrorum fusca; linea dorsalis aut cœruleo-argentea, aut cyprea aurea

autea, & saepe præterea striolæ 2 seu 3 exteriore abbreuiatæ, ejusdem coloris.

*Ilig.* Schönh. loc. cit. var. b.

*Cassida pulchella.* Panz. nr. 39. f. 15. Crit. Rev. I. 73.

*Cassida larvis.* Herb. col. 8. 250. 21 tab. 131. f. 6. d.

*Cassida Splendidula.* Marth. Ent. Br. I. 147. 8.

Habitat in plantis variis, sat frequens.

Descr. Minor, præcedente paulo longior, sed non latior, multo magis convexa, elytrorum margine deflexo vel dependente, non ut in prioribus depresso vel reflexo. Caput parvum, nigrum, fronte triangulari, crenatissime punctulata; oculi magni, nigro-brunnei, supra frontem conniventes; Antennæ thorace paullo longiores, nigro-fuscæ, basi pallidæ; Thorax brevis, antice rotundatus, non tamen evagete in formam segmenti circularis, sed paulo magis in medio angustatus, basi sinuatus, versus latera obliquè adscendens, angulum obtusum fere formans; supra im disco valde convexus, versus latera sensim declivus, disco fere laevis, versus latera subtiliter punctulatus, totus griseo-flavescens. Scutellum oblongo-triangulare, flavescens, laeve. Elytra antice thorace paullo latiora, angulo producto; thorace plus triplo longiora, supra valde convexa, margine laterali dilatato dependente, præsertim anterioris, nec depresso vel reflexo ut in prioribus; tota griseo-flavescens, profunde punctato-striata, punctis quibusdam, sub-oculo armato, sub-ocellatis; sutura lata, laevis, & juxta illam stria profunda, crebre punctata; interstitium secundum a sutura reliquis latius, laeve, nitidum, in vivo cœruleo-ar genteum, interdum cupreo-aureum, nitidissimum, post

post mortem vero pallide flavum; interstitium tertium in medio latius, punctis nonnullis vagis impressum; margo lateralis obsolete, vagus, punctulato-subrugosus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum, abdominis limbo late testaceo. Pedes breviusculi; obscure testacei, femoribus nigris, genubus plus minusve testaceis.

Var. b, differt tantum sutura elytrorum late fuscata, & striola una alterave abbreviata metallico-nitente in disco exteriori & versus humerum.

Obs. Post mortem saepe tota supra pallide flavescens, unicolor.

10. *C. viridula*: oblongo-ovata, convexa, supra pallide virescens, unicolor, elytris minus profunde punctato-striatis, margine deflexo, femoribus basi nigro-fuscis.

*Payk. fn. 2. 49. 6. Schönh. synon. 2. 220. 71.*

*Caffida margaritacea* var. *Herbst. col. 8. 225.*  
*7. tab. 130. f. 16.*

*Caffida Spergulae*. *Marsh. Ent. Br. 1. 144. 3.*

Habitat in agris arenosis, praesertim in *Spergula arvensi*, passim.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas praecedentis, colore fere unice distincta. Caput & antennae ut in praecedenti. Thorax & scutellum quoad structuram etiam ut in illo, sed tota pallide viridia. Elytrorum forma eadem, ut & striarum situs, interstitio nempe secundo a sutura reliquis latiore, tertio in medio dilatato, punctis nonnullis vagis adsperso; sed tota pallide viridia, unicolora, & puncta striarum paulo minora, simplicia. Pectus &

& abdomen in medio fusca, lateribus late pallide virescentibus. Pedes pallide virescentes, femoribus basi nigricantibus.

Obs. Color viridis paginae superioris post mortem in pallidum, fere albidum, pellucidum, transit, remanente tamen hinc inde tintura virescente; an modo varietas junior praecedentis? Dom. Herbst. loc. cit. hanc ut varietatem magis oblongam Cassidæ margaritaceæ veræ Fabricii inspexisse videtur.

*Cassida margaritacea*: Thunb. Inf. Svec. 8. p. 103, quæ certe C. haemisphærica Herbst. Col. 8. 220. 8. „Sub-orbiculata, elytris crebre; vage punctatis, abdomine pedibusque totis pallidis;“ vix in Svecia occurrit. *Cassida pallida*, Thunb. loc. cit. mihi planè ignota; anne secundum Specimen immaturum alias Speciei descripta?

### Subdivisio 2:da. Hispoideæ;

Antennæ penitus exsertæ, porrectæ; caput exsertum, verticale, ore nudo, in sterno antico non recipiendo. Corpus elongato-ovatum, antice angustius; Thorax trapeziformis, vel sub-quadratus; antice angustior. Latr.

### H I S P - A.

Palpi æquales, medio crassiores. Maxilla bifida. Mandibula quadrato-subtrigona, apice vix angustiori, sub-eque bidentata. Labium cornutum, integrum. Antennæ cylindricæ,

l. H.

**H. atra:** atra, opaca, antennarum articulo basiliari majori, uni-spinoſo, thorace antice spinis duabus geminis, lateribus dilatatis, spina gemina, aliaque ſimpli, elytris multi-spinoſis.

Linn. Syſt. 2. 603. 1. var. *parva*, Svecana.

Fabr. Eleut. 2. 58. 2. Payk. fn. 2. 151. 1.

Roff. Fn. Etr. 1. 52. 129.

Habitat ad radices graminum, in Svecia Australi, rarius.

Deser. Parva, Ptino rufipede non longior, sed paullo latior. Capit medioere, obtusum, atrum, opacum, subtiliffime coriaceum, ore deflexo; oculi parvi, nigro-brunnei. Antennæ vix dimidio corpore longiores, crassæ, sub-filiformes, porrectæ, nigrae, extorrisum fuscae, articulo primo majore, ovato, supra spina longa, sub arcuata armato; secundo brevi, utrinque in spinulatum brevem producto; sequentibus valde coarctatis, & perfoliatis, inferioribus utrinque acuminato-productis, ultimo breviter conico. Thorax antice angustior, capiti æqualis, lateribus valde rotundatus, basi truncatus, supra parum convexus, pone medium transversim profunde impreflus, totus ater, opacus, subtiliffime coriaceus; intra apicem spinæ duæ, geminatæ, ramis divaricatis, & in utroque latere spina, etiam gemina; antetior, & alia simplex, posterior, omnes elongatæ, acuminatæ, atrae. Scutellum rotundatum, atrum, opacum. Elytra thoracis medio non latiora, sed illo triplo longiora, supra convexa, rude punctato-striata, tota atra, opaca; in singulo series hex spinarum, quarum laterales magis regulares, spinis longioribus & crebribus instructæ, dorsales vero spinis minoribus, paucioribus remotis. Corpus subtus atrum, opacum;

*Ins.* Svec. T. I. P. III. F. ob-

obsolete coriaceo-punctatum. Pedes breviusculi validi, atri, tibialis anticus externe spina acuta armatis, posterioribus angulo tectum in medio instructis.

Obs. Aliam Indicam, magnitudine & colore similimam, a beato Dom. T. Lund obtinens, quæ tamen certe distincta Species, antennis longioribus, articulo primo Spina tri-ramosa, secundo simplici, armatis, thoracis lateribus etiam spina tri-ramosa, utrinque, spinis omnibus multo longioribus, quam in Specie Europæa; alia iterum a Dom. Prof. Ad. Afzelio a Sierra Leona allata, & benevole communicata, adhuc magis diversa, plus duplo major, antennis longioribus, muticis, articulo tertio longissimo, cylindrico; thoracis lateribus spinulis tribus simplicibus, & spinis elytrorum paucioribus, brevioribus, &c.

### Subdivisio 3:a, Chrys. Genuine.

Antennæ ante oculos insertæ, moniliformes, gradatim extrorum crassiores. Palpi maxillares aut filiformes, aut extrorum crassiores, articulo ultimo plerumque truncato. Maxillæ bifidæ, laevis fere æqualibus, sub-cylindricis, externa paulo latiore. Corporis forma varia, aut sub-hemisphærica, aut ovata, aut elongato-ovata, &c.

### C H R Y S O M E L A.

*Palpi maxillares exserti, maxillis longiores, articulo ultimo crassiores, truncato. Labium transversè quadratum, coriaceum. Antennæ extrorum gradatim crassiores. Corpus crassum,*

*sam, convexum, aut sub-orbicularis, aut ova-  
tum. Tarsum articulus tertius rotundatus;  
parum emarginatus.*

- Sect. i. Elytris vase punctatis, saltem in  
disco; punctis versus margines tamen in-  
terdum sub-serialis.
- ii. C. coriaria: aptera, gibbola, nigra, cre-  
bre inaequaliter punctulata, subtus viola-  
cea, thorace tenuè marginato, posterius  
angustiori, antennis longitudine thoracis.

Fabr. Elout. I. 424. 6. Panz. fn. 44. f. 2.  
Marth. Ent. br. I. 170. 2. Schönh. Synon. n.  
239. II.

*Chrysomela Goettingensis.* Payk. fn. 2. pl. I.

Var. b, *lupra cœruleo-nigricans.*

*Chrysomela violaceo-nigra.* Do. Gér. Ins. p.  
293. 8.

Habitat in Svecia soustrali; rarius.

Descr. Chr. Populi fere brevior, sed latior &  
multo magis convexa; mas plerumque dimidio mi-  
nor. Caput rotundatum, nigro-violaceum, crebre  
punctulatum, fronte antice inaequali, impressa; oculi  
oblongi, brunnei. Antennæ vix thorace longi-  
res, crassiusculæ, basi violaceo-nigrae, extrorium  
nigro-fuscæ, pubescentes, articulo primo magnò,  
clavato; 2. 10. nodosis, distantibus, exterioribus  
gradatim paullo crassioribus, ultimo majori, acumini-  
nato. Thorax brevis, transversus, antice late, sed  
parum profunde, semi-circulariter emarginatus, la-  
teribus ante medium latior, posteriora nonnihil am-  
gustatus, basi truncatus, angulis sub-prominulis;

undique, etiam basi & apice anguste marginatus; supra modice convexus, niger, nitidus, crebre, subtiliter punctulatus, punctis sub-equalibus. Scutellum breve, transverso triangulare, nigrum, laxe. Elytra magna, antice thoracis basi multo latiora & illo quadruplo longiora, pone basin dilatata, dein anuata, lateribus dupliciter marginata, apice rotundata, supra valde convexa, nigra, nitida, crebre punctata, punctis inaequalibus, aliis netape paullo majoribus, aliis minutis, varie mixtis; margo inflexus coeruleo-violaceus. Corpus totum subitus coeruleo-violaceum, nitidum, punctulatum. Pedes longiculi, validi, violacei, tarsis valde dilatatis, praesertim in masculis.

Var. b, differt tantum colore paginæ superioris cœrulecente.

Obs. Varietatem maris e Germania obtinui, corpore subtus pedibusque fere nigris, vel perparum cœrulecentibus, qui forte Tenebrio latipes, Linn. Syst. 2. 678. 30.

2. C. hæmoptera: gibbosa, nigro-coerulea tota, antennis basi rufo-piceis, thorace obsolete punctulato; lateribus vix incrassato, elytrorum punctis profundioribus, irregulariter sub-seriatis.

Linn. Syst. 2. 587. II. En. Sv. 512. Marsh. Ent. br. I. 171. 5.

*Chrysomela Hottentotta.* Fabr. Eleut. I. 429. 37. Payk. fn. 2. 67. 17. Schönh. synon. 2. 243. 40.

Habitat in pratis apricis; tempore vernali, passim.

Defct.

Descr. Magnitudo & statura brevis, gibbosæ, Chr. staphyleæ, tota supra & subtus nigro-cœrulea, nitida. Caput parvum, breve, rotundatum, obsolete punctulatum, ore nigro-piceo; oculi majusculi, oblongi, brunnei. Antennæ thorace longiores, basi rufo-piceæ, extrorsum nigro-fuscæ, pubescentes. Thorax brevissimus, transversus, antice angustior, ibique late, semi-circulariter emarginatus, angulis prominulis, acutis, lateribus oblique sub-rectis. vix incrassatis, subtus anguste marginatis; basi bi-sinuatus, angulis acuminatis; supra modice convexus, nigro-cœruleus, nitidus, crebre, sed valde obsolete, minutissime punctulatus, versus margines laterales insuper punctis aliquot majoribus impressus. Scutellum oblongo-triangulare, nigro-cœruleum, parce punctatum. Elytra thoracis basi parum latéra, pone basin dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigro-cœrulea, nitida, punctis majusculis, sat crebris, versus latera & suturam irregulariter sub-tertiatis, impressa. Alæ amplæ, paleide rufescentes. Corpus subtus nigro-cœruleum, nitidum, parce obfoletius punctatum. Pedes medios cœrualei nitidi, tibiarum apice interne spongiosi, que tarsuum cinereo-villofis.

3. C. Goettingensis: breviter ovata, tota violacea, subtilissime punctulata, antennarum basi, palpis tarſisque rufo-testaceis.

Linn. *Syst. 2. 586. 4. Fn. Sv. 506. Panz. fn. 44. f. 3. Marsh. Ent. Br. I. 171. 4. Fabr.*

*Eleut. L. 429. 36? Schönh. synon. 2. 242. 39.*

*Chrysomela hæmoptera. Payk. fn. 2. 52. 2.*

Habitat in pratis apricis, aridis, sub lapidibus, muscis, tempore vernali, passim.

Iutius rufescente; supra os linea arcuata, impressa; oculi oblongi, nigri, prominuli. Antennæ longitudo dimidii corporis, totæ ferruginæ. Thorax brevissimus, transversus, antice angustior, late, sed non profunde emarginatus, lateribus rotundatus, margine valde incrassato, elevato, fovea longitudinali arcuata, punctata; a disco distincto; postice bisinuatus, supra disco convexus, subtilissime, obsoleta punctulatus, totus brunneo-castaneus, æneo-micans. Scutellum oblongo-triangulare, castaneum, lœve. Elytra magna, antice thoracis basi paullo latiora, versus medium dilatata, thorace quintuplo longiore, supra valde convexa, castanea, æneo micantia, nitida, punctis parvis, inordinatis, crebre adpersa. Corpus sublîus aut dilutius testaceum, aut saturatius brunneum, obsolete punctulatum. Pedes longiusculi, validi, ferrugineo-testacei, nitidi.

**C. polita:** breviter ovata, viridi-ænea, nitida; thorace aureo, marginibus incrassato; elytris brunneo-testaceis, subtiliter punctulatis.

Linn. Syst. 2. 590. 27. Fn. Sv. 522. Fabr. Eleut. 1. 434. 73. De Gér. Ins. 5. 294. 2. 2. 23. Payk. fn. 2. 54. 5. Schönh. Syst. 2. 252. 82.

Var. b; cœrulea, nitida, elytris brunneo-testaceis. Payk. loc. cit. var. b.

Habitat in plantis & gramine, ut & sub lapidibus, in scis, frequens.

Descr. Precedenti simili, sed paullo longior, minus convexa, & plerumque paullo minor. Caput rotundatum, viridi-æneum, nitidum, subtiliter ob-

sole-

solete punctulatum, oculis magnis, brunneis. Antennæ nigro-fuscæ, articulis tribus baseos sub-ferrugineis. Thoracis structura ut in præcedenti omnino, supra in disco aut cupreo-aureus, aut magis virescenti-aureus, nitidissimus, obsolete punctulatus, marginibus incrassatis viridi-æneis. Scutellum triangulare, viridi-æneum; nitidum, lœve. Elytra quoad formam fere ut in priori, modo paullo longiora & minus convexa, dilutius brunneo-testacea, nitida, punctis parvis, inordinatis, crebre adspersa. Corpus subitus aut viride, aut viridi-æneum, aut viridi-cærulescens; abdominis dorso, lateribus anque ferrugineis. Pedes longiusculi, validi, viridi-ænei, tarsis piceis, spongiis ferrugineis.

Var. b, differt tantum colore capitis, thoracis, corporis pedumque cæruleo, thoracis disco tamen plerumque virescente.

7. C. Populi: ovata, nigro-cærulea, nitida, thorace parvo, utrinque impresso, elytris amplis rufis, consertissime punctulatis, ipso apice nigris.

Linn. *Syst.* 2. 390. 39. Fn. *Sv.* 523. Fabr. *Eleut.* 1. 433. 68. *De Géer Ins.* 5. 290. 1. tab. 8. f. 16-22. Payk. *fn.* 2. 55. 6. Panz. *fn.* 100. f. 3. Schénh. *Synon.* 2. 250. 77.

Habitat in foliis Populi tremulæ & Salicis, frequens.

Descr. Maxima, fere nostratum hujus generis. C. Goettingensi in elytris multo latior; variat tamen statura minore. Caput parvum, nigro-cæruleum, subtiliter punctulatum, fronte inæquali, plurimque canaliculata, supra os arcuatim impressa.

truncata; oculi prominuli, brunnei. Antennæ thorace parum longiores, nigrae, extorsum fuscopubescentes. Thorax parvus, transversus, antice late & sat profunde semi-circulariter emarginatus, lateribus rotundatus, angustissime marginatus, vix incrassatus, basi etiam sub-rotundatus, angulis nonnihil prominulis; supra parum convexus, nigro-ceruleus, in medio laevissimus, nitidus, versus latera crebre punctatus, fovea arcuata, abbreviata, longe intra marginem utrinque impressus. Scutellum parvum, triangulare, nigro-ceruleum, laxe. Elytra ampla, thorace multo latiora & textu pllo longiora, supra satis convexa, in vivo saturate rubra, post mortem ferrugineo-testacea, confertissime subtiliter punctulata, apice ipso anguste nigro. Corpus sub-tus nigro-ceruleum, nitidum, pectoris lateribus rugoso-punctatis, ventris marginibus testaceis. Pedes mediocres, nigro-cerulei, tarsis nigris, cinereo-spongiosis.

**C. Tregulæ: ovata, coeruleo-virescens,  
nitida, thorace utrinque profunde impre-  
so, basi sub-truncato, elytris rufo-testa-  
cis, immaculatis, sub-rugofisis.**

*Fabr. Eleut. I. 434. 69. Payk. fn. 2. 55. 7.*

*Panz. fn. 100 f. 6. Schönh. synon. 2. 251. 78.*

**Habitat in foliis Populi tremulae, apud nos rarius.**

**Descr.** Præcedenti similis & affinis, sed dimi-  
dio minor, thoracis foveæ profundiores, elytra apic-  
e concolora, &c. Caput parvum, coeruleo-vires-  
cens, nitidum, subtiliter punctulatum, fronte inae-  
quali, supra os arcuatim impressa, truncata; oculi  
oblongi brunnei. Antennæ thorace parum longio-  
res,

res, inferne cœruleo-nigrae, extrorsum crassiores, fuscae. Thorax brevis, transversus, antice late emarginatus, lateribus sub-rotundatus, anguste marginatus, basi fere truncatus, angulis nonnihil prominulis; supra in disco convexus, cœruleo-virescens, nitidissimus, subtilissime, obsolete-punctulatus; versus latera sat profunde punctatus; longe intra marginem utrinque fovea, profunde impressa, arcuata, crebrim punctata. Scutellum oblongo-tiangularis, cœruleoescens, laeve. Elytra thoracis basi latiora, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, rufo-testacea, nitida, creberrime & paullo fortius quam in praecedenti, punctata, superficie reliqua sub-rugosa. Corpus subtus cœruleo-virescens, nitidum, paree punctulatum, ventris marginibus testaceis. Pedes mediocrea cœruleo-virescentes,

9. *C. collaris*: ovata, nigro-cœrulea, nitida, thoracis lateribus luteo-ferrugineis, puncto nigro, elytris violaceis, creberrime punctulatis.

Linn. Syst. 2. 591. 37. Kn. Su. 528. De Géor. Ins. 5. 302. 13. Payk. Kn. 2. 58. 10. a; Schönh. synon. 2. 254. 89. b.

*Chrysomela Salicis*, Fabr. Elsut. 1. 436. 81.

Var. ♂ nigro-cœrulea, thoracis lateribus flavo-albidis, elytris viridi-geneis, vel æneo-subviolaceis. Payk. loc. cit. var. ♂, Schönh. loc. cit. a.

*Chrys. collaris*. Fabr. Elsut. 1. 433. 80. Panz. Kn. 78. f. 2.

Habita-

**Habitat in foliis Salicis, Populi, frequens;**  
**var. a & b, separatim degunt, & cum**  
**similibus tantum copulantur.**

Deser. Statura & magnitudo C. politæ. Caput nigro sub-cœrulescens, fronte depresso, inæquali, saepè canaliculata, parce punctata, oculis oblongis brunneis. Antennæ thorace parum longiores, inferne piceo-ferrugineæ, extrorsum crassiores, nigræ. Thorax transversus, antice late emarginatus, lateribus sub-rectis, anguste marginatis, basi sub-sinuatus, angulis acuminatis; supra parum convexus, in medio longitudinaliter nigro-cœruleos, nitidus, subtilissime punctulatus, lateribus late, inæqualiter luteo-ferrugineis, profundius punctatis, cum puncto parvo fusco, paullo ante medium utrinque. Scutellum parvum, triangulare, cœruleo-virens. Elytra thoracis basi latiora, & pone basin, ultra medium, magis dilatata, thorace fere quintuplo longiora, apice, in femina reflexo-acuminata, in mare submutica, supra valde convexa, cœruleo-violacea, interdum nigro-violacea, nitida, creberrime vage punctulata. Corpus subtus nigrum, parum cœrulecenti-micans, vix punctatum, ventris marginibus postice ferrugineis. Pedes mediocres, nigro-cœrulecentes, nitidi, tibiis apice crassioribus, externe canaliculatis, saepius macula oblonga rufescente notatis.

Var. b, colore tantum differt; thoracis latera in vivo fere alba, post mortem flavo-albida. Elytra violidi-zæna, interdum violaceo-tincta.

30. *C. sanguinolenta*: ovata, nigro-cœrulescens, elytris nigris, profunde rugoso-punctatis, margine lateralí late sanguineo.

*Linn.*

Linn. *syft.* 2. 591. 38. Fn. Sv. 519. Fabr.  
 Eleut. 1. 441. 115. Payk. *fn.* 2. 52. 3.  
 Panz. *fn.* 16. f. 10. Schönh. *Synon.* 2. 262.  
 123

*Chrysom. rubro marginata.* De Gér. *Ins.* 5.  
 298. 7. tab. 8. f. 26.

Habitat in Sveciæ australis graminosis, ra-  
 tius.

Descr. *Statura & magnitudo C. Goettingensis.*  
 Caput parvum, rotundatum, nigrum, parum cœrule-  
 scenti-micans, supra os arcuatim, impressum, subtiliter  
 punctulatum. Antennæ thorace longiores, tenues,  
 nigræ, basi sub. cœrulecentes. Thorax brevissimus,  
 transversus, antice late & profunde emarginatus, la-  
 teribus rotundatus, incrassatus, sub latere anguste  
 marginatus, basi bi-sinuatus, supra parum convexus,  
 niger, parum cœrulecenti-micans, disco elevationi,  
 subtilissime obsolete punctulato, lateribus punctis  
 magnis profundis, inæqualibus impressis. Scutellum  
 sub-triangulare, cœrulecens, nitidum, lœve. Ely-  
 tra magna, antice thorace multo latiora, & pone  
 basin adhuc magis dilatata, thorace sextuplo longio-  
 ra, supra valde convexa, nigra, nitida, punctis cre-  
 bris, profundis, & rugis elevatis lœvibus, varis  
 confluentibus, valde inæqualia, margine lateralí to-  
 to late sanguineo, post mortem rufo-testaceo. Cor-  
 pus subitus nigro cœruleum, nitidum, vix punctu-  
 latum. Pedes mediocres, cœrulecentes, femori-  
 bus evidenter punctatis.

ii. *C. limbata:* breviter ovata, nigra, nigræ  
 da, subtiliter punctulata, elytrorum limbo  
 toto

ctulatus, versus latera impressus, profunde rugosus; punctatus. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum. Elytra thoracis basi multo latiora, & illo Sextupo longiora, supra modice convexa, rufo-testacea, nitida, crebre, inordinate punctata, sutura tota late coerulefcente; intra basin cuiusvis elytri macula magna, difformis, intus angustior; rarius in duas disjunctas, coerulescens; in medio fascia transversa, subundata, futuræ connexa, margines laterales non attingens, ejusdem coloris, & intra apicem arcus magnus, coerulescens, a futura antrosum circulatim productus, versus aquum apertus. Corpus subitus obscure viridi-aeneum, vix punctatum. Pedes mediocres, femoribus viridi-aeneis, tibiis rufo-ferrugineis, tarsis piceis.

Var. b, differt tantum signaturis coeruleis elytrorum valde dilatatis, confluentibus, relictis tantum margine lateralí & lineis nonnullis arcuatis disci, rufo-testaceis.

Var. c, elytra gerit fere tota coerulentia, excepto margine lateralí, & punto uno altero de disci testaceis.

83. *C. cuprea*: ovata, viridi-aenea, thorace parvo, lateribus incrassato, elytris magnis, gibbosis, cupreis, basi plicatis, abdominis margine rufescente.

*Fabr. Eleat.* 1. 432. 61. *Payk. fn.* 2. 56. 8.

*Panz. fn.* 25. t. 8. *Schönh. synon.* 2. 248. 66.

Var. b, corpore toto supra obscure viriscati-aeneo. *Payk. Schönh. loc. cit. var. b.*

*Chrysomela ruficaudis.* *De Gér Ins.* 5. 305. 17.

Var.

Var. *c*, atro-subvirescens, elytris cœruleo-violaceis. Payk. Schônh. loc. cit. var. *c*.

Habitat in foliis Salicis, apud nos rarius.

Descr. Statuta Chr. æneæ, sed plerumque di-midio major, thoracis latera incrassata, elytra magis convexa, &c. Caput parvum, rotundatum, virescen-ti-æneum, sat crebre punctulatum, fronte canalicu-lata, & supra os triangulariter depressa; oculi ob-longi, brunnei. Antennæ vix capite cum thorace longiores, inferne rufo-piceæ, extrorfam crassiores, nigræ. Thorax parvus, brevis, transversus, elytris multo angustior, antice late emarginatus, lateribus parum rotundatus, anguste marginatus, & longe intra marginem fovea, illi parallela, profunde impres-sa, utrinque, unde latera incrassata apparent; basi sub-sinuatus, angulis acutis, reflexis, supra in disco sub-convexus, virescenti-æneus, nitidus, vix vel obsoletissime punctulatus; linea media longitudinali impressa canaliculatus, versus latera crebre & sat profunde punctatus. Scutellum triangulare, viridi-æneum, nitidum, læve. Elytra magna, antice tho-racis basi multo latiora, pone basin dilatata, thora-ce sextupo longiora, supra anterius valde convexa, fere gibbosa, posterius declivia, tota rubro-cuprea, nitida, creberrime subtiliter vage punctulata; intra humerum callus elevatus, & juxta illum interne fo-vea satis magna, impressa, unde elytra basi plicata, Corpus subrus virescenti-æneum, nitidum, obsole-te strigosum, ventris lateribus & ano rufescentibus. Pedes mediocres, viridi-ænei, tibiis externe canali-culatis.

Var. *b*, fimmilla, sed color elytrorum idem ac thoracis & capitis, obscurius virescenti-æneus.

Var. *c*, colore magis differt; caput, thorax & corpus fere nigra, parum coeruleoscenti vel æneo-  
Inj. Sust. T. I. P. III. Gg

micantia; elytra luteo rufesceni - vel cæruleo rufesceni - violacea, nitida; canalicula dorsalis thoracis in hac varietate plerumque obsoletior.

14. *C. Bulgharen sis*: ovata, virescens, cærulea, nitida, thorace lateribus incrassato, dorso lœvi, elytris magnis, cyaneis, basi plicatis.

*Fabr. Eleut.* 1. 444. 134.

*Chrysom. ænea*, var. *Schönh. synon.* 2. 249. 67. b.

*Illig. Mag.* 3. 159. 134.

Habitat in Finlandia, Dom. Pfeiff.

Defcr. Statura præcedentis, sed triplo minor, thoracis dorso non canaliculato, elytris minus convexis, distincta; a Chr. ænea, thorace utrinque profunde impresso, lateribus incrassato, disco lœvi, &c., etiam vere diversa mihi videtur. Caput parvum, rotundatum, cæruleo-virescens, sat crebre punctulatum, fronte non canaliculata, sed supra os triangulariter impressa, ore ferrugineo. Antennæ articulis 2-6 ferrugineis, reliquis nigris, structura ut in præcedente. Thorax brevis, transversus, quadrangularis, antice late emarginatus, lateribus fere rectis, anguste marginatis, & longe intra marginem fovea profunda, impressa, unde latera elevata videntur; postice parum sinuatus, angulis sub-rectis, supra in disco convexus, cæruleo-virescens, nitidissimus, lœvis, versus latera crebre & profunde punctatus. Scutellum parvum, triangulare, cæruleum, lœve. Elytra magna, antice thorace multo latiora, & illo sextuplo longiora, supra æquilater, modice convexa, cyanea seu cæruleo-subviolacea, nitida, crebre subtiliter punctulata, margine laterali crasso, sub-elevato; in basi elytrorum callus humeralis & illi

inten-

interius adjacens foveola impressa, ut in priori. Corpus subtilis caeruleo-virescens, nitidum, vix punctulatum, ventris marginibus posticis anguste rufescens-tibus. Alae longae, tuscensentes. Pedes mediocres, caeruleo-virescentes, tibiarum spicè rufisque rufopicei.

15. C. ænæa: ovata, supra viridi-ænea, nitidissima, creberrime punctulata, subtus obscurior; ano ferrugineo, thoracis lateribus non incrassatis.

Linn. S. A. 2. 587. 8. Fn. Sv. 510. Fabr. Ent. 1. 444. 33. Payk. fn. 2. 59. u. Panzer fn. 25. f. 9. Schönh. Synon. 2. 248. 67.

*Chrysom. viridis* Alni. De Gér. Inf. 5. 305. 18.

Var. b, caeruleo-violacea tota, ano rufescente. Payk. Schönh. loc. cit. var. b.

*Chrysom. caeruleo-violacea*. De Gér. Inf. 5. 316. 22.

Habitat in foliis Betulæ alni, frequens, folia misere devastans.

Descr. Media, C. collaris aequalis; variat etiam duplo minor, praesertim mas. Caput parvum, viridi-æneum, saepe aureum, nitidissimum, crebre subtiliter punctulatum, fronte impressa, plerumque cahaliculata, supra os arcuatim depressa; oculi oblongi, brunnei. Antennarum structura ut in proxime precedentibus, inferne rufo-piceæ, extorrisum nigrae. Thorax brevis, transversus, antice paullo angustior, late & profunde emarginatus, lateribus nonnihil rotundatus, anguste marginatus, minime incrassatus.

nigro-piceo; Antennæ thorace longiores, extrorsum crassiores, totæ nigrae, articulo primo supra viridaneo. Thorax brevis, latus, transversus, antice late & sat profunde emarginatus, lateribus sub-rectis, anguste marginatis, parum incrassatis; basi bifiduatus, supra convexus, viridaneus, nitidus, in disco subtilissime, obsolete, versus latera evidenter punctulatus. Scutellum triangulare, cœruleo-virescens, lœve. Elytra antice thorace parum latiora, sed pone basin dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, virescens-aenea, nitidisima, creberrime, vage punctulata. Corpus subtus cœruleo-violaceum, certo situ virescens, nitidum, vix punctulatum. Pedes mediocres, cœruleo-virescentes, tarsis piceis, griseo-spongiosis.

Var. b, supra aut saturatis rubro-cuprea, aut fulutius aeneo-cuprea, subtus, cum pedibus, aeneo-virescens; cæterum omni punto conveniens; Thoracis-margines vix in ulla varietate hujus speciei incrassati dici queant, modo punctura fortiori, & interdum impressione obsoleta, versus basin, a disco distincti.

Var. c, d, e, etiam colore tantum distincti, secundum diagnosim cuivis datam, & per transitus ab una in alteram connexi.

Var. f, fere tota nigra, interdum tamen in elytris & femoribus cœruleo-iridescentia micans.

19. C. Raphani: oblongo-ovata, supra vidi aurea, nitida, confertissime punctata, subtus cœrulea, thorace antice vix emarginata, fronte sulcata.

Fabr. Elest. 1. 430. 47. Payk. Jn. 2. 62. 15.  
Schönh. synon. 2. 245. 51.

Cary.

*Chrysom. fulgida.* Fabr. Eleut. 1. 432. 59.

Schönh. synon. 2. 247. 64.

Habitat in pratis aridis, sat frequens; var. c, tamen apud nos raro occurrit. Dom. Schönherr.

Descr. Inter maiores, Chrysom. Sanguinolenta fere longior; sed paulo angustior. Caput rotundatum, viridi-æneum, subtiliter punctulatum, fronte obsolete canaliculata, supra os rotundatum depresso; oculi oblongi, brachii; os piceum, labro viridi æneo. Antennæ thorace longiores, tenues, coeruleo-virescetes, extrosum nigro-fuscæ, articulis duobus baseos subtus ferrugineis. Thorax brevis, transversus, anteice late, sed minus profunde emarginatus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, vix incrassatus, basi sub-sinuatus, angulis acutis; supra valde convexus, viridi æneus, certo situ saepe coeruleo-micans, crebre punctatus, punctis versus latera majoribus, confluentibus. Scutellum triangulare, coeruleo-virescens, laxe. Elytra thorace latiora, & quintuplo longiora, supra valde convexa, viridi-ænea, nitida, versus latera aureo-ænea, futura & plaga media longitudinali certo situ coeruleo-micantia, crebre punctata, punctis versus latera & suturam sub-seriatia. Corpus subtus viridi-aureum, nitidissimum, parce punctulatum. Pedes longiusculi, viridi-ænei, nitidi, spongiis tarsuum cinereis.

Var. b, differt tantum colore paginae superioris coeruleo-violaceo; oblique inspecta, color viridi-æneus tamen translucet, saltem versus margines.

Var. c, etiam colore tantum differt, ut in diagnosis indicatum; in cæteris vero ne punctulo diversa,

17. *C. fastuosa*: ovata, convexa, tota viridi-aurea, cœruleo-micans, elytrorum sutura vittaque media abbreviata saturate cœruleis, antennis basi ferrugineis.

*Linn. syst. 2. 588. 18. Pand. & El. Rub. p. 8. Fabr. Eleut. 1. 440. 109. Payk. fn. 2. 64. 18. Pang. fn. 44. f. 12. Thunb. Nov. Aff. Ups. 5. 148. 37. Schönh. synon. 2. 260. 28.*

Habitat in plantis oleraceis, gramine, sat frequens.

Déscr. Præcedenti colore simillima, sed triplo minor & ultra, statua brevior, antennæ extrosum crassiores, basi ferrugineæ, &c. Caput rotundatum, viridi-aureum, nitidissimum, versus latera punctatum, fronte laevi, tenui canaliculata, supra os rotundatum depresso. Antennæ dimidio corpore fere longiores, basi ferrugineæ, extrosum crassiores suscæ, pubescentes. Thoraci structura & color ut in præcedenti omnino, supra modice convexus, in disco subtilissime & obsolete, versus latera evidenter punctulatus. Scutellum ut in priori. Elytra thorace latiora & quadruplo longiora, supra valde convexa, viridi-aurea, nitidissima, crebre, evidenter punctata, punctis versus latera & suturam sub-seriatim; sutura tota, & vitta in singuli elytri medio, abbreviata, nec basin neque apicem attingens, cœruleo-viola-cea. Corpus subitus viridi-æntum, nitidum, obsoleto punctulatum. Pedes mediocres, viridi-ænei, tarsis obscurioribus, cinereo-spongiosis.

Obs. Chrys. Speciosa, Linn. syst. 2. 588. 19. Eahp. Eleut. 1. 441. 112., secundum sententiam Dom. Illigeri & Schönherrii, hujus Speciei varietas elegantior, sed haec mihi plane ignota.

18. *C. varians*: breviter ovata, convexa, thoracis margine parum incrassato, elytris creberrime, vase punctatis, colore vario.

Var. *a*, supra æneo-virescens, subtus cœrulea.

*Fabr. Eleut.* 1. 433. 64. *Payk. fn.* 2. 60. 12.

*Panz. fn.* 44. f. 9. *Schönl. synon.* 2. 249.  
70.

Var. *b*, supra cuprea, nitidissima, subtus viridi-ænea, femoribus cupreis. *Payk.*  
*Schönh. l. c. var. b.*

*Chryf. Centaurej.* *Fabr. Eleut.* 1. 428. 34.

*Panz. fn.* 44. f. 10.

*Chryf. Marsham.* *Marsh. Ent. Br.* 1. 173. 10.

Var. *c*, supra cœruleo-virescens, subtus cœrulea.

Var. *d*, tota cœrulea.

Var. *e*, tota violacea.

*Chryf. Hyperici.* *De Gler Ins.* 5. 312. 20. tab:  
9. f. 13.-17.

Var. *f*, tota nigra, femoribus sub-cœruleo-scentibus.

*Chrysom. aethiops.* *Fabr. Eleut.* 1. 429. 38.?

Habitat in plantis variis, præsertim in *Hypericis*, ubique frequens; var. *f*, tamen rarius occurrit.

Descr. Magnitudo sene precedentis, sed paullo brevior, rotundato-ovata. Caput breve, rotundatum, viridi-æneum, nitidum, obsolete pubescutatum, ore

*Chrysom. Betulae.* Linn. *Syst. 2.* 587. 10. *Fn.*  
*Sv. 514.* *Marsh. Ent. Br. 1.* 178. 20.

*Chrys. Plantaginis.* *De Gér Inf. 5.* 322. 25.

Var. c, coeruleo-virescens, plerumque di-  
 midio minor.

Habitat in plantis aquaticis, *Veronica Beccabunga*, *Ranunculis*; aliisque, ubique  
 frequens.

Descr. Parva, brevis, statura C. *Armorsciæ*,  
 sed minor. Caput sub-triangulare, versus os angu-  
 statum, coeruleum, nitidum, crebre punctulatum,  
 oculis magnis, brunneis. Antennæ thorace longiores,  
 nigrae, extrorium multo crassiores. Thorax  
 brevis, transversus, anterius paulo angustior, ibique  
 late emarginatus, lateribus obliquis, sub-rectis, an-  
 guste marginatis; basi sub-sinuatus; supra modice  
 convexus, coeruleus, nitidus, crebre subtiliter pun-  
 ctulatus, absque rudimento impressionis lateralis.  
 Scutellum sub rotundatum, coeruleum, laxe. Ely-  
 tra magna, thorace multo latiora & quadruplo lon-  
 giora, supra valde convexa, coerulea, nitida, subtil-  
 lissime punctato-striata, punctis crebris, coarctatis,  
 interstitiis adhuc subtilius, obsolete punctulatis; in  
 medio baseos fovea impressa, & extra illam callus  
 humeralis elevatus. Corpus subtus obscurius nigro-  
 coeruleum, obsolete punctulatum, ani margine te-  
 traceo. Pedes mediocres, nigro-coerulecentes, tar-  
 fis griseo-spongiosis.

Var. b, differt tantum colore paginæ superioris,  
 praesertim elytrorum, violaceo-purpureo, niti-  
 diffimo.

Var. c, plerumque dimidio minor, supra magis  
 virescens, cæterum omnes simillimæ.

26. C. litura: breviter ovata, convexa, rufo-testacea, elytrorum sutura vittaque abbreviata, nigris, abdominalis antennarumque apice fuscis.

*Fabr. Eleut. I. 429. 34. Payk. fn. 2. 74 28.*

*Panz. fn. 78. f. 6. Marsh. Ent. Br. I. 182.*

*Schönh. Synon. 2. 242. 37.*

Var. b., pallidior; sutura elytrorum sola obscuriori. *Payk. Schönh. I. c. var. b.*

*Chrysomela olivacea. Marsh. Ent. Br. I. 181.*

Var. c., pallida, elytrorum sutura concolor.

*Chrysomela flavicans. Fabr. Eleut. I. 429. 33.*

*Chrys. Cerasi. Linn. sylt. 2. 588. 13?*

Habitat in foliis Pruni Padic, apud nos ratius. Dom de Paykull.

Descr. Minor; Chr. Polygoni fore brachior, imágis convexa. Caput rotundatum, testaceum, nitidum, sat crebre punctatum; vertice maculij duabus fuscis; saepe sub thoracis margine occultatis; oculi oblongi, brupnei. Antennæ thorace longiores; pallide testaceæ, extrorum crassiores, fuscae. Thorax brevissimus, transversus, antice late, sed non profunde emarginatus; lateribus parum rotundatus, anguste marginatus; basi sub sinuatus, supra valde convexus; rufo-testaceus; nitidus, in disco subtus fine versus latera evidenter punctulatus. Scutellum rotundatum, fulco-piceum, laxe. Elytra thorace parum latiora, sed quadruplo longiora & ultra; supra valde convexa; plerumque pallidius testacea; interdum cinerascenti-olivacea; nitida; sat profundè

*Ins. Svec. T. I. P. III. Hh. part.*

20. C. *Polygonicæ*: oblongo-ovata, cœrulescens, nitida, confertissime punctata, thorace, ano pedibusque rufis.

Linn. *syst.* 2. 589. 24. Fn. Sv. 520. Fabr.

*Eleut.* 1. 439. 102. *De Gér. Ins.* 5. 322. 26.

*Thunb. Act. Ups.* 5. 108. 38. *Payk. fn.* 2.

2. 61. 14. *Schönh. Synon.* 2. 258. III.

*Galleruca ruficollis.* Fabr. *Eleut.* 1. 479. 6.

*Schönh. Synon.* 2. 289. 9. forte eadem, secun-

dum *Scientiam Dom.* Illig. in *Mag.* 3. 158. 102.

Habitat in *Polygono aviculari*, *Rumice*, & illisque plantis, ubique frequens.

Desor. Bayva, Caput rotundatum, saturate cœruleum, subtiliter punctulatum, oculis oblongis, nigro-brunneis. Antennæ thorace multo longiores, basi plerumque ferrugineæ, extremitate crassiores, nigrae. Thorax brevis, transversus, antica parum emarginatus, lateribus & postice nonnihil rotundatus, angulis obtusis, supra convexus, totus rufus, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus. Scutellum rotundatum, cœruleum, sub-læve. Elytra thorace multo latiora, & quadruplo longiora, supra valde convexa, cœrulares, interdum violacea, rarius virescens-micantia, confertissime & profundius quam thorax, vage punctata. Thorax subtus rufus, medio nigro, cœrulus; pectus & abdomen cœrules, parce punctata, ano rufo. Pedes mediocres, rufi, tarsis supra picis.

21. C. *Armoricæ*: breviter ovata, cœrula, virescens, nitida, creberime punctata, subtus nigra, elytris basi plicatis.

Linn.

*Linn. Juss. 2. 588. 16. Fn, Sv. 515. Fabr.*

*Eleut. 1. 445. 136. Payk. tn. 2. 60. 13.*

*Panz. fn. 44. f. 14. Schbnk. Synon. 2. 268.*

143.

**Chryl. cœrulea Salicis.** *Dö. Geer Ins. 5. 318.*

24. tab. 9. f. 24-33.

**Var. b, Supra nigro-violacea.**

**Habitat in foliis Salicis, Betulæ, apud nos Karlius.**

**Descr.** Minor, rotundata, Chr. coerulea pârum major, minus convexa. Caput breve, rotundatum, cœruleum, subtiliter obsolete punctulatum, fronte sub canaliculata; os piceum. Antennæ thorace parum longiores, inferno rufo-ferrugineæ, extrosum crassiores, nigrae. Thorax brevis, transversus, antice paullo angustior, late & sat protunde emarginatus, lateribus anguste marginatus, basi rotundatus, angulis sub rectis; supra parum convexus, cœruleus, vel cœruleo-virescens, nitidus, subtilissime obsolete punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, cœruleo-virescens. Elytra thoracis basi latiora, & post basin magis dilatata, thorace quinque longiora, supra modice convexa, cœruleo-virescentia, nitida, creberreme, evidenter punctata, punctis in ipsa basi rarioribus, sub serratis. Corpus subitus nigrum, parum metallico-bitens, vix punctulatum. Pedes mediocres, nigri, tarsis piceis.

**Var. b,** differt tantum colore paginae superioris, vel saltim elytrorum, virescens, interdum nigricante sub-violaceo.

**22. C. Sophiae:** breviter ovata, valde convexa, cœruleo-virescens, antennarum basi,

si, tibialis tarsisque pallide testaceis, elytris postice attenuatis, sub-acuminatis.

*Fabr. Eleut. I. 445. 139. Schall. Abt. Hall. I. 272. Illig. Mag. I. 416. 139. Penz. fn. 25. f. 10. Schönh. Jynon. 2. 269. 147.*

Habitat in Finlandia, ad Urbem Wäsa.  
Dom. Falander.

Descr. C. Polygoni brevior, sed crassior, multo magis convexa. Caput sub-triangulare, anterius angustatum, cœruleo-virescens, crebre, subtiliter punctulatum, foreolis duabus oblongis intra antennarum basin impressum, ore piceo; Antennæ thorace longiores, basi ferrugineæ, extorrisum crassiores, nigrae. Thorax transversus, antice paullo latior, truncatus, lateribus anguste marginatus, basi rotundatus, supra valde convexus, cœruleo-virescens, nitidus, crebre subtiliter punctulatus. Scutellum rotundatum, cœruleo-virescens, sub-læve. Elytra antice thorace paullo latiora, & illæ quadruplo longiora, apicem verius attenuata, sub acuminata, supra anterius valde convexa, posterius declivia, tota cœruleo-virescentia, nitida, crebre, sed parum profunde, vage punctata. Corpus subtus obscure cœruleum, pectore fortius, ventre tubilissime punctulatis. Pedes mediocres, femoribus cœruleo-virentibus, nitidis, tibialis pallide testaceis, basi nigrantibus, tarsis testaceis, supra fuscescentibus.

Obs. Variat corpore toto, supra luteo-violaceo. Vix Colaspidis generi associanda, sed potius Colaspis Barbara, Fabr. Eleut. I. 415. 15, quæ huic quoad structuram simillima, etiam ad Chrysomelas reducenda, ut rite observarunt Dom. Latreille & Illiger.

Sect.

28. C. affinis: oblongo-ovata, converva, nigra, thoracis disco sub-lævi, elytris testaceis, tenuie punctato-striatis, maculis quinque nigris.

Schönh. synon. 2. 257. 99. var. c.

*Chrysomela dispar.* Payk. fn. 2. 67. 20. var. d.

Var. b, Elytro singulo maculis tantum quatuor nigris. Schönh. loc. cit. var. d.

Var. c, thoracis lateribus tibiisque rufescens-tibus, maculis elytrorum ut in a. Schönh. loc. cit. var. b.

Var. d, thoracis lateribus tibiisque rufescens-tibus, elytrorum maculis ut in b; Schönh. l. c. a.

*Chrys. dispar.* Payk. fn. 2. 67. 20. var. c.

Habitat in Provinciis Borealibus, Lapponia, Finlandia, in foliis Salicūm; a & b, frequentiores, c & d, rarius ocurrunt.

Descr. Præcedenti quidem similis & affinis, at-tamen vere distincta videtur, nitidior, subtilius pun-ctata, thoracis disco nempe subtilissime punctulato, elytrorum striis tenuibus, macularum sito allo, &c. Caput breve, rotundatum, nigrum, nitidum, subtilissime, obsolete punctulatum, oculis brunneis. An-tennae longitudine fere dimidii corporis, extrorsum crassiores, nigrae, inferne ferrugineæ, articulo pri-mo supra nigro. Thorax brevis, transversus, anti-ce late, sed non profunde emarginatus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, basi bi-sinustus, angulis prominulis, acutis; supra modice conexus, etus niger, nitidus, in disco subtilissime, ut vix

visibiliter, punctulatus; versus latera evidenter, va-  
ge punctatus. Scutellum rotundatum, nigrum, nitidum, laxe. Elytra ante thoracis basi paulo la-  
tiora, postea basin nonnihil dilatata, thorace quinque  
longiora, supra valde convexa, rufo-testacea,  
nitida, subtiliter punctato-striata, punctis striarum  
parvis, valde coarctatis, intersticiis levibus, praeter-  
quam in disco posteriore, ubi puncta nonnulla par-  
va, inter striae sparsa; in singulo elytro maculae  
quinque nigrae, quarum prima intra humerum, par-  
va, oblonga; secunda versus scutellum, magna, dif-  
formis; tertia intra marginem, ante medium, trans-  
versa; quarta versus suturam, paullo pone medium,  
magna, oblonga, saepe cum macula scutellari conne-  
cta; quinta intra marginem, pone medium, minor,  
rotundata. Corpus subtus nigrum, parum nitidum,  
crebre, subtiliter punctulatum. Pedes medioeres, to-  
ti nigri, structura ut in praecedente.

Var. b, differt tantum defectu maculae posticæ  
intra marginalis elytrorum.

Var. c, ut a, sed tibiæ & latera thoracis plus  
minusve pallidiora, testacea aut livida.

Var. d, ut var. c, sed maculae elytrorum ut in b.

Obs. Variat etiam macula humerali in duas di-  
visa, ut quatuor maculae intra-marginales existant.

49. *C. rufipes*: oblongo-ovata, nigra; ore,  
pedibus, thorace elytrisque rufis, his ni-  
gro-maculatis, elytris tenue punctato-  
striatis, intersticiis obsoletius punctulatis.

*De Gér. Ins. 5. 295. 4. tab. 8. f. 25. Payk.  
fn. 2. 69. 28. Schönh. synon. 2. 254. 92.*

*Chrys. 10-notata. Marsh. Ent. Br. I. 175. 13.*

Ha-

rax brevis, transversus, anterius angustior, ibique late, sed parum profunde emarginatus. Tateribus obliquis, rectis, anguste marginatis; basi sub-sinuatus, angulis acuminitis; supra in disco modice convexus, totus olivaceus vel viridi-cerulecens, nitidissimus, lævissimus; versus latera utrinque sulcus profundus, sub-arcuatus, impunctatus, unde latera valde incrassatae apparent. Scutellum obtuse triangulare, concolor, læve. Elytra antice vix thoracis basi latiora, sed pone basin dilatata, thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, olivacea, seu viridi-cerulefcentia, nitida; in singulo series novem, æquali spatio distantes, e punctis majusculis, imprecisis, remotis, stria suturali & laterali punctis minoribus, magis coarctatis. Corpus subtus cœruleo viscerens, minus nitidum, sub-læve. Pedes validi, cœrulecentes, tarsis dense griseo-spongiosis.

Obs. Che. Bankfii, Fabr. Eleut. I. 430. 43, a Dom. Paykull in Fn. Sv. 3. add. 450. I. 2. ut Finlandie incola erroneæ allata, ad Europam meridionalem pertinet, vid. Schönh. Synon. 2. 244. 46.

25. C. Cœchleariae: breviter sub-ovata, cœrulea, nitida, subtus obscurior, elytris subtilissime punctato-striatis, humeris gibbis, ano testaceo.

Fabr. Eleut. I. 445. 137. Pagk. fn. 2. 75. 29.  
Panz. fn. 44. f. 15. Schönh. synon. 2. 268.  
144.

*Altica Eruca.* Panz. fn. 21. f. 2. Crit. Rev.  
I. 88.

Var. b, supra violacea, nitida,

*Chrysom. Betulæ.* Linn. Syst. 2. 587. 10. Fn.  
Sv. 514. Marsh. Ent. Br. 1. 178. 20.

*Chrys. Plantaginis.* De Geer Ins. 5. 322. 25.

Var. c, cœruleo-virescens, plerumque di-  
midio minor.

Habitat in plantis aquaticis, Veronica Becc-  
abunga, Ranunculis, aliisque, ubique  
frequens.

Descr. Parva, brevis, statura C. Armorsciæ,  
sed minor. Caput sub-triangulare, versus os angu-  
statum, cœruleum, nitidum, crebre punctulatum,  
œculis magnis, brunneis. Antennæ thorace longiores,  
nigræ, extrorium multo crassiores. Thorax  
brævis, transversus, anterius paullo angustior, ibique  
late emarginatus, lateribus obliquis, sub-rectis, an-  
guste marginatis; basi sub-sinuatus; supra modice  
convexus, cœruleus, nitidus, crebre subtiliter pun-  
ctulatus, absque rudimento impressionis lateralis.  
Scutellum sub rotundatum, cœruleum, lœve. Ely-  
tra magna, thorace multo latiora & quadruplo lon-  
giora, supra valde convexa, cœrulea, nitida, subtilissime  
punctato-striata, punctis crebris, coarctatis,  
interstitiis adhuc subtilius, obsolete punctulatis; in  
medio baseos fovea impressa, & extra illam callus  
humeralis elevatus. Corpus subtus obscurius nigro-  
cœruleum, obsolete punctulatum, ani margine te-  
staceo. Pedes mediocres, nigro-cœrulecentes, tar-  
sis griseo-spongiosis.

Var. b, differt tantum colore paginæ superioris,  
præsertim elytrorum, violaceo-purpurascente, niti-  
dissimo,

Var. c, plerumque dimidio minor, supra magis  
virescens, cæterum omnes finillimæ.

26. C. litura: breviter ovata, convexa, rufo-testacea, elytrorum futura vittaque abbreviata, nigris, abdominis antennarumque apice fuscis.

*Fabr. Eleut.* i. 429. 34. *Payk. fn.* 2. 74 28.

*Panz. fn.* 78. f. 6. *Marth. Ent. Br.* i. 1825  
27. *Schönh. Lyon.* 2. 262. 37.

Var. b, pallidior; futura elytrorum sola obscuriori. *Payk. Schönh. I. c. var. b.*

*Chrysomela olivacea.* *Marsh. Ent. Br.* i. 1816  
26.

Var. c, pallida, elytrorum futura coeruleo-

*Chrysomela flavicans.* *Fabr. Eleut.* i. 429. 33.

*Chrys. Ceraf. Linn. syl. 2. 588. 13?*

Habitat in foliis Pruni Padif., apud nos rati-

lius. Dom de Paykull.  
  
Descr. Miner.; Chr. Polygoni fore brachior; magis convexa. Caput rotundatum, testaceum, nitidum, sat crebre punctatum; vertice maculis duabus fuscis; saepe sub-thoracis margine occultatis, multi oblongi, brupnei. Antennæ thorace longioræ; pale testaceæ, extrosum crassiores, fuscae. Thorax brevissimus, transversus, apice late, sed non profunde emarginatus, interibus parum rotundatus, anguste marginatus, basi sub sinuatus, supra valde convexus; rufo-testaceus, nitidus, in disco subtilissime versus latera evidenter punctulatus. Scutellum rotundatum, fulco-piceum, lœve. Elytra thorace param latiora; sed quadruplo longiora & ultra; supra valde convexa, plerumque pallidius testacea, interdum cinerascenti-olivacea, nitida, sat profunde

*Inj. Svec. T. I. P. III.*

Hh

part.

in praecedenti omnino, in a, & b, supra rufo-testaceo, sub-nitidus, immaculatus, in dilco subtilissime versus latera profudius punctatus. Scutellum ut in priori. Elytrorum forma etiam eadem, supra vade convexa, subtijiter punctato-striata, interstitiis confertissime punctulatis, tota rufo-testacea. Tarsus subitus in medio niger, lateribus late rufis; pectus & abdomen nigra, nitida, crebre punctata, ani margine rufescente. Pedes mediocre, toti nigri, structura ut in prioribus.

Var. b, similissima a, sed prope basin elytrorum maculae duæ aut tres nigrae, una oblonga juxta humerum, altera ei opposita, rotundata, versus saturam, & interdum tertia, minor, intra marginem, ante medium.

Var. c, versus basin thoracis gerit puncta duo nigra, libera, paria, aut parva, aut magis dilatata, & sœpissime inter illos tertium, oblongum, interdum cum lateralibus confluens; cætera ut in a, omnia.

Var. d, quoad thoracis signaturas ut var c, e. lytra vero ut in b, basi nigro-maculata; præter maculas tres in var. b, descriptas, haec varietas sœpe gerit quartam, oblongam, interne versus saturam, pone medium.

Var. e, ad basin thoracis gerit maculam magnam, sub-emarginatam, nigram, quasi e punctis varietatum c, & d, valde dilatatis, confluentibus, conflatam; cætera ut in a.

Var. f, quoad thoracem ut var. e, quoad elytra vero ut var. b, d.

Var. g, quoad thoracem ut var. e, & f; in elytris maculae 5 distinctæ, nigrae; quatuor priores ut in var. d, descriptæ, quintum parvum, intra marginem, versus apicem.

Var. h, ut var. g, sed maculae elytrorum valde dilatatae, vario modo confluentes,

Var.

Var. i, differt macula thoracis majori, apicem sere attingente, ut modo latera, anterius latius ferruginea; elytrorum discus totus niger, limbo laterali inæqualiter, baseos anguste, & pars antica superiore rufo-testaceis.

Var. k, thorace toto nigro, & elytris rufis immaculatis, differt, sed vix Chrys. lurida Linn. & Fabr. Sub hoc nomine aliam, colore simillimam, e Germania obtinui, vere distinctam, thoracis lateribus incrassatis, elytrorum striis multo profundioribus, interstitiis laevissimis.

Var. l, tota nigra, nitida, antennarum basi & noque rufescens, exceptis; cæterum simillima, & sepe cum varietatibus antea descriptis copulata occurrit. *Chrysl. hæmorrhoidalis*, Linn. Fn. Sv. 503, secundum descriptionem, vix hoc pertinet.

31. *C. marginata*: oblongo-ovata, supra fuscocastanea, thoracis lateribus incrassatis, elytrorum margine exteriori flavescente, aliis rufescens.

Linn. sys. 2. 591. 39. Fn. Sv. 530. Fabr. E. leut. I. 441. 116. De Gér. Ins. 5. 303. 14. Payk. fn. 2. 71. 24. Panz. fn. 16. t. II. Schönh. synon. 2. 263. 125.

Var. b, Elytris castaneis, vix vel parum cæneo-micantibus, margine pallido.

Var. c, capite, thorace corporeque subtus piceis aut rufo-brunneis, nitidis, ore, antennis, elytris pedibusque testaceis.

Habitat in pratis & agris aridis, præsertim in *Scabiosa arvensi*, passim; var. c in Gott-

*Gottlandia*, a Dom. Odhner capta, &  
Dom. Schönherr communicata.

Descr. Magnitudo & fere statura præcedentis,  
sed paullo minus convexa; variat etiam dimidio mi-  
nor. Caput breve, rotundatum, fusco-æneum, nitidum,  
subtilissime, parce punctulatum, ore oculisque  
nigris; Antennæ thorace longiores, basi rufo-piceæ,  
extrorsum paullo crassiores, nigrae. Thorax brevis,  
transversus, anterius paullo angustior, ibique late  
& sat profunde emarginatus, lateribus incrassatus,  
anguste marginatus, basi sinuatus, supra modice con-  
vexus, fusco-æneus, nitidus, in disceo subtilissime,  
obsolete punctulatus, versus latera longitudinaliter  
impressus, impressione profundius punctata. Scutel-  
lum oblongo-triangulare, virescenti-æneum, nitidum,  
læve. Elytra antice thorace parum latiora,  
pone basin dilatata, thorace quintuplo longiora,  
su-  
pra modice convexa, fusco-virescenti-ænea, parum  
nitida, margine laterali toto late luteo seu flavo-ruf-  
fescente; striæ elytrorum punctatae, tenues, minus  
regulares, per paria non nihil approximatæ, intersti-  
tis hinc illinc vase punctulatis. Alæ pallide rufe-  
scentes. Corpus subtas nigrum vel nigro-virescens,  
magis nitidum, vix punctulatum, ani margine livido.  
Pedes mediocres, nigri, nitidi, tarsis piceis,

Var. b, differt tantum elytrorum colore pallidiori,  
castaneo, vel fulco-testaceo, interdum æneo-  
micante, margine semper pallidiori.

Var. c, adhuc dilutior, ut in diagnosi indica-  
tum, forte nuper exclusa & immatura.

g2. C. analis: oblongo-ovata, nigra, thora-  
ce lateribus non incrassato, disco levissi-  
mo, elytris obscurioribus, margine latera-  
li rufo, alis albidis. Linn.

*Linn. Jyst. 2. 592. 42. Fabr. Eleut. 1. 442. 48.*

*Payk. fn. 2. 72. 25. Panz. fn. 16. In. 13.  
Schönh. synon. 2. 263. 127.*

Var. b, capite thoraceque nigro-aeneis, nitidissimis, elytris obscurioribus, sub-violaceis, subtiliter punctato-striatis, margine rufo. Payk. Schönh. loc. cit. var. b.

*Chrysom. Sthach. Fabr. Eleut. 1. 441. 117.*

Var. t, capite thoraceque cœruleo-violaceis, nitidissimis, elytris rubro-violaceis obscurioribus, margine rufo. Schönh. l. c. var. t.

*Chrysom. Sthach. Panz. fn. 16. f. 12.*

*Chrysom. lomata. Herbst. Archiv. 4. 54. 20.  
tab. 23. f. 3.*

Habitat in aridis, sub lapidibus, non infrequens.

Descr. Statura præcedentis, sed duplo minor & ultra. Caput rotundatum, nigrum, nitidissimum, lœve, ore piceo. Antennæ thorace multo longiores, nigrae, extrorsum crassiores, articulis duebus baseos ferrugineis. Thoracis structura ut in præcedenti omnino, supra parum convexus, niger, nitidissimus, politus, in disco lœvissimus, versus latera punctatus, sed non impressus, quare latera non incrassata apparent; intra marginem utrinque, saepè, non vero semper, punctum majuscum, impressum. Scutellum triangulare, nigrum, nitidissimum, lœve. Elytrorum forma ut in priori, supra nigra, interdum fusca, aeneo-micantia, obscuriora, subtiliter & minus ordinato punctato-striata, interstitiis etiam hic illuc vagè pun-

punctulatis; margo lateralis totus late rufus. Aliae  
cineres albidae. Corpus subtilis nigrum, nitidum,  
læve, ani. marginæ fulco-testaceo. Pedes mediocres,  
nigr., nitidi.

Var. b, & c, colore tantum differunt, aut nigro.  
æneo, aut cœruleo-virescente, aut violaceo, nitidissi-  
mo; plerumque etiam magnitudine minores; forte  
maculi, sæpius in copula cum a, capti.

33. C. aucta: ovata, convexa, supra cœru-  
lea vel cœruleo-virescens, elytrorum mar-  
gine rufo, capite thoraceque confertissi-  
me punctatis.

*Fabr. Eleut.* l. 442. n. 119. *Payk. fn.* 2. 72. 26.

*Panz.* fn. 16. f. 14. *Schénh. synon.* 2. 264.  
128.

Var. b, Elytrorum margine concolor.

*Chrys. glabra.* *Herb. Archiv.* 4. 60. 45.

Habitat in pratis humidis, non infrequens;  
var. b, raro occurrit.

Descr. Parva, Chr. Polygoni duplo minor, bre-  
viter ovata, obtusa, convexa; aut cœrulea, aut cya-  
nea, aut cœruleo-virescens. Caput retrœctum, ro-  
tundatum, cœruleum, fronte inæquali, creberrime,  
profunde punctata. Antennæ thorace longiores, to-  
tæ nigrae, extrosrum multo crassiores. Thorax bre-  
vis, transversus, anterius fere latior, ibique late &  
profunde emarginatus, lateribus ante medium rotun-  
dato-dilatatus, anguste marginatus, basi sinuatus,  
supra modice convexus, cœruleus, confertissime,  
profunde punctatus, præsertim versus latera. Scu-  
tellum rotundatum, cœruleum, læve. Elytra tho-  
racis basi latiora, & illo quadruplo longiora, supra  
valde

valde convexa, cœrulea, magis nitida, regulariter punctato-striata, interstitiis levibus; margo lateralis totus late rufo-testaceus, apice futuræ tinctum, cœruleo.. Corpus subitus nigrum, vel nigro-sanguivirescens, confertissime punctulatum. Pedes mediores, nigro-cœruleentes, femoribus nitidis.

Var. b, omni puncto similima, modo margo elytrorum disco concolor, nigro-cœruleens vel virescens.

34. *C. marginella*: oblonga, supra cœrulea vel cœruleo-virescens, thoracis elytrorumque lateribus late luteis.

Linn. syl. 2. 591. 40. Fn. Sv. 531. Fabr. Eleut. 1. 442, 122. Payk. fn. 2. 73. 27. Paus. fn. 16. f. 15. Schönh. Synon. 2. 264. 330.

*Chrysom. marginella ranunculi*. De Geer. Ins. 5. 394. 45.

Var. b, Vitta abbreviata lutea in apice elytrorum, juxta futuram, cum flavedine marginis connexa. Schönh. l. c. var. b.

*Chrysom. Hannoveriana*. Herbst. Arch. 4. 342. 22. tab. 23. f. 10.

Var. c, vitta eadem abrupta, nec cum flavedine marginis connexa. Schönh. loc. cit. var. c.

*Chrysom. Potentillæ*. Herbst. Arch. 4. 55. 23. tab. 23. f. 11.

Var. d, vitta eadem contigua, versus basin elytrorum extorsum flexa. Payk. 1 c. var. b. Schönh. var. d. Chrys.

*Chrys. Hannoverana.* Fabr. *Elsut.* I. 443. 123.  
Panz. fn. 16. f. 16.

*Chrys. Ranunculi.* Herbst. *Arch.* 4. 55. 24. tab.  
23. f. 12.

Habitat in pratis humidis, præsertim in Cal-  
tha palustri, Ranunculis, frequens; var.  
c, & d, parcus occurunt.

Descr. Longitudo C. Polygoni, sed angustior,  
præsertim a, qui forte mas; var. b, seu femina;  
crassior, magis ovata. Caput sub triangulate, ver-  
sus os angustatum, nigro-ceruleo-scapulatum; crebre &  
sat profunde punctatum, supra os impressum. An-  
tennæ thorace longiores, extrorsum multo crassi-  
ores, totæ nigrae. Thorax transversim quadrangulus,  
antice late, sed non profunde emarginatus, lateri-  
bus sub-increvatis, anguste marginatus; basi trun-  
catus, supra modice convexus, undique crebre pun-  
ctatus, in medio longitudinaliter coeruleus, nitidus,  
lateralibus supra & subtus late luteis. Scutellum ro-  
tundatum, coeruleum, nitidum, lœve. Elytra tho-  
race latiora, & fere quintuplo longiora, supra mo-  
dice convexa, coerulea, nitida, regulariter punctato-  
fasciata, intersticiis lœvibus; margo lateralis totus  
late luteus. Pectus & abdomen nigro-ceruleo-  
scantia, pectore crebre & sat profunde, ventre parcus  
& subtilius punctatis. Pedes longiusculi, nigro-co-  
ruleentes.

Var. b, paullo major, præsertim crassior, forte  
femina; differt præterea vitta abbreviata lutea in a-  
pice elytorum, juxta suturam, cum margine flavo  
connexa.

In var. c, vitta eadem a margine ab-rupta, &  
præterea saepe versus basin elytorum exterius, li-  
neola alia abbreviata, lutea;

In var. d, vitta illa integra, basin ~~attingens~~, & ante medium extorsum arcuata; propter staturam crassiorem, varietates omnes ad sexum feminineum pertinere videntur.

35. C. vitellinæ: oblongo-ovata, parum convexa, viridi-ænea, nitida, elytris tenui punctato-striatis, basi plicatis, ansi margine rufescente.

Linn. syst. 2. 589. 23. Fn. Sv. 519. De Gér. Ins. 5. 323. 27. Marsh. Ent. Br. 1. 180. 23. Schönh. synon 2. 266. 138.

*Galleruca vitellinæ.* Fabr. Eleut. i. 487. 49. Payk. fn. 2. 94. 12. Panz. fn. 44. f. 16.

Var. b, corpore supra cupreо aut obscurius olivaceo-æneo.

Var. c, corpore supra nigro, subfus nigrae æneo. Payk. Schönh. loc. cit. var. c.

Var. d, cœrulea, nitida, plerumque dimidio major. Fabr. Payk. Schönh. l. c. var. b.

*Chrys. vulgatissima.* Linn. syst. 2. 589. 22. Fn. Sv. 517. Marsh. Ent. Br. 1. 179. 22.

*Chrys. cœrulea Betulæ.* De Gér. Ins. 5. 317. 23.

*Galleruca Betulæ.* Panz. fn. 102. f. 4.

Habitat in Salicibus, Populo, Betula; ubique vulgatissima; folia exedens; var. c, parcius occurrit.

Descri-

Fn. Svec. T. I. P. III. II

Deinceps, Statura oblonga praecedentis, sed plurimumque paulo major. Caput sub-triangulare, versus os angustatum, viridi-aeneum, nitidum, sat crebre punctulatum, oculis prominulis, brunneis. Antennæ thorace multo longiores, basi sub-ferrugineæ, extrorsum paulo crassiores, nigrae. Thorax brevis, transversus, antice late, sed parum profunde emarginatus, lateribus ante medium rotundato-dilatatus; anguste marginatus, basi sub-truncatus, supra modice convexus, viridi-aeneus, nitidus, in disco subtilius, versus latera profundius, crebre punctulatus. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, levé. Elytra thorace latiora, & illo quintuplo longiora, supra parum convexa, viridi-aenea, nitida, punctis parvis, coarctatis, in disco interiori lat regulariter, versus latera magis confusè striatis. Corpus subitus obscurius virescenti-aeneum, vix punctulatum, amo plerumque, non vero semper, ferrugineo-marginato. Pedes mediocres, viridi-aenei, tarsis fusco-spongiosis.

Var. b, differt tantum colore paginæ superioris, aut saturatius cùpreo, aut olivaceo-aeneo.

Var. c, supra tota nigra, subtus nigro-coerulea fuscens.

Var. d, plerumque dimidio major, tota saturatae coerulea, interdum virescenti-micans, cæterum omni punto conveniens, ut vix specie distincta.

### H E L O D E S.

*Palpi breves, medio crassiores; maxillares vix maxillarum longitudine, haud prominulae; articulo ultimo fere omnium breviter ob-conico. Labium ad basin sub-angustius, ad apicem rotundato-dilatato-membranaceum. Antennæ arti-*

*articulis 5 ultimis, clavam elongatam, fere componentibus; clavæ hujus articulis 4 primis semi-globoſis.*

*Corpus elongatum, sub-lineare, latitudine sa-tem triple longius, depresso. Thorax qua-dratus.* Latreille.

- i. H. Phellandrii nigro-ænea, nitida, tho-racis margine lateralī ſinuato, femorum bafi tibiisque flavis, elytris punctato-stria-tis, flavis, futura tota vittaque media æ-neis.

Fabr. Eleut. i. 469. i. Payk. fn. 2. 84. n.  
Schönh. Synon. 2. 277. 1.

Chryſ. Phellandrii. Linn. ſyl. 2. 601. iii. Fm-Sv. 569. De Geer Inf. 5. 324. 28. tab. 9. fig. 34.

Praſocuris Phellandrii. Latr. Gen. Inf. 3. 59. n.

Crioceris Phellandrii. Thunb. Nov. Att. Upf. 5. III. 42. Panz. fn. 83. f. 9. Crit. Rev. 1. 89.

Habitat in plantis aquaticis; præfertim Phel-landrio, frequens.

Descr. Chryſom. marginella multo longior, sed anguſtior, cæterum ejus var. d, facie ſimilis. Ca-pit porrectum, anterijs anguſtatum, nigro-æneum vel virescens, nitidum, crebre punctatum, frōte imprefia; oculi magni, oblongi; brunnei. Antennæ vix thorace longiores, articulo primo magno, cla-vato; 2-6 anguſtis, nodofis, his omnibus nigro-vi-reſcentibus; nitidis; ultimis quinque crassioribus, ni-

gro-fuscis, pubescentibus, opacis. Thorax sub-quadratus, apice parum emarginatus, lateribus fere rectis, tenue marginatis; basi truncatus, angulis sub-prominulis; supra parum convexus, crebre punctatus, nitidus, in medio longitudinaliter nigro-zeneus, lateribus late, sinuatim flavis. Scutellum mediocre, postice rotundatum, nigro-virescens, nitidum, vix punctulatum. Elytra thorace paulo latiora, & plus triplo longiora, sub-linearia, supra modice convexa, regulariter & sat profunde punctato-striata; intersticiis sub-lævibus; flava, futura tota, antrorsum latius, & in singulo elytro vitta lata media, ante apicem abbreviata, nigro-zeneis, vel virecentibus. Corpus subtus nigro virescens, creberrime punctulatum, thoracis lateribus late, anique margine luteis. Pedes breviusculi validi, femoribus basi luteis; tarsis crassiusculis nigro-virescentibus;

2. H Beccabungæ: cœrulea vel sub-virescens, nitida, ano rufescente, elytris punctato-striatis, striis regularibus, rectis.

*Payk. fn. 3. add. 451. 2.*

*Chrysom. Beccabunga. Illig. Schneid. Mag. 5.*

*600. 7. Pant. fn. 25. f. II. Crit. Rev. I.*

*75. Marsh. Ent. Br. I. 186. 39.*

*Helodes violacea Fabr. Eleut. I. 470. 3. Schönh.*  
*synon. 2. 278. 2.*

Habitat in Veronica Beccabunga & Anagallide, in Svecia Australi, rarius.

Deser. Structura omnino precedentis, sed plurimque minor; etiam similis Chrys. Vitellinae var. d, (C. vulgarissima Linn.) sed multo angustior, thorax longior, sub-quadratus, antice fere integer. & striæ

striæ elytrorum regulares, adeoque abunde distinctæ, ut monstravit Dom. Prof. Illiger loc. cit. Capit quoad formam ut in præcedenti, coeruleum, nitidum, crebre & sat profunde punctatum, ore piceo; oculi oblongi, brunnei. Antennæ thorace paullo longiores, structuræ omnino ut in priori, articulis 6 inferioribus nigro-coeruleis, ultimis quinque majoribus, nigro fuscis, tenui pubescentibus. Thorax sub-quadratus, vel longitudine parum latior, antice vix emarginatus, lateribus sub rectis, anguste marginatis; basi truncatus, angulis sub-prominulis; supra parum convexus, sub inæqualis, crebre & sat profunde punctatus, totus coeruleus, nitidus, interdum coeruleo-virescens. Scutellum mediocre, rotundatum, coeruleum, nitidum, vix punctulatum. Elytra thorace paullo latiora, & fere triplo longiora, supra modice convexa, coerulea, interdum virescentia, nitida, regulariter & concinne punctato-striata, striis rectis, interstitiis subtilissime coriaceis. Corpus subtus coeruleo-subvirescens, creberrime punctulatum, ani lateribus rufo-testaceis. Pedes breviusculi, validi, coeruleo-virescentes, tarsis crassiusculis, subtus griseo-spongiosis.

#### Subdivisione 4:ta Gallerucaideæ.

Antennæ inter oculos insertæ, saepè approximatae, filiformes, aut sensim extrorsum paullo crassiores, articulis sub-cylindricis. Palpi medio crassiores, ad apicem conico-acuminati. Maxillæ bifidæ, lacinias sub-æque longis, externa graciliori, sub-lineari, interna sub-quadrata.

#### G A L L E R U C A.

*Instrumenta Cibaria & Antennæ ut in dia-  
gnosi sub-divisionis indicatum. Caput par-*

vum, semi-retractum, versus os angustatum.  
*Thorax brevis transversus, s̄epissime inaequalis, impressus. Elytra magna, ovata. Femora posticia simplicia, non saltatoria.*

Sect. 1:a, Antennarum articulo secundo dimidio aut ultra breviori tertio.

**G. Tanaceti:** nigra, immaculata, supra confertissime, profunde rugoso-punctata, thorace inaequali lateribus sinuato, elytris obsolete elevato-lineatis.

*Tabr. Eleut. 1. 481. 16. Latr. Gen. Inf. 3. 61. 1. Payk. fn. 2. 86. 1. Panz. fn. 102. f. 2. Schönh. Jynon. 2. 290. 19.*

**Chrysom. Tanaceti.** Linn. syk. 2. 587. 5. Fa. Sv. 507. If. Gottl. 270. De Gér. Inf. 5. 299. 4. tab. 8. f. 27.

Var. b, thorace elytrisque griseis.

Habitat in pratis & pascuis apricis, ubique frequens, tarda & ignava, valde; var. b, raro occurrit.

Deser. Major in hoc genere, praesertim feminis, que cum ovis gravida, valde intumescit. Caput rotundatum, convexum, nigrum, sub-nitidum, creberime & sat profunde punctatum, fronte obsolete canaliculata; os cipereo-pubescentis, oculi laterales brunnei, parum prominuli. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassiusculæ, nigræ, apice pubescentes, articulo primo magno, ob-conico; secundo parvo nodo; 3-10 tub-obconicis, exterioribus gradatim paullo brevioribus; ultimo sub-conico. Thorax brevissimus, transversum quadrangulus, ante-

nte parum emarginatus, angulis prominulis, lateribus ante medium rotundato-dilatatus, juxta apicem & versus basin sinuato-emarginatus, margine laterali elevato, reflexo, præfertim antice; basi trifinatus, supra parum convexus, totus niger, parum nitidus, inæqualis, vel hinc illinc, obsolete impressus, punctis majusculis, saepe confluentibus, creberrime obsitus. Scutellum rotundatum, nigrum, magis nitidum, obsoletius punctatum. Elytra magna, thorace multo latiora, & pone medium adhuc magis dilatata, thorace sextuplo longiora, apice obtuse rotundata, supra valde convexa, tota nigra sub-nitida, punctis majusculis, sat profundis, vagis, creberrime adspersa, quoram interstitia rugulas retiformes constiuant; margo lateralis valde reflexus, pæsertim anterius; interdum in singulo elytro, observantur lineæ quinque longitudinales elevatae, quarum, suturae proxima tenuis, obsoleta, reliquæ intra apicem per paria coeuntes, secunda nempe cum quinta, & tertia cum quarta; saepissime tamen omnes valde obsoletæ, vix observandæ. Alæ obscure fuscæ. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtilius & obsolete punctatum, tende pubescens. Pedes longiusculi, validi, nigri, femoribus nitidis, tibiis ciliato-scabris.

Var. b, differt tantum thorace elytrisque griseis, adeoque sequenti simillima, elytrorum lineis elevatis magis obsoletis, unice distinguenda.

2. *G. rustica*: nigra, supra confertissime, profunde rugoso-punctata, thorace lateribus sinuato, elytrisque griseis, hijs lineis elevatis evidentioribus.

*Eabr. Eleut.* 1. 48t. 15. *Payk. fn.* 2. 87. 3.  
*Panz.* 14. 102. f. 1. *Schönh. Fynom.* 2. 290. 17.

*Chrysom. rufica.* Schall. Abt. Hall. I. 274.

Habitat in Svecia Australis rarius. Dom.  
de Paykull.

Descr. Majoribus praecedentis speciei individuis plerumque adhuc major, & color thoracis elytrorumque griseus, ut in ejus var. b; lineæ elevatæ elytrorum eodem numero ac situ, ut apud præcedentem, descriptæ, semper multo evidenteriores, magis elevatæ, nitidæ; caeterum formatio partium, punctura & omnia, quoad minimum usque punctum simillima; an igitur vere distincta species, ut contendit Dom. Schaller, loc. cit.?

Obs. Varietas, a Dom. Payk. l. c. memorata: „Elytrorum lineis elevatis interruptis,“ que a Dom. Illiger Mag. I. 423. 13. & Schönherr Synon. 2. 290. 18. ut distincta Species, sub nomine G. interrupta, numeratur, mihi plane ignota, nec Sveciae incolam esse credo.

3. *G. Capreæ*: oblongo-ovata, nigra, supra glabra, grisea, punctatissima, capite maculisque thoracis nigris, antennis longioribus, inferne, tibiisque griseo-variis.

Fabr. Eleut. I. 487. 46. Payk. fn. 2. 88. 4.

Panz. fn. 102. f. 7. Schönh. Synon. 2. 297. 57.

*Chrysom. Capreæ.* Linn. syst. 2. 600. 180. Fn. Sv. 566.

Var. b, thorace antennisque fere totis nigris, elytris fusco-brunneis. Payk. Schönh. loc. cit. var. b.

Habi-

Habitat in Salice cinerea, aliisque, frequen-  
tissima, folia misere devastans.

Descr. Media inter nostras hujus generis. Caput parvum, nigrum, crebre & sat profunde punctatum, fronte inaequali, canaliculata; oculi magni, prominuli, nigro brunnei. Antennae filiformes, di-midio corpore multo longiores, articulo primo magno, crassio, obconico, basi nigro, apice griseo; secundo parvo, toto griseo, sequentibus sub-obconicis, exterioribus gradatim brevioribus, tertio quartoque basi griseis, reliquis totis nigris. Thorax brevis, transversus, antice latior vix emarginatus, lateribus anguste marginatus, in medio rotundato-dilatatus, basi fere triangularis, etiam anguste marginatus, supra parum convexus, inaequalis, rude rugoso-punctatus, glaber, griseus, maculis tribus nigris, media ob-triangulari, antice latiori, lateralibus difformibus, transversis. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, sublaeve. Elytra thoracis basi latiora, humeris prominulis, & illo fere sextuplo longiora, supra convexa, grisea, subnitida, glabra, confertissime vague punctata, sutura calloque humerali plerumque brunneis. Thorax & totum corpus subtus nigrum, subtiliter punctulatum, tenue pubescens. Pedes longiusculi, validi, femoribus nigris, posticis crassioribus, sub arcuatis; tibiis basi griseis, extrosum fusciscentibus; tarolis nigro-fuscis.

Var. b, colore obscuriori tantum differt; Antennae fere totae nigrae; maculae nigrae thoracis dilatatae, confluentes, discum fere totum occupant; elytra fusco-brunnes; tibiæ tantum anteriores basi fusco-griseæ, extus nigrae.

4. G. Sanguinea: ovata, supra glabra, rufa, confertissime profunde punctata, sub-

Il 5 tus

*tus nigra*, a<sup>o</sup> pedibusque rufis, antennis  
brevioribus, rufescentibus, apice fuscis.

Fabr. Eleut. I. 488. 54. Payk. fn. 2. 94. II.  
Schönh. synon. 2. 299. 69.

*Crioceris sanguinea*, Ross. Fn. Etr. I. 105. 267.

Var. b, Elytro singulo lineolis duabus ab-  
breviatis nigris. Payk. Ross. Schönh. loc.  
cit. var. b. Panz. fn. 102. f. 8.

*Crioceris Crataegi*. Marsh. Ent. Br. I. 228. 23.

Habitat in Syecia Australi carius. Dom. &  
Paykull.

Descr. Præcedenti similis & affinis, sed paullo  
brevior, aliter colorata, antennis brevioribus, &c.  
distincta. Caput parvum, rufum, creberrime rugoso-  
punctatum, fronte sat profunde canaliculata; oculi  
prominuli, nigro-brunnei. Antennæ vix dimidio cor-  
pore longiores, cæterum structura ut in priori, bai-  
rusæ, articulis apice infuscatis, extrosum nigro-  
fuscæ. Thorax adhuc brevior quam in præcedente,  
cæterum similiter constructus, totus rufus, immacu-  
latus, supra parum convexus, creberrime punctatus,  
in medio obsoletæ canaliculatus, & versus latera  
utrinque fovea lata impressus. Scutellum triangula-  
re, piceo-rufum, sub-læve. Elytra thorace multo  
latiora, humeris prominulis, & illo quintuplo le-  
giora, supra convexa, tota rufa, glabra, confertissi-  
mæ & adhuc profundius quam in præcedenti, rugo-  
so-punctata. Pectus & abdomen nigra, subtiliter  
punctata, tenue pubescentia, a<sup>o</sup> late rufo. Pedes  
mediocres, toti pallidius rufi.

Var. b, differt tantum, elytro singulo lineolis  
duabus abbreviatis nigris, una ante medium, inte-  
rior

qior, brevior, altera intra medium marginis, longior,  
utrinque attenuata.

Obs. Color paginæ superioris, pedum & ani,  
in vivo Insecto lâete sanguineus, post mortem dilu-  
tias rufus.

5. G. Viburni: ovata, convexa, flavescenti-grisea, holosericeo-pubescentia, subtilissime coriacea, macula verticis, lineis tribus thoracis calloque humerali elytrorum nigris.

*Payk. fn. 2. 89. 5. Schönh. synon. 2. 296. 55.  
Crioceris Viburni Marsh. Ent. Br. 1. 224. 13.*

Habitat in foliis Viburni opuli, passim copiose.

Descr. Statura G. Capreae, & mas illi magnitudine æqualis; femina plerumque dimidio, imo duplo major. Caput crassum, deflexum, griseo-flavescens, subtilissime coriaceum, tenue pubescens, vertice macula magna, rotundata nigra; mandibulæ apice nigrae; oculi brunnei, minus prominuli. Antennæ maris dimidio corpore longiores, feminæ breviores, in utroque nigrae, articulis basi testaceis. Thorax brevissimus, transversus, antice truncatus, lateribus ante medium angulato-dilatatus, vix marginatus; postice fere tri-sinuatus, supra convexus, griseo-flavescens, subtilissime coriaceus, tenue pubescens; in medio dorsi fovea longitudinalis obsoleta, ipæqualis, linea nigra inducta, & latera utrinque latius nigra. Scutellum nigrum, coriaceum, pubescens, apice truncatum vel sub-emarginatum. Elytra thorace multo latiora, humeris prominulis, & illo quintuplo longiora, supra convexa, griseo-brunnea, subtilissime coriacea, pube brevi, depresso-grisea.

grisea, holosericō-micante, obducta; callus humeralis valde elevatus, niger, nitidus. Corpus luctus griseo-flavescens, subtilissime punctulatum, tenue pubescens, segmentorum ventralium marginibus fuscis. Pedes mediocres, griseo-flavescentes, tenue pubescentes.

6. *G. Calmariensis*: oblongo-ovata, subdepressa, supra griseo-flavescens, crebrexime punctulata, thorace maculis tribus, elytris vitta intra-marginali lineolaque baseos nigris.

*Fabr. Eleut.* 1. 483. 52. *Latr. Gen. Inf.* 1.  
62. 2. *Schönh. Jymon.* 2. 298. 67.

*Crioceris Calmariensis.* *Thunb. Nov. Act. Upl.*  
5. 93. 10.

Var. b, lineola nigra baseos elytrorum deficiente. *Schönh. I. c. var. b.*

*Galleruca Calmariensis.* *Payk. fn.* 2. 90. 3.

Habitat in foliis Ulmi, in Svecia Australi,  
rarius.

Descr. Longitudo fere feminæ præcedentis, sed angustior, & multo minus convexa. Caput rotundatum, griseo-flavescens, crebre punctatum, fronte profunde canaliculata; in vertice macula triangularis nigra, opaca, & supra antennarum basin alia, didyma, nigra, nitida; oculi magni, prominuli, brunnei. Antennæ dimidio corpore fere longiores, supra longitudinaliter nigrae, subtus flavo-testaceæ. Thorax brevis, transversus, antice truncatus, lateribus rotundatus, evidenter marginatus, basi sub-trisinuatus, supra parum convexus, inæqualis, griseo-flavescens,

etc.

creberrime punctulatus, maculis tribus nigris, media longiori, lateralibus rotundatis, intra margines locaris. Scutellum rotundatum, flavescens, obsolete punctulatum. Elytra thorace multo latiora, & plus quam sextuplo longiora, supra parum convexa, griseo-flavescens, confertissime punctulata, tenui pubescens; in singulo vitta intra-marginalis nigra, posterius latior, e callo humerali inchoata, apicem non attingens, & in medio baseos lineola parva, tenuis, abbreviata, ejusdem coloris. Thorax subitus flavescens; pectus & abdomen nigra, obsolete punctulata, parce pubescentia, ventris limbo testaceo. Pedes longiusculi validi, flavo-grisei, femoribus externe punctato; tibiis interne lineola nigro fusca notatis; tibiae posticæ arcuatæ.

Var. b, differt tantum defectu lineolæ nigrae baseos elytrorum.

7. G. *Nymphææ*: oblongo-ovata, sub-depressa, nigra, thorace flavo, maculis tribus nigris, ore, elytrorum margine laterali pedibusque flavis, femoribus basi nigris; major.

*Fabr. Eleut.* 1. 486. 45. *Payk. fn.* 2. 92. 10.  
*Panz. fn.* 102. f. 6. *Schönh. synon.* 2.  
296. 56.

*Chrys. Nymphææ.* *Linn. siffl.* 2. 600. 99. *Enz.*  
*Sv.* 565. *De Géer Ins.* 5. 326. 31. *tab.* 10.  
*f.* 1-6.

*Crioceris Nymphææ.* *Marsh. Ent. Br.* 1. 224:  
12.

Var. b, thorace pallido, punctis tribus nigris, minutis, elytris cinereo-testaceis, margine pallido. Ha-

Habitat in foliis Nymphaeæ, in lacubus & flaviis passim.

Descr. Præcedente paullo major, præsertim li-  
tior, magis depressa. Caput rotundatum, flavo-te-  
staceum, subtilissime coriaceum, vertice fere toto ni-  
gro; frons antica inter antennas tenue canaliculata,  
labrum & mandibularum apices nigro-piceæ; oculi  
prominuli nigro brunnei. Antennæ longitudine dimi-  
dii corporis, nigræ, articulo primo apice, sequenti-  
bus 5, vel 6, basi, sub testaceis. Thôrax brevissi-  
mus, transversus, antice latior, truncatus, lateribus  
paullo anté medium angulato-dilatatus, anguste mar-  
ginatus, basi sub-trifinuatus, supra parum convexus,  
flavo-testaceus, valde inæqualis, in medio dorfi nem-  
pe foveolæ duæ irregulares, una pone alteram, &  
alia utrinque versus latera, magna, rotundata, pro-  
funde punctata; in medio dorfi præterea litura ob-  
longa, nigra, & versus marginem utrinque macula  
magna, rotundata, ejusdem coloris, marginem fere  
attingens. Scutellum sub-triangulare, apice rotun-  
datum, nigrum, subtilissime punctulatum. Elytra  
thoracis basi multo-latiora, humeris prominulis, &  
illo sextuplo longiora, apice ipso acuminata, supra  
depressa, in dorso medio fere impressa, nigra, opa-  
ca, crebre inæqualiter punctata, pilis minutissimis,  
depressis, cinereo-nitidis, crebre adspersa, margine  
laterali & apicis late flavescentibus. Thorax subtus  
lateribus flavus, medio niger; Pectus & abdomen  
nigra, opaca, subtilissime punctulata, tenui pubes-  
centia, uno late flavo-testaceo; Pedes longiusculi,  
flavo-testacei, femoribus basi plus minusve, gen-  
ibusque nigro-fuscis.

Var. b, colore pallidiori tantum differt; thorax  
fere totus supra pallide flavus, lituris nigris parvis,  
obsoletis; elytra cinereo-testacea, margine pallidio-  
ri; pedes fere toti pallidi; cæterum magnitudo &  
omnia ut in a.

g. G.

8. *G. Sagittariæ*: oblongo-ovata, parum convexa, nigra, thorace flavo, maculis tribus nigris, ore, elytrorum fusciorum margine, pedibusque flavescentibus, femoribus basi fuscis; minor.

Var. b, pallidior, thorace griseo-flavescente, maculis nigris obsoletis, elytris griseo-testaceis, margine pallidiori, femoribus basi parum infuscatis.

*Payk. fn. 2. 93. not. sub G. Nymphaeæ.*

Habitat in *Sagittaria Sagittifolia*, aliisque plantis aquaticis, passim.

Descr. Præcedenti quoad colores simillima, sed plus duplo minor, paullo magis convexa, præsertim in elytris, & ut mihi videtur, vere distincta. Caput quoad formam & colores ut in præcedenti omnino, sed paullo evidentius punctulatum, fronte profundiūs impressa. Antennæ ut in præcedenti. Thoracis structura eadem; etiam color & faveolæ, sed maculæ nigrae minores, sæpe obsoletæ, & punctura plerumque fortior. Scutellum brevius quam in priori, sub quadratum, apice truncatum, nigropiceum, punctulatum, tenuè pubescens. Elytra quoad puncturam & pubescenciam ut in priori, sed paullo breviora, apice minus acuminata, supra paullo magis convexa, nullatenus impressa, rarius nigricantia, plerumque fusca vel fuscoc-brunnea, margine laterali & apicis pallide; sutura etiam plerumque pallescit. Corpus subtus ut in præcedenti. Pedes plerumque griseo-pallidi, genubus tarsisque infuscatis, cæterum quoad structuram ut in priori.

Var. b. colore pallidiori tantum differt; thorax flavescentis, maculis fuscis minoribus, magis obsoletis;

tie; elytra grisea, interdum brunneo-testacea, margine semper pallidiori; pedes pallidiores, femorum basi genubusque parum infuscatis, interdum fere concoloribus.

9. *G. lineola*: oblongo-ovata, supra flavo-testacea, punctata, sericeo-pubescentia, vertice, lineola thoracis scutelloque nigra, subtus nigra, ano pedibusque flavo-testaceis.

*Fabr. Eleut.* 1. 486. 44. *Payk. fn.* 2. 90. 6.  
*Panz. fn.* 102. f. 5. *Schönh. Lyon.* 2. 296.  
53.

*Chrus. grisea* *Athi.* *De Gér. Inf.* 5. 325. 30.  
tab. 9. f. 36.

Var. b, Elytris vitta longitudinali fusca, indeterminata. *Payk. Schönh. l. c. var. b.*

Habitat in foliis Alni, Salicis, sat frequens.

Descr. Longitudo G. Viburni; sed angustior; minus convexa; mas fere duplo minor femina. Caput parvum, flavo-testaceum, subtiliter punctatum, fronte sat profunde canaliculata, vertice macula magna semi-circulari, nigra; mandibulæ apice piceæ; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, nigræ, articulis plerisque basi flavo-testaceis. Thorax brevis, transversus, antice paullo latior, vix emarginatus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, basi sub-sinuatus, supra perparum convexus, fere planus, in medio dorso longitudinaliter impressus, totus flavo-testaceus, parce, obsolete punctatus, macula canaliculiformi nigra in medio dorso notatus. Scutellum nigrum;

grum, pubescens, vix punctulatum, apice obtuse rotundatum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, & illo sextuplo longiora, supra modice convexa, disco testacea, evidenter, vase punctata, pube subtilissima, depressa, cinerea, certo situ holosericeo nigrante tecta, limbo toto, suturam tamen angustius, pallide flavo; callus humeralis elevatus, niger, vel nigro-fuscus. Thorax subtus flavescens; pectus & abdomen subitus nigra, subnitida, cinereo-pubescentia, vix punctulata, ano late flavescente. Pedes mediocres, toti flavo-testacei, Var. b, differt tantum vitta elytrorum lata, indeterminata intra-marginali nigro-fusca, que sepe maximum disci partem occupat.

10. *G. Lythri*; oblongo-ovata, supra testacea, profunde punctata, punctis sub-ocellatis, vertice, linea thoracis, scutelloque nigris; subitus nigra, ano pedibusque testaceis.

*Schönh. synon.* 2. 296. 54.

Var. b, Elytris vitta intra-marginali nigra, sat determinata, postice abbreviata. *Schönh.*

*I. c. var. b.*

*Chrysom Calmariehfs.* *Linn. syst.* 2. 600. 107.

*Cricoceris Calmariensis.* *Marth. Ent. br.* 2. 227.

*21.*

Var. c, tota pallida, antemnis extorsum maculaque verticis nigro-fuscis.

Habitat in Lythro Salicaria, aliisque planis;

*Ins. Susc.* T. I. P. III. Kk. Deser.

Descr. Præcedenti quoad structuram & colores simillima, sed plus duplo minor, respectu magnitudinis fortius punctata, præsertim in elytris, punctis sub ocellatis, &c. Media quasi inter G. lineolam & tenellam, sed posteriori plus duplo major, fortius punctata, &c. Caput parvum, rotundatum, testaceum, crebre punctulatum, fronte canaliculata, vertice macula semi-circulari nigra. Antennæ longitudine dimidii corporis, nigro-fuscæ, articulis tribus primis fere totis testaceis. Thoracis structura ut in præcedenti omnino, supra perparum convexus, testaceus, crebre & profunde punctatus, tenui pubescens, inæqualis, canalicula nempe media, longitudinali, nigro-inducta, & fovea profundiori, rotundata, utrinque impreffusa. Scutellum fusco-piceum, pubescens, punctulatum, spicæ sub-emarginatum. Elytrorum forma fere ut in priori, sed supra pallido magis convessa, & multo profundius, creberime punctata, punctis plerisque sub-ocellatis, seu punctulo centrali elevato notatis; tota testacea, limbo vix pallidiori; Callus humeralis elevatus, sed parum infuscatus. Thorax subtus pallide testaceus; pectus & abdomen nigra, sub-nitida, vix punctulata, pube cinerea, sericeo-micante, obducta, ano late pallide testaceo. Pedes mediocres, toti pallide testacei.

Var. b, differt macula thoracis nigra magis dilatata, & in elytris vitta nigra, intra-marginali, e callo humerali exeunte, posterius latiori, intra apicem definente, fatis determinata.

Var. c, tota pallidius testacea, etiam subtus, modo macula verticis & apex antennarum nigro-fusca; forte junior, nuper exclusa.

u. *G. tenella*: oblongo-ovata, convexa, subtus nigra, ano pedibusque pallidis, elytris

tris simpliciter punctatis testaceis; margine, thoraceque toto luteo flavis.

Fabr. Eleut. 1. 490. 62. Payk. fn. 2. 93. 10.  
Schönh. Lyon. 2. 301. 78.

*Chrysom. tenella.* Linn. syst. 2. 600. 102. Fn.  
Sy. 564.

Vari. in thorace lineola longitudinali, elytris vitta intra-marginali abbreviata, nigra.

*Galleruca tenella.* Panz. fn. 102. f. 9.

Habitat in pratis hirsutibus, ubique frequens.

Descr. Proxime praecedenti iterum plus duplo minor. Structura & tere coloribus simillima, sed viva saturatus flavus in thorace & margine, elytrorum, &c. Caput parvum, rotundatum, flavo-testaceum, crebre punctulatum, fronte canaliculata, vertice late nigro; oculi prominenti, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, bafi effaceæ, exterritorum nigrae. Thorax quoad structuram ut in praecedenti, supra perparum convexus, crebre & sat profunde punctatus, in medio canaliculatus, & utrinque foveæ rotunda impressus, totus flavus vel flavescenti-pallidus, plerumque immaculatus, interdum lineola fusca in canalicula dorsali notatus. Scutellum fulvo-piceum, punctulatum, structura ut in priori. Elytra thoracis bafi multo latiora, & illo quintuplo longiora, supra convexa, crebre, evidenter punctata, punctis simplicibus; in disco aut testacea, aut rufesceni-ferruginea, sub-nitida, margine laterali late reflexo, suturaque luteo flavis; Callus humeralis sub-elevatus, plerumque puncto fusco notatus. Corpus subtilius & pedes ut in praecedenti omnino.

Kk 2

Var.

tus, ante medium nonnihil rotundato dilatatus, basi media truncatus, angulis oblique prominulis; supra modice convexus, totus supra & infra luteo flavus, nitidissimus, vix punctulatus. Scutellum subtriangularis, nigrum, nitidum, luteo. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, & illo ferè sextuplo longiora, supra convexa, nigra, nitida, glabra, creberim, sed sparsissime & obsoletius punctulata. Alæ longæ, fulvescentes. Pectus & abdomen nigra, nitida, parce & obsolete punctulata. Pedes longiusculi, flavescentes, femoribus, præfertim posticis, basi nigricantibus.

Mas plerumque dimidio minor, antennis longitudine totius corporis, & ultra, articulo primo supra fusco; thorax paullo angustior quam in feminâ, cæterum simillimus.

**14. G. rufipes.** oblonga, nigra, nitida, glabra, antennarum basi pedibusque flavis, femoribus basi nigris.

*Crioceris flavipes.* Payk. Schönh. I. c. var. b.

*Crioceris rufipes.* Fabr. Eleut. I. 40. 54.

Panz. fn. 23. f. 5.

*Luperus.* Gouffr. Ins. I. 231. 2.

Mas: Antennis longitudine corporis.

*Ptinus longicornis.* Fabr. Eleut. I. 325. 4.

Illig. Mag. I. 387. 4.

Habitat in foliis Betulæ, alni, aliisque frequens.

Descr. Præcedenti ut ovum ovo simillima, & omni puncto conveniens, modo thorax totus supra &

& infra niger, nitidissimus; minime vero Sexu tantum differunt, ut autumat Dom. Geoffroi loc. cit. nam ex utraque Specie inveniuntur specimina anten-  
nis mediocribas, & alia antennis corporis longitu-  
dine vel ultra; millies quoque ambas species copi-  
latas vidi, sed ne unica vice nisi similes cum simili-  
bus, unde vero simillimum mihi videtur, distinctas  
esse species.

Obs. Plurimas Fabricii Criocerides ad Galleru-  
cas retulit Dom. Latreille, loc. citato, & quidem  
summo jure, ut mihi videtur.

**Sectio 2:da, antennarum articulis secundo  
& tertio brevioribus quarto.**

15. *G. Alni*: ovata, cœruleo-violacea, nitida; elytris rufescenti-violaceis, confertissime, vage punctulatis, antennis, tibiis ter-  
risque nigris.

*Fabr. Eleut.* 1. 483. 27. *Payk. fn.* 2. 87. 2.  
*Panz. fn.* 102 f. 3; *Schönh. synon.* 2. 292.  
30.

*Chrysom. Alni*. *Linn. syst.* 2. 587. 9. *Fn. Sv.*  
511. *De Gter Inf.* 5. 314. 21. *tab.* 9. f. 18.

Var. 4, corpore fere toto supra nigro.

Habitat in foliis Betule Alni, passim.

Descr. Statura ovata fere *G. Tanaceti*, & mac-  
sculis ejus magnitudine æqualis. Caput parvum,  
rotundatum, cœruleum, nitidum, crebre rugoso pun-  
ctatum, fronte profunde impressa, antrorsum canali-  
culata; oculi magni, brunnei, prominuli. Antennæ  
dimidio corpore paullo longiores, nigrae, articulo  
Kk 4. tertio.

F20

tertio vix longiori secundo, cæterum ut in prioribus; Thorax brevis, transversus, antice late, sed non profunde emarginatus, angulis prominulis, lateribus rotundatus, evidenter reflexo marginatus; basi rotundatus, supra convexus, coeruleo sub-violaceus, nitidus, creberime subtiliter punctulatus. Scutellum triangulare, nigro coerulescens, nitidum, laevissimum, politum. Elytra magna, antice thorace latiora, & ultra medium adhuc magis dilatata, thorace sextuplo longiora, supra valde convexa; violacea; rubro-mixta, nitida, consertissime subtiliter vage punctulata. Corpus subitus, nigro coeruleum, nitidum, parce punctatum. Pedes longiusculi, femoribus coeruleis, nitidis, tibiis tarsisque nigris, opacis, pubescentibus. Var. b. differt tantum colore paginæ superioris nigro, aut nigro sub-coerulecente; apex elytrorum tamen plerumque magis violaceo-nitens.

*Talus et perstata que exinde videtur.*

### H A L T I C A.

*Instrumenta cibaria & Antennæ ut in Galleruca. Femora postica incrassata; Saltatoria.*

*Obs. Secundum Regular Systematicas Cl. Fabricii, Halticæ non nisi in subdivisione sub genere præcedenti collocandæ es- sent, dum instrumenta Cibaria & Antenne non discrepant; sed ob commoditatem tironum, ut peculiare Genus, a plurisque Entomologis receptum, retinui, propter rationes a Dom. Prof. Illiger, in Mag. 1. p. 416, & Dom. Prof. Latreille, in Gen. Inf. 3. p. 63. adhibitas.*

*Select. n. Elytris vage punctatis.  
n. Hs fuscicornis: ovata, nigra, capite, thorace, pedibus antennarumque basi ru-*

fis,

fis, elytris cœruleo-virentibus, subtiliter,  
vage punctulatis.

*Ent. Heft. 2. 51. 28. Schönh. synon. 2. 306. 34.*

*Chrysom. fuscicornis. Linn. Synt. 2. 595. 66.*

*Crioceris fulvipes. Fabr. Eleut. 1. 463. 68.*

*Galleruca rufipes. Payk. fn. 2. 97. 14.*

*Chrysom. rufipes. De Gér. Inf. 5. 343. 47.  
tab. 10. f. 11.*

*Altica rufipes. Panz. fn. 21. f. 10.*

Habitat in Malvis aliisque plantis, apud  
nos rarius.

Descr. G. Oleracea paullo brevior, sed non angustior. Caput parvum, rufum, nitidum, vix vel obsoletissime punctulatum, ore piceo; oculi nigri, prominuli. Antennæ longitudine dimidii corporis, basi rufæ, extrosum paullo crassiores, nigrae. Thorax brevis, transversus, antice parum emarginatus, lateqibus rotundatus, evidenter marginatus; basi subtruncatus, angulis reflexis, acutis; supra satis convexus, æqualis, totus supra & infra rufus, nitidus, subtilissime, obsolete punctulatus. Scutellum subtriangulare, cœralescens, nitidum, lœve. Elytra antice thoracis medio paullo latiora, ultra medium magis dilatata, supra valde convexa, cœrulea, vel cœruleo-virescentia, nitida, creberrime subtiliter & obsoletius punctulata. Pectus & abdomen nigra, nitida, parce punctata. Pedes mediocres, toti rufi, nitidi, femoribus posticis modice incrassatis.

2. *H. oleracea: oblongo-ovata, convexa,  
cœruleo-virescentia, antennis nigris, tho-  
race postice transversim impresso.*

vel cœrulescens, vix punctulatum, fronte inæquali; oculi nigro-brunnei, modice prominuli. Antennæ dimidio corpore longiores, crassiusculæ, extrosum nigro-fuscæ, pubescentes, articulo primo apice & nonnullis insequentibus rufo-piceis. Thorax brevifimus, transversus, antice late sed parum profunde emarginatus, lateribus nonnihil rotundatus, evidenter marginatus, basi media etiam rotundatus, supra anterius transversum valde convexus, fere pulvinatus, nigro-cœrulescens, nitidissimus, vix vel subtilissime punctulatus; intra basin striga transversa, impressa, abbreviata, utrinque fovea profunda, sub-lunata, basin thoracis fere attingente, terminata. Scutellum parvum, triangulare, nigro cœrulescens, lœve. Elytra antice thorace latiora, humeris rotundatis, & ultra mediūm multo magis dilatata, rotundato-ovata, thorace vix quadruplo longiora, supra valde convexa, nigro-cœrulecentia, nitida, subtilissime & obsolete, pabulo tamen evidenter quam thorax, punctulata. Corpus subtus nigrum, parum cœrulecenti-micans, sat crebre, subtiliter punctulatum. Pedes breviusculi, nigri, femoribus nitidis, posticis modice incrassatis, parum cœrulecenti-micanibus.

4. *H. cœrulea*: ovata, supra cœrulea, nitida, antennarum basi pedibusque pallide testaceis, femoribus posticis apice fascis, thorace non impresso, elytris crebre, subtiliter punctulatis.

*Ent. Heft. 2. 55. 31. Schönh. Jynx. 2. 312. 69.*

*Galleruca cœrulea. Payk. fn. 2. 97. 15.*

*Chrysolom. flavipes. Herbst. Arch. 4. 61. 53.*

*Nar. b; supra cœruleo-virescens. Ent. Heft.*

*Schönh. var. b. Ali-*

*Altica Hyoscyami.* Panz. In. 21. f. 4.

Habitat in plantis & gramine, locis humentibus, apud nos ratis.

Descr. Magnitudo & fere statuta H. Helixines, sed magis convexa. Caput triangulare, coeruleum, nitidum, vix punctulatum; fronte convexa, inaequalis; oculi nigro-brunnei, inde proeminuli. Antennæ dimidiò corpore longiores, articulis 4 vel 5 baleos pallide testaceis, sequentibus gradatim crassioribus, nigro-fusciis. Thorax brevis, transversus, antice paullo latior, vix emarginatus, lateribus obliquis, evidenter marginatis, basi sub truncatus, supra modice convexus, totus cœruleus, nitidissimus, vix visibiliter punctulatus. Scutellum sub rotundatum, cœruleo-virescens, nitidum, lœve. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris rotundatis, ultra medium magis dilatata, thorace sextuplo longiora, apice obtuse rotundata, angulo suturali sub recto; supra modice convexa, tota cœrulea, nitida, crebre, subtiliter & obsoletis vage punctulata, interstitiis rugulosis, unde tenue eorundea apparent. Corpus subtruncatum, parum cœruleescens micans, obsolete punctulatum. Pedes longissimi, pallide testacei vel flavescentes, femoribus posticis apice nigricantibus.

Var. b, differt tantum colore paginae superioris cœruleo-virescente, præsertim in capite & thorace.

5. H. Euphorbiæ: ovata, nigra, nitida, supra æneo vel cœrulecenti-micans, antennarum basi pedibusque pallidis, thorace sub-lœvi, non impresso, elytris subtiliter punctulatis.

Ent. Heft. 2. 38. 34. Schönl. Synon. 2. 312. 71.

Crio-

*Ent. Heft. 2. 64. 39. Schönh. synon. 2. 313. 75.*

*Altica nigripes. Panz. fn. 21. f. 5. Crit. Rev.*

*I. 77.*

*Var. b, tota cœrulea vel cœruleo-virescens.*

*Chrysomela lens. Thunb. Act. Uppl. 4. 13. 22.*

*Habitat in plantis oleraceis, apud nos rarius; in Smolandia, Dom. Begeman; var. b, Upsaliæ, Dom. Prof. Thunberg.*

Descr. Statura oblonga, sub-depressa H. nemorum; sed plerumque dimidio minor. Caput triangulare, viridi æneum, sub-nitidum, crebre, subtilissime punctulatum, fronte inter antennas longitudinaliter sub-carinata; oculi majusculi, prominuli, brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, totæ nigrae, extrosum crassiores, pubescentes. Thorax latitudine mediæ paulo brevior, anterius nonnihil angustior, truncatus, angulis deflexis, compressis, unde magis angustatus appareat; lateribus rotundato-dilatatus, anguste marginatus, basi sub-bisinuatus, angulis obtusis; supra parum convexus, totus viridi-æneus, sub-nitidus, crebre & concinne, subtiliter punctulatus. Scutellum parvum, sub-transversum, viridi-cœrulescens, vix punctulatum. Elytra thorace multo latiora, & illo quintuplo longiora, apice obtuse rotundata, angulo suturali recto; supra parum convexa, viridi-cœrulescens, sub-nitida, confertissime & paullo fortius quam thorax, concinne punctata. Corpus subitus nigro, cœrulescens, crebre, obsoletius punctulatum. Pedes mediocres, nigri, femoribus param cœruleo-micantibus.

Var. b, differt tantum colore paginae superioris saturatius cœruleo vel violaceo; cæterum simillima.

B. H.

**H. atra**: oblongo-ovata; sub-depressa; nigra, sub-nitida; conseruissime; evidentius punctata, antennis hasi piceo, ferrugineis, thorace antice angustiori, elytris obtusis.

*Ent. Hett.* 2. 63. 38. *Schönh. Synop.* 2. 313. 74.

*Gallusca atra*. *Pugl. fm.* 2. 100. 19.

*Chrysom. punctularia*. *Marsch. Ent. Br.* n. 200. 73.

Habitat in pratis umbrosis, humeribus, passim.

Deter. Statua oblonga, sub-depressa, omnino praecedentia, cui valde affinis, sed tota saturateatra, multo profundijs punctata, praesertim ea Elytris. Caput triangulare, nigrum, crebre, subtiliter punctulatum, fronte inter antennas carinata, longitudinali elevata, nitida; quali prominelli, nigro-brunnei. Antennae dimidio corporeo paucis longiores, articulo primo magna, piceo; nonnullis in sequentiibus dilutius piceo, ferrugineis, reliquis gradatim crassioribus, nigris, tenui pubescentibus. Thorax latitudine medii fere duplo brevior, transversus, antice paulo angustior, truncatus, angulis deflexis, lateribus rotundato-dilatatus, tenui marginatus, basi vix sinuatus, angulis obtusis; supra parum convexus, saturate niger, sub nitidus, creberrime, evidenter punctatus. Scutellum breve, transversum, obtulatum, nigrum, sub-læve. Elytra thorace multo latiora, & illo fere sextuplo longiora, apice obtusa, angulo suturali sub-recta; supra parum convexa, tota nigra, sub-nitida, rarius nonnihil cerascenti-micantia, conseruissime, & adhuc fortius quam thorax punctata. Corpus subtus nigrum, magis nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes medios, nigri, semoribus, praesertim posticis, nitidis, farfis, fulcescentibus.

*Lytt. Sist. T. I. P. III. L. 9. H.*

*g. H. nigra edum: oblongo-ovata; sub-depressa, nigra, crebre punctata, elytis vita longitudinali integra sulphurea, attenuatum basi, tibiis tarassisque testaceis.*

*Ent. Hist. 2. 70. 41. Panz. fn. 21. f. 19.*

*Schönh. synon. 2. 313. 77.*

*Chrysomela nemorum. Linn. susc. 2. 595. 62.  
Fn. Sv. 543.*

*Crioceris nemorum. Fabr. Eleut. 1. 467. 89.*

*Galleruca nemorum. Payk. fn. 2. 98. 16.*

*Habitat in plantis, præsertim Tetradynamis, ubique vulgaris, & valde noxia.*

*Descript. Parsa, & magnitudine valde varians. Caput triangulare, nigrum, sub-nitidum, creberrime punctulatum, fronte inter antennas carinula longitudinali elevata, superne foveola impressa in duas divises; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ dimidiò corpore longiores, articulo primo magno, ob-conico, nigro-piceo; apice pallido; secundo & tertio ob-conicis; totis pallidis; reliquis nigris, in femina gradatim extorrisma crassioribus; in masculis quartus & quintus proxime præcedentibus, & præcipue sexto majoribus, crassioribus; sextus parvus; reliqui gradatim majores, ut in femina. Thorax latitudine multo brevior, basi apiceque sub-truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, evidenter marginatus, supra parum convexus; niger; plerumque virescens-micans; creberrime & profundius quam caput punctatus. Scutellum rotundatum, nigro-virescens, laxe, Elytra, thoracis basi multo latiora, & illo sexuplo longiora, supra modice convexa, nigro-virescentia, sub-nitida, creberrime & sat profunde punctata, callo humerali elevata; in medio*

*cujusvis*

enjusvis e'ytri vitta lata sulphurea seu pallide lutes, integra, latere interiori fere recta, externe in medio non nihil arcuata, apice intorsum flexa, apicem ipsum elytrorum non attingens. Corpus subtilissime, crebre punctulatum. Pedes mediocres, femoribus nigris, genubus anterioribus una cum tibiis tarsisque omnibus plerumque testaceis.

10. *H. flexuosa*: oblongo-ovata, subdepressa, nigra, crebre punctata, Elytris vitta longitudinali sinuata, luteo-testacea, antennarum basi genuibusque piceo-testaceis.

*Ent. Heft. 2. 71. 42. Schönh. synon. 2. 314. 79.*  
a, vitta elytrorum angustior, sub-integra, vel externe parum sinuata. *Ent. Heft. 2. Schönh. l. c. a.*

*Altica Nasturtii. Panz. fn. 21. f. 9. Crit. Rev. 1. 83.*

Var. b, Vitta elytrorum dilatata, in medio exteriori sinu brevi, semi-circulari, nigro, emarginata. *Ent. Heft. 2. Schönh. l. c. var. b.*

*Altica flexuosa. Panz. fn. 25. f. 12.*

Var. c, vitta elytrorum lata, externe sinu elongato emarginata. *Ent. Heft. 2. Schönh. l. c. var. c.*

*Altica flexuosa. Illig. Schneid. Mag. 5. 601. 8.*

Var. d, vitta elytrorum per sinum exteriorem dilatatum, aut fere abrupta, reman-

nente modo lineola angusta lutea; vel omnimode in maculas duas separatas divisa. Ent. Heft. Et Schönh. l. c. var. d. &

*Galleruca nemorum*. Payk. fn. 2. 98. 16. var. b.

Habitat in plantis & gramine non infrequens.

Descr. Præcedenti simillima & nimis affinis, magnitudine pari modo varians, forma & colore saturatiore vittæ elytrorum fere unice distincta. Structura partium & punctura omnino ut in priori, sed color magis saturate niger, vix virescens. Antennæ secundum sextum simili modo constructæ, sed articuli baseos plerumque obscuriores, piceæ. Pedes aut toti nigri, aut genua & basis tarsum tantum obscure testacea. Vitta elytrorum saturatius testacea, interdum rufo-tincta; in a fere integrâ, angustior quam in *H. nemorum*, externe vix vel perparum sinuata; ex hac varietate feminas tantum vidi, & in societate cum varietatibus sequentibus legi.

In var. b. & c, vitta elytrorum mox pone calatum humeralem, externe dilatata, dein versus medium iterum angustata, nigredine marginis neque in medio sinus introrsum emittente, aut breviorem, segni-circularem, ut in var. b, aut longius extensus, ut in c; pone medium vitta iterum extrorsum dilatata, spicè nonnihil inflexa, abbreviata, unde valde sinuata evadit; ad basin elytrorum vitta eadem plerumque versus scutellum inflexa, unde satura anterior angustius nigra.

In var. d, sinus medius nigredinis marginalis ita dilatatus, ut vitta lutea aut omnimode abrupta, & in maculas duas separatas divisa, aut maculae sita tantum stria tenui, angusta, conjunctæ; Specimina plerisque, quas vidi, hujus varietatis; masculina fuerunt.

Obs.

Obs: Varietatem pedibus fere totis flavis, ex-  
terum var. b., similissimam, ex Anglia a Dom. Kir-  
by obtinui.

II. *H. 4-pustulata*: brevior, ovata, conve-  
xa, saturate nigra, crebre, subtiliter pun-  
ctulata, elytro singulo lineolis duabus,  
antennarumque basi flavo-testaceis.

*Est. Heft. 2. 73. 43. tab. 3. f. 5. Schönh. sy-  
non. 2. 307. 38.*

*Galleruca 4-pustulata*, Payk. fn. 2. 99. 17.

*Chrysom. exclamatori*s. Thunb. *Act. Upf.* 4.  
14. 23.

Var. b., elytrorum lineolis dilatatis, stria te-  
nui flavescente connexis.

Habitat in plantis & gramine, locis hu-  
mentibus, sat frequens.

Descri. Proxime praecedentibus similia, sed plus  
duplo minor, præfertim brevior, magis convexa,  
& vere distincta. Caput triangulare, atrum, sub-  
nitidum, subtilissime punctulatum, fronte inter an-  
tennas tenue carinata; oculi prominuli, nigro-brun-  
nei. Antennæ dimidio corpore longiores, crassiu-  
sculæ, articulo primo magno, ob-conico, testaceo;  
secundo & tertio parvis, ob-conicis, etiam testaceis;  
quarto paullo majori, piceo; quinto, in masculis,  
magno, elongato, ob-conico, nigro, apice incrassato;  
sesto parvo, brevi, nodoso, nigro; sequenti-  
bus etiam nigris, gradatim crassioribus; ultimo ova-  
to, obtuso; in femina articulus quintus quidem prio-  
ribus, & præcipue sexto longior, sed non crassior.  
Thorax latitudine medii multo brevior, basi spice-

que sub-truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, evidenter marginatus, supra valde convexus, fere pulvinatus, totus niger, sub-nitidus, creberrime punctulatus. Scutellum rotundatum, atrum, nitidum laeve. Elytra thoracis basi multo latiora, & illo quadruplo longiora, supra valde convexa, atra, sub-nitida, creberrime & profundius quam thorax, punctata; in singulo lineolæ duæ longitudinales flavo-tenuicæ, una posse alteram, prior in medio baseos, ante medium elytri definens, posterior intra spicem, cuneiformis, sub-arcuata. Corpus subtus atrum, sub-nitidum, creberrime punctulatum. Pedes mediocres, femoribus atris, nitidis, tibiis tarsisque fusco-piceis.

Var. b, differt tantum lineolis elytrorum magis dilatatis, arcuatis, & stria-tenui, angusta, interne connexis, unde varietatibus b, & c, praecedentis Speciei facie similis evadit, sed statura corporis, brevior, magis convexa, tatis distinguuntur.

12. H. Holsatica: ovata, convexa, atra, nitida, crebre punctulata, elytris macula postica rotundata rubra, antennarum basi tibiisque anterioribus rufis.

*Ent. Heft. 2. 60. 36. Schönh. synon. 2. 311.  
64.*

*Chrysom. Holsatica. Linn. syst. 2. 595. 67. Fn.  
Sv. 544.*

*Crioceris Holsatica. Fabr. Eleut. 1. 467. 85.  
Galleruca Holsatica. Payk. fn. 2. 99. 18.*

Var. b, macula apicali elytrorum sub-cordata, vel antice emarginata, *Ent. Heft. 67. Schönh. l. s. var. b.*

*Chry-*

*Chrysomela pulicaria.* Linn. Syst. 21 595. 64.

*Alien pulicaria.* Thunb. Act. Ups. 5. 113. 45.

Habitat in pratis humentibus, non infrequens.

Descr. Statura convexa praecedentis, sed plerumque dimidio major. Caput triangulare, nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum, fronte inter antennas carinula longitudinali elevata; oculi prominentes nigro-brunnei. Antennae dimidio corpore longiores, articulis tridus primis pallide testaceis, reliquis nigris, exterioribus gradatim crassioribus. Thorax latitudine brevior, antice paulo latior, truncatus, lateribus sub-obliquis, vix rotundatis, epi-denter marginatis; basi etiam truncatus, supra valde convexus, totus niger, nitidus, crebre, subtilissime punctulatus. Scutellum breve, triangulare, nigrum, nitidum, laxe. Elytra antice thorace latiora, humeris rotundatis, & ultra medium valde dilatata, thorace quintuplo longiora, apice rotundata, angulo suturali sub-recto; supera valde convexa, nigra, nitida, creberrime & profundius quam thorax, punctata; ante apicem cuiusvis elytri macula rotunda, rubra, pellucida, interdum parva, punctiformis, plerumque vero major, rarius ad apicem usque dilatata. Corpus subtus nigrum, nitidum, crebre subtiliter punctulatum. Pedes mediocres, femoribus nigris, anterioribus saepe apice testaceis; tibiae & tarsi anteriores testacei, postici fusco-picei.

Var. b. differt tantum macula rubra apicali & lytrorum antice emarginata, cordiformi.

Obs. Chrysomela bi-pustulata, Thunb. Act. Ups. 4. 13. 21, a Dom. Schönher ad Halticas relata, Synon. 2. 311. 63. certe coccinella Reppenb., Payk. Fn. 2. 27. 58. var. b.

13. H. Anchusæ: ovata; convexa; nigra; subnitida; antennarum basi, tibiis ita que pallidis, elytris confertissime punctatis, apice singulatim rotundatis, abdomine brevioribus.

*Ent. Heft. 2. 62. 37. Schönh. Synon. 2. 313.*

73.

*Galleruta Anchusæ. Payk. in. 2. 101. 91.*

Habitet in Anchusa & Cynoglosso Westrogothia, passim.

Deser. H. Ruphorbiae paullo major, variat tamen etiam statu minor. Caput triangulare, nigrum, nitidum, vix visibiliter punctulatum, fronte antice inter antennæ longitudinaliter carinata; oculi prominenti, nigro-branell. Antennæ dimidio corporis longiores, crassiusculæ, articulo primo majori, basi fusco-piceo, extrorsum pallido, sequentibus 4 aut 5 angustioribus, pallidis, reliquis nigris, gradatim crassioribus, ultimo sub-acuminato. Thorax latitudine brevior, basi apiceque truncatus, lateribus sequaliter rotundatus, anguste marginatus, supra valde convexus; totus saturate niger, nitidus, crebre subtilissime punctulatus. Scutellum sub-rotundatum, nigrum, nitidum, lœve. Elytra antice thoracis medio parum latiora, humeris oblique rotundatis, sed ultra medium dilatata, thorace quintuplo longiora, apice valde obtuse & singulatum per se rotundata, ab domine paullo breviora, angulo suturali dehiscente; supra valde convexa, tota saturate nigra, crebre & profundius quam thorax punctata. Alæ vix illæ, saltem in majoribus, forte feminis. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, crebre, subtiliter punctulatum. Pedes mediocres; pallide testacei; femoribus nigris, anterioribus apice testaceis.

14. H.

14. *H. lurida*: ova, convexa, nigro-picea, antennarum basi pedibusque livido-testaceis, elytris brunneis, contertissime, profunde punctatis, apice singulatim rotundatis.

*Schönh. synon.* 2. 309 s.

*Galleruca atricilla.* *Payk. fn.* 2. 104. 23. var. 6.

Var. b, thorace aut piceo, aut rufescente, elytris ferrugineis, fusco-obumbratis, pedibus lividis, femoribus posticis, sajtem apice, nigricantibus. *Schönh.* l. 4. var. b. *Payk.* l. c. var. d.

*Atrica pratorum.* *Ent. Hest.* 2. 88. 50.

*Atrida fuscescens.* *Dom. Kirby in litteris.*

Var. 1, rufo-ferruginea, antennis pedibusque palpidioribus, oculis, pectore, abdomenque nigro-fuscis.

*Chrysoloma lurida.* *Rößl. Ep. Err.* 1. 89. 226.

Habitat in plantis & gramine, praesertim siccis umbrosis, ubique frequentissima.

Descr. Statuta, magnitudo &c. affinitas praecedentis; simili modo magnitudine valde variat, ut alii aliis triplo vel quadruplo minores. Caput triangulare, nigro-piceum, nitidum, subtilissime obsolete punctulatum, fronte inter antennas carinata; oculi protinunti, nigro-brunnei. Antennae feminæ dimidi corporis longitudine, maris multo longiores & crassiores, in utroque livido-testaceæ, extrosunt gradatim crassiores, rufescentes, & tenuè pubescentes. Thorax brevis, transversus, basi piceus

truncatus, lateribus æqualiter rotundatus, evidenter marginatus, supra modice convexus, nigro-piceus, sub-nitidus, confertissime, sed obtusius rugosus punctatus. Scutellum breve, sub-triangulare, piceum, nitidum, lœve. Elytra antice thoracis medio pīx latiora, humeris oblique rotundata, dein ultra medium valde dilatata, thorace quintuplo longiora, apice singulatim obtuse rotundata, sub-dehiscentia, in feminis abdome paucio breviora, supra valde convexa, jam saturatius, jam dilutius brunnea, apicem versus plerumque pallidiore, undique confertissime & profunde punctata. Alæ vix illae, salem, in feminis. Corpus subitus nigro-piceum, parum nitidum, vix vel subtilissime punctulatum. Pedes livido-testacei, femoribus posticis magnis, superne insulcatis.

Var. b, colore dilutiōri fātum differt; thorax aut piceus, aut rufescēti brunnea, antice sc̄e obscuro. Elytra vel brunnea, vel rufescēti testacea, jam unicolora, jam verius saturata & margines plus minusve infuscata; pedes plerumque pallidiores, femoribus posticis aut concavib⁹, aut supra piceo-insulcatis.

Var. c. adhuc dilutiōr, fere tota jam rufo-testacea, jam magis pallida, oculis foliis nigris, pectore abdomeque aut fusco-aut rufo-piceo.

Obs. Mares plerumque duplo minores & ultra, elytris longioribus, abdomen occultantibus, apice minus obtusis, & antennis longioribus, extremitate crassioribus, a feminis distinctas.

Obi. Dom. de Paykull, in Ep. Sv. 2. 104. 23. sub Galleruca atricilla, ut varietates conjunxit. Halticas fere omnes indigenas pallidiores, elytris vage punctatis. & in Ent. Heft. 2. 88. 59. Abstomachia illius operis, eadem sub altica præstans colliguntur, exceptis tantum A. atricilla & Verhaesi; vix prolixe, quoniam formatio partium punctura & color res

res saepe constanter aliæ; quare illas accuratius distinguere & determinare in sequentibus tentavi; Synonymia tamen saepe incerta & dubia, nam characteres & descriptiones auctorum incompletæ.

15. *H. pratensis*: ovata, convexa, nigra, supra subtiliter, crebre punctulata, antennarum basi, thorace, & elytris pedibusque pallidis, elytrorum humeris apiceque singulatim rotundatis.

Panz. fn. 21. f. 16. Crit. Rev. 1. 86. id. var.

Eut. Heft. 2. 88. 50. Schönh. synon. 2. 309. 50.

Var. b., capite etiam pallide testaceo.

*Chrysomela exoleta*. Linn. syst. 2. 594. 59. Fn. Sv. 54!?

*Galleruca atricilla*. Payk. fn. 2. 102. 23. a.

Var. c., tota pallida, oculis nigris, abdominis basi interdum fulva.

*Altica tabida*. Panz. fn. 21. f. 15. Crit. Rev. 1. 85?!

*Altica pallens*. Dom. Kirby in litteris.

Habitat in plantis & gramine frequens.

Deser. Statura fere praecedentis, & magnitudo pari modo varians, sed multo subtilius punctulata, color longe alius, &c. Caput triangulare, nigropiceum, nitidum, subtilissime punctulatum, fronte antica subcarinata, vertice saepe dilutius piceo; oculi prominenti, brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, basi pallida, extremitate gradatim crassiores,

que sub-truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, evidenter marginatus; supra valde convexus, fere pulvinatus, totus niger, sub-nitida, creberrime punctulatus. Scutellum rotundatum, atrum, nitidum laeve. Elytra thoracis basi multo latiora, & illo quadruplo longiora, supra valde convexa, atra, sub-nitida, creberrime & profundius quam thorax, punctata; in singulo lineola due longitudinales fuso-testaceæ, una posse alteram, prior in medio basos, ante medium elytri definens, posterior intra apicem, cuneiformis, sub-arcuata. Corpus subtus atrum, sub-nitidum, creberrime punctulatum. Pedes mediocres, femoribus atris, nitidis, tibialis tanisque fusco-piceis.

Var. b, differt tantum lineolis elytrorum magis dilatatis, arcuatâ, & stria tenui, angusta, interne connexis, unde varietatibus b, & c, præcedentis Speciei facie similis evadit, sed statura corporis brevior, magis convexa, latis distinguit.

12. *H. Holsatica*: ovata, convexa, atra, nitida, crebre punctulata, elytris macula postica rotundata rubra, antennarum basi tibiisque anterioribus rufis.

*Ent. Heft. 2. 60. 36. Schönh. synon. 2. 3<sup>rd</sup>. 64.*

*Chrysom. Holsatica. Linn. syst. 2. 595. 67. Fr. Sv. 544.*

*Crioceris Holsatica. Fabr. Eleut. 1. 467. 85. Galleruca Hollatica. Payk. fn. 2. 99. 18.*

Var. b, macula apicali elytrorum sub-cor data, vel antice emarginata. *Ent. Heft. 2. Schönh. 1. 6. var. b.*

*Chry-*

*Chrysomela pulicaria.* Linn. Syst. 22 595. 64.

*Alien pulicaria.* Thunb. Act. Upsi. 5. 113. 45.

Habitat in pratis humentibus, non infrequens.

Descr. Statura convexa praecedentib; sed plurimum dimidio major. Caput triangulare, nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum, fronte inter antennas catinulis longitudinali elevata; oculi prominentes nigro-brunnei. Antennae dimidio corpore longiores, articulis tribus primis pallide testaceis, reliquis nigris, exterioribus gradatim crassioribus. Thorax latitudine brevior, antice paulo latior, truncatus, lateribus sub-obliquis, vix rotundatis, exidenter marginatis; basi etiam truncatus, supra valde convexus, totus niger, nitidus, crebre, subtilissime punctulatus. Scutellum breve, triangulare, nigrum, nitidum, laxe. Elytra antice thorace latiora, humeris rotundatis, & ultra medium valde dilatata, thorace quinto plus longiora, apice rotundata, angulo saturata sub-recto; supra valde convexa, nigra, nitida, creberrime & profundius quam thorax, punctata; ante apicem cuiusvis elytri macula rotunda, rubra, pellucida, interdum parva, punctiformis, plerumque vero major, rarius ad apicem usque dilatata. Corpus subtus nigrum, nitidum, crebre subtiliter punctulatum. Pedes mediocres, femoribus nigris, anterioribus saepe apice testaceis; tibiae & tarsi anteriores testacei, postici fusco-picei.

Var. b, differt tantum macula rubra apicali elytrorum antice emarginata, cordiformi.

Obs. Chrysomela bi-pustulata, Thunb. Act. Ups. 4. 13. 21, a Dom. Schönber ad Halticas relata. Synon. 2. 311. 63. certe coccinella Reppensis, Payk. Fn. 2. 27. 38. var. b.

truncatus, lateribus æqualiter rotundatus, evidenter marginatus, supra modice convexus, nigro-piceus, sub-nitidus, confertissime, sed obtusètius rugoso-punctatus. Scutellum breve, sub-triangulare, piceum, nitidum, lœve. Elytra antice thoracis medio vix latiora, humeris oblique rotundatis, dein ultra medium valde dilatata, thorace quintuplo longiora, apice singulatim obtuse rotundata, sub-dehiscentia, in feminis abdome paulo breviora, supra valde convexa, jam saturatius, jam dilutius brunnea, apicem versus plerumque pallidiore, undique confertissime & profunde punctata. Alæ vix ulce, salem in feminis. Corpus subitus nigro-piceum, parum nitidum, vix vel subtilissime punctulatum. Pedes livido-testacei, femoribus posticis magnis, superne infuscatis.

Var. b, colore dilutiōnē tantum differt; thorax aut piceus, aut rufescens brunnans, antice saepe obscurior. Elytra vel brunnea, vel rufescens testacea, jam unicolora, jam verius suturam & margines plus minusve infuscata; pedes plerumque pallidiores, femoribus posticis aut concoloribus, aut supra piceo-infuscatis.

Var. c. adhuc dilatiōr, fere tota jam rufo-testacea, jam magis pallida, oculis solis nigris, pectore abdomeque aut fusco- aut rufo-piceo.

Obs. Mares plerumque duplo minores & ultra, elytris longioribus, abdomen occultantibus, apice minus obtusis, & antennis longioribus, extremitate crassioribus, a feminis distinctas.

Obi. Dom. de Paykull, in Ep. Sv. 2. 104. 23. sub Galleruca atricilla, ut varietates conjunxit. Halticas fere omnes indigenas pallidiores, elytris vage punctatis. & in Eot. Heft. 2. 88. 59. Augustus illius operis, eadem sub altica præteri collocantur, exceptis tantum A. atricilla & Verhadii; vix proponere, quoniam formatio partium diversa & color res

accepit, huic simillimam, sed cui futura elytrorum tota nigro-fusca, antennae obscuriores, etiam versus basin; pectus, abdomen & femora postica nigro-picea; forte haec Altica Verbasci, Ent. Heft. 2. 84. 482, & Crioceris Sisymbrii Fabr. Eleut. 1. 465. 76; sed nullum individuum, ita coloratum, cum H. Verbasci apud nos legi, quare nec de identitate cum illa dijudicare possum.

19. *H. melanocephala*: ovata, convexa, nigra, thorace sub-lævi, rufo-ferrugineo, elytris testaceis, apice acuminatis, futura nigricante, antennarum basi tibiisque pallidis.

Schönh. synon. 2. 309. 45.

*Chrysem. melanocephala*. De Geer Inf. 5. 348.  
57?

*Chrysem. exoleta*. Marsh. Ent. Br. 1. 201. 73?

Var. b, femoribus anterioribus etiam testaceis.

Habitat in plantis & gramine, passim.

Descr. H. atricilla quoad colores similis, sed paullo minor, brevior; thorax multo subtilius punctulatus; elytra apice sub-acuminata, &c. Caput triangulare, nigro-piceum, vertice nitido, sub-lævi, fronte antica opaca, subtiliter rugoso-punctata; inter antennas carinata; oculi magni, prominuli, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, articulis 5 vel 6 inferioribus testaceis, reliquis gradatim crassioribus, nigro-fuscis pubescentibus. Thorax brevis, transversus, antice latior, truncatus, lateribus oblique rotundatus, marginatus, basi etiops.

Inf. Suec. T. I. P. III. Mm rotun-

lida, nitida, crebre & profundius quam thorax punctata, futura fere tota nigro-fusca. Corpus subtus nigropiceum, nitidum, crebre punctulatum. Pedes quatuor anteriores, ut & tibiæ & tarfi posticorum pallide testacei; femora postica magna, nigro-picea, plerumque basi & subtus rufo-ferruginea.

Variet. b. differt tantum femoribus posticis dilatioribus, quoad maximam partem rufo-ferrugineis, superne vero & apice nigro-piceis.

17. *H. tabida*; oblongo-ovata, minus convexa, flavo-pallida, ore, oculis, antennarumque apice nigrioantibus, elytris latioribus, subtilissime punctulatis.

Schönh. synon. 2. 311. 65.

*Cricoceris tabida*. Fabr. Eleut. 1. 467. 36.

*Chrysoloma tabida*, Marsh. Ent. Br. 1. 203.

&c.

Habitat in Svecia australis gramineis, ratiis; eadem ex Anglia, ut *Chrys. tabida* Marshami, a Dom. Kirby missa.

Descr. Praecedente fere duplo major; elytra malto subtilies punctata; illarum humeri magis prominuli, &c.; Halt. Verbasci magis affinis, eique magnitudine fere æqualis, elytris antice paullo latioribus, corpore, ut videtur, minus convexo, & colore pallido, distincta. Caput sub-triangulare, convexum, pallide testaceum, nitidum, vix punctulatum, fronte antica inter, antennas carinata; os nigro-fuscam; oculi prominenti, nigri. Antennæ dimidiæ, corpore paullo longiores, pallidæ, extrorsum fuligescentes. Thorax brevis, transversus, basi apice

deique sub-truncatus, lateribus parum rotundatus, evidenter marginatus, supra modice convexus, pallidus, & nitidus, subtilissime punctulatus. Scutellum parvum, rotundatum, pallidum, levé. Elytra thorace multo latiora, humaris fere rectangularis, thorace quinquefo longiora, apice sub-acuminata, supra minus convexa, tota pallida vel flavescens, nitida, sat crebre, sed subtilissime punctata. Corpus sub-tus paullo magis testaceum, nitidum, obsolete punctulatum. Pedes pallide-testacei, femoribus posticis concoloribus & modice incrassatis.

OBS. Hæc jam descripta species, ob magnitudinem majorem Halt. exæcta fere æqualem, Crioceris tabida Fabricii esse videtur; Altica vero tabida Panzeri & Rossi, utpote minores, potius ad varietatem pallidam H. præteris pertinent. Sed utrum hæc nostra & sequenti vere diversa, pro certo dijuri dicere nequædam vivam non sidi; inter magnam copiam speculum H. Verbasci, ne unicam tamen exacte similem reperi.

18. *H. Verbasci*: ovata, convexa, griseo-pallida, nitida, thorace sub-levi, elytris subtilissime punctulatis, subros nigro-picea, femoribus posticis obscure ferrugineis, tenui-perte mufuscatis.

Panz. in. 21. f. 17. Crit. Rer. I. 87. Schönh.

Synon. 2. 309. 47.

*Chrysomela Verbasii*. Marsh. Ent. Br. I. 202.

q. 2.

Var. b, subitus dilutius rufo-ferruginea.

Schönh. f. c. var. b.

Alli-

*Altica verbasti.* Ent. Heft. 2. 34. 48. var.  
b. fab. 3. f. 2. b.

Habitat in Verbiacot Thapsi foliis; in Smo-  
landia, Dom. Bergman; juxta villam ame-  
nam Sparrsatta Westrogothie, iam domi-  
cium amicissimi Dom. Schönherr, aestate  
præterita copiose lecta.

Descr. Major reliquis nobis hujus phalangis;  
H. testacea fere aequalis, sed magnitudine variat.  
Caput triangulare, fusco-ferrugineum, vertice laxe,  
nitido, fronte antice carinata, punctata, ore nigro-  
piceo; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antenna  
dimidio corpore paullo longiores, cinereo-pallidæ,  
extrosum parum crassiores, dilute fulcescentes. Tho-  
rax brevis, transversus, basi apiceque truncatus, la-  
teribus rotundatus, marginatus, supra convexus,  
griseo-testaceus, pellucidus, nitidissimus, vix visibi-  
liter punctulatus; intra apicem plerumque striga  
transversa fusca, abbreviata, & interdum etiam in  
disco posteriori altera, obsoletior. Scutellum par-  
vum, rotundatum, fusco-testaceum, nitidum, laxe.  
Elytra antice vix thoraci basi latiora, humeris ob-  
liquis rotundatis; sed ante medium valde dilatata,  
thorace quintuplo longiora, apice fusculatione rotun-  
data; supra validè convexa, griseo-testacea, nitida,  
pellucida, crebre, subtilissime punctulata, sutura paul-  
lo saturatiæ testacea. Thorax subtus griseo-testa-  
cens, pectus & abdomen nigro-picea, nitida, cre-  
bre punctulata. Pedes quatuor anteriores, ut & po-  
sticorum tibiae tarsique pallidi; femora postica magna  
fusco-ferruginea, supra & apice obscurius picea.

Var. b, simillima, sed corpus subtus glutinosum  
ferrugineum, & femora postica minus infuscata.

Obs. Sub nomine Chrysomela Thapsi, Marb.  
Ent. Br. 1. 202. 79, ex Anglia, a Dom. Kirby, alias  
accepi,

accipi, huic simillimam, sed cui futura elytrorum tota nigro-fusca, antennae obscuriores, etiam versus basin; pectus, abdomen & femora postica nigro-picea; forte haec Altica Verbasci. Ent. Heft. 2. 84. 48<sup>a</sup>, & Crioceris Sifymbrii Fabr. Eleut. 1. 465. 76; sed nullum individuum, ita coloratum, cum H. Verbasci apud nos legi, quare nec de identitate cum illa dijudicare possum;

19. *H. melanocephala*: ovata, convexa, nigra, thorace sub-lævi, rufo-ferrugineo, elytris testaceis, apice acuminatis, futura nigricante, antennarum basi tibiisque pallidis.

Schönh. synon. 2. 309. 45.

*Chrysom. melanocephala*. De Geer Inf. 5. 348.  
57?

*Chrysom. exoleta*. Marsh. Ent. Br. 1. 201. 75?

Var. b, femoribus anterioribus etiam testaceis.

Habitat in plantis & gramine, passim.

Descr. H. atricilla quoad colores similis, sed paullo minor, brevior; thorax multo subtilius punctulatus; elytra apice sub-acuminata, &c. Caput triangulare, nigro-piceum, vertice nitido, sub-lævi, fronte antica opaca, subtiliter rugoso-punctata; inter antemas carinata; oculi magni, prominuli, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, articulis 5 vel 6 inferioribus testaceis, reliquis gradatim crassioribus, nigro-fuscis pubescentibus. Thorax brevis, transversus, antice latior, truncatus, lateribus oblique rotundatus, marginatus, basi etiama-

Inf. Suec. T. I. P. III. Mm rotun.

rotundatus, supra modice convexus, totus rufo-ferrugineus, nitidus, vix, vel omnium subtilissime punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, rufo-piceum, laxe. Elytra antice thorace parum latiora, humeris rotundatis, dein ultra medium dilatata, thorace quintuplo longiora, apice suturali sub acuminate, supra modice convexa, pallide testacea, cerebriforme, subtiliter punctuata, sutura fere tota nigro fusca. Corpus subitus nigro-piceum, nitidum, crebre, evidenter punctatum. Femora quatuor anteriores nigro-picea, apice plerumque testacea; tibiae & tarsi anteriores testacei; femora postica magna, nigra, nitida, subtilissime punctulata, tibiis piceis, tarsis testaceis,

Var. b, differt rictum femoribus anterioribus testaceis interdum basi obscurioribus; femora postica etiam saepe basi inferiori rufo-pices, & tibiæ ejusdem paris fusco-testaceæ.

Obs. Sub nomine Chr. exoleta Marshami, a Dom. Kirby missa, sed descriptioni non exacte quadrat; Dom. De Geer futuram elytrorum nigram non memorat cætera correspondent,

20. *H. lutescens*: ovata, minus convexa, flavo-testacea, subtilissime punctulata, ore, oculis, antennarum femorumque posticorum apice, elytrorum sutura, pectore ab domineque nigris.

Habitat in plantis & gramine, locis umbrosis, non infrequens.

Descr. *H. melanocephala* paullo minor, minus convexa, elytrorum humeri magis prominuli, Caput semper flavo-testaceum, sutura elytrorum angustius,

ftius, sed saturatus & magis determinate nigra; color in vivo læte flavus, post mortem magis testaceus, præsertim in capite & thorace. Caput majus sculum, triangulare, flavo-testaceum, subtilissime punctulatum. fronte inter antenas vix carinata, sed tuberculis duobus parvis, paribus, notata, fere ut in H. Cyparissæ, Ent: Heft. 2. 80. 47; os nigro-piceum; oculi mediocres, prominuli, nigri. Antennæ dimidio corpore longiores, articulis 4 seu 5 baseos pallidis, sequentibus gradatim crassioribus, nigris. Thorax brevis, transversus, apice latior, truncatus, lateribus oblique rotundatus, evidenter marginatus, basi etiam subrotundatus, supra parum convexus, subtilissime obsolete punctulatus, in vivo læte flavus, nitidus, post mortem saepe pallide testaceus. Scutellum parvum, triangulare, flavum, læve. Elytra thoracis basi multo latiora; humeris prominulis, & illo quintuplo longiora, apice conjunctim rotundata, angulo suturali sub-acuminato: supra parum convexa, læte flava, nitida, confertissime, subtiliter punctata; in ipsa futura stria communis, angusta, saturate nigra, abbreviata, nec basin neque apicem attingens. Alæ longæ albo-hyalinæ. Thorax subtus lateribus pallidus, medio niger; pectus & abdomen nigra, sub nitida, crebre punctulata, ano saepe dilutius palecente. Pedes mediocres, pallidi, tarsis fuscis; semora postica magna, pallida, apice late nigra, nitida, præsertim supra.

Obs. Nuper exclusa subtus dilutior, pallide fusca; cæterum hæc species temper sibi simili. nec inter centena individua ullam variationem observavi, Chrysomela ochroleuca, Marsh. Ent. Br. 1. 202. 80, quam ex Anglia misit Dom: Kirby, huic quidem similissima, sed corpus totum flavo-testaceum, ore, oculis femorumque posticorum apice foliis nigris, futura elytrorum nullo modo infuscata, unde forte distincta species.

21. *H. Nasturtii*: ovata, minus convexa, nigro-picea, nitida, antennarum basi, tibiis tarsisque ferrugineis, elytris latioribus, consertissime punctatis, testaceis, futura margineque nigro-fuscis.

Var. *b*, femoribus quatuor anterioribus etiam ferrugineis.

*Crioceris Nasturtii*. *Fabr. Eleut.* i. 463. 77.

*Haltica pratenis*. *Ent. Hefl.* 2. 88. 50. var. *b*. tab. 3. f. 9. *Schönh. Synon.* 2. 309. 50. var. *b*.

*Galleruca atricilla*. *Payk. fn.* 2. 103. 23. var. *c*.

*Chrysomela futuralis*. *Marsh. Ent. Br.* i. 201. 77.

Var. *c*, elytris nigro-fuscis, plaga media obsoleta testaceo-pellucida.

Habitat in plantis & gramine, sat frequens.

Descr. Statura fere proxime praecedentis, sed plerumque paullo minor. Caput majusculum, triangulare, nigrum, vertice nitido, interdum æneo-micante, subtilissime punctulato, fronte antica nigra, opaca, inter antennas carinata; oculi magni prominuli, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, articulis 4 seu 5 baseos ferrugineis, reliquis nigris, gradatim crassioribus. Thorax parvus, brevis, transversus, capite vix latior, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, evidenter marginatus, supra minus convexus, crebre, subtilissime & obsolete punctulatus, niger, nitidus, saepe æneo-micans. Scutellum mediocre, rotundatum, nigro-piceum, læve. Elytra thorace multo latiora, humeris

ris prominulis, & illo fere sextuplo longiora, apice rotundata, angulo suturali obtuso; supra modice convexa, jam dilutius, jam obscurius testacea, confertissime, evidenter punctata, sutura tota & margine laterali, saltem in medio, hunc anguste, alia vice latius nigro-fuscis. Aliae ampliae, albo-hyalinae. Corpus subitus nigrum, nitidum, subtilissime, parce, punctulatum. Femora quatuor anteriora nigro-picea, genibus, tibiis testaceis; femora postica magna, nigra nitida, tibiis fuscis, testaceis.

Var. b, differt tantum colore pedum dilutioni anteriores quatuor toti testacei, ut & tibiae postico rum; femora postica basi plus minusve ferruginea.

Var. c, differt elytris obscurioribus, fere nigris, plaga tantum media oblonga, paucio pallidiori, at obsoleta, vix nisi elytris elevatis conspicua.

22. *H. pusilla*: ovata, nigro-picea, convexa, thorace rufo-piceo, elytris pallide testaceis, immaculatis, antennarum basi pedibusque testaceis, femoribus posticis apice nigris.

Habitat in plantis & gramine, passim.

Defcr. Statura fere praecedentis, sed minimis ejus adhuc minor, vix *H. parvula* æqualis, elytris totis pallide testaceis, thorace rufo-piceo, &c. distincta. Caput majusculum, triangulare, vertice piceo, nitido, subtilissime punctulato, fronte antica obscuriori, opaca, inter antennas carinata; oculi magni, prominenti, nigri. Antennæ dimidio corpore paucio longiores, crassiusculæ, inferne rufo-testaceæ, extrorsum gradatim crassiores, fuscae, pubescentes. Thorax brevis, transversus, basi apiceque

truncatus, lateribus rotundatus, evidenter marginatus, supra modice convexus, subtilissime, crebre punctulatus, in disco rufescens, nitidus, limbo, præfertim antico & laterali, fusco-piceo. Scutellum triangulare, piceum, lœve. Elytra thorace latiora, humeris sub-prominulis, thoracē quintuplo longiora, apicē obtuse rotundata, supra valde convexa, tota pallide testacea, sub-nitida, crebre & evidentius quam thorax punctata. Corpus subitus, nigro-piceum sub-nitidum, subtilissime punctatum. Pedes mediocres, rufo-testacei, femoribus posticis supra & apice plus minusve nigro-fuscis.

Obs. Sub nomine „Altica Anglicæ“ dubie licet, a Dom. Kirby missa, sed vix Crioceria Anglicæ Fabricii.

23. *H. testacea*; sub-orbiculata, gibba, rufo-testacea, nitida, subtilissime, obsolete punctulata, oculis solis nigris, thorace ante emarginato, postice sinuato.

*Ent. Heft. 2. 50. 27. Panz. fn. 24. f. 13.*  
*Schönh. synon. 2. 305. 29.*

*Chrysomela testacea. Fabr. Eleut. 1. 448. 159.*  
*Marsh. Ent. Br. 1. 202. 81.*

*Galleruca testacea. Payk. fn. 2. 104. 24.*

Habitat in Svecia meridionali, rarius.

Descr. Reliquis magis globosa, statura Coccinellæ, & *C. impunctata* Linn. *C. aptera* Payk. magnitudine æqualis & facie similis. Caput parvum, triangulare, rufo-testaceum, vertice semi-circulariter elevato, vix punctulato, striga arcuata, impressa, a fronte antica distincto; supra antennarum insertio-

nem

nem tubercula duo parva, elevata, paria, & aliud majus, oblongum, inter antennas; oculi magni, proximuli, nigri. Antennæ dimidio corpore parum longiores, totæ testaceæ, extorsum gradatim crassiores, articulo ultimo acuminato. Thorax brevissimus, transversus, antice angustior, late, sed minus profunde emarginatus, lateribus rotundatus, evidenter marginatus, basi valde sinuatus, in medio nempe rotundato-productus, & utrinque bis leviter emarginatus, angulis lateralibus sub-rectis; supra valde convexus, totus rufo-testaceus, nitidissimus, crebre, sed subtilissime & valde obsolete punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, rufo-testaceum, laxe. Elytra antice vix thorace latiora, humeris rotundatis, sed mox pone basin valde dilatata, dein versus posteriora attenuata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, tota rufo-testacea, nitidissima, paullo evidentius quam thorax punctulata. Corpus totum subtus rufo-testaceum, nitidum, obsolete punctulatum. Pedes pallidius testacei, femoribus nitidis, tibiis, præsertim mediis, arcuatis, apice crassioribus.

Obs. Sub nomine Alt. Cardui, Dom. Kirby et jam ex anglia misit, huic quidem simillimam, sed corpore magis oblongo, minus convexo, & paullo fortius punctato distinctam.

### Sectio 2:a, Elytris punctato-striatis.

**24. H. exoleta:** oblongo-ovata, rufo-testacea, nitida, immaculata, oculis solis nigris, thorace postice transversim impresso, elytris regulariter punctato-striatis.

*Ent. Hest. 2. 17. 5. Panz. fn. 21. f. 14. Schönh.  
Synon. 2. 310. 56.*

teorfum gradatim crassiores. Thorax brevis transversum quadrangulus, antice truncatus, lateribus vix rotundatus, evidenter marginatus, basi sub sinuatus, angulis prominulis; supra parum convexus, pallide testaceus, confertissime, subtiliter & obsolete punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, testaceum, laxe. Elytra antice thorace multo latiora, & pone basin valde dilatata, deinde versus apicem attenuata, thorace sextuplo longiora, supra parum convexa, pallide seu livide testacea, regulariter & profunde punctato-striata, sutura, praesertim in medio, nigrofusca. Alæ longæ albidae. Thorax subtus lateribus testaceus, medio niger; pectus & abdomen nigra, nitida, obsolete punctulata. Pedes quatuor anteriores, tenues, femoribus piceis, apice cum tibiis tarsisque testaceis; femora postica magna, tota nigra, nitida; tibiæ & tarsi ejusdem paris testacei, tibiis apice acumine elongato ultra tarsum insertionem anctis.

Obs. Nuper exclusa fere tota pallida, oculis nigris, pectore, abdominis basi, femorumque posticorum apice fuscescensibus. Utrum Chrysoloma exoleta Linnaei, secundum sententiam Dom. Illigeri in Mag. I. 420. 80, ab hanc speciem pertinet, vel ad Halt. pratensem antea, vix certo dijudicandum, quoniam de eiytrorum punctura, aut vaga sit, aut striatum digesta, nil memoratur.

26. *H. Salicariæ*: ovata, convexa, pallide testacea, elytris dilutionibus, pectore ab domineque piceis, oculis nigris, antennis apice fuscescensibus.

Schönh. synon. 2. 311. 58.

*Galleruca Salicaria*, Payk. sp. 3. add. 453.

31 - 2.

Habi-

**Habitat in Lythro Salicaria, ad lacum littora, paucim copiose.**

Descr. Similis praecedenti, sed dimidio minor ultra, præsertim brevior, multo magis convexa, apud triangulare, rufo-testaceum, parum nitidum, ix punctulatum, fronte depressa, sub-inæquali; oculi prominenti, nigri. Antennæ dimidio corpore paulo longiores inferne pallide testaceæ, extrosum gradatim crassiores, fusco cinereæ, pubescentes. Thorax brevis, transversus, antice vix emarginatus, lateribus parum rotundatus, anguste marginatus, basi truncatus, supra valde convexus, pulvinatus, totus aut rufo-testaceus, aut pallidior, nitidus, omnium subtilissime, crebre punctulatus. Scutellum triangulare, testaceum, tæve. Elytra antice thorace multo latiora, & pone basin magis dilatata, apicem versus parum angustata, thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, sat profunde punctato-striata, striis versus apicem evanescentibus; pallidius testacea, nitida posterius adhuc dilutiiora; futura communis interdum, non vero semper, nonnihil infuscata. Thorax subtus ut supra, totus testaceus, pectus & abdomen nigro-piceæ, sub-nitida, subtilissime punctulata, ano sæpe dilutiiori. Pedes crassiculi, validi, toti pallide testacei.

27. *H. pubescens*: ovata, convexa, nigra, nitida, antennarum basi pedibusque testaceis, thorace creberrime punctato, postice impresso, elytris profunde punctato-striatis, tenue pubescentibus.

*Ent. Heft. 2. 37. 17. Panz. fn. 99. f. 6.*

*Schönh. Jynon. 2. 315. 87.*

*Habitat in aridis, graminosis, in Westro-gothia rarissime lecta.*

Deser. Statura brevis, convexa, fere præcedens, sed paullo minor. Caput retractum, triangulare, nigrum, subtilissime, crabiæ punctulatum, vertice elevationi, sub nitido, fronte antica opaca, sub-carinata; oculi laterales, nigri, prominuli. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, versus basin pallide testaceæ, extrorsum gradatim crassiores, nigro fuscæ, pubescentes. Thorax brevissimus transversus, antice late, sed non profunde emarginatus, caput amplectens, lateribus parvum rotundatus, evidenter marginatus, basi sub-sinuatus, angulis prominulis, acutis; supra anterius valde convexus, pulvinatus, pone medium striga transversa, abbreviata, utrinque foveola profundiori terminata, impessus; totus niger, nitidus, parum metallico-micans, confertissime, concinne & evidenter punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, læve. Elytra antice thoracis basi vix latiora, humeris rotundatis, sed mox pone basin valde dilatata, thorace vix quintuplo longiora, apice conjunctim obtuse rotundata, supra modice convexa, dorso antico sub-impressa, tota nigra, sub-nitida, regulariter & sat profunde punctato-striata, interstitiis pilis brevibus, cinereis, sub-reflexis, adspersis. Corpus subitus nigrum, sub-nitidum, crebre, subtiliter punctulatum. Pedes quatror anteriores testacei, femoribus infernum basi infuscatis; femora postica magna, nigra, nitida, tibiis tarsisque testaceis.

Obs. Eandem omnino ex Insulis St. Bartholomæi & St. Eustachii, a Dom. Forsström obtinui, & simillimam, modo antennæ fere totæ, pedes anteriores & posticorum tibiæ tarsiique dilutius pallidi; varietates elytris flavo-maculatis, in Ent. Heft, loc. cit. memoratae, mihi non obviæ.

28. *H. nigritula*: ovata, convexa, nigra, nitida, antennis, tibiis tarsisque rufo-piceis; thorace vix punctulato, postice impresso, elytis profunde punctato-striatis, apice sub-lævibus.

Habitat in Finlandia graminosis, Dom. Pfeiff, & ab illo sub nomine: *Altica globosa*, missa.

Descr. Statuta fere præcedentis, sed duplo major, *H.* affini æqualis. Caput retractum, triangulare, nigrum, vertice nitido, vix punctulato, fronte supra antenarum insertionem tuberculis duobus obsoletis, notata, & anteriorius carinula parva, elevata; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassiœculæ; pubescentes, rufo piceæ, articulo primo & ultimis paullo obscuriorib; Thorax brevis, transversus, antice late, sed parum profunde emarginatus, laterib; vix rotundatus, evidenter marginatus, basi sub sinuatus, angulis prominul; supra anteriorius valde convexus, pulvinatus; pone medium striga transversa, abbreviata, multinq; foveola profundiori, in baso thoracis excavente terminata, impressus; totus niger, nitidus, parum metallico-micans, vix vel omnium subtilissime & obsolete punctulatus. Scutellum triangulare, nigrum, læve; Elytra, antice thoracis basi parum latiora, bumeris rotundatis, sed mox pone basin dilatata, dein versus apicem attenuata, thorace vix quintuplo longiora, supra valde convexa, nigra, nitida, glabra, anteriorius sat regulariter & profunde punctato-striata, punctis majusculis, remotis, striis pone medium omnino evanescientibus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum. Pedes breviuscuti, validi, femoribus nigro-piceis, tibiis tarsisque dilatioribus, rufo-piceis.

29. *H.*

29. *H. rufipes*: ovata, thorace, postice impresso, capite, antennis pedibusque totis rufis, elytris coeruleo-virentibus, regulariter, minus profunde punctato-striatis, pectore abdome neque nigris.

*Ent. Heft. 2. II. 2. Thunb. Act. Ups. 5. II.*

44. *Schönh. lynn. 2. 307. 36.*

*Chrysomela rufipes*. *Linn. syst. 2. 595. 65. Fn. Sv. 545.*

*Crioceris ruficornis*. *Fabr. Eleut. 1. 464. 70.*

*Chrysom. coeruleo-striata*. *De Gér. Ins. 5. 343. 48.*

*Galleruca ruficornis*. *Payk. fn. 2. 108. 29.*

*Altica ruficornis*. *Panz. fn. 21. f. 12.*

Habitat in plantis variis, locis umbrosis, non infrequens.

Descr. Statura & magnitudo H. exoletæ. Caput triangulare, totum rufum, vertice nitido, vix punctulato; frons inæqualis, inter antennas longitudinaliter carinata, & superius tuberculis duobus, paribus notata; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassuliculæ, totæ ruso-testaceæ, extrorsum gradatim crassiores. Thorax brevis, transversus, antice latior, truncatus, angulis prominentiis, acutis, lateribus parum rotundatus, late marginatus, basi sub sinuatus, supra antice valde convexus, pulvinatus; pone medium striga profunda, abbreviata, utrinque fovea profundior, rectangulariter in basin thoracis excurrente, terminata, impressus; totus rufus, nitidus, vix visibiliter punctulatus. Scutellum triangulare, coeruleo-virens, nitidum, læve. Elytra antice thorace parum latiora,

latiora, dein ulterius medium magis dilatata, thorace quintuplo longiora, supra modice convexa, dorso antico sub depresso, tota coeruleo virescentia, nitida, regulariter, sed minus profunde punctato-striata, punctis parvis, coarctatis, praesertim versus saturam; striis paucis ante apicem irregularibus, evanescentibus; intra humerum soveota baseos impressa, unde callus humeralis elevatus appareat. Thorax subitus rufus; pectus & abdomen nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata. Pedes validi, toti ruso-testacei, femoribus politis modice incrassatis; superne paulo saturati ferrugineis.

30. *H. femorata*: ovata, capite, thorace postice impresso, tibialis terisque rufis, elytris coeruleis, regulariter, profunde punctato-striatis, ore, femoribus, pectore abdomineque nigris.

*Haltica rufipes*. Schönh. synon. z. 307. 36.  
var. b.

Habitat in Lapponia, Dom. Grape; a Dom. Schönherr benevole communicata.

Defin. Magnitudo, statuta & summa affinitas praecedentis, distincta tamen videtur, non solum colore oris femorumque nigro, sed etiam punctis striarum in elytris majoribus, profundioribus, paucioribus, &c. Caput, oculi, antennae ut in praecedenti omnino, modo os nigro-piceum. Thoracis structura, color, punctura & impressiones etiam exakte ut in illa. Scutellum ut in praecedenti. Elytrorum forma eadem, sed color saturatus coeruleus, & puncta striarum multo majora, profundiora, pauciora in quavis stria, unde magis remota, etiam in striis dorsilibus;

ibus; alias striæ tenui modo intrâ apicem in puncta irregulariter sparsa resolventur. Coronus subtus ut in priori. Pedum structura eadem, sed femora omnia tota nigra, nitida, tibiis tarsisque foliis rufis,

**H. fuscipes:** ovata, convexa, nigra, capite, thorace antennarumque basi rufis, elytris coeruleo-virentibus, minus regulariter punctato-striatis, thorace postice utrinque sub-impresso.

*Ent. Heft. 2. 10. 1. Panz. fn. 21. f. 11. Crit.*

*Rev. 1. 80. Schönh. synon. 2. 306. 35.*

*Crioceris fuscipes. Fabr. Eleut. 1. 464. 69.  
Coquib. Illustr. 3. 124. tab. 28. f. 5.*

*Galleruta fuscipes. Payk. fn. 2. 107. 28.*

**Habitat in Svecia meridionali rarius. Dom de Paykull.**

**Descr.** Magnitudo & fere statuta H. rufipennis, sed paullo brevior & magis obtusa. Caput sub-triangulare, rufum, vertice nitido, vix punctulato, fronte inaequali, inter antennarum insertionem obsoleta carinata; os fusco-piceum; oculi prominenti, brunnei. Antennæ longitudine dimidi corporis, articulis 3 seu 4 basos rufis, reliquis gradatim crassioribus nigris, pubescentibus. Thorax brevis, transversus, antice sub-emarginatus, angulis prominenti, lateribus rotundatus, evidenter marginatus, basi sub-sinuatus, supra valde convexus, pulvinatus, totus rufus, nitidissimus, omnium subtilissime punctulatus; in ipsa basi utrinque foveola parva, obliqua, impressa, sed stria postica transversa omnino nulla. Scutellum triangulare, nigro-coerulescens, laeve, Ely-

tra thoracis bafi latiora, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, cœruleo-virescentia, nitida, tenue punctato-striata, punctis minus regulariter ordinatis, saepe duplicatis. Thorax subitus rufus; pectus & abdomen nigra, sub-nitida, subtiliter, obsolete punctulata. Pedes validi, nigri, tarsis piceis, femoribus posticis modice incrassatis, nitidis.

32. *H. nitidula*: oblongo-ovata, thorace postice impresso; subtiliter punctulato, capiteque viridi-aureis, elytris cœruleis, striis subtilioribus, intricatis, antennarum bafi pedibusque anterioribus rufis.

*Ent. Heft. 2. 13. 3. Schönh. synon. 2. 303. 20.*

*Chrysom. nitidula. Linna. sylt. 2. 594. 60. Fn. Sv. 542. Fabr. Eleut. 1. 447. 151. D.*

*Gér. Ins. 5. 346. 54.*

*Galleruca nitidula. Payk. fn. 2. 105. 26.*

*Habitat in Populo, Salice, passim.*

Descr. Magnitudo & fere statura, *H. exoetes*, sed minus convexa; mas fere duplo minor fealna. Caput triangulare, viridi-aureum, vertice nitissimo, vix punctulato, fronte inter antennas carinata longitudinali elevata, & supra illam tuberculi duobus, paribus, notata; oculi prominuli, brunnii. Antennæ longitudine dimidii corporis, paleae testaceæ; extrorum paulo crassiores, nigro. scilæ. Thorax brevis, transversus, antice latior, truncatus, angulis deflexis, lateribus parum rotundatus, late-marginalis, bafi sub sinuatus, supra, anteriorius, modice convexus, pone medium striga transversa, abbreviata, utrinque foveola profundior, rectangulariter in basin thoracis excurrente, terminata impressus; totus

*Ins. Svec. T. I. P. III. Nn. vire-*

virescenti-aureus, nitidissimus, crebre, subtiliter punctatus. Scutellum triangulare, nigro-caerulescens. Elytra thoracis basi latiora, humeris fere rectangularis, thorace fere sextuplo longiora, supra modice convexa, caerulea, nitida, tenuè punctato-striata, striis minus regularibus, punctis saepe duplicatis & invicem intricatis. Corpus subitus nigrum, nitidum, parum virescenti micans, obsolete punctatum. Pedes validi, flavo-testacei, femoribus posticis latis, compressis, nigris, nitidis, aeneo-micantibus.

33. *H. Helxines*: ovata, supra metallica, thorace profunde punctato, postice impresso, elytris regulariter, profunde punctato-striatis, antennis pedibusque flavo-testaceis.

■, Supra aut viridi-aenea, aut viridi-aurea, aut in capite & thorace magis aureo-cuprea.

*Ent.* Heft. 2. 15. 4. var. a, b, c, d, e, ♂ i.  
*Panz.* fn. 21. f. 6. *Schönh. synon.* 2. 303.  
 21. var. a, b, c, d, e, ♂ i.

*Chrysomela Helxines*. *Fabr. Eleut.* 1. 447. 152.  
*Linn. Syst.* 2. 594. 58. *Fn. Sv.* 540, exclusive  
 descriptione, erroneæ e Faunæ ed. 1:ā translata.

*Chrysom. viridi-aurata*. *De Geer Inf.* 5. 345. 52.

*Galleruca Helxines*. *Playk. fn.* 2. 106. 27. a, b.

Var. b: supra rubro-cuprea tota. *Ent.* Heft. ♂ *Schönh. loc. cit.* var. f.

*Chrysom. fulvicornis*. *Fabr. Eleut.* 1. 447. 153.

Var. c, supra obscurior, aut fusco-cuprea,  
 aut cupreo-violacea, aut violaceo-nigritas,

*cans*; præsertim in elytris. *Ent. Heft. 8*  
*Schöph. l. c. var. g. h.*

**Var. x,** supra aut cœruleo-virescens, aut capite thoraceque viridibus vel viridi-æneis, elytris cœruleis, aut tota cœruleo-violetacea. *Ent. Heft. loc. cit. var. k. l; Schöph. l. c. var. k. l. m. Payk. l. c. var. c. d.*

***Chrysom. violaceo-punctata.* De Géer Ins. 5.  
 344. 50.**

***Chrysom. cyanea.* Marsh. Ent. Br. l. 196. 62.**

Habitat in Salicibus, Populo, ubique frequentissima; varietates c, & d, tamen parcius occurunt.

**Descr.** Statuta præcedentis, sed duplo minor & ultra, punctura profundiori, striis elytrorum regularibus, &c. abunde distincta. Caput triangulare, vertice viridi-æneo, nitidissimo subtilissime punctulato, fronde inferiore viridi, opaca, inæquali, carinula tuberculisque ut in priori notata; oculi prominuli, brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, pallide testaceæ, extrosum gradatim crassiores & interdum apice obscuriores. Thorax brevis, transversus, antice latior, vix emarginatus, angulis deflexis, lateribus oblique rotundatus, basi bi-sinuatus, angulis sub-rectis; supra anterior modice convexus, posterius stria transversa, abbreviata, utrinque foveola profundiori terminata, impressus, undique creberime, profunde punctatus, aut viridi æneus, aut auro-vel cupreo-æneus, nitidus. Scutellum parvum, rotundatum, obscure virescens, laeve. Elytra thoracis basi latiora, & illo quintuplo longiora, supra minus convexa, dorso antico plerumque sub-depressa, regulariter & profunde punctato-striata, intersticiis

tiis lævibus, callo humerali oblongo, elevato; aut læte viridia, aut viridiææneæ, aut virescenti-aurea, plerumque tamen minus fulgida quam thorax & caput. Pectus subtus viride, nitidum, læve; abdomen nigro sub-virescens, parum nitidum, crebre, subtiliter punctulatum. Pedes mediocres, pallide testacei, femoribus posticis apice superiori macula nigro-fusca notatis.

In var. b, color paginæ superioris intense rubro-cupreus, lateribus elytrorum tamen plerumque virescentibus; femora postica in hac varietate sœpe tota testacea, vel macula fusca apicis obsoleta.

Var. c, supra obscarius colorata, quasi fusco-inducta, ut in diagnosi indicatum; elytra præsertim obscurata, lateribus tamen viridi-nitentia; apex femorum posticorum sœpe latius niger; pleraque hujus varietatis individua ad sexum masculinum; pertinent, ut ex copulatione & magnitudine minori concludi possat.

In var. d, elytra coerulea vel coeruleo-violacea; caput & thorax rarius elytris concolora; sed plerumque magis virescentia; cæterum omnes varietates in essentialibus simillimæ, nec singulas coloris variationes sufficiens determinare opus est, præcipue cum minus inconstantes sint, & una in alteram successive transit.

Obs. Charakter Chrysom. Helixines Linnæi in Syst. Nat. & Fn. sv. ed. 2:da, certe nostro competit, sed descriptio Faunæ; ex editione 1:ma translatæ, potius ad Halticam dentipedem pertinet.

Obs. Amicissimus Dom. Schönerr ex Museo suo Halticam communicavit, medianam quasi inter Halt. nitidulam & Helixines; priori magnitudine æqualis. eique quoad colorem & puncturam capitis, thoracis corporis & pedum, simillima; sed elytra virescenti ænea, regulariter & profunde punctato-striata, ut in H. Helixines; nec vero patria pro cer-

to cognita, nec secundum unicum individuum speciem novam determinandam existimo, quare heic leviter tantum indicavi. Insectum dubijs adhuc originis,

34. *H. Dulcamarae*: ob-ovata, convexa, posterius attenuata, atro-cerulea, nitida, antennis basi rufis, pedibus nigris, elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis obsolete punctulatis.

*Ent. Heft. 2. 24. 9. tab. 2. f. 5. Schönh.*  
*Synon. 2. 304. 14.*

Habitat in Solano Dulcamara, prope Holmiam. Dom. Schönherr.

Descri. Statura & affinitas *H. Hyosyami*, sed paullo major, latior, magis convexa; præterea colore atro-ceruleo pedibusque nigris, ab illa abunde distincta. Caput parvum, retractum, triangulare, vertice cœruleo-virescente, nitido, parvo, subtiliter punctulato, linea semi-circulari impressa a fronte antica distincto; frons inter antennas triangulariter elevata, etiam ejusdem coloris & puncturæ; tegi oris obscurior, nigro-picea; oculi prominuli, brunnei. Antennæ longitudine dimidiū corporis, crassiusculæ, articulis tribus baseo testaceis, reliquis gradatim crassioribus, nigro-fuscis. Thorax brevis, transversus, antice paullo angustior, late sed non profunde emarginatus, angulis deflexis, prominulis, caput amplectentibus; lateribus rotundatus, late marginatus, basi bi-sinuatus, iu medio rotundatim productus; supra modice convexus, æqualis, nigro-ceruleus, nitidus, parum virescenti-micans, versus latera crebrius, in disco posteriori parce punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, nigro-ceruleum, laxe, Elytra antice thorace paullo latiora, &

scens, laxe. Elytra antice thoracis basi parum leviora, sed mox pone basin dilatata, dein versus apicem valde attenuata, thorace testuplo longiora, supra modice convexa, nigro-cerulea vel virescentia, magis quam thorax nitida, regulariter sed tenuer punctato-striata, interstitijs obsoletissime rugulosis. Corpus subtus nigro-piceum, sub-nitidum, confertissime subtiliter punctulatum, ano saepe dilutius rufo-piceo. Pedes quatuor anteriores, ut & tibiæ tarisque posticorum, rufo-testacei; femora postica magna, nigra, nitida, parum coeruleo-micantia, tenuer cinereo-pubescentia; tibiæ posticæ apice elongato-productæ, ut in prioribus.

Var. b, differt tunc femoribus quatuor anterioribus fusco-piceis, apice plerumque testaceis.

In var c, etiam tibiæ & tarfi omnes plus minusve infuscati, genubus, tibiarum apice, tarsumque basi testaceis.

38. *H. elongata*: ob-ovata, convexa, posterius attenuata, capite, thorace; antennarum basi pedibusque rufo-testaceis, elytris coeruleo-virentibus, pectore, abdomine femoribusque posticis nigro-piceis.

Habitat in Smolandie plantis oleraceis, rarius; Dom. Wetterhall; ex Italia eandem pluries obtinui.

Descr. Praecedenti magnitudine & statura similis, nimisque affinis; differt tamen thorace toto rufo-testaceo, immaculato, paullo evidentius punctulato. Caput quoad structuram ut in praecedente, aut totum testaceum, aut in vertice nonnihil infuscatum; os interdum fulco-piceum; oculi & antennæ ut in priosi. Thoracis structura eadem, sed totus

ice & fronte superiori viridi-æneis, nitidis, crebre ubtiliter punctulatis, ut in priori constructis; regio ovis nigro-picea; oculi prominuli, brunnei. Antennæ crassiusculæ, longitudine dimidii corporis, articulis tribus seu quatuor baseos pallide testaceis, reliquis gradatim crassioribus, nigro-piceis. Thorax brevis, transversus, antice paullo angustior, late sed non profunde emarginatus, lateribus rotundatus, evidenter marginatus, basi sub-bifinuatus, supra modice convexus, æqualis, virescenti æneus, nitidas, subtilissime & sat crebre punctulatus. Scutellum triangulare, virescenti-æneum, lave. Elytra antice vix thoracis basi latiora, sed mox pone basin dilata-ta, dein versus apicem senum attenuata, thorace sex-tuplo longiora, supra modice convexa, virescenti-ænea, nitida, regulariter & paullo profundius quam in praecedenti punctato-striata, interstitiis crebre, subtilissime & obsoletius punctulatis. Alæ longæ, cinereo-albidæ. Corpus subtus nigro-æneum, subnitidum, crebre punctatum. Pedes quatuor anteriores & posticorum tibie tarsique pallide testacei; femora postica magna, crassa, nigro-ænea, nitida, tibiis ejusdem paris quoad structuram omnino ut in praecedente descriptis.

Obs. Chryl. Hyoscyami Linn. Syst. & Fn. Sv. ed. 2:da certe huc pertinet, sed Mordella ovata, coerulea, &c. Fn. Sv. ed. 1:ma N:o 540, erroneæ cum illa conjuncta, ad H. Napi vel Chrysocephalam aptius referenda, ut & Paykullii Gall. Hyoscyami var. b.

36. H. Napi: ovata, convexa, posterius minus attenuata, supra nigro-coerulea, antennis inferne pedibusque testaceis, femoribus posticis nigro-coeruleis, elytris regulariter punctato-striatis, integrutiis vix punctulatis. N:n 4 Ent.

thoracis basi non latiora, sed pone basin nonnihil dilatata, dein sensim versus apicem attenuata, thorace sextuplo longiora, supra modice convexa, viridis, nitida, parum æneo-micans, regulariter & sat profunde punctato-striata, interstitiis obsoletissime vase punctulatis. Corpus subtus nigro-piceum, parum nitidum, crebre, subtiliter punctulatum, anno pleramque dilutiori. Femora quatuor anteriora basi fusco-picea, extrorsum testacea; tibiæ & tarsi omnes pallide testacei; femora postica magna, viridi-ænea, nitidissima, subtus rufo-picea; tibiæ posticæ apice elongatæ ut in prioribus.

Obs. Altica attenuata, Ent. Heft. 2. 34. 15. A Dom. Sturm communicata, huic simillima & valde affinis, sed thorax minus convexus videtur, & elytrorum apex ferrugineus, quod in nostris nunquam vidi, etiam magnam speciminum copiam examinavi.

40. *H. occultans*: oblongo-ovata, convexa, nigra, supra cœrulecenti-micans, thorace crebre punctato, caput occultante, elytris confertissime punctato-striatis.

*Ent. Heft. 2. 23. 8. tab. 2. f. 4. Schönh. sy. non. 2. 315. 90.*

Habitat in aridis Westrogothiæ, cum præcedenti rarius lecta.

Descr. Longitudo præcedentis, sed paullo latior, uncinque optusa. Caput omnino intra thoracem retratum, ut in *Cryptocephalis*, fronte sola conspicus, quæ nigra, subnitida, vix punctulata, inter antennas sub carinata; oculi magui, depresso-brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, basi ferrugineæ, extrorsum gradatim crassiores, nigro-fusco, Thorax brevis,

femoribusque posticis nigro-cœruleis, fronte, antennarum basi pedibusque testaceis.

Ent. Hft. 2. 31. 13. tab. 2. f. 8. Schönh. syn. non. 2. 392. 17.

*Chrysoloma chrysoccephala.* Linn. Syſt. 2. 594.  
53. Fn. Sv. 535. Marsh. Ent. Br. 1. 193. 54.

*Altica Napi.* Panz. fn. 21. f. 3. Crit. Rev.  
1. 75.

Var. b, femoribus anterioribus insuscatis.

Var. c, pedibus anterioribus nigro piceis,  
genibus tarsisque fusco-testaceis.

*Chrysoloma erythrocephala.* Linn. Syſt. 2. 594.  
56. Fn. Sv. 538. Fabr. Eleut. 1. 448. 157.

*Haltica erythrocephala.* Schönh. Jynon. 2. 305. 27.

Habitat in plantis oleraceis, præfertim Ra-phano sativo, sat frequens.

Deser. H. Hyascyami paullo longior, posterius magis attenuata; cæterum similis & affinis. Caput triangulare, rufo-testaceum, fronte inter antennas carinata; vertex sive frons superior convexa, subtilissime punctulata, aut rufo picea, aut nigro-virescens, nitida; palpi maxillares nigri; oculi magni, prominenti, brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, fenes, basi testaceæ, extrorsum parum crassiores, nigro-fuscae, articulo ultimo oblique acuminato. Thorax brevis, transversus, antice angustior, parum emarginatus, angulis deflexis, lateribus sub-rotundatus, late marginatus, basi leviter bi-sinuatus, supra valde convexus, vix vel omnium subtilissime, crebre punctulatus, minus nitidus, aut nigro-virescens, aut cœruleicens. Scutellum triangulare, nigro-cœrule-

N<sup>o</sup> 5 scens.

scens, laxe. Elytra antice thoracis basi parum leviora, sed mox pone basin dilatata, dein versus apicem valde attenuata, thorace tenuipennis longiora, supra modice convexa, nigro-caerulea vel virescentia, magis quam thorax nitida, regulariter sed tenui punctato-striata, interstitijs obsoletissime rugulosis. Corpus subtus nigro-piceum, tub-nitidum, confertissime subtiliter punctulatum, anno saepe dilutius rufopiceo. Pedes quatuor anteriores, ut & tibiæ tarsique posticorum, rufo-testacei; femora postica magna, nigra, nitida, parum caeruleo-micantia, tenui cinereo-pubescentia; tibiæ posticæ apice elongato-productæ, ut in prioribus.

Var. b, differt tunc femoribus quatuor anterioribus fusco-piceis, apice plerumque testaceis.

In var c, etiam tibiæ & tarsi omnes plus minusve infuscati, genubus, tibiarum apice, tarsuumque basi testaceis.

38. H. elongata: ob-ovata, convexa, posterius attenuata, capite, thorace; antennarum basi pedibusque rufo-testaceis, elytris caeruleo-virentibus, pectore, abdomine femoribusque posticis nigro-piceis.

Habitat in Smolandie plantis oleraceis, rarius; Dom. Wetterhall; ex Italia eandem pluries obtinui.

Descri. Praecedenti magnitudine & statura similis, nimisque affinis; differt tamen thorace toto rufo-testaceo, immaculato, paullo evidentius punctulato. Caput quoad structuram ut in praecedente, aut torum testaceum, aut in vertice nonnihil infusatum; os interdum fusco-piceum; oculi & antennæ ut in priori. Thoracis structura eadem, sed totus

us rufo-testaceus, nitidus, cibbre subtiliter punctatus. Scutellum triangulare, nigro-ceruleum, laeve. Elytrorum forma striæ & punctura ut in praecedenti, aut nigro-cerulea, aut ceruleo-virescentia, nitida. Thorax subtus rufo-testaceus; pectus & abdomen nigro-picea, nitida, ciberrime punctulata. Pedes aut tori pallide testacei, femoribus posticis tantum nigro-piceis, nitidis, aut femora anteriores basi infuscata.

## 2

39. H. Spergulae: oblongo-ovata, convexa, utrinque attenuata, supra viridi-aenea, antennarum basi, tibiis tarsisque testaceis, thorace confertissime punctato, antice valde compressa.

Habitat in agris arenosis, præsertim in Spergula arvensi, sat frequens.

Descr. H. Chrysocephala fere triplo minor, præsertim angustior, alias statura similis & affinis, utrinque attenuata. Caput triangulare, retractum, obtusum, viridi-aeneum, nitidum, subtilissime punctatum, fronte inter antenas foveola rotundata, impressa; os piceum; oculi prominuli, brunnei. Antennæ longitudine dimidiis corporis, tenues, articulis 4 vel 5 baseos pallide testaceis, reliquis gradatim paullo crassioribus, nigris. Thorax brevis, transversus, antice sub-rotundatus vel oblique truhatus, ibique reapse latior quam postice, sed valde compressus, angulis lateribusque dependentibus, unde superne inspectus, multo angustior appareat; lateribus parum rotundatus, anguste marginatus, basi leviter sinuatus, supra valde convexus, viridi-aeneus, subnitidus, confertissime, evidenter punctatus. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, laeve, Elytra antice thora-

baseos obscure ferrugineis, reliquis gradatim paulo crassioribus, nigris; ultimo conico. Thorax brevis, transversus, antice paulo latior, truncatus, lateribus nonnihil obliquis, evidenter marginatis; basi sub-sinuatus; supra modice convexus, aequalis, absque foveolis posticis, undique confertissime & lat profunde punctatus, aut fusco-aeneus, aut virescens micans, magis nitidus. Scutellum parvum, rotundatum, fusco-aeneum; laxe. Elytra antice thoracis basi non latiora, sed mox pone basin dilatata; thorace vix quintuplo longiora, supra modice convexa, fusco-aenea, profunde punctato-striata; striis versus latera, sat regularibus, in dorso autem consufis & intricatis, ut obiter intuenti vage punctata appareant. Corpus subitus nigro-aeneum, sub-nitidum, crebre & evidenter punctatum. Pedes breviusculi, validi, femoribus nigro-aeneis, posticis magnis, nitidissimis; tibiis rufisque ferrugineis; tibiae posticæ externe dente setoso armatae, ut in praecedente.

Varietates colore tantum differunt; var. b, aut tota supra virecenti-coerulea, aut in capite & thorace magis virescens, in elytris coeruleo-violacea.

Var. c, aut tota supra nigro-coerulea, aut coeruleo-violacea.

Var. d, supra sere nigra, vel parum coerulecenti-micans;

43. H. semi-aenea: elongato-ovata, valde convexa, sub-cylindrica, thorace virecenti-aeneo, postice utrinque lineola impresso, elytris regulariter punctato-striatis, obscure coeruleis, apice pedibusque rufoferrugineis.

*Ent. Heft. 2. 43. 22. Schönh. synon. 2. 305. 25.*

*Chryso-*

*Chrysomela semi-aenea.* Fabr. Eleut. i. 448. 156.

*Galleruca semi-aenea.* Payk. fn. 2. 109. 32.

Var. b, elytris rufo-ferrugineis, futura virescenti-cerulea, anterius latiori.

Habitat in plantis & gramine, locis aridis, paucim.

Descr. H. Modeeri, N:o 46 infra, fere dimidio longior, sed non latior, nec thorax postice depresso ut in illa. Caput triangulare, obscure virescens, sub nitidum, crebre, subtilissime punctulatum, fronte inter antennas striga transversa impressa; os piceum; oculi prominuli brunnei. Antennæ vix longitudine dimidii corporis, crassiusculæ, basi fusco-ferrugineæ, extrorsum gradatim multo crassiores, nigræ, articulo ultimo oblique acuminato. Thorax brevis, transversus, antice paullo latior, truncatus, lateribus ante medium dilatato-rotundatus; anguste marginatus, basi bi sinuatus, supra modice convexus, obscure virescens, parum aeneo-micans, concinne, sed minus crebre punctulatus; ad basin utrinque, versus marginem, lineola nonnihil obliqua, sat profunde impressa. Scutellum parvum, rotundatum, ceruleo-virescens, lœve. Elytra antice thorace parum latiora, versus medium nonnihil dilatata, thorace sextuplo longiora, supra valde convexa, regulariter & sat profunde punctata, striata, interstitiis lœvibus; anterius aut nigro cerulea, aut ceruleo-virescentia, nitida, apice ad tertiam fere partem totius elytri, rufo-ferruginea, interdum dilutius testacea. Corpus subtus nigrum, parum virescenti-micans, crebre, subtilissime punctulatum. Pedes rufo-testacei, femoribus posticis magnis, nigro virescentibus; femora anteriora etiam interdum rufo-picea; tibiae posticæ apice, ad insertionem tarsuum, truncatæ, acumine minuto tantum armatae.

*Inf. Svec.* T. I. P. III. Oo Var.

Var. b, colore tantum differt; thorax dilutus viridi-æneus; elytra rufo ferruginea, futura jam late, præsertim anterius, jam anguste virescenti-coerulea; Pedes aut ut in a, aut toti pallidius rufo-testacei, femoribus posticis apice tantum piceis.

44. *H. Chrysanthemi*: oblongo-ovata, valde convexa, fusco-ænea, thorace postice utrinque lineola impresso, elytris regulariter punctato-striatis, apice; pedibusque testaceo-ferrugineis.

*Ent. Heft. 2. 45. 23. Schönh. Jynon. 2. 305. 24.*

Habitat in pratis apricis, aridis; sat frequens.

Descr. Præcedenti in plurimis similiis & affinis, sed statura multo breviori & colore alio præcipue distincta. Caput triangulare, fusco-æneum, parum nitidum, crebre subtiliter punctulatum; striga transversalis in fronte inter antennas obsoletissima, vix conspicua; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ ut in præcedenti, sed pallidius testaceæ, articulis tantum ultimis fuscis. Thoracis structura ut in priori omnino, sed supra fusco-æneus, parum nitidus, crebrius subtiliter punctulatus, lineola postica obliqua utrinque impressus, ut in illa. Scutellum parvum, rotundatum, fusco æneum, lœve. Elytra antece vix thoracis basi latiora, dein ultra medium nonnihil dilatata, thorace vix quintuplo longiora, supra valde convexa, fusco-ænea, sub-nitida, apicem versus indeterminate dilatiora, testaceo-ænes, regulariter & sat profunde punctato striata, intersticiis lœvibus. Corpus subitus nigrum, æneo-micans, nitidum, subtilissime punctulatum, Pedes validi, ferruginei.

ruginel, femoribus posticis saturatius ferrugineo-piceis, æneo-micantibus; tibie posticæ inermes, apice truncatæ, cum acamine parvo ut in priori.

45. *H. obtusata*: oblongo-ovata, convexa, nigro-cœrulea, antennarum basi, tibiis tarsisque ferrugineis, thorace postice utrinque lineola impresso, elytris regulariter punctato-striatis.

Habitat in pratis graminosis passim.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas praecedentis, sed tota supra nigro-cœrulea, parum nitida, & femora omnia nigra vel nigro-picea; ab *H. aridella* var. b, cui etiam facie simillima, constanter differt, thorace postice utrinque lineola impresso, elytris regulariter punctato-striatis, tibiisque posticis multicisis, &c. Caput triangulare, nigro-cœruleum, parum nitidum, creberrime subtiliter punctatum, fronte inter antennas striga transversa evidenter impressa; oculi prominenti, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore breviores, articulis 3. secundis baseos ferrugineis, reliquis gradatim multo crassioribus, nigris. Thorax brevis, transversus, antice truncatus, lateribus æqualiter rotundatus, evidenteg marginatus, basi bi-sinuatus, supra modice convexus, nigro-cœruleus, parum nitidus, creberrime, subtiliter punctulatus; in ipsa basi utrinque lineola obliqua, impressa, ut in proxime praecedentibus, Scutellum parvum, rotundatum, nigro-cœruleum, læve. Elytra antice thoracia basi vix latiora, dein versus medium dilatata, thorace quintuplo longiora, supra anterius valde convexa, posterius declivia, tota nigro cœrulea, sub-nitida, regulariter & sat profunde punctato-striata, interstitiis levibus. Corpus subnigrum,

nigrum; parum coerulecenti-micans, subtiliter punctatum. Pedes mediocres, tibiis tarsisque omnibus ferrugineis, femoribus quatuor anterioribus nigropiceis, posticis nigro-coeruleis, nitidissimis; tibiæ posticæ externe inermes, apice truncatae, cum acuminio parvo ut in proxime præcedentibus.

**46. H. Modeeri:** breviter ovata, convexa; ænea, nitidissima, antennarum basi, elytrorum apice pedibusque lutescentibus, thorace postice transversum impresso.

*Ent. Heft. 2. 47. 24. Panz. fn. 21. f. 7.  
Schönh. synon. 2. 304. 23.*

*Chrysomela Modeeri Linn. syst. 2. 594. 57.  
Fn. Sv. 539. Fabr. Eleut. 1. 448. 155.*

*Galleruca Modeeri. Payk. Fn. 2. 110. 33.*

Habitat in arenosis, aridis, passim.

Descr. Parva, H; dentipede vix longior, sed multo magis convexa, postice obtusa. Caput triangulare, zeneum, nitidum, subtiliter punctulatum, fronte inter antennas longitudinaliter carinata; os productum, piceum; oculi prominuli, nigri. Antennæ vix longitudine dimidii corporis, crassiusculæ, basi testaceæ, extrorsum gradatim multo crassiores, nigrae, articulo ultimo oblique acuminato. Thorax brevis, transversus, antice sub truncatus, lateribus parum rotundatus, late marginatus, basi bi-sinuatus, supra anterius valde convexus, pone medium transversum obsolete depresso, utrinque foveola profunda, in basin excurrente, impressus; totus zeneus, nitidissimus, sat crebre, subtilissime punctulatus. Scutellum parvum, fusco-æneum lœve. Elytra antice thoracis basi parum latiora, sed dein ultra medium valde dilatata, thorace

thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, æneis, nitidissima, regulariter & sat profunde punctato-striata, callo humerali elevato; apex totus, fere ad tertiam partem elytri, pallide lutescens vel flavus. Corpus subtus crebre punctulatum, pectore abdominisque basi nigro-æneis, nitidis, ano rufo-piceo. Pedes validi, pallide testacei, femoribus posticis crassis, apice rufo-piceis; tibiæ posticæ apice, ad insertionem tarsium, truncatæ, interne tantum acumine minuto armatae.

**47. H. Rubi:** ovata, convexa, nigra, nitida, antennis pedibusque rufis, thorace subtilissime punctulato, non impresso, elytris profunde regulariter punctato-striatis.

*Ent. Heft. 2. 43. 21. Schönh. synon. 2. 314. 82.*

*Crioceris Rubi. Fabr. Eleut. 1. 468. 92.*

*Galleruca Rubi. Payk. fn. 2. 112. 35.*

*Chrysomela striatula. Marsh. Ent. Br. 1. 205.  
90.*

Var. b, Supra brunnea aut dilute picea, subtus pallide testacea. *Schönh. l. c. var. b.*

*Chrysomela picina. Marsh. Ent. Br. 1. 206. 92.*

Habitat in foliis Rubi idæi, cæsi & fruticosi, ut & in Fragaria, aliisque plantis, sat frequens.

Descr. Parva, precedente plus duplo minor, H. 4. pustulata æqualis. Caput triangulare, nigrum, sub-nitidum, crebre subtilissime punctulatum, ore piceo; oculi prominuli, nigri. Antennæ longitudine dimidii corporis, extrorsum gradatim crassiores, to-

tus, pube tenui grisea adpersus. Scutellum oblongum nigrum, apice triangulariter acuminatum, basi punctatum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris valde elevatis, prominulis, thorace quadruplo longiora, apice singulatim rotundata, anum non tegentia, supra valde convexa, pone humerum transversim impelta, tota nigra, subnitida, griseo-pubescentia, confertissime sed inaequaliter punctata, punctis versus latera inflexa sub-seriatim; oblique inspecta anterius obsolete sulcata apparent, & in his sulcis puncta crebrius congesta. Corpus subtus nigrum, magis nitidum, vix pubescens, crebre subtilissime punctulatum. Pedes elongati, nigri, femoribus omnibus clavatis nitidis, tibiis apice dense sericeo-pubescentibus.

Varietates colore dilutioni tantum differunt, super exclusæ; in var. b, caput, corpus & pedes saturate rufo-ferruginea; elytra pallidius testacea; thorax, præsertim supra, fulco-piceus; antennæ extrorsum, oculi & genua nigra; in var. c, thorax etiam rufo-ferrugineus, cætera ut in var. b.

Obs. Eum. Vitis, Fabr. Eleut. I. 422. 20. qualis e Germania obtinui, & qui cum descriptione Cl. Prof. Latreille in Gen. Ins. 3. 56. 2. omnino convenit, huic nostro, colore excepto, quoad minimum usque punctum simillimus; caput, thorax, corpus, antennæ extrorsum, nigra ut in a; Elytra, tibiae & antennarum basi rufo-testacea; femora sape in medio rufo-picea; annexa victu & climate modo prioris varietas?

### C L Y T H R A.

*Palpi quatuor inaequales, in medio crassiores. articulo ultimo conico-cylindrico. Antennæ serratae*

*serratae vel sub-serratae, semper exsertae, vix thorace longiores. Corpus breviter cylindricum, utrinque obtusum.*

2. C. 4-punctata: nigra, nitida, griseo-pubescentia, elytris ruto-testaceis, singulo maculis duabus nigris, posteriori majori, transversa, saepe duplicata.

Fabr. Eleut. 2. 31. 13. Latr. Gen. Inf. 3. 54.

I. Panz. fn. 106. f. 10. Schneid. Mag. 2. 191. 7. Schönh. synon. 2. 344. 14.

*Cryptocephalus* 4-punctatus. Rayk. fn. 2. 123. 1.

*Chrysomela* 4-punctata. Linn. Syst. 2. 596. 76.

Fn. Sv. 547. D: Geer Inf. 5. 329. 32. tab. 10. f. 7,

Habitat in foliis Coryli, Betule, aliisque, sat frequens.

Descr. Maxima nostratum hujus generis. Caput retractum, rotundatum, nigrum, opacum, fronte subtilissime rugoso-punctata, obsolete longitudinaliter canaliculata; oculi magni, oblongi, prominenti, brunnei. Antennæ thorace breviores, articulo primo magno, clavato, nigro; 2, 3, parvis, nodosis, testaceis, reliquis nigris, 4-10 interne valde productis, pectinatis; ultimo ovato, acuminato. Thorax brevis, transversus, antice late, rotundate emarginatus, lateribus & angulis posticis rotundatus, evidenter marginatus, basi bi-sinuatus, abo medio producto, rotundato; supra valde convexus, totus niger, nitidus, versus margines undique crenatim, in disco parce, subtiliter punctulatus. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, nitidum laxe. Elytra antice thorace angustiora, sed mox pone ba-

tus, pube tenui grisea adspersus. Scutellum oblongum nigrum, apice triangulariter acuminatum, basi punctatum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris valde elevatis, prominulis, thorace quadruplo longiora, apice singulatim rotundata; anum non tegentia, supra valde convexa, pone humerum transversim impresa, tota nigra, sub-nitida, griseo-pubescentia, confertissime sed inaequaliter punctata, punctis versus latera inflexa sub-seriatim; oblique inspecta anterius obsolete sulcata apparet, & in his sulcis puncta crebrius congesta. Corpus subtus nigrum, magis nitidum, vix pubescens, crebre subtilissime punctulatum. Pedes elongati, nigri, femoribus omnibus clavatis nitidis, tibiis apice dense sericeo-pubescentibus.

Varietates colore dilutioni tantum differunt, numerus exclusae; in var. b, caput, corpus & pedes saturate rufo-ferruginea; elytra pallidius testacea; thorax, praesertim supra, fusco-piceus; antennae extrosus, oculi & genua nigrae; in var. c, thorax etiam rufo-ferrugineus, cætera ut in var. b.

Obs. Eum. Vitis, Fabr. Elest. I. 422. 20. qualis e Germania obtinui, & qui cum descriptione Cl. Prof. Latreille in Gen. Ins. 3. 56. 2. omnino convenit, huic nostro, colore excepto, quoad minimum usque punctum simillimus; caput, thorax, corpus, antennae extrosus, nigra ut in a; Elytra, tibiae & antennarum basis rufo-testacea; femora sape in medio rufo-picea; annexa victu & climate modo prioris varietas?

### C L Y T H R A.

*Palpi quatuor inaequales, in medio crassiores. articulo ultimo conico-cylindrico. Antennæ serratae*

tum, fronte impressa, obsolete canaliculata; oculi parvi, prominuli, brunnei; mandibulæ maris maxime, valde arcuatæ, spatium magnum vacuum, orbiculatum, inincidentes. Antennæ, præfertim maris, thorace cum capite paullo longiores, nigrae, perum violaceo tinctæ, articulo primo magno, clavato; 2, 3, parvis nodosis; 4, majori, ob-conico; 5-10 magnis, compressis, introrsum valde dilatatis, serratis, ultimo ovato, compressio, apice sinuato. Thorax brevissimus, transversus, antice truncatus, lateribus dilatato-rofundatus, margine inæqualiter ferrato vel crenato; basi etiam fere truncatus, margine angusto angulisque sub-elevatis; supra in dorso parum convexus, totus nigro-cœruleus, parum nitidas, conæ fertilissime, evidentet rugolo-punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, vel apice obtusum, nigro-cœruleum, punctulatum. Elytra quoad structuram ut in præcedenti omnino, sed thorace vix quintuplo longiora, tota pallide testacea, immaculata, sat crebre, subtiliter vase punctulata. Corpus subitus nigro-cœruleum, sub-nitidum, crebre punctulatum, tenuo cinereo-pubescentes. Pedes validi, nigro-cœruleescentes, antici maris longissimi, coxis maximis, tibiis valde arcuatis.

Femina simillima, modo mandibulæ mediocres, vel parvæ. & pedes antici minus elongati.

3. C. tridentata: cœruleo-virescens, punctatissima, elytris testaceis immaculatis, thoracis angulis posticis elevatis, antennis brevioribus, pedibus anticus elongatis, femoribus rectis.

Schneid. Mag. 2. 191, 10. Schönh. synon. 2.

347, 27,

fin dilatata, deinde in medio leviter contracta & posterius iterum latiora, thorace sextuplo longiora, supra valde convexa, sub-cylindrica, jam saturate rufo-ferruginea, jam pallidius testacea, nitida, subtiliter punctulata, punctis hic illic sub-seriatim; in ipso callo humerali macula rotundata nigra, & paulo pone medium, suturæ proprius, altera, rarius parva, rotundata, plerumque major, transversa, inæqualis, externe angustior, quasi e duobus conflata. Corpus subtus nigrum, opacum, confertissime subtiliter punctulatum, pube tenui cinerea, sericeo-micante, nitida, obductum. Pedes validi, nigri, pube simili uti corpus obducti; pedes antici in masculis reliquis parum longiores.

Obs. Varietatem e Rossia obtinui, cui macula posterior elytrorum valde dilatata, transversum ovata; cæterum simillima.

2. *C. taxicornis*: nigro-coerulea, punctatissima, elytris testaceis immaculatis, thorace lateribus serrato, basi sub-truncato, antennis elongatis, compressis, ferratis.

*Fabr. Eleut.* 2. 34. 29. *Schönh. Iynon.* 2. 347. 30.

*Cryptocephalus taxicornis*, Payk. fn. 2. 130. 3.

*Clythra similis*, Schneid. *Mag.* 2. 191. 8. *femina*.

Habitat prope Holmiam rarissime. Dom. de Paykull & Schönherr.

Desct. Praecedente paulo minor, præsertim in elytris brevior. Caput rotundatum, nigro coeruleum, opacum, confertissime subtiliter rugoso-punctatum,

multo magis; femoribus crassis, externe rectis, interne nonnihil arcuatis; tibiæ tenues, valde arcuati.

Obit. Etsi magnam copiam speciem cum collegi & examinavi, ne unicum inveni, puncto humerali nigro in elytris notatum, unde verosimile videtur, Cl. Dom. de Paykull Clythram humerale Schneideri & Panzeri, Schönh. Syn. 2, 346, 26, ut hujus varietatem inspexisse; sed hæc dimidio, imo duplo major, mandibulæ maris multo majores, rotundato-arcuatae, &c; nec in Svecia occurrit, quantum mihi innotuit.

4. *C. longimana*: viridi-ænea, nitida, punctatissima, elytris testaceis, callo humerali fusco, thoracis angulis posticis elevatis, pedibus anticus longissimis, femoribus sub-arcuatis.

Schneid. Mag. 2. 191. 9. Schönh. synon. 2. 347. 28.

*Chryomela longimana*. Linn. syst. 2. 599. 95.  
Fn. Sv. 562.

*Cryptoccephalus longimanus*. Payk. fn. 2. 131. 4.

*Clythra tridentata*. Panz. fn. 48. f. 12.

Habitat in pratis aridis, praesertim in Trifolio montano, paucim.

Deser. Praecedenti quoad structuram similima, sed fere duplo minor, viridi-ænea, magis nitida, thorax paullo convexior, & pedes antici multo longiores, femoribus sub-flexuosis, tibiis valde arcuatis, &c. Caput viridi-æneum, nitidum, crebre subtiliter punctatum, fronte in medio profunde impressa, vertice obsolete canaliculato; mandibulæ maris magnæ, rotundatae.

Habitat in Svecia passim. Dom. *de Paykull*;  
in Finlandiæ Betula & Corylo. Dom.  
*Pfeiff.*

Descr. Magnitudo & statura brevis, fere Crypt. disparis (Cr. bipunctati F.). Caput rotundatum, nigro-cœruleum, nitidum, fronte retusa, inæquali, sat crebre punctata; os piceum; oculi prominuli, brunnei. Antennæ vix thorace longiores, compresse, articulis 4 baleos testaceis, reliquis nigro-piceis, structura ut in prioribus. Thorax brevissimus, transversus, antice sub-truncatus, lateribus & angulis posticis rotundatus, evidenter marginatus, basi leviter bi-sinuatus, supra valde convexus, pulvinatus, totus lâte rufo-testaceus, nitidus, vix visibiliter punctulatus. Scutellum nigrum, opacum, apice carinatum. Elytrorum forma ut in prioribus, supra modice convexa, cyanea vel cœruleo-violacea, interdum virescenti-micantia, confertissime & sat profunde vase punctata. Thorax subtus rufo-testaceus; pectus & abdomen nigro-cœruleo-scentia, parum nitida, crebre subtiliter punctulata, tenue pubescentia. Pedes mediocres, rufo-testacei, femoribus posticis basi nigro-cœruleis.

7. *C. affinis*: nigro-cœrulea, nitida, ore, thoracis lateribus, pedibus antennisque inferius ruto-testaceis, elytris cœruleis, confertissime punctatis.

*Ilig. Schneid. Mag. 5. 611. 17. Schön. Synon.*  
2. 349. 42.

*Cryptocephalus affinis.* *Payk. fn. 2. 132. 6.*  
*Panz. fn. 25. f. 1.*

*Clythra muciciformis.* *Schnid. Mag. 2. 194. 15.*

Habitat

## Habitat in Finlandia. Dom. de Paykull.

Descr. Parva, præcedente fere triplo minor. Caput rotundatum, nigro-cœrulescens vel virescens, fronte retusa, sub-inæquali, crebre punctulata; os testaceum; oculi majusculi, prominuli, brunnei. Antennæ vix longitudine thoracis, testaceæ, extrorsum fuscescentes, structura ut in prioribus. Thorax quo ad structuram omnino ut in proxime præcedenti, supra valde convexus, subtiliter & crebre punctulatus, in medio longitudinaliter cœruleo virescens, lateribus late luteus vel aurantiacus. Scutellum triangula-re, nigrum, opacum, læve. Elytrorum forma ut in præcedentibus omnino, thorace quadruplo longiora, supra modice convexa, cœrulea, interdum sub-virescens, nitida, confertissime & sat profunde punctata. Thorax subtus lateribus testaceus, medio niger; pectus & abdomen nigro-cœrulea, parum nitida, crebre subtiliter punctulata, tenui pubescens. Pedes mediocres, pallide testacei, femoribus posticis basi parum infuscatis;

## CRYPTOCEPHALUS.

*Instrumenta cibaria &c structura corporis ut in Clythra. Antennæ simplices, filiformes, sæpe corporis longitudine, articulis cylindrico-obconicis.*

Sect. i, Elytris, in disco saltem, vase punctatis, punctis versus latera interdum sub-seriatis.

i. C. cordiger: niger, thorace flavo-variegato, elytris rubris, punctis duobus nigris distis, S. sc., T. L. P. III. Pp sim-

Habitat in Svecia passim. Dom. de Paykull;  
in Finlandiae Betula & Corylo. Dom.  
*Pfeiff.*

Descr. Magoitudo & statura brevis, fere *Crypt.*  
*disparis* (*Cr. bipunctati F.*). Caput rotundatum, ni-  
gro-cœruleum, nitidum, fronte retusa, inæquali-  
sat crebre punctata; os piceum; oculi prominuli,  
brunnei. Antennæ vix thorace longiores, cōpres-  
sæ, articulis 4 baleos testaceis, reliquis nigro-pi-  
ceis, structura ut in prioribus. Thorax brevissimus,  
transversus, antice sub-truncatus, lateribus & an-  
gulis posticis rotundatus, evidenter marginatus, ba-  
si leviter bi-sinuatus, supra valde convexus, pulvi-  
natus, totus lâte rufo-testaceus, nitidus, vix visibili-  
liter punctulatus. Scutellum nigrum, opacum, apice carinatum. Elytrordm. forma ut in prioribus,  
supra modice convexa, cyanea vel cœruleo-viola-  
cea, interdum virescenti-micantia, confertissime &  
sat profunde vase punctata. Thorax subtus rufo te-  
staceus; pectus & abdomen nigro-cœrulecentia,  
parum nitida, crebre subtiliter punctulata, tenue pu-  
bescentia. Pedes mediocres, rufo-testacei, femori-  
bus posticis basi nigro-cœruleis.

7. *C. affinis*: nigro-cœrulea, nitida, ore,  
thoracis lateribus, pedibus antennisque in-  
ferius ruto-testaceis, elytris cœruleis, con-  
fertissime punctatis.

*Illig.* Schneid. Mag. 5, 611. 17. Schönh. synon.  
2. 349. 42.

*Cryptocephalus affinis.* Payk. fn. 2. 132. 6.  
Panz. fn. 25. f. 1.

*Clythra mucififormis.* Schneid. Mag. 2. 194. 15.

Habitat

color pallidius testaceus, sutura marginaque obscurius fuscis; juxta callum humeralem macula nigra, aut magna, ovata, aut minor, oblonga, & interius versus futuram alia parva, punctiformis; paulo posne medium maculæ dæ, transversim positæ, exteriori majori, difformi, interiori parva, sæpe cum exteriori coalita. Corpus subtus ut in priori. Redes toti nigri, maculis flavecentibus in apice femorum & coxis anticis, ut in præcedenti.

In var. b, puncta interiora elytrorum desunt, aut unum alteramve, aut ambæ; vitta media thoracis sæpe interrupta, & postice in maculas duas parvas divisa;

In var. c, punctum tantum unicum posterius adest, reliquis omnibus evanescentibus,

3. *C. variegatus*: niger, thoracis marginibus maculaque postica didyma flavecentibus, elytris testaceis, singulo punctis duobus, pedibusque totis nigris.

Fabr. Eleut. 2. 46. 27. Payk. fn. 2, 135. 8.  
Schönh. synon. 2. 359. 25.

*Cryptoceph. distinguendus*. Schneid. Mag. 2.  
209. 19. Panz. fn. 13. f. 3.

*Chrysom. cordigera*, var. *De Gœr* Ins. 5. 331.  
33.

*Chrysom. M. Uddman.* diff. 12. 23.

Var. b, thorace ut in a, elytris puncto tantum humerali nigro. Payk. Schönh. l.  
c. var. b.

*Schnid. Mag.* 2. 207. 17. *Panz. fa.* 13. f. 7.

*Schönh. synon.* 2. 357. 20.

*Cryptcephalus cordiger.* *Payk. fa.* 2. 134. 7.  
var. b.

Var. b, Punctis elytrorum paucioribus, aut tribus, aut duobus tantum in singulo, interiorum nempe vel priori, vel posteriori, vel utroque deficiente. *Schönh.* l. c. var. b; c; d; *Payk.* l. c. var. c.

*Crypt. variabilis.* *Fabr. Eleut.* 2. 44. 20.

Var. c, elytro singulo puncto tantum unicō, parvo; pone medium. *Schönh.* l. c. var. s. *Payk.* l. c. var. d.

Habitat in frutetis, apud nos rarius; in Finlandia frequentius occurrit.

Descr. Praecedenti quidem valde similis & a finis, sed paulo minor, & in pluribus distinctus. Caput nigrum, fronte sub-impressa, obsolete canaliculata, crebre punctulata; supra os maculæ tres pallide flavescentes, media majori, sub-triangulari; oculi lunati brunnei. Antennæ ut in priori, sed articulus primus obscurior, nigro-piceus, apice dilutior. Thoracis structura eadem, supra valde convexus, pulvinatus, niger, nitidus, crebre, concinne punctulatus; in utroque latere vitta lata, flavo-albida, in medio latior, interne sub-crenata, margine ipso exteriori anguste nigro-fusco; margo anticus anguste flavescens, & ab illo, in medio, vitta tertia exit, anterius angusta, postice dilatata in maculam magnam ovatam, lineola tenui longitudinali abbreviata nigra, in medio, notatam. Scutellum ut in priori. Elytrorum forma & punctura eadem, sed color

crebro & sat profunde vage punctata, sutura marginisque baseos nigro-fuscis; in ipso callo humerali macula major, oblonga, nigra, nitida, & paulo ponere medium, margini proprius, altera minor, obsoletior, difformis. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, confertissime punctulatum, tenui pubescens. Pedes mediocres, toti nigri, immaculati.

Var. b, differt tantum defectu puncti posterioris elytrorum.

In var. c, thoracis margo anticus & laterales anguste tantum testacei, & basis aut immaculata, aut lineola angusta, saepe in medio interrupta, notata; elytrorum puncta quatuor ut in a.

Var. d, quoad thoracis signaturas uti var. c, elytris macula tantum humerali ut in var. b.

**4. C. 6-punctatus: niger, thorace testaceo-variegato, elytris rufo-testaceis, margine omni, singuloque maculis tribus magnis difformibus nigris, ore albo-maculato.**

**5.**, Thorace testaceo, margine lateraliter, maculis duabus anticis fasciaque baseos abbreviata, tri-cuspidata nigris; maculis elytrorum aut distinctis, aut interioribus sutura connexis.

*Fabr. Eleut.* 2. 46. 30. *Payk. fn.* 2. 136. 9.  
*Schneid. Mag.* 2. 206. 16. a. *Schönh. Synon*  
2. 359. 28.

*Chrysomela 6-punctata.* *Linn. syst.* 2. 599. 92.  
*Fn. Sv.* 559, *De Gér Inf.* 5. 33b. 34. tab.

10. f. 9.

Var. *b*, maculis nigris thoracis cum angulis fasciæ baseos confluentibus, plagam Anchoræ formem testaceam includentibus; maculis elytrorum aut ut in *a*, aut posterioribus in fasciam continuam continatis. Schneid. Schönh. l. c. var. *b*. Panz. fn. 68. f. 7.

Var. *c*, thorace nigro, vitta laterali lata rufo-testacea, puncto nigro notata, margine antico anguste rubro, in medio lineolam simplicem, abbreviatam emittente; elytrorum maculis ut in *a* & *b*. Payk. l. c. var. *b*. Schneid. Schönh. l. c. var. *c*.

Var. *d*, thorace nigro, margine antico, lineolam latiorem abbreviatam in medio emittente, vittaque laterali utrinque, puncto nigro notata, rubris; elytris nigris, macula baseos trigona, fascia media undulata, maculaque magna apicis rufo-testaceis. Schönh. l. c. var. *f*.

Var. *e*, Thorax ut in var. *d*, elytra nigra, lunula baseos, macula obsoleta in medio marginis, & alia magna intra apicem rubris. Schönh. l. c. var. *g*.

Var. *f*, Thorace nigro, margine antico & lateralibus flavo-testaceis, elytris rubris, punctis quatuor nigris, posteriori nempe in duos diviso. Payk. l. c. var. *c*. Schönh. var. *e*.

Habits

Habitat in Corylo, Betula, passim; varietates d, e, f, in Provinciis borealibus raro occurunt.

Dicitur. Statura & magnitudo proxime praecedentium. Caput nigrum, fronte retusa, sub-impressa, subtiliter punctulata; supra os macula semi-circulare, & alia minor utrinque sub oculis, flavo-albidæ; oculi lunati nigri. Antennæ corpore paullo breviores, filiformes nigræ, articulis inferioribus subtus ferrugineis. Thorax quoad structuram omnino ut in praecedente descriptus, supra valde convexus, pulvinatus, crebre, concinne punctulatus, in a, quoad maximam partem flavo-testaceus, margine summo laterali nigro; intra apicem maculæ duæ magnæ, ovatæ, pares, nigræ, & in medio baseos fascia, utrinque abbreviata, nigra, anterius tricuspidata; fascia hæc rarius in medio interrupta, relictâ tamen lineola parva media, cuspidis medii locum tenente. Scutellum triangulare nigrum, nitidum, lœve. Elytra quoad formam omnino ut in prioribus, crebre & sat profunde vage punctata, jam saturatius rufo-testacea, jam dilutiiora, sub-nitida; in callo humerali macula magna, ovata, nigra; interiorius versus scutellum altera, paullo minor, sub-rotondata, saepè cum futura nigra connexa, paullo postea medium tertia, maxima, transversa, saepè cum margine & satura, in fasciam continuam dilatata. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, subtiliter crebre punctulatum, tenue pubescens. Pedes breviusculi, nigræ, femoribus in apice exteriori macula albida notatis, in anticis minuta, saepè obsoleta; coxae primi paris etiam antice albi.

Var. b, differt tantum maculis anticis nigris thoracis cum angulis lateralibus productis fasciae baseos confluentibus, unde discus testaceus anchoræ formam præbet; maculae elytrorum variant ut in a.

In var. c, thoracis discus totus niger, sed in utroque latere vitta lata rufa. testacea, in medio punto parvo nigro notata, & margo anticus anguste testaceus, in medio lineolam simplicem versus medium disci emittens; elytra ut in a, & b.

Var. d, & e, ut in diagnosi fusi designatae; in elytris maculae nigrae ita dilatatae & confluentes, ut maximam occupent partem.

In var. f, lineola media anterior thoracis deest, & puncta elytrorum minora, posteriori diviso.

5. C. *Coryli*: niger, fronte lineolis duabus flavis, elytris rufis, sutura fusca, thorace nitido, subtilissime punctulato, maris nigro, feminæ rufo.

*Fabr. Eleut.* 2. 45. 26. *Payk. Fn.* 2. 137. 10.

*Schneid. Mag.* 2. 204. 14. *Panz. fn.* 68. f. 6. *Schönh. synon.* 2. 352. 24.

*Chrysomela Coryli*. *Linn. syst.* 2. 598. 38. *Fn.* Sv. 555.

*Cryptocephalus vitis*. *Panz. fn.* 68. f. 5. *Crit. Rev.* t. 93. mas.

Var. b. Elytro singulo punctis duobus nigris, uno in ipso humero, altero paullo pone medium. quorum tamen aut anteriorius aut posticum interdum deest, & hoc in utroque Sexu. *Payk. Schönh. l. c. var. b. c.*

*Cryptocephalus dimaculatus*. *Næzén Att. Halm.* 1794. 268. 3. tab. 9. f. 1.

*Chryso-*

*Chrysoloma.* *Uddman. Diff. 12. 22. mas.*

Habitat in foliis Coryli, passim; mares multo rarius occuruntur.

Descr. Magnitudo & fere statura praecedentium, sed paullo longior. Caput nigrum, fronte retusa, subtiliter punctulata; oculi depresso, lunati, brunnnei. Antennæ corpore parum breviores, filiformes, nigrae, articulis 2, 3, 4, ferrugineis. Thorax brevis, anterius paullo angustior, late sed non profunde, emarginatus, lateribus vix rotundatus, late reflexo-marginatus, basi bisinuatus, supra valde convexus, palvinatus, subtilissime parce punctulatus, maris totus niger, feminæ supra rufus, in utroque nitidissimus. Scutellum oblongum; nigrum, nitidum, læve, apice elevatum, rotundatum. Elytra quoad structam ut in prioribus, thorace quintuplo longiora, supra convexa, rufa, vel rufo-testacea, parum nitida, subtiliter & minus crebre punctulata, punctis in dorso hinc inde sub-seriatim; callus humeralis oblongus, valde elevatus, & juxta illum interne sovea sat profunde impressa, in ipsa basi; futura communis & margo baseos anguste nigro-fusca. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, crebre subtiliter punctulatum, tenue pubescens. Pedes toti nigri, femoribus nitidis.

Var. b, differt tantum punctis nigris in elytris, uno parvo, nitido, in callo humerali, altero paullo majori in disco pone medium obfoletiori; saepe tandem deest aut prius, aut posterius, & hoc in utroque sexu.

6. C. Pini: testaceus, elytris pallidioribus, oculis antennarumque apice nigris, capite thoraceque confertissime punctulatis.

*Eabri.*

*Fabr. Eleut.* 2. 56. 83. *Payk. Th.* 2. 138. II.

*Schneid. Mag.* 2. 211. 21. *Panz. Th.* 39. I.

17. *Schönh. synon.* 2. 369. 87.

*Chrysomela Pini.* *Linn. Syst.* 2. 598. 89. *Fn.* 556.

Var. b, saturatius rufo-testaceus, corpore subtus elytrorumque dilco interdum nigro-brunneis. *Payk. Schönh. l. c. var. b.*

Habitat in Pini Sylvestris frondibus, frequens.

Deser. Præcedentibus longe minor, Cr. Morzi æqualis; mas adhuc duplo minor femina, ut in illo, & plerumque subtus obscurior, fuscō-brunneus. Caput testaceum, fronte retusa, confertissime subtiliter punctulata; oculi oblongi, lunati, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, basi testaceæ, extrorsum nigrae, articulis gradatim paullo crassioribus, interne nonnihil dilatatis. Thorax brevis, antice parum emarginatus, lateribus nonnihil rotundatus, late marginatus, basi bi-finuatus, supra modice convexus, rufo-testaceus, sub-nitidus, confertissime subtiliter punctulatus, margine antico anguste, lateralibus latins pallide testaceis vel flavescentibus. Scutellum sub-triangulare pallide testaceum, parce punctulatum. Elytra quoad formam fere ut in prioribus, thorace vix quintuplo longiora, apice singulatim rotundata, supra modice convexa, pallidius testacea, sœpe flavescentia, præfertim versus latera, suturam & apicem, disco antico saturatius testaceo; undique sat crebre & profundius quam thorax, vase punctata. Corpus subtus saturatius testaceum, subtiliter crebre punctulatum, tenue pubescens, in masculis pectus & abdomen plerumque adhuc obscuriora,

seuriora, fusco-brunnea. Pedes breviusculi, validi, pallide testacei, tibiis compressis, apice dilatatis.

Var. b, colore obscuriori differt; discus elytrorum, pectus & abdomen fusco-brunnea, rarius nigra; ē sexū masculino tantum tales vidi.

7. *C. sericeus*: viridi-sericeus, aureo, aeneo vel cœruleo-scenti-micans, antennis nigris, thorace evidenter punctulato, clytris rugoso-punctatis, apice singulatum rotundatis, juxta scutellum elevatis.

*Fabr. Eleut.* 2. 49. 46. *Latr. Gen. Inf.* 3. 54.

i. *Payk. fn.* 2. 139. 12. *Schneid. Mag.* 12.

214. 26. *Panz. fn.* 102. f. 13. *Schönh. syn-*  
*non.* 2. 361. 42.

*Chryomela sericea.* *Linn. syst.* 2. 598. 36. *Fn.*  
*Sv.* 554. *De Gér Inf.* 5. 334. 47.

Var. b, totus cœruleus vel violaceus. *Payk.*  
*Schneid. l. e. var. b. Schönh. var. c.*

Var. e, cupreo-violaceus, versus latera vi-  
rescens. *Schneid. var. c. Schönh. var. d.*

Habitat in floribus, præsertim Hypocheris-  
dis & Hieraciorum, ubique frequens; var.  
b, & c, parcius occurunt.

Descr. Majores *C. Coryli* statura & magnitudi-  
ne æquales, sed variat duplo, imo triplo minor. Ca-  
put valde retractum, fronte retusa viridi ænea, con-  
fertissime rugoso-punctata, in medio obsolete impref-  
sa, ore piceo; oculi depresso, lunati, brunnei. An-  
tennæ dimidio corpore paulo longiores, nigræ, se-  
ticuæ

*Fabr. Eleut.* 2. 56. 83. *Payk. fn.* 2. 138. II.

*Schneid. Mag.* 2. 211. 21. *Panz. fn.* 39. I.

17. *Schönh. synom.* 2. 369. 87.

*Chrysemela Pini.* *Linn. Syst.* 2. 598. 89. *Fa.*  
*Sv.* 556.

Var. *b*, saturatus rufo-testaceus, corpore  
subtus elytrorumque dilco interdum nigro-  
brunneis. *Payk. Schönh. l. c. var. b.*

**N**abitat in Pini Sylvestris frondibus, fre-  
quens.

Descr. *Præcedentibus longe minor*, Cr. Morai  
æqualis; mas adhuc duplo minor femina, ut in illo,  
& plerumque subtus obscurior, fuscò-brunneus. Ca-  
put testaceum, fronte retusa, confertissime subtiliter  
punctulata; oculi oblongi, lunati, nigro-brunnei.  
Antennæ dimidio corpore paullo longiores, basi te-  
stacea, extrorsum nigræ, articulis gradatim paullo  
crassioribus, interne nonnihil dilatatis. Thorax bre-  
vis, antice parum emarginatus, lateribus nonnihil  
rotundatus, late marginatus, basi bi-finuatus, sa-  
modice convexus, rufo-testaceus, sub-nitidus, con-  
fertissime subtiliter punctulatus, margine antico ar-  
guste, laterilibus latius pallide testaceis vel flave-  
scentibus. Scutellum sub-triangulare pallide testa-  
ceum, parce punctulatum. Elytra quoad formam  
fere et in prioribus, thorace vix quintuplo longiora,  
apice singulatim rotundata, supra modice convexa,  
pallidius testacea, saepè flavescentia, præsertim versus  
latera, futuram & apicem, disco antico saturatus te-  
staceo; undique sat crebre & profundius quam tho-  
rax, vage punctata. Corpus subtus saturatus testa-  
ceum, subtiliter crebre punctulatum, tenue pubescens,  
in masculis pectus & abdomen plerumque adhuc ob-  
scuriors,

seuriora, fusco-brunnea. Pedes breviusculi, validi, pallide testacei, tibiis compressis, apice dilatatis.

Var. b, colore obscuriori differt; discus elytrorum, pectus & abdomen fusco-brunnea, rarius nigra; e leâu masculino tantum tales vidi.

7. *C. sericeus*: viridi-sericeus, aureo, aeneo vel cœruleo-scen-ti-micans, antennis nigris, thorace evidenter punctulato, elytris rugoso-punctatis, apice singulatum rotundatis, juxta scutellum elevatis.

*Fabr. Eleut.* 2. 49. 46. *Latr. Gen. Inf.* 3. 54.

1. *Payk.* fn. 2. 139. 12. *Schneid. Mag.* 12. 214. 26. *Panz.* fn. 102. f. 13. *Schönh. synon.* 2. 361. 42.

*Chryomela sericea*. *Linn. syst.* 2. 598. 86. *Fm.* Sv. 554. *De Gér Inf.* 5. 334. 47.

Var. b, totus cœruleus vel violaceus. *Payk.* *Schneid.* l. s. var. b. *Schönh.* var. c.

Var. c, cupreo-violaceus, versus latera virescens. *Schneid.* var. c. *Schönh.* var. d.

Habitat in floribus, præsertim Hypocheridis & Hieraciorum, ubique frequens; var. b, & c, parcius occurunt.

Descr. Majores *C. Coryli* statura & magnitudine æquales, sed variat duplo, imo triplo minor. Caput valde retractum, fronte retusa viridi ænea, confertissime rugoso-punctata, in medio obsolete impressa, ore piœo; oculi depresso, lunati, brunnei. Antennæ dimidio corpore paulo longiores, nigrae, articulatae;

ctulatus. Corpus subtus nigrum, perparum cœrulcenti-micans, creberrime punctulatum; tenui pubeſcens; ſegmentum ultimum ventrale integrum, convexum. Pedes nigri, ſtructura ut in priori, femoribus parum cœrulecentibus.

9. *C. nitens*: niger, thorace lœvissimo elytrisque nigro- cœruleis nitidis, ore, antenarum baſi pedibusque totis flavis, elytrorum diſco vague, ſubtiliter punctato; Femina.

*Fabr. Eleut.* 2. 49. 47. *Payk. fn.* 2. 140. 13.  
a. *Panz. fn.* 68. f. 8. *Schneid. Mag.* 2.  
216. 28. var. b. *Schönh. synon.* 2. 362. 43.

*Chryſomela nitens*, *Linn. Jyſt.* 2. 598. 84. *Fn.*  
*Sv.* 551. *De Gér. Inſ.* 5. 334. 28.

Mas: dimidio minor, antennis longioribus, vertice punctis duobus flavis remotis, pedibus quatuor posterioribus nigris, primi paris flavis, femoribus externe linea nigra. *Payk. l. e. var. b. Schneid. l. c. iph*  
*Species descripta.*

*Cryptocephalus affimilis*. *Herbft. Archiv.* 4. 63 13.

*Cryptocephalus flavifrons*. *Fabr. Eleut.* 2. 51.  
*Schönh. synon.* 2. 365. 60.

Habitat in foliis *Betule albeæ*, *Alni*, ſat frequens.

Descr. Cr. bipunctato paullo angustior, sed non brevior. Caput retractum, fronte retula nigro-cerulea, parce punctulata, obsolete canaliculata; supra os macula magna triangularis flava in medio, & alia minor utrinque, priori contigua, fabro tamen ipso nigro-cerulecente; oculi depresso, lunati, brunnei. Antennae dimidio corpore longiores, tenues, filiformes, articulis 4 vel 5 baseos flavescens, reliquis nigris. Thorax omnino ut in Cr. fericeo constructus, supra fere adhuc magis convexus, pulvinatus, totus nigro-ceruleans, nitidissimus, omniho lœvis. Scutellum triangulare, nigro-ceruleans, nitidum, lœve, apice adscendens. Elytra quoad formam etiam ut in Cr. fericeo, apice singulatim rotundata, dehiscentia, anum non tegentia; supra modice convexa, callo humerali & futuræ basi juxta scutellum elevatis; tota nigro-cerulea, nitida, punctis minutis impressis, versus basin & futuram sub-feriatis, in disco exteriori vagis, parce adspersa. Podex pone elytra, uti totum corpus subitus, nigra, vix cœrulecenti-micantia, subtilissime punctulata, tenue pubescentia, segmento ultimo ventris in medio profunde impressa. Pedes breviuscui, toti pallide testacei vel flavescentes.

Mas dimidio minor, antennis longitudine fero corporis; præter maculas flavas supra os, lineolas duæ parvæ ejusdem coloris in vertice; ad marginem superiorem singuli oculi; pedes primi paris flavi, femoribus externe versus apicem linea nigra; posteriores quatuor nigri, femoribus intermediis basi subitus flavescens; segmentum ultimum ventrale integrum, non impressum.

Obs. Cr. flavifrons, Fabr. I. c. ad masculum jam descriptum pertinere videtur, nam elytra ut vix striata describuntur, & reliqua satis apte concordant.

10. C.

Ins. Svec. T. I. P. LII.

Qq

*Chrysomela glauco-cephala.* Schall. *Act. Hall.* 1.  
277.

*Chrysomela Bothnica var.* De Gér. *Inj.* 5.  
336. 39.

Habitat in foliis Betulæ, Populi, passim.

Descr. Statura omnino Cr. nitentis; sed dimidio minor in utroque Sexu, Cr. Moræi magis æqualis & similis; sed in illo thorax subtiliter punctulatus; elytra regulariter punctato-striata; os & maxima pars pedum nigra; elytra flavo-maculata, &c. Caput retractum, fronte retusa, subtiliter punctulata, in vertice canalicula brevi exarata, ubi cum ore flava; vertice ipso anguste nigro; supra labrum macula triangularis fusca in femina; oculi depresso, lunate, brunnei. Antennæ corpore paullo breviores, filiformes; a basi fere ad medium flavo-testaceæ, dein nigræ, pubescentes. Thorax quoad structuram ut in proxime præcedentibus omnino; totus niger, nitidus, laevissimus, politus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, laxe, postice elevatum. Elytrum forma ut in prioribus omnino, suturæ basi juxta scutellum etiam in tuberculum elevata; tota nigra, minus nitida; anterius evidenter, parce punctata, punctis in strias, licet parum regulares, dispositis; posterius fere laeva, vel obsoletissime punctulata; margo lateralis a basi fere ad medium anguste albûs. Anus extra elytra & totum corpus subitus, nigra, sub-nitida, crebre punctulata. Pedes mediocres, validi, anteriores quatuor flavo-testacei, femoribus supra linea nigra notatis; femoris postica nigra, nitida, genibus tibiisque testaceis, tarlis fuscis.

Mas dimidio minor; Antennæ longitudine composis; macula triangularis nigra supra os deest; ipse mar-

margo anticus thoracis elevatus niger, sed intra illum linea angusta alba, contigua, quæ & latera ad angulum posticum usque cingit, & versus angulum anticum magis dilatata, lineam punctatam nigrum includens; segmentum ultimum ventris convexum, integrum, quod in femina profunde impressum; cætera ut in femina omnino.

**12. C. 4-pustulatus:** niger, ore, antennarum basi, pedibus anterioribus thoracisque lœvissimi angulis anticis flavo-testaceis, elytris irregulariter sub-seriato-punctatis, macula marginali apicisque flavo testaceis.  
Mas: dimidio minor, antennis longioribus, segmento ultimo ventrali non impresso.

*Fabr. Eleut.* 2. ss. 75. ? *Schönh. synon.* 2. 369.  
80.

**Var. b,** elytris apice immaculatis, mas & femina.

**Habitat in** foliis arborum & fruticum, pal-

sim.

**Descr.** Præcedenti magnitudine & statura similis, sed punctura elytrorum & signaturis diversus; Cr. Moræi primo intuitu adhuc magis similis, sed thorax lœvissimus, elytrorum striæ irregulares, &c. Caput retractum, fronte retusa nigra, sub-nitida, subtiliter punctata, ore facieque infera sub-antennis flavo-testaceis; palporum & mandibularum apices nigro-fusci; oculi lunati, nigro-brunnei. Antennæ ut in prioribus, basi flavo-testaceæ, extorsum nigrae. Thoracis structura ut in præcedentibus omnino, supra valde convexus, pulvinatus, niger nitidus, lœvis-

Var. f, Elytris nigris immaculatis. Payk.  
Schönh. I. c. var. f.

Habitat in foliis Coryli, Betulæ, Salicis,  
&c. frequens; varietates c, - f, tamen  
parcius occurunt.

Descr. Medius, Cr. 6-punctato paullo angu-  
stior; variat etiam dimidio minor. Caput nigrum,  
fronte retusa, sub-inaequali, crebre subtiliter & ob-  
solete punctata; oculi depresso, lunati, brunnei. An-  
tenæ in utroque sexu longitudine fero corporis, filiformes,  
articulo primo magno obconico, piceo;  
2, 3, 4, angustis, ferrugineis, reliquis nigris, ultimo  
lineari-elongato, præcedentibus angustiori, sub-acu-  
minato. Thorax quoad structuram omnino ut in Cr.  
sericeo, nitente, &c. supra valde convexus, pulvina-  
tus, totus niger, nitidus, laevissimus, politus. Scu-  
tellum oblongo-triangulare, nigrum, nitidum, lave,  
spice adscendens. Elytrorum forma etiam omnimo-  
de ut in Cr. sericeo, aut saturatius rufa, aut diluti-  
rus rufo-testacea, nitida, sat regulariter & profunde pan-  
ctato-striata, striis nonnihil obliquis; limbus totus  
undique niger, & præterea in callo humerali eleva-  
to punctum parvum, oblongum, nigrum, & paulo  
pone medium in disco interiori macula major, aut  
rotundata, aut oblonga, anterius producta, acumina-  
ta, ejusdem coloris. Corpus subtilis nigrum, parum  
nitidum, crebre subtiliter punctatum, tenue pub-  
escens. Pedes longiusculi, toti nigri, femoribus  
nitidis.

Var. b, differt maculis nigris elytrorum dilata-  
tis, confluentibus in vittam vel plagam magnam lon-  
gitudinalem, abbreviatam, neque basin nec apicem  
attingentem; ex hac, ut & reliquis varietatibus am-  
bo occurunt sexus, ut ex copulatione, & quoque  
ex impressione profunda in ultimo segmento ventra-  
li

Si feminæ concludendum; saepius tamen hanc vari-  
etatem cum a copula junctam vidi, & plerumque  
ut illius mas.

In var. c, plaga nigra disci ita dilatata, ut lim-  
bus rufescens valde angustus intra margines remanet.

In var d, Elytra nigra, macula intra apicem  
aut rotundata, aut sub-lunata rubra, & in disco an-  
tico prope scutellum alia, valde obsoleta.

Var. e, ut var. d, sed litura disci deest.

In var. f, macula apicis etiam deest, & elytra  
tota nigra, immaculata; varietates d. e, f, nunquam  
cum prioribus copulatas vidi, quare dubium de iden-  
titate specifica remanet; præter colorem, nullam ta-  
men notam distinctivam investigare potui.

24. C. Moræi: niger, macula frontalí cru-  
ciata, thoracis margine antico angulisque  
posticis flavis, elytris maculis duabus mar-  
ginalibus flavo-testaceis, thorace subtiliter  
punctulato; Mas.

Femina: dimidio major, fronte maculis tan-  
tum duabus flavis, thoracis margine an-  
tico immaculato.

*Fabr. Eleut.* 2. 52. 61. *Payk. fn.* 2. 145. 17.

*Panz. fn.* 68. f. II. *Schneid. Mag.* 2. 201.

7. *Schönh. synon.* 2. 365. 63.

*Chrysomela Morzi.* *Linn. syst.* 2. 597. 82, *Fa.*  
*Sv.* 550.

*Cryptocephalus 4-pustulatus.* *Schrantz. Fuerstly.*  
*Neue Mag.* 2. 319. 27. *fem.*

Habitat in Hyperico quadrangulo & per-  
forato, sat frequens.

Descr. Cr. flavigredi, secundum utramque sexum, magnitudine aequalis, illi & Cr. 4 - punctulato etiam quoad colorem & signaturas simillimus, sed thorace subtiliter punctulato elytrisque regulariter punctato-striatis ab utroque distinctus, ut apud illos dictum. Caput retusum, fronte nigra, crebre subtiliter punctulata, litura flava cruciformi vel potius litteram X referente, notata, & praeterea sub quovis oculo macula parva triangularis flava; oculi lunati, depresso, nigro-brunnei. Antennae longitudine fere corporis, filiformes, nigrae, inferne fusco-ferruginea. Thorax latitudine brevior, antice paullo latior, vix emarginatus, angulis & lateribus valde deflexis, compressis, unde ibi angustior appareat; lateribus obliquis, fere rectis, anguste marginatis; basi bi-sinuatus, angulis acuminatis, sub-elevatis; supra valde convexus, pulvinatus, niger, nitidus, sed crebre subtiliter punctulatus; juxta marginem anticam linea angusta flava continua, margine tamen summo tenuissime nigro, & in quovis angulo postico macula triangularis flava sub-elevata. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, nitidum, laxe, apice elevatum. Elytrorum forma ut in prioribus omnino, supra modice convexa, nigra, nitida, sat regulariter & profunde punctato-striata, intersticibus laxeibus; juxta humerum macula marginalis oblonga flava, utrinque attenuata, medium marginis fere attingens, & juxta apicem altera, transversim ovata, ejusdem coloris. Podex & corpus subtus nigra, sub-nitida, crebre subtiliter punctulata. Pedes longiusculi, nigri, femoribus anticus subtus linea flava, tibiis ejusdem parvis piceis.

Femina dimidio, itmo duplo major, fronte nigra, maculis duabus oblongis flavis, partibus, supra antennarum insertionem; margino anticus thoracis disco concolor, absque striga flava; maculae elytrorum plerumque saturiores, flavo-testaceæ; cætera ut in male. Obs.

Obs. Var b, Schneid. & Schönh. l. c. e Germania sub nomine „Cr. bivittatus“ missa, quoad signaturas capitis & thoracis, masculis Cr. Morzei similissima, sed plus duplo majora elytra profundius striata, macula anterior in fasciam utrinque dentatam, suturam fere attingentem, dilatata, & posterior etiam multo major quam in nostra; tibiæ omnes plurimque testaceæ; utrum hæc mera varietas, vel plus propria Species, pro certo dijudicare nequeo, nec talis apud nos occurrit.

15. C. 10-punctatus: niger, thorace punctulato, vitta media, posterius dilatata, maculisque lateralibus, fronte pedibusque anterioribus flavo-testaceis, elytris flavis, maculis quinque nigris.

Fabr. Elut. 2. 53. 66. Schneid. Mag. 2. 197.  
4. Panz. fn. 68. f. 12. Schönh. Synon. 2.  
366. 68.

*Chrysomela* 10-punctata Linn. Syst. 2. 599. 23.  
Fn. Sv. 560.

*Cryptocephalus varians.* Payk. fn. 2. 149. 21.  
var. b.

Var. b, maculis elytrorum dilatatis, vario modo confluentibus. Schneid. l. c. var. a.  
Schönh. var. b.

Var. c, elytris nigris, thoracis margine antico vittaque media postice dilatata, striola fusca divisa, testaceis. Payk. l. c. a.  
Schneid. var. c. Schönh. var. f.

*Cryptocephalus Bothnicus.* Fabr. Eleut. 2. 45.  
22. Panz fn. 68. f. 3.

*Chrysomela Bothnica* Linn. syst. 2. 598. 90. Fn.  
Su. 557.

Var. *a*, linea media testacea thoracis abrupta, posterius punctis duobus oblongis aucta. Schönh. l. c. var. *c*.

*Cryptocephalus ornatus.* Herbst. Archiv. 4. 63.  
15. tab. 23. f. 24.

Var. *c*, thoracis vitta media testacea angusta, simplici, abbreviata, vix medium disci attingente. Schneid. var. *d*.

*Cryptocephalus Bothnicus.* Herbst. Archiv. 7.  
164. 21. tab. 44. f. 8.

*Chrysomela Bothnica.* De Géer Inf. 5. 335. 39.

Habitat in foliis Salicis cinereæ, passim.

Descr. Statura & magnitudo præcedentis; variatiam dimidio minor. Frons retusa, crebre subtiliter punctulata, sub antennis flavo-testacea, superne nigra, macula magna biloba flavo-testacea, cum flavedine oris connexa; oculi depresso, lunati, brunnei. Antennæ corpore paullo breviores, inferne ferrugineaæ, extrosum paullo crassiores, nigræ. Thorax brevis, antice paullo angustior, parum emarginatus, lateribus rotundatus, marginatus, basi bi-finuatus, supra modice convexus, sat crebre punctulatus, niger, nitidus; margo anticus jam totus, jam in medio tantum flavo-testaceus; in medio dorsi vitta lata ejusdem coloris, cum margine antico connexa, posterius angulariter valde dilatata, basin non omnimode attingens, postice lineola fusco-ferruginea notata; in utroque latere macula flavo-testacea, aut magna, elongata;

gata, cum flavedine marginis antice contexa, aut minor, separata; in medio laterali foveola transversa impressa utrinque. Scutellum sub-triangulare, nigrum, nitidum laxe. Elytrorum forma ut in prioribus omnino, supra modice convexa, regulariter & sat profunde punctato striata; laxe flava, margine omni anguste nigro; in ipso humero macula ovata nigra, margini connexa, interius versus scutellum altera, paulo major, rotundata, libera; tertia in medio marginis & illi connexa, quartaque ei opposita in disco interiori, ambae rotundatae; quinta intra apicem paulo minor, transversim ovata. Podex & corpus nigra sub nitida, crebre subtiliter punctulata. Pedes breviusculi, tenues, femoribus quatuor anterioribus supra linea nigra, posticis aut totis aut in medio plus minusve nigro piceis.

In var. b; cibof niger magis dilatatus; thoracis maculæ laterales testaceæ aut parvæ, aut omnino defunt; margo anticus & vitta media angustiores; maculæ nigrae elytrorum valde dilatatae; vario modo confluentes; aut omnes; aut anteriores per partia fascias constituentes; plerique hujus varjetatis masculini sexus sunt.

In var. c, d, elytra tota nigra; thorax etiam niger; marginis antico & vitta media longitudinali flavo-testaceis; vitta illa aut continua, posterius dilatata, lineola fusca in medio posteriori divisa; aut in medio abrupta, parte posteriori in lineolas duas parvas separata;

Var. e, ut var. c, d, sed vitta media thoraco parva, angusta, valde abbreviata, ab apice vix medium disce attingens, & margo anticus tantum in medio testaceus; variat etiam thorace fere toto nigro; absque vitta testacea, marginis antico vix vel parvam testaceo-marginato.

Obs. varietates c, & d, Schönh. Syn. iii Svecia non occurunt, quantum mihi innotuit. Var. c, d, e, saepè

shape cum a; & b; copula connexas vidi, & priores semper ut feminas.

16. C. *Insignis*: niger, thorace lævissime, macula antica pallida, elytris atro-cyanis, subtilissime punctato-striatis, ore pedibusque pallidis.

*Payk. Act. Holm. 1799. p. 116. Fn. Sv. 3. add. 453. 20. 21. Schönh. Synon. 2. 365. 62.*

Habitat in Insula Singön Røslagiæ, rarissime; Dom. *Granberg*; mihi non visus, quare descriptionem Cl. Dom. de *Paykull* transscribo.

Descr. Cr. Moræi vix major. Caput antice pallidum, clypeo obscuriori, postice nigrum, punctulatum; Antennæ corpore paullo longiores, filiformes, simplices, nigrae, basi flavescentes. Thorax longitudine antice fere dimidio, postice vix duplo latior, convexus, lævissimus, marginatus, niger, nitidus, macula magna antica pallida, punctum vel maculam minorem fuscescentem antice includente. Scutellum minutum, nigrum. Elytra thorace vix latiora, at latitudine plus quam dimidio longiora, atro-cyanæ, nitida, cylindricæ, abdomen obtentus, subtilissime punctato striata, oculo armato rugis lævissimis intersectis. Pectus & abdomen nigra, opaca. Pedes flavo-pallidi.

Obs. Cl. Dom. Schönberr *Crypt. communica-*  
vit, huic, ut videtur affinem, Cr. Moræi paullo ma-  
jorem, cui character: „Niger, nitidus, fronte, tho-  
raco lævissimi margine antico anguste, lateribus la-  
te, sinuatim, pedibusque totis flavo-testaceis, elytris sub-

subtiliter punctato-striatis; sed patria hujus incerta; quare ulterior descriptio omittitur.

17. *C. flavidabris*: cœruleo-violaceus, ore antennarumque basi flavo-testaceis; thorace punctulato, postice obsolete impresso, elytris profunde punctato-striatis, pedibus virescentibus.

Fabr. Eleut. 2. 51. 57. Rayk. fn. 2. 146. 18.  
Schneid. Mag. 2. 217. 29. Schönh. synon. 2.  
364. 56.

Var. *b*, elytris puncto apicis flavescente.  
Payk. Schönh. var. *b*.

Var. *c*; supra niger; subtus nigro-cœruleus.

*Chrysomela* *Barbareæ*. Linn. syst. 2. 598. 85.  
Fn. Sv. 552?

*Cryptocephalus* *Barbareæ*. Marsh. Ent. Br. 1.  
512. 13. Schönh. synon. 2. 364. 55.

Habitat in foliis Betulæ albæ, passim.

Descr. Cr. Moræi quoad utrumque sexum magnitudine sub æqualis, vel paulo longior; Mas dimidio minor femina, magis virescens, antennis longioribus. Caput cœruleo-virescens, nitidum, crebre punctulatum, vertice obsolete canaliculato; regio oris infra antennas flavo-testacea, labro nigro piceo; oculi lunati, depresso, brunnei. Antennæ maris longitudine corporis, feminæ paulo breviores, in utroque basi testacea, extrosum gradatim paulo crassiores, nigrae. Thorax latitudine brevior, antice non-nihil emarginatus, angulis deflexis, prominulis, leviter

teribus parum rotundatus, late marginatus, basi bimarginatus, supra valde convexus, pulvinatus, coeruleo-violaceus vel virescens, nitidus, sat crebre, subtiliter punctulatus; in medio baseos ante scutellum foveolæ duæ impressæ, obsoletæ, obliquæ, versus margines laterales leviter continuatæ. Scutellum triangulare, nigro-violaceum, laxe, apice adscendens. Elytra quoad structuram ut in prioribus omnino, et jam callo humerali & tuberculo communis juxta scutellum elevatis; tota coeruleo-violaceo, nitida, profunde & sat regulariter punctato-striata, striis versus apicem tenuioribus, evanescentibus. Podex & corpus subtus nigro-coeruleo, nitida, crebre subtiliter punctulata. Pedes breviusculi coeruleo-virescens, interdum viridiænei, nitidi.

Var. b. differt tantum macula parva transversa testacea intra apicem elytrorum.

Var. c. colore obscuriore tantum differt; corpus fere totum supra nigrum, versus latera tamen plerunque violaceo-micans; subtus nigro-coeruleo, scens pedibus magis virescentibus. Chrys. Barbareæ Linn. l. c. forte talis obscura varietas, alias illa mihi ignota.

Obs. Cl. Dom. Prof. Illiger in Mag. 3. 168. 57. Cr. flabilabrem masculum Cr. marginati esse contendit, sed apud nos mas & femina temperissimili occurunt, nec Cr. marginatum unquam in Svecia inventum audivi; quare de identitate specifica dubium remanet;

ig. C. punctiger: niger, fronte, thoracis margine antico, antennarum basi pedibusque anterioribus flavo-testaceis, thorace punctato, elytris coeruleis, profunde punctato-striatis.

*Payk.*

*Payk. sp. 2. 146. 19. Schönh. synon. 2. 364. 57.*

Habitat in foliis Salicis, Capreæ, passim.

Descr. Cr. labiato paullo longior, sed femina ejus non crassior. Caput postice nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum, vertice caudicula brevi exarato; regio oris sub antennis tota flava, macula frontali biloba supra antennarum insertionem, cum flavedine inferiori cohaerente; oculi lunati, nigro-brunnei. Anterioræ corpore breviores, basi testaceæ, extrorsum paullo crassiores, nigræ. Thorax brevissimus, transversius, antice paullo latior, truncatus, angulis valde deflexis compressis, lateribus parum rotundatus, evidenter marginatus, basi bi-sinuatus, supra valde convexus, pulvinatus, niger nitidus, sat evidenter sed minus crebre punctatus; ipse margo anticus anguste, ut & anguli anteriores & rarius margines laterales angustissime flavescentes; versus latera dorsi utrinque foveola obliqua indeterminata impressa. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, laxe, apice elevatum. Elytra quoad structuram ut in prioribus, apice obtuse rotundata, anum fere tegentia, supra modice convexa, cœrulea vel cœruleo-virescentia nitida, regulariter profunde punctato-striata, interstitiis laxeibus; callus humeralis & regio scutelli elevati ut in prioribus. Corpus subtus nigrum, nitidum, crebre, subtiliter punctulatum. Pedes longisculi, validi, anteriores quatuor flavo-testacei, femoribus supra linea fusca; postici nigri, tarvis dilutioribus;

19. *C. pallifrons*: supra nigro-cœruleus, subtus niger, fronte, antennarum basi pedibusque flavo-testaceis, thorace laxeviso, elytris profunde punctato-striatis.

*In. Svec. T. I. P. III.*      Rr      Habi-

**Habitat in follis Betule, Salicis, ratibus.**

Descr. **Magnitudo**, statūra & summa similitudo præcedentis, sed thorax lævissimus, cœruleſcent, vix flavo-marginalis, pedes postici etiam flavescentes, femoribus in medio tantum fuscis, etc. Frons ferè tota flava, parce ſubtiliter punctulata, vertice lineola longitudinali abbreviata nigra; dum caput magis exfertum, vertex ipfe etiam transverſim niger; palpi anteriores fusco-picei; oculi lunati bruhnei. Antennæ corpore paulo breviores, bafi flavo-testacea, extroſum gradatim multo crassiores, nigrae. Thorax quoad structuram ut in præcedenti omnino, ſupra nigro-cœruleus, nitidus, lævissimus, foveola laterali obliqua utrinque impressus, ut in priori; intra angulum anticum utrinque lineola parva, brevis, flavo-testacea. Scutellum ut in priori, sed nigro-cœruleſcens. Elytrotum forma, color, ſtriae & omnia ut in præcedenti omnino. Podex & corpus totum subtus nigrum, nitidum, parum violaceo-vel cœruleſcenti-nigricans, ſat crebre punctulatum. Pedes longisculpi, validi, flavo-testacei, femoribus anterioribus ſupra linea fusa, poſticis in medio annulo latè nigricante,

so. **C. frontalis:** niger, nitidus, fronte, antennarum bafi, pedibus, thoracis marginalibus, elytrorum costa antica, ſcutellique apice flavo-testacea, thôrace brevi lævifimo.

*Marth. Ent. Br.* 1, 211-12. *Schönh. synon.*  
2. 365. 59.

*Cryptoccephalus labiatus.* *Schneid. Mag.* 2. 204.  
12, var. b.

Hab-

Habitat in foliis Betale abae, rarius.

Descr. Proxime praecedentibus paulo brevior, sed non angustior, feminae Cr. labiati æqualis; sed thorax brevior, elytrorum striæ magis regulares, ad apicem usque excurrentes, & signaturæ pallidæ longe aliæ. Frons fere tota flava, parce punctata, vertice ipso, in medio lineolam vel maculam oblongam emitte, nigris; oculi lunati brunnei. Antennæ corpore parum breviores, basi pallidæ, extrorsum gradatim crassiores, nigrae. Thorax brevissimus, transversus, omnino ut in proxime praecedentibus constructus, niger, nitidus, laevissimus, foveola obliqua utrinque impressus, ut in prioribus; margo anticus totus, ut & anguli anteriores & pars anterior marginis lateralis pallide flavo-testacei. Scutellum oblongo-triangulare, pallide flavum, basi fulcum, apice elevatum. Elytrorum forma fere ut in prioribus, sed paullo breviora, supra modice convexa, nigra, nitida, profunde punctato-striata, striis lateralibus ad apicem usque excurrentibus, intersticiis planis, laevibus; margo lateralis a basi ultra medium linea flavo-albida cinctus, Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes longiusculi, validi, flavo-testacei, femoribus anterioribus supra linea fusca, posticis in medio late nigro-fusca.

21. C. labiatus: niger, ore, antennarum basi pedibusque anterioribus flavis, thorace laevissimo, elytris anterius profunde punctato-striatis, apice laevibus.

Fabr. Eleut. 2. 51. 56. Payk. fn. 2. 147. 20.  
Panz. fn. 48. f. 9. Schmid. Mag. 2. 203.  
12. Schanh. synon. a. 363. 33.

R 2

Chry-

*Chrylomela labiata.* Linna. Syst. 2. 598. 87. Fa.  
Sv. 553.

Habitat in soliis Betulæ, Alni, Salicis, frequens ubique; Larva intra saccum subcylindricum fuscum degit.

Deser. Parvus, Cr. minuto æqualis; mas plurimque dimidio minor femina. Frons supra antenæ nigra, nitida, vix punctulata, obsolete canaliculata, sub antennis, una cum ore, fere tota flava. Oculi lunati brunnei. Antennæ maris longitudine corporis; feminæ breviores; in utroque sexu basi flavae; extrosum gradatim crassiores nigræ, pilis paucis longioribus adspersæ. Thorax latitudine paulo brevior, antice compressus, subemarginatus, angulis nonnihil prominulus, lateribus parum rotundatus, late marginatus, basi sat profunde bisinuatus, supra valde convexus, pulvinatus, totus niger, levissimus, nitidus, politus. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, nitidum, læve, spicæ adscendentes. Elytra quoad formam ut in prioribus omnino, cæto humerali & suturæ basi elevatis, tota nigra, nitida, a basi ultra medium regulariter & sat profunde pustato-striata, striis, praesertim disci, longe ante apicem omnino evanescitibus. Podex & corpus subtus nigra, parum nitida, tæbre, subtiliter punctulata. Pedes longiusculi, antici flavi, femoribus plurimque supra linea nigra; mediæ etiam flavi, femoribus supra & in medio plus minusve nigris; postici femoribus totis nigris, tibiis aut flavis, aut spicæ infuscatis; variat etiam, praesertim femina, pedibus totis flavis, femoribus posticis tantum in medio infuscatis.

Obs. Dom. Schönherr *Cryptocephalum* communicavit huic simillimum, & minimis masculis æqualem, cui frons superior lineis duabus flavis notata; hic certe Cr. labiatus var. a. Schneid. l. c. & var. b. Schönh. l. c.; sed in illo thorax subtilissime

pun-

punctatus videtur & elytrorum striae apicem fere attingunt, quare propria forte species, nec in Svecia lectum credo.

22. *C. minutus*: thorace laevissimo fulvo, clytris pallidis, capite, antennarum basi pedibusque testaceis, pectore, abdомine antennarumque apice nigris.

*Fabr. Eleut.* 2. 57. 87. *Payk. fn.* 2. 149. 22.  
*Panz. fn.* 39. f. 18. *Schönh. synon.* 2. 370. 89.

*Chrysomela exoleta.* *De Gér. Inf.* 5. 338. 42.

Var. b, sutura calloque humerali clytrorum nigris. *Payk. Schönh. l. c. var. b.*

Var. c, Thorace femoribusque posticis fusco-brunneis.

Var. d, clytrorum sutura, puncto calloso humerali maculaque magna pone medium, interdum in fasciam dilatata, nigris. *Payk. var. c. Schönh. var. d.*

*Cryptocephalus pusillus.* *Fabr. Eleut.* 2. 56. 85.  
*Schneid. Mag.* 2. 211. 22. *Marsh. Ent. Br.*  
1. 210. 9.

*Chrysomela minuta.* *Herbst. Archiv.* 4. 57. 31.  
tab. 23. f. 19.

Habitat in collibus aridis pratorum, s<sup>e</sup>pe copiose; var. c, in Scania rarius lecta.

Descr. Magnitudo & statura Cr. labiati. Caput retractum, fronte flavo, testacea, punctis paucis in medio impressa, ore margineque verticis infuscatis; in fronte superiori canalicula obsoleta, interdum in-

per medium elytri ducta, intra apicem abbreviata, Podex pone elytra & totum corpus subtus nigræ, crebre subtiliter punctulata. Pedes validi, toti pallide testacei.

In var. b, vitta media singuli elytri intra apicem introrsum arcuata & cum sutura nigra connecta, unde in singulo elytro vitta interior flava, a basi paulo ultra medium extensa, nigredine undique cincta, exstat.

In var. c, vitta interior flava varietatis b, ante medium fascia nigra interrupta, unde exstant in singulo elytro maculæ duæ flavæ, una baseos transversa, altera in medio, oblonga, quæ jam majores, jam parvæ, obsoletæ, nigredine dilatata discum sere totum occupante; ex hac varietate feminas tantum vidi, ex var. b, vero ambæ occurruunt sexus.

### Subdivisio 6:a, Lemoideæ.

(*Criocerides Latreille.*)

Maxillæ lacinia exteriori vix vel obsoletissime bi-articulata, forma & colore pallidum non æmulante. Thorax cylindricus, ab domine elytrisque manifeste angustior. Corpus elongatum. *Latreille.*

#### L E M A.

*Palpi quatuor crassifulti, filiformes. Mandibulae apice bidentatae. Maxillæ bifidæ, lacinia exteriori lanceolata, acuta. Ligula membranacea, dilatata, apice rotundata, integra. Antennæ sub-filiformes, cylindricæ, articulo primo*

*primo crasso, ovato vel globoso, sequentibus plerumque moniliformibus. Caput exsertum, collo distincto thoraci adnexum. Oculi prominuli, interne emarginati. Thorax immarginatus, posterius attenuatus, elytris mulio angustior.*

1. *L. Merdigera*; nigra, thorace elytrisque rufis, immaculatis, thorace postice utrinque profunde impresso, elytris subtilius punctato-striatis.

*Fabr. Eleut. 1. 472. 9. Schönh. synon. 2. 279. 9.*

*Crioceris merdigera. Latr. Gen. Ins. 3. 47. 1.*

*Payk. fn. 2. 81. 5. var. b. Panz. fn. 45. f. 2.*

*Chrysomela merdigera. Linn. syst. 2. 599. 97.*

*Fn. Sv. 563. var. capite pedibusque nigris.*

*Chrysomela rubra Liliorum. De Geer Ins. 5. 338. 43.*

Habitat in plantis Liliaceis hortorum, apud nos rarius.

Descr. Hæc & insequens reliquis nostris hujus generis maiores, præsertim in elytris latiores. Caput parvum, triangulare nigrum, fronte plana, inæquali, bis cruciatim impressa, obsolete punctulata; oculi valde prominuli, lunati, nigro-brunnei, interne finu profundo, angusto emarginati; collum capite multo angustius, convexum, nigrum, nitidum, lœve. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, crassiusculæ, totæ nigrae, articulo primo magno, ovato; secundo minimo, nodoso; 3., 4., parvis, obconicis, his quatuor nitidis. politis; reliquis multo

majoribus, sub-cylindricis, opacis. Thorax latitudine fere longior, antice paullo latior, truncatus, lateribus immarginatus, paullo pone medium utriusque profunde transversim incisus, basi etiam truncatus, supra modice convexus, rufus, nitidus, vix puncto uno altero ye obsoleto impressus; in medio canalicula longitudinalis obsoleta, serie punctorum indicata, & paullo ante basin striga transversa, profundius impressa. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, nitidum, laeve. Elytra magna, thoracis basi duplo latiora, humeris valde elevatis rectangularis, thorace quadruplo longiora, apice rotundata, anum occultantia, supra modice convexa, ante medium transversim indeterminate impressa, tota rufa, nitida, posterius regulariter sed parum profunde punctato-striata, versus basin punctis magnis, distantibus, minus ordinatis impressa, callo humerali valde elevato, laevissimo. Thorax subtus in medio niger, lateribus levatim rufus; pectus & abdomen tota nigra, nitida, vix punctulata. Pedes longisculi, toti nigri, femoribus clavatis, tarsis subtus cinereo-spongiosis; tarsuum articulus penultimus reliquis latior, bilobus,

2. *L. brunnea*: nigra, capite thoraceque supra, elytris, ano pedibusque rufis, genuis tarsisque nigris, thorace utrinque profunde impresso, elytris profundius punctato-striatis.

*Fabr. Eleut.* 1. 473 *ii. Schönh. synon.* 2. 280, 10.

*Crioceris brunnea*, *Panz. fn. 45. f.*, 1.

*Chrysomela merdigera*, *Linn. syst. 2. 599. 97.*

*Fn. Sv. 563. capite pedibusque rufis.*

*Crioceris merdigera*, *Payk. fn. 2. 81. 5. a.* *Chry-*

*Chrysomela rubra Litiorum*, var. *De Gler*  
*Iul. 5. 338. 43.*

Habitat in Convallaria majali, non infrequens.

Descr. Præcedenti magnitudine, statura & formatione partium ut ovm ovo simillima, colore & habitatione fere unice distincta; Elytrorum striæ tamen paullo profundiores videntur. Caput & collum aut tota rufa, aut os & gula obscurius rufopicea; oculi, antennæ, thorax supra & infra ut in præcedenti omnino. Scutellum plerūmque rufo ferrugineum vel rufo-piceum. Elytra tota rufa, paullo profundius, cæterum pari modo punctato-striata, ut in priori. Pectus & abdomen nigra, nitida, lævia, segmentis duobus ultimis analibus fere totis rufis. Pedes rufi, genibus tarfisque nigris.

3. L. 12:punctata: rubra, elytris dilutioribus, singulo punctis sex nigris, antennis, pectore, genibus tarfisque nigris, thorace ovato, convexo.

*Fabr. Eleut. 1. 473. 12. Schbh. Jymn. 2. 289. 13.*

*Crioceris 12-punctata. Payk. fn. 2. 81. 6. Panz.*  
*fn. 45. f. 3.*

*Chrysomela 12-punctata. Linn. syst. 2. 601.*  
*110. Fn. Sv. 568.*

*Auchenia 12-punctata. Thunb. Att. Uppl. 5. 95. 13.*

Habitat in Asparago, apud nos rarissime.

Descr. Præcedenti parum brevior, sed dimidio angustior & ultra. Caput sub-triangulare, rufum, fronte plana, inæquali, fovea oblonga, profunda in vertice, & supra antennarum insertionem, lingulis variis impressa, supra os crebre subtiliter coriacea;

oculi

**tidum, lœve.** Elytra thoracis basi duplo latiora & illo vix quadruplo longiora, supra parum convexa, in medio dorso sub-impressa, tota coerulea vel coeruleo-virescentia, nitida, regulariter & sat profunde punctato-striata. Corpus totum subtus coeruleum nitidam, crebre punctulatum, pilis brevissimis rigidis cinereis adspersum. Pedes longiusculi, coerulei, tarsis nigris, densius pilosis.

Femina duplo major & ultra; thorax a thorace maris valde diversus, lateribus antice angulariter productus, in medio laterali profunde impressus, supra parum convexus, crebre & profunde rugosopunctatus; in dorso anteriori lineæ duæ impressæ, punctatæ, sed striga transversa ante basin valde obsoleta; cætera ut in mare.

Var. b, differt tantum corpore toto supra nigro, opaco, subtus nigro-coerulescente, & hoc in utroque sexu,

7. L. Sub-spinosa: nigra, capite, thorace, antennarum basi pedibusque flavo-testicis, thorace profunde punctato utrinque unispinofo, elytris confertissime vagè punctatis.

Panz. fn. 83. f. 10. Schönh. syuon. 2. 285. 33.

Crioceris subspinoja. Fabr. Eleut. I. 461. 57.

Payk. fn. 2. 78. 3.

Auchenia subspinoza. Thunb. Act. Upp. S. 16.

51. Marsh. Ent. Br. I. 216. 7.

Var. b, duplo major, celio capiteque super late nigris, thorace obsoletius pun-

ctato; an femina? Schönh. l. c. var. b.

44.

*Auchenia flavitollis.* Marsh. Ent. Br. I. 217. s.

Habitat in foliis Betulae, Populi, Coryli,  
passim.

Descr. Parva, L. cyanella triplo minor. Caput subfuscum triangulare flavo-testaceum nitidum, rebro & sat profunde punctatum, postice in collum reva angustatum; mandibulæ apice piceæ; oculi prominenti brunnei, antice incisi. Antennæ longitudo dimidi corporis, articulis quatuor baseos flavo-testaceis, reliquis gradatim crassioribus nigris. Thorax antice latior, truncatus, lateribus paullo ante medium in spinam validam triangularē dilatatus, nisi truncatus, supra modice convexus, crebre & profunde rugoso-punctatus, totus supra & infra lato-testaceus. Scutellum parvum triangulare nigrum, cinereo-pubescentes. Elytra thoracis basi duo lataiora, humeris rectangularis, & illo plus triplo angiora, supra convexa, ante medium dorsi sub-impressa, tota saturate nigra, sub-nitida, confertissime & profunde punctata, margine suturali & lateralī levatis. Alæ longæ fuscae. Pectus & abdomen abtus nigra, confertissime subtiliter punctata, tenue pubescentia. Pedes longiusculi, toti flavo-testacei, pubescentes.

Var. b, fere duplo major, capite supra antennarum insertionem colloque late nigris; thoracis punctura obsoletior, minus crebra, & color illius, ut oris, pedum baseosque antennarum pallidius flavidus.

Obs. Var. b, Payk. loc. cit. quæ var. c, chönb. „Elytris etiam pallidis“; mihi non visa; præ secundum specimen immaturam designata.

Obs. Secundum sententiam Cl. Dom, Latreille, Gen. Inf. 3. 45, hæc Species genus proprium constitueret.

sticuero debet, Megalopo proximum; in plurimis tamen cum Lema Speciebus convenit, quare heic retineo.

### O R S O D A C H N A.

*Palpi elongati, crassissouli, anticorum articulis ultimo apice oblique truncato; eodem posticorum sub conico. Mandibulae & maxillae ut in Lema. Caput exserium, absque collo distincto thoraci adnexum. Oculi globosi, proximuli, integri. Antennæ extrorsum paullo crassiores, articulis fere omnibus ob-conicis. Corpus oblongum. Thorax postice angustior.*

**O. chlorotica:** elongata; supra glabra, vage punctata; subtus sericeo-pubescent; thorace anterius utrinque rotundato-dilatato.

, Capite thoraceque rufo-testaceis; elytris pedibusque pallidioribus, pectore ab domineque nigro-fuscis.

*Latr. Gen. Ins. 3. 44. 1. Schönh. Synom. 2. 287. 1.*

*Crioceris fulvicollis.* Payk. fn. 2. 77. 2. a. Panz. fn 83. f. 8.

*Crioceris Cerasi.* Fabr. Eleut. 1. 456. 30.

*Lema fulvicollis.* Illig. Mag. 1. 418. 30.

Var. b, abdomine & interdum etiam pectore testaceis.

Var.

Var. c, capite thorace rufo-brunneis,  
elytris pallide testaceis, limbo corpore-  
que nigris. Payk. Schönh. l. c. var. c.

*Galleruc Ceraf.* Fabr. Ent. Syst. 2. 22. 43.

Var. d, capite antice, thorace totō, abdo-  
mitis apice pedi usque rufo-testaceis;  
vertice, elytris pedatoreque nigris. Payk.  
l. c var. d; Schönh. var. e.

*Crioceris glabrata.* Fabr. Elstut. 1. 455. 28.  
Panz. fn. 84. f. 6.

Habitat in floribus Pruni Padi, Crataegi O-  
xyacantæ, Pyri, aīisque passim.

Descr. Statura-oblonga Lemæ melanopæ, & ab  
ilius magnitudine ad triplo majorem variat. Caput  
magnum, porrectum, versus os angustatum, pone  
oculos etiam coarctatum, sed non callo distincto a  
borace disjunctum, rufo-testaceum nitidum, evi-  
denter sed minus crebre punctatum, vertice saepe ni-  
gro; oculi globosi brunnei integri; mandibulæ cor-  
neæ fornicate, apice nigrae, evidenter bifidæ, laci-  
niis æqualibus acutis. Antennæ vix longitudine di-  
midii corporis, aut totæ testaceæ, aut extrorsum  
obscuiores, articulis fere omnibus obconicis vel spi-  
ce introrsum dilatatis, exterioribus gradatim paulo  
crassioribus. Thorax oblongus, antice latior, trun-  
catus, lateribus ante medium rotundato-dilatatus,  
limarginatus, posterius multo angustior, basi tran-  
scapus, supra modice convexus, rufo-testaceus nitidus  
glaber, evidenter, sed minus crebre punctatus.  
Scutellum sub-triangulare, subtiliter punctulatum,  
aut testaceum, aut obscurius piceum, præsertim ba-  
si. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, hymen-  
ris elevatis rectangulari, thorace plus triplo longio-

ra, supra modice convexa, dilutius flavo-testacea; nitida, glabra, undique crebre & sat profunde vase punctata. Thorax subitus testaceus; pectus & abdomen nigra vel nigro-picea; vix punctulata, pubes degressa sericeo-nitente obducta. Pedes longiusculi validi, pallide testacei.

Var. b, differt tantum abdome & interdum etiam pectore, testacea.

In var. c, caput rufo-brunneum, vertice nigro; thorax aut rufo-testaceus, aut obscurius brunneus; Scutellum nigro-brunneum; elytrorum limbus jam late, jam angustius nigro-fuscus; disco longitudinaliter pallide testaceo; pectus & abdomen ut in a; thorax etiam subitus obscurius brunneus. In uno specimine hujus varietatis thorax paucio pone medium utrinque foveola oblonga impressus.

In var. d, caput rufo-testaceum; vertice late nigro; thorax totus; antennae & pedes rufo-testacea; elytra, pectus & abdomen nigra, ano obscure tristaceo; cetera in omni varietate simillima.

a. O? Betulae elongata, nigro-fusca; pubescens, punctatissima, ore, antennis, pedibus elytrorumque margine laterali pallidioribus, thorace utrinque denticulato, elytris lineis tribus elevatis.

*Lema Betulae.* Schönh. synon. 2. 286. 38.

*Crioceris Betulae.* Fabr. Eleut. 1. 462. 61. Payk. fn. 2. 76. 1.

Var. b, dimidio major, capitla vertice thoroceque ferrugineis vel brunneis, elytris pallidis, futura lineaque humerali brunneis; forte femina,

Habi-

Habitat in Betulae albae frondibus, in Dalekarlia & Bothnia, Dom. de Paykull; in Westrogothiae Silva Kinnensi, ut & prope Alingsas, pluries a me lecta.

Deser. Magnitudo & statura elongata Lemæ Asparagi. Caput majuscum, rotundatum, aut nigro-fuscum, aut brunneum, creberrime & sat profunde punctatum, tenui pubescens, sub antennis flavum, mandibularum spicæ piceo; oculi ovati, prominuli, nigro-brunnei, integri; collum non dilatatum. Antennæ dimidio corpore longiores, filiformes, basi pallidæ, extrorsum ferrugineæ vel bruneæ, articulis ob-conicis, ultimo, longiori acuminato. Thorax latitudine medii fere brevior, antice truncatus, angulis lateraliter prominulis, lateribus in medio dilatatus, denticulis plurimque tribus armatus, media majori, saepè duplicata; basi etiam truncatus, supra parum convexus, fusco-brunneus, opacus, tenui pubescens, confertissime rugoso-punctatus; in medio dorfi canalicula longirudinalis impressa, saepè obsoleta. Scutellum oblongum fusco-brunneum, pubescens, apice obtusum. Elytra thoracis basi duplo latiora, humeris rectangularis, & illo ere quintuplo longiora, sub-linearia, supra modice convexa, jam obscurius fusco-brunnea, jam dilatius fusco-testacea, margine lateralí & apicis femoræ pallidis, sutura carinaque lateralí nigro-fusca; in singulo elytro lineæ tres elevate, quarum exterior, e callo humerali exiens, magis distincta, carinata, interiores saepè obsoletæ; superficies tota elytorum confertissime & sat profunde punctata, puntis plerisque seriatim. Corpus subtus jam saturatius fusco-brunneum, jam dilatius ferrugineum, præterim pectus & regio ani, semper crebre subtiliter punctulatum, tenui griseo-pubescentes. Pedes medios, pallidi pubescentes, femoribus tibiisque, saepè in medio saturatius ferrugineis.

Var. b, dimidio major & pallidius colorata; caput & thorax supra ferruginea aut dilute brunnæ; Elytra pallida, sutura & linea angusta in carinula laterali brunneis; os, antennæ, corpus, pedes paleide testaceæ; forte femina.

Obs. Palpi, maxillæ, labium & ligula ut in *Lema merdigera*; antennæ & ocali ut in *Orsodachna chlorotica*; mandibulæ apice tridentatae; forte proprii generis, ut dudum monuit Dom. Schönherr, loc. cit.

### D O N A C I A.

*Palpi quatuor filiformes. Maxibnæ apice bifidae. Maxillæ membranacea bifidae. Ligula truncata integræ. Antennæ filiformes, articulis sub cylindricis, basi approximatae. Oculi semi-globoſi, integri. Caput porrectum, collo distincto thoraci adnexum. Elytra subtrigona, posterine angustata, apice plerumque truncata. Femora clavata.*

Sect. I. Femoribus posticis dentatis.  
D. crassipes: depresso-plana, supra violacea, subtus argenteo sericea, thoracis disco canaliculato lœvi, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis lœvibus, femoribus posticis longissimis arcuatis.

Mas: Femoribus posticis subtus versus apicem tri-dentatis, dente medio majori.

Femina: Femoribus posticis uni-dentatis.

Fabr. Eleut. 2. 126. 1. Payk. fn. 2. 191. 4.

*Lepto-*

*Leptura aquatica.* Linn. Syst. 2. 637. t. Fai.  
Sv. 677, var. b.

*Leptura aquatica spinosa.* De Geer Inf. 5. 140.  
18 tab. 4 f. 14-16.

*Donacia striata.* Ponz. fa. 29. f. 1. Crit. Rev.  
L. 99.

*Donacia micans.* Hoppe Inf. Erl. 39. f. 5.

*Leptura micans.* Marsh. Ent. Br. 1. 344. 8.

Var. b; supra viridi-tenea.

*Donacia aquatica.* Thunb. Act. Ups. 5. 219. 56.  
var. b.

Habitat in plantis aquaticis, praesertim in  
foliis Nymphaeæ, passim.

Deser. Media, sed magnitudine variat. Caput  
nigrum opacum, sub-læve, tenuissime pubescens,  
fronte canalicula longitudinali profunda exarata;  
collum elevatum, capiti concolor; oculi valde pro-  
minuli, semi-globosi, brunnei. Antennæ dimidio  
corporis longiores, siliformes, nigrae, articulis infe-  
rioribus basi ferrugineis; articulus primus magnus,  
crassus, ob-conicus; secundus reliquis brevior, et  
jam ob-conicus; sequentes elongati, sub-cylindrici,  
apice paullo crassiores. Thorax anterius latior,  
truncatus, & latitudine antica brevior, lateribus ob-  
liquis, sub-inæqualibus, basi, etiam truncatus, an-  
gulis lateraliter prominulis; supra depresso-pianus,  
in medio canalicula longitudinali abbreviata exar-  
ata, & intra angulum anticum utrinque tuberculo  
elevata, rotundato, fovea sat profunda erucata a di-  
scō distincto, rotundata; intra basin transversum obso-  
lete impressus; discus præterea lævis vel omnium  
subtilissime coriaceus, violaceus sub-nitidus, lateri-  
bus sub-virecentibus. Scutellum oblongo-triangu-

*lare nigrum; leue, pubescens. Elytra antice thoracis bsi fere duplo latiora, humeris valde elevatis, rectangulis, thorace sextuplo longiora, posterius angustata, spicce ipso late truncata, supra depresso-plana, punctis sat profundis, rotundatis, simplicibus regulariter & pulchre striata, interstitiis levibus, vel sub lente subtilissime coriaceis; dorso toto violacea, sub-nitida, lateribus & postice viridi-sericea. Corpus totum subtus vellere denissimo testum, antice inspecto argenteo vel margaritaceo-sericeo, a posteriori vero iustrato fusco-plumbeo. Pedes elongati obscure testacei, albido pubescentes, femoribus tibialisque supra nigro-fuscis; femora omnia clavata, postica valde elongata & arcuata, basi tenuis, spicem versus incrassata, clavata, maris intra spicem subtus dentibus tribus in serie locatis, armato, medio majori, extimo minato, saepe obsoleto; in femoribus feminis dens tantum unicus, medium nemppe, adest.*

Var. b, differt tantum colore dorfi thoracis & elytrorum viridi, parum aeneo-micante; cetera ut in a omnia.

a. *D. bidens: convexior, supra viridi-senea, violaceo-micans, subtus argenteo-sericea, elytris crenato-striatis, interstitiis thoracisque dorso transversim rugosis, femoribus crassis fusco-violaceis, posticis minus elongatis.*

*Mas: femoribus posticis subtus dentibus duobus acutis, paribus.*

*Oliv. Ent. 4. 75. II. 12. Pl. 2. f. 12. a, b.*

*Donacia dentata, Hoppe Enum. Ins. Erl. 40.  
f. 2. Fe*

Femina: femoribus posticis dente tantum unico, plerumque parvo, obsoleto.

*Donacia claripes.* Payk. fn. 2. 190. 3.

Var. b, pedibus totis fusco-aeneis; femina, Habitat in plantis variis, locis humidis, sat frequens.

Descr. Praecedenti quidem similis, sed pluribus notis essentialibus abunde distincta. Caput quoad structurem ut in priori, nigro-fuscum, interdum fuso-aeneum, pubescens, obsoletè punctatum, fronte canaliculata; oculi ut in priori. Antennarum struttura eadem, sed articuli ferè omnes basi latius ferruginei. Thorax angustior quam in praecedente, fere quadratus, basi spiculæ truncatus, angulis non-nihil prominulis, supra magis convexus, in medio canalicula abbreviata, plerumque rubro-aurea, impressus, viridi-sericeus, in dorso saepè fuso-violaceo micans, undique crebre transversim rugosus & punctatus; tuberculum elevatum anguli antici magis oblongum. Scutellum triangulare viridi-aeneum, pubescens, laxe. Elytrorum forma ut in priori, modo supra magis convexa, viridi-sericea, dorso plus minusque fuso-violacea, sat profunde crenato striata, interstitiis crebre transversim rugosiss. Corpus totum subtus indumento, simili ut in priori testum. Pedes breviores quam in praecedenti, femoribus crassis fulco-violaceis, basi tantum testaceis, posticis multo minus arcuatis, nam basi immo attenuatis, maris versus apicem subtus dentibus duodus acutis, paribus, transversim positis, armata, inter quas tibia reclinata locatur; femora feminæ dente tantum unico, parvo, saepè obsoleto, notata; tibiæ & tarsi fuso-testacei, pubescentes.

Var. b, simillima, sed pedes toti fuso-aenei, pubescentes; feminas tantum hujus varietatis vidi.

Quod hæc D. clavipes Paykullii, ex autopsia affere-  
ravit Dom. Schönherr.

3. *D. dentipes*: sub-depressa, thorace æneo,  
crebre rugolo-punctato, elytris vitta lata  
media rubro-cuprea, marginibus fututaque  
viridibus; subitus flavescenti-fericea, pedi-  
bus æneis.

Fabr. Eleat. 2. 127. 6. Payk. fn. 2. 195. 8.  
Panz. fn. 29. f. 5.

*Donacia cingula*. Oliv. Ent. 4. 75. 7. 5. Pl. 1.  
f. 5. a, b.

*Donacia fasciata*. Hoppe Ins. Erl. 41. f. 3.

*Donacia aquatica*. Thunb. Act. Upf. 5. 19.  
56. var. a.

*Leptura aquatica*. Linn. Syst. 2. 637. 1. a. Fu-  
su. 677. a.

*Lept. aquatica fasciata*. De Gler Ins. 5. 142. 2.

*Lept. fasciata*. Marsh. Ent. Br. 1. 344. 9.

Var. b., obscurior, thorace fusco-virescente,  
elytris viridibus, vitta media rufescente  
obsoleta.

Habitat in floribus Calthæ, Carlicum, aliis-  
que, locis humidis, sat frequens.

Descr. Magnitudo & fere statura D. crassipe-  
dis, sed paulo magis convexa. Caput majusculum,  
porrectam, cum collo elevato fusco æneum, opa-  
cum, subtiliter pastido pubescent, fronte canalica-  
lata, oculis semi-globosis brunnies. Antennæ nigrae,  
artic.

articulo primo sub æneo pubescente, cæterum ut in prioribus constructæ. Thorax sub quadratus, vel latitudine paullo longior, anterius nonnihil latior, basi apiceque truncatus, angulis omnibus lateraliter prominulis; supra parum convexus, aut æneus nitidus; aut rubro-æneus vel cupreus, crebre transversim rugulosus & punctatus, in medio dorsi cayalcula brevi exaratus; tuberculum anguli antici oblongum, nepe obsoletum. Scutellum triangulare fusco-æneum, dense pallido; pubescens. Elytra thoracis basi fusa duplo latiora, humeris valde elevatis, rectangulis; thorace quinqueplo longiora, apicem versus attenuata, apice ipso truncata, supra parum convexa, paullo ante medium, juxta suturam, soyeola obsoleta, sexis aureo-micante, impelta, in medio longitudinaliter purpureo-cuprea, lateribus & supra viridi-sericeis; basis inter catum humeralem & suturam crebre & rite punctata, cæterum sat regulariter punctata, striata, intersticis subtiliter transversim strigosis vel costaceis. Corpus totum subitus viridescenti ændum, vellere densè griseo-flavescens, sericeo-micante, tectum. Pedes ænei, flavesceni-pubescentes; posticii multo longiores, femoribus maiore incrasitatis, versus apicem subitus dente unico, in masculis crasso, valido, in feminis minori, armatis.

Var. b, colore obscuriori tantum differt; thorax aut fusco viridescens, aut sub-violaceus; elytra cœruleo-virescentia, vitta media parum rufescens, obsoleta.

4. *D. Sagittariae*: sub-depressa, supra viridis, di-sericea, subitus flavescenti-aureo pubescens, thorace sub-quadrato rugoso-punctato, elytris lacunosis, subtiliter punctato-striatis, basi parum vase punctatis.

Fabr.

*Fabr. Eleut. 2. 128. 8. Latr. Gca. Inf. 3. 46.*

*1. Payk. fn. 2. 192. 5. Oliv. Ent. 4. 75. 6.*

*4. Pl. 1 f. 4. a-c. Panz. fn. 29. f. 7.*

*Donacia aurea. Hoppe Inf. Erl. 43. f. 5.*

*Donacia aquatica. Thunb. Act. Ups. 5. 118. 56.a.*

Var. b, supra obscurius viridis, thorace cœrulecente. *Illig. Mag. 3. 179. 8.*

*Donacia collaris. Panz. fn. 29. f. 8.*

Habitat in plantis aquaticis paſſim, minus frequens.

Deser. Præcedentibus psullo major, præſertim longior. Caput & collum viridia vel viridi-zena, treberrime punctata, fronte profunde canaliculata; oculi globosi brunnei. Antennæ nigrae, structura ut in prioribus, articulo primo virescente. Thorax subquadratus, antice parum latior, basi apiceque truncatus, angulis omnibus sub-prominulis; supra depreſsus, in medio obſoleto capalicylhus, viridi-zena vel orichalceus, ferico-micans, confertiflme rugoſo punctatus; tuberculum anguli antici obſoleto, parum elevatum. Scutellum triangulare vicide opacum pubescens. Elytra thoracis basi duplo latiora, humeris valde elevatis, rectangulis, thorace ſextuplo lengiora, apicem versus attempuata, apice ipso truca-tata, ſupra perparum convexa, inæqualia, foveolis plurimis impreffia; una nempe communis pone ſcutellum; in medio dorſi quatuor, in quadrangulum poſitæ, duæ ſciliat in ſingulo elytro; in medio diſci alia oblonga & juxta callum humeralem interius iterum alia, arcuata; tota flavo-virescentia vel orichalceus, ferico-micans, parum profunde punctato-striata, ſtriis interſoribus ad basin usque ſat regulis, punctis in lacuna humerali tantum vagis, in ordi-

ordinatis, crebrioribus; interstitia striarum confertissime subtiliter strigosa vel coriacea. Corpus subtus virescentiæ æneum, totum vellere dense flavo-aureo-nitente omnino tectum. Pedes mediocres viridi ænei, ffavo pubescentes, femoribus clavatis, posticis minus elongatis, subtus versus apicem dente parvo armatis.

Var. b, colore obscuriori tantum differt; caput & thorax cœruleo-virescentie; elytra saturatius viridia, vix orichaleco-micantia; æcetera ut in a.

5. D. Lemnæ: sub depresso, supra fusco-ænea, sub nitida, subtus cinereo-holosericea, thorace sub-quadrato, rugoso-punctato; elytris lacunosis; basi parum vague punctatis, vitta intra-marginali purpurea; femoribus posticis obsolete dentatis.

*Fabr. Elscut.* 2. 128. 10.

*Donacia limbata.* *Panz.* fn. 29. f. 12.

Var. b, elytris præterea macula purpurea in basi interiori singuli Elytri.

*Donacia vittata.* *Panz.* fn. 29. f. 11.

*Donacia marginata.* *Hoppe Inf. Erl.* 42. f. 4.

*Leptura vittata.* *Mursh. Ent. Br.* 1. 345. 10.

Var. c, elytris unicoloribus; absque vittis purpureis.

Habitat in plantis aquaticis Scaniæ, Hallandiae, rarius.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas præcedentis, colors obscuriori, signaturis elytrovam & femoribus posticis obsoletissime tantum dentatis, distinx.

distincta. Caput & collum fusco-ænea, opaca, crebre obsoleta punctata, tenuè pubescentia, frönte sulco profundo exarata; oculi globosi brunnei. Antennæ nigrae, articulo primo fusco æneo, pubescente. Thorax quoad structuram ut in præcedenti omnino; supra sub-depressus, fusco æneus, sub-nitidus, obsoleta canaliculatus, confertissime rugoso-punctatus. Scutellum triangulare fusco-æneum pubescentis. Elytrorum forma, impressiones, striæ & punctura omnino ut apud præcedentem descripta, sed color multo obscurior, fusco æneus, parum nitidus; intra marginem lateralem utrinque vitta rubro-purpurea, e callo humerali exiens, apicem elytri fere attingens. Jam lator & pulchre colorata, jam angustior, dilatior & magis obsoleta. Corpus totum subtus vellere denso cinereo, holoserico micante, interdum cinereo-flavescere tectum. Pedes longiusculi, validi, nigro-subvirescentes, cinereo pubescentes, femoribus clavatis, posterioribus versus apicem dente minuto, sœpe obsoletu, notatis.

In var. b, præter vittam intra-marginalem purpuream, in medio baseos cuiusvis elytri macula oblonga ejusdem coloris, quasi initium vittæ interioris, sed mox abbreviatum. È Germania Specimen hujus varietatis obtinui, coloribus magis nitidis, pedibus æneis, & vellere corporis flavescere; cæterum vero non punctato diversum.

Var. c, elytra gerit concolora, absque rudimento vittæ purpureæ.

6. D. obscura: sub-depressi, supra fusco-ænea, sub-opaca, subtus flavescenti-aureo-pubescentes, thorace sub-quadrato, rugoso-punctato, elytris lacunosis. Basi crebre vague punctatis, femoribus posticis valde dentatis. Habi-

## Habitat in plantis aquaticis passim.

Descr. Magnitudo, statura, formatio partium & impressiones elytrorum omnino ut in duobus proxime precedentibus, sed tota valde obscura, unicolor, elytrorum basis fere tota crebre vage punctata, & femora postica dente valido armata, unde distincta species mihi videtur. Caput cum collo obscurè fusco æneum, opacum, crebre subtilissime & obsolete punctulatum, dense griseo-pubescentia, fronte profunde canaliculata; oculi semi-globosi brunnei. Antennæ ut in prioribus constructæ, nigrae, articulo primo fusco-æneo pubescente. Thoracis structura ut in iuxime precedentibus omnino, supra sub-depressus, fusco subæneus, parum nitidus, creberrime rugosofunctatus, in medio obsoleto canaliculatus. Scutellum triangulare fusco-æneum, dense cinereo-pubescentia. Elytrorum forma & impressiones ut in D. Sagittariæ omnino, sed basis fere tota, praesertim versus callum humeralem, crebre vage punctata, interstitiis subtilissime strigoso-coriaceis; tota obscurè fusco ænea, opaca. Corpus totum subtus velle de dense flavescenti-holosericeo tectum. Pedes longisculi fusco ænei, femoribus clavatis, magis nitidis, posticis subtus dente valido acuto armatis.

D. Impressa: supra fusco-ænea nitida, subtus flavescenti-fericea, thorace sub-quadrato punctatissimo, elytris regulariter punctato-striatis, dorso quadrifoveolatis, femoribus posticis obsolete dentatis.

*Payk. fn. 2. 193. 6.*

*Leptura aquatica ænea, De Gehr. Ins. 53  
143. 214*

Var. *b*; corpore supra aut fusco-æneo, aut obscure virescente. Payk. l. c. var. *b*.

Var. *c*, Thorace elytrisque rubro-cupreis.

Habitat in plantis aquaticis frequens; var. *c*, tamen rarius occurrit.

Descr: Proxime præcedenti simillima & valde affinis, sed duplo minor & ultra; color paginæ superioris multo magis nitidus; puncta vix illa vaga in basi elytrorum, & femora postica plerumque obsoletissime tantum dentata. Caput & collum fusco-ænea, opaca, subtilissime crebre punctulata, terue griseo-pubescentia profunde canaliculata; oculi semi-globosi bruanei. Antennæ quoad structuram ut in prioribus, nigræ, articulo primo fusco-æneo. Thorax quadratus, vel latitudine fere brevior, supra parum convexus; fusco-æneus, nitidus, confertissime punctatus; in medio obsolete canaliculatus. Scutellum fusco-virescens, obsolete punctulatum, dense cinereo-pubescentia. Elytrorum forma ut in prioribus omnino, supra parum convexa, fusco-ænea, nitida, regulariter punctato-striata, interstitiis subtilissime transversim strigosis; juxta callum humeralem puncta pauca vaga, sed nulla in reliquis interstitiis; in medio dorsi foveolæ quatuor obsoletæ, in quadrangulum politæ, ut in prioribus. Corpus totum sub-tus vellere denso cinero-flavescere, nitido tectum. Pedes elongati ænei, femoribus nitidis, subtilissime punctulatis, posticis plerumque dente minuto, obsoleto, interdum vero evidenter armatis.

Var. *b*, colore paginæ superioris obscuriori differt, sicut obscurius fusco-æneo, aut fusco-virescente.

In var. *c*; thorax & elytra rubro-cuprea, interdum rubro-ænea, cæterum prioribus simillima.

§: D. sericea: convexa, supra metallica, varicolor; subtus tenuius sericea, thorace ob-

longo sub-lævi, elytris crenato-striatis,  
interstiliis transversim rugosis, femoribus  
crassis, posticis valide unidentatis.

*Ellig. Mag.* 3. 179. 4.

a. Supra aut cœrulea, aut cœruleo-violacea,  
aut rubro violacea.

*Leptura sericea* *Linn.* *sys.* 2. 638. 8. *Fø. Sv.*  
683.

*Donacia Nymphaeæ*. *Payk.* *fn.* 2. 196. 9. var. b.

*Donacia crassipes*. *Oliv.* *Ent.* 4. 75. 4. i. *Pl.*  
t. f. i. var. c.

*Donacia Festucæ*. *Panz.* *fn.* 29. f. 2?

*Donacia discolor*. *Panz.* *fn.* 29. f. 3. mas.  
*Crit. Rev.* i. 99.

*Leptura Festucæ*. *Marsh.* *Ent. Br.* i. 346. 13.

Var. b, Supra nigro-cœrulescens vel nigro-  
subviolacea.

*Donacia Festucæ*. *Fabr.* *Eletut.* 2. 127. 4.

Var. c, supra virens-cœrulescens.

*Leptura sericea*. *Fabr.* *Eletut.* 2. 365. 64.

Var. d, supra virenscenti-senea.

*Donacia thianæ*. *Panz.* *fn.* 29. f. 9.

*Donacia senea*. *Hoppe Inf. Erl.* 44 f. 6.

*Donacia crassipes*. *Oliv.* *Ent. loc. cit.* a.

*Donacia Nymphaeæ* *Payk.* *loc. cit.* mas.

Var. e, supra cupreo- vel aureo-senea,  
splendida.

*Ins. Svec. T. I. P. III.* T t Dona-

*Donacia discolor*. Panz. fn. 29. f. 4. *femina*.

*Donacia Splendens*. Dow. Anderjch. in litteris.

*Leptura ænea*. Marsh. Ent. Br. 1. 346. 12.

*Donacia armata*. Payk. fn. 2. 194. 7. *var. b.*

*Var. f. supra rubra cuprea*.

*Donacia Nymphaeæ*. Fabr. Eleut. 2. 128. 7.

*Payk. l. c. femina*. Panz. fn. 29. f. 6.

*Donacia crassipes*. Oliu. l. c. *var. b.*

*Leptura Nymphaeæ*. Marsh. Ent. Br. 1. 347. 15.

*Var. g. Supra obscure ænea; elytris nudi-*  
*toribus.*

*Donacia armata*. Payk. fn. 2. 94. 7. a.

In omni varietate præterea color antennarum & pedum variat: in aliis antennæ nigrae, basi parum æneo-micantes, & tum pedes aut coeruleo-violacei, aut ænei vel vicescentes, immaculati, secundum colorem pingue superioris; in aliis antennarum articuli plurimi basi ferruginei, & in his tibiarum basis, tarsi & interdum femorum basis plus minusve ejusdem coloris; vix vero discrepantiae istæ sexum indicant.

Habitat in plantis aquaticis frequens; a & b, parcus occurunt.

Descr. Media in hoc generè; mas plerumque minor, angustior, magis linearis. Caput cura colore in a, obscure coeruleo-violaceum, confertissime subtiliter punctulatum, tenue griseo-pubescent, fronte

canea

analiculata; oculi semi-globosi nigro-brunnei. Annæ quoad structuram ut in prioribus, maria paulo longiores & tenuiores, articulis inferioribus intreque sexu cœrulecentibus, reliquis aut totis nigris, aut basi ferrugineis. Thorax latitudine longior, anterius paullo lator, basi apiceque truncatus, ateribus in medio impressus, supra sub-depressus; otus cœruleus vel violaceus, parum nitidus, canalicula longitudinali exaratus, disco plerumque levigatus, interdum vero plus minusve obsolete & tenue rugulosus; tuberculum intra angulum anticum sit elevatum, oblongum, oblique positum. Scutellum triangulare, obscure cœruleum, dense cinereo-pubescent. Elytra thoracis basi duplo latiora, bumeris valde elevatis, fere rectangulis, thorace quadruplo longiora, apicem versus attenuata, apice ipso obtuse rotundata, angulo suturali recto; supra convexa, subæqualis, foveola tantum unica obsoleta ante medium versus suturam impressa, aut cœrulea, aut cœrulecenti-violacea, aut rufescenti-violacea, nitida, regulariter punctato-striata, interstitiis rugis elevatis majoribus transversis, minus crebris, notatis, unde striæ quasi crenatae apparent. Corpus subtus cœruleo-vel violaceo-virescens, antice inspectum pubetenui, minus densa, cinereo-micante, obductum, & posteriori vero visum, fere nudum videtur. Pedes longiusculi, validi, cœrulei vel violacei, femoribus omnibus crassis, clavatis, posticis parum longioribus, subtus versus apicem dente magno valido, acuto, armatis.

Varietates recentissimæ colore paginæ superioris præcipue differunt, secundum diagnosis cuivis datum; color pedum plerumque colori paginæ superioris similis; tomentum paginæ inferioris interdum nigris flavicans, imprimis in var. f, & ex hac varietate rarius occurrunt specimen asteplatis pedibusque errugineo variegatis; var. g, reliquis obscurior, fu-

*scoænea* (Gallice „couleur de Bronze“), nitida tamen, præsertim in elytris nulla præterea essentiali nota a reliquis distincta.

9. *D. violacea*: convexa, supra cœruleo-violacea, subtus tenue sericea, thorace oblongo sub-lævi, elytris punctato-striatis interstitiis lævibus, femoribus clavatis, posticis valide unidentatis.

*Fabr. Eleut. 2. 127. 5. Hoppe Inj. Erl. 44. f.  
?? Illig. Mag. 3. 179. 5.*

*Donacia Felutæ. Panz. fn. 29. f. ??*

Habitat in plantis aquaticis rarius.

Delcr. *Don. Sericea*, s., ut ova ovo simili-  
ms., nec punctuio diversa, præterquam quod inter-  
stitia striarum in elytris non transversim rugosæ,  
modo sub oculo acute armato subtilissime strigoso-  
coriscea; vix ideo, me judice, ut species distincta  
considerari queat.

Obs. Incertum omnino nam D. Hoppe & Parz.  
l. c. hanc, vel var. a, præcedentis intellexerint, dum  
interstitiarum qualitatem non meminerint.

10. *D. discolor*: metallicæ, antennarum ba-  
si, ano pedibusque rufis, thorace latiori,  
subtilissime punctulato, elytris crenato-  
striatis, apice rotundatis, femoribus cras-  
sis, posticis valide unidentatis.

*Mas: Supra nigro-violaceus.*

*Femina: Supra virescenti-senea.*

*Hoppe*

*Hoppe Inj. Erl. 45. f. 8, 9.*

*Danacia nigra.* Payk. fn. 2. 196. 10. Oliv.

Ent. 4. 75. s. 3. Pl. 1. f. 3. a, b. mas; ♂

*D. rufipes.* ibid. n:o 2. Pl. 1. f. 2. a, b,  
femina.

*Leptura discolor.* Marsh. Ent. Br. 1. 346. 14.

♂ *Lept. fusca* ibid. 349. 20. var. *obscura*  
*maris forte.*

*Danacia simplex.* Thunb. Abb. Ups. 5. 118. 55.

Var. b, nigra, ano, antennarum articulis  
exterioribus tibiisque rufis.

Habitat in floribus Calthæ, Ranunculorum,  
aliisque, locis humidis, frequens; var. b,  
rarior occurrit.

Deser. D. Sericea paullo brevior, sed latior,  
præfertim in thorace. Caput & collum maris nigro-  
violacea, sub-opaca, creberrime subtiliter punctulata,  
fronte profunde canaliculata, ore toto rufo; ocali  
globosi nigro-brunnei. Antennæ quoad structuram  
ut in prioribus, articulo primo & secundo rufis, re-  
liquis aut totis nigris, aut basi rufis; apice nigris,  
aut fere totis rufis, apice parum infuscatis, & hoc  
in utroque sexu. Thorax latitudine antica non lon-  
gior, anterius malto latior, basi apiceque truncatus,  
lateribus oblique, non impressus; supra parum con-  
vexus, nigro-violaceus sub-nitidus, creberrime subti-  
liter punctulatus, in medio obsolete canaliculatus,  
interdum foveola duabus paribus in doto posterio-  
ri impressus; tuberculum anguli antici valde obsole-  
tum. Scutellum triangulare nigrum opacum, tenue  
pubescens. Elytra thoracis basi dimidio latiora, hu-  
meris minus elevatis, sub-rotundatis, thorace vix

quadruplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, æqualia, dilutius violacea sub-nitida, regulariter sed minus profunde crenato striata, interstitiis subtilissime coriaceo strigosis. Corpus subtus cœruleo-virescens, pube tenui cinerea sericeo-micante obductum, segmentis ultimis ventralibus læte rufis. Pedes longiusculi, validi, toti pallide rufescentes, femoribus omnibus crassis clavatis, posticis parum longioribus, subtus dente crasso valido acuto armatis.

Femina dimidio major & ultra, supra virescentiæ ænea, magis nitida, elytrorum interstitiis evidenter strigoso-coriaceis; femora minus crassa; cæterum simillima.

Var. b; fere tota nigra, parum nitida; antennarum articulus primus totus niger, reliqui basi rufi; os, tibiarum basi & anus rufo-ferruginea; cæterum ut in a omnia.

Obs. *Donacia nigra* Fabr. Eleut. 2. 128. 9. D. *palustris* Panz. Fn. 29. f. 10. D. *abdominalis* Oliv. Ent. 4. 75. 9. 8. huic quoad staturam & colores similis, sed fere triplo major, thorax longior, elytrorum interstitia evidenter transversim rugosa, &c; sed hæc apud nos non occurrit, quantum mihi innotuit.

### Sect. 2. Femoribus inermibus.

II. D. *Menyanthidis*: elongata, sub-depressa, supra viridi-ænea nitida, subtus argenteo-sericea, antennis extrofusum pedibusque rufo-ferrugineis, elytris crenato-striatis, interstitiis transversim rugosis.

*Fabr. Eleut. 2. 129. 14.*

*Donacia clavipes. Oliv. Ent. 4. 75. 8. 6. Pl. 1.  
f. 6.*

*f. ♂ a, b.* Panz. fn. 29. f. 13. Crit. Rev.

i. 99. (Fabr. Ent. Syft. 2. 117. 7.

*Donacia simplex.* Payk. fn. 2. 189. 2.

*Leptura aquatica mutica.* De Gler Ins. 5. 148.  
19.

*Leptura simplex.* Marsh. Ent. Br. 1. 348. 19.

Habitat in plantis aquaticis, praesertim Iris de Pseudacoro, in flaviis & lacubus pa-

sim.

Descr. Reliquis nostris major, longior; mas  
fere dimidio minor femina, ceterum simillimus.  
Caput & collum fusco-virescenti-anea, crebre sub-  
tilissime punctulata, tenue pubescentia, fronte pro-  
funde canaliculata; oculi globosi nigro-brunnei.  
Antennae quoad structuram ut in prioribus, basi fu-  
sco-picea, extorsum rufescentes. Thorax latitudine  
fere Jonglor, antice latior, basi apiceque truncatus,  
lateribus in medio sae profunde impressus, supra sub-  
depressus, viridi-aneus nitidus, obsolete canalicula-  
tus, utrinque bis foveolatus, in disco sub-laevis,  
versus apicem & basin crebre subtiliter strigosus.  
Scutellum triangulare nigrum depresso, dense ci-  
nereo-pubescentia. Elytra thoracis basi fere duplo  
latiora, humeris elevatis rectangularis; & illo fere  
sextuplo longiora, apice obtuse rotundata, fere trun-  
cata, supra parum convexa, viridi-anea nitida, saepe  
aureo-anea, sat profunde crenato striata, interstitalia  
crebre & valide transversim rugosus. Corpus totum  
subtus vellere denso margaritaceo vel argenteo-leri-  
ceo nitido omnino tectum. Pedes elongati rufo-fer-  
ruginosi, tenue sericeo pubescentes, femoribus parum  
incrassatis, posticis multo longioribus arcuatis, basi  
attenuatis.

12. D. simplex: brevior, sub-convexa, supra virecenti-aenea, subtus cinereo-sericea, pedibus fusco-ferrugineis, thorace punctatissimo, elytris crenato-striatis, dorso rubro-cupreis, interstitiis transversim rugosis.

*Fabr. Eleut. 2. 129. 13. Illig. Mag. 3. 180. 13.*

*Donacia semi-cuprea. Panz. fn. 29. f. 14.  
Crit Rev. 1. 99.*

*Leptura melanocephala. Marth. Ent. Br. 1.  
348. 18.*

Habitat in plantis aquaticis passim, minus frequens.

Deser. Parva, D. sericea plerumque minor, præfertim mas, qui duplo fere minor femina. Caput & collum fusco-aenea sub-opaca, crebre tubuliter punctata, dense cinereo-pubescentia, canalicula frontali saepius interrupta; oculi semi-globosi brunnei. Antennæ quoad structuram ut in prioribus, nigro-fusca, articulis saepe basi ferrugineis; interdum etiam apex totus testaceus. Thorax latitudine paullo longior, antice latior, basi spicisque truncatus, lateribus in medio impressus, supra parum convexus, virecenti-aeneus, interdum cupro-micans, sub-nitidas, obsolete canaliculatus, confertissime punctatus, tuberculo anguli antici obsoleto. Scutellum triangulare fuscum, dense cinereo-pubescentia. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, humeris elevatis, thorace vix quinto longiora, apice obtuse rotundata, sub-truncata, supra modice convexa, aquila, lateribus viridi-aenea, nitida, dorso communi capreo, colore plus minusve vivo; sat regulariter & profunde crenato-striata, interstitiis evidenter transversim rugosis. Corpus sub-

tus

tus æneo-micosus, yellere denso cinereo-argenteo-nitido tectum. Pedes elongati obscure ferruginei, pubescentes, femoribus clavatis, versus apicem fulco-æneis, posticis longioribus arcuatis.

13. *D. linearis*: elongata, sub-depressa; supra obscure virescenti-ænea, subtus argenteo-sericea, antennis pedibusque ferrugineo-variegatis, thorace quadrato punctatissimo, elytrorum interstitiis subtilissime strigosis.

*Hoppe Inf. Erl. 46. f. 10.*

*Leptura linearis. Marsh. Ent. Br. 1. 347. 16.*

*Donacia simplex. Oliv. Ent. 4. 75. II. II. Pl. 2. f. II. a, b. Panz. fn. 29. f. 15. Crit. Rev. 1. 99. Illig. Mag. 3. 180. 13.*

*Donacia clavipes. Fqbr. Eleut. 2. 128. II?*

Var. *b*, Elytria vitta futurall purpurea vel rubro-cuprea.

Var. *c*, Thorace elytrisque totis rubro-cupreis.

Mabitat in plantis aquaticis passim, minus frequens, Var. *c*, raro occurrit.

Descr. Statura elongata, sub-depressa *D. Meny.* anthidis, sed semper minor, & inter se magnitudine valde varians. Caput & collum fusco-ænea opaca, confertissime subtiliter punctulata, tenui pubescentia, fronte canaliculata; oculi globofi nigro-brunnei, Antennæ quoad structaram ut in prioribus, nigræ, articularis basi plus minusve ferrugineis, Thorax sub-

Tt 5. quadra-

quadratus, vel latitudine antica non longior, antice latior, basi apiceque truncatus, lateribus parum inaequalis, supra sub-depressus, obscure virescentiæneus, parum nitidus, obsoletissime canaliculatus, crenatissime punctatus; tuberculum anguli antici oblongum, oblique positum. Scutellum triangulare nigrofuscum, dense cinereo-pubescent. Elytra thoraci basi, dimidio latiora, humeris elevatis, & illo sexto longiora, apicem versus attenuata, apice ipso truncata, supra sub-depressa, præsertim in dorso antico, tota fusco-virescentiæneus, parum nitida, versus latera plerumque magis sericeo-micantia, regulariter & sat profunde punctato-striata, punctis rotundatis simplicibus, intersticiis crebre, subtilissime transversa strigosis; in medio dorfi foveolæ quatuor impressæ, in quadrangulum posita, saepe obsoletissimæ. Corpus totum subtilis vellere denso argenteo-sericeo, nitido tectum. Pedes longiusculi, tenues, postici reliquis multo longiores; femora omnia ænea nitida, basi testacea; tibiae tenues arquatae, fusco-testacea, tarsis obscurioribus.

Var. b, simillima, sed in fuscogulo elytro, justa futuram vitta lata, apicem non attingens, aut purpurea, aut rufo-cuprea, interdum colore atro-coeruleo inducta.

In var. c, thorax & elytra tota rufo-cuprea & femora etiam cupro-micantia, cæterum simillima.

Obs. De scriptio D. clavipedis in Fabr. Ent. Syt. p. 117. 7. exæcte D. Menyanthidi Fabr. Eleat. convenit; quænam vero D. clavipes ejus Syt. Eleat. p. 128. 11. descriptione deficiente dijudicari non potest. D. clavipes Payk. Fn. a. 190. 3. certe D. bipunctata femina, ut antea dictum.

E. D.

14. D. *Hydrocharidis*: latior, depressa, obscure fusco-ænea, opaca, tenue cincereo-pubescent, thorace quadrato, vix punctulato, elytris subtiliter punctato-striatis, intersticiis subtilissime coriaceis.

*Fabr. Eleut.* 2. 129. 15.

*Donacia Hydrocharis.* *Oliv. Ent.* 4. 75. 12. 13.

*Pl. 2. f. 13. a, b. Payk. fn. 2. 189. 1.*

*Panz. fn. 29. f. 17.*

*Leptura Hydrocharis.* *Marjh. Ent. Br.* 1. 347.  
17.

*Donacia terrestria.* *Panz. fn. 29. f. 16.*

*Donacia cinerea.* *Herbst. Archiv.* 5. 100. 6.

*Hoppe. Inf. Erl.* 46. f. II.

Habitat in *Typha*, aliisque plantis aquatilis, minus frequens.

Descr. D. *Menyanthidis minor*, præsertim multo brevior; mas duplo minor femina. Caput & collum fusca, opaca, vix æneo-tincta, crebre subtilissime punctulata, pube densa brevissima depressa cincerea obducta, fronte canalicula, saepe interrupta, impressa; oculi globosi nigro-brunnei. Antennæ quoad structuram ut in prioribus, nigrae, articulis, præsertim exterioribus saepe basi ferrugineis. Thorax subquadratus, vel latitudine paullo brevior, antice parum latior, basi apiceque truncatus, lateribus in medio impressus, supra fere planus, fusco-subæneus, opacus, vix visibiliter punctulatus, pube densa depressa cincerea tectus, obsoletissime canaliculatus, tuberculo anguli antici magno elevato rotundato. Scutellum triangulare fuscum, dense cincereo-pubescentia.

thoracis basi fere duplo latiora, humeris modice elevatis, thorace vix quintuplo longiora; apice subtriangulata, supra dorsu antico depresso, tota fusco-subcinerea, opaca, subtiliter ordinate punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis; pube tenui depresso-cinerea undique obducta. Corpus totum subtus pube densa cinereo-argentea nitida testum. Pedes longiusculi pubescentes, femoribus clavatis, externe fusco-zonatis, basi testaceis; tibiae angulatæ tarisque fusco-testacei.

Obs: Dom. Prof. Fallén specimen *Donaciæ* comunicavit, in Scania captum, D. *Hydrochaeridis* similimum, sed totum supra pube flavescenti testum; tuberculatum anguli antici thoracis absotetum, & pedes toti testacei, femoribus tantum ante spicem non-nihil infuscatis; forte hæc species distincta, sed secundum individuum unicura, minus bene conservatum, pro certo determinare non audeo.

15. *D. Fennica*: latior, sub-convexa, supra rufo-testacea, subtus argenteo-sericea, thorace subtilissime rugoso, elytris profunde punctato-striatis, apice rotundatis, muticis.

*Rhagium Fennicum*, Payk. fn. 3. 70. s.

Habitat in Finlandia rarius, Dom. Pfeiff.

Descr. Statura & fere magnitudo praecedentis. Caput & collum nigra opaca, crebre subtilissime punctulata, pube densa cinerea depresso obducta; fronte temne canaliculata; oculi globosi nigro-brunnei. Antennæ quoad structuram ut in prioribus, nigro-fuscæ, pubescentes, articularis basi ferrugineis. Thorax latit.

latitudine parum longior, anterius latior, basi apice que truncatus, lateribus parvum inaequalis, supra modice convexus; dorso & lateribus rufus, subnitidus, glaber, crebre subtiliter transversim rugosus, in medio postico obsolete canaliculatus, tuberculo anguli articuli oblongo, minus elevato. Scutellum triangulare nigro-piceum, dense cinereo-pubescent. Elytra thoracis basi duplo latiora, humeris valde prominulis, thorace vix quinqueplo longiora, apice obtuse rotundata, mutica, supra modice convexa, dorso obsoletissime quadri-foveolata, tota dilutius rufo-testacea nitida glabra, regulariter & profunde punctatob-striata intersticiis levibus. Corpus totum subtus vellere denso cinereo-argenteo nitido tectum, segmentorum ventralium marginibus rufo-testaceis. Pedes longiusculi fusco-testacei pubescentes; femoribus clavatis, superne infuscatis.

16. D. Zosteræ: angustior, convexa, thorace nigro-bilineato pedibusque flavo-testaceis, elytris pallidioribus apice spinosis, striis nigro-punctatis, per paria approximatis.

*Fabr. Eleent. 2. 127. 3.*

*Rhagiūm muticum. Payk. fū. 3. 69. 4.*

Var. b, duplo minor.

*Donacia Equiseti. Fallén Obs. Ent. 1. p. 16.*

Habitat in Finlandiae aquosis rariis; var. b, in Scanie, Bahusie maritimis; ad Insulam Åskerö Bahusie in Ruppia aliisque plantis marinis, & mox aqua crescente in ipsis undis circumvagantes & sece copulantes, ferme vidimus.

Descr. D. dentipede paullo minor, angustior & multo convexior, Caput porrectum nigro-fuscum, vellere

vellere denso cinereo sericeo tectum, ore deflexo elongato, vertice profunde canaliculato; oculi parvi semi-globosi brunnei. Antennæ corpore parum breviores, nigro fuscæ, articalis inferioribus apice annulo angusto cinereo albido cinctis. Thorax antice paullo latior, basi apiceque truncatus, angulis sub-prominulis, supra modice convexus, in medio longitudinaliter canaliculatus, totus flavo-testaceus, opacus, omnium subtilissime coriaceus; in utroque lateri dorsi linea obliqua, jam nigra, jam dilutius fuscæ, saepe etiam obsoleta, vix observanda, praesertim in masculis; semper abbreviata, margines nullibi tangens. Scutellum oblongo-triangulare angustum nigrum, cinereo-pubescentia. Elytra antice thoracis basi dimidio latiora, humeris rotundatis, & illo quinto longiora, apicem versus attenuata, apice ipso emarginata, angulo exteriori in spinam elongatam acutam producto, interiori obtuso, parum prominulo; supra convexa pallida glabra nitida, punctatostriata, striis per paria approximatim, punctis striarum crebris coactatis, omnibus nigro-fuscis, unde elytra nigra, lineata & interstitia alterna latiora magis elevata, lineas flavas formant. Pectus & abdominis basis fuscæ, vellere denso cinereo-flavescente, sericeonitente, testa, ano testaceo. Pedes valde elongati, tenues, flavo-testacei, femoribus sub-clavatis, tibias posticis flexuosis.

Var. b, in omnibus simillima, modo duplo minor & ultra.

Qbd. Donacia Equileti Fabr. Eleut. 2. 127. 2. D. appendiculata, Panz. Fn. 24. f. 17. D. mucronata, Höppe Int. Erl. 47. f. 12. hujus varietas, teste Dom. Illig. in Mag. 3. 178. 2; sed si picturæ Panzeri & Hoppii naturæ fideles, striæ elytrorum non per paria approximatæ, unde dubium oritur, nam tales apud nos non vidi.

*Finis Partis Terzae.*

## ADDENDA

ad Partem Primam.

Pag. 6. *Pammadius.*

2. *P. elevatus.* var. b; immatura forte, corpore toto saturate ferrugineo, in Gotlandia a Dom. *Odhner* lecta, & a Dom. *Schönherr* communicata.

Pag. 39. *Aphodius.*

36. A. *Sus:* varietatem paullo obscuriorem, maculis fuscis elytrorum magis dilatatis & confluentibus, in Gotlandia a Dom. *Odhner* captam, communicavit Dom. *Schönherr*.

Pag. 44. *Copris.*

- 1-2. C. *Taurus:* Femina: ovata nigra subpubescens, clypeo thoraceque nigro-zonatis, elytrorum limbo obscure ferrugineo, clypeo rotundato integerrimo, lineis duabus transversis elevatis.

Var. b, linea anteriori clypei valde obsoleta.

*Fabr. Eleut.* i. 45. 69. *Illig. Col. Ber.* L. 44.8. *Critz. Ent. Vers.* i. 72. 25.

Habitat in Gotlandiae stercoratis, Dom. *Odhner*, qui plures feminas, nullum vero marem ibi detexit.

Descr. Statura C. auchicornis, sed plerumque paullo major. Capitis clypeus sub-orbiculatus, margine antico integrissimo, reflexo, supra sub-depressus, niger, virescens - zeno micans, crebre, at obsoletius

foletius coriaceo-punctatus; in vertice carinula transversa elevation, utrinque abbreviata, saepe in medio depresso, sub-emarginata; & ante illam in medio clypei alia, minus elevata, sed longior, margines fere attingens. Antennæ breves, ferrugineæ, clava fusca. Thorax magnus, elytris fere latior, antice late & profunde emarginatus, angulis prominentibus obtusis, lateribus rotundato dilatatus, postice in medio nonnihil productus, angulum obtusum formans; supra valde convexus, niger, virescenti-aeneo-nigricans, patte pubescens, concinno punctatus; antice in medio impresso retusus, quæ excavatio, a discō superiori elevata, carinula transversa, obtusa, abbreviata, in medio humiliori, distinguitur; in medio disci rudimentum obsoletissimum canaliculæ longitudinalis, & ab utroque latero foveola oblonga, qui exsus adiacet tuberculum elevatum. Elytra brevia, antice thoracis medio angustiora, ante medium dilatata, apice singulatim obtuse rotundata, supra depressa, tenui striata, interstitiis parce punctulatis; nigro-picea opaca, pubescentia, limbo exteriori dilatius fusco-ferrugineo. Corpus subtus nigrum, virescenti-nigricans, nitidum, pubescens, pectore crebrus, ventre parce punctulatis. Pedes breviusculi, validi, nigri, femoribus lati, compressis, nitidis; tibias anticus externe 4-dentatis.

Var. b, in omnibus simillima, sed carinula anterior clypei valde obsoleta, vix observanda.

Obs. Utrum C. capra auctorum & C. Tauro vere distincta, dijudicare nequeo; feminam vero jam descriptam ad C. Taurum verum pertinere, ex accuratestima determinatione Dom. Creutzeri; Loc. cit. indubium mihi videtur.

Pag. 71. A E S A L U S.

*Palpi quatuor inaequales, filiformes. Mandibula brevis, fornea; arcuata, acuta, femina dente parvo; interno, maris supra versus apicem dente vel cornu magno eretto, obtuso, armata. Maxilla brevissima, cornuta; apice compressa, rotundata, hirsuta, oblique laciniis, juxta apicem palpigera. Ligula vix illa. Labium breve tortilem truncatum integrum. Antennæ breves, articulo primo magno; arcuato; penultimus duabus latis, interne acuminate-productis, ultimo ovato. Corpus breviter ovatum; convexum. Tibia latæ; compressa, externe denticulis planimis serrata.*

i. *Æ. Scarabæoides*: sulco-castanelis, obscurus, confertissime punctatus, elytris lineis elevatis interruptis, e squamis erectis piliforibus nigris tantibus formatis.

*Fabr. Eleent. 2. 254. 1. Latr. Gen. Ins. 2.  
133. 1.*

*Lucanus Scarabæoides*. *Panz. fn. 26. f. 15. 16.*

Habitat in ligno putrido *Quercus*, ad *Strömsrum Smalandiæ*, non procul ab Urbe *Catarina*, in Julio mense 1812, a Dom. Ribbing & Manklin copiose lectus.

Descr. Statura brevis convexa & fere facies Syrthi, B. pillula paullo minor. Caput sub-rotundatum, sulco-castaneum, parum nitidum, confertissime punctatum; oculis lateribus nigris nitidis. antennæ thorace multo breviores, dilutius ferrugineæ, articulo primo maximo, valde arcuato, tertiam

*Ins. Svec. T. I. P. III. Uu* partem

partem totius jantennae effidente; secundo brevissimo, sed sequentibus crassiori, perfoliato; 3-8 minutis, valde coarctatis, exterioribus gradatim paulo crassioribus; 9, 10 magnis, latis, sed brevibus, interne acuminato-productis; ultimo etiam magno, rotundato compresso. Thorax antice multo angustior, ibique late & profunde emarginatus, angulis productis, acuminatis, lateribus sub-rotundatus, marginatus, basi bi-sinuatus, lobo medio magis producto, obtuse rotundato, angulis lateribus sub-rectis; supra valde convexus, pulvinatus, fusco-caeruleus, parum nitidus, confertissime concinne punctatus, squamulis densis piliformibus, vel pilis rigidis erectis, brevissimis fascis obductis, quales etiam in fronte observantur. Scutellum ovatum fusco-caeruleum, crebre punctatum, squamuosum. Elytra antice latitudine baseos thoracis, sed mox pone basin valde dilatata, deinde pone medium iterum coarctata, apice obtuse rotundata, ahumi tegentia, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, fusco-caerulea, confertissime punctata, punctis hic illis sub-seriatis, omnibus umbilicatis vel sub-ocellatis; in signulo elytro series tres aut quatuor, inæqualiter interruptæ, fasciculorum e squamulis erectis piliformibus brevissimis. Corpus subtus fusco-caeruleum, paullo magis nitidum, crebre rugoso-punctatum. Pedes breves validi, femoribus compressis, punctatis, pilis parvis cinereis depresso-adspersis, tibialis angulatis, externe dilatatis, spinulis plurimis inæqualibus, apicis majori, armatis.

Pag. 91. Hister.

21. H. virens.

Habitat etiam in Scania, rarissime. Dom.

Wetterhall,

Obs.

Obl. H. metallico statuta & magnitudine similis, magis tamen viridis, & ab illo distinctus; horcis superficie tota punctulata, eti in disco parvus & subtilius; fronte convexa, cibra punctulata, absque rugis transversis; tibiae antice etiam magis dilatatae videuntur, dentibus pluribus & minoribus armatae; elytrorum apex fere totus punctatus; it & discus ad basin fere, a Ria secunda ad quintam, eti parcius;

Pag. 100. *Sphaeridium*.

i. *S. Scarabaeoides*:

Var. a, Elytris apice immaculatis, macula humerali saturate rufa.

Habitas prope Holmiam. Mef. Dom. Schönherr.

Var. c, cum praecedentibus omni puncto conveniens, modo elytrorum apex disco concolor; absque hacula pallida seu rufescente; simillima *S. marginata*, sed major, & margo thoracis disco concolor.

Pag. 136: G-E O R I S S U S. Latreille:

*Palpi breves, sub-aquales, extrosum crassiores; maxilares paulo longiores, articulo ultimo ovalis; eodem labialium sub-globoso. Mandibulae validae cornute, basi latiores, extrosum artuato angustatae, apice obtuso, sub-enarginatae. Maxillæ breves, tristilaceæ, jub-rictæ, processu terminali trigono, appendice membranacea, denticulo interno instruita; stipulis lateris internis simpliciæ.*

bria membranacea aucto. Labium sub-crustaceum, truncato-trigonum, basi latius, apice utrinque costitato; Ligula membranacea, transversa, ad basin labii inserta. Antennæ thorace breviores; articulis novem, tribus ultimis clavatis sub-orbiculari, ferme sub-solidam aut obsoletissime perfoliatam formantibus. Corpus breve, sub-globosum; Caput valde inflexum & sub thorace positum abscondendum. Latreille.

Obs. Generi Macronycho Mylleri, in Illig. Mag. 5. p. 207, proximum, attamen in multis distinctum.

a. G. pygmaeus: sub-globosus niger, fronte rugulosa, thorace inaequali antice angustiori, elytris profunde punctato-striatis, humeris prominulis.

Latreille Gen. Inf. 4. add. p. 377.

Pimelia pygmaea. Fabr. Eleut. 1. 133. 31. Pag. fn. 3. add. 440. 1. Illig. Mag. 1. 338. 31. Schönh. Synon. 1. 136. 52.

Trox dubius. Panz. fn. 62. f. 5. Crit. Rev. 1. 28.

Var. b, elytris posterius fusco-ferrugineis.

Habitat ad ripas & littora aquarum, in Upplandia, Scania, Hallandia, Blekingia, &c. passim; plerumque luto & granulis arenaceis adglutinatis tectus, ut ægre investigatur.

Descr. Parvus, brevis, rotundatus, Sphaeridio atomario fere minor, eique facie quodammodo similis.

lis. Caput parvum sub-triangulare, valde retractum & sub thorace inflexum, nigrum opacum fronte in-sequali subtiliter ruguloso-coriacea; oculi parvi laterales, oblongi prominuli brunnei. Antennæ capite parum longiores, fulcæ, articulo primo crasso, oblongo; secundo aque crasso, sed brevi sub globoso; 3-6 angustioribus; 7-9 iterum crassis, compressis, coarctatis, clavam ovatam formantibus. Thorax anterius multo angustior, apice rotundatus, margine sub-elevato vel reflexo; lateribus pone medium dilatatus, basi sub-bifinuatus, supra in disco posteriori convexus, pulvinatus, fere levigatus, ante medium transversim impressus, ante impressionem, ut & versus latera posterius rugulosus, inæqualis totus niger, parum nitidus. Scutellum vix nullum. Elytra ante thorace multo latiora, humeris elevatis, rectangularis, thorace vix triplo longiora, apicem versus attenuata, supra valde convexa, posterius declivia, tota nigra, magis nitida, punctis magnis, profundis, feriatim digelatis, striata, interstitiis subtilissime coriacea. Alæ amplæ, albo-hyalinæ. Corpus subtus nigrum, opacum, obsoletius punctatum. Pedes longissimi nigri, tibiis anticis brevibus, arcuatis, posterioribus elongatis, rectis, sub-linearibus; tarsi 5-articulati videntur, primo parvo, angusto; secundo elius majori, ob-conico; 3, 4 etiam ob-conicis, secundo gradatim paucis minoribus; unguicalari longiori, arcuato.

Var. b, differt tantum elytro fragulo versus apicem plaga majori vel minori obscurare rufescens notato, sutura tamen semper nigra.

Pag. 175. *Cryptophagus*.

2-13. C. elongatus; angustus, niger, opacus; dense cinereo-pubescent, antennis pedibusque fusco-piceis, thorace oblongo sub-

Uu 2

deptessio

- depresso postice angustiori, "elytris" obsolete rugosis.  
 Habitat in Gotlandia, sub lapidibus, rarissime, Dom. Wetterhall. In Smolandia ad Strömstum. Dom. Marklin.

Descr. Cr. Caricis, Inf. Sy. s. add. p. IV. No 12, vix brevior, sed multo angustior, magisque depresso. Capit magnum, porrectum, sub triangulare, nigrum, parum convexum, crebre sed obsolete rugoso-punctulatum, cinereo-pubescentes, oculis lateralibus globosis nigris. Antennæ vix capite cuncthorace longiores, crassiusculæ, fusco-piceæ, pubescentes, articulis tribus ultimis crassioribus. Thorax latitudine longior, antice truncatus, lateribus ante medium nonnihil dilatatus rotundatus, subtiliter crenulatus, posterius angustatus, basi obtuse rotundatus, supra subdepressus, totus niger, cinereo-pubescentes, crebre sed obsoletissime rugoso-punctatus. Scutellum breve transversum, truncatum nigrum pubescens. Elytra thoracis basi paullo latiora & illo fere triplo longiora, apice rotundata, supra parva convexa, nigra, opaca, crebre & evidentius rugoso-punctata, pilis rigidis depresso-cinereis, fere ferim dispositis adpersa. Corpus subtus nigrum, magis nitidum, crebre subtilissime punctulatum, tenissime pubescens, ano piceo. Pedes breviusculi, validi, fusco-picei, pubescentes, tarsis crassiusculis 5-articulatis.

### Pag. 179. *Cryptophagus.*

- 16-17. C. plicatus: oblongus rufo-castanea nitidus, capite exerto, rotundato, thorace postice depresso, elytris basi plicatis.

Habitat

Habitat in Smolandie Parocchia Säby, a Dom.  
Wetterhall rarissime lectus.

Descr. Parvus, Cr. atro fere angustior, sed longior. Caput exsertum, rotundatum, thorace parum angustius, supra saturate castaneum nitidum, fronte depresso, subtiliter punctata; os inflexum, dilutius testaceum. Antennae capite cum thorace paullo longiores, crassæ, testaceæ, articulis tribus ultimis majoribus. Thorax quadrangulus, longitudine latior, basi truncaatus, angulis fere rectis, supra in dapse antico convexus, pulvinatus, lateribus & postice depresso, saturate castaneus, nitidus, crebre subtiliter punctulatus. Scutellum minutum, vix observandum. Elytra thorace parum latiora, sed illo plus triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra valde convexa, dilutius rufo-testacea, nitida, sat crebre vage punctata; in ipso humero tuberculatum vel circinata elevata, & intra illam foveola parva impressa, unde elytra quasi plicata apparent. Corpus subitus dilatius rufo-castanum, nitidum. Pedes longuscui, tenues, rufo-testacei.

Obs. Ab hoc genere differt: Capite majori, exerto, scutelloque minuto, vix transverso; Scydmoenis quodammodo similis, praesertim elytris basi platicatis, sed palpi breves hujus generis videntur.

### Pag. 236. Nitidula.

25-26. N. Olivacea: fusco-testacea, pubescens, crebre punctulata, capite, scutello, elytrorum futura apiceque fuscis, antennarum clava nigra, thorace magno, transverso, antice vix emarginato.

Habitat in floribus Scaniae rarissime. Dom.

Wetterhall.

U 4.

Descr.

Desq. Parva, N. Pediculariae aequalis & colore excepto similique. Caput breve, triangulare, fuscum, dense cinereo-pubescent, fronte plana, creberrime punctulata; oculi parvi prominuli nigri. Antennae vix longitudine thoracis, arcuatae, basi testaceæ, extrosum fuscescentes, clava magna nigricante. Thorax latus, transversus, antice paullo angustior, sub-truncatus, vel perparum emarginatus, lateribus anguste marginatus, basi elytrorum latitudine & illis adæquatus, angulis retrosum nonnihil prominulæ, supra valde convexus, fulco-testaceus, creberrime subtiliter punctulatus, dense cinereo-pubescent, Scutellum majuscum, rotundatum, fuscum, subtilissime punctularum. Elytra latitudine fere thoracis & illo vix triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra modice convexa, testacea, crebte subtiliter punctulata, dense cinereo-pubescentia, futura tota & apice late infascatis. Corpus subtus fusco-testaceum, sub-hirsute. Pedes testacei, unguis fuscescentibus.

Obs. An modo specimen immaturum N. Pediculariae?

### Pag. 242. *Nitidula*.

32-33. N. polita; brevis ovata nigra nitida levissima, antennarum basi pedibusque pilosis, capite levissimo, elytris truncatis.  
Var. b, capite rufescente.

Habitat in Smolandie Betula alba, variflora. Dom. Wetterhall.

Desq. Minuta, N. erythropa minor, Cryptophago globulo aequalis, brevis, utrinque obtusa, convexa, nigra nitida levissima. Caput cum oculis latitudine fere thoracis, sed breve, convexum, nigrum, nitidum,

nitidum laeve, versus usq; angustatum; oculi magni laterales nigro-brunnei. Antennæ thorace breviores, tenues, arcuatæ, basi piceæ, extrosum nigræ, articulo primo magno clavato; secundo brevi globoso, crassiusculo; 3-8 minutis coarctatis, clava ob ovata, obtusa, parum incrassata. Thorax brevis, latuus, antice in medio rotundatus, versus angulos subemarginatus, lateribus rotundatis deflexis; basi truncatus, supra valde convexus, fere pulvinatus, niger, nitidus, laevissimus. Scutellum breve triangulare nigrum nitidum laeve. Elytra latitudine thoracis, & illo vix triplo longiora, apice truncata, aum tamen tegentia, supra valde convexa, nigra, nitida, laevissima, polita. Corpus subitus nigrum, parum nitidum, tenui griseo pubescens. Pedes breves, tenues, nigro-picei.

Var. b, simillima, modo caput totum rufo-testaceum, semel in copula cum præcedente capta.

Pag. 265. *Silpha*,

*S. tristis*:

Var. b, fusco-testacea, capite, thoracis disco, antennis pedibusque nigro-piceis; immatura, nuper exclusa, certe.

Habitat in Gotlandia. Dom. Oehner.

Pag. 283. A G Y R T E S

Palpi quatuor; maxillares extrosum paulo erasiores, articulo ultimo ovato; labiales filiformes. Mandibulæ exsertæ, valide, apice valde arcuatæ acutissimæ, edentulæ. Maxilla apice bifida, lacinias sub-equalibus. Ligula membranacea, me-

die,

ticulis tribus ultimis abrupte majoribus, fuscis, apicali sub-acuminato. Thorax latitudine medii longior, anterius angustior, supra convexus, totus niger, nitidus, sub-lævis, lateribus parum pubescens, versus basi utrinque foveola, interdum duplicita, impressus. Scutellum vix observandum. Elytra oblongo-ovata, thorace plus triplo longiora, ante thoracis basi vix latiora, verius medium dilatata, apice rotundata, supra valde convexa, nigra, nitida, sub-lævis, pilis paucis cinereis adspersa; in basi singuli elytri striolæ vel plicæ ducit abbreviatæ, imprellæ. Corpus subtus nigro piceum, sub-nitidum, obsolete punctulatum. Pedes elongati, femoribus basi tenuibus, testaceis, extrosum valde clavatis, incrassatis, obscure castaneis, tibiis tardiusque fenuibus, pallidius testaceis.

Pag. 230. *Lampyris*.

3. L. hemiptera: nigra obscura, ano pallido, clytris brevissimis, antennis crassis compressis.

*Natr. Eleut.* 2. 106. 33. *Oliv. Ent.* 2. 28. 25.

25. Pl. 3. f. 25. a, b. *Geoffr. Ins.* 2. 168. 2.

*Müller. in Illig. Mag.* 4. 173.

Habitat in Gotlandiae pratis Sylvaticis raffissime, Dom, Wetterhalli.

Descri. Parva, L. noctiluca quadriplo minor, nigra-fusca, parum nitida, Caput parvum, pallidius fuscam, sub thoracis clypeo omnino reconditum, oculis parvis globofisi lateralibus nemotia nigra. Antennæ longitudine vix dimidiæ corporis, filiformes nigrae, pubescentes, valde crassæ, nonabilis compressæ, articulo primo pallidiori, ob-conico, basi tenui; secun-

secondo brevi; angulo; 13-10, crassis, coarctatis, apice truncatis, sub-equalibus; ultimo reliquis duplo longiori; spicè rotundato. Thoracis clypeus semi-ovalis, basi latior, sub-emarginatus; angulis tetrosum acutus-natis, antice obtuso rotundatus, supra in disco longitudinaliter convexus, intra margines latè profunde impressus, margine elevato, reflexo; totus niger, immaculatus, pèrùm nitidus, subtiliter granulato-punctatus; intra marginem utrinque Series e punctis paulo majoribus; ante medium baseos foveulae impressa obsoleta, eis utinque adiacet elevatio transversa, nitida. Scutellum magnum triangulare, nigrum, opacum, sub-rugosum. Elytra parva, vix thoracis longitudine, spicè dehiscentia, rotundata, nigra, opaca, subtiliter coriaceo-rugosa, fusco-pubescentia. Abdomen elytris triplo aut quadruplo longius, latum; depressum, nigrum, paulo magis nitidum, subtiliter granulato-coriaceum, segmentis duobus ultimis pallidiorebus; abdominis latera posteriores ferrata, segmentis 3-6 in angulum utrinque productis. Corpus subtus nigrum, opacum, segmentis duobus analibus flavis. Pedes breves, validi, compressi, nigro-fusci, genibus tarsisque pallidius lividis, femoribus tibiisque linea impressa canaliculatis.

### Pag. 325. *Dafytes.*

- 2. D. obscurus: elongatus nigro sub-virescens, hirtus, thorace brevi, elytris subtiliter rugoso-punctatis, antennis obtuse serratis, maris elongatis.

Habitat in floribus, prope Holmiam, Dom. Schönerr; in Gotlandia, Dom. Wetterhall; in Westrogothia, ipse; raro tametsi obvius.

*Defec*

Descri. Medius quasi inter D. cæruleum & nigrum; prius magnitudine & statuta elongata aequalis; etiam antennarum maris structura similia; color utroque posteriori; ab utroque tamen distinctus. Caput maris cum oculis thorace latius, nigrum, obsoletus punctatum; fronte inter oculos fovea lata impressa; uti totum corpus supra p<sup>ro</sup>p<sup>ri</sup>a longis fasciis hirtum; oculi maximi globosi, brunnei. Antennæ nigrae, pubescentes, longitudine dimidij corporis, intus obtuse ferratae, articulis triangularibus, 7-10 reliquis multo longioribus, ultimo adhuc longiori, sub-cylindrico. Thorax brevis transversus; antice truncatus, angulis deflexis, lateribus & angulis posterioris, rotundatus, supra in disco convexus, ante apicem & basin transversim obsolete impressus, in medio nigro sub-virescens, nitidior, p<sup>re</sup>cipue punctatus, versus marginae crebre rugoso-granulatus, obscure niger. Scutellum obtusum nigro-virescens, obsoletè punctulatum. Elytra antice thoracis medio paulo latiora, humeris elevatis proximalis, & illo sextuplo longiora, pone medium nonnihil dilatata, apico rotundata, supra convexa, nigro sub-virescens, pars summa nitida, crebre subtiliter rugoso-punctata, hirta. Pectus nigro-sub-virens, magis nitidum, obsoletè punctulatum; venter concolor, sub punctatus, pubetenui depressa fusco-testacea vestitus, segmento penultimum late & profunde emarginato. Pedes elongati tenues, femoribus nigro virescentibus, tibialis tisque nigro-piceis;

Femina longitudine maris, sed fere dimidio latior; Antennæ thorace parum longiores, extrosum crassiores, articulis omnibus obtuse ferratis; segmentum penultimum ventrale integrum, non emarginatum; cætera ut in mare;

Pag. 477. *Dytiscus*.

10-11. D. Bogemannii: oblongus niger, ore, antennis, pedibus totis Sternique laciniis testaceis, thorace testaceo fascia media abbreviata nigra, elytris mediocriter transversim strigosis.

*Dytiscus striatus*, Gyll. Inj. Sv. 1. 470. 16.

var. t.

Habitat in aquis stagnantibus, minus frequens; Monente Nob. Domino C. J. Bogeman, Capitaneo, Entomologo oculatissimo, Insectum hoc ut distinctam speciem considerare, ejusque nomine designare, justum censui.

Descr. Magnitudo & summa affinitas D. striati, ed minus convexus, & posterius minus angustatus; pedes toti & sterni laciniæ testaceæ; elytrorum trigesæ, præsertim in feminæ profundiores; a D. doabroto, cui etiam valde affinis, differt magnitudine esse duplo majori, corpore posterius minus attenuato, elytrorum striis duabus longitudinibus sat evidenter, & strigis transversis minus profundis, ubi simplicibus, cum in illo frequenter bimbi & ferè nastomozantes &c; Caput sub-depressum, nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum, ore toto late, maiusque duabus frontalibus rufo-testaceis; palpi testacei, apice patum suscipientes; oculi glaucescentes. Antennæ capite cum thorace paulo longiores, enues, totæ testaceæ. Thorax brevissimus, transversus, anterior angustior, late emarginatus, angulis rominalis acutis, basi sub-truncatus, supra subdepressus, striolis crôbris tenuibus irregularibus exarsus, flavo-testaceus, nitidus, fascia media abbreviata nigra.

nigra inæquali notatus. Scutellum triangulare nigro-piceum. Elytra oblongo-ovata, antice thoracis basi parum latiora, in medio nonnihil dilatata, apice rotundata, supra parum convexa, nigro fusca, margine laterali latius, baseos anguste flavescens; superficies tota crenulatim transversim strigosa; strigis in mare tenuibus, in femina multo profundioribus, in utroque hic illuc bifidis, non vero ita crenulatis anastomozantibus ut in D. dolabrato; præterea in singulo elytro striæ duæ longitudinales, irregulariter punctatae, in masculis evidenter, in femina parum conspicuae, propter strigas profundiores. Thorax subitus; pectus & venter nigra, crenula, subtilissime strigulosa; segmentorum posteriorum marginibus ferruginea; sternum postice bifidum, lacinias divercatis rotundatis rufo-piceis. Pedes validi, toti testacei, pilosi, tarsis anticis maris dilatatis, feminæ simplicibus.

Pag. 493. *Dytiscus*.

26. D. Sturmii: var. c. omnino ut var. b, sed pedes pilosi, tarsis obscurioribus. E Lapponia; a Dom. Schönherr communicata.

Pag. 500. *Dytiscus*.

32. D. angustior!

Obs. In var. c, e Lapponia, a Dom. Schönherr communicata, striæ lateralis pallidioris rudimentum obsoletum observatur.

Pag. 529. *Hyphydrus*.

- 13-14. H. nigro-lineatus: oblongo-ovatus, subitus niger, supra pallide testaceus, thora-

thorace macula media rhombea, elytrorum sutura lineisque quatuor nigris, striis impressis nullis.

Schônh. synon. 2. 33. 16. Tab. 4. f. 2. a, b.

Habitat in aquis Scaniæ rarissime; Dom. Fallén; in Oelandia, Dom. Marklin.

Descr. H. lineello facie, colore & fere magnitudine simillimus, macula discoidali thoracis, & defectu striarum impressarum in elytris, satis distinctus. Caput obtuse rotundatum, pallide testaceum, subtilissime, ut vix visibiliter punctulatum, margine summo verticis nigricante; oculi depresso brunnei. Antennæ vix capite cum thorace longiores, testacea, extremitatem fuscantes, Thorax brevissimus, transversus, anterius paulo angustior, pro capite late emarginatus, postice bifinatus, in medio productus, supra transversim elevato convexus, basi apiceque depresso, pallide testaceus, subtilissime punctulatus, margine summo antico fuscante; in medio dorsi macula parva rhombea nigra, posterius elongata. Elytra antice vix thoracis basi latiora, versus medium dilatata, apice rotundata, supra parum convexa, pallide testacea, creberrime & paulo evidenter quam thorax vase punctata, sutura tota lineisque quatuor parallellis, neque basin exacte, nec apicem attingentibus, nigris, extima in medio attenuata, saepè interrupta; extra illas interdum præterea linea quinta, parva, angusta, nigra. Pectus & abdomen nigra, sub nitida, subtiliter punctulata. Pedes elongati rufo-testacei, tarsis obscurioribus.

Pag. 535. *Hyphydrus.*

18-19. H. Marklini: oblongo-ovatus, glaber, niger, antennarum basi, fronte, tho-  
*Inf. Svec. T. I. P. III.* X x racis

racis fascia media, pedibusque testaceis, elytris griseis, plaga magna sinuata nigra.

Habitat in Oelandiae aquis, Dom. G. Marcklin, Medicinæ studiosus, Inspector, præfertim Plezatorum, scrutator eximus; vir integer, amicus exoptatissimus.

Descr. Magnitudo & fere statura H. 6 pustulati, vel paullo magis convexus. Caput latum, antice rotundatum, crebre subtiliter punctulatum, fronte late testacea nitida, limbo toto nigro piceo; oculi magni, depresso, brunnei. Antennæ thorace longiores, crassiusculæ, testacea, apice nigro piceæ. Thorax brevissimus, transversus, antice in medio truncatus, angulis anteriorum prominulis, caput ambientibus, lateribus sub-rotundatus, anguste marginatus, basi sinuatus, in medio loco scutelli, angulariter proditus, supra in medio transversim convexus, testaceus nitidus, subtiliter punctulatus, margine antico angustius, baseos late, inaequaliter nigro piceis. Elytra antice thoracis basi paullo latiora, & pone bâti adhuc magis diatata, posterius angustata, apice subacuminata, thorace sextuplo longior & ultra, supra parum convexa, undique confertissime punctulata, griseo-testacea, sutura tota nigra, & in singulo elyro plaga magna sinuata, posterius cum sutura conexa, ejusdem coloris; plaga hæc quasi e lineis confluentibus composita videtur, antice præcipue conspicua; in disco anteriori cuiusvis elytri striæ duæ crebrius punctatae, quarum interior magis conspicua. Thorax subtus testaceus; pectus & abdomen nigro picea nitida, crebre punctata. Pedes longiusculi testacei, femoribus in medio infuscatis.

Pag. 540. *Hypydrus.*

25. H.

15. H. Granularis:

Var. b; elytrorum lineis pallidis valde obsoletis, vix observandis.

Habitat in aquis stagnantibus Gotlandiae, pessim. Dom. Wetterhall.

Var. b, paullo minor, angustior quam a; differt praesertim elytris concavioribus, vix pallido-lineatis; linea mediae rudimentum tamen plerumque animo conspicendum; ceterum omni punto cum aconveniens, ut specie non distinguenda.

Pag. 544 *Hyphydrus*.

19. H. hamulatus: ovatus, thorace testaceo, basi utrinque striola impresso, elytris pallidis, futura, linea longiori postice hamata; aliaque abbreviata nigris.

Habitat in conservis marinis Gotlandiae ad Slitö. Dom. Wetterhall.

Descr. Minutus; H. gemino aequalis & quoad culpturam thoracis similis. Caput rotundatum rufo-spiceum punctulatum. Antennae ferrugineæ, apice obscuriores. Thorax brevissimus, transversus, antice paullo angustior, late & sat profunde emarginatus, angulis productis, acutis, lateribus sub-rectis, tenue marginatis, basi sub-truncatus, in medio loco scutellij nonnihil productus, supra modice convexus, pallide testaceus, subtilissime punctulatus; margine ipso baseos anguste infuscato; ab utroque latere baseos ferre in medio inter marginem & centrum dorsale, linea brevis impressa, introrsum obliqua. Elytra ante thoracis basi parum latiora, ante medium non-

nihil dilatata, posterius attenuata, thorace quintuplo longiora, supra modice convexa, pallida, subtilissime creberrime punctulata, tenui pubescentia; basis ipsa juxta thoracem nonnihil insuscata; sutura tota late nigra, subnitida; juxta suturam in angulo elytro linea lata nigra, utrinque abbreviata, postice extorsum hamulum emittens, & extra illam anterius lineola brevis ejusdem coloris; intra marginem posteriorius lineola fusca obsoleta. Corpus piceum. Pedes tenues testacei.

---

### 'Addenda ad Partem Secundam.'

#### Pag. 40. *Nebria*:

##### 3. N. Gyllenhalii.

Varietatem elytris rufo-piceis, forte immaturam, e Lapponia, communicavit Dom. Schönherz.

##### 6. N. multipunctata: pag. 44.

Varietatem violaceo-virescentem, nitidam, e Lapponia, communicavit Dom. Schönherz.

#### Pag. 85. *Harpalus*.

##### 6. H. oblongo-punctatus.

Varietatem fere omnino nigram, palpis, tibialis tarsisque nigro-piceis, e Lapponia, communicavit Dom. Schönherz.

#### Pag. 97. *Harpalus*,

6. *H. rufipes.*

Var. c; males etiam hujus varietatis e Lapponia, communicavit Dom. Schönerr; Pedes, imprimis femora, in hac varietate obscurius rufo-picei.

Pag. 98. *Harpalus.*

6-17. *H. pumicatus:* oblongus nigro-piceus nitidus, antennis pedibusque rufescens, mandibulis productis, thorace ob-ovato, fovea utrinque simplici, elytris punctato-striatis.

*Carabus pumicatus.* Illig. Col. Ber. t. 186. 62.  
Panz. fn. 30. f. 16. Schön. synon. t. 190. 120.

*Carabus tenuis.* Marsh. Ent. Br. t. 468. 97.

Habitat in Scania. Dom. Fallén.

Deser. Statura angusta H. oblongi, sed fere duplo major, thorace anteriori latiori, foveis baseos angustioribus impunctatis, mandibulis elongatis, &c. ibunde distinctus. Caput porrectum nigrum nitidum sub-læve, fronte inter oculos utrinque fovea obliqua impressa; mandibulæ valde elongatae, arcuatae, rufo-nigrae; Palpi elongati, pallide testacei; oculi prominuli nigri. Antennæ dimidio corpore longiores, uno-testaceæ, pubescentes, articulo primo valde elongato. Thorax oblongus, antice multo latior, runcatus, lateribus rotundato-dilatatus, anguste marginatus; posteriorius valde angustatus, basi submarginatus, angulis prominulis acutis; supra valde convexus, niger, nitidus, lævis, in medio profunde caliculatus, & intra angulum utrinque fovea oblonga, angusta, profunda, lævi, impressus. Scutellum

parvum, rotundatum, nigro piceum, laxe. Elytra oblongo-ovata, antice thoraci basi latiora, & ab illo remota, angulis humerum rotundatis; ultra medium dilatata, apice rotundata, supra modice convexa, nigro picea, saepe dilutius rufo-picea nitida, profunde striata & in striis subtiliter punctata, interstitiis planis, laevibus; intra marginem series, in medio interrupta, e foveolis sub-orbiculatis, sub-ocellatis vel umbilicatis, sed in disco puncta majora nulla. Corpus subtus dilutius rufo-piceum nitidum, thorace pectoreque crebre punctatis, ventre sub-laxe. Pedes elongati, validi, pallide rufo-testacei, tibialis tarsisque ciliatis,

Pag. 114. *Harpalus*.

30. *H. cupreus*.

Var. g, femoribus rufis.

Habitat in Finlandia. Dom. Schönherr.

Var. g, praecedentibus omni punto simillima, sed femora tota late rufo-testacea, tibialis tarsisque fusco picet; color paginæ superioris variat, aeneus, aut coerulescens ut in a, d, & e, antea,

Pag. 123. *Harpalus*.

34-35. *H. azureus*: cyaneo-virens, sub-pubescentes, subtus piceus, antennis pedibusque rufis, thorace profunde punctato, elytris striatis, punctulatissimis.

*Carabus azureus*. Fabr. Eleut. 1. 196, 145.

Illig. Mag. 1. 51, 36-7. Schönh. synon 1. 203, 209.

*Carabus chlorophanus* Panz. sp. 73. f. 3. Crit. Rev. 42:

## Habitat in Gotlandia. Dom. Odhner.

Descr. Magnitudo, statura & affinitas H. puncticollis, N:o 25 antea, sed thoracis anguli nullatus producti, & color longe alias. Caput breve, rotundatum, nigrum, parum cœrulecenti-micans, sat profunde, sed in disco minus crebre punctatum, lato, ore palpisque ruf-scentibus; oculi parvi laterales prominuli nigri. Antennæ thorace paullo longiores, filiformes rufæ, pubescentes. Thorax longitudine latior, antice sub emarginatus, basi truncatus, ateribus reflexo marginatus, ante medium rotundato-dilatatus, angulis posticis sub-rectis, nullatenus prominulis; supra cœruleo-violaceus, nitidus, tenui pubescens, in disco antico nonnihil convexus, ibique parcitus, in limba omni crebrius profunde punctatus, in medio obsolete canaliculatus, foveolis vero posticis vix ullis. Scutellum parvum triangulare nigrum. Elytra thoracis basi latiora, illoque plus triplo longiora, apice rotundata, supra parum convexa, cœruleo-virescentia sub-opaca, subclavige pubescentia, tenui, regulariter striata, striis sub-tævibus, interstitiis confertissime punctulatis. Alæ amplexu albo-hyalinæ. Corpus subtus piceum, sub nitidum, parce punctulatum. Pedes brevisculi, validi, toti pallidius rufo-testacei, tibiis tarvisque ciliato-spinosulis.

Obs. Variat colore thoracis elytrorumque obscurius cœruleo-nigricante,

Pag. 123. Marpalus.

34-35. H. punctulatus: sub-depressus niger, laevis, elytris subtiliter punctato-striatis, thorace intra angulum posticum carinula elevata utrinque.

Xx 4

Cora:

*Carabus punctulatus*. Fabr. Eleut. i 292. n.  
*Illig Col. Bor.* i. 175. 46. *Panz. fn.* 3<sup>a</sup>.  
*io. Schall. Act. Hall.* i 318. *Schönh. Syno-*  
*i. 197. 165.*

Habitat in *Gottlandia* passim, Dom. *Wetter-*  
*hall & Odhner*; in *Oelandia*, Dom. *Marklin*.

Descr. H. tardo major, longior. H. Cisteloid  
 aequalis. Caput magnum porrectum nigrum nitidum  
 læve, foveola oblonga inter oculos utrinque impre-  
 sum, palpis piceis; oculi magni globosi brunnei.  
 Antennæ thorace paullo longiores, basi nigrae, ex-  
 trorsum fuscae, pubescentes. Thorax longitudine la-  
 tior, antice parum emarginatus, lateribus nonnihil  
 rotundatus, marginatus, basi truncatus, angulis ob-  
 tusis, ante scutellum sub-emarginatus, supra sub de-  
 pressius, totus niger, lævis, foveola longitudinali te-  
 nui impremissus; juxta angulum posticum utrinque  
 carinula elevata brevis, & intra illam foveola lata,  
 sed non profunda, obsoleta, parce punctata. Scut-  
 ellum parvum triangulare nigrum læve; Elytra  
 antice latitudine thoracis & illo triplo longiora, in  
 medio nonnihil dilatata, reflexo - marginata, versus  
 spicem sinuato - attenuata, supra sub - depressa, in  
 medio baseos retusa, tota nigra nitida, striis subti-  
 lissimis e punctis parvis seriatim notata, interstitiis  
 omnino lævibus; in stria tertia a futura puncta tria  
 majora, remota, & intra marginem series e punctis  
 majusculis, in medio magis distantibus. Alae amplae  
 albo - hyalinæ. Corpus subtus atrum, magis nitidum,  
 pectore parce punctato, ventre lævi, seriebus  
 quatuor e punctis majoribus remotis. Pedes medi-  
 ocrens nigri, femoribus validis, tibiis spinoso ciliatis,  
 tarfis piceis.

Pag. 150. *Harpalus*,

57-58. *H. Bogemannii*: nigro-piceus de-  
pressus, subitus dilutior, thorace breviori  
cordato, elytris obsolete inæqualiter stria-  
tis, interstiliis subtilissime strigosis.

Habitat in Smolandia rarissime, Dom. Bo-  
geman; etiam in Finlandia, a Dom. Schönherr  
communicatur.

Descr. Statura depressa & affinitas *H. liventis*,  
sed fere duplo minor, thorace breviori, striis ely-  
trorum, &c. ubunde distinctus, *H. picepedi magni-*  
*tudinis* *æqualis* & *similis*, sed multo magis depre-  
sus, thoracis structura longe alia &c. Caput oblongum  
nigrum nitidum lævissimum, fronte antica inter  
oculos utrinqua impressa; os piceum; palpi rufi,  
picei, medii crassiores & minus elongati quam in  
*H. picipede*; oculi oblongi prominuli, in mortuo  
glauci. Antennæ vix longitudine dlmidii corporis,  
basi piceæ, extrorsum fuscæ, pubescentes. Thorax  
cordatus, latitudine apicis vix longior, antice truncatus, lateribus ante medium nonnihil dilatatus, ba-  
si multo angustior, truncatus, angulis rotundatis;  
supra parum convexus, niger nitidus, subtilissime  
transversim strigosus, in medio tenue canaliculatus,  
intra basin utrinque foveola rotundata sat profunda  
impressus; margo lateralis, posterius latior, valde  
elevatus. Scutellum oblongo-triangulare nigrum  
nitidum sub-læve, quoad maximam partem in inter-  
stitio inter thoracem & elytrorum basin situm. Ely-  
tra ampla, thoracis basi fere duplo latiora, humeris  
rotundatis, & illo fere quadruplo longiora, lateri-  
bus non dilatata, apice oblique sinuato-truncata,  
supra depressa, dilutius nigra, minus nitida, obsolete  
striata, striis vix punctatiss., per paria magis ap-  
proximatis, unde interstitia alterna, 2, 4, 6, 8, &

satura paullo latiora, & omnia sub oculo acute ar-  
matu omnium subtilissime & creberrime transversim  
strigosa; margo lateralis antice reflexus, posterius  
latius explanatus, & intra marginem series e foveo-  
lis sub ocellatis vel umbilicatis, remotis. Corpus  
subtus diuisus piceum, nitidum, laxe, aro lato, ob-  
tuso, extra elytra parum prominulo. Pedes elon-  
gati, tenues, picci, basi dilatati rufescentes,

Pag. 156. *Harpalus.*

63 H. Sex-punctatus: var,

Specimina mortua, equis distans immersa, co-  
lorem nigrum induunt, unde difficile distingueda,

Pag. 162. *Harpalus.*

68-9 H. Wetterhallii: niger nitidus, an-  
tennis pedibusque testaceis, elytris depre-  
ssis basi ferrugineis, thorace transverso an-  
tice emarginato, foveis baseos nullis.

Habitat sub lapidibus, in Gotlandia ad Slit-  
ō, rarius, Dom. Wetterhall; in Oelandia  
Dom. Marklin.

Deser. H. Vespertino fere brevior, sed latior  
depressus. Caput rotundatum nigrum nitidum laxe,  
foveolis obsoletis in fronte & inter antennas im-  
pressum; oculi prominuli brunnei; os pallide testa-  
ceum, palpis omnino hujus generis. Antennae tho-  
race cum capite paullo longiores, siliformes, tenues,  
totae pallide testaceæ. Thorax brevis transversus,  
ab elytris remotus, antice late & sat profunde emar-  
ginatus, lateribus & postice rotundatus, supra con-  
vexus, tenui canaliculatus, niger nitidus laxevis, mar-  
gine laterali angusto reflexo ferrugineo, foveis po-  
sticis

sticis omnino nullis. Scutellum minutum triangulare piceum. Elytra antice vix latitudine thoracis, posterius dilatata, apice oblique truncata, supra depressa, fere plana, regulariter striata, striis tenuibus vix punctatis, interstitiis planis, lævibus; nigra nitida, basi transversim saturata ferruginea; marpo lateralis inflexus, & ipse apex etiam angustè ferrugineus; intra marginem series e foveolis majoribus obsoletis posterius magis coarctatis. Corpus subitus nigro-piceum nitidum læve. Pedes mediocres validi, toti testacei, tibiis tarvisque nigro-ciliatis.

Pag. 210. *Omalium.*

## II. O. depressum:

Var. b, elytris fusco-testaceis:

Var. c, Antennarum basi pedibusque rufo-testaceis, thorace, elytris corporeaque rufo-piceis.

*Silpha hemiptera.* Illig Schneid Mag. s. 597. s.  
Panz. fn. 25. f. 6.

Habitat var. b, cum præcedente in stercore & fungis; var. c, in Smolandæ fungis, Dom. Wetterhall.

Var. b, differt tantum elytris pallidioribus, aut brunneis aut fusco-testaceis.

Var. c, paullo major; caput nigrum; antennæ basi rufo-testaceæ, extrosum fuscescentes; thorax lateribus testaceus, disco obscurior; elytra rufo-picea, lateribus interdum dilatiora; abdōmen piceum; pedes toti rufo-testacei; cæterum conformatio paritium, punctura & omnia ut in a, quare specie distingui non possunt.

Pag. 224. *Omalium.*

22-23. *O. inflatum*: ovatum, valde convexum, rufo-testaceum, nitidum, profundius crebre punctatum, capite elytrisque piceis.  
Var. 6, Thorace etiam piceo.

Habitat in Smolandia, Dom. *Wetterhall*; in Westrogothia ad Mysseberg, in floribus Spireæ Ulmarie, aliquoties captum.

Deser. *O. pygmaeum* proximum, sed adhuc brevius, multo magis convexum magisque nitidum, profundius punctatum, sere glabrum. Caput subtriangulare, supra piceum, nitidum, crebre & sat profunde punctatum, inter antenpas foveola obsoletissima utrinque impressum, ore palpisque testaceis; oculi laterales sub-globosi nigri. Antennæ thorace sere longiores, crassissimæ rufo-ferrugineæ, pilis longis histæ; articulo primo longo, crasso ob-conico; secundo æque crasso, sed brevi, nodoso; tertio angusto, ob-conico; 4-6, parvis, sub-globulis; 7-10 multo latioribus, sed brevibus, perfoliatis; ultimo adhuc crassiori ovato. Thorax brevis transversus, basi apiceque truncatus, lateribus satis late marginatus, in medio rotundato dilatatus, angulis posticis sub-rectis, supra in diseo valde convexus, crebre & sat profunde punctatus, saturate rufo-testaceus, nitidus, sub-glaber, vel sub oculo acute armato, pilis subtilissimis adspersus. Scutellum triangulare rufo-testaceum læve. Elytra thorace triplo longiora, antice ejus medio vix latiora, versus apicem sensim dilatata, apice truncata, angulis exterioribus rotundatis; supra valde convexa, veluti inflata, picea vel rufo-brunnea nitida, uti thorax sub-glabra, crebre & sat profunde punctata, antice præsertim versus humerum & marginem lateralem, dilutius rufo-testacea. Abdomen breve, latum, versus axum sub-acuminatum.

cuminatum, uti totum corpus subtus pallidius, rufo-testaceum, nitidum; laeve, fere glabrum. Pedes tenuis pallide testacei.

Var. b, differt tantum thorace etiam supra obscuriori, piceo vel rufo-brunneo.

Obs. Ob figuram corporis brevem, ovatam, hæc species aptius in sectione priori, juxta Om. affimile collocanda, sed propter summam cum Om. pygmeo affinitatem illi sub-jungere idoneum censui.

Pag. 224 *Omalium.*

22-23 O. luridum: oblongo-ovatum rufo-piceum, antennis exrrorsum gradatim crassioribus pedibusqne testaceis, thorace postice angustiori, elytris confertissime punctatis.

Habitat in Smolandæ Paroecia Sæby, tempore hiemali in glacie captum, a Dom. Wetterhall; e Finlandia etiam a Dom. Flander missum;

Descr. Magnitudo & fere statura O. pygmae; sed distinctum, thorace postice angustiori, elytris multo profundius punctatis, corpore glabriori, &c; ab O. inflato differt: corpore longiori, minus convexo, antennarum structura, &c. Caput sub-triangulare brunneum punctatum; inter antennas vix impressum; ore testaceo; oculi laterales sub-globosi nigri. Antennæ capite thoraceque longiores, pallide testaceæ, tenui pubelcentes, articulo primo valde elongato, apice incrassato, ob-conico; securido etiam crasso, sed brevi; tertio tenui, longiusculo ob-conico; quarto parvo globoso; 5-10 gradatim crassioribus, truncatis; ultimo adhuc crassiori, ovato. Thorax longitudine latior- basi apiceque truncatus, lateribus

ribus teque marginatus, ante medium rotundato-dilatatus, posterius angustior, angulis sub rectis; supra modice convexus, æqualis, rufo-piceus, parum nitidus, crebre punctatus. Scutellum parvum triangulare piceum læve. Elytra thorace duplo longiora, antice thoracis basi latiora, posterius nonnihil dilatata. spicæ truncata, angulo exteriori rotundata; supra in dorso sub depresso, saturatius picea, confertissime & sat profunde punctata, pilis minutissimis griseis parce adspersa. Abdomen pone elytra illarum fere longitudine, latum, marginatum, piceum, læve, ano sub acuminato testaceo. Corpus subtus pallidius rufo testaceum, nitidum, læve, Pedes tenues pallide testacei:

- Pag. 231. *Omaliumii.*

#### 28. O. striatum:

Var. b, thorace fusco-ferrugineo, elytris pallide testaceis, corpore subtus anōque rufo-testaceis.

Habitat in Scania. Dom. Prof. *Pallén.*

Var. b, colore pallidiōri tantum differt; caput fusco piceum; thbrax obscure ferrugineus; elytra pallidius testacea; corpus totum subtus & anus supra rufo-testacea; pedes pallidi; cætera ut in a.

Pag. 247. *Tachyporus.*

10-11. T. bi punctatus: convexus niger nitidus, pubescens, ore anō, pedibus, elytrorumque macula baseos lunata testacea, antennis crassis nigris, basi apicequé testacea.

*Grav.*, *Mitr.* 133. 13. *Monogr.* 5. 4.

Hab-

**Habitat in Boletis arboreis Smolandiae raffissime, Dom. Wetterhall.**

Descr. Minutus, T. pediculario æqualis & affinis, sed differt antennis adhuc crassioribus, medio nigris, elytrorum macula rufo-testacea, &c. A T. bipustulato, cui etiam similis, differt magnitudine quadruplo minori, antennis multo crassioribus, &c. Caput breve latum, convexum rigrum nitidum, ore toto palpisque testaceis. Antennæ longitudine thoracis, extorrisum valde incrassatae, nigro-piceæ, articulis quatuor baseos, ultimoque sub globoso testaceis. Thorax amplius, antice angustior, sub emarginatus, lateribus vix marginatus, postice multo latior, truncatus, angulis fere rectis; supra valde convexus, niger nitidus, tenuissime pubescens, margine summo baseos testaceo pellucido. Scutellum triangulare nigrum punctulatum. Elytra thoracis postico paullo angustiora, at illo fere duplo longiora, apice truncata, angulis rectis; supra convexa nigra nitida, tenui pubescens, vix punctulata; in singulo versus basin macula transversa lunata rufo testacea, finu apicem respiciente. Abdomen pone elytra illis brevius, conicum, setis longis undique adspersum, nigrum, ano late testaceo. Corpus subtus nigrum, minus nitidum, subtiliter crebre punctulatum, ventre rufopiceo. Pedes tenues, toti rufo-testacei.

Pag. 296 *Staphylinus*.

15. S. Stercorarius:

Var. b, antennis totis nigro-piceis.

Grav. Monogr. 155. 130. var.

**Habitat in Smolandia Dom. Wetterhall; in Westrogothia Dom. Dalman.**

Obs. Ab a, differt tantum antennarum basi fusi concolor, nec rufa; cætera omnino convenient.

Pag. 364. *Lathrobium*.

1-2. L. rufipenne: nigrum sub-nitidum, elytris saturatius rufis, basi nigris, capite oblongo. profunde punctato, ore, antennis pedibusque testaceis.

Mas: segmento penultimo ventrali trimarginato.

Femina: segmento eodem rotundato integrum.

Habitat in Smolandia, ad litora lacus Säbyensis, ratus Dom. Vetterhall.

Descr. Medium quasi inter L. elongatum & fulvipenne, utroque tamen paullo minus & distinctum, præsertim capite longiori, crebrius & multo profundiis punctato, elytris saturatius rufis, nitidioribus, &c. Caput thorace paullo latius, oblongo-quadrangulum, nigrum, convexum, undique creberrime & profunde punctatum, ore palpisque testaceis, mandibulis piceis; oculi parvi brunnei. Antennæ longitudine fere thoracis, filiformes, rufo-ferrugineæ, in medio interdum obscuriores, structura ut in L. elongato. Thorax oblongo-quadrangulus, niger, paulo minus crebre & subtilius quam caput punctatus, linea media longitudinali angusta levissima. Scutellum triangulare nigrum, obsolete punctatum. Elytra thorace paulo latiora & longiora, supra parum convexa, subtiliter & obsoletius vage punctata, late rafa, basi vix ad tertiam partem nigra. Abdomen pone elytra reliquo corpore paulo brevius, supra uti totum corpus subtus; nigrum sub-nitidum, creber-

creberrime subtilissime punctulatum, pubescens, ano supra concolore, segmentis posterioribus ventralibus subitus anguste testaceo-marginatis; segmentum penultimum ventrale maris in medio leviter, versus latera utrinque late emarginatum, non impressum; feminæ rotundatum integrum; ultimum in utroque sexu conicum, stylis duobus longioribus rigidis nigris armatum. Pedes breviusculi validi, pallide rufo-testacei, structura omnino ut in L. elongato.

Pag. 367. *Lathrobium*.

3-4. L. multipunctum: rufo-piceum nitidum, pectore abdome neque nigris, ore, antennis, pedibus anoque testaceis, clytris profunde seriatopunctatis.

*Grav. Mirr. 52. 2. Monogr. 131. II. var. 2.*

Habitat in Gotlandia sub lapidibus, rarissime. Dom. *Wetterhall*.

Descr. Statura omnino L. elongata, sed paullo minus, praesertim angustius, elytrorum punctis magnis, profundis, seriatim digestis, a reliquis nostris distinctum. Caput thorace latius, subquadratum, angulis rotundatis, supra convexum, saturate rufo-piceum, nitidum, lateribus crebre, in fronte vero parcius mediocriter punctatum, oculis parvis nigro-brunneis; os & palpi dilutius rufo-testacei, antecram articulo tertio magno clavato. Antennæ longitudine thoracis, filiformes, rufo-testaceæ, pubescentes, structura ut in L. elongato. Thorax oblongo-quadrangulus, dilutius rufo-brunneus nitidus, ut crebre punctatus, punctis hic illis in series abbreviata, confusa, dispositis; in medio dorso linea longitudinalis levius, ut in prioribus. Scutellum triangulare, ap-

*Inf. Syst. T. I. P. III. Y y.*

fere rectangularis, & illo triplo longiora, lateribus & postice rotundata, supra valde convexa, tota testacea, immaculata; juxta suturam posterius stria impressa, & in disco series simplices regulares e punctis minutis, quarum interstitia etiam crebre subtinente punctulata. Corpus subitus ferrugineum, subtiliter punctulatum. Pedes breves, pallide testacei, membranibus simplicibus, parum crassus.

Pag 566. *Anisotoma*.

10. A. multi-striatum: oblongo-ovatum, ferrugineum nitidum, capite thoraceque saturationibus, subtiliter punctulatis, elytris confertissime striato-punctatis.

Habitat in Svecia. Mus. Dom. *Fallén*.

Descr. Minimis, A. ferruginei individuis adhuc paullo minus, praesertim angustius, magisque oblongum; quoad puncturam elytrorum cum A. punctato convenire videtur, sed statura magis oblonga, caput & thorax parcus & multo subtilius punctulatus, &c. Caput transversum, convexum, saturate ferrugineum, fere rufo-castaneum, nitidum, subtilissime & minus crebre punctulatum, ore pallidiori; mandibulae validae, arcuatæ, apice fuscescentes; oculi sub-depressi, nigro-brunnei. Antennæ thorace cum capite breviores, crassiusculæ, saturate ferrugineæ, clava ut in prioribus 5° articulata, ultimis tribus magnis nigro-brunneis. Thorax brevis transversus, antice paullo angustior, ibique late sed non profunde emarginatus, lateribus & postice nonnihil rotundatus, tenui marginatus supra convexus, rufo-castaneus nitidus, subtiliter & minus crebre punctulatus, tenuillum breviter triangulare ferrugineum nitidum, subtiliter punctulatum. Elytra thoracis basi vix latentes, sed illo fere quadruplo longiora, posterius attenuata.

tenuata; supra convexa, dilutius rufo-ferruginea. nitida, confertissime seriatopunctata; striæ impressæ vix observandæ, sed puncta in seriebus alternis profundo profundiora & magis approximata, quam in seriebus interstiliarum; versus humerum striæ minus regulares. Corpus subtus dilutius rufo-testaceum nitidum, vix punctulatum, pectore saturatiori. Pedes mediocres pallide testacei, femoribus compressis, tibiis ciliato-spinosis, posticis parum arcuatæ.

Pag. 566. *Anisotoma.*

9 10. A: spinipes: oblongo-ovatum, rufobrunneum, antennarum clava 5-articulata nigricante, elytris punctato-striatis, interstitiis transversim rugosis, femoribus posticis dente valido acuto armatis.

Habitat prope Upaliam, Dom. Falander; Mus. Dom. Schönberr; in Westrogothia silva Kinnensi, ipse; rarissime tamen occurrit.

Descr. Minimis A. ferruginei individuis adhuc dimidio minus, praesertim angustius, reliquis hunc generis magis oblongum. Caput deflexum, transversum, saturate brunneum, fere nigrum, nitidum, obsolete punctulatum, ore palpisque ferrugineis, mandibulis piceis; oculi parvi laterales nigri. Antennæ thorace breviores, inferne tenues, testaceæ, clava magna, crassa, 5-articulata nigricante, structura ut in prioribus. Thorax transversus, antice fere truncatus, vix emarginatus, lateribus angulisque posticis rotundatus, tenue marginatus, basi truncatus, supra valde convexus, fere pulvinatus, rufo-brunnens nitidus, sat crebre sed obsolete punctatus, Scutellum triangulare rufo-piceum, abso-

lete punctulatum. Elytra thoracis medio vix latior, humeris rectangulis, & thorace fere quadruplo longiora, apice rotundata, supra valde convexa, rufobrunnea nitida; juxta saturam stria unica sat profunda, antice abbreviata, & in disco series plurimæ sat regulares e punctis parvis, parum profundiis, subobsoletis; superficies tota præterea rugulis crebris transversis tenuibus obsita, unde series punctorum ægre observantur. Alæ longæ cinereo-hyalinæ, Caput & thorax subtus testacea; pectus & abdomen fusco-brunnea, obsolete punctulata, tenue pubescens. Pedes crassiusculi rufo-testacei, femoribus posticis crassioribus clavatis, verius apicem subtus dente magno valido acuto, antrorum sub-arcuato, armatis; tibiæ omnes sub-rectæ, pubescentes, vix ciliatae.

Pag. 570. *Anisotoma*.

13-14. A. ferricorne: sub-globosum rufo-testaceum nitidum, elytris vase punctulatis, basi, thoracisque disco antico nigris, antennis inferne testaceis ferratis, clava 5-articulata nigra.

Habitat in ligno putrefcente Silvæ Kinnenfis Westrogothiæ rarissime, mense Junio captum.

Descr. Statura globosa A. Staphylæi, sed fere dimidio minus, antennarum stipite ferrato, ut & maculis thoracis elytrorumque nigris, a reliquis distinctum. Caput deflexum, sub-rotundatum, rufo-testaceum nitidum, vix visibiliter punctulatum, margine pone oculos nigro; oculi mediocres nigricantes. Antennæ longitudine thoraci, arcuatae, inferne testaceæ, serratae, articulis 3, 6 introrsum proditis, acuminatis, clava magna, elongata 5-articulata, nigra.

nigricante, structura fere ut in primis speciebus, articulo septimo tamen introrsum magis producto, acuminato; octavo ejusdem structuræ, sed parvo. Thorax transversus, antice multo angustior, late & profunde emarginatus, lateribus & postice rotundatus, supra valde convexus, pallide testaceus, nitidus, vix visibiliter punctulatus; macula magna nigro-picea oxata transversa, in disco antico. Scutellum triangulare testaceum laxe. Elytra vix thoracis basi latiora, humeris sub-rectangulis, & illo fere triplo longiora, supra valde convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter vase punctulata, bali transversim saturate nigra, nitida. Caput & thorax subitus pallide testacea; pectus & venter rufo-picea, subtiliter punctulata. Pedes pallide testacei, femoribus compressis, parum incrassatis, tibiis tafsisque tenuibus intermisibus.

Pag. 584. *Hypophloeus?*

**H. brunneus:** rufo-brunneus, nitidus glaber, capite magno rotundato, thorace amplio, punctato, elytris brevioribus obsolete vase punctulatis.

Habitat in Boleto suberofo Smolandiae, raffissime. Dom. Wetterhall. E. Germania

Insectum idem, sub nomine: *Lyctus fermentarius* Müller, obtinui.

Descr. Minutus, *Lycto* Histeroide minor, profertim angustior. Caput magnum, semi-orbiculatum, convexum, rufo-brunneum nitidum, crebre punctulatum, oculis parvis lateralibus brunneis. Antennæ capite parum longiores tenues, pallide testaceæ, articulis duobus baseos crassioribus, 3-8 parvis, angustis; 9-11 iterum crassioribus, compressis. Thorax amplius, antice elytris fere latior, bali illis æqua-

*Ms.* latitudine paullo longior, basi apiceque truncatus, supra convexus, rufo-brunneus nitidus, crebre punctulatus, lateribus & postice tenue marginatus, Scutellum vix nillum. Elytra antice latitudine baseos thoracis, & illo vix duplo longiora, posterius nonnihil angustata, apice rotundata, supra convexa, rufo brunnea nitida, vase & præsertim posterius, obsolete punctulata. Corpus subtus rufo-brunneum. Pedes tenues pallidius testacei.

Pag. 596. *Blaps*.

- 2, B, obtusa: latior, nigra immaculata, thorace breviori crebre punctato, elytris connatis, rugoso-punctatis, apice obtusa.  
*Fabr. Eleut.* 1. 141. 4. *Schönh. synon.* 1. 144. 4  
*Blaps mortifaga, femina. Herbst. Col.* 8. 144.  
tab. 128. t. 3. *Illig. Col. Bor.* 1. 112. 1.

Habitat in Scanie suffocatis. Dom. *Falla* & *Wetterhall*.

Descr. Bl. motisage simillima, & pro ejus forma a pluribus habita, differre tamen videtur, corpore multo latiori, thorace breviori, transverso, crenatis punctato, & elytria rugoso-punctatis, apice parum acuminatis. Capit, labrum, oculi ut in priori, sed superficies capitii fortius punctulata. Antennæ paullo breviores & crassiores quam in priori, exeterum articuli simili modo constructi. Thorax transversus, latitudine multo brevior, antice emarginatus, angulis rotundatis, lateribus ante medianum rotundato-dilatatus, evidenter marginatus, basi subfinatus, anguste marginatus, angulis sub-roctis; supra parum convexus, totus niger, crebre, evidenter punctatus, in medio obsolete punctulatus & foveolis obsoletis hinc inde impressus. Scutellum ut in priori,

priori. Elytra antice thoracis basi parum latiora, dein ultra medium dilatata, versus apicem iteram attenuata, apice parum producto, bifido; supra convexa, connata, nigra, crebre evidenter coriaceo-rugulosa & punctulata; latera elytrorum bi-marginata, lobo inferiori laevi, corporis latera amplectante. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, crebre rugulosopunctatum. Pedes ut in priori.

Pag. 6II. *Mordella.*

## 9. M. variegata:

Var. *c*, thorace nigro, macula parva transversa testacea ante medium utrinque, elytris testaceis, marginibus apiceque late fuscis, femoribus posticis infuscatis.

Var. *d*, omnino ut var. *c*, sed elytra nigra, macula humerali oblonga testacea.

Var. *e*, ut var. *d*, sed thorax fere totus niger, et antennae fuscæ, basi apiceque pallidiores.

Habitat in floribus rarius; var. *c*, *d*, in Smolandia, Dom. Bogeman; var. *e*, prope Holmiam, Dom. Schönherr; in Westrogothia spic.

Var. *c*, var. *b*, paullo major, *a*, aequalis, sed thorax niger, macula tantum parva, transversa, obsoleta testacea ante medium utrinque; elytra ut in *b*, omnino; femora postica disco insulcata; cætera ut in *a*.

Var. *d*, omnino ut var. *c*, quoad thoracem & femora postica, sed elytra ut in *a*, saturate nigra, macula humerali oblonga testacea, vix medium disci attingens.

Xy 5

Var.

Var. e, ut var. d, sed thoracis latera vix pallidiora, & antennæ fuscae, basi apiceque pallidiores.

Pag. 623. *Cistela*,

2-3. *C. rufipes*; nigro-picea, fusco-pubescentia ore, antennis pedibusque rufo-ferrugineis, elytris creberrime punctulatis, obsoletissime striatis.

*Fabr. Ent. Syst.* 2. 19. 12. *Schönh. Synon.* 2. 334. 19.

*Cistela fusta*. *Illig. Schneid. Mag.* 5. 610. 16. *Panz. fn.* 25. f. 19. *Crit. Rev.* 1. 90.

Habitat in Blekingia rarissime, a Dom. Schönherr 1810. capta, & in musæo ejus servata.

Deicr. Statua omnino & fere color *C. muri-*  
 næ var. b, sed plus duplo major, *C. fulvipedi* æqualis. Caput parvum, rotundatum, nigro-piceum, subtiliter punctulatum, griseo-pubescentia, oculis lunatis nigris; os rufo-ferrugineum, palporum articorum articulo ultimo compresso, triangulare, basi dilatato. Antennæ dimidio corpore fere longiores, setaceæ, rufo-ferrugineæ, apice obscuriores. Thorax transversus, antice obtuse rotundatus, fere semi-circulæ, basi sinuatus, elytris adæquatius, angulis retrosum productis, acuminatis; supra parum convexus, niger vel nigro-piceus, omnem subtillisime crebre punctulatus, pube fusco-ferruginea midante obductus. Scutellum parvum triangulare rufo-piceum, pubescentia, punctulatum. Elytra thoracia basi vix latiora, sed illo fere quintuplo longiora, apice sub-acuminata, supra convexa, nigro-picea, confertissime & paulo evidenter quam thorax coriaceo-punctata, pube-

fusco-

fusco-ferruginea micante obducta, antice & verso<sup>3</sup>  
latera obsoletissime, apicem & suturam versus paulo  
evidentius striata. Corpus subtus pallidius rufo-pi-  
ceum, magis nitidum. Subtilissime punctulatum &  
pubescens. Pedes mediocre, dilatius rufo-testacei,  
pubescentes.

Pag. 644. *Salpingus.*

5. *S. denticollis*: elongatus fuscus, capite,  
thorace antennis pedibusque testaceis,  
elytris basi pallescentibus, thorace pun-  
ctatissimo, postice attenuato, lateribus den-  
ticulato.

Habitat in Scania ad Elsperöd, rarissime.

Dom. Fallén.

Descr. *S. atro minor*, præfertim angustior, &  
eius var. b, colore similis, thorace lateribus denti-  
culato, postice magis angustato, abunde distinctus.  
Caput oblongum, porrectum, cum oculis thorace  
fere latius, totum testaceum, glabrum, fronte inae-  
quali, depressa, crebre punctulata, ore producto;  
oculi prominuli nigri. Antennæ thorace paulo lon-  
giores, crassiusculæ, ferrugineæ, structura ut in *S.*  
*atro*. Thorax oblongo-cordatus, antice lator, tu-  
necatus, lateribus ante medium rotundato-dilatatus,  
utrinque denticulis 3 s. 4 parvis crenatus, posterius  
valde attenuatus, totus rufo-testaceus, glaber, supra  
convexus, creberrime punctulatus, pone medium fo-  
veolis duabus obsoletis impressus. Scutellum trian-  
gulare fusco-testaceum punctulatum. Elytra thora-  
cæ basi duplo latoria, & illo quadruplo longiora,  
sub-linearia, apice rotundata, supra convexa, crebre,  
sed minus regulariter punctato-striata, lateribus &

postice fusco-brunneus, antice introrsum oblique pallide testacea. Pectus & abdomen fusco-picea, nitida, subtilissime punctulata. Pedes mediocres, toti pallide testacei, tarsis, ut videtur, hujus generis.

6. *S. cursor*: oblongus, brunneus, glaber, thorace sub-quadrato, lateribus denticulato, supra sub-inaequali, crebre punctato, elytris punctato-striatis.

*Tenebrio cursor*. Linn. sys. z. 675. s. Fn. Sv. sig.?

Habitat in ligno sicco Fagi, ad praedium Belteberga Scanie rariissime. Dom. Waterhall.

Descr. S. atro magnitudine & statura simili, sed paulo longior & angustior, thorace sub-quadrato, lateribus denticulato, a reliquis evidenter distinctus. Caput cum ocellis vix thorace latius, breve, rufo-brunneum nitidum, fronte inaequali punctata; oculi globoſi nigri. Antennæ vix thorace longiores brunneæ, structura omnino ut in precedentibus. Thorax sub-quadratus, antice tamen paulo latior, truncatus, lateribus parum rotundatus, utrinque denticulis quinque armatus, quarum duæ posteriores parum majores, approximatæ; supra planum convexus, crebre punctatus, ante basin utrinque obsolete impressus, totus brunneus seu castaneus, sub-nitidus. Scutellum rotundatum fusco-brunneum, subtiliter punctulatum. Elytra thoracis bafi latiora & illo quadruplio longiora, sub-linearia, apice rotundata, supra convexa, ante medium transversam impressa,

prefixa, sat regulariter & profunde punctato-striata, tota brunnea seu dilute castanea, nitida. Corpus sub-tus brunneum, nitidum, punctulatum. Pedes brevisculi, dilatius ferruginei.

---

### Addenda ad Partem Tertiam.

Pag. 383. Cis.

5-6. *C. mandibularis*: castaneus nitidus glaber, subtilissime punctulatus; antennis pedibusque pallide testaceis, capite late inaequali, mandibulis magnis elongatis.

Habitat sub cortice arborum emortuarum, in Westrogothia a Dom. Schönherr et Marklin captus.

Descr. *C. nitido* statura & magnitudine simillimus, sed caput multo latius & mandibulae, praesertim maris, magnae, elongatae. Caput maris latitudine thoracis, sed breve, postice valde convexum, totum rufo-castanum, subtilissime punctulatum, fronte fore tota impresso-excavata, margine supra os non-nihil prominulo, sub-emarginato; mandibula sinistra maris longitudine fere capitis, valida, arcuata, apice bifida, laciniis divericatis, superiori paullo longiori, adscendente; mandibulae femorae capite breviores, parum arcuatae, apice bifidae, dente inferiori longiori. Oculi parvi, globoſi, nigri. Antennae capite parum longiores, pallide testaceae, structura ut in prioribus. Thorax latitudine brevior, antice fere transversus, lateribus valde deflexus, rotundatus, ibi quo

Obs. Clarissimus Dom. de Paykull mihi ad describendum benebole communicavit Insectum singulare, ab Ipsi in ligno patrido Abietis Blekingiae capitum, quod forte proprii Generis, Cucujis quodammodo affine; sed Instrumenta ejus cibaria enucleare mihi non contigit, quare determinationem hac vice omittere coactus fui; Dom. Sturm Insectum idem, sub nomine: „Ryffodes exaratus Illigeri, ex America boreali,“ ad Dom. Schönherr misit, forte in Illig. Mag. Tom. 6. descriptum. Ips monilis, Oliv. Ent. 2. 18. 4. 2. Pl. I. fig. 6. a, b, secundum figuram & descriptionem, nostro affinis videtur, & forte ejusdem Generis.

*Finis Partis 3:iae,*

---

# INDEX.

## *GENÉRUM ET SPECIÉRUM PÄRTIS III:izæ*

pag. nro

**AESALUS.** add. 673

Scarabæoides . . . . . 673 I

**AGYRTES.** add. 681

castaneus . . . . . 682 I

**ALTICA** vid. **HAETICA**.

**ANISOTOMA** add. . . . .

multi striatum . . . . . 708 9-10

orbiculare, var. b. . . . . 707 5

serricorne . . . . . 710 13-14

spinipes . . . . . 709 9-10

sub-testaceum . . . . . 707 5-6

**ANTHICUS.** add. . . . .

anterinus var. c. . . . . 706 3

**ANTRIBUS** p. I.

albinus . . . . . 3 2

albirostris . . . . . 4 3

cinctus . . . . . 7 6

dorsalis . . . . . 5 4

latirostris . . . . . 1 1

niveirostris . . . . . 6 5

scabrosus . . . . . 8 7

varius . . . . . 10 8

**APATE** p. 372.

Capucina . . . . . 372 I

elongata . . . . . 374 3

sub striatus . . . . . 374 2

**APHODIUS** add. 671

Sus, var. . . . . 671 36

*Inf. Susc. T. I. P. III.*

**APION** p. 31.

Æneocephalam . . . . . 49 16

æneum . . . . . 40 8

æthiops . . . . . 54 22

angustatum . . . . . 56 24

afragall . . . . . 44 18

aterrimum . . . . . 41 9

atomarium . . . . . 60 29

brevirostre . . . . . 52 20

Craccæ . . . . . 38 6

eyaneum . . . . . 45 12

Ebeninum . . . . . 48 15

Ervi . . . . . 55 23

flavipes . . . . . 36 5

frumentarium . . . . . 32 I

gibbirostre . . . . . 52 19

Hydrolopathi . . . . . 51 18

Loti . . . . . 60 28

marchicum . . . . . 47 14

minimum . . . . . 59 27

pallipes . . . . . 34 3

pomonaæ . . . . . 39 7

punctiger . . . . . 46 13

Sorbi . . . . . 42 10

superciliosum . . . . . 58 26

tenuius . . . . . 57 25

vernale . . . . . 33 2

viciæ . . . . . 35 4

violaceum . . . . . 50 17

vorax . . . . . 53 21

AT.

Z z

<b>ATTELABUS</b> p. 16	nobilis . . .	445	9
Coryli . . . 16	obsoleta . . .	444	8
Cuculionoides . 18	rubiginosa . .	437	3
<b>BITOMA</b> p. 412.	sanguinolenta .	441	6
crenata . . . 412	thoracica . . .	439	4
lunata . . . 414	vibex . . .	440	5
<b>BLAPS</b> add. p. 712	viridula . . .	447	10
obtusa . . . 712			
<b>BOSTRICHUS</b> p. 351	<b>CERYLON</b> p. 415.		
asperatus . . . 368	Histeroides . . .	418	3
bidens . . . 357	Juglandis . . .	416	1
chalcographus .	picipes . . .	417	2
cineteus . . . 370	<b>CHRYSOMELA</b> p. 450.		
dispar . . . 363	senea . . .	467	15
domesticus . . . 365	affinis . . .	485	28
fuscus . . . 360	analis . . .	492	32
Laricis . . . 354	armoraciæ . . .	474	21
lineatus . . . 366	aucta . . .	494	33
micrographus .	Bulgarenfis . . .	466	14
monographus .	dispar . . .	482	27
oestodentatus .	Cochleariæ . . .	479	25
pusillus . . . 371	collaris . . .	459	9
Tiliæ . . . 369	coriaria . . .	451	1
Typographus . . . 351	cuprea . . .	464	13
villosus . . . 351	fatuosa . . .	470	17
<b>BRUCHUS</b> p. 11.	geminata . . .	477	23
Cisti . . . 13	Goettingensis . .	453	3
granarius . . . 11	graminis . . .	468	16
Loti . . . 13	haemoptera . .	452	2
seminarius . . . 14	lamina . . .	478	24
<b>CALANDRA</b> p. 255.	Lapponica . . .	463	12
granaria . . . 255	limbata . . .	461	11
<b>CASSIDA</b> p. 434.	litura . . .	481	26
equestris . . . 436	Lusitanica . . .	454	4
murræa . . . 434	marginata . . .	491	31
nebulosa . . . 442	marginella . . .	495	34
	polita . . .	456	6
	poly.		

- Polygoni . . . 474 20  
 Populi . . . 457 7  
 Raphani . . . 472 19  
 rufipes . . . 486 29  
 sanguinolenta . . . 460 10  
 Sophiæ . . . 475 22  
*staphylæa* . . . 455 5  
 - dito var, add 718 5  
 Tremulæ . . . 458 8  
 varians . . . 471 18  
 viminalis . . . 487 30  
 vitellinæ . . . 497 35
- CIS** p. 377.  
 alni . . . 386 8  
 bidentatus . . . 383 6  
 Boleti . . . 377 1  
 festivus . . . 381 4  
 hispidus . . . 380 3  
 mandibularis ad-  
 dit. . . . . 717 5-6  
 micans . . . 379 2  
 nitidus . . . 382 5  
 perforatus . . . 385 7
- CISTELA** add.  
 rufipes . . . 714 2-3
- CLYTRA** p. 584.  
 affinis . . . 592 7  
 cyanea . . . 591 6  
 longimana . . . 589 4  
 4 maculata . . . 590 5  
 4-punctata . . . 585 1  
 taxicorvis . . . 586 2  
 tridentata . . . 587 3
- COLYDIUM** p. 403  
 elongatum . . . 403 3
- COPRIS** add. p. 671  
 Taurus . . . 671 1-2
- CORYNETES** p. 375  
 violaceus . . . 376 1
- COSSONUS** p. 256  
 Chloropus . . . 259 3  
 lignarius . . . 258 2  
 linearis . . . 256 1  
 Lymexylon , . . 260 4
- CRYPTOCEPHALUS**  
 p. 593  
 bilineatus . . . 630 23  
 cordiger . . . 593 1  
 coryli . . . 602 5  
 10 punctatus . . . 619 15  
 dispar . . . 614 13  
 flavilabris . . . 623 17  
 flavipes . . . 611 21  
 frontalis . . . 626 20  
 insignis . . . 622 16  
 labiatus . . . 627 21  
 minutus . . . 629 22  
 Moræi . . . . . 617 14  
 nitens . . . . . 608 9  
 nitidulus . . . . . 610 10  
 pallifrons . . . . . 625 19  
 Pini . . . . . 603 6  
 punctiger . . . . . 624 18  
 4-pustulatus . . . . . 613 12  
 sericeus . . . . . 605 7  
 6 punctatus . . . . . 599 4  
 variabilis . . . . . 595 2  
 variegatus . . . . . 597 3  
 violaceus . . . . . 607 8

CRY-

**CRYPTOPHAGUS**

- add. p. 677  
*elongatus* . . 677 12-13  
*plicatus* . . 678 16-17

**CURCULIO** p. 26L

- æneopunctatus* 314 39  
*albidus* . . 267 5  
*argentatus* . . 324 47  
*ater* . . 291 22  
*atrocinctus* . . 290 21  
*caninus* . . 277 13  
*cervinus* . . 332 52  
*coryli* . . 304 32  
*flavipes* . . 271 8  
*fulvicornis* . . 276 12  
*geminatus* . . 302 31  
*glaucus* . . 265 4  
*hirsutulus* . . 307 34  
*hirticornis* . . 287 19  
*hispidulus* . . 284 17  
*incanus* . . 286 18  
*lævigatus* . . 292 23  
*lepidopterus* . . 315 40  
*Liguistici* . . 310 36  
*limbatus* . . 301 30  
*lineatus* . . 279 14  
*lineellus* . . 281 15  
*mali* . . 330 51  
*maurus* . . 293 24  
*Mercurialis* . . 296 26  
*micans* . . 328 49  
*muricatus* . . 321 45  
*nebulosus* . . 264 3  
*nubilus* . . 312 37  
*oblongus* . . 334 53  
*obscurus* . . 294 25

- ovatus* . . 320 44  
*pallidus* . . 268 6  
*parvulus* . . 272 9  
*picipes* . . 317 42  
*pilosellus* . . 300 29  
*Pyri* . . 323 46  
*raucus* . . 297 27  
*Rubi* . . 329 50  
*rugifrons* . . 319 43  
*scabriculus* . . 309 35  
*sericeus* . . 326 48  
*setosus* . . 298 28  
*squamulatus* . . 306 33  
*sulcatus* . . 313 38  
*sulcirostris* . . 261 1  
*tenebriosus* . . 288 20  
*tibialis* . . 283 16  
*trisulcatus* . . 263 2  
*undatus* . . 275 11  
*viridicollis* . . 273 10  
*viridis* . . 269 7  
*Zebra* . . 316 41

**DASYTES** add. p. 685

- obscurus* . . 685 1-2

**DONACIA** p. 646

- bidens* . . 648 2  
*crassipes* . . 646 1  
*dentipes* . . 650 3  
*discolor* . . 660 10  
*Fennica* . . 668 15  
*Hydrochæridis* 667 14  
*impressa* . . 655 7  
*Lemnæ* . . 653 5  
*linearis* . . 665 13  
*Menyanthidis* . 662 11

<i>obscura</i>	:	654	6	<b>GEORISSUS</b>	add.	p. 675
<i>sagittariae</i>	:	551	4	<i>pygmæus</i>	.	676
<i>fericea</i>	:	656	8	<b>HALTICA</b>	p.	520
<i>simplex</i>	:	664	12	<i>affinis</i>	.	553
<i>violacea</i>	:	660	9	<i>anchusæ</i>	.	536
<i>Zosteræ</i>	:	669	10	<i>aridella</i>	.	575
<b>DYTISCUS</b>	add.	688		<i>atra</i>	,	529
<i>angustior</i> var.	.	688	32	<i>atricilla</i>	.	540
<i>Bogemanpi</i>	.	687	10-11	<i>Chrysantenii</i>	.	578
<i>Sturmii</i> var. c.	.	688	26	<i>chrysocephala</i>	.	568
<b>ECCOPTOGASTER</b>	346			<i>cerulea</i>	.	524
<i>poligraphus</i>	.	349	3	<i>dentipes</i>	.	573
<i>pygmæus</i>	.	348	2	<i>Dulcamaræ</i>	.	505
<i>scolytus</i>	.	346	1	<i>elongata</i>	.	570
<b>EUMOLPUS</b>	p.	582		<i>Euphorbiae</i>	.	525
<i>obscurus</i>	.	583	1	<i>exoleta</i>	.	551
<b>GALLFRUCA</b>	p.	501		<i>femorata</i>	.	559
<i>Alni</i>	.	519	15	<i>flexuosa</i>	.	534
<i>Calmariensis</i>	.	508	6	<i>fuscicornis</i>	.	520
<i>Capréæ</i>	.	504	3	<i>fuscipes</i>	.	560
<i>flavipes</i>	.	517	13	<i>Helixines</i>	.	562
<i>interrupta</i> add.	.	718	2-3	<i>Holsatica</i>	.	534
<i>lineola</i>	.	512	9	<i>Hyoscyami</i>	.	566
<i>Lythri</i>	.	513	10	<i>Lepidii</i>	.	527
<i>Nymphææ</i>	.	599	7	<i>lurida</i>	.	537
<i>maculata</i>	.	516	12	<i>lutescens</i>	.	546
<i>rafipes</i>	.	518	14	<i>melanocephala</i>	.	545
<i>rufica</i>	.	503	2	<i>Mercurialis</i>	.	523
<i>sagittariae</i>	.	511	8	<i>Modéeri</i>	.	580
<i>sanguinea</i>	.	505	4	<i>Napi</i>	.	567
<i>Tapaceti</i>	.	502	1	<i>Nasturtii</i>	.	548
<i>tenella</i>	.	514	11	<i>nemorum</i>	.	530
<i>Viburni</i>	.	507	5	<i>nigritula</i>	.	557
				<i>nitidula</i>	.	561
				<i>obtusata</i>	.	579
				<i>occultans</i>	.	45

oleracea . . .	521	2
parvula . . .	526	6
pratenis . . .	539	15
pubescens . . .	555	27
puilla . . .	549	22
4 pustulata . . .	533	11
Rubi . . .	581	47
rufipes . . .	558	29
salicariae . . .	554	26
semi-aenea . . .	570	43
spergulae . . .	571	39
tabida . . .	542	17
testacea . . .	550	23
Verbasci . . .	543	18

**HARPALUS add.**

zureus . . .	695	34-5
Bogemanri . . .	697	57-8
cupress var. g. . .	694	30
oblongo-punctatus var . . .	692	6
pumicatus . . .	693	16 17
punctulatus . . .	695	34-5
rufipes var. c. , .	693	16
6 punctatus var. . .	698	63
Wetterhallii . . .	698	68 9

**HELODES p. 498**

Beccabungae . . .	500	2
Pheillandrii . . .	499	1

**HISPA p. 448.**

atra . . .	449	1
------------	-----	---

**HISTER add. 674**

virescens . . .	674	21
-----------------	-----	----

<b>HYLESINUS</b> p. 335		
anguistratus . . .	342	5
ater . . .	343	6
crenatus . . .	339	3
Fraxini . . .	345	7
ligniperda . . .	335	1
palliatus . . .	340	4
Piniperda . . .	337	2

**HYPHYDRUS add.**

granularis var. b. . .	691	25
hamulatus . . .	691	29
Marklini . . .	689	18-19
nigro-lineatus . . .	688	13 14

**HYPOPHLOEUS add.**

brunneus . . .	7xx	8
----------------	-----	---

**LAMPYRIS add.**

hemiptera . . .	684	3
-----------------	-----	---

**LATHROBIUM add.**

rufipenne . . .	704	1-2
multipunctatum . . .	705	3-4

**LEMA p. 632**

asparagi . . .	636	4
brunnea . . .	634	2
cyanella . . .	638	6
12 punctata . . .	635	3
melanopa . . .	637	5
merdigera . . .	633	1
sub-spinosa . . .	640	7

**LIXUS p. 62.**

paraplecticus . . .	62	1
---------------------	----	---

LY-

<b>LYCTUS</b> p. 408.		luridum . . 701 22-3
canaliculatus , 408	I	striatum var. b, 702 28
contractus . , 410	2	
nitidus : . 411	3	
<b>MORDELLA</b> add.		
variegata, var. c,		
d, e, . . 713	9	
<b>MYCETOPHAGUS</b> p. 387		
atomarius . . 388	2	
bifasciatus . . 390	7	
fulvicollis . . 395	6	
fumatus . . 399	9	
multipunctatus 393	5	
populi . . 392	4	
punctatus . . 398	8	
maculatus . . 387	1	
testaceus . . 400	10	
variabilis . . 390	3	
<b>NEBRIA</b> add.		
Gyllenhalii; var, 692	3	
multipunctata var. 692	6	
<b>NEMOZOMA</b> p. 402		
elongatam . . 402	I	
<b>NITIDULA</b> add. 679		
olivacea . . 679	25-6	
polita . . 680	32-3	
<b>OMALIUM</b> add.		
depressum var. b,		
c, . . . 699	11	
inflatum - . 700	22-3	
<b>ORSODACHNA</b> p. 642		
Betulae . . 644	2	
chlorotica . . 642	I	
<b>PHALACHUS</b> p. 427		
æneus . . 431	5	
bicolor . . 431	6	
coruscus . . 427	1	
millefolii . . 429	3	
substriatus . . 428	2	
testaceus . . 432	7	
Ulicis . . 430	4	
<b>PSAMMODIUS</b> add.		
elevatus var. b, 672	I	
<b>PYTHO</b> add.		
depressus, var. f, 706	I	
<b>RYNCHÆNUS</b> p. 64		
abietis . . 166	86	
acridulus . . 75	10	
æthiops . . 72	8	
affinis . . 174	92	
alismatis . . 87	21	
alni . . 238	140	
anthirini . . 207	117	
arcticus . . 64	I	
artemisiae . . 81	15	
arundinis . . 100	32	
asperifoliarum 221	128	
affimilis . . 141	63	
atratus . . 187	102	
strostris . . 92	25	

Beesea

- Beccabungæ* . . . . . 122 49  
*bifasciatus* . . . . . 247 147  
*bimaculatus* . . . . . 74 9  
*bi-nodus* . . . . . 84 18  
*bi-notatus* . . . . . 105 85  
*bi-punctatus* . . . . . 119 46  
*borealis* . . . . . 115 43  
*Borraginis* . . . . . 227 133  
*brunnirostris* . . . . . 93 26  
*campenulæ* . . . . . 130 55  
*carboqarius* . . . . . 185 101  
*carpini* . . . . . 120 47  
*castor* . . . . . 159 80  
*cerafi* . . . . . 183 99  
*ceraforum* . . . . . 204 115  
*cochleariæ* . . . . . 144 66  
*collinus* . . . . . 209 119  
*colon* . . . . . 164 84  
*comari* . . . . . 156 77  
*contractus* . . . . . 143 65  
*costatus* . . . . . 89 22  
*cylindrus* . . . . . 78 13  
*depressicollis* . . . . . 147 68  
*didymus* . . . . . 225 131  
*dissimilis* . . . . . 116 44  
*dorsalis* . . . . . 196 109  
*druparum* . . . . . 191 105  
*elongatus* . . . . . 99 31  
*epilobii* . . . . . 151 72  
*equiseti* . . . . . 91 24  
*ericæ* . . . . . 147 69  
*erysimi* . . . . . 142 64  
*fagi* . . . . . 243 144  
*fasciculatus* . . . . . 107 37  
*festucæ* . . . . . 76 11  
*floralis* . . . . . 145 67  
*fraxini* . . . . . 217 125  
*fuscot-maculatus* 162 82  
*Geranii* . . . . . 140 62  
*Germanus* . . . . . 163 83  
*globosus* . . . . . 134 58  
*globulip* . . . . . 235 13  
*graminis* . . . . . 210 12  
*Hercyniæ* . . . . . 68 4  
*hortulanus* . . . . . 215 123  
*Ilicis* . . . . . 241 142  
*inconspectus* . . . . . 158 79  
*indigena* . . . . . 71 7  
*Jota* . . . . . 248 148  
*Lapathi* . . . . . 169 88  
*Lemnæ* . . . . . 129 54  
*leucogaster* . . . . . 161 81  
*Linariæ* . . . . . 208 118  
*litura* . . . . . 222 129  
*lutosus* . . . . . 85 19  
*luteolentus* . . . . . 86 20  
*Lythri* . . . . . 127 52  
*majalis* . . . . . 177 94  
*márginatus* . . . . . 224 130  
*miles* . . . . . 97 29  
*murinus* . . . . . 105 36  
*Myriophyli* . . . . . 152 73  
*Nereis* . . . . . 77 12  
*nigrirostris* . . . . . 114 41  
*notatus* . . . . . 69 5  
*nucum* . . . . . 201 113  
*pascuorum* . . . . . 124 50  
*pectoralis* . . . . . 178 95  
*pedestris* . . . . . 98 95  
*pericarpius* . . . . . 157 78  
*phlegmaticus* . . . . . 182 98  
*picrostris* . . . . . 121 48  
*pilosus* . . . . . 242 143  
*Pinastris* . . . . . 168 87

pi.

pineti . . . . .	65	2
pini . . . . .	66	3
piniphilus . . . . .	70	6
plantaginis . . . . .	103	34
plantaria . . . . .	152	152
pollinarius . . . . .	226	132
Pollux . . . . .	96	28
Polygoni . . . . .	109	39
pomorum . . . . .	188	103
populi . . . . .	249	149
posticus . . . . .	113	41
pruni . . . . .	82	16
ptinoides . . . . .	128	53
pubescens . . . . .	192	106
pulicarius . . . . .	251	151
punctatus . . . . .	108	38
quadricornis . . . . .	154	75
quadri-nodosus . . . . .	155	76
quadri-tuberculata . . . . .	153	74
Qverceti . . . . .	149	70
Qvercicola . . . . .	230	135
Qvercus . . . . .	138	61
5 punctatus . . . . .	197	110
Rhina . . . . .	83	17
Rubi . . . . .	194	108
rubicundus . . . . .	136	60
rugulosus . . . . .	231	136
Rumicis . . . . .	94	27
Saliceti . . . . .	250	150
Salicis . . . . .	245	145
Salicivorus . . . . .	206	116
Scanicus . . . . .	118	45
scortillum . . . . .	135	59
Serophulariae . . . . .	212	121
scutellaris . . . . .	240	141

semi - cylindri-		
cus . . . . .	180	96
signatus . . . . .	133	57
signifer . . . . .	246	146
Sisymbrii . . . . .	90	23
Solani . . . . .	216	124
squamifer . . . . .	200	112
stygius . . . . .	184	100
sub - fasciatus . . . . .	253	153
sub - rufus . . . . .	149	76
sulcicollis . . . . .	228	134
tæniatus . . . . .	175	93
T. album . . . . .	79	14
Thapsus . . . . .	214	122
tortrix . . . . .	173	91
Tremulæ . . . . .	171	90
tricolor . . . . .	126	51
Trifolii . . . . .	111	40
trimaculatus . . . . .	219	126
Troglodytes . . . . .	233	137
Ulmi . . . . .	189	104
variabilis . . . . .	104	35
varians . . . . .	193	107
venustus . . . . .	199	111
viciæ . . . . .	101	33
viduatus . . . . .	220	127
villosus . . . . .	203	114
viminalis . . . . .	237	139
violaceus . . . . .	181	97
viscariae . . . . .	132	56
vorax . . . . .	170	89

## RHYNCHITES p. 19.

æqvatus . . . . .	25	5
alliarie . . . . .	26	6
Bacchus . . . . .	23	3
Betulæ . . . . .	29	9

Beta.

Betuleti . . .	19	I	SILPHA. add.
cypreus . . .	24	4	trifitis var. b, 681
minutus . . .	27	7	
nanus . . .	28	8	SILVANUS. 405
Populi . . .	21	2	Sexdentatus . 406
Rhinomacer . .	30	10	unidenidentatus 405
<b>RHYZOPHAGUS. 420</b>			
depressus . . .	422	2	SPHAERIDIUM. add.
dispar . . .	424	5	Scarabæoides, var.
ferrugineus ,	420	I	ca. . . 675
parvulus . . .	424	4	
politus . . .	423	3	STAPHYLINUS add.
<b>SALPINGUS, add.</b>			
cursor . . .	716	6	Stercorarius, var.
denticollis . .	715	5	b, . . . 703 15
<b>SCYDMOENUS. add.</b>			
Wetterhallii ,	683	23	TACHYPORUS add.
			bipunctatus . 702 10-II

## ERRATA CORRIGENDA.

- Pag. 5 lin. 6 pro: viftito . . lege: viftito,  
.. 12 . . 21 . . tenue . . tenui.  
.. 18 . . 5 . . oglonga . . oblonga.  
.. 36 . . ult. . . III . . 14.  
.. 43 . . 24 . . Elytris . . Elytra.  
.. 49 . . 3 . . ualdi . . validi.  
.. 64 . . 4 . . articus . . arcticus.  
.. 79 . . 3 . . pallis . . paſſim.  
.. 96 . . 22 . . gramein . . gramine.  
.. 102 . . 7 . . griseo pucescens . . griseo-pube  
scens.  
.. 126. num. pag. . . 261 . . 126.  
.. 134 . . 7 . . numeris . . humeris.  
.. 154. . . penult . . viſilibus . . viſibilibus.  
.. 156 . . 25 . . albēde . . albido.  
.. 167 . . 29 . . . ;  
.. . . 30 . . ; ; ;  
.. 175 . . 20 . . oigro . . nigro.  
.. 214 . . 24 . . cupite . . capite.  
.. 232 . . 29 . . quadrangulari adde atra.  
.. 255 . . 26 . . piceæ lege: piceæ.  
.. 287 . . 4 . . gricea . . gricea.  
.. 288 . . 7 . . griceis . . griceis.  
.. 297 . . 10 . . , interstitiis deleatur.  
.. . . . ; 3, 7. 5 lege: 3, 5. 7,  
.. 304 . . 6 . . sqvamulorum . . sqvamularum;  
.. 310 . . 16 . . maculus . . sqvamulas.  
.. 311 . . 17 . . pucescentes . . puþescentes.  
.. 348 . . I . . poſtice . . poſticæ.  
.. 330 . . 2 . . xix vix.  
.. 342 . . 5 . . futuratius . . saturatius.  
.. 349 . . 21 . . taſtaceis . . teſtaceis.  
.. 374 . . 14 . . recontendo . . recondendo.  
.. 401. penult. . . apta . . apte.  
.. 426 . . 26 . . obſervatus . . obſervatur.  
.. 427 . . 18 . . convevus . . convexus.  
.. 430 . . 12 . . bi ſinuatis . . bi-striatis.  
.. 440 . . 12 . . acuminatum . . acuminatim.

- .. 448 .. 12 .. 220 .. 226.  
.. 480 .. 5 .. Rub. .. Byb.  
.. 585 .. 22 .. fito .. situ  
.. 494 .. 3 .. marginæ .. margine.  
.. 500 .. 16 .. luteis, adde: extorsum nigre  
virescentibus, tibiis arcuatissi-  
tis luteis, tarvis &c.  
.. 517 .. 21 .. pro: fate .. lege: fat fre-  
.. 527 .. 19 .. thorace .. thorace.  
.. 536 .. 11 .. Euphorbiæ .. Euphorbiæ,  
.. 551 .. 23-4 .. etjam .. aliam.  
.. 564 .. 25 .. minas .. nimis.  
.. 579 .. 16 .. multicis .. multicis.  
.. 594 .. 11 .. 30 .. 330.  
.. 595 .. 28 .. var. a, . var. c,  
.. 614 .. 25 .. cerbo .. certo.  
.. 618 .. 18 .. fed .. fat:  
.. 653 .. 9 .. virescertie .. virescentia.  
.. 656 .. 32 .. sut .. aut.  
.. 658 .. 5 .. rubra cuprea .. rubro-cuprea.  
.. 669 .. 31 .. post. undis adue: per millia.  
.. 675 .. ult .. stipitis .. stipitis.  
.. 697 .. 10 .. ubunde .. abunde.  
.. 688 .. 11 .. eqvis .. aquis.  
.. 700 .. 4 .. etiam .. etjam.
- 

Erratum in parte x:o emendandum:  
Pag, 395, lin. 15, pro: Elytris - lege; Antennis.

---

