

M A N T I S S A

I N S E C T O R U M

EXHIBENS SPECIES NUPER IN ETRURIA

COLLECTAS

A

P E T R O R O S S I O

ADIECTIS FAUNAE ETRUSCAE ILLUSTRATIONIBUS,

AC EMENDATIONIBUS.



P I S I S

EX TYPOGRAPHIA POLLONI

PRAESIDUM FACULTATE

M D C C X C I I.

LECTORI.



EN tibi, ENTOMOPHILE, Insectorum species a me nuper in Etruria collectas, quas oro excipias animo ipso indulgenti quo superiores labores meos complexus es. Illustrationes, ac emendationes specierum in Fauna Etrusca editarum addidi, easque partim occasione data, suo loco, partim in Operis calce, quemadmodum et Icones praestantiora Insecta exhibentes ibidem indicatas invenies. Vale.

Dabam Pisis Prid. Kal. Mart. 1792.

minus quam in superiore convexus, hirtus. Elytra uti thorax aeneo-viridia punctulata marginata, minus hirta. Abdomen, et pedes toti elytris concolores. Variat magnitudine duplo minori, colore viridi subaurato. Habitat in floribus frequens.

XL. CURCULIO.

Palpi quatuor filiformes. *Maxilla* cylindrica unidentata. *Labium* integrum. *Antennae* clavatae insidentes rostro corneo.

* *Longirostris fem. simpl.*

88. C. BARDANAE.

Longirostris, cylindricus, griseo-tomentosus, pedibus anticis elongatis. *F. Mant.* 104. 84.

Statura, et magnitudo fere *C. Paraplectici*. Junior totus tomento griseo tectus; adultior niger, et glaber evadit. Elytra rotundata, obtusa. Pedes anteriores parum elongati. *F.* In hoc elytra subtilissime ac laeviter punctato-striata; in *C. Pulverulento Scop.* qui forte est *C. Angustatus F.* transversim rugosa.

Habitat in Arctio Lappa, aliisque plantis non rarus.

* 89. C. SANGUINEUS.

* *basi rostri ad apicem elytrorum. Long. 4. l. Lat. 1. l.*

Longirostris cylindricus, ruber, oculorum supercilio, thoracisque lateribus flavescens.

Statura, et magnitudo *C. Ascanii*, at elytra apice obtusa. Rostrum thoracis longitudine, totum superne sanguineum, inferne cinereum. Antennae breves, fractae, cinereo fuscae. Caput sanguineum quod ubique inflectit. Oculi nigri supercilio flavo. Thorax laevis sanguineus, margine laterali flavo-lineato. Elytra laevia, sanguinea, apice obtusa. Sternum, et abdomen cinerea. Pedes cinerei femoribus dilute

sanguineis . Color idem qui in *Call. Sanguineo* , et cum in tenuissima pube consistat , facile attritu deletur ; et tunc niger evadit .

Lectus Pisis in Verbasci foliis d. 24. Mart.

90. C. CUPRIROSTRIS.

Longirostris , oblongus , viridi-aeneus , elytris striatis , rostro cupreo . *F. Mant.* 100. 43.

Magnitudo *C. Granarii* . Corpus oblongum nitidum . Rostrum arcuatum cupreum . Thorax viridi-aeneus , laevissimus nitidus . Elytra subtilissime striata , viridi-aenea nitida . Abdomen viride . Pedes fuscī .

Habitat in Alno non rarus .

91. C. CAERULESCENS.

Long. 1. $\frac{1}{2}$ l. *Lat.* $\frac{2}{3}$ l.

Longirostris , obscure caeruleus ; elytro singulo decemstriato , rostro deflexo . *Schrank. E. I.* 202.

C. Caerulescens. Scop. E. Carn. 87.

Statura praecedentis , at latior . Rostrum tenue longum , deflexum . Thorax excavato-punctatus , etiam inferius . Elytra subtilissime striata striis decem-impunctatis . ~~Femora nitida .~~

Raro lectus .

* 92. C. TIMIDUS.

Longirostris , ater laevis , nitidus : elytris substriatis , rostro crassiusculo incurvo .

Magnitudo fere *C. Betulae* , at paullo oblongior , et corpore ovato globoso . Totus ater nitidus . Rostrum crassiusculum incurvatum antennis nigris . Thorax latus . Elytra subtilissime punctato-striata . Femora inermia . Alatus .

Habitat in pratis silvaticis frequens .

* 93. C. P E R P E N S U S .

Long. 1. l. Lat. $\frac{1}{2}$ l.

Longirostris , griseo-fuscus , thorace , elytrisque hispidis , cinereo nigroque obsolete punctatis .

Statura C. *Anthirrii* . Fn. Etr. Rostrum tenue , porrectum . Elytra striata . Femora mutica . Tibiae testaceae .

Habitat in silvis .

94. C. R U M I C I S .

Long. 3. l. Lat. 1. l.

Longirostris , griseus , nigro-nebulosus , antennis fuscis . F. *sp.* 170. 55. Linn. Syst. Nat. 614. 60. Fn. Sv. 590.

Curculio longirostris , femoribus muticis , antennis fractis , corpore oblongo griseo , fusco-nebuloso , thorace fasciis duabus nigricantibus . De Geer. Ins. 5. 231. 20. t. 7. f. 10. 11.

Magnitudo variat .

Habitat in Rumice frequens .

* 95. C. I N F I D U S .

Longirostris , piceus , nitidus ; thorace punctato , femoribus clavatis , compressis .

Statura C. *Granarii* , cui valde affinis , at major , et distinctissimus . Differt a C. *Granario* praeter magnitudinem quae fere dupla , colore picco nitidiore ; rostro magis porrecto ; thorace diversimode punctato punctis rotundioribus . Elytra in hoc thorace longiora nitida , manifeste punctato-striata . Femora mutica , clavata clava compressa , imprimis antica . Tibiae breves , compressae . Subtus concolor nitidus , punctulatus .

Habitat Pisīs .

96. C. C I N C T U S .

Longirostris globosus rufus , elytris striatis fascia transversa alba . Geoff. Ins. 1. 289. 28. Ent. Par. 124. 27.

C. *Erytroleucos* . Ed. Linn. 13.

Magnitudo *C. Rufrostris*. Rostrum tenue nigrum. Antennae ferrugineae clava apice cinereo.

Habitat in plantis non frequens.

** *Longir. fem. dentatis*.

* 97. *C. BINOTATUS*.

Longirostris, fuscus, elytris subdepressis, pone medium puncto albo notatis.

Statura *C. Colon*, at major. Rostrum mediocre crassiusculum carinatum longitudine thoracis. Thorax fuscus, subcarinatus, linea laterali cinerea obsoleta. Elytra basi subdepressa, obsolete punctato-striata, fusca, pone medium angustata, gibba, puncto utrinque albo. Antennae, pedesque fusci femoribus subdentatis. Apterus. Color fuscus in testaceum vergit.

Habitat in silvestribus paludosis; hieme in truncis arborum putridis minime rarus.

* 98. *C. TIGRATUS*.

Longirostris? femoribus dentatis, bruneus fulvo maculatus, thorace depresso, carinato, elytris sulcatis, punctatisque.

Magnitudo *C. Abietis*. Totus bruneus ~~maculis lacte ferrugineis~~ aspersus. Antennae fractae, pilosae clava subrotunda crassiuscula. Rostrum mediocre carinatum sulcis tomento fulvo contextis. Thorax rotundatus, depressus, carinatus maculis, fasciisque ferrugineis ordine dispositis. Elytra sulcata lineis elevatis, abdominis latera admodum involventia, coalita, fulvoque undique maculata. Femora omnia dentata annulo fulvo. Inter singulos sulcos striae duae punctorum impressorum.

Habitat in silvis non frequens.

* 99. *C. BIPUSTULATUS*.

Longirostris, femoribus dentatis, niger subpilosus, elytris striatis, plaga utrinque rufescente.

Statura *C. Verbasci* quo paulo minor. Rostrum tenue antennis

nigris. Elytra late striata, subpilosa, maculam in medio gerentia insignem rotundam rufescentem. Femora dentata, crassiuscula.

Lectus raro.

*** *brevirostres fem. muticis.*

* 100. C. CANESCENS.

Long. 4. l. *Lat.* 1. $\frac{1}{2}$ l.

Brevirostris, cinereus nitidus subpilosus, elytris nigro maculatis.

Minor *C. Incano*, et corpus magis ovatum, magisque globosum. Caput cinereum rostro crasso brevissimo. Antennae brevissimae fractae cinereae clava subrufa. Thorax cinereus in medio obscurior. Elytra cinerea subpilosa, leviter punctato-striata, punctisque inaequalibus nigris aspersa, coalita, apiceque parum acuminato. Color totius corporis albido cinereus nonnihil ad aeneum vergens.

Lectus pluries sub arborum cortice tempore hiberno.

* 101. C. CAUDATUS.

Long. 6. l. *Lat.* 2. l. et ultra

Ovato-oblongus, thorace, elytrisque scabris, apice acuminatis pilosis.

Major *C. Armadillo*, et oblongior. totus niger subobscurus. Rostrum breve crassum, bisulcatum, apice dilatatum. Antennae in medio fractae longiores. Thorax, ac elytra punctis elevatis scabra, eaque magnam partem abdominis obtegentia, minime striata, apice acuminato, pilisque subferrugineis hirto, quasi penicillato. Abdominis basis inferne compressa, retusa. Femora omnia clavata inermia. Alae nullae. Apex elytrorum nunc magis, nunc minus pilosus. Dubitavi de *C. Nigrita*, at descriptio minime convenit, et species nova videtur.

Habitat Florentiae.

102. C. C O S T A T U S .

Brevirostris cinereus, thorace nigro: lineis quatuor cinereis:

F. Mant. 115. 194.

C. Bilineatus. Fn. Etr. 1. 110. 281.

Magnitudo *C. Incani*. Antennae in medio fractae, basi ferrugineae. Rostrum apice incrassatum nigrum dorso cinereo. Thorax rotundatus niger linea dorsali paullulum elevata atra. Elytra, pedesque cinerea. *F.*

Habitat in pratis frequens.

* 103. C. V I A T O R .

Long. 2. $\frac{1}{2}$ l. *Lat.* 1. l.

Brevirostris? niger oblongus, thorace, elytrisque squamoso-aeneis subnitidis.

Magnitudo fere *C. Pyri*, at statura distinctus, et colore etiam minus nitido. Rostrum mediocre crassiusculum longitudine thoracis. Antennae breves fractae fuscae clava subcinerea. Thorax lateribus squamoso-aeneis obscuris. Elytra mutica. Ademta pube aeneo-rufescente totus niger apparet.

Lectus Pisis.

104. C. S C A B R I C U L U S .

Long. 1. $\frac{1}{2}$ l. *Lat.* 1. l. vix.

Brevirostris, corpore cinereo hispido. *F. sp.* 189. 159.

C. Scabriculus brevirostris, femoribus muticis, cinereus, elytris hispidis. *Linn. Mant.* 531.

Bonsd. Curc. Svec. 2. f. 21.

Magnitudo *C. Cervini*: Totus cinereus. Rostrum breve canaliculatum. Antennae crassiusculae vix longitudine rostri. Elytra striata hispida, praesertim postice. Femora inermia.

Raro lectus in locis arenosis Pisani nemoris.

* 105. C. BREVIROSTRIS.

Brevirostris, ater subnitidus, elytris punctato-sulcatis, rostro latitudine capitis.

Paullo major *C. Granario*, a quo praecipue differt thorace elytris brevior, rostro brevissimo crasso latitudine capitis. Ater nitidus, sed minime lucens, glaberrimus. Antennae brevissimae nigrae apice cinereo. Caput punctulatum, at respectu thoracis laeve. Thorax excavato-punctatus. Elytra punctato sulcata, connata. Femora subclavata inermia. Habitat in agro Pisano.

* 106. C. LIMOSUS.

Brevirostris, niger obscurus, thorace, elytrisquo limo exsiccato obductis, antennis rufis.

An. *C. Lutosus*. Mus. Lesk. p. 22. n. 482?

Statura *C. Lineati*, quo duplo major. Niger, sed totus semper crusta terrea coniectus. Rostrum breve crassum nigrum. Antennae rufae clava fusco-nigra. Thorax subglobosus. Elytra adempto limo, nigra striata. Femora mutica: antica subclavata. Abdomen cinerascens.

Habitat Florentiae, et Pisis sat frequens.

* 107. C. VISUS.

Brevirostris, fuscus, elytris fasciis duabus marginalibus cinereis, antennis, pedibusque testaceis.

Medius inter *C. Lineatum*, et *C. Argentatum*. Antennae fractae testaceae clava obscuriori, apice cinereo. Rostrum brevissimum. Caput, et thorax tomento flavo lucido subaureo tecta. Elytra convexa striata, flavo-tomentosa dorso fusco, fasciis duabus cinereis, prima obliqua prorsus marginali; altera apicis usque ad suturam producta. Abdomen fusco nitidum. Pectus macula utrinque cinerea. Pedes testacei tenues, femoribus muticis, et versus apicem cinereo annulatis. Alatus.

Habitat in plantis non rarus.

**** *brev. fem. dentatis.*

* 108. C. ARMADILLO.

Long. 4. $\frac{1}{2}$ l. Lat. 2. $\frac{1}{4}$ l.

Brevirostris, femoribus subdentatis, niger elytris crenato-striatis, striarum fossulis cinereo-flavescentibus.

Corpus ovato-globosum nigrum. Antennae fractae articulo primo praelongo. Rostrum breve crassum bisulcatum. Thorax subrotundus punctis elevatis scaber. Elytra connata, admodum convexa, crenato-striata pilis sordide cinereis brevissimis in striarum foveolis hic inde aspersa, unde cinereo veluti pulvere inquinata apparent. Femora clavata, subdentata. Alae nullae.

Descriptio C. *Nigritae* Fn. Etr. ad hunc male pro C. *Nigrita* assumtum referenda.

Habitat in silvis frequens.

109. C. SULCATUS.

Brevirostris, femoribus dentatis ater, elytris striatis, ferrugineo-maculatis. F. sp. 197. 212.

Femora omnia apice clavata, postica etiam acute dentata. Differt a C. *Armadillo* praesertim statura oblongiori, et macularum colore non sordide cinereo, sed ferrugineo flavescente. Elytra crenato-striata. Magnit. variat.

Raro lectus hieme sub arborum cortice.

XLI. RHINOMACER.

Palpi quatuor extrorsum crassiores articulo ultimo truncato.

Antennae setaceae rostro insidentes.

110. R. BRENTOIDES.

Glaber piceus, thorace punctato, elytris punctato striatis.

D. D. *Antic. Soc. Linn.*

Fn. Etr. 1. 135. 347. t. 3. f. 14.

Pimelia Angustata. F. sp. 320. 24. Mant. 209. 28?

Habitat sub arborum cortice obvius.

XLII. A T T E L A B U S.

Palpi quatuor filiformes. *Maxilla* bifida. *Labium* corneum palpos tegens. *Antennae* moniliformes insidentes rostro.

* III. A. B I C O L O R.

Cupreus, hirtus, elytris saturate testaceis.

Statura, et magnitudo *A. Pubescentis*, at paulo latior. Rostrum tenue elongatum longitudine fere dupla thoracis, subrufum, apice dilatato, bifido. *Antennae* subrufae, rectae moniliformes, medio rostri insidentes, clava fusca. Oculi prominuli nigri. Caput, thorax, abdomen, femora cuprea, quasi subaurata hirta. Thorax punctulatus. Elytra punctato-striata hirta saturate testacea. Tibiae subrufae.

Habitat Florentiae rarus.

XLIII. C L E R U S.

Palpi quatuor; *antici* filiformes: *postici* longiores, securiformes. *Antennae* moniliformes.

* II2. C. U N I V I T T A T U S.

Niger, elytris fascia media unica alba.

Statura *C. Unifasciati*, at paulo minor. *Antennae* nigrae basi ferrugineae. Caput, thoraxque nigra pilosa, minus tamen quam in *C. Unifasciato*. Elytra nigra, nitida, striato-punctata, fascia media recta unica alba. Abdomen nigrum. Pedes ferruginei femoribus nigris. Alae fuscrescentes.

Habitat Pisis rarus.