

OPUSCULES

ENTOMOLOGIQUES

PAR

E. MULSANT

Sous-Bibliothécaire de la ville de Lyon ,
Professeur d'histoire naturelle au Lycée ,
Président de la Société Linnéenne ,
Membre de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
et des Sociétés d'Agriculture et Littéraire
de la même ville, etc., etc.

NEUVIÈME CAHIER.

PARIS

MAGNIN, BLANCHARD ET C^e, LIBRAIRES ,

rue Honoré-Chevalier, 3 , près la place St-Sulpice.

—

1859.

DESCRIPTION

DE

QUELQUES CURCULIONITES

NOUVEAUX OU PEU CONNUS,

PAR

E. MULSANT et Cl. REY.

Présenté à la Société impériale d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon, dans la séance du 9 mars 1858.

Tropideres maculosus.

Oblongus, subcylindricus, opacus, niger, cinereo-pubescentis; maculis obscurioribus subdenudatis, mediâ suturali, communi, maximâ, variegatus. Scutello albicante; pedibus totis nigris; antennis brevibus, basi piceis.

Longueur 0^m,003 (1 ligne 1/3). — Largeur 0^m,0017 (3/4 ligne).

♂ *Troisième et quatrième arceaux du ventre* resserrés dans leur milieu, profondément sinués à leur bord apical : le *dernier* aussi resserré dans son milieu que le précédent, non prolongé, sinué ou échancré à son sommet. *Pygidium* vertical.

♀ *Quatrième arceau ventral* seul resserré dans son milieu et profondément sinué à son bord apical : le *dernier* plus développé que le précédent, assez prolongé, largement arrondi au sommet. *Pygidium* subvertical.

Corps oblong, subcylindrique, noir, couvert d'une pubescence cendrée, couchée, interrompue par des taches plus dénudées ou d'un duvet plus obscur : la plus grande, oblongue, médiane, suturale, commune aux deux élytres.

Tête verticale, rugueusement ponctuée, noire, couverte de poils couchés d'un cendré blanchâtre et soyeux. *Front* légèrement convexe, un peu plus étroit que le diamètre transversal de l'œil. *Rostre* presque aussi large que la tête, court, déprimé, garni d'une pubescence un peu plus serrée que celle du front. *Parties de la bouche* d'un noir de poix, avec l'extrémité des mandibules un peu plus claire. *Yeux* très-grands, noirs, suborbiculaires, très-peu saillants.

Antennes grêles, assez courtes, dépassant à peine la base du prothorax; pubescentes vers l'extrémité; d'un noir de poix, avec les premier et deuxième articles ordinairement un peu plus clairs : le deuxième renflé, brièvement ovalaire; les troisième à cinquième assez allongés; les sixième à huitième médiocrement allongés, obconiques; la *massue* oblongue, de trois articles : l'intermédiaire transversal.

Prothorax un peu moins long que large à sa base, sensiblement plus étroit en avant qu'en arrière; tronqué au sommet, bissinué à son bord postérieur, légèrement arqué sur les côtés, faiblement convexe; finement, densément et rugueusement ponctué; d'un noir mat, avec une pubescence courte, couchée, d'un cendré soyeux, et disposée, chez les individus bien frais, suivant trois bandes longitudinales; l'une médiane, les deux autres latérales. La carène transversale de la base est assez éloignée de celle-ci, et profondément bissinuée.

Écusson suborbiculaire, garni d'une pubescence serrée, blanchâtre.

Élytres deux fois et demie plus longues que le prothorax; un peu plus larges que lui à la base; légèrement resserrées sur les côtés derrière les épaules qui sont arrondies; subparallèles dans le reste de leur longueur; simultanément échancrées à la base vers l'écusson; individuellement arrondies au sommet ainsi qu'aux angles postéro-externes, avec l'angle sutural très-obtus ou à peine arrondi; faiblement convexes, assez fortement striées-ponctuées, avec les *intervalles* rugueusement ponctués, subconvexes à la base et presque plans à l'extré-

mité ; noires ; couvertes d'une pubescence soyeuse d'un cendré blanchâtre , et variées de taches brunes ou dénudées : la principale, grande, oblongue, commune aux deux élytres et occupant le milieu de la suture : une deuxième, assez grande, arrondie, située un peu derrière le milieu de la base de chaque élytre : les autres, notablement moindres, dispersées irrégulièrement sur le reste du disque. *Calus huméral* est saillant , toujours dénudé.

Pygidium scutiforme, arrondi à son extrémité ; rugueusement et densément ponctué ; noir, avec quelques poils brillants, très-courts , grisâtres.

Dessous du corps assez convexe ; finement et densément ponctué ; couvert d'une pubescence d'un cendré blanchâtre, un peu plus longue et plus serrée sur les côtés.

Pieds assez courts, légèrement pubescents, obsolètement ponctués ; noirs, avec les tarses et la base des tibias souvent d'un noir de poix obscur. *Cuisses* peu renflées. *Tarses* allongés.

PATRIE : Lyon, Cluny, Tournus, Morgon (Beaujolais).

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup au *Tropideres cinctus*, Pk. Mais elle est d'une taille plus ramassée ; les antennes, beaucoup moins longues, ont leur second article proportionnellement beaucoup plus court, ce qui le fait paraître plus renflé ; les articles intermédiaires sont aussi beaucoup moins allongés, ainsi que la massue dont l'article intermédiaire est sensiblement transversal. Les élytres sont différemment tachées. Enfin les cuisses intermédiaires des ♂ ne sont nullement dilatées en oreillette.

Elle se distingue facilement du *Tropideres pudens*, Sch. par son rostre plus court et non resserré à la base.

Apion detritum.

Oblongum, convexum, ferè glabrum, subopacum, nigrum. Prothorace subcylindrico, basi sulcato, sparsim punctato ; fronte sulcis duobus brevissimis, profundis, postice confluentibus, insculptâ ; antennis subincrassatis ;

pedibus elongatis; rostro longo, subtenui, arcuato; elytris evidentè punctato-sulcatis, interstitiis planis, substrigosis.

Long. 0^m,0025 (1 l.). — Larg. 0^m,001 (1/3 l.).

Corps oblong; convexe; presque glabre; d'un noir peu brillant.

Tête transversale; très-faiblement chagrinée; d'un noir mat. *Col* renflé, convexe, plus large que la tête et les yeux réunis; d'un noir assez brillant; presque lisse ou très-finement et obsolètement ridé en travers. *Front* subdéprimé; marqué de deux sillons très-courts et profonds, postérieurement réunis. *Rostre* presque aussi long que la moitié du corps, assez épais, assez fortement arqué; noir, opaque; très-obsolètement chagriné à la base; assez brillant et presque lisse à partir de l'insertion des antennes jusqu'au sommet. *Parties de la bouche* d'un brun de poix. *Yeux* orbiculaires, assez saillants; brunâtres.

Antennes assez fortes; atteignant à peine la base du prothorax; insérées près de la base du rostre; noires, légèrement pubescentes; à articles basilaires du funicule épaissis; à *massue* oblongue acuminée.

Prothorax un peu plus long que large; peu convexe; subcylindrique; d'un noir peu brillant; finement chagriné, parsemé en outre de points assez grossiers, mais peu profonds et peu serrés; marqué à la base d'un sillon longitudinal assez profond, mais étroit, ne dépassant pas le tiers postérieur; garni, sur les côtés, de quelques poils blanchâtres rares, insérés dans les points enfoncés.

Ecusson triangulaire, oblong; d'un noir peu brillant; presque lisse.

Elytres deux fois et demie plus longues que le prothorax, beaucoup plus larges que lui à leur base; à *épaules* largement arrondies et peu saillantes; allant insensiblement en s'élargissant jusqu'aux deux tiers postérieurs, puis se rétrécissant assez brusquement, en s'arrondissant, jusqu'au sommet;

très-convexes, surtout en arrière; d'un noir peu brillant, un peu bleuâtre; marquées de stries canaliculées assez fortes et visiblement ponctuées, avec les *intervalles* plans, assez larges, obsolètement ridés en travers.

Dessous du corps assez convexe; d'un noir assez brillant; fortement ponctué, d'une manière assez serrée sur la poitrine, un peu plus lâche sur le ventre.

Pieds allongés; finement chagrinés; noirs; garnis de poils blanchâtres, couchés, peu serrés. *Cuisses* grèles à la base, épaissies avant leur extrémité.

PATRIE : Marseille. Juin. Très-rare.

Obs. On prendrait aisément cette espèce pour une variété épilée de l'*Apion confluens*, Sch., auquel elle ressemble beaucoup, et dont elle ne diffère que par son rostre plus long et plus grèle, et par les sillons du front beaucoup plus profonds et plus courts.

Apion parvulum.

Elongatum, convexum, albido-pilosellum, nigrum, opacum. Prothorace subcylindrico, fortitèr rugoso-punctato, basi tenuitèr sulcato; fronte coriaceâ; antennis brevibus, basi piceis; pedibus subelongatis. Rostro parùm producto, subincrassato, levitèr arcuato. Élytris fortitèr sulcato-punctatis, insterstitiis angustis, planis.

Long. 0^m,0018 (2/3 l.). — Larg. 0^m,0007 (1/4 l.).

♂ *Rostre* un peu plus long que la tête; opaque à la base, brillant vers le sommet.

♀ *Rostre* deux fois plus que la tête; assez brillant dans toute son étendue.

Corps allongé; assez convexe; d'un noir peu brillant; couvert de poils blanchâtres assez longs, peu serrés, longitudinalement ou obliquement couchés.

Tête presque en carré transversal; subdéprimée; très-finement chagrinée; rugueusement marquée de points épars et obsolètes; d'un noir opaque, avec quelques longs poils blan-

châtres, couchés, croisés, autour des yeux et sur le *front*. Celui-ci assez large, chagriné. *Rostre* subcylindrique; assez épais; légèrement arqué; très-finement chagriné; obsolètement et éparsément ponctué; d'un noir plus ou moins opaque. *Parties de la bouche* couleur de poix. *Yeux* grands; orbiculaires, peu saillants; d'un noir profond.

Antennes courtes; assez fortes; n'atteignant point la base du prothorax; insérées à la base du rostre; à peine pubescentes; noires, avec le *scape* et souvent la base du *funicule* d'une couleur de poix plus ou moins ferrugineuse; celui-ci submoniliforme: la *massue* oblongue, acuminée.

Prothorax pas plus long que large; peu convexe; subcylindrique ou très-faiblement arrondi sur les côtés; tronqué à la base et au sommet, à peine étranglé avant ce dernier; d'un noir opaque; finement et rugueusement chagriné, marqué de gros points enfoncés assez serrés; couvert, surtout sur les côtés, de quelques poils blanchâtres couchés, paraissant naître du fond des points enfoncés; présentant en outre vers la base un petit sillon longitudinal très-fin et ne dépassant pas le tiers postérieur.

Ecusson enfoncé, à peine visible.

Elytres oblongues; trois fois plus longues que le prothorax; beaucoup plus larges que lui à leur base; à *épaules* peu saillantes et arrondies; convexes; subparallèles jusqu'aux deux tiers postérieurs de leur longueur, après lesquels elles se rétrécissent d'une manière arquée jusqu'au sommet, où elles sont simultanément arrondies; marquées de stries canaliculées, ponctuées, assez fortes, et dont les *intervalles* sont plans, assez étroits et transversalement chagrinés; d'un noir peu brillant, avec des séries de poils blanchâtres longitudinalement ou obliquement couchés, disposées l'une dans le fond des stries, et l'autre sur les intervalles. *Pygidium* caché par les élytres.

Dessous du corps assez convexe; fortement et grossièrement ponctué; d'un noir assez brillant; garni d'une pubescence

blanchâtre peu serrée : les deuxième, troisième et quatrième arceaux du ventre chagrinés, non ponctués, avec quelques rares poils blanchâtres.

Pieds assez allongés ; rugueusement chagrinés ; noirs ; garnis de poils blanchâtres couchés, peu serrés. *Cuisses* assez épaisses. *Tarses* assez courts.

PATRIE : Lyon, Beaujolais.

Obs. Cette espèce se distingue de l'*Apion atomarium*, Kirby, par sa forme beaucoup plus étroite et par ses épaules moins saillantes, et de l'*Apion flavimanum*, Kirby, par ses pieds antérieurs concolores.

Apion semicyaneum.

Oblongum, subconvexum, subnitidum tenuitèr parcius albido-pubes-cens, nigrum ; elytris violaceis, parum profundè sulcato-punctatis, intersti-tiis angustulis, planis ; capite prothoraceque punctatis, hoc lateribus levi-tèr ampliato, basi brevitàr sulcato. Antennis brevibus, pedibus subelongatis. Rostro brevi, subcylindrico, arcuato, punctulato.

Long. 0^m,0023 (1 l.). — Larg. 0^m,001 (1/3 l.).

♂ *Rostre* épais ; un peu plus long que la tête ; fortement arqué ; pointillé ; d'un noir opaque, avec une fossette oblongue, obsolète, sur son milieu.

♀ *Rostre* moins épais ; deux fois plus long que la tête ; médiocrement arqué ; pointillé ; d'un noir brillant ; sans fossette sur son milieu.

Corps oblong ; peu convexe ; d'un noir un peu opaque sur la tête et le prothorax ; d'un violet plus ou moins obscur sur les élytres ; garni d'une pubescence blanchâtre assez rare, très-fine et couchée.

Tête faiblement transversale ; subdéprimée ; très-finement chagrinée ; éparsément ponctuée ; d'un noir opaque, avec quelques poils blanchâtres sur les côtés et autour des yeux. *Front* large ; rugueux ; présentant quelques rides longitudinales obsolètes, très-fines, et quelques poils blanchâtres fins,

couchés. *Rostre* subcylindrique; assez épais; sensiblement arqué; pointillé, et parsemé d'une légère et rare pubescence blanchâtre, brillante. *Parties de la bouche* d'une couleur de poix ferrugineuse. *Yeux* grands; suborbiculaires, peu saillants, brunâtres.

Antennes insérées vers la base du rostre; assez fortes; atteignant à peine le milieu du prothorax; légèrement pubescentes; noires; à *massue* elliptique; à premier article du *funicule* renflé, subglobuleux: les deuxième et troisième obconiques: les autres moniliformes.

Prothorax à peu près aussi long que large; légèrement convexe; tronqué à la base et au sommet; médiocrement étranglé avant ce dernier; assez arrondi sur les côtés après le milieu; très-finement chagriné; d'un noir peu brillant; offrant une ponctuation assez forte, peu profonde et assez serrée; garni, surtout sur les côtés, de quelques poils fins, couchés, blanchâtres et brillants; marqué à la base d'un sillon longitudinal profond, court, lancéolé.

Ecusson oblong; triangulaire; obscur; presque lisse.

Elytres trois fois plus longues que le prothorax; plus larges que lui à leur base; à *épaules* peu saillantes et largement arrondies; peu convexes; subparallèles jusqu'aux deux tiers postérieurs, après lesquels elles se rétrécissent d'une manière arquée pour aller s'arrondir simultanément au sommet; d'un violet plus ou moins obscur, quelquefois verdoyant, assez brillant, avec quelques poils fins, couchés, blanchâtres; marquées, en outre, de stries canaliculées, peu profondes, assez fortement ponctuées, subcrénelées. *Intervalles* plans; assez étroits; obsolètement ridés.

Dessous du corps peu convexe; d'un noir brillant; fortement et grossièrement ponctué; garni d'une pubescence blanchâtre fine et rare. Deuxième et troisième arceaux du ventre déprimés; non ponctués; subopaques; très-finement chagrinés.

Pieds assez allongés; obsolètement chagrinés; d'un noir brillant; garnis de poils blanchâtres peu serrés, bien visi-

bles. *Cuisses* médiocrement renflées. *Tarses* assez courts.

PATRIE : La Seyne, près Toulon. Juin. Rare.

Obs. Cette espèce doit être placée entre l'*Apion setiferum*, Sch., et l'*Apion lævigatum* Kirby (*brunnipes*, Sch.).

Apion scalptum.

Elongatum, convexum, brevius albido-pilosum, subopacum, nigrum. Fronte intrusâ; prothorace oblongo, subcylindrico, fortitè rugoso-punctato, basi sulcato. Elytris sulcato-punctatis, interstitiis planis, latiusculis, rugulosis. Antennis validis, pedibus subelongatis. Rostro longo, arcuato, basi tumidulo.

Long. 0^m,003 (1 l. 1/4). — Larg. 0^m,0011 (1/3 l.).

♂ *Tibias antérieurs* arcuément dilatés vers le milieu de leur tranche interne; assez brusquement recourbés en dedans avant l'extrémité, où ils présentent une dent courte assez solide.

♀ *Tibias antérieurs* seulement légèrement sinués en dedans avant l'extrémité.

Corps allongé; assez convexe; d'un noir peu brillant; revêtu de poils couchés, blanchâtres.

Tête presque carrée; d'un noir peu brillant; fortement et rugueusement ponctuée; presque excavée entre les yeux, qui paraissent alors plus élevés que le front : sur celui-ci les points enfoncés se transforment en rides longitudinales plus ou moins visibles; garnie en outre de quelques poils courts, couchés, blanchâtres, un peu plus serrés vers le bord interne des yeux. *Rostre* arqué, presque aussi long que le prothorax; sensiblement renflé et angulairement dilaté à la base, subcylindrique dans le reste de sa longueur; très-obsoletement et éparsement pointillé; marqué en son milieu d'une fossette oblongue, peu visible, souvent effacée; d'un noir mat dans sa première moitié, brillant dans sa dernière; garni, à la base, de quelques poils blancs, couchés, très-courts. *Parties de la bouche* d'un noir de poix. *Yeux* assez saillants,

suborbiculaires; noirs. *Antennes* assez longues; assez épaisses; pubescentes; d'un noir obscur; insérées à la partie dilatée du rostre.

Prothorax étroit, oblong; sensiblement plus long que large; subbissinué à la base; tronqué au sommet; subcylindrique; faiblement convexe; très-fortement et rugueusement ponctué; d'un noir peu brillant, avec quelques poils couchés, blanchâtres, les uns obliquement, les autres longitudinalement dirigés; marqué aussi vers la base d'un sillon longitudinal court, mais profond.

Ecusson très-petit; ovalaire; noir; obsolètement chagriné.

Elytres deux fois et demie plus longues que le prothorax; plus larges que lui à leur base; à *épaules* assez saillantes et légèrement arrondies; allant presque insensiblement en s'élargissant jusque vers le milieu, après lequel elles se rétrécissent d'une manière arquée jusqu'au sommet, où elles sont simultanément arrondies; assez convexes; d'un noir d'acier peu brillant, avec des séries plus ou moins régulières de poils couchés, blanchâtres; marquées de stries canaliculées, assez profondes, dont le fond est distinctement ponctué, et dont les *intervalles*, plans et assez larges, présentent des rugosités transversales ou rides irrégulières très-obsolètes.

Dessous du corps assez convexe; brillant; marqué de points assez forts, peu serrés; parsemé de poils couchés, blanchâtres: les deuxième, troisième et quatrième arceaux du ventre déprimés, opaques, finement chagrinés: le quatrième en outre obsolètement et rugueusement ponctué.

Pieds assez allongés; chagrinés; noirs; garnis de poils couchés, blanchâtres, suivant des directions différentes sur les cuisses, plus régulièrement disposés sur les tibias. *Cuisses* médiocrement épaissies. *Tarses* assez courts.

PATRIE : Hyères. Juin. Rare.

Obs. Cette espèce a beaucoup d'affinité avec l'*Apion gibbirostre*, Gyl. (*carduorum*, Kiby). Elle en diffère par son front excavé; son prothorax plus long, subcylindrique, beaucoup

plus fortement ponctué ; et par les tibias antérieurs des ♂, moins grêles, plus sensiblement dilatés vers le milieu de la tranche interne et plus brusquement recourbés vers l'extrémité.

Aplon funiculare.

Ovatum, convexum, nigrum, densius cretaceo-piloso-squamosum ; antennis pedibusque subelongatis, testaceis ; funiculo, tarsi femorumque summâ basi infuscatis ; rostro subcylindrico, arcuato, longitudine prothoracis, basi angulatim dilatato ; capite prothoraceque fortiter rugoso-punctatis ; hoc transverso, lateribus leviter ampliato, basi profundè sulcato ; elytris punctato-sulcatis, suturâ vittâque submarginali fulvo-cinereis ; interstitiis planis, latiusculis, rugoso-punctatis.

Long. 0^m,0027 (1 l.). — Larg. 0^m,0013 (1/2 l.).

Corps ovale ; assez convexe ; noir ; couvert de squamules piliformes d'un blanchâtre argenté, avec la suture et une bande sur les côtés des élytres, d'un fauve doré.

Tête transversale, déprimée, noire, fortement et rugueusement ponctué ; garnie de poils couchés, peu serrés, brillants, d'un fauve argenté. *Front* déprimé. *Col* assez élevé ; presque lisse ou très-finement et presque imperceptiblement ridé en travers. *Rostre* de la longueur du prothorax ; subcylindrique, un peu infléchi, assez fortement arqué, dilaté de chaque côté vers la base en forme d'angle ; rugueusement ponctué ; pubescent et d'un noir assez mat dans son premier tiers, glabre et d'un noir brillant dans le reste de sa longueur ; obsolètement pointillé ou marqué de petits points oblongs, en forme de hâchures, sur son milieu ; tout à fait lisse vers le sommet. *Parties de la bouche* ferrugineuses. *Yeux* grands ; noirs ; suborbiculaires ; médiocrement saillants.

Antennes aussi longues que la tête et le prothorax réunis ; insérées à la partie dilatée du rostre ; poilues ; testacées, avec le *funicule* rembruni : le premier article de celui-ci oblong, grand, un peu plus épais et moins obscur que les suivants : le deuxième plus grêle et un peu moins long que

le précédent, un peu plus long que le suivant : les troisième à septième obconiques, subégaux : la *massue* oblongue, acuminée.

Prothorax un peu moins long que large ; une fois plus étroit en avant qu'en arrière ; subbissiné à la base, tronqué au sommet, avant lequel il est légèrement étranglé ; faiblement convexe ; assez fortement arrondi sur les côtés après le milieu ; assez densément, fortement et rugueusement ponctué ; d'un noir peu brillant ; revêtu de poils couchés, micacés, plus ou moins squamiformes ; marqué vers la base d'un sillon longitudinal assez étroit, mais profond, n'atteignant point le milieu.

Ecusson petit ; suborbiculaire ; noir ; presque lisse ou très-finement et obsolètement chagriné.

Elytres deux fois et demie plus longues que le prothorax ; plus larges que lui à leur base ; assez convexes ; légèrement arrondies aux *épaules* qui sont assez saillantes ; subparallèles jusqu'aux deux tiers postérieurs, après lesquels elles se rétrécissent pour aller s'arrondir simultanément au sommet ; noires, mais densément recouvertes de poils squamiformes, couchés, d'un blanc de craie, plus ou moins divergents et imbriqués ; avec une large bande suturale et une large bande submarginale de poils de même nature, mais d'un fauve plus ou moins cendré, postérieurement réunies et prolongées jusqu'au sommet des élytres : celles-ci offrent en outre des stries canaliculées, peu profondes, mais fortement ponctuées. *Intervalles* plans ; assez larges ; rugueusement ponctués.

Dessous du corps noir ; faiblement convexe ; grossièrement ponctué ; garni de poils micacés, beaucoup plus serrés sur les côtés de la poitrine et sur les derniers arceaux du ventre.

Pieds assez allongés ; finement pubescents ; obsolètement et rugueusement ponctués ; testacés, avec les genoux légèrement rembrunis : les tarses, les trochanters et l'ex-

trême base des cuisses, noirâtres : celles-ci assez longues, peu épaissies.

PATRIE : Nérès (Bourbonnais). Juillet. Rare.

Obs. Cette espèce, voisine des *Apion ulicis*, Forst. *difficile*, Hbst., et *genistæ*, Kirby, se distingue : du premier, par son rostre moins long, arqué, à base dilatée mais non dentée, par la couleur de ses pieds et de ses antennes, et par les premiers articles du funicule beaucoup moins allongés : du deuxième, par son rostre plus arqué, à base dilatée mais non dentée, et par la couleur des tarsi, des cuisses intermédiaires et postérieures et du funicule des antennes : du troisième, par sa taille plus grande, par son rostre beaucoup plus arqué et par la couleur du funicule des antennes dont la massue est aussi plus allongée. La couleur testacée de cette dernière empêche de confondre cette espèce avec l'*Apion bivittatum*, Gerstaecker.

Apion pedale.

Oblongum, convexum, brevissimè parcè albido-pubescent, subnitidum, nigrum; elytris gibbosis, nigro-cæneis, catenato-striatis, interstitiis latis, planis, obsoletè coriaceis; antennis brevibus, tenuibus, basi piceis; pedibus elongatis, lætè, tibiis anticis obscurè, testaceis; tibiis intermediis et posticis, tarsisque omnibus nigricantibus; rostro elongato, subcylindrico, arcuato, punctulato; capite prothoraceque oblongis, rugoso-punctatis; hoc levis-simè lateribus ampliatis, basi sulcatis.

Long. 0^m,0028 (1 l.). — Larg. 0^m,0013 (1/3 l.).

♂ *Antennes* insérées au milieu du rostre. *Rostre* plus court que la tête et le prothorax réunis; subopaque; un peu épaissi et obsolètement et longitudinalement rugueux à la base, parcimonieusement pointillé et brillant dans le reste de sa longueur. *Dernier arceau ventral* très-convexe, tronqué ou subsinué à son sommet. *Premier et deuxième articles des tarsi intermédiaires et postérieurs* fortement dilatés. *Tibias postérieurs* sensiblement arqués. *Pygidium* visible.

♀ *Antennes* insérées un peu avant le milieu du rostre. *Rostre* aussi long que la tête et le prothorax réunis; brillant dans toute son étendue; guère plus épaissi et longitudinalement subsillonné à la base; parcimonieusement pointillé dans le reste de sa longueur. *Dernier arceau ventral* subdéprimé, arrondi à son sommet. *Premier et deuxième articles des tarsi intermédiaires et postérieurs* non dilatés. *Tibias postérieurs* droits. *Pygidium* caché.

Corps oblong; convexe; noir, un peu métallique sur les élytres, parsemé d'une pubescence très-courte, grisâtre, à peine visible.

Tête en carré long; déprimée; rugueusement ponctuée; noire. *Col* assez brillant; finement ridé en travers; d'un noir métallique. *Front* avec des rugosités longitudinales assez marquées, se prolongeant plus ou moins, en s'affaiblissant, sur la base du *rostre*. Celui-ci subcylindrique, assez fortement arqué; rugueux ou plus ou moins visiblement subsillonné à la base, surtout sur les côtés; obsolètement et parcimonieusement pointillé sur le reste de sa longueur et presque lisse au sommet. *Parties de la bouche* d'un noir de poix. *Yeux* très-grands; suborbiculaires, peu saillants; brunâtres.

Antennes assez grêles; courtes, dépassant à peine le bord antérieur du prothorax; légèrement pubescentes; d'un brun de poix, avec la base du *scape* plus claire et la *massue* plus obscure: celle-ci elliptique, acuminée: le premier article du *funicule* oblong, assez épais; le deuxième allongé, beaucoup plus grêle que le précédent: les suivants obconiques, graduellement moins longs en approchant du sommet.

Prothorax oblong; bien plus étroit que les élytres; sensiblement plus long que large; tronqué à la base et au sommet, plus étroit à celui-ci qu'en arrière; subconvexe; légèrement arrondi après le milieu sur les côtés; d'un noir assez brillant; rugueusement et assez fortement ponctué;

marqué à la base d'un sillon longitudinal assez étroit, profond, et dépassant un peu le milieu.

Ecusson oblong; rugueux; noir.

Elytres oblongues, ovalaires; gibbeuses et très-convexes postérieurement; trois fois plus longues que le prothorax; obliquement coupées et largement arrondies aux épaules; à *calus huméral* oblong, assez saillant; allant en s'élargissant jusqu'au milieu, après lequel elles se rétrécissent d'une manière arquée pour s'arrondir simultanément au sommet; d'un noir légèrement bronzé, brillant, avec une pubescence blanchâtre peu serrée, très-courte, à peine visible; marquées de stries peu profondes, distinctement ponctuées-caténulées: *intervalles* plans, larges et très-obsolètement chagrinés. *Pygidium* nu dans le ♂, rugueux, en losange transversal.

Dessous du corps assez convexe, avec une ponctuation assez grossière, mais peu serrée, et quelques poils micacés très-courts, insérés au fond des points.

Pieds allongés; à peine pubescents. *Trochanters* et *cuisse*s d'un testacé assez clair: *tibias antérieurs* d'un testacé un peu plus obscur: *tibias intermédiaires* et *postérieurs*, brunâtres; tous les *tarses* noirâtres, garnis en dessous d'une brosse de poils blancs. *Cuisses* allongées; médiocrement épaissies.

PATRIE: Hyères. Juin. Rare.

Obs. Cette espèce ressemble au premier abord à l'*Apion fagi*, Lin. (*apricans*. Hbst., Sch.). Elle n'en diffère que par ses antennes moins pâles à la base, et par la singulière conformation des tarses intermédiaires et postérieurs des ♂.

Apion longimanum.

Subelongatum, convexum, subglabrum, parum nitidum, nigrum; antennis piceis, basi dilutioribus; femoribus lætè, tibiis obscurius testaceis; rostro subcylindrico, elongato, subtenui, levitè arcuato; capite prothoraceque oblongis, rugoso-punctatis, hoc lateribus levissimè ampliato, basi obsolete sulcato; elytris oblongo-subgibbosis, nigro-subcæneis, catenato-striatis; tibiis anticis et intermediis longis, gracilibus, levitè arcuatis.

Long. 0^m,0027 (1 l.). — Larg. 0^m,0011 (1/3 l.).

Corps assez allongé; convexe; presque glabre; d'un noir peu brillant, un peu métallique sur les élytres.

Tête oblongue; déprimée; d'un noir peu brillant; très-fortement et rugueusement ponctuée: les points se transformant sur le front en rides longitudinales bien marquées. *Col* convexe; brillant; noir; presque lisse. *Rostre* assez grêle, subcylindrique, aussi long que la tête et le prothorax réunis; faiblement arqué; d'un noir brillant; obsolètement strié à la base, parcimonieusement pointillé sur le reste de sa longueur. *Parties de la bouche* d'un noir de poix. *Yeux* très-grands; suborbiculaires, peu saillants, subdéprimés; brunâtres, avec des reflets micacés.

Antennes insérées vers le milieu du rostre; assez grêles; assez courtes, dépassant à peine le bord antérieur du prothorax; légèrement pubescentes; d'un brun de poix, avec la base plus claire, et la *massue* obscure: celle-ci allongée, acuminée. Le premier article du *funicule* oblong, assez épais: les deuxième, troisième et quatrième suballongés, obconiques: les autres submoniliformes.

Prothorax oblong; sensiblement plus étroit que les élytres; sensiblement plus long que large; tronqué à la base et au sommet; pas plus étroit en avant qu'en arrière; subcylindrique ou très-faiblement arrondi vers le milieu de ses côtés; d'un noir peu brillant; fortement et rugueusement ponctué, et marqué à la base d'un sillon longitudinal obsolète, s'avancant jusqu'au milieu.

Écusson oblong; noir; rugueux.

Elytres oblongues; convexes, postérieurement gibbeuses; trois fois plus longues que le prothorax; obliquement coupées aux épaules qui sont arrondies et offrent un *calus* oblong, assez élevé; allant en s'élargissant jusqu'après le milieu à partir duquel elles se rétrécissent, d'une manière arquée, pour s'arrondir simultanément au sommet; pres-

que glabres; d'un noir peu brillant et à peine bronzé; marquées de stries peu profondes, distinctement ponctuées-caténulées, avec les *intervalles* plans, larges, absolument ruguleux; garnies, surtout sur les côtés, de quelques rares poils blanchâtres, brillants, très-courts, à peine visibles.

Dessous du corps assez convexe; assez grossièrement mais obsolètement ponctué; d'un noir assez brillant, avec quelques poils micacés, très-courts, au fond des points.

Pieds allongés; à peine pubescents. *Cuisses* testacées; assez longues, faiblement épaissies. *Tibias* d'un testacé obscur. *Tarses* noirâtres. *Tibias antérieurs* et *intermédiaires* longs; grêles; légèrement arqués.

PATRIE : Hyères. Mars. Rare.

Obs. Cette espèce peut facilement être confondue avec *l'apion trifolii*, Lin. (*æstivum*, Germ.); mais elle est un peu plus allongée; les stries des élytres sont moins profondes et leurs intervalles tout à fait plans. Du reste la forme des tibias antérieurs et intermédiaires nous semble un caractère suffisant pour l'en séparer.

Sitones dispersus.

Subelongatus, levitèr convexus, niger, parce pallido-pubescens, densè albido-squamosus; antennis, femorum basi, geniculis, tibiis tarsisque ferrugineo-testaceis; fronte rostroque canaliculatis; capite prothoraceque subtilitèr punctulatis, prætereaque vagè grossè punctatis, hoc medio lateribus ampliatis; elytris punctato-striatis, seriatim albido-setosis; oculis omninò depressis.

Long. 0^m,0042 (1 3/4 l.). — Larg. 0^m,002 (4/5 l.).

Corps assez allongé, légèrement convexe, noir, densément revêtu de squamules arrondies, blanchâtres, entremêlées de poils de la même couleur.

Tête transversale; noire; plus ou moins garnie de squamules et de poils blanchâtres, micacés; parsemée de gros

points arrondis, vaguement disposés, dans l'intervalle desquels on remarque une ponctuation beaucoup plus fine et serrée. *Vertex* légèrement convexe. *Front* subdéprimé; profondément canaliculé. *Rostre* court; un peu plus étroit que la tête; rugueusement ponctué; creusé en son milieu d'un canal profond, continuant celui du front et s'arrêtant avant l'extrémité; échancré ou incisé à son sommet; plus ou moins garni, surtout sur les côtés, de poils et de squamules blanchâtres et brillantes. *Parties de la bouche* barbues; d'un noir de poix. *Mandibules* avec quelques squamules pâles. *Yeux* suborbiculaires; grands; brunâtres; tout à fait déprimés. *Antennes* assez courtes; légèrement pubescentes; d'un testacé ferrugineux; à articles intermédiaires submoniliformes: *massue* ovale-oblongue, acuminée.

Prothorax un peu moins long que large; tronqué à la base et au sommet; à peine étranglé avant ce dernier; faiblement convexe; assez fortement arrondi sur les côtés vers le milieu; noir; offrant d'assez gros points circulaires, vaguement disposés, et dont les intervalles sont eux-mêmes finement pointillés; densément revêtu de squamules arrondies, blanchâtres, argentées, plus ou moins brillantes, et entremêlées de quelques poils pâles et couchés.

Ecusson petit, orbiculaire, densément couvert de squamules blanchâtres.

Elytres trois fois plus longues que le prothorax; sensiblement plus larges que lui dans son milieu; simultanément sinuées à la base; à *épaules* obliques, peu saillantes et légèrement arrondies; faiblement convexes; subparallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, à partir desquels elles se rétrécissent pour aller s'arrondir simultanément au sommet; noires; densément revêtues de squamules arrondies, blanchâtres, argentées, plus ou moins brillantes; marquées de stries peu profondes, mais assez fortement ponctuées, dont les *intervalles* sont plans, larges, obsolètement chagrinés, et ornés chacun d'une série de poils hispides, blanchâtres, inclinés en arrière.

Dessous du corps subdéprimé; rugueux; densément couvert de squamules et de poils blanchâtres.

Pieds assez forts; légèrement chagrinés; garnis de poils pâles et couchés. *Cuisses* assez épaisses; noires, avec la base et les genoux ferrugineux. *Tibias* et *Tarses* d'un testacé ferrugineux.

PATRIE : Hyères. Mars.

Obs. Cette espèce, qui a un peu le faciès du *Metallites murinus*, Sch., est en quelque sorte intermédiaire entre les *Sitones promptus*, Sch. et *elegans*, Sch. Elle diffère de l'un et de l'autre par la singulière ponctuation de son prothorax.

Peritelus subdepressus.

Ovato-oblongus, subdepressus, niger, densè, squamulis griseo-luteis micantibus, lateribus magis albidis, vestitus; thorace rugoso-punctato, medio subtilissimè obsoletè carinulato; elytris distinctè subtilitèr punctato-striatis; interstitiis latis, planis, seriatim breviter setulosis. Fronte sulcatâ; pedibus fusco, antennis dilutiùs ferrugineis.

Long. 0^m,004 à 0^m,006 (1 l. 2/3 à 2 l. 1/2). — Larg. 0^m,0022 à 0^m,003 (1 l. à 1 1/4 l.).

♂ *Prothorax* beaucoup moins long que large. *Elytres* obovales.

♀ *Prothorax* un peu moins long que large. *Elytres* oblongues.

Corps ovale-oblong; légèrement déprimé, noir; densément couvert de squamules grossières, arrondies, grisâtres, à reflets légèrement dorés sur le dos, argentés sur les côtés.

Tête large; rugueuse; noire; couverte de squamules blanchâtres, et hérissée de quelques soies légèrement épaissies au sommet, argentées, brillantes et dirigées en arrière. *Vertex* convexe. *Front* assez profondément sillonné sur son milieu. *Rostre* à peine plus long que la tête; sensiblement divariqué et assez profondément échancré à son sommet;

presque plan à la base, mais à partir de celle-ci creusé d'une gouttière allant en s'évasant jusqu'à l'extrémité, et au milieu de laquelle s'élève une carène longitudinale assez fine, prolongée jusqu'à l'échancrure du sommet. *Parties de la bouche* d'un noir de poix. *Yeux* médiocres; suborbiculaires; peu saillants; noirs.

Antennes assez fortes; ferrugineuses; insérées au sommet du rostre. *Scapè* atteignant le bord antérieur du prothorax, sensiblement courbé en dehors, distinctement renflé en massue à son extrémité; garni de soies argentées, brillantes, couchées. *Funicule* de la longueur du scapè: les deux premiers articles allongés, obconiques, subégaux, garnis de soies de la même nature que celle du scapè; les troisième à cinquième transversaux, moniliformes, ciliés de poils obscurs assez redressés. *Massue* petite; ovalaire; acuminée; finement pubescente.

Prothorax subdéprimé sur le dos; sensiblement plus court chez le ♂ que chez la ♀; tronqué au sommet, obliquement coupé à la base; légèrement arrondi sur les côtés; rugueusement ponctué; marqué sur son milieu d'une carène longitudinale très-fine, souvent obsolète; entièrement couvert de squamules grossières, brillantes, d'un gris un peu jaunâtre sur le dos, d'un blanchâtre argenté sur les côtés.

Ecusson indistinct.

Elytres, derrière les épaules, sensiblement plus larges que le prothorax; trois (♂) ou quatre (♀) fois plus longues que lui; obovales (♂) ou oblongues (♀); subdéprimées sur le dos; marquées de points rangés en stries fines, mais bien distinctes, un peu plus profondes vers l'extrémité: chaque point muni d'une petite squamule oblongue, argentée; densément couvertes de squamules grossières, d'un gris jaunâtre, brillantes à un certain jour, d'un blanchâtre argenté assez vif sur les côtés, avec souvent des lignes ou taches oblongues pâles sur le disque. *Intervalles* plans; larges; munis chacun d'une série de soie très-courtes.

légèrement épaissies à leur sommet, blanches, brillantes, couchées, et souvent seulement visibles en arrière. *Epaules* obliques, effacées.

Dessous du corps subdéprimé; creusé sur la poitrine; noir; assez densément couvert de squamules d'un gris argenté, moins grossières et plus allongées que celles du dessus du corps.

Pieds assez robustes; d'un brun de poix plus ou moins ferrugineux; couverts de squamules d'un gris argenté, avec les tibias garnis en outre de poils blanchâtres et brillants. *Cuisses* sensiblement épaissies dans leur milieu. *Tarses* assez courts; ferrugineux; sans squamules, mais garnis d'une pubescence blanchâtre, brillante.

PATRIE : Languedoc, Provence. Mai. Juin,

Obs. Cette espèce est intermédiaire entre le *Peritelus rusticus*, Sch., et le *P. prolixus*, Ksw. Elle diffère du premier par ses élytres plus déprimées; du second, par sa forme plus allongée et par son prothorax plus densément et moins fortement ponctué.

Ottiorhynchus cœsipes.

Oblongo-obovatus, levitèr convexus, supra ferè glaber, punctulatus, nitidus, niger, antennis piceis, subelongatis. Fronte medio puncto minuto impressâ; rostro longitudinalitèr obsoletè carinato; prothorace oblongo, lateribus modicè rotundato; elytris obsoletissimè transversim alutaceis, subtilissimèque punctulatis. Pedibus brevibus, crassis, fusco-ferrugineis; tibiis anticis intus apice incurvis, intermediis intus apice levitèr, posticis profundius incis. Femoribus muticis, modicè incrassatis. ♂.

Long. 0^m,009 (4 l.). — Larg. 0^m,004 (1 3/4 l.).

Corps en ovale un peu allongé; légèrement convexe; d'un noir brillant; presque glabre en dessus ou bien avec une fine et rare pubescence grisâtre, à peine visible, sur les côtés; obsolètement et finement ponctué.

Tête large; légèrement convexe; finement ponctuée; d'un

noir brillant. *Front* faiblement convexe; finement ponctué; marqué au milieu et en arrière d'une petite fossette punctiforme, profonde et bien distincte. *Rostre* presque plan; légèrement ponctué; sensiblement divariqué et échancré au sommet, et offrant en son milieu une carène longitudinale peu saillante. *Parties de la bouche* d'un brun de poix. *Yeux* assez gros; suborbiculaires; peu saillants; noirs.

Antennes assez allongées; pubescentes; d'un brun de poix. *Scape* ponctué; dépassant le bord antérieur du prothorax; grêle à la base, sensiblement renflé en massue vers son extrémité. *Funicule* à peine aussi long que le scape; à premier et deuxième articles allongés, ponctués: les troisième à septième obconiques: le troisième un peu plus long que large: *massue* oblongue, finement pubescente, acuminée, un peu ferrugineuse à son extrémité.

Prothorax un peu plus long que large; d'un tiers plus étroit que les élytres dans leur plus grande largeur; tronqué au sommet, très-obsolètement subsinué au milieu de sa base qui est finement rebordée; assez fortement arrondi sur les côtés; légèrement convexe; d'un noir brillant; couvert sur le dos d'une ponctuation fine et légère, pas trop serrée, et se transformant sur les côtés en une granulation assez forte.

Ecusson excessivement petit; triangulaire; noir, brillant; lisse.

Elytres obovales; deux fois et demie plus longues que le prothorax; assez fortement arrondies sur les côtés vers leur milieu, et sensiblement atténuées en arrière où elles sont simultanément et obtusément arrondies à leur sommet; légèrement convexes; d'un noir de poix brillant; presque glabres ou seulement avec une rare pubescence grisâtre sur les côtés, peu visible; présentant en outre de fines rides transversales ou obliques, entremêlées d'une ponctuation très-fine et très-légère, très-distincte sur le dos, plus embrouillée sur les côtés, où elle se confond avec les rides pour se transformer avec elles en une granulation plus ou

moins obsolète ; n'offrant de faibles traces de stries que tout à fait en arrière vers l'extrémité : *épaules* peu saillantes, effacées.

Dessous du corps subdéprimé ; légèrement pubescent ; d'un noir brillant. *Poitrine* largement excavée ; chagrinée. *Ventre* légèrement ponctué, avec le dernier arceau triangulairement impressionné vers son extrémité.

Pieds forts, d'un ferrugineux plus ou moins obscur ; brillants ; finement pubescents. *Cuisses* assez allongées ; mutiques, sensiblement renflées en massue avant leur extrémité ; rugueusement ponctuées à leur base, obsolètement et parcimonieusement sur le reste de leur étendue. *Tibias* rugueusement ponctués ; plus ou moins crénelés ou denticulés à leur tranche interne : les antérieurs un peu plus courts que la cuisse, arqués à leur tranche externe, assez brusquement recourbés en dedans avant leur sommet : les intermédiaires sensiblement plus courts que la cuisse, presque droits à leur tranche externe, un peu dilatés en dedans vers leur tiers supérieur, puis légèrement mais sensiblement entaillés vers leur sommet : les postérieurs encore plus sensiblement plus courts que la cuisse, légèrement recourbés en dehors avant le sommet à leur tranche externe, allant graduellement en s'élargissant de la base jusqu'après les trois quarts où ils sont fortement entaillés en dedans avant l'extrémité. L'entaille est garnie de poils plus grands que les autres, d'un fauve cendré. *Tarses* courts ; garnis en dessous d'une brosse de poils fins, d'un gris blanchâtre.

PATRIE : Montagnes de la Provence (M. Gabillot).

Obs. Cette espèce se rapproche de l'*Otiorhynchus sanguinipes*, Sch. Mais il est d'une forme plus ramassée, les élytres sont moins convexes et plus lisses. Elle diffère de toutes les espèces avec lesquelles on pourrait la confondre, par la singulière conformation des tibias, surtout des postérieurs, laquelle dénote sans doute un caractère masculin.

O. frigidus.

Oblongus, subdepressus, parè albido-piloso-squamosus, antennis pedibusque rufo, ferrugineis, femorum clavâ picescente. Fronte profundè foveolatâ; rostro rugoso, levitèr bisulcato, mediò carinulato; prothorace oblongo, fortitèr rugoso-granulato, lateribus levitèr rotundato. Elytris profundè punctato-pupillato-striatis, sparsim maculatim albido squamosis; interstitiis angustis, convexiusculis, obsoletè tuberculatis, seriatim setulosis. Pedibus gracilibus, femoribus antè apicem fortitèr clavatis, infrâ subdentatis.

Long. 0^m,007 (3 l. 1/4). — Larg. 0^m,0033 (1 1/2 l.).

Corps oblong; d'un noir de poix peu brillant; couvert de squamules piliformes, peu serrées, blanchâtres. *Elytres* avec quelques petites taches éparses, formées de squamules de même couleur, mais plus courtes, plus grossières, ovalaires.

Tête large; courte; convexe; noire; rugueusement ponctuée, et garnie de squamules piliformes, blanchâtres. *Vertex* dénudé; finement chagriné. *Front* déprimé, creusé sur son milieu d'une fossette oblongue, profonde. *Rostre* légèrement bissillonné; finement caréné sur son milieu; noir, rugueusement ponctué et couvert de squamules piliformes blanchâtres, couchées, transversalement disposées; un peu plus long que la tête; rétréci dans son milieu; sensiblement divariqué et échancré au sommet, et obliquement impressionné au devant de la bouche: l'impression dénudée, avec des rugosités longitudinales. *Parties de la bouche* d'un noir de poix. *Yeux* médiocres; suborbiculaires; déprimés; noirs.

Antennes assez allongées; pubescentes; d'un roux ferrugineux. *Scape* dépassant le bord antérieur du prothorax; assez grêle; assez brusquement renflé et déjeté en dehors à son extrémité. *Funicule* sensiblement plus long que le scape; à premier et deuxième articles allongés: le deuxième plus long que le précédent: les troisième à septième ovalaires, un peu plus long que larges; la massue elliptique, acuminée.

Prothorax de moitié plus étroit que les élytres dans leur

plus grande largeur; un peu plus long que large; tronqué au sommet et à la base; légèrement arrondi sur les côtés; faiblement convexe; d'un noir de poix; assez fortement et rugueusement granulé, et paré de quelques squamules piliformes, blanchâtres, peu serrées, couchées, et généralement disposées en travers.

Ecusson très-petit; enfoncé; triangulaire; dénudé; d'un noir de poix; presque lisse.

Elytres trois fois plus longues que le prothorax; oblongues; subdéprimées; simultanément échancrées à la base; faiblement arrondies sur les côtés; assez brusquement rétrécies en arrière où elles sont simultanément et obtusément tronquées au sommet; d'un noir de poix peu brillant; garnies de squamules piliformes, blanchâtres, peu serrées, couchées, obliquement ou longitudinalement disposées; et parées en outre, çà et là, de petites taches composées de squamules ovalaires, plus serrées, plus courtes, plus grossières, d'un blanc plus ou moins argenté, quelquefois à reflets dorés ou verdâtres; marquées de stries de gros points enfoncés, parés chacun d'une squamule oblongue, blanchâtre, qui les fait paraître comme ocellés. *Intervalles* assez étroits; assez convexes; obsolètement tuberculés et comme transversalement ondulés; parés chacun d'une série de soies blanchâtres, un peu redressées et inclinées en arrière. *Épaules* sont saillantes et largement arrondies.

Dessous du corps subdéprimé; d'un noir de poix; paré de squamules piliformes, peu serrées, blanchâtres. *Poitrine* un peu excavée, rugueusement ridée en travers. *Ventre* brillant; parcimonieusement ponctué.

Pieds grêles; garnis d'une pubescence blanchâtre, soyeuse, peu serrée sur les cuisses, plus dense aux tibias et aux tarses; d'un brun ferrugineux, avec la massue des cuisses plus obscure. *Cuisses* allongées; grêles à leur base, fortement renflées en massue après leur milieu, où elles sont, en dessous, anguleusement prolongées et munies d'une petite dent très-

courte. *Tibias* grèles ; un peu plus courts que les cuisses, dilatés et recourbés en dedans à leur sommet. *Tarses* assez courts ; garnis en dessous d'une brosse serrée de poils fins et blanchâtres.

PATRIE : Chamouni. Août.

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup à l'*Otiorhynchus pupillatus*, Sch., dont elle diffère par sa forme un peu plus allongée, par ses élytres sensiblement moins convexes, et à taches moins grandes, moins nombreuses, moins confluentes et d'une couleur moins fauve.

O. aurosus.

Brevitèr ovatus, subnitidus, convexus, niger, parce aureo-piloso-squamosus; antennis pedibusque ferrugineis. Fronte breviter profundè foveolatà; rostro levitèr bisulcato, medio carinato; prothorace brevi, lateribus modice ampliato, medio obsoletè canaliculato, fortitèr granulato seu tuberculato, tuberculis dorsi depressis. Elytris obsoletè punctato-striatis, maculis numerosis soèpè confluentibus, aureo-squamosis, ornatis; interstitiis angustis, convexiusculis, obsoletè tuberculatis. Antennis brevibus; pedibus sat elongatis, femoribus modicè incrassatis, muticis.

(*Otiorhynchus aurosus*. Guillebeau in litteris).

Long. 0^m,008 (3 l. 1/2). — Larg. 0^m,0045 (2 l.).

Corps en ovale court ; convexe ; d'un noir de poix assez brillant ; couvert de squamules piliformes, couchées, peu serrées, d'un cuivreux doré très-brillant, et disposées, sur les élytres, par taches plus ou moins confluentes.

Tête transversale ; convexe ; noire ; très-finement chagrinée ; dénudée et presque imponctuée sur le vertex ; assez fortement ponctuée et garnie de squamules piliformes d'un jaune doré sur le front, couchées, obliquement disposées, éparses, sur le milieu, plus serrées autour des yeux. *Front* marqué sur son milieu d'une petite fossette ovale et profonde. *Rostre* court ; un peu plus long que la tête ; étranglé dans son milieu ; sensiblement divariqué et échancré au sommet ; faiblement

bissillonné en dessus et surmonté sur son milieu d'une carène longitudinale peu saillante, bifurquée à son extrémité; assez fortement ponctué et garni d'une pubescence squamiforme d'un jaune doré, couchée, peu serrée, obliquement disposée : sommet du rostre dénudé, avec une impression triangulaire peu sentie. *Parties de la bouche* d'un noir de poix. *Yeux* médiocres; suborbiculaires; légèrement saillants; noirs avec des reflets dorés, éclatants.

Antennes courtes; d'un ferrugineux obscur; garnies d'une pubescence blanchâtre assez longue. *Scape* atteignant à peine le bord antérieur du prothorax; légèrement recourbé en dehors et faiblement renflé à son extrémité. *Funicule* à peine aussi long que le scape; à premier et deuxième articles allongés, subégaux : les troisième à quatrième légèrement : les cinquième à septième fortement transversaux. *Massue* petite, oblongue, acuminée.

Prothorax transversal; un peu plus court que large; d'une moitié plus étroit que les élytres en leur plus grande largeur; tronqué à la base et au sommet; assez fortement arrondi sur les côtés; assez convexe, d'un noir assez brillant; couvert d'une granulation assez forte, à grains, surtout sur le disque, aplatis et comme foulés par un cylindre; creusé sur son milieu d'un léger sillon longitudinal, souvent effacé en arrière. Il est en outre garni de squamules piliformes d'un jaune doré, brillantes, couchées, obliques ou longitudinales, peu serrées, et formant, sur les côtés du disque, par leur disposition plus transversale et plus serrée, comme deux bandes pâles légèrement cintrées en dedans. (Chez les individus bien frais, on aperçoit aussi à la partie antérieure du sillon quelques squamules longitudinalement disposées, plus serrées et plus apparentes que les autres.)

Ecusson très-petit; enfoncé; subtriangulaire; très-finement chagriné; d'un noir de poix peu brillant.

Elytres trois fois plus longues que le prothorax; obovales, assez courtes; assez convexes; simultanément échancrées à

la base, assez fortement arrondies en arrière, et rétrécies en pointe mousse à leur sommet; d'un noir de poix assez brillant; couvertes de squamules piliformes d'un jaune doré, brillantes, et disposées par taches nombreuses, plus ou moins confluentes; marquées de stries obsolètes, formées de points peu profonds, assez grossiers, assez écartés. *Intervalles* assez étroits; légèrement convexes; obsolètement tuberculés ou comme transversalement ondulés.

Dessous du corps assez convexe; d'un noir de poix brillant; garni de squamules piliformes pâles, peu serrées; parcimonieusement et obsolètement ponctué, plus densément, plus fortement et plus rugueusement sur les côtés de la poitrine.

Pieds médiocrement allongés; d'un ferrugineux de poix; garnis d'une pubescence blanchâtre, peu serrée. *Cuisses* mutiques; ponctuées à la base et au sommet, médiocrement renflées après leur milieu, où elles sont presque lisses ou obsolètement ridées en travers. *Tibias* finement chagrinés; parcimonieusement et rugueusement ponctués. *Tarses* courts; plus obscurs que le reste des pieds; garnis en dessous d'une brosse de poils fins et blanchâtres.

PATRIE : Cette belle espèce a été prise en Suisse par notre ami commun, Guillebeau.

Obs. Cette espèce a les dessins de l'*Otiorhynchus chrysocomus*, Germ., dont elle diffère par sa taille plus ramassée, par ses antennes plus courtes, à articles extérieurs du funicule fortement transversaux, et par la sculpture de son prothorax.

♀ . grisescens.

Elongatus, subdepressus, sat densè griseo-pubescens, opacus, niger; antennis fusco-piceis. Fronte foveolatâ. Rostro rugoso, levitèr bisulcato et medio carinulato. Prothorace levitèr transverso, fortitèr pupillatim rugoso granulato, lateribus parim rotundato, medio tenuitèr canaliculato, canaliculâ densiùs griseo-pubescente. Elytris profundè grossèque punctato-striatis; interstitiis angustis, convexiusculis, tuberculatis. Pedibus elongatis; femoribus clavatis, muticis.

Long. 0^m,008 (3 l. 1/2). — Larg. 0^m,003 (1 l. 2/3).

Corps allongé; assez étroit; subdéprimé; d'un noir peu brillant; entièrement couvert de poils fins, couchés, grisâtres, assez serrés.

Tête assez large; transversale; convexe; rugueusement ponctuée, d'un noir peu brillant. *Vertex* dénudé; finement chagriné. *Front* pubescent; déprimé; assez fortement et rugueusement ponctué, creusé sur son milieu d'une petite fossette arrondie, profonde. *Rostre* d'une moitié plus long que la tête; sensiblement divariqué et faiblement échancré au sommet; pubescent; noir; assez fortement et rugueusement ponctué; faiblement bissillonné; finement caréné sur son milieu. *Parties de la bouche* d'un noir de poix. *Yeux* médiocres; sub-orbiculaires; peu saillants; brunâtres.

Antennes insérées vers l'extrémité du rostre; assez longues; pubescentes; d'un brun de poix. *Scape* dépassant le bord antérieur du prothorax; faiblement recourbé en dehors et épaissi vers son extrémité. *Funicule* à peine aussi long que le scape; à premier et deuxième articles, allongés: le deuxième un peu plus long que le précédent: le troisième à peine aussi long que large: les quatrième à septième sensiblement transversaux. *Massue* petite; allongée; acuminée.

Prothorax d'un tiers plus étroit que les élytres dans leur plus grande largeur; un peu moins long que large; tronqué à la base et au sommet; médiocrement arrondi sur les côtés; faiblement convexe; pubescent; d'un noir peu brillant; rugueusement granulé ou tuberculé, avec les grains ou tubercules uniponctués à leur sommet et comme ocellés; marqué sur son milieu d'un sillon longitudinal très-fin, rempli d'une pubescence serrée, grisâtre.

Ecusson très-petit; subtriangulaire; d'un noir assez brillant; rugueux.

Elytres allongées; trois fois et demie plus longues que le prothorax; faiblement et simultanément échancrées à la base;

obliquement coupées aux *épaules* qui sont effacées ; subparallèles vers le milieu de leurs côtés ; assez brusquement rétrécies en arrière, où elles sont obtusément tronquées à leur sommet ; subdéprimées ; d'un noir peu brillant, et couvertes d'une pubescence grisâtre, assez serrée, courte et couchée ; présentant en outre des stries de gros points enfoncés, peu serrés et peu profonds. *Intervalles* étroits ; légèrement convexes ; tuberculés et comme transversalement ondulés.

Dessous du corps pubescent ; noir ; rugueusement et fortement ponctué. *Métasternum* concave. Premier, deuxième et troisième segments ventraux, ridés à leur partie postérieure : le premier beaucoup plus fortement.

Pieds allongés ; noirs ; rugueux ; garnis d'une pubescence grisâtre, devenant plus serrée et fauve vers l'extrémité des tibias. *Cuisses* mutiques ; assez fortement renflées après leur milieu. *Tibias* recourbés en dedans en angle aigu à leur sommet. *Tarses* courts ; assez larges ; garnis en dessous d'une brosse serrée de poils blanchâtres.

PATRIE : Pyrénées (feu M. Decazes).

Obs. Cette espèce ressemble un peu à l'*Otiorhynchus nubilus*, Escher. Elle s'en distingue aisément par ses cuisses mutiques, et par sa forme beaucoup plus allongée, qui lui donne le faciès de l'*Otiorhynchus longiventris*, Küst.

Magdalinus punctulatus.

Subelongatus, convexiusculus, opacus, niger, supra glaber, infra griseo-pubescentis, pectoris lateribus albido pollinosis ; antennis piceis, basi dilutioribus. Rostro modico, cylindrico, arcuato, punctulato ; fronte impressâ. Prothorace subdepresso, densè rugoso punctato, anticè levitè constricto, medio lineâ nitidâ anteriùs abbreviatâ. Elytris punctato-striatis ; interstitiis latiusculis, levitè convexis, crebrè rugoso-punctatis. Pedibus brevibus ; femoribus subclavatis, subtùs acutè unidenticulatis ; tarsis elongatis.

Long. 0^m,004 à 0^m,0045 (1 l. 3/4 à 2 l.). — Larg. 0^m,0017 à 0^m,002 (2/3 à 3/4 l.).

♂ *Rostre* un peu plus court que le prothorax ; médiocre-

ment arqué ; peu brillant et assez densément ponctué jusqu'à son sommet.

♀ *Rostre* de la longueur du prothorax ; assez fortement arqué ; brillant ; assez fortement ponctué à sa base, un peu plus légèrement et moins densément vers le sommet.

Corps allongé ; assez convexe sur les élytres ; d'un noir mat.

Tête transversale ; opaque ; noire ; postérieurement convexe ; légèrement ponctué, avec la partie située derrière les yeux assez brillante, obsolètement chagrinée, presque lisse.

Front très-étroit ; longitudinalement et assez fortement impressionné. *Rostre* un peu plus court (♂) ou aussi long (♀) que le prothorax sans la tête ; cylindrique ; ponctué ; arqué ; noir ; très-faiblement étranglé avant l'insertion des antennes.

Parties de la bouche d'un roux de poix. *Yeux* très-grands, peu convexes, en ovale court et irrégulier ; d'un brun livide, avec des reflets grisâtres et micacés.

Antennes assez courtes, atteignant le milieu du prothorax ; pubescentes ; d'un brun de poix, avec le *scape* souvent ferrugineux : celui-ci assez grêle, arqué avant son extrémité et légèrement renflé en massue à son sommet : les premier et deuxième articles du *funicule* assez allongés, obconiques : le premier beaucoup plus épais que le suivant : les troisième à septième courts, moniliformes, subégaux. *Massue* assez grande, égalant les trois quarts de la longueur du *funicule* ; oblongue, elliptique, acuminée, à articles subégaux ; garnie d'une pubescence fine, courte et serrée, d'un gris fauve.

Prothorax un peu plus étroit que les élytres ; à peu près aussi long que large ; tronqué en devant, assez fortement bisiné à la base ; légèrement resserré avant le sommet ; sensiblement arrondi sur les côtés ; à angles postérieurs faiblement réfléchis et aigus ; subdéprimé sur le dos ; rugueusement et densément ponctué ; d'un noir mat, avec une ligne longitudinale lisse, raccourcie en avant, enfoncée en arrière où elle se termine, au devant de l'écusson, par une impression assez forte.

Écusson oblong; noir; plus ou moins obsolètement rugueux, quelquefois presque lisse et brillant.

Elytres plus de deux fois et demie plus longues que le prothorax; faiblement élargies après leur milieu; largement et obtusément arrondies au sommet; légèrement convexes, d'un noir profond peu brillant; avec une faible dépression longitudinale sur chacune derrière l'écusson près de la suture, ce qui fait paraître celle-ci relevée à sa base; marquées de stries de points oblongs, assez forts, dont les *intervalles*, très-légèrement convexes et assez larges, sont densément et rugueusement ponctués: la strie suturale est plus profonde et comme enfoncée vers la base. Les *épaules* sont arrondies, peu saillantes.

Dessous du corps assez convexe; assez grossièrement ponctué; d'un noir assez brillant; garni d'une pubescence rare et cendrée, qui se change en une poussière blanchâtre et grossière sur le prosternum, le mésosternum et les épisternum.

Pieds courts; rugueux; noirs; garnis d'une pubescence grisâtre peu serrée, assez longue. *Cuisses* légèrement renflées après leur milieu, où elles sont munies en dessous d'une dent aiguë. *Tibias* solides, assez épais; denticulés à leur arête interne; armés en dedans à leur angle apical d'un crochet ferrugineux assez fort. *Tarses* assez allongés, garnis en dessous d'une brosse de poils blanchâtres.

PATRIE : Suisse, montagnes du Beaujolais.

Obs. Cette espèce a tout à fait le faciès du *Magdalinus duplicatus*, Germ., et l'on croirait de prime abord qu'elle en est une variété noire. Elle s'en distingue cependant par des caractères notables: le front beaucoup plus profondément impressionné, les tibias plus épais, le dessous du corps plus fortement ponctué, les intervalles des stries densément et rugueusement ponctués. Ce dernier caractère, surtout, empêchera toujours de confondre cette espèce avec celles qui peuvent lui ressembler sous d'autres rapports.

Erirhinus incanus.

Oblongus, convexiusculus, parùm nitidus, testaceus, densè albido piloso-squamulosus; capite, prothoracis disco plagisque mediis elytrorum magis denudatis; rostro antennisque rufo-testaceis, pedibus pallidè testaceis, metasterno obscuro. Rostro tenui, longissimo, modicè arcuato, nudo, nitido, lateribus basi substriato. Fronte carinulatâ. Capite prothoraceque crebrè rugoso-punctatis; hoc subdepresso, lateribus posticè parùm ampliato. Elytris punctato-striatis, interstiis rugulosis, planis, nono postice subcarinato. Antennis gracilibus. Pedibus modicis, femoribus subclavatis, subtus fortitè unidentatis.

Long. 0^m,0055 (2 l. 1/4). — Larg. 0^m,0025 (1 l.).

Corps oblong; légèrement convexe; peu brillant; testacé; densément couvert de squamules piliformes blanches, qui lui donnent un aspect farineux, avec la tête, le disque du prothorax et une large tache triangulaire obsolète sur les côtés et au milieu des élytres, plus dénudés et un peu roussâtres.

Tête transversale; convexe; assez densément et rugueusement ponctuée; d'un testacé roussâtre; couverte de squamules piliformes peu serrées, d'un blanc un peu fauve. *Front* étroit; subdéprimé; rugueusement ponctué; marqué sur son milieu d'une carène obsolète, qui se prolonge, en s'effaçant, sur la base du *rostre*. Celui-ci grêle, cylindrique, presque aussi long que la moitié du corps; assez sensiblement arqué; d'un roux-testacé, brillant, nu ou seulement avec quelques rares squamules à la base; substrié-ponctué sur les côtés jusqu'à l'insertion des antennes, presque lisse ou très-obsolètement ponctué sur le reste de sa longueur. *Parties de la bouche* couleur de poix; ciliées de poils blancs, brillants. *Yeux* assez grands; subarrondis; déprimés; brunâtres.

Antennes grêles; atteignant la base du prothorax; insérées un peu avant les deux tiers du rostre; ciliées de poils blancs et brillants. *Scape* très-grêle; atteignant les yeux; plus long à lui seul que le reste des antennes, faiblement arqué et mé-

diocrement renflé en massue à son sommet : les premier et deuxième articles du *funicule* très-allongés, un peu plus longs, pris ensemble, que le reste du funicule : le deuxième d'un tiers moins long que le premier; le troisième oblong; les quatrième à sixième obconiques, un peu plus longs que larges; le septième transversal. *Massue* petite; pubescente; ovulaire, subacuminée.

Prothorax légèrement transversal; d'un quart plus étroit que les élytres; subsinué au milieu de son bord antérieur, subbissinué à sa base; près d'une moitié plus étroit en avant qu'en arrière; légèrement resserrée avant son sommet; légèrement arrondi postérieurement sur les côtés; subdéprimé, impressionné au devant de l'écusson; rugueusement ponctué; d'un testacé roussâtre; garni de squamules piliformes blondes et peu serrées sur le disque, blanches et très-serrées sur les côtés.

Ecusson assez petit; subarrondi; rugueux; d'un testacé roussâtre; garni de squamules piliformes blanches.

Elytres trois fois et demie plus longues que le prothorax; simultanément échancrées au milieu de leur base; subparallèles ou bien très-faiblement élargies au deux tiers de leur longueur; largement et simultanément arrondies au sommet, mais brièvement déhiscents à l'angle sutural; légèrement convexes; d'un testacé un peu roussâtre; couvertes de squamules piliformes, longitudinalement ou obliquement couchées, d'un blanc assez vif, assez serrées, et qui leur donne une apparence farineuse; avec une grande tache triangulaire obsolète, située vers le milieu sur les côtés, plus dénudée, composée de squamules plus courtes et blondes : ces taches, par leur ensemble, forment comme une large bande transversale, peu sentie et largement interrompue à la suture; marquées de stries assez légères de points enfoncés, ornés chacun d'une squamule oblongue : ces stries deviennent postérieurement comme indistinctes, par l'effet de la pubescence squamuliforme qui les cache. *Intervalles* plans;

rugueux : le cinquième, muni à son extrémité d'un tubercule ou calus peu prononcé; le neuvième, sensiblement convexe, subcaréné, depuis un peu avant le milieu jusqu'un peu avant l'extrémité. Les *épaules* sont arrondies, peu saillantes.

Dessous du corps faiblement convexe; rugueusement ponctué, densément couvert de poils squamuliformes blanchâtres, plus longs que ceux du dessus du corps; assez brillant; testacé, avec le métasternum obscur.

Pieds médiocres; rugueusement ponctués; d'un testacé pâle; garnis d'une pubescence blanchâtre. *Cuisses* médiocrement renflées dans leur milieu; munies d'une dent aiguë: les antérieures un peu plus longues que les autres. *Tarses* assez courts; d'un testacé un peu roussâtre; garnis en dessous d'une brosse de poils blanchâtres.

PATRIE : Avignon, Aubagne. Mai, juin. Sur le peuplier blanc.

Obs. Cette espèce est intermédiaire entre l'*Erirhinus tortrix*, Lin., et l'*Erirhinus filirostris*, Sch. Elle diffère de tous deux par sa couleur farineuse; du premier, par son rostre beaucoup plus long et plus grêle et par ses antennes à funicule composé d'articles beaucoup plus allongés: du second, par sa forme un peu plus épaisse, par ses élytres un peu plus convexes, et par son rostre plus sensiblement arqué.

Bagous minutus.

Subelongatus, parum convexus, piceo-niger, densè cinereo-squamosus, crebrè tenuitèr granulatus; tibiis, tarsis antennisque testaceis; his clava nigra, apice griseo-tomentosa; femoribus infuscatis. Rostro valido, arcuato; prothorace levitèr transverso, modice lateribus ampliato, anticè constricto, dorso subœquali. Elytris profundius sulcato-striatis, striis impunctatis; interstitiis latiusculis, subconvexis, quinto apice calloso. Antennis brevibus; pedibus subelongatis; tarsis gracilibus.

Long. 0^m,0027 (1 l.). — Larg. 0^m,001 (1/3 l.).

Corps suballongé, oblong; peu convexe; finement granulé; densément couvert de squamules grisâtres.

Tête très-peu saillante, fortement engagée dans le prothorax; finement granuleuse, et entièrement recouverte de squamules grisâtres. *Vertex* faiblement convexe. *Front* plan et large. *Rostre* épais; à peu près de la longueur du prothorax; sensiblement arqué; très-faiblement élargi au sommet; mat, obsolètement granulé et couvert de squamules grisâtres depuis sa base jusque près de l'insertion des antennes; obsolètement ponctué et d'un noir de poix assez brillant à partir de celle-ci, avec l'extrémité ainsi que les *parties de la bouche* d'un brun ferrugineux. *Yeux* grands; subovales; très-peu saillants, noirs.

Antennes insérées peu après le milieu du rostre; très-courtes, dépassant un peu le bord antérieur du prothorax; brillantes; presque glabres, ou avec quelques rares poils à l'extrémité du funicule; testacées, avec la massue d'un noir très-brillant, lisse jusqu'aux deux tiers, garnie d'une pubescence tomenteuse et grisâtre dans le reste de sa longueur. *Scape* atteignant à peine les yeux; assez solide; faiblement renflé en massue à sa partie supérieure: le premier article du *funicule* assez court et renflé: le deuxième beaucoup plus grêle et allongé; les troisième à septième courts, transversaux, très-serrés. *Massue* oblongue, acuminée.

Prothorax transversal, un peu moins long que large; d'un tiers environ plus étroit que les élytres; tronqué à la base, largement échancré au sommet, avec les lobes latéraux arrondis, s'avancant sur les yeux; faiblement convexe; à peine plus étroit en avant qu'en arrière; assez sensiblement étranglé, surtout sur les côtés, avant son extrémité; assez fortement arrondi sur les côtés avant le milieu; finement granulé et densément couvert de squamules grisâtres.

Ecusson petit; subarrondi; rugueux; grisâtre.

Elytres deux fois et demie plus longues que le prothorax, faiblement et simultanément échancrées à la base; subparallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, puis rétrécies en pointe arrondie au sommet; très-faiblement convexes; den-

sement couvertes de squamules grisâtres ; assez fortement striées-caniculées, avec le fond des stries paraissant im-ponctué. Les *intervalles* sont assez larges, légèrement convexes, chargés d'une granulation fine et serrée, aplatie et et comme ocellée ; ils sont parés en outre chacun d'une série de soies brillantes, pâles, très-courtes, à peine visibles, ou seulement à un certain jour : le cinquième à partir de la suture terminé par un calus oblong, assez sensible. *Epaules* peu saillantes, largement arrondies.

Dessous du corps légèrement convexe ; finement granulé ; densément couvert de squamules grisâtres.

Pieds assez allongés. *Cuisses* légèrement renflées après leur milieu ; chargées d'une granulation très-aplatie, ocellée ; d'un testacé obscur encore plus rembruni vers le sommet ; offrant en dessous quelques poils rares et brillants. *Tibias* recourbés en dedans à leur extrémité ; flexueux à leur arête interne, où ils sont munis, à l'angle apical, d'un crochet assez développé ; testacés, et ciliés en dessous de quelques longs poils blanchâtres et brillants. *Tarses* grêles, étroits ; ciliés ; testacés, égalant au moins les deux tiers de la longueur des tibias.

PATRIE : Aiguemortes, Hyères. Printemps.

Obs. Cette espèce est voisine du *Bagoüs biimpressus*, Sch. ; mais elle est plus petite, son prothorax est plus égal, et les stries des élytres sont imponctuées.

Centhorhynchus mixtus.

Brevitèr ovatus, subdepressus, opacus, nigro-piceus, suprâ squamulis fulvis albidisque mixtus, infrâ griseo-albido squamosus ; antennis piceis ; tarsis testaceis. Rostrò elongato, arcuato, rugoso-punctato, nudo, apice lævigato. Capite prothoraceque crebrè rugoso-punctatis ; hoc transverso, bituberculato, apice angustiore et constricto, antè scutellum profundè impresso. Elytris subquadratis, tenuitèr striato-punctatis ; interstitiis planis rugoso-punctatis. Antennis gracilibus, clavâ elongatâ. Pedibus subelongatis ; femoribus levissimè incrassatis, anticis obtusè, posticis acutè dentatis.

Long. 0^m,0026 (1 l.). — Larg. 0^m,0017 (2/3 l.).

Corps en ovale court; subdéprimé; d'un noir de poix; rugueusement ponctué; couvert en dessous de squamules blanchâtres, en dessus de squamules fauves mélangées de squamules blanches.

Tête transversale; subdéprimée; densément et rugueusement ponctué; garnie de squamules fauves, blanchissantes sur les côtés et sur le *front*. Celui-ci déprimé. *Rostre* presque de la longueur de la tête et du prothorax réunis; nu ou avec quelques rares squamules à la base; d'un noir mat et rugueusement ponctué jusqu'à l'insertion des antennes, presque tout à fait lisse et brillant après celle-ci. *Parties de la bouche* d'une couleur de poix ferrugineuse. *Yeux* grands; ovalaires; légèrement convexes, noirs.

Antennes grêles; dépassant le milieu du prothorax; insérées après les deux tiers du rostre; pubescentes; couleur de poix, avec l'extrémité du scape et la massue un peu plus claires. *Scape* grêle, légèrement renflé en massue à son sommet: premier article du *funicule* allongé, obconique, assez épais: le deuxième beaucoup plus grêle, allongé: le troisième oblong, obconique: les quatrième à septième à peine plus longs que larges: la *massue* grande, très-allongée, acuminée, densément pubescente, aussi longue que les cinq articles précédents réunis.

Prothorax transversal, d'un tiers plus court que large; près d'un tiers plus étroit que les élytres à sa base; largement échancré au sommet; coupé un peu obliquement à la base; d'une moitié plus étroit en avant qu'en arrière; sensiblement étranglé avant son bord antérieur qui est passablement relevé, subdéprimé, densément et rugueusement ponctué; muni de chaque côté après le milieu d'un tubercule peu aigu, mais assez saillant; marqué à la base au-devant de l'écusson d'une impression punctiforme profonde, envahissant l'écusson lui-même et s'étendant en avant un peu en mourant sur le dis-

que ; garni en outre de squamules piliformes, longitudinalement ou obliquement couchées, d'un fauve obscur, entremêlées ; surtout en arrière et sur les côtés, de squamules blanchâtres.

Ecusson enfoncé, invisible.

Elytres deux fois et quart plus longues que le prothorax ; formant ensemble un carré arrondi aux angles et un peu plus étroit en arrière ; un peu obliquement coupées à la base ; obtusément et individuellement arrondies au sommet ; très-faiblement convexes ; d'un noir de poix peu brillant ; assez finement striées-punctuées. Les *intervalles* sont assez larges, plans, rugueux, parés chacun de trois séries de squamules piliformes fauves, entremêlées, surtout à la base, sur les côtés et en arrière, de squamules plus grossières, triangulaires, blanchâtres. Ces dernières, un peu plus condensées autour de l'écusson, y forment une espèce de tache oblongue, irrégulière, peu apparente. *Epaules* assez saillantes.

Dessous du corps assez convexe ; assez fortement ponctué ; assez densément couvert de squamules triangulaires, blanchâtres sur les côtés du prothorax et de la poitrine, un peu blondes sur le milieu de la poitrine et sur le ventre.

Pieds assez allongés ; garnis de squamules piliformes blanchâtres ; obscurs, avec les tarses testacés et les ongles noirs. *Cuisses* légèrement renflées après leur milieu : les antérieures obsolètement, les intermédiaires et les postérieures assez fortement et aigument unidentées en dessous. *Tibias* assez solides ; d'un ferrugineux de poix à leur sommet, où ils sont comme brûlés et garnis de poils fins et d'un roux obscur. *Tarses* allongés ; portant en dessous une brosse serrée de poils blanchâtres ; à pénultième article très-large et fortement bilobé.

PATRIE : Hyères. Mars.

Obs. Cette espèce se rapproche un peu du *Centhorrhynchus grypus*, Hbst. (*quercicola*, F.) ; mais elle s'en éloigne par sa forme beaucoup plus large et plus déprimée, et par la couleur des tarses.

Gymnetron sinus.

Oblongo-ovatus, subdepressus, parùm nitidus, longiùs fusco fulvoque pilosellus, niger; antennis (clavâ exceptâ fuscâ), femorum apice, tibiis, tarsis, elytrisque rufo-testaceis; his suturâ faciisque duabus transversis nigris, extius abbreviatis. Rostro crasso, brevi, ruguloso, apice attenuato. Capite prothoraceque grossè punctatis; hoc brevi, transverso, lateribus rotundato, albido-villoso-trilineato. Scutello albido-villoso. Elytris striato-punctatis, vittâ humerali fasciâque posticâ albido-pilosellis; interstitiis planis, seriâtim punctatis. Antennis brevissimis. Pedibus brevibus, griseo-hirtis; femoribus modicè incrassatis, muticis.

Long. 0^m,0015 à 0^m,002 (2/3 à 3/4 l.). — Larg. 0^m,009 à 0^m,0011 (1/3 à 1/2 l.).

Var. A. Elytres d'un rouge testacé avec la suture (moins l'extrémité) et une tache discoïdale noires.

Var. B. Cuisses entièrement d'un rouge testacé.

Var. C. Toute la partie postérieure des élytres hérissée de longs poils blanchâtres.

♂ *Rostre à peine aussi long que la tête. Pygidium vertical. Ventre très-convexe.*

♀ *Rostre un peu plus long que la tête. Pygidium un peu oblique. Ventre faiblement convexe.*

Corps ovale oblong; subdéprimé; peu brillant; hérissé de longs poils plus ou moins redressés.

Tête légèrement transversale; assez saillante; faiblement convexe; noire; couverte d'une ponctuation assez grossière, mais peu serrée; hérissée de longs poils redressés, d'un fauve obscur. Front plan; obsolètement sillonné sur son milieu. Rostre épais; très-court; atténué au sommet; déprimé à la base dans sa partie médiane; ruguleux sur les côtés; d'un noir assez brillant au sommet; hérissé de quelques longs poils d'un fauve obscur. Parties de la bouche d'une couleur de poix plus ou moins ferrugineuse. Yeux grands; ovalaires; peu saillants; noirs.

Antennes très-courtes, dépassant à peine le bord antérieur

du prothorax ; insérées près de l'extrémité du rostre ; piloselées ; d'un roux-testacé, avec la massue obscure, pubescente. *Scape* court ; en forme de massue : le premier article du *funicule* épais, globuleux : le deuxième beaucoup plus grêle, obconique : les troisième et quatrième petits, transversaux : le cinquième plus large, très-fortement transversal, lenticulaire : *massue* grande, ovale-oblongue, obtuse.

Prothorax transversal, d'un tiers moins long que large ; d'un tiers plus étroit que les élytres ; près d'une moitié plus étroit en avant qu'en arrière ; tronqué au sommet, obtusément arrondi à la base ; légèrement convexe ; d'un noir de poix ; couvert de points grossiers, circulaires et peu serrés ; garni de longs poils redressés d'un fauve obscur ; paré en outre de trois bandes longitudinales, composées de longs poils d'un blanc vif : une de chaque côté, une au milieu : celle-ci plus large en arrière.

Ecusson subarrondi ; assez grand ; garni de poils blancs et couchés.

Elytres près de trois fois plus longues que le prothorax ; très-faiblement et simultanément échancrées à la base ; fortement et simultanément arrondies au sommet ; subparallèles ou très-légèrement arrondies sur les côtés ; subdéprimées ; d'un rouge testacé, avec la suture (moins l'extrémité) et deux bandes transversales noires, légèrement obliques et n'atteignant point les côtés : la première vers le milieu : la deuxième un peu avant le sommet ; hérissées de longs poils fauves, redressés, et parées en outre d'une bande subhumérale et d'une bande transversale composées de longs poils d'un blanc vif, en partie couchés : la dernière située sur la partie rouge entre la première et la deuxième bande noire ; garnies sur leurs bords de longs poils grisâtres et redressés, plus serrés et divergeant à l'angle sutural ; rayées de stries peu profondes et ponctuées. *Intervalles* assez étroits ; plans ; absolument ridés en travers, et offrant chacun une série de points enfoncés et rugueux. *Épaulés* assez saillantes.

Dessous du corps assez convexe; d'un noir brillant; grossièrement ponctué; garni de poils peu serrés et grisâtres. *Pygidium* rugueusement ponctué; noir.

Pieds courts. Cuisses médiocrement renflées dans leur milieu, mutiques; obsolètement ridées en travers; hérissées de soies blanchâtres; d'un noir de poix assez brillant, avec le sommet ferrugineux. *Tibias* assez solides, obsolètement rugueux; d'un rouge testacé; hérissés, surtout en dehors, de longues soies blanchâtres. *Tarses* assez courts; d'un rouge testacé, avec les ongles obscurs.

PATRIE : Marseille, Avignon, Hyères. Mars, Avril, Mai. Sous les pierres et dans les trous des vieilles murailles, en compagnie de *fourmis* et de la *Tagenia minuta*.

Obs. Cette espèce intéressante qu'on prendrait volontiers, au premier abord, pour le *Gymnætron labilis*, Hbst., s'en distingue essentiellement par la longueur des poils dont le corps est hérissé, par la brièveté de son rostre visiblement atténué au sommet, et par les bandes noires des élytres moins obliques.

Rhyncolus flum.

Filiformis, subcylindricus, subdepressus, nitidus, glaber, nigro-piceus, pedibus antennisque rufo-ferrugineis: his clavâ dilutiore. Rostro brevi, crassissimo, attenuato, punctulato. Prothorace elongato, fortitèr grossè punctato. Elytris parallelis, fortitèr sulcato-subcrenato-punctatis; interstitiis angustis, convexis, seriatim parèè punctulatis. Antennis pedibusque brevibus; femoribus medio valdè incrassatis, compressis. Tarsis tenuibus.

Long. 0^m,0035 (1 1/3 l.). — Larg. 0^m,0007 (1/4 l.).

Corps subcylindrique, filiforme, très-étroit; glabre; grossièrement ponctué; d'un noir de poix brillant.

Tête très-courte, fortement transversale; fortement engagée dans le prothorax; à peine plus étroite que lui; très-convexe; d'un noir de poix brillant; parcimonieusement ponctué sur le vertex, plus densément sur le *front*. Celui-ci

très-large, convexe. *Rostre* court, épais ; aussi large que la tête à la base, atténué vers l'extrémité ; convexe en dessus et ne paraissant faire qu'un avec la tête ; d'un noir de poix brillant ; assez densément ponctué ; très-faiblement et largement subéchancré à son sommet ; cilié à son bord apical de quelques soies blondes assez longues. *Parties de la bouche* d'une couleur de poix ferrugineuse, avec les mandibules un peu plus obscures : celles-ci assez saillantes. *Yeux* obovales ; médiocres ; déprimés ; noirs.

Antennes très-courtes, dépassant un peu le bord antérieur du prothorax ; insérées vers le milieu du rostre ; d'un roux ferrugineux, avec la massue d'un testacé pâle. *Scape* assez solide, sensiblement renflé en massue à son sommet. *Funicule* pas plus long que le scape ; cilié de quelques poils blonds : à premier article obconique, assez grand : les autres courts, fortement transversaux, très-serrés : *massue* pubescente : brièvement ovalaire, subacuminée.

Prothorax allongé, subcylindrique ; près d'une moitié plus long que large ; presque aussi large que les élytres ; tronqué à la base et au sommet ; faiblement étranglé avant celui-ci sur les côtés ; très-légèrement élargi et arrondi en arrière au-devant des angles postérieurs ; muni à sa base d'un rebord très-fin qui forme aux angles postérieurs mêmes une espèce de petit bourrelet arrondi ; longitudinalement subdéprimé à sa partie médiane ; d'un noir de poix brillant, avec le bord apical un peu roussâtre et translucide ; couvert d'une ponctuation très-grossière, très-forte, peu serrée, beaucoup plus fine et plus serrée au-devant de l'étranglement.

Ecusson petit ; transversal ; lisse ; d'un noir de poix brillant.

Elytres deux fois plus longues que le prothorax ; tronquées à la base ; largement et simultanément arrondies au sommet ; subcylindriques ; longitudinalement subdéprimées à la région suturale ; à côtés subparallèles jusqu'aux $\frac{5}{6}$ de leur longueur ; d'un noir de poix brillant, avec la partie réfléchie

roussâtre, translucide; creusées de stries grossièrement ponctuées-subcrénelées, assez faibles en avant, mais postérieurement très-profondes. *Intervalles* étroits; assez convexes; lisses, et parés chacun d'une série de petits points enfoncés, écartés. *Suture* tout à fait déprimée à sa base derrière l'écusson, assez élevée dans le reste de son étendue. *Epaules* peu saillantes; d'une couleur de poix, quelquefois un peu ferrugineuse.

Dessous du corps assez convexe; d'un noir de poix brillant; grossièrement ponctué.

Pieds courts; d'un roux-ferrugineux brillant. *Cuisses* fortement dilatées, latéralement comprimées. *Tibias* solides; munis à l'angle externe d'un assez fort crochet recourbé en dedans: les intermédiaires et les postérieurs s'élargissant en triangle à l'extrémité: les antérieurs, plus longs et moins larges, légèrement sinués ou échancrés vers les deux tiers de leur tranche interne, où ils sont ciliés de poils blonds, et offrent une petite dent, située à l'angle interne de leur sommet. *Tarses* étroits; d'un testacé un peu rougeâtre: les intermédiaires et les postérieurs assez grêles, aussi longs que les tibias, leur quatrième article presque aussi long que les trois précédents réunis: les antérieurs moins grêles, plus courts que les tibias.

PATRIE: Hyères. Juin. Parmi les débris végétaux accumulés sur le rivage de la mer.

Obs. Dans cette petite espèce, la ponctuation et les stries sont à peu près celles du *Rhyncolus porcatus*, Germ.; mais l'exiguïté de sa taille, sa forme étroite et parallèle, ne permettent de la confondre avec aucune de ses congénères.