

BULLETIN DES SÉANCES

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Recueilli par M. E. DESMAREST, Secrétaire.

Paraissant deux fois par mois.

Avis. M. le Trésorier (rue Saint-Placide, 52) prie instamment de nouveau ceux de ses collègues qui n'ont pas encore soldé le montant de leur cotisation pour l'année 1875, de vouloir bien en faire le versement le plus promptement possible.

Séance du 27 Octobre 1875.

Présidence de M. EUGÈNE SIMON.

21 membres présents.

Communications. M. L. Buquet fait savoir la mort de l'un de nos collègues M. Jean-Antoine Bianconi, de Bologne, décédé le 21 juillet dernier, qui avait été reçu membre de la Société en 1865.

— M. Desbrochers des Loges envoie les diagnoses de quatre espèces nouvelles de Coléoptères, dont les descriptions *in extenso* paraîtront dans un Supplément à ses Monographies :

(1875, 3^e année.)

1. **RHYNCHITES CRIBRUM.** — Long. 3-3,5 mill. (rostr. excl.). — Cœruleus aut viridescens, pilis erectis brunneis; rostro nigro, nitido; capite triplo longiore, subrecto; prothorace subtransverso posterius paulo ampliato obsolete canaliculato, punctis profundis subconfluentibus; elytris striis profundis, crenato-punctatis, striola juxta scutellari brevi; interstitiis striis angustioribus dense punctatis.

Syrie.

2. **AULETOBIUS BECKERI.** — Long. 3 mill. — Ater, opacus, griseo-pubescent; rostro capite cum thorace breviori, paulatim ad capitem ampliato; fronte convexissima; antennis submediis articulis 3 primis sat elongatis, minus inflatis; prothorace oblongo, latitudine fere longiori; elytris minus crebre subseriatim punctatis.

Derbent.

3. **BALANINUS SYRIACUS.** — Long. 3,5 mill. — Subrhomboïdalis, angustior, niger, opacus, pube brevi grisea variegatus; rostro brunneo, thorace fere duplo longiori, tenue, nitidissimo, in mare basi distinctius punctato, postice arcuato; antennis basi ferrugineis, brevioribus, articulis funiculi ultimis subtransversis; prothorace breviter subconico; elytris tenuiter striatis, interstitiis coriaceis; femoribus acute dentatis.

Syrie.

4. **ANTHONOMUS BAUDUERI.** — Long. 3,5 mill. — *A. spiloti* forma et colore fere similis. Rostro regulariter arcuato; antennis articulis 4-ultimis transversis, clava breviter ovata; elytris infra scutellum impressis, tenuiter minime profunde striatis, interstitiis non convexis; femoribus anticis dente mediocri antice emarginato, cœteris dente parvo, instructis; tibiis intus vix sinuatis.

Syrie.

— M. René Vallette écrit que chassant dans la Gâline, près Saint-Maixent, il a pu constater de nouveau un fait entomologique plusieurs fois indiqué et dont la Société s'est occupé récemment. Il a trouvé des fientes de renards qui étaient en grande partie composées de débris de Coléoptères, qui lui ont paru provenir de *Geotrupes* et peut-être aussi de *Copris lunaris*.

M. E. Simon ajoute qu'il a été à même de faire des observations ana-