

# CATALOGUE RAISONNÉ

D E S

## OBJETS DE ZOOLOGIE

RECUEILLIS DANS UN VOYAGE

AU CAUCASE ET JUSQU'AUX FRONTIÈRES ACTUELLES DE LA PERSE

ENTREPRIS PAR ORDRE DE

S. M. L'EMPEREUR.

P A R

*E. MÉNÉTRIES*

CONSERVATEUR DU MUSÉE ZOOLOGIQUE DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG,  
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DES NATURALISTES DE MOSCOU.



*Présenté à l'Académie IMPÉRIALE des sciences de St.-Petersbourg le 1 Février 1832.*

---

ST.-PÉTERSBOURG,

DE L'IMPRIMERIE DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES.

1 8 3 2.

953. *OEDEMERA PODAGRARIAE*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 373, N° 26.

Très commune dans les steppes près de Lenkoran.

954. *OEDEMERA FLAVESCENS*, Linn. Oliv. Gyll. Ins. Suec. II, p. 635.

Moins commune à Lenkoran.

955. *MYCTERUS UMBELLATARUM*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 396, N° 4.

Il est assez commun dans les steppes.

956. *MYCTERUS CURCULIOIDES*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 428, N° 2.

Moins commun que le précédent.

*Curculionites. (\*)*

957. *BRUCHUS HOLOSCEBICEUS*, Schoenherr.

*Ovatus, niger, unicolor, pube tenui cinereo-adspersus; thorace subtriangulari, punctatissimo, obsolete canaliculato; elytris obsolete punctato-striatis, interstitiis rugulosis; femoribus posticis obsoletissime dentatis.*

Il est un peu plus petit que le *Br. pisi*, et surtout plus étroit.

Je l'ai pris à Lenkoran, Mr. Faldermann, l'a reçu de la Perse.

958. *BRUCHUS ASTRAGALI*, Bochn. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou.

Je l'ai trouvé dans la graine de l'*Onobrychis, radiata*.

959.  *ORYNUS PORCELLUS*, Schoenh.

*Grex strophosomus.*

*Oblongo-ovatus, griseo-hirtus, squamulis fuscis et griseis variegatus; antennis rufo-piceis; fronte non canaliculata; thorace profunde punctato, fusco-trilineato; elytris subtiliter punctato-striatis.*

Il est deux fois plus grand que le *Euc. faber*.

Je l'ai trouvé au Caucase.

960.  *ELABUS CURCULIOIDES* Fab. Syst. Eleut. II, p. 420, N° 22.

Il est commun partout.

---

(\*) Mr. Schoenherr, qui a eu la bonté d'examiner cette famille d'insectes de mon voyage, a de plus travaillé lui-même les diagnoses des nouvelles espèces.

461. **ENCHITES GIGANTEUS**, Meg.

*Cupreo-æneus, parce pubescens; capite elongato, rostro longo arcuato; thorace lateribus ampliato; antennis versùs apicem rostri insertis tarsisque nigro-violaceis, æneo-micantibus.*

Il ressemble assez au *Rh. bacchus*, Oliv., mais il est beaucoup plus grand, et se distingue du reste, par les caractères indiqués plus haut.

Je l'ai pris au Caucase, Mr. Besser, l'avait reçu d'Odessa.

962. **ION SANGUINEUM**, Gyll. Insect. Suec. IV, app. p. 543.

Il est très commun dans les fleurs, surtout à Lenkoran.

963. **ION ELEGANTULUM**, Germ. Magaz. der Entom. III, p. 48, No 4.

Il est très commun dans les fleurs à Lenkoran.

964. **ION AENEUM**, Gyll. Insect. Suec. III, p. 40, No 8.

Il est commun partout.

965. **CHLOROPHANUS VITTATUS**, Schoenh.

*Oblongus, niger, in dorso parce cinereo, lateribus et subtùs dense virescenti-squamosus; thorace subconico; elytris punctato-striatis, apice mucronatis, disco singuli vitta dense viridi-squamosa ornato.*

Il est un peu plus long et plus étroit que le *Chl. viridis*, et il se distingue de celui-ci surtout par la bande verdâtre dont il est parlé plus haut.

Il est assez rare au Caucase.

966. **CHLOROPHANUS GRAMINICOLA**, Megerl. *Curcul. pollinosus*, Oliv. *Cur. flavescens*, Herbst.

*Chlorophanus viridis*, var. Dej.

*Oblongo-ovatus, niger, subtùs et lateribus squamositate dense viridi-flavescente tectus, suprà squamis cupreis pilisque depressis ochraceis vestitus; thorace longitudine longiore, sublineari, elytrorum mucronibus longioribus subdehiscens.*

*Var. B. Vitta laterali flavo-virescenti, elytrorum latiore, plusquam dimidiam illarum partem occupante, suturaque etiam flavescens-pollinosa.*

Il ressemble beaucoup au *Chl. viridis*, mais il est toujours un peu

plus grand, autrement coloré; les pointes des élytres sont plus allongées et plus rapprochées.

Il se trouve en assez grande quantité sur les frontières de la Perse.

967.  **YNOCYLLUS LATIROSTRIS**, Schoenh.

*Lixus latirostris*, Latr. *Lixus morosus*, Oliv. *Rhinobatus odontalgicus*. Dej.

*Oblongo-ovatus, niger obscurus, confertissime alutaceus, tomento-flavescente-variegatus; antennis tarsisque piceis; rostro profundius impresso, evidentius interrupte carinato.*

Chez tous les individus que je trouvai, le bec était court, et fortement imprimé, ce qui peut-être n'est qu'une différence du sexe.

Il n'est pas rare à Lenkoran sur les chardons.

 **MALORHINUS**, Schoenh.

*Antennæ mediocres validiusculæ; articuli 1, 2, funiculi longiusculi, subobconici, 3 - 6 breves, subturbinati, 7 paullo crassiore; clava oblongo-ovata, acuminata, distincte articulata. Rostrum breve, capite paullo angustius, deflexum, angulatum, supra planum. Oculi rotundati, valdè prominuli. Thorax basi apiceque truncatus, lateribus æqualiter valdè rotundatus, supra parum convexus. Scutellum distinctum, apice rotundatum, Elytra oblongo-ovata; humeri obtuse-angulati.*

*Descriptio: Corpus oblongo-subovatum, parcius squamosum, obscurum, alatum, mediocris magnitudinis. Antennæ thoracis medium non superantis, in medio rostri insertæ, validiusculæ, fractæ, 12-articulatæ; articulo 1<sup>mo</sup> oculos attingente, clavato, 2°, et 3° longiusculis obconicis, illo sublongiore 4 - 7 subturbinatis æqualibus, 8° paullo crassiore, clavæ adpresso: clava oblongo-ovata, acuminata, articulis quatuor distinctis. Rostrum longitudinale capitis, sub illo paullo angustius, crassum deflexum, angulatum, supra planum; apice ipso triangulariter emarginatum; mandibulæ paullo exsertæ, obtusæ edentulæ, intus concavæ; scrobs profunda, subito deflexa. Oculi laterales, rotundati,*

*valdè prominuli. Thorax longitudine medii vix longior, antice posticeque truncatus, lateribus æqualiter valdè rotundato-amplius, suprà parùm convexus. Scutellum distinctum, apice rotundatum. Elytra oblongo-ovata, basi truncata humeris obtuse angulatis, apice conjunctim rotundata, suprà minùs convexa, versùs apicem haud callosa. Pedes mediocres, validis femoribus versùs apicem incrassatis, muticis; tibiis rectis, apice latioribus, anticis intùs crenulatis; tarsis subtùs parùm spongiosis, articulo penultimo latiore bilobo, ultimo valido, clavato, bi-unguiculato.*

*Ab ὁμαλός, planus, æqualis, et ῥίς, nasus.*

Ce genre par l'*habitus* se rapproche des *Graphorhinus*, mais la forme de son bec et de ses antennes l'en distingue suffisamment, il doit être placé entre le genre *Deracanthus*, Schoenh. et le *Pachyrhynchus*.

968.  **MALORHINUS TRISTIS**, Schoenh.

*Oblongus, niger, opacus, parcius cinereo-albido-squamosus; fronte plana; thorace disperse punctato, lateribus valdè ampliato; elytris obsoletius punctato-striatis, interstitiis planis, confertim alutaceis.*

Il est à peu près de la taille du *Brachyd*, *incanus*, mais un peu plus court, d'un noir mat, et recouvert d'un duvet jaunâtre; le corselet est aussi long que large, et arrondi sur les côtés, couvert de points peu serrés; les élytres sont, à leur base, plus larges que le corselet, de forme presque rectangulaire, et se retrécissant vers l'extrémité; le corps est noir en dessous, ponctué et légèrement pubescent.

Je l'ai pris au Caucase.

969.  **SOMUS OVULUM**, Ill. Germar. Insect. Spec. I, p. 459. N<sup>o</sup> 602.

Il est commun partout.

970.  **SQMUS PILIFERUS**, Schoenh.

*Oblongus, niger, squamulis cinereo-argenteis tectus, pilis erectis fuscis adpersus; antennis flavescens; elytris subtiliter punctato-striatis; femoribus valide dentatis.*

Il est de la taille de l'*Eus. ovulum*, avec lequel il ressemble, si ce n'est que la couleur du duvet qui le recouvre, et la forte dentelure des cuisses qui l'en distingue.

Je le pris sur les montagnes de Talyche.

971.  **BOMUS PILOSUS**, Schoenh.

*Oblongus, niger, squamulis dilute virescentibus, pilisque fuscis adpersus; antennis rufo-testaceis; thorace punctulato, lateribus majis rotundato, ampliato supra obsolete carinato; elytris parum convexis, obsolete punctato-striatis; femoribus valide acute dentatis.*

Il ressemble beaucoup à l'*Eus. piliferus*, mais le corselet est un peu renflé de chaque côté, les élytres sont plus étroites, et ont des lignes de points peu serrés, mais assez fortement imprimés.

Il paraît rare au Caucase.

972.  **IONA INOPS**, Schoenh.

*Oblongus, niger, super fusco subtus cinereo-argenteo-squamosus; thorace breviori, medio latiori, antice vix reflexo, supra subtiliter punctato, albido-trilineato; antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis.*

Elle est de la taille de la *Sitona lineata* avec la quelle elle ressemble, et ne s'en distingue que par les caractères indiqués plus haut.

Je l'ai prise au Caucase.

973.  **LEONUS FIRMUS**, Schoenh.

*Oblongo-ovatus, niger, subtus dense supra inæqualiter cinereo-albidotomentosus; rostro sulcato; thorace parce tuberculato, villis subtribus albidis notato; elytris obsolete punctato-striatis, interstitiis confertim tuberculatis; ventre tuberculis numerosis glabris atris asperso.*

Il est le plus grand du genre, et se rapproche un peu du *Cl. perlatus*, mais il est du double plus grand, les tubercules du corselet sont beaucoup moins serrés que ceux des élytres.

Je l'ai trouvé sur les montagnes du Caucase.

974.  **LEONUS SULCIROSTRIS**, Fab. Syst. Eleut. II, p. 515, N° 51.

Il est commun dans les steppes au pied du Caucase.

975.  **LEONUS SCUTELLATUS**, Schoenh. Bohemann.

*Cleonis quadri-carinata*, Meg. Dej.

*Oblongo-ovatus, latior, niger, tenuiter cinereo-tomentosus; elytris fortius rugoso-tuberculatis, obsoletissime oblique fasciatis; rostro sulcis tribus æqualibus exarato.*

Il ressemble un peu au *Cl. sulcirostris*, mais il est du double plus grand, et surtout plus large; les élytres sont fortement rugueuses, et les bandes obliques qui les recouvrent sont peu prononcées.

Il n'est pas rare à Lenkoran.

976.  **LEONUS RORIDUS**, Fab. Syst. Eleut. II, p. 514, N° 47.

Je pris également à Lenkoran plusieurs jolies variétés de cette espèce.

977.  **OPHLOEUS NUBICULOSUS**, Schoenh.

*Ovatus, niger, squamulis cinereo-albidis vestitus; thorace brevi, postice latiore, antice non impresso; elytris subtiliter sub-remotè punctato-striatis, in striis obsoletè fusco-maculatis; femoribus acute dentatis.*

Il est un peu plus petit et plus court que le *L. nubilus*, mais c'est surtout la forme du corselet qui l'en distingue.

Je l'ai trouvé sur les frontières de la Perse.

978.  **ETHYNODERES STRABUS**, Schoenh. Curcul. meth. dispos. p. 147.

Il n'est pas rare au Caucase.

979.  **ETHYNODERES HALOPHILUS**, Gebl.

*Oblongus, niger, albo-squamosus; rostro longo, recto, carinato; thorace obsoletè rugoso, basi fovea oblonga, profundè impresso; elytris apice singulatim subacuminatis, macula media nigra.*

Il est de la taille du *Both. punctiventris*, Germ., avec lequel il a quelque ressemblance.

Je l'ai pris sur les Alpes du Caucase.

980.  **THYNODORUS VIRGATUS**, Schoenh.

*Oblongo-ovatus, niger, albo-variegatus; rostro leviter carinato; thorace vittis quinque albis ornato, lateribus arcuatis; elytris inæqualiter punctato-striatis, confertim albo-variegatis.*

Il a à peu près la forme du *Cleonus marmoratus*, mais il est du double plus grand.

Je l'ai pris au Caucase.

981.  **THYNODORUS MARMORATUS**, Fab. Syst. Eleut, II, p. 515, N° 50.

Il se trouve au Caucase.

982.  **THYNODORUS ALBIDUS**, Fab. Syst. Eleut. II, p. 517, No 59.

Il n'est pas commun au Caucase.

983.  **XYLOBIUS CONTEMPTUS**, Schoenh.

*Polydrusus contemptus*, Dej. Cat. p. 93.

*Oblongus, niger, pilosus, squamulis piliformibus cinereis, virescenti-submicantibus vestitus; antennis pedibusque ferrugineis; thorace ruguloso; elytris sublinearibus, punctato-striatis, apice acuminatis.*

*Var. B. antennarum scapo apice, clava basi femoribusque fusco-piceis.*

Il n'est pas commun au Caucase.

984.  **XYLIAS GLOMULUS**, Schoenh.

*Breviter ovatus, niger, squamulis non nullis, viridi-argenteis adpersus; antennis rufo-testaceis; capite profunde punctato; rostro apice impresso; thorace brevissimo; elytris globosis, atro-cyaneis, profunde punctato-striatis; femoribus posticis acute dentatis.*

Il ressemble assez à l'*O. glomeratus*, dont il a la taille, mais les impressions de l'extrémité du bec, la dent des cuisses postérieures, et la couleur des antennes, l'en distingue suffisamment.

Il se trouve au Caucase

985.  **XYLIAS DUPLICATUS**, Schoenh.

*Oblongo-ovatus, niger, subnitidus; antennis pedibusque ferrugineis; thorace*

*confertim sat profunde punctato, dorso antico subcarinato; elytris profunde simpliciter striatis, interstitiis planis, dispersè punctatis.*

Il est de la taille du *Baridium nitens*, avec lequel il ressemble, cependant il est un peu plus long, le corselet est plus profondément ponctué, les stries des élytres sont plus fortement marquées, mais les points de la surface sont moins visibles que ceux des intervalles.

Je l'ai trouvé au Caucase.

986.  **ORHYNCHUS, IMPEXUS**, Schoenh.

*Nigro-piceus, parum nitidus, pilis longioribus declinatis cinereis parè adpersus; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; thorace rotundato, profunde punctato; elytris obsolete punctato-striatis, interstitiis undiquè confertim granulatis.*

Il est de la taille du *Pachygaster monticola*, Dej. et ressemble un peu au précédent, mais le corselet est plus profondément ponctué, et non caréné.

Je le pris au Caucase.

987.  **ORHYNCHUS OBCAECATUS**, Schoenh.

*Niger, subnitidus, fexè glaber; rostro rugoso, vix carinato; thorace longiore, confertissime granulato; elytris ovatis, distinctè punctato-striatis, interstitiis obsolete dispersè punctulatis.*

Il ressemble beaucoup à l'*O. maurus*, il est cependant un peu plus petit, le corselet est un peu plus long et moins renflé, enfin les intervalles des stries des élytres sont ponctués.

Il se trouve au Caucase.

988.  **ORHYNCHUS PORICOLLIS**, Schoenh.

*Niger, subnitidus, parè cinereo-tomentosus; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; thorace punctis magnis profundis, confertim intruso; elytris antice sub-serialim punctatis, posteriùs granulatis.*

Il est de la forme de l'*O. monticola*, et lui ressemble beaucoup, mais il est moitié plus petit, et diffère du reste, par la ponctuation du corselet et le dessin des élytres.

Il habite le Caucase.

989.  ORHYNCHUS JUVENILIS, Schoenh.

*Nigro-piceus, parum nitidus, pilis reclinatis cinereis adpersus; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; thorace brevior, confertim punctato; elytris dilutius piceis, punctato-striatis, interstitiis subtiliter granulatis.*

Il est de la forme et de la taille du précédent, mais le corselet est moins profondément ponctué, tandis qu'au contraire les rangées de points des élytres sont plus marquées.

Je le pris avec le précédent.

990.  IOBHYNCHUS MOESTIFICUS, Schoenh.

*Oblongo-ovatus, niger, parum nitidus, parce cinereo-pubescens; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; rostro distincte carinato; thorace pulvinato confertissime tuberculato; elytris obsolete punctato-striatis, interstitiis confertissime granulatis.*

Il a quelque ressemblance avec l'*O. moestus*, mais il est un peu plus grand; le corselet est plus long, plus convexe, et de chaque tubercule part une soie raide.

Se trouve assez rarement au Caucase.

991.  IOBHYNCHUS LIGUSTICI, Fab. Syst. Eleut. II, p. 538, N° 188.

Il est assez commun au Caucase.

992.  IUS FILIFORMIS, Fab. Syst. Eleut. II, p. 501, N° 15.

Il varie beaucoup, surtout par la taille.

Commun à Lenkoran.

993.  IUS CINERASCENS, Schoenh.

*Elongatus, niger subnitidus, tenuissime cinereo-pubescens; antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis; rostro brevi, crasso, obsolete carinato; thorace minus confertim profunde varioloso, utrinque obsolete cinereo-lineato, basi subtiliter canaliculato; elytris elongatis, sat profunde striato-punctatis, apice obtusè rotundatis.*

Je l'ai pris au Caucase, il avait été précédemment trouvé en Crimée.

994.  **INOPS**, Schoenh.

*Oblongus, niger, pube-cinerea, parè adpersus; thorace remotè varioloso, longitudinaliter obsolete canaliculato, basi impresso; elytris a basi ultra medium profundè dein subtiliter punctato-striatis, plaga dentata ponè medium e pube cinerea, condensata ornatis, apice mucronatis, dehiscentibus.*

Il est à peu près de la longueur du *L. paraplecticus*, mais beaucoup plus large; le mâle a le bec épais, et de la longueur de la tête et du corselet réunis, la femelle l'a plus mince et un peu plus long.

Il vit sur les bords de la mer Caspienne.

995.  **MOTACILLA**, Schoenh.

*Oblongus, niger, pube-cinereo-adpersus; rostro crasso, arcuato, basi carinulato; thorace rude rugoso, lateribus et subtilius niveo-squamoso, utrinque oblique impresso; elytris punctato-striatis, ponè scutellum et supra humeros impressis, apice mucronatis, dehiscentibus, versùs apicem plaga magna, dentata, transversa, niveo-squamosa, decoratis.*

Il ressemble beaucoup par la taille et la forme au *L. sita*, Sahlb., mais le bec est courbé et un peu caréné à sa base, et le corselet est plus large, rugueux, et a une impression oblique de chaque côté; sa couleur le distingue également.

Cette jolie espèce se trouve au Caucase.

996.  **STURNUS**, Germ. Insect. Spec. I, p. 384, N° 528. *Rhinobatus fringilla*, Dej. Catal.

Il est commun au Caucase.

997.  **ONOPORDINIS**, Fab. Syst. Eleut. II, p. 440, N° 8.

Je l'ai pris au Caucase.

998.  **MACULOSUS**, Besser.

*Ovatus, niger, tomento-flavescente-variegatus; rostro crasso, basi bisulcato, carina media, antrorsum bifida instructo; thorace rugoso, medio leviter carinato; elytris subtiliter rugulosis, punctato-striatis.*

Il a la forme plus ramassée que celle du *L. onopordinis*, et il est de moitié moins grand.

Je le pris au Caucase.

999.  **BRINUS CARDUI**, Germ. Insect. Spec. I, p. 382. N° 526.

*Lixus cynaræ*, Oliv.

Il est commun au Caucase, sur les chardons.

1000.  **CHIU RUFIROSTRIS**, Schoenh.

*Ovatus, rufo-piceus, squamosi supra pallida, subtus alba tectus; rostro longo, lineari; antennis pedibusque rufo-testaceis, femoribus muticis.*

Il ressemble beaucoup aux *Tych. striatulus*, et *squamulatus*, mais il diffère du premier en ce que son bec est plus long et plus mince, et du second par sa taille plus grande, et par les cuisses antérieures qui sont nues entièrement.

Je le pris au Caucase.

1001.  **BRIDIUS NITENS**, Schoenh. *Calandra nitens*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 436, N° 35. *Rhynchaenus timidus*. Oliv.

Très commun à Lenkoran.

1002.  **BRIDIUS DUPLICATUS**, Schoenh.

*Oblongo-ovatus, niger, subnitidus; antennis pedibusque ferrugineis; thorace confertim sat profunde punctato, dorso antico subcarinato; elytris profunde simpliciter striatis, interstitiis planis, rude minus crebre, dispersè punctatis.*

Il est très voisin du *B. nitens*, cependant il est allongé, les points du corselet sont plus serrés et plus profonds, les stries des élytres, sont à peine ponctuées et au contraire les intervalles le sont distinctement.

Sur les fleurs à Lenkoran.

1003.  **NONYCHUS SALVIAE**, Germ. Ins. Spec. I, p. 241, N, 371.

Je l'ai pris au Caucase.

1004.  **NTORYNCHUS Erysimi**, Gyll. *Rh. Erysimi*, Fab. Syst. Eleut, II, 452. N° 72.

A Lenkoran.

1005.  ONUS THAPSI, Germ. Magaz. der Entom. 4, p. 303, N° 4.

Il est très commun dans les Amaryllis, à Lenkoran.

1006.  HYNCHOPHORUS GRANARIUS, Schoenh., *Calandra granaria*, Fab. Syst. Eleut. II, p. 437, N° 39.

Commun à Lenkoran.

1007.  YNCOLUS SUBMURICATUS, Schoenh.

*Piceus, subnitidus; rostro brevi, latitudine capitis; thorace confertim punctato, lateribus ampliato, intra apicem transversim impresso; elytris punctato-striatis, porteriùs submuricatis.*

Il est plus petit que le *Rh. culinaris*, et très voisin de celui-ci, le bec est plus court et plus large.

Je le pris au Caucase.

### *Xylophages.*

1008. BRONTES FLAVIPES, Fab. Syst. Eleut. II, p. 97. N° 2.

Dans les forêts des montagnes de Talyche.

1009. MYCETOPHAGUS QUADRI-MACULATUS? Fab. Syst. Eleut. II, p. 565. N° 2.

Je l'ai trouvé près de Saliane.

1010. TROGOSSITA CARABOIDES, Fab. Syst. Eleut. II, p. 151 N° 6.

Il est des plus communs l'hiver à Bakou.

1011. CIS CAUCASICUS, mihi.

*Subcylindricus, piceo-testaceus, parçè griseo-pubescent; thorace pulvinato, lateribus explanato; elytris profundè punctato-striatis, interstitiis inæqualiter valdè rugosis.*

Long. 1 li  $\frac{3}{4}$ . Larg. 1 li.

Sur les montagnes du Caucase.

1012. NEMOZOMA CAUCASICUM, mihi.

*Glabrum nigrum, nitidum, conicum, punctatum; antennis, pedibus, thoracis antico, elytrorum basi, maculaque intra apicem rufis; fronte emarginata, profundè sulcata.*

Long. 3 li.  $\frac{1}{2}$ . Larg. 1 li  $\frac{1}{2}$ .

Je l'ai pris dans des magasins à farine, au Caucase.

*Capricornes.*

1013. PARANDRA CASPIA mihi.

*Elongata linearis, rufo-picea, glabra nitidissima; antennis moniliformibus articulo basali majore globoso; thorace quadrato, antice nonnihil latiore, angulis rectis; elytris subconvexis, lateribus tenuè marginatis.*

Long. 9 li. Larg. 3 li.

Je ne trouvai qu'un seul individu de cette espèce sur l'île Sara; elle doit y être rare, car M. le Dr. Kiezeresky, médecin de la flotte russe, ne l'a jamais rencontrée, quoiqu'il ait récolté avec zèle beaucoup de jolis insectes de ces contrées.

1014. PRIONUS SCABRICORNIS, Fabr. Syst. Eleut. II, p. 258. N° 6.

Je l'ai pris sur l'île Sara.

1015. HAMATICHERUS HEROS, Fab. Syst. Eleut. II, p. 270. N° 21.

Il n'est pas très rare sur les montagnes de Talyche.

1016. HAMATICHERUS CERDO, Fab. Syst. Eleut. II, p. 270. N° 20.

Dans les forêts de Lenkoran.

1017. CERAMBYX AMBROSIACUS, Stev. Fisch. Entom. T. II, p. 236, Tab. 48, fig. 2,

*Var. C. thoracicus*, Fisch. Entomogr. T. II, Tab. 48, fig. 3, -4.

Assez commun aux bains du Caucase.

1018. CALlichroma ALPINA, Fab. Syst. Eleut. II, p. 272. No 30. Fisch. Entom.

T. II, p. 237, Tab. 48, fig. 6.

Se trouve dans les forêts de Lenkoran.

1019. PURPURICENUS BADENSIS, Panz. Taschenb. 2, 48, 6.

Je l'ai pris non loin du fleuve Térék.

1020. ACANTHOCINUS ATOMARIUS, Meg. Fab. Syst. Eleut. II, p. 287, N° 34.

Dans les forêts près de Lenkoran.