

Espèces inédites de Curculionides de l'Ancien Monde

III

1. *Thylacites gallæcianus*. Long. 9 ; lat. 3 mil. (1).—

Oblongo-ovatus squamose ævus, longe inæqualiter pilosus. Caput subplanum, oculis exsertis. Rostrum deplanatum, quadratum, sulco longitudinali tenui, integro. Antennæ validæ, breviores, scapo valde clavato, articulis funiculi, 1° elongato, conico, 2-6 brevibus, sublenticularibus; clava oblonga. Prothorax brevis, a latere valde rotundato-ampliatum, basi et apice breviter constrictus, margine antico impresso. Elytra convexa, a latere modice arcuata, humeris rotundatis, albo-maculata, grosse inæqualiter striato-punctata. Tibiæ anticæ longe pilosæ, apice incurvæ.

Galice.

C'est du *T. pretiosus* Schauff. que cette espèce se rapproche le plus, non seulement par sa coloration, mais aussi par sa forme convexe, la dilatation latérale du prothorax, la dépression du front et du rostre. La pubescence dressée du dessus est bien plus longue, surtout sur les parties antérieures et vers la partie postérieure des élytres ; le sillon du rostre n'est pas raccourci ; les antennes sont, ici, épaisses, tandis qu'elles sont grêles chez le *T. pretiosus*, qui a, en outre, le 2^e article du funicule presque aussi long que large ; le prothorax est, ici, fortement arrondi jusqu'aux angles postérieurs et paraît plus granulé, sur le dos, par suite des squamules plus petites et moins déprimées ; les taches squameuses, blanchâtres, du prothorax et des élytres sont teintées de bleuâtre chez le *T. gallæcianus* ; enfin, chez le *T. pretiosus*, les tibias antérieurs restent à peu près droits jusqu'au sommet.

(1) Les dimensions indiquées ne comprennent pas le rostre.

2. Thylacites costulatus. Long. 6-7; lat. 2, 2-2, 4 mill. — *Oblongo-elongatus, subdepressus, nigro-æneus, subopacus, supra griseo-maculatus, setis paucis parum elongatis, rigidis, postice parum inclinatis, præditus. Rostrum breviter subquadratum; frons modice convexa, oculis modice prominulis. Prothorax brevis, apice abrupte constrictus, margine valde impresso, a latere vix arcuatus. Elytra elongata, sulcato-punctata, interstitiis alternis magis elevatis. Pedes longe pilosi, femoribus brunneo-griseo que annulatis, tibiis anticis intus apice vix curvatis, apice ipso denticulatis.*

Teboursouk, Tunisie.

Cette espèce, découverte et communiquée par M. le docteur Sicard, rentre dans la division de celles à élytres allongées, déprimées, rectilignes latéralement : *angustus*, *multiseriatus*, etc. Elle se distingue facilement de ses congénères par ses élytres à intervalles alternes costiformes.

SERICOPHOLUS *novum Genus.*

Corpus dense squamosum, subglabrum. Caput angustius, sat elongatum, oculis lateralibus minutis, a thorace distantibus. Rostrum elongato-subquadratum, scrobibus linearibus, lateralibus, infra flexis. Antennæ fractæ, elongatæ, scapo recto, apice clavato, thoracem attingente, funiculi articulis 1^{er} elongato, 3-sequentibus fere longiore, cæteris oblongo-moniliformibus; clava ovata. Prothorax transversus, basi et apice subtruncatus. Scutellum indistinctum. Elytra oblonga, humeris non prominentibus. Pedes modice elongati, femoribus clavatis, posticis dente mediocri, anticis spina brevissima instructis.

Ce nouveau genre appartient au groupe des BRACHYDÉRIDES et viendrait se placer, suivant le système de Lacordaire, à côté des *Caulostrophus*.

3. S. Sicardi. Long. 5; lat. 2 mill. — *Oblongus, niger, pedibus rufescentibus, densissime cretaceo vel subviridi-argenteo-*

squamosus. Caput vix convexum. Antennæ rubro-ferrugineæ. Prothorax transversim subquadratus, lateribus subrectis, utrinque impressus. Elytra latitudine duplo longiora, a latere modice arcuata, anguste striato-punctata, interstitiis planis, extus, posterius præsertim, convexis, setis paucis brevissimis, pallidis, albo-seriatis. Pedes squamosi, femoribus posticis calide dentatis, cæteris obsolete uni-spinosis.

Teboursouk, Tunisie.

Je n'ai vu que deux exemplaires de cette espèce, qui paraît varier du cendré blanchâtre au vert pâle. J'en dois la communication à M. le Dr Sicard, médecin aide-major de 1^{re} classe, qui chasse actuellement les insectes avec zèle et succès dans notre colonie tunisienne. La Science Entomologique lui est redevable, déjà, de plusieurs découvertes et j'ai tenu à lui dédier l'une des plus intéressantes.

4. *Magdalinus crenatocollis* (♀). Long. 5; lat. 2 mill. *Oblongus, niger, subopacus, antennis tarsis que brunneo-ferrugineis. Caput breviter conicum, oculis non prominulis, dense punctatum. Rostrum elongatum, rugoso-punctatum, apice dilatatum, curvatum. Antennæ articulo funiculi, 1° conico; 2° angustiore, cæteris transversis, sensim latioribus; clava oblongo-ovata. Prothorax transversus, antice parum attenuatus et supra impressus, angulis posticis minus porrectis, vix divaricatis, latioribus, præsertim antice denticulatis. Scutellum rugulosum. Elytra basi impressa, margine elevato-crenato-punctata, interstitiis striis vix latioribus, densissime rugulosis. Pedes sat elongati, femoribus intus, breviter uni-spinosis.*

Caucase.

Distinct du *M. asphaltinus*, par les côtés de la tête et du prothorax glabres et par l'absence de calus saillant de chaque côté du bord antérieur du prothorax; du *M. aterrimus*, par le prothorax non avancé en saillie anguleuse près des angles antérieurs, par les interstries des élytres convexes, etc.; du *M. carbonarius* dont il se rapproche davantage, par la ponctuation bien plus serrée sur la

tête, le rostre et le prothorax ; par l'absence de ligne lisse longitudinale sur ce dernier, qui est criblé de gros points subconfluents ; par sa dilatation latérale bien moindre et par suite, par l'étranglement beaucoup moins sensible vers la base, avec les angles postérieurs moins petits ; enfin, et surtout, par les sillons des élytres non munis de points en carré transverse, crénelant les intervalles : ces derniers criblés de fines rugosités et de granulations qui leur donnent une apparence presque mate.

5. *Magdalinus distinguendus*. — Long. 5,2 ; lat. circ. 2 mill. — *Oblongo-elongatus, niger, elytris cyaneis, antennis brunneis. Caput breviter conicum, minus crebre punctatum, oculis non prominentibus, fronte impressa. Rostrum supra parce punctatum, nitidius, cylindricum. Antennæ articulis funiculi 2-primis, conicis, illo crassiore, cæteris brevibus, clava oblongo-ovata. Prothorax latitudine vix longior, angulis posticis non reflexis, creberrime profunde punctatus. Scutellum fere læve. Elytra basi separatim marginata, thorace vix latiora, striis sat profundis, punctis elongato-quadratis ; interstitiis extus et apice subconvexis, subserie evidenter granulatis. Femora dente acuto spiniformi armato.*

Syrie.

Cette espèce a un peu la forme atténuée, en avant, du *M. phlegmaticus* ; mais ce dernier a les élytres densément ponctuées, à intervalles plans, avec les stries fines. Le *M. frontalis*, bien moins allongé, surtout à prothorax bien plus court, a la ponctuation de ce segment, ainsi que celle de la base du rostre et de la tête bien plus fine et plus serrée ; les stries étroites et finement ponctuées, avec les intervalles déprimés et à peine distinctement granulés. Quant au *M. cæruleipennis*, de forme bien plus courte et plus large, il se distingue facilement de notre espèce par la faible ponctuation écartée de la tête, les stries bien plus fines et sa couleur plus brillante.

6. Magdalinus Kiesenwetteri ♀. Long. 6; lat. 2-2 mill. — Oblongus, sat elongatus, niger, antennis tibiis tarsisque rufescentibus. Caput creberrime rugose-punctatum, obconicum, oculis depressis. Rostrum validum, crebre fortiter punctatum, minus elongatum, subtus, apicem versus, denticulatum. Antennæ articulis funiculi 2-primis parum elongatis, illo crassiore, latitudine non longiore, cæteris breviter conicis, clava suboblonga. Prothorax vix transversus, subquadratus, punctis confluentibus, linea longitudinali angustissima, lævi, angulis posticis acutis, non vere reflexis, margine antico impresso, utrinque ante marginem denticulato ac angulato. Scutellum subquadratum. Elytra basi non vere elevata, submarginata, profunde late sulcata, punctis subquadratis, intestitiis convexis, creberrime granulosis. Femora dente mediocri, intus, armata. Tibiæ anticæ subrectæ.

Grèce.

Cette espèce ne peut être rapprochée que du *M. cerasi* ♀. La taille est trois fois plus grande. Le prothorax est d'une autre forme, les stries des élytres sont très profondes et d'une ponctuation tout autre.

7. Ceutorhynchus Cinapis. Long. 2,2-3; lat. 1,3-15 mill. — Ovatus, atro-velutinus, subtus niteo-squamosus, tarsis ferrugineis. Caput punctatum, intra oculos plurisulcatum. Rostrum subrectum, capite thoraceque brevius, pubescens, rugulose-punctatum, a latere minute denticulatum. Antennæ nigræ, graciles, articulo funiculi 1^o solummodo elongato, ultimo subrotundato-transverso, clava subelliptica. Prothorax brevis, antice abruptè constrictus, ibique utrinque crenulatus, lateribus late, macula, in fossa basali niveis, punctoque brunneo, laterali, ornatus; minus æqualiter punctatus. Elytra fasciis duabus transversis, arcuatis. sutura apice que niteo-squamosis. Pedes femoribus albo-annulatis, intus medio, acute unidentatis; tibiis posticis apice incrassatis, nigro-pectinatis.

J'ai trouvé plusieurs exemplaires de cette rare et belle espèce en 1889, sur les hauteurs qui dominent la forêt de cèdres de Teniet-El-Haâd, en fauchant des fleurs de

Sinapis. Je l'ai vue, depuis, de la même provenance, dans plusieurs autres collections. Sa coloration remarquable ne permet pas de la confondre avec les espèces voisines.

8. **Cleonus** (*Plagiographus*) **obesulus**.— Long. 8; lat. 6 mill. — *Ovatus, niger, albo-squamosus. Caput carinatum, fronte fovea parva insculptum. Rostrum longitudine thorace æquale, angustius, subrectum, versus apicem non gibbosum, tricarinatum, sub 4-sulcatum. Prothorax subconicus, vix transversus, apice constrictus, angulis posticis vix acutis, inæqualiter strigosus, carina media strigaeque utrinque, postice abbreviata munitus, linea laterali antice angulata, maculaque interna oblonga albo-squamosis, ornatus. Elytra basi thorace, vix latiora, in humero et infra humerum callosa, a latere evidenter arcuata, margo exteriore vix sinuato, fasciis lacunosus una ad tertiam partem, valde arcuata, altera post medium transversim triangulari, prædita. Tibiæ anticæ unco longiori incurvo, apice armata.*

Espagne. Je le dois à la générosité de M. Théry.

La forme ovale lui donne l'aspect d'un **STEPHANOCLEONUS**; mais le rostre est tout autre, presque droit, non gibbeux, ni dilaté au sommet et bien plus long que chez aucune espèce du sous-genre **PLAGIOGRAPHUS**, dans lequel il me paraît devoir rentrer. Sauf la forme, il a une certaine ressemblance avec les variétés pâles et à bandes des élytres réduites du *P. turbatus*; la fossette frontale est bien plus raccourcie; le rostre est muni d'une carène latérale interne; le prothorax, bien plus allongé que chez le *P. turbatus*, est élargi en arrière, il est chargé d'une carène médiane prolongée du bord antérieur au milieu du segment, avec une impression de chaque côté et sans fossette à la base; les rugosités peu nombreuses, sont bien moins saillantes que chez le *P. turbatus*, les côtés sont ornés d'une bande très étroite, aboutissant inférieurement au calus huméral et redressée en crochet à l'extrémité opposée, avec une tache oblongue de chaque côté, en dedans de celle-ci; les élytres

en outre des bandes indiquées ci-dessus, sont ornées d'un calus postérieur blanchâtre entouré de noirâtre et sur le dernier intervalle externe, d'une série de taches guttiformes blanchâtres; le dessous est parsemé de petits points dénudés et le dernier segment abdominal, très bombé, est densément pubescent, avec des cils blanchâtres soulevés.

9. Mecaspis angustulus. — Long. 6, 5-7; lat. 2, 5-2, 8 mill. — *Elongatus, sublinearis, niger, elytris albo-lineatis. Frons convexa, foveolata, nitida, parce punctata. Rostrum capite vix longius, medio obsolete carinatum, rugosum supra apice depressum. Antennæ ferrugineæ, funiculi articulo 1^o subquadrato, cæteris brevibus, pressis, clava subelliptica. Prothorax quadratim subconicus, irregulariter parce punctatus, medio depressus, rugis lateralibus interruptis, cinereo-4-lineatus. Elytra thorace basi latiora, latitudine fere triplo longiora, apice separatim acuminata, inæqualiter punctato-striata, punctis distantibus; interstitiis extus et apice convexis, albo-tomentoso virgatis. Pedes dense villosi, tibiis tarsisque ferrugineis, his apice unco brevi præditis.*

Kustendjé, trois exemplaires communiqués, autrefois par notre regretté collègue le Dr Sénac, dont la collection de CERCULIONIDES réunie actuellement à la mienne, m'a été offerte par sa famille à titre de souvenir.

Sa forme étroite rappelle le *M. palmatus*, mais la coloration est tout autre; cette coloration est tout à fait celle des exemplaires typiques du *M. alternans*, à bandes blanchâtres entières sur le dos, interrompues extérieurement; la forme est bien plus étroite, la tête est presque lisse entre les yeux, avec des points espacés au lieu d'être très densément ponctuée.

10. **Lixus subfarinosus**. Long. 4, lat. 1, 5 mill. — *Elongatus, niger, antennis, elytris pedibusque brunneo-rufis; supra pube brevi, interdum nitida, obsitus. Caput brevi, oculis depressis. Rostrum crassum, brevius, vix arcuatum, pubescens et punctatum, apice rubrum, nitidum. Antennæ breviores, articulo funiculi 1° oblongo, cæteris brevibus, pressis, clava elliptica. Prothorax quadratus, apice ipso cærcatus. Elytra thorace basi vix latiora, humeris obtusis, latitudine triplo longiora, postice parum ampliora, apice obtusa, sat anguste striato-punctata, interstitiis planis. Pedes elongati, femoribus vix incrassatis, tibiis tarsis non longioribus.*

Egypte.

Très voisin du *L. subulatus* Faust, dont il diffère par la coloration des diverses parties, par les stries des élytres bien plus nettement ponctuées, par les interstries plus larges, surtout ceux qui avoisinent la suture; par la pubescence plus distinctement soulevée en arrière; l'insecte, vu de côté, paraît bien plus épais.

11. **Lixus nigricornis** ♀. Long. 4; lat. 1,2 mill. — *Lineari-elongatus, niger, griseo-breviter pubescens. Caput breve, oculis non prominentibus. Rostrum tenue, thorace paulo longius, subcylindricum, basi punctatum, post medium glabrum, nitidum, et parce punctulatum. Antennæ nigrae, articulo funiculi 1° elongato, 2° breviter conico, cæteris latioribus, transversis, clava ovata. Prothorax transversus, a latere modice arcuatus, angulis posticis rectis, crebre punctatus. Scutellum griseo-tomentosum. Elytra thorace vix latiora, humeris non prominentibus, latitudine vix triplo longiora, apice obtusis, striis tenue punctatis, externis profundioribus, interstitiis subplanis, crebre punctulatis. Pedes inermes, tarsis concoloribus.*

Sicile.

Ressemble, au premier abord, aux petits exemplaires du *L. fillormis*; mais ce dernier s'en distingue facilement par sa tête en forme de cône allongé, par son rostre épais et mat; par son prothorax atténué en avant, dès le milieu;

par la pubescence des élytres bien plus fine ; enfin, par ses antennes et ses tarses plus ou moins rougcâtres.

12. **Procas minutus**. Long. 5 ; lat. 2 mill. — *Oblongus, minus elongatus, niger, griseo-absolute-maculatum pubescens, antennis tarsisque rufis. Caput breve, oculis non prominulis. Rostrum post medium subito arcuatum, crassius, thorace paulo longius, pilosum, ruguloso-punctatum, non carinatum. Antennæ funiculi articulo 1° secundo longiore, 2° subfiliforme, 3° latitudine paulo longiore, cæteris transversim subrotundatis, clava magna, subelliptica. Prothorax transversus, a latere vix arcuatus, apice constrictus, angulis posticis subobtusis, creberrime punctatus. Scutellum subrotundatum. Elytra basi thorace evidenter latiora, humeris subrotundatis, a latere subparallela, post tertiam partem obtuse acuminata, pilis obscuris reclinatis vestita, regulariter tenue striato-punctata, interstitiis planis, dense rugulose punctatis, externo antice latiore. Pedes elongati, femoribus inermibus, tibiis tarsisque gracilibus, his articulo 1° elongato, 2° breviter conico, subtransverso.*

Espagne.

Trois ou quatre fois plus petit que les exemplaires de taille moyenne du *P. picipes*, à antennes bien plus courtes ; à rostre plus brusquement courbé ; les élytres sont plus courtes ; les tarses antérieurs sont bien plus déliés, à premier article beaucoup plus long que large ; chez le *P. picipes*, les tibias sont bien plus larges, les tarses antérieurs épais, à articles beaucoup plus courts, à premier article aussi large au sommet que sa longueur.

13. **Apion Sicardi** ♀. Long. 2,3-2,5 ; lat. 1,2-1,3 mill. (*sine rostro*). — *Oblongo-ovatum, nigrum, antice submetallicum, elytris obscure cyaneis, breviter parce griseo-pubescens. Caput angustius, oculis vix prominulis. Rostrum tenue, subcylindricum, modice curvatum, basi paulo constrictum, capite thoraceque subæquale. Antennæ graciliores, filiformes. Prothorax subtransversus, basi foveolatus, minus dense punctatus. Scu*

tellum oblongum, sulcatum. Elytra-striato-punctata, interstitiis externis subconvexis. Pedes elongati.

Teboursouk, Tunisié.

Je le dédie à M. le docteur Sicard, qui m'en a communiqué plusieurs exemplaires. A placer à la suite de l'A. loti.

14. Apion sejugum ♀. Long. 3,2; lat. 1,1 mill. — *Anguste elongatum, nigrum, parce griseo-pubescens. Caput subtransversum, angustius. Rostrum sat validum, capite thoraceque paulo longius, curvatum basi, utrinque, vix dilatatum. Antennæ subbasilares, minus crassæ, articulis funiculi 2-7 apice nodosi, clava subovata. Prothorax exacte quadratus, basi foveolatus. Elytra a latere subparallela, thorace fere triplo longiora, striis tenuibus, dense punctatis, interstitiis planis, subtilissime rugulosis, striis latioribus. Pedes elongati, tibiis subrectis.*

Syrie : un exemplaire ♀ de notre collection ; un deuxième exemplaire, du même sexe et absolument semblable, parmi les APION recueillis par M. Valentin, de Francfort-sur-le-Mein. et communiqués par M. le Baron von Heyden. Cet exemplaire étiqueté : Saragöl. (Caucase).

A placer à la suite de l'A. lancirostre.

15. Apion adjectum. — ♂ Long. 2,5; lat. 1,2 mill. — *Oratum, atrum, vix pubescens, scapo antennarum, coxis anticis, femoribus tibiis que basi flavis. Caput latum, fronte obsolete striolata. Rostrum elongatum, medio modice dilatatum. Antennæ scapo dimidio rostri longiore, valde clavato, funiculo gracile, villosa, articulis 3-5 brevibus, 6 et 7 valde elongatis, clava elongatissima, pilosa. Prothorax convexus, dense fortiter punctatus, a latere subrotundatus. Elytra valde convexa, striato-punctata, interstitiis latis, subconvexis.*

Tibiæ rectæ; tarsi compressi, articulis 1 et 2 elongato-quadratis, subtus dense albo-villosis.

♀. *Antennæ atræ; tibiæ posticæ basi non arcuatæ.*

Algérie, sans localité précise, mais très probablement de la Province de Constantine.

A placer à la suite de l'A. *di simile*.

16. Apion Doriæ. — Long. 2-2, 2; lat. circ. 1 mill. — *Ovatum, nigrum, griseo-pubescent, antennis pedibus que piceis. Caput thorace vix angustius. Rostrum sat validum, sat elongatum, profunde punctatum. Antennæ nigræ, articulis 2 primis elongatis, clava subelliptica. Prothorax subtransversus, basi et apice breviter constrictus, tenue punctatus, stria basali brevi. Elytra basi thorace valde latiora, nigro-ænea, striato-punctata, interstitiis latis, subplanis, parcissime punctulatis, basi tenuissime plicatulis. Pedes inermi.*

Le ♂ a le rostre plus court, plus épais.

Perse septentrionale; provenant des chasses de M. le Marquis Doria. Plusieurs exemplaires communiqués par le Musée civique de Gênes.

17. Apion persicum. — Long. 2, 8-3; lat. 1, 12 mil. — *Ovatum, nigro-cyaneum, tenue albido-setulosum. Caput latum, oculis minus prominulis, fronte obsolete striolata. Rostrum sat validum, capite prothorace que simul sumptis paulo brevius, arcuatum, medio subincrassatum, punctatum, sat nitidum. Antennæ tennes, basi rufescentes, scapo elongato, articulo funiculi 1^o incrassato, clava subelliptica. Prothorax subtransversus, antice paulo attenuatus, fortiter punctatus, stria basali brevi insculptus. Elytra prothorace valde latiora, humeris sat elevatis, subsulcato-punctatis, interstitiis minute coriaceis. Pedes sat validi, tarsi elongatis.*

Perse septentrionale, provenant, comme le précédent, des chasses de M. le Marquis Doria, et communiqué également par le Musée de Gênes.

18. Cleonus (*Eutulomatus*) **bigibbosus**. — Long. 7-8; lat 2, 2-2, 5 mill. — *Angustus, elongatus, subglaber, niger, antennis tarsisque rufis, subtus æqualiter albido supra albido brunneoque variegatim cretaceus. Frons convexa. Oculi ovati, suboblique positi. Rostrum capite fere brevius, rectum, obsolete carinatum, basi incrassatum, apice non emarginatum. Antennæ articulis funiculi 2 primis conicis, cæteris transversis, gradatim latioribus, clava ovata, apice valde acuminata. Prothorax subconvexus, lateribus vix sinuatis, antice subito attenuatus, angulis posticis rectis, utrinque albido-cretosus. Elytra parallela, thorace basi non latiora, basi tuberculo granato instructa, apice non mucronata, plaga subscutellari, fascia que laterali valde interrupta, albido-squamosis, sutura obscura. Pedes griseo-tomentosi; Abdomen segmento ultimo calloso-tomentoso.*

Algérie, Biskra. Très rare.

Bien reconnaissable à sa coloration : Prothorax avec trois bandes longitudinales noirâtres peu accusées, limitées par une squamosité flavescente ; élytres à bande suturale noirâtre, interrompue, aboutissant, antérieurement à une tache mal limitée d'un blanc squameux ; avec des taches irrégulières de la même nature, sur les côtés, où elles figurent une sorte de bande inégale, interrompue. Pas de points noirs sur les parties inférieures.

Rappelle un peu, par sa forme générale, les petits exemplaires du *C. conicirostris* Ol., mais le rostre n'est pas conique. La forme de cette partie le rapprocherait davantage du *C. confluens*, par exemple. Les yeux sont bien plus ovales, plus arrondis, que chez cette espèce, le rostre n'est pas échancré triangulairement et avec un empâtement lisse au sommet ; et la présence d'un tubercule à la base de chaque élytre, ainsi que sur le dernier segment abdominal, me semble devoir justifier la création d'une coupe sous-générique spéciale que je nommerai : *EUTULOMATUS*.

19. Elytrodon maroccanus. — Long. 7-8; lat. 3, 5-3, 7 mill. — *Oblongus, niger, nitidiusculus, antennis rufescentibus,*

griseo in elytris maculatim pubescens, setis paucis nigris hirsutus. Caput convexum, fronte impressa, late foveolata, oculis valde prominentibus. Rostrum subquadratum transversum, apice late emarginatum. Antennæ articulis funiculi 2-primis subæqualibus, 6° intermediis longiori, 5° et 7° brevibus, clava sublineari. Prothorax transversus, lateribus medio rotundato-ampliatis, laxè fortiter punctatus, interstitiis crebre punctuclatis. Elytra modice elongata, a latere vix arcuata, striato-punctata, interstitiis subconvexis, alternis indistincte elevatis. Femora 4-antica dente spiniformi armata.

De la taille et à peu près de la forme de l'*Elytrodon giganteus*, de couleur plus foncée sur les pattes et sur les antennes. Le rostre est élevé, au sommet, en une sorte de bourrelet arqué, et fortement échancré presque en demi cercle; le front est marqué d'une fossette, au lieu d'une strie raccourcie; la tête est plus large et les yeux beaucoup plus saillants; le prothorax, assez brillant, est marqué de gros points bien moins nombreux que chez l'*E. giganteus*; les intervalles alternes des élytres ne sont pas subcostiformes; enfin, les cuisses, au lieu d'être armées d'une très large dent aux deux paires antérieures, sont, ici, munies d'une courte dent spiniforme.

Tanger, deux exemplaires.

20. *Chiloneus brevipilis.* Long. 4, 5; lat. 4, 6 mill. — *Ovatus, convexus, brunneus; nigro cinereo que variegatus, squamosus, antennis tarsisque pallidis, elytris brevissime subseriatim hispidis. Caput transversum, post oculos vix ampliatus, fronte depressa, obsolete foveolata, oculis prominentibus. Rostrum apice nitidum ac ferrugineum, elevatione nitida et transversim bi-impressa. Antennæ tenues, articulo funiculi 1° 2° valde longiori, cæteris brevioribus, moniliformibus, 7° transverso, clava subrotata. Prothorax transversus, antice impressus, a latere vix arcuatus, utrinque albido vittatus, dense squamosus, punctis indistinctis. Elytra basi simul emarginata, humeris obliquis, non prominentibus, striis profundis, punctatis, interstitiis modice convexis,*

sutura ferruginea. Femora inermia ; tibiæ anticæ lineares, apice non recurvæ.

Province de Constantine et Tunisie.

Très voisin du *C. infuscatus* (*algericus*), dont il a la coloration. Bien distinct par l'extrême brièveté des soies dressées sur les élytres, par la proportion très différente entre les divers articles des antennes ; chez le *C. infuscatus*, les deux premiers articles du funicule sont presque d'égale longueur ; par l'absence de gros points distincts espacés sur le prothorax, etc.

Description d'un **URODON** nouveau d'Algérie.

URODON-BAUDII. — *Forma et statura flavescenti brevior. Densissime albido-squamosus, antennis pedibusque testaceis. Caput angustius, oculis obliquis. Antennæ graciles, articulo 1^o funiculi solo elongato, cæteris transversis. Prothorax parum elongatus, lobo basali obtuso, minus prominulo, versus basin punctis profundis, setis que crassioribus præditus. Elytra latitudine non longiora, tenue albido-subseriatim setulosa. Pygidium longitudina liter profunde sulcatum, postice nigro-aspere punctatum ac setulosum Abdomen segmentis 3-ultimis apice albido-fimbriatis.*

Algérie, sans localité précise.

Espèce remarquable par sa squamosité très dense, non piliforme, par les points enfoncés vers la base du prothorax, par les soies argentées qui se détachent sur le fond, disposées subsérielement sur les élytres et par le *pygidium* sillonné d'un bout à l'autre et muni de points noirs râpeux postérieurement.