

Espèces inédites de CURCULIONIDES de l'Ancien Monde

IV

RHINOSPATHUS nov. gen.

Corpus nigrum, squamosum.

Caput subconicum, oculis obliquis, non prominentibus, lateralibus, minus distantibus.

Rostrum elongatum, arcuatum, glabrum, nitidum, a basi ad apicem ampliatur, Scrobibus lateralibus, obliquis.

Antennæ graciles, scapo oculos attingente, funiculo 7-articulato, clava angusta, fusiformi.

Prothorax transversus, prosterno longius, basi et apice subtruncatus.

Scutellum minutum, triangulare.

Elytra basi simul emarginata, humeris elevatis, striata.

Pedes elongati, femoribus vix clavatis, inermibus, tibiis linearibus, tarsis gracilibus, articulo 3^o bilobo, unguiculis simplicibus.

Abdomen segmentis 2-primis magnis, subæqualibus, 3-4 angustis, 4^o leviter arcuatim emarginato, angulis externis non vere prolongatis, 5^o majore, apice truncato.

A placer près du Genre ELLESCHUS, dont il diffère, notamment, par la forme tout spéciale du rostre, la structure des antennes, les stries des élytres entièrement recouvertes par la squamosité, etc.

1. *Chobauti*. Long. 2-2, 3 mill. — Oblongus, parum convexus, niger, dense griseo virescenti subsquamulatus, antennis pedibusque pallide-ferrugineis. Rostrum atrum, nitidissimum, antérieurement distinctement punctulé, l'apex versé subtilement cilié. Antennes articulo 1^o funiculi filiformi ; 2^o sequentibus simul sumptis longiore, apice nodoso, 2-7 gradatim brevioribus, subconicis, breviter setulosis,

clava obscura. Prothorax brevis, subtrapezoidalis, antice impressus. Elytra thorace quadruplo longiora, postice ampliora, apice obtuse acuminata, striis vix perspicuis. Pedes minus dense squamosi, pallide-testacei, femora interdum obscurioribus, unguiculis nigris. Abdomen segmento ultimo ruguloso punctato.

Algérie : Biskra.

Ce curieux insecte a été rapporté par M. le Docteur Chobaut de son récent voyage en Algérie, et je suis heureux de lui dédier une de ses trouvailles les plus intéressantes.

La squamosité des élytres est ordinairement formée de petites écailles allongées, parfois un peu soulevées et disposées longitudinalement, ce qui les fait paraître obsolètement côtelées.

2. Lignyodes uniformis. Long. 4 mill. — *Oblongus angustior, minus convexus, fulvus, pectore nigro, rostro antennis pedibusque rufis, supra griseo-fulvescente rude subsquamosus, infra griseo-pilosus. Caput mediocre. Rostrum tenue, teres, postice arcuatum, læve, nitidum, vix punctulatum. Antennæ articulis funiculi 2-primis valde elongatis, illo longiore, ultimis brevibus, clava magna, oblonga. Prothorax sat angustus, a latere non ampliatus, antice attenuatus, vix constrictus. Elytra basi emarginata, a latere subparallela humeris obliquis, striis apice et extus profundioribus, interstitiis angustioribus, subconvexis. Pedes elongati, femoribus inermibus, tibiis subsinuatis, unguiculis appendiculatis.*

Balkans.

Très distinct par sa forme étroite, à côtés parallèles, par la vestiture du dessus uniforme, formée de poils subsquamiformes soulevés par place, d'un gris fauve, sans taches.

Le *L. enucleator* est la seule espèce décrite ayant le rostre épais et une tache triangulaire pâle couvrant les

épaules des élytres et dont la pointe atteint la suture. Le *L. rudesquamosus* n'en est, certainement, qu'une variation. Les autres espèces ont le rostre mince, allongé. Le *L. oblique-fasciatus*, auquel doit être réuni le *L. Muerlei*, à en juger par la description, se distingue par la présence de trois bandes très nettes au prothorax, et d'une bande arquée partant de l'épaule de chaque élytre et atteignant la suture, vers les $\frac{2}{3}$. Le *sutuatus* dont je ne connais que la description, a la tête noire et est recouvert d'une couche uniforme de pubescence fauve, avec la suture rembrunie.

3. *Pachytychius* (*Styphotychius*) *punctulatus*. —

Long. 3,3 mill. *Oblongus, griseo pilosus, ruber, thorace femoribus que basi obscurioribus. Caput punctulatum, fronte impressa. Rostrum postice curvatum, pluri-suclatum ac punctulatum. Antennæ pilosæ, funiculi articulo 1° valde elongato, 2-3 latitudine longioribus, cæteris submoniliformibus, ultimis transversis, clava oblonga. Prothorax convexus, creberrime punctatus, non granulatus, a latere rotundato-ampliatus, pilis griseis, transversim digestis, vestitus. Scutellum minutissimum, triangulare. Elytra oblonga, humeris non prominentibus, a latere vix arcuata, subtiliter striato-punctata, longitudinaliter griseo-pilosa, pilis paulo hirsutis. Femora, antica præsertim clavata. Tibiæ sublineares, apice intus breviter angulatæ, unguiculis simplicibus.*

Algérie, Tunisie.

Très voisin du *P. scabricollis*, dont il a la coloration et la forme générale. Il s'en distingue, au premier coup d'œil, par son prothorax simplement ponctué, sans tubercules, par ses antennes grêles, à 2° article du funicule allongé et à massue peu renflée ; par les stries des élytres presque superficielles et à intervalles très plans, au lieu d'être ponctués nettement de points carrés et à intervalles convexes ; par la pubescence bien plus fine du dessus, plus distinctement demi-hérissée sur les élytres ; par le rostre nettement cannelé.

Le *P. subasper*, qui a le prothorax simplement ponctué, a la forme bien plus courte, le corps plus convexe, le prothorax et les élytres bien plus arrondis, la pubescence hispide des élytres beaucoup moins abondante et moins soulevée. Le rostre est presque uni dans la deuxième moitié.

4. *Pachytychius subcordatus*. — Long. 3,5 mill. *Oblongo-elongatus, angustior, piceus, rostro antennis pedibusque ferrugineis, minus dense griseo-squamulatus, sutura elytrorum inæqualiter nigro-denudata. Rostrum sat tenue. Antennæ articulis funiculi ultimis submoniliformibus, clava oblongo-ovata. Femora subdentata.*

Ramlé; un exemplaire de la collection Sénac provenant des chasses de M. Letourneux.

Très voisin du *P. bæticus* dont il a la coloration et la forme générale, quoique plus étroite; prothorax bien plus fortement et brusquement rétréci à la base, ce qui le fait paraître subcordiforme, largement arrondi latéralement. Rostre plus mince. Antennes à articles du funicule légèrement noueux, plus détachés, avec les derniers non distinctement plus larges; tandis que chez le *P. bæticus*, le dernier article, notamment, est très large, du double environ plus large que long; massue faiblement renflée. Cuisses armées d'une dent obtuse, peu saillante.

4 (bis). *Pachytychius Lucasi* var. *marmoreus*. — M. Lostia m'a envoyé, il y a quelque temps, de Sardaigne, des exemplaires du *P. Lucasi* chez lesquels les élytres, au lieu d'avoir sur un fond cendré une simple bande suturale noire dentée, s'élargissant postérieurement, sont marbrées de brun sur toute la surface, ce qui leur donne un aspect très différent.

Ces exemplaires paraissent un peu plus larges que le type et à cuisses postérieures encore plus fortement renflées.

5. Tychius Chobauti. Long. 3.5 mill. (♂). — *Oblongo-elongatus, latiusculus, brunneus, fulvo-aureo pilosus, antennis pedibusque totis testaceis. Frons antice transversim cristata. Rostrum supra hirsutum, infra ciliatum, basi valde incrassatum, apice curvatum, subulatum. Antennæ graciles, breviter setosæ, articulo funiculi 1° parum elongato, cæteris transversis, clava oblongo-ovata. Prothorax transversus basi minus constrictus. Elytra elongata, a latere parallela, pilosa et serie griseo-setulosa. Femora inermia. Tibiæ dilutiores, extus breviter ciliatæ.*

Biskra, deux exemplaires ♂, rapportés par M. le docteur Chobaut qui a bien voulu m'en offrir un pour ma collection.

Extrêmement voisin du *T. funicularis* ♂, à part la coloration différente; mais le rostre est ici, hérissé de soies sur toute sa longueur, les antennes sont brièvement ciliées au lieu d'être assez longuement hispides, et noirâtres postérieurement, le prothorax est moins sensiblement rétréci à la base, d'où l'angle rentrant formé à la rencontre de cet organe et des élytres moins prononcé; enfin, les élytres, en outre de la pubescence couchée, présentent des séries de soies raides, paraissant élevées quand on examine l'insecte la tête tournée vers soi, tandis que cette pubescence est tout à fait appliquée chez le *T. funicularis*.

6. Tychius edentatus. Long. 2.8 mill. — *Oblongus, angustior, supra depressus, piceus, minus dense sericeo-argenteo squamulatus, antennis basi, rostro apice pedibusque ferrugineis. Rostrum elongatum, curvatum, apice subulatum ac denudatum. Antennæ nigrae, ciliacæ, articulis 2-primis funiculi testaceis, sequentibus transversis, clava ovata. Prothorax subtransversus, elytris angustior, antice transversim impressus. Elytra minute striato punctata, interstitiis subtiliter serie-setulosis. Pedes rufi, femoribus, inermibus tibiis anticis leviter, intus, arcuatis.*

Algérie.

Très voisin du *T. sericeus* dont il a la coloration, et à peu près la forme, bien que plus étroite; les pattes sont entièrement d'un rouge clair, parcimonieusement squa-

meuses. Il s'en distingue par la coloration des antennes qui sont noires, sauf à la base, par le prothorax presque droit sur les côtés, par les squamules des élytres en forme d'écaillottes épaisses au lieu de poils squamiformes et par les cuisses inermes au lieu d'être munies d'une dent assez forte, surtout aux antérieures.

7. *Tychius medius*. Long. 2.8-3 mill. — *Oblongus, subconvexus, niger, antennis, rostro postice pedibusque rubris, minus dense subargenteo-squamulatus, squamis oblongis. Rostrum longitudine thoracis vix æquale, basi incrassatum, apicem versus valde attenuatum, in dimidia parte posteriore rufum. Antennæ ciliatæ, articulo 1° funiculi elongato, 2° breviter conico, cæteris subtransversis, haud nodosis, clava oblongo-ovata. Prothorax transversus, convexus, antice vix impressus, apice constrictus, basi paulo attenuatus, medio longitudinaliter obsolete cristulatus. Elytra minus elongata, usque in medio parallela, anguste striata, postice vix attenuata, sutura albosquamosa. Femora inermia.*

Biskra, plusieurs exemplaires qui m'ont été communiqués par M. le docteur Chobaut.

Ne peut être confondu avec le *T. argentatus* qui est d'une tout autre forme, étant bien plus déprimé, très allongé, atténué en arrière, à rostre à peine courbé, bien plus long, à squamules du dessus beaucoup plus larges et à bande latérale blanche chez les exemplaires frais. Le *T. sericeus* (1), de forme plus courte, est bien plus large et a les cuisses nettement dentées, tandis qu'elles sont inermes chez le *T. medius*, abstraction faite d'une petite saillie obtuse que fait ressortir une échancrure subapicale. Le *T. Meliloti*, en outre de sa coloration, s'en éloigne par une forme moins étroite, par sa vestiture bien moins épaisse, piliforme, etc. Chez le *T. medius*, les squamules du protho-

(1) Cette espèce varie de coloration. Tantôt elle présente l'aspect soyeux-argenté du *T. argentatus*, tantôt elle est presque opaque, avec une nuance flavescente: var. *opaculus* m. Les exemplaires de cette variété sont ordinairement plus larges et à prothorax plus convexe.

rax sont disposées en travers et convergent sur la ligne médiane ; elles sont beaucoup plus larges en dessous, surtout sur la poitrine.

8. **Tychius spinierus**. — Long. 3 mill. *Oblongo-ovatus, latior, minus elongatus, niger, antennis rostro apice pedibusque rubris, supra dense fulvo-squamulatus, subtus, prothoracis et elytrorum basi, cum margine externa et sutura albido-squamosis. Rostrum thorace non longius, modice curvatum, postice nitidum et valde attenuatum. Antennæ graciles, articulis funiculi 2-primis valde elongatis, ultimis latitudine vix longioribus, subconicis, clava oblonga, angusta. Prothorax transversus, apice valde constrictus et impressus, postice vix angustatus, lateribus parum arcuatis, medio obsolete carinato. Scutellum triangulare. Elytra a latere modice arcuata, postice obtuse acuminata, striis angustis, apice distinctius punctatis. Femora postica dente magno spiniformi armata, cætera subinermia.*

Corse, un exemplaire de la collection Sénac.

La couleur fauve des élytres, avec la suture d'un blanc squameux, fait ressembler cette espèce à la var. *litigiosus* du T. *Meliloti* ; mais la forme est tout autre et la structure des pattes est bien différente. Elle diffère de la variété *globithorax* du T. *polylineatus* par de nombreux caractères : la forme est bien plus large, les élytres plus courtes, cunéiformes postérieurement : le prothorax faiblement dilaté latéralement et faiblement rétréci vers la base, n'a pas de bande squameuse médiane, la base du prothorax et des élytres, ainsi que le bord externe de ces dernières, sont étroitement bordés de blanc squameux ; la massue des antennes est étroite ; les stries des élytres sont superficielles ; la dent des cuisses postérieures est très acuminée.

9. **Tychius ellipsiformis**. Long 2,6 mill — *Elongato-ellipticus, sat angustus, supra depressus, niger, subopacus, rostro antennis elytris postice pedibusque rufis, supra griseo-pubescent, subtus albo-squamosus. Rostrum subrectum, thorace,*

non-longius, postice attenuatum, basi squamosum, apice fere lævi. Antennæ articulo funiculi 1^o solummodo elongato, incurvo, 2^o breviter conico, cæteris brevioribus, ultimo latiore, clava subelliptica, nigra. Prothorax longitudine vix latior, a latere vix arcuatus, apice constrictus, crebre punctatus. Elytra thorace basi vix latiora, postice subcuneata, anguste striato-punctata, interstitiis planis. Pedes sat elongati femoribus inermibus, tibiis subrectis, tarsis concoloribus. Abdomen segmento ultimo apice impresso.

Corse. Deux exemplaires de ma collection.

La forme elliptique-allongée de cette espèce la fait aisément reconnaître. Elle se rapproche, sous ce rapport, du *T. longitubus*, mais elle est bien plus atténuée en arrière, plus étroite, autrement colorée et à vestiture subpiliiforme mate, au lieu d'être écailleuse et brillante.

10. *Tychius beckerianus*. Long. 3, 5 mill. — *Oblongo-subellipticus, latior, supra depressus, niger, rostro pedibusque dilutioribus, antennis pallide rufis. Oculi minus depressi. Rostrum elongatum, robustum, paulo curvatum, squamosum, apice denudatum et attenuatum. Antennæ graciles, articulis 2^o-primis funiculi valde elongatis, cæteris brevioribus, non transversis, clava oblonga. Prothorax amplus, modice a latere arcuatus, apice constrictus, angulis posticis obtusis, medio albo-longitudinaliter vittatus. Elytra post medium magis attenuata humeris obliquis, striis tenuibus, interstitiis planis, latissimis. Femora intus basi obtuse angulata.*

Russie méridionale, reç. autrefois de M. Becker.

Encore une espèce voisine du *T. globithorax* pour la coloration, se rapprochant davantage pour la forme du *T. spinicrus* ; plus grand, bien plus large, rostre beaucoup plus long. Prothorax orné d'une assez large bande médiane de squamules blanches. Elytres rétrécies en arrière seulement au-delà du milieu ; une bande étroite, formée de squamules blanches, partant du calus huméral et prolongée presque jusqu'à l'extrémité, en outre, ça et là, quelques mouchetures éparses. Vues de face, elles présentent un calus

huméral prononcé. Les cuisses sont très renflées, surtout les antérieures.

11. *Tychius nasutus*. Long. 2,5 mill. — *Oblongus minus elongatus, sat convexus, antennis, rostro apice pedibusque obscure rufis, dense subargenteo-squamosus. Rostrum thorace brevius, modice arcuatum, crassum, apice subulatum. Antennæ graciles, articulo 1° funiculi elongato, 2° triangulari, cæteris brevibus, clava oblongo-coata. Prothorax transversus, apice constrictus et transversim impressus, lateribus subrectis, angulis posticis rectis. Elytra usque ad medium a latere parallela, dein obtuse acuminata. Femora antica obtuse dentata, cætera subinermia.*

Sicile, environs de Palerme, (M. Ragusa).

Bien plus court que le *T. argentatus* et même que le *T. sericeus* dont il a la coloration. Diffère de l'une et de l'autre espèce par le rostre plus brusquement épaissi à la base, bien plus court, plus brièvement aminci postérieurement ; par le prothorax non distinctement rétréci à la base, d'où les côtés non arrondis ; par la structure des antennes, par les pattes bien moins allongées, etc. Les squamules, obliquement dirigées sur le prothorax, convergent vers la ligne médiane ; celles des élytres ont en outre de la couche foncière, des petites soies plus soulevées, disposées en séries longitudinales.

12. *Tychius longus*. Long. 3-5 mill. — *Valde elongatus, subdepressus, opacus, dense pallide subvirescente squamosus, rostro apice pedibusque rufis. Rostrum robustum, dense squamosum, apice denudatum et paulo attenuatum, thorace non longius. Antennæ articulo 1° elongato ; 2° latitudine paulo longiore, sequentibus gradatim brevioribus, clava elliptica, apice valde acuminata. Prothorax sat elongatus, apice constrictus, a latere vix arcuatus, lateribus postice parallelis. Scutellum cordiforme. Elytra thorace fere triplo longiora, postice vix attenuata, apice obtusa,*

stritis distinctis, extus profundioribus, interstitiis dorsalibus planissimis, 9^o elevato, postice angustissimo, sutura pallida. Femora clavata. Tibiæ anticæ intus sinuatæ. Abdomen segmento ultimo medio foveolato.

Russie méridionale.

La squamosité rappelle celle des exemplaires pâles du *T. cinnamomeus*. La forme étroite et très allongée, qui n'a pas d'analogue parmi les espèces voisines, lui donne l'aspect de certains *MICCOTROGUS*.

13. *Tychius paleolatus*. Long. 2-5 mill. — *Oblongus, modice elongatus, convexus, supra fulvo-aureus, albido-variegatus, infra albo-cretosus. Rostrum basi vix curvatum, postice attenuatum, aureo-squamosum, apice ipso denudatum, punctulatum, thorace paulo brevius. Antennæ articulo 1^o fomiculi magno, 3-7 breviter subconicis, clava obscura, fusiformi. Prothorax subtransversus, apice constrictus, a latere, versus basin, oblique attenuatus, anterieus modice arcuatus, albo-squamoso 3-vittatus. Elytra basi thorace paulo latiora, non triplo longiora, subparallela, apice obtusa, plaga oblonga utrinque ad scutellum denudata munita, inæquatiter albido-sparsa. Femora omnia ante apicem emarginata.*

Russie méridionale, collection Faust, la mienne.

Se rapproche par la forme et le revêtement du *T. serie-squamosus* de Syrie, mais plus large, plus écourté, plus convexe sur le dos ; le prothorax est plus arrondi latéralement, distinctement rétréci à la base, plus court ; les bandes latérales sont, ici, moins nettes et la bande médiane est élargie aux deux bouts ; les élytres paraissent ornées d'une bande suturale très raccourcie et d'une autre latérale mal limitée, d'un blanc squameux.

14. *Sibinia excepta*. Long. 2-8 mill. — S. var. *Silenes proxima*, et similiter colorata, magis depressa rostro atro, calde tenuiore, basi non incrassato, præcipue differt.

Je sépare du *S. Silenes*, qui n'est réellement qu'une variété pâle du *S. atlantica*, à suture blanche effacée, (d'après plusieurs exemplaires authentiques qui me viennent de Perris), cet insecte provenant de l'Algérie, ayant la même conformation et la même coloration, mais qui ne peut lui être assimilé, à cause de son rostre entièrement noir, beaucoup plus mince que celui de la ♀ de cette espèce, qu'on l'examine de face ou de côté, et de $1\frac{1}{4}$ plus long. L'insecte est moins épais, plus déprimé en dessus, et quand on l'examine de côté, le prothorax et les élytres, jusqu'à leur milieu, paraissent situés sur le même plan, et les élytres sont moins déclives en arrière.

15. **Sibinia Stierlini**. Long. 2,8-3 mill. — *Ovata, brevis, latior, convexa, nigra, antennis tibiisque rufescentibus, supra fulvo-aurea, albo-variegata, infra dense cretaceo-squamosa. Rostrum validum, arcuatum, thorace longitudine subæquale, atrum, squamosum, rugoso-punctatum, apice attenuatum. Antennæ oriculo funiculi 1^o elongato, cæteris gradatim paulo latioribus, clava ovata. Prothorax convexus, brevis, apice late constrictus, a latere valde rotundatus, vitta irregulari media et lateribus albo-squamosis. Scutellum oblongum. Elytra basi thorace vix latiora, humeris obtusis, a latere arcuata, apice obtusa, striis tenuibus, plaga communi infra-scutellari et in utraque vitta obliqua discoidali, fulvo-aureis.*

Russie méridionale, reçu autrefois, de M. Becker, sous le nom que je lui ai conservé.

La disposition des bandes des élytres réunies postérieurement et enclosant la tache infra-scutellaire, rappelle un peu celle de la *S. inclusa*; le *S. Stierlini* est bien plus court, de couleur foncée plus sombre; le prothorax est beaucoup plus court, plus arrondi latéralement, plus fortement étranglé antérieurement; les interstries externes sont, ici, tout à fait plans, tandis qu'ils sont élevés chez le *S. inclusa*. Le *S.*

harmonica est autrement coloré, à taches bien plus nettes, la bande oblique n'est pas prolongée antérieurement et réduite à une sorte de croissant. Le *S. tibiella* a la deuxième moitié du rostre rouge et cet organe plus long, moins épais.

16. *Sibinia attalica* var. *scutellaris*.— Je rapporte, comme variété, à cette espèce un exemplaire très frais que j'ai recueilli au Mont-Edough en 1889, et qui me paraît absolument conformé comme le type, si ce n'est que l'écusson est très détaché et que les élytres sont parées d'une large tache blanche triangulaire commune, limitée en dehors par quelques macules brunâtres.

17. *Sibinia distinctirostris*. Long. 2,8 mill. — *S. tibiella forma vestitura et colore subsimilis. Rostrum basi supra longe pluri striatum, elongatius, sat tenue, antice vix crassius, in dimidia postica parte læte rufum. Tibiæ omnes læte rufæ.*

Environs de Bône.

Absolument conforme aux plus petits exemplaires du *S. tibiella*, pour la forme et la coloration, mais ne pouvant lui être rapporté, à cause de la présence de cinq stries longitudinales très nettes partant du front et prolongées jusqu'au milieu de la longueur du rostre qui est lisse et d'un rouge clair à partir de cet endroit, courbé, et d'épaisseur subégale d'un bout à l'autre.

18. *Sibinia fortirostris*. Long. 3 mill. — *Oblongovata, nigra, antennis rostro pedibusque rufis, supra dense pallide fulvo squamosa, vitta media et lateribus thoracis, sutura margine que elytrorum albo-cretaceis. Rostrum sat validum, arcuatum, apice non vere attenuatum, basi albo-squamosum, postice denudatum. Antennæ graciles, articulo funiculi 2º elongato, cæteris gradatim brevioribus, ultimis*

transversis, clavâ angusta, subellipticâ, concolore. Prothorax transversus, apice constrictus, a latere rotundatus. Scutellum minutum, triangulari-elongatum, depressum. Elytra thorace basi paulo latiora, a latere subparallela, apicem versus subacuminata, tenuiter striata, interstitiis planis.

Russie méridionale, reçue de M. Becker.

Ressemble pour la coloration, au *S. attalica*, en diffère par sa forme plus étroite, à côtés presque parallèles, par la coloration des élytres, par celle du rostre et des cuisses, par le rostre moins épaissi, par l'étroitesse et la couleur de la massue des antennes.

19. *Sibinia Reitteri*. Long. 3 mill. — *Oblonga, nigra, subdepressa, funiculo antennarum rostro apice tibiis tarsisque rufescentibus, supra dense fulco aureo squamosa, infra albido fulco que picta. Rostrum crassius, modice arcuatum. Antennæ tenues, articulo funiculi 1^o nigro, crassiore, 2^o et 3^o paulo elongatis, cæteris brevioribus, clava ovata. Prothorax transversus, a latere vix arcuatus, apice constrictus et profunde impressus, medio anguste lateribus late albo-cittatis. Scutellum latum, triangulari, depressum. Elytra thorace basi latiora, vix triplo longiora, a latere subparallela, apice obtusa, sutura basi obscuriore, striis angustis in fundo squamulis linearibus seriatis.*

La coloration, surtout celle du prothorax, rapprocherait cette espèce de *S. attalica* et congénères ; la forme oblongue, bien plus allongée rappelle, plutôt, le *S. planiuscula* mais il est moins allongé que cette espèce, le rostre est autrement conformé, la coloration est tout autre.

J'ai reçu cette espèce de M. Reitter. L'étiquette porte cette indication : Caucasus, Araxes, Leder.

20. *Sibinia asiatica* (σ). Long. 2 mill. *Ovata, fulvo-aureo squamosa, antennis, tibiis tarsisque ferrugineis. Ros-*

trum crassius, a basi valde arcuatum, nigrum. Antennæ tenues, funiculi articulis linearibus. Prothorax convexus, a latere valde rotundato-ampliatum, basi oblique attenuatus, antice profunde impressus, linea angusta media, antice interrupta, albo-squamosa, ornatus. Elytra litura infra scutellari apice transversim dilatata, nigro velutina ornata. Femora valde clavata.

Syrie.

Le *S. primita*... des auteurs (?) car je défie qu'on puisse appliquer sûrement, à l'espèce généralement répar- due sous ce nom, la description de Herbst, pas plus que la figure qu'il donne du *primita*, où, entre parenthèse, la *tache suturale claviforme n'est pas représentée* (1) est très voisin de cette espèce, mais chez le *primita*, la tache infra-scutellaire suturale des élytres est d'un roux de même nuance que le fond du prothorax et, sauf chez la variété *variata*, où elle devient presque linéaire, elle offre l'apparence de deux lobes élargis, le postérieur non ou à peine plus dilaté que l'antérieur ; le prothorax est légèrement régulièrement arqué latéralement, subdéprimé, situé, vu de profil, sur le même plan que les élytres ; chez le *S. asiatica*, la bande bilobée d'un noir velouté, bien plus foncée, par conséquent, que le fond du prothorax qui est roux, est fortement dilatée postérieurement, du double, au moins, plus large vers son extrémité qu'à la base. Le prothorax est fortement dilaté latéralement, un peu en avant, distinctement rétréci en arrière, beaucoup plus convexe, à dépression intra-apicale bien plus éloignée du bord. Le rostre ♂ est bien plus courbé dès la base, plus épais que chez le même sexe du *S. primita*.

21. *Sibinia amplithorax*, var. *uniformis*. *Supra*

(1) On peut y voir un *tychius* quelconque à pattes rousses ou toute autre chose.

fulva, immaculata; callo humerali elytrorum scutello que albo squamosis.

Teniet-el-Haâd, un seul exemplaire.

Cette forme est plus large et plus courte que la forme typique, le rostre plus court, plus épaissi vers la base. Le reste ne m'a pas présenté de différence appréciable.

22. *Sibinia modesta*. Long. 2-3 mill. *Oblonga, minus elongata, supra depressa, nigra, rostro apice antennis pedibusque pallide rubris, opaca, supra pallide virescens, infra albo-squamosa. Caput convexum, post oculos transversim strigosum. Rostrum sat validum, curvatum, basi calde crassius, apice attenuatum, antice dense squamosum, postice denudatum ac punctulatum. Antennæ breviores, breviter ciliatæ, funiculi articulo 1^o inflato, elongato; 2^o gracile, sequentibus gradatim latioribus, brevioribus, clava oblonga. Prothorax transversus, a latere non vere arcuatus, margine antica profunde transversim impressa. Scutellum triangulare. Elytra a basi paulo attenuata, anguste parum distincte striata, interstitiis serie-setulosis, sutura humerisque albescentibus. Pedes sat graciles, femoribus inermibus, anticis solis clavatis, tibiis subrectis.*

Syrie, Jéricho.

Cette espèce est très voisine du *Sibinia Reichi*, dont M. von Heyden a eu l'obligeance de me communiquer un exemplaire typique.

Elle en diffère, en outre de la forme plus déprimée, en dessus, et de la coloration d'un cendré verdâtre, uniforme, sans bandes plus foncées au prothorax, par le rostre beaucoup plus épais, distinctement atténué de la base au sommet; par le premier article du funicule des antennes fortement épaissi, par les poils squamiformes du dessus de forme plus allongée sur les élytres, formant une couche très compacte, tandis qu'ils sont un peu soulevés chez le *Reichei*; par les élytres moins raccourcies, à séries de soies squa-

miformes bien plus espacées et par les intervalles tout à fait plans, tandis qu'ils sont un peu élevés, surtout extérieurement, chez ce même insecte.

23. *Sibinia planiuscula*. (HEYDENI Tourn.) var. *rotundicollis*. — *Prothorax valde convexus, a latere distincte rotundato-ampliatu basi, attenuatus, elytris non angustior. Elytra a latere distincte arcuata, sutura callo que humerali albescentibus.* — Alger. (M. Savin de Larclause).

Cette variété, si ce n'est une espèce propre, diffère de la forme typique par l'ampleur du prothorax, la convexité du dessus, les élytres non parallèles latéralement, arquées presque dès l'épaule. La coloration est d'un cendré blanchâtre.

24. *Sibinia fulvo-aurea* (σ). — Long. 2, 5 mill. — *Oblonga, minus elongata, subconvexa, fulva, thorace pectore que obscuris, antennis pedibusque pallidioribus, supra minus dense fulvo-aureo squamosa, infra cretacea. Frons obsolete impressa. Rostrum thorace paulo brevius, apice attenuatum, longitudinaliter striolatum. Antennæ graciles, funiculi articulo 1^o longitudine 2-sequentibus subæquale, 2^o subconico, cæteris brevioribus, vix crassioribus, clara sub-oblonga, crassiuscula. Prothorax transversus, apice ipso constrictus, a latere subparallelus. Elytra thorace latiora, ante medium postice obtuse attenuata, humeris nullis, minus distincte striato-punctata. Femora inermia, parum clavata. Tibiæ anticæ intus arcuatæ.*

Algérie.

25. *Sibinia subpigilera* (σ) Long. 2,5 mill. — *Oblongiorata, rufa, pectore abdomine que nigris, antennis pedibusque rufis, supra pilis griseis crassioribus, infra squamulis oblongis, albido subcyanescentibus parum dense vestita. Rostrum thorace fere brevius, apice attenuatum, valde arcuatum, minus dense punctulatum, in tertia parte postica nitidum. Antennæ minus tenues, articulo 1^o funiculi incrassato, 2-sequentibus fere brevioribus, 2^o suboblongo, cæteris submoniliformibus, clara ovata, brevioribus.*

Prothorax subtransversus, apice constrictus, a latere parum arcuatus, crebre punctatus. Elytra thorace latiora, a latere arcuata, humeris prominulis, anguste striato-punctata. Femora inermia. Tibiæ anticæ curvatæ.

Algérie.

Ressemble à l'espèce précédente pour la forme générale et la coloration. La vestiture est très différente, étant, chez le *subpiligera*, formée, en dessus, de poils épais, d'un cendré mat, disposés longitudinalement, au lieu de squamules dorées. Le dessus, vu de profil, offre, dans le sens de la longueur, une courbe à peu près régulière, tandis que les élytres sont bien plus convexes en arrière chez le *fulvo-aurea*, avec la moitié antérieure du prothorax subdéprimée; le rostre ne présente pas de stries ou fines-cannelures longitudinales et est lisse au bout, sur une plus grande étendue. La structure des antennes est différente, surtout la massue; elles sont bien moins grêles, à funicule moins filiforme. Le prothorax est légèrement, distinctement, arqué latéralement, (et la courbe se continue jusqu'aux angles postérieurs), au lieu d'être presque en carré transverse, à côtés latéraux presque droits.

23. Sibiria Thierryi. Long, 1,8 mill. *Oblonga, minus elongata, opaca, supra obscure ferruginea, rostro, antennis pedibusque rufis, dense cinereo-fulvo infra albido-squamosa. Rostrum capite thoraceque longitudine vix æquale, sat tenue, antice vix crassius, apice paulo attenuatum, basi squamosum, postice nitidum. Antennæ graciles, funiculi articulo 1^o elongato, incrassato, cæteris brevibus, angustis, clata subovata. Prothorax transversus, dorso convexus, ante apicem transversim impressus, a latere vix arcuatus, medio basi triangulariter albo-squamosus. Elytra thorace latiora, duplo et ultra longiora, a latere vix arcuata, squamis fulvis latioribus vestito. Pedes modice elongati, femoribus clavatis.*

Algérie, province de Constantine, communiqué par M. Théry à qui la faune de l'Algérie est redevable de plusieurs découvertes très intéressantes.

Cette espèce, l'une des plus petites du genre, se distingue aisément à sa coloration, à la forme et à la disposition des petites écailles des élytres, bien plus larges que celles du prothorax, impressionnées dans leur centre, (vues à un fort grossissement), et disposées en deux séries longitudinales sur chaque interstrie. Chez un exemplaire, le prothorax est parsemé de soies squamiformes épaisses, blanchâtres, avec une série de soies analogues le long de chaque interstrie des élytres.

24 Sibinia Abeillei (♀). Long. 4 mill. *Ocata; suboblonga, nigra, tarsi rufescentibus, supra pilis crassioribus cinereovirescentibus indutus, infra cretaceo-squamulata. Caput convexum, oculis non prominulis. Rostrum dimidio corpore longius, subcylindricum, postice attenuatum, apice nitidius, punctato-strigulosum, basi modice arcuatum, postice rectum. Antennæ nigrae, basi obscure ferrugineae, funiculi articulis 2-primis valde elongatis; 3^o oblongo, 4-7 gradatim latioribus, clava ocata. Prothorax convexus, elytris vix angustior, a latere rotundato-amplius. Scutellum triangulare. Elytra thorace non triplo longiora, humeris non elevatis, a latere arcuata, striis angustis, punctatis, interstitiis planissimis. Pedes elongati, femoribus minus clavatis, dense squamosis, tibiis leviter bisinuatis, apice dilatatis, posticis supra ante apicem emarginatis.*

Syrie, Anti-Liban, Zibedani, à une grande hauteur, d'après M. Abeille de Perrin qui l'a découverte, et qui a bien voulu m'abandonner son deuxième exemplaire.

De la taille des plus grands *S. cana*, à teinte légèrement olivâtre; rostre beaucoup plus long que chez la ♀ de cette espèce, dilaté antérieurement, vu de profil; vestiture un peu plus épaisse en dessous; cuisses revêtues de squamu-

Les blanchâtres analogues à celles du dessous, tandis que chez le *Sibinia cana*, elles sont couvertes, peu densément de poils grisâtres semblables à ceux du dessus. Prothorax bien plus ample, plus arrondi latéralement ; la forme des tibias est très différente chez le *S. Viscariæ* qui est bien plus allongé, le rostre ♂ n'atteint, (étant replié en arrière), que le niveau des hanches intermédiaires ; il est bien plus épaissi vers la base, et le prothorax est bien moins large que les élytres.

25. *Sibinia Viscariæ* var. *lugdunensis*. *Supra pilis crassioribus, infra squamis argenteis vestitus.*

Plusieurs exemplaires de cette variété, assez différente, à première vue, de la forme typique et provenant des environs de Lyon, étaient indiqués dans la collection Grilat sous le nom inexact de *tibialis* qui est une espèce tout autre.

26. *Sibinia brevinasus*. Long. 3 mill. *Oblonga, subelliptica, nigra, tarsi rufi, supra dense olivaceo-subsquamosa, infra, in abdomine laxius cretacea. Rostrum sat validum, curvatum, thorace vix brevius, subcylindricum, apice denudatum. Antennæ obscure ferrugineæ, funiculi articulo 1^o elongato, cæteris brevibus. Prothorax transversus, elytris vix angustior, antice leviter arcuatim attenuatus, margine antico anguste reflexo. Scutellum subpunctiforme. Elytra angustiora, modice elongata, a latere subparallela, humeris distinctis, vix callosis, tenue striatopunctata. Pedes albo-squamosi.*

Algérie.

Extrêmement voisin de *S. curtirostris* Tourn., même coloration ; n'en diffère que par les caractères suivants : Tête plus grande. Rostre bien plus épais, un peu plus long, plus distinctement courbé, égalant, presque, en longueur, le prothorax. Prothorax presque de la largeur des

élytres, plus arrondi latéralement près des angles postérieurs, ce qui fait paraître les épaules des élytres non saillantes, tandis qu'il est distinctement plus étroit, avec les épaules un peu proéminentes chez le *curtirostris*.

27. **Sibinia consanguinea** (♂). Long. 3,5 mill. — *Oblongo-subelliptica, minus angusta, convexiuscula, nigra, supra virescenti pubescens, infra, in pectore densius, cretacea. Rostrum crassum, curvatum, pubescens, apice ipso denudatum ac rufescens, vix attenuatum, thorace non longius. Antennæ minus graciles, piceæ, scapo clava que nigris, articulis funiculi 2 primis elongatis, illo crassiore, 3^o subconico, cæteris gradatim brevioribus, latioribus, clava ocata. Prothorax convexus, ante apicem, late transversim impressus, a basi ad apicem paulo attenuatus. Scutellum suboblongum. Elytra thorace basi vix latiora, humeris non prominentibus, a basi paulatim modice attenuata, striis angustis, interstitiis planis. Pedes femoribus clavatis, inermibus, tarsis rufescentibus, inguiculis approximatis.*

Algérie.

Coloration du *Viscaria*, prothorax à peu près de même forme, mais rostre bien moins long. Elytres oblongues, subelliptiques, à peine plus larges que le prothorax; pas de tache soyeuse pâle sur le calus huméral. Ecusson non triangulaire.

Ne peut être confondu avec *subellipticus*, (Perrisi Tourn.), (que certains entomologistes ont réuni à tort au *fugax*, sans connaître, peut-être, ni l'un ni l'autre) : ce dernier étant étroit, allongé, très rétréci aux deux bouts, à prothorax relativement fort long. Il se rapproche davantage du *brevinasus*, mais le rostre est moins court, l'écusson est deux fois plus grand, le rebord antérieur du prothorax est beaucoup plus large, etc. Le *fugax* a le prothorax bien plus long, le rostre beaucoup plus allongé, moins épais, etc.

28. Miccotrogus Damryi Long. 3 mill. — *Oblongus, minus elongatus, niger, antennis, (clava infuscata,), rostro apice tibiis tarsisque rufis; supra albidus vel flavescens, infra dense cretaceo-squamosus, prothorace medio brunneo-aureus. Rostrum arcuatum, basi incrassatum, apice subulatum, postice denudatum et vix punctulatum. Antennæ minus tenues, ciliatæ, funiculi articulis 2-primis elongatis, illo longiore, ultimis transversis, clava oblonga. Prothorax convexus, a latere rotundatus, angulis posticis obtusis. Elytra minus parallela, ante medium a latere leviter arcuatim attenuata.*

Sardaigne, reçu de M. Damry.

Très voisin du *M. capucinus*, ayant à peu près la même coloration; une tache ovale au milieu du prothorax, rarement dilatée transversalement en avant; une bande pâle latérale aux élytres. Le rostre est un peu plus épaissi à la base chez le *M. Damryi*; la massue des antennes est, ici, rembrunie, tandis qu'elle est concolore chez le *M. capucinus*; ces organes sont visiblement moins grêles, à articles plus courts. Le prothorax est plus fortement dilaté latéralement; les élytres, moins longues, sont moins atténuées en arrière tout en étant moins parallèles latéralement, ayant leur plus grande largeur vers le milieu, et non au niveau de l'épaule.

Les insectes de ce petit groupe ayant été confondus par les auteurs anciens et la synonymie qu'en donnent les catalogues plus récents étant inexacte, je crois devoir résumer leurs caractères dans un petit tableau synoptique et rectifier cette synonymie d'après les descriptions et après avoir vu les types des auteurs.

1. Elytra extus late brunneo-cincta. Prothorax in dimidia parte antica fascia brunnea, infra tridentata, ornatus. Clava antennarum omnino nigra.

MONACHUS Chevr.

— *Elytra extus non brunnea. Prothorax macula longitudinali media ovata, brunneo-ferruginea, plus minuste dilatata, ornatus. Clava antennarum vel infuscata, vel concolor.* 2.

2. *Angustior, elytris valde elongatis, parallelis. Prothorax elytris evidenter angustior. Clava antennarum fuscescens.* CAPUCINUS Boh.

— *Lator, minus elongatus, elytris a latere subarcuatis, medio latoribus, post medium attenuatis. Prothorax elytris latitudine fere æqualis. Clava antennarum rufa.* DAMRYI Db.

SYNONYMIES.

1. **capucinus** Boh. Sch. VII, (2), p. 312 (1).

signaticollis Chevr. Rev. zool. 1859, p. 301.

molitor Chevr. l. c. p. 301.

discoideus Db. Soc. Belg. Tychiides, p. 21.

2. **Damryi** Db. (*vide supra*).

3. **monachus** Chevr. Rev. zool. 1859, p. 300.

capucinus var. B. Boh., p. 312.

Le *Miccotrogus nigricollis* Chevr., ainsi qu'on l'a reconnu depuis, est un *Tychius*. Sa coloration passant du noir au cendré est très variable et a fait croire à l'existence d'espèces différentes. On en a réuni plusieurs avec raison, mais il en reste quelques autres qui devront peut-être ne constituer que des variétés d'un même type. Ainsi, le *T. conspersus* Rosenh., dont je ne connais que la description, doit en être très voisin, mais il aurait les élytres parsemées de macules blanches et la suture et les côtés d'un brun cendré. Le *T. suturatus* Perris doit se rapprocher aussi du *T. nigricollis*, mais il en différerait, d'après la description, par le rostre noir, par les stries des élytres plus distinctement ponctuées et par la présence d'une double série de soies couchées sur chaque interstrie.

Le *Tychius trimacula* Rosenh., que Chevrolat rapproche de son *nigricollis*, mais sans indiquer les différences entre les deux espèces et que le **Catalogus Coleopterorum**

(1) Et non 412, ainsi que l'indique le Catalogue de Marscul et après lui celui de M. Reitter.

Europæ 1891 fait figurer parmi les *PACHYTYPHIUS* : « antennis rostro que ferrugineis... prothorace maculis tribus rotundis albidis notato, una ante scutellum, duabus lateralibus in medio prothoracis... elytris lineatim albido-variegatis », me paraît être une variation du *T. bellus* Kirsch, chez lequel on remarque outre la tache basale, une tache blanche vers le milieu de la largeur du prothorax, ordinairement transverse mais de forme assez variable. C'est à tort que ce *T. bellus*, espèce rare, confondue avec les exemplaires de la variété *decoratus* du *striatellus* dont elle a la coloration, a été réunie au même catalogue, comme variété, au *fuscolineatus*, et c'est à tort également que ce dernier, de même que le *deliciosus* Perris, sont séparés spécifiquement du *striatellus*. On trouve tous les passages entre les différentes formes.

Mais le *T. Olcesei*, dont je possède des exemplaires authentiques de Tanger et d'Espagne, doit être maintenu comme espèce propre. Il se distingue par sa forme étroite, par l'ampleur du prothorax, aussi large que les élytres, et caréné antérieurement longitudinalement et par les soies des élytres plus dressées, plus abondantes.

Le *T. bellus* se distingue des variétés foncées et à bandes alternes brunes du *striatellus* par le rostre moins fortement, plus brièvement subulé, roussâtre seulement à l'extrême pointe, par la structure différente des antennes, par les tibias minces, peu dilatés postérieurement, parcimonieusement pubescents, tandis qu'ils sont assez larges, dilatés et très densément recouverts de poils hispides chez le *fuscolineatus*. En outre, la tache prothoracique médiane est plus ou moins oblongue, parfois même prolongée plus étroitement antérieurement et la tache latérale est rarement avancée en dessus chez le *fuscolineatus*, tandis que la première, plus réduite, affecte toujours une forme subtransverse, et la deuxième s'étend, en dessus, jusque vers l'angle antérieur du prothorax, chez le *T. bellus*.

PARATRACHYPHLOENS nov. gen.

Corpus subglobosum, squamosum, setulosum.

Caput infra oculos transversim impressum. Oculi minuti, laterales.

Rostrum breve, subquadratum, supra postice impressum, scrobibus sublinearibus, lateralibus.

Antennæ breves, scapo curcato, abrupte clatato, funiculo 5-articulato, 1° conico, elongato, 2° sublineari, 3 5 sublenticularibus, gradatim latioribus, clava ovata.

Prothorax brevis, a latere dilatato-subangulatus, apice medio subelevatus, supra pluri-impressus.

Scutellum indistinctum.

Elytra globosa, basi oblique separatim truncata, apice abrupte declivia, humeris obliquis, substriata.

Pedes breviores, sat graciles, femoribus brevioribus clavatis, inermibus, tibiis ciliatis, anticis ante apicem supra uni-dentatis, apice digitatis, tarsis angustis, articulo 1° elongato, sequentibus brevibus, 3° bilobo, unguiculis simplicibus, connexis.

Abdomen 5-articulatum, suturis subrectis, segmentis 3 et 4 brevioribus, ultimo apice rotundato.

Coxæ antice contiguæ, intermedicæ vix separatæ, posticæ valde distantes.

Ce genre a quelque analogie avec le genre **Trachyphloens**, par la structure des diverses parties, surtout celles des pattes. Il en diffère essentiellement par le funicule qui n'a que cinq articles.

29. Paratrachyphloens variegatus. Long. 2 mill. — *Obscure ferrugineus, subtus, antennis pedibusque pallidioribus, supra variegatim brunneo cinereoque squamosus, breviter parce setulosus, infra. in abdomine parce squamosus. Antennæ brevissime ciliatæ. Rostrum paulo declive,*

subplanum, antice paulo attenuatum. Prothorax longitudine duplo latior, basi et apice valde constrictus. Elytra humeris rotundatis, striis minus distincte punctatis, interstitiis interdum paulo convexis.

Maroc.

30. Strophosomus (Nellocarus) sagittiformis. Long. 5-6 mill. — *Elongatus, niger, dense cinereo-subflavescente squamulatus, parce brevissime setulosus, antennis pedibusque rufis. Caput longitudinaliter sulcatum, ante oculos subarcuatim strigatum, hirsutum, oculis non vere angulatis. Rostrum basi incrassatum, supra planum, æquale, latitudine maxima non longius. Antennæ graciles, parcius ciliatæ, funiculi articulis 2-primis longitudine subæqualibus, cæteris præcedentibus fere duplo brevioribus, leviter nodosis, clava subovata. Prothorax brevis, antice et apice attenuatus, sat fortiter inæqualiter punctatus. Elytra basi contracta et anguste marginata, a latere inæqualiter striato-punctata, interstitiis alternis distinctius convexis. Femora inflata, inermia. Tibiæ subrectæ, intus longius parcius ciliatæ.*

♂ Oculi obtusissime vix subangulati. Prothorax angustior, basi magis attenuatus. Elytra angustiora utrinque attenuata.

♀ Oculi rotundati. Prothorax latior, apice minus attenuatus. Elytra latiora, humeris minus ecanescentibus antice ampliora.

Abbaye de Font-froide, près Carcassonne, Aude, sur *Erica arborea*, communiqué par M. Gavoy Louis.

Très voisin de *sagitta*. Le ♂ est plus étroit dans toutes ses parties que chez cette espèce. Les yeux sont, ici, plus petits, un tant soi peu anguleux, tandis qu'ils sont tout à fait arrondis chez le *S. sagitta* ♂. Le dernier article du funicule des antennes, chez ce dernier, est aussi large que long et la massue est elliptique, peu épaissie. Le protho-

rax est moins fortement rétréci en arrière chez la ♀ de *sagitta*; les yeux sont moins saillants; les élytres sont coupées obliquement au dessous des épaules, au lieu d'être arrondies à ce point. On n'aperçoit pas chez le *sagittiformis* les gros points ocellés, très distincts sur les flancs du prosternum du *sagitta*, la ponctuation des côtés du prothorax est plus faible. La coloration est à peu près la même chez les deux espèces, avec des traces de squamules métalliques en dessous et sur les côtés

31. **Bradybatus Delagrangi** (♂). Long. 4 mill. — *Obcuneiformis, ferrugineus, capite pagina que infera nigris, minus dense parum tenuiter griseo-pubescens. Caput subconicum, infra oculos transversim impressum, postice parcius punctatum, oculis depressis. Rostrum sat robustum, subcylindricum, capite duplo longius, paulo arcuatum, punctatum, (punctis setigeris), basi obsolete strigatum. Antennæ sat tenues, funiculi articulo 1^o elongato, cæteris brevibus, pressis, clava subelliptica, concolore. Prothorax subquadratus, apice constrictus ac impressus, angulis posticis rectis, punctis magnis, paucis, piligeris. Scutellum minutum, suboblongum, albo-squamosum. Elytra basi subtruncata, thorace paulo latiora, humeris vix prominentibus, angustius striato-sulcata, interstitiis dorso planis, antice angustioribus, subconvexis, sub-serie punctatis, griseo-pilosis. Pedes crassiores, femoribus anticis valde clavatis, intus dente sat valido, cæteris spina brevi armatis, tibiis anticis intus ad medium angulatis, tarsis modice elongatis, unguiculis appendiculatis. Abdomen laxè pilosum, segmento ultimo impresso.*

Akbès, Asie mineure, rapporté par M. Delagrange, de son dernier voyage, et communiqué par M. Pic, qui a bien voulu me céder son deuxième exemplaire.

Assez voisin du *B. elongatulus*, même coloration. En diffère par le dessus bien plus densément et uniformé-

ment pubescent, sans trace de la bande médiane étroite du prothorax et de la fascie ondulée transverse des élytres qu'on remarque chez le *B. elongatulus* ; par la ponctuation beaucoup moins serrée du prothorax, par le peu d'épaisseur du funicule des antennes, par les tibias antérieurs plus minces et presque droits sur leur tranche supérieure, etc.

32. *Apion niloticum*. Long. 2,3 mill.—*Ovatum, nigrum, antennis pedibusque brunneis, dense sub-inordinatim albosquamosum, subfarinosum. Caput subtransversum, oculis non prominulis. Rostrum curvatum, thorace vix longius, apice attenuatum. Prothorax subquadratum, in tertia parte antica constrictus, indistincte punctulatus. Antennæ graciles, articulo 1^o funiculi incrassato, clava subovata. Elytra striato-punctata, interstitiis internis planis. Onychium articulis 2-præcedentibus elongatius, unguiculis basi obsolete dentatis.*

Egypte, de la collection Tournier, communiqué par M. Pic, qui a bien voulu m'en céder un exemplaire.

A placer à la suite de l'A. *Kirschi*.

33. *Apion brevipilis* (♀). Long. 3 mill.. — *Ovatum, obscure-viridi-metallicum, antennis pedibusque piceis, griseo-setulosum. Caput longitudinaliter strigosum. Rostrum ♀ longitudine capiti thoracique æquale, cylindricum, nigro-purpurascens. Antennæ articulo funiculi 1^o oblongo. Prothorax subquadratus, basi sulcatus, punctis subrotundis insculptus. Elytra sulcato-punctata, interstitiis latioribus, subplanis, pilis erectis, brevissimis, seriatis.*

Oran, de la collection Grilat, où il était inscrit sous le faux nom de *rugicolle*.

A placer à la suite de l'A. *Grenieri*.

34. *Apion Delagrangi*. Long. 2,2 mill. — *Ovatum, nigrum, opacum, antennis basi pedibusque læte rufis, sat*

dense in elytris subseriatim griseo-pubescentis. Rostrum in ♂ brevius, in ♀ capite thoraceque non longius, crassiusculum, punctatum, modice arcuatum. Antennæ scapo et articulo 1° funiculi incrassatis, cæteris gracilibus, clava ovato-elliptica. Prothorax transversim antice constrictus. Elytra sulcato-punctata, interstitiis striis vix latioribus. Femora nigro maculata.

Akbès, reçu de MM. Pic et Staudinger, et rapporté par M. Delagrange de son dernier voyage.

A placer à la suite de l'*A. holosericeum*.

35. Cionus parce-notatus. Long. 4-5,5 mill. — *C. Olens forma, colore et pubescentia proximus. Antennæ testaceæ, clava nigra. Elytra macula orbiculari scutellari integra maculisque non nullis parvis subpunctiformibus, velutinis, ornata. Rostrum longius, apice supra subampliatum. Prothorax subtrapeziformis, antice vage impressus. Femora obscura, dentata, dente in ♀ minore.*

Akbès, rapporté par M. Delagrange, et communiqué par MM. Pic et Staudinger.

Généralement plus grand que le *C. olens*, de même forme et de même coloration, il en diffère par le rostre plus long, de même largeur ou un peu plus élargi, vu de face, à partir du milieu; par la massue les antennes et cuisses toujours foncés, par la dépression du 1/3 antérieur du prothorax très faible, tandis qu'elle est très prononcée chez le *C. olens*; par la tache veloutée située vers le deuxième tiers de la suture arrondie, pleine, jamais formée de deux taches juxta-posées et par la présence de plusieurs autres taches plus petites, de même nature, très peu nombreuses, situées surtout sur la moitié externe de l'élytre et près du calus huméral, d'où s'échappent de petites soies épaisses, de la couleur de ces taches.

Assez voisin du *C. Merkli* de Turquie, pour la coloration et la pubescence; mais, chez ce dernier, le prothorax

est plus petit, fortement impressionné en avant, les antennes ont la pubescence plus courte, les cuisses sont beaucoup plus fortement dentées, les interstries des élytres sont légèrement élevés, tandis qu'il sont tout à fait plans chez le *C. Merkli*, etc.

36. *Thylacites Letourneuxi*. Pic in litt. — Long. 8 mill. — *Oblongo-ocatus, crassus, convexus, niger, opacus, dense squamosus, albo-fulvo que lineatim obsolete variegatus, squamis subrotundatis. Caput sat convexum, oculis non vere prominentibus. Rostrum subquadratum, supra planiusculum. Antennæ piceæ, funiculi articulis oblongis. Prothorax transversim basi et apice subæqualiter constrictus, a latere modice rotundatus, subrectilineatim fulvo-obsolete trilineatus. Elytra basi elevata, thorace triplo et ultra longiora, a latere arcuata, humeris rotundatis, apice acuminata, punctato-extus paulo profundius striata, interstitiis convexis, apicem versus breviter parce setulis reclinatis munitis. Pedes validi, tibiis sublineari-bus, tarsis dilatatis, Onychio elongato.*

Egypte.

J'ai reçu cet insecte de M. Pic sous le nom de *Letourneuxi* que j'ai été heureux de lui conserver. Il provient des chasses faites sous la direction du regretté Letourneux et faisait partie de la collection Leprieur. M. Letourneux, dont j'ai fait la connaissance à mon passage à Alger, était d'un désintéressement rare, passant une partie de son temps à recueillir des objets d'histoire naturelle appartenant aux branches de cette science, en dehors de celle dont il s'occupait lui-même. Les naturalistes qui venaient en Algérie étaient certains de rencontrer chez lui l'assistance la plus dévouée et tous les renseignements dont ils avaient besoin pour diriger leurs excursions.

37. *Thylacites maroccanus*. — Long. 5,5-6 mill. — *Oblongus, niger, antennis pedibusque obscure ferrugineis, dense æreo-squamosus, nitidus. Oculi non prominuli. Rostrum brevis-*

simum, quadratum, basi sulcatum, punctatum, longius setose-hirsutum. Antennæ graciles, setulosæ, articulo funiculi 1^o elongato ; 2^o latitudine longiore, cæteris brevibus, clava subovata. Prothorax angustior, longitudine vix latior, a latere vix arcuatus, ante apicem impressus, basi et apice vix coarctatus, medio longitudinaliter sulcatus, breviter parce hirsutus, brunneo 3-vittatus, crebre sat profunde punctatus. Elytra thorace multo latiora, basi subtruncata, humeris elevato-rotundatis, a latere fere parallela, tenuiter lineatim punctata, setis reclinatis brevibus parce hirsuta, apice breviter subacuminata, ante apicem obsolete albo-punctata, æneo griseoque variegata. Pedes femoribus ante apicem intus subemarginatis, tibiis linearibus, parce setosis, apice parcissime pectinatis, tarsis modice dilatatis.
Maroc, Tanger.

Ressemble un peu au *T. variegatus* par la ponctuation du prothorax qui offre une apparence granulée, par suite du rapprochement des points profonds ; beaucoup plus petit, à reflet métallique prononcé, à élytres distinctement tachetées, à soies beaucoup plus courtes et non recourbées. Le prothorax est étroit et non dilaté latéralement.

38. Thylacites dispar. ♂ — Long. 4-5 millim. — *Suboblongus, minus convexus, niger, dense cretaceo a latere densius squamosus, in capite ac rostro longius, in elytris brevissime parce sublineatim setosus. Oculi prominuli. Rostrum transversum, subquadratum, medio longitudinaliter sulcatum. Antennæ brevioris, funiculi articulis ultimis moliniformibus, clava oblonga. Prothorax parum æqualis, medio vix distincte sulcatus, antice late profunde transversim impressus, dense sat fortiter punctatus, medio vitta brunnea dilatata ornatus. Elytra minus elongata, humeris rotundatis, minute seriatim punctata, apice obtusa, interstitiis paulo elevatis, squamulis depressis, parcissime apicem versus, breviter setosis, retro inclinatis. Tibiæ lineares, setulosæ.*

♀ latior, magis convexa, elytris æqualiter densissime cretaceo-squamosa, squamis impressis.

Algérie, Boghari, Mecheria, communiqué par MM. von Heyden et Pic.

La coloration de la ♀ de cette espèce rappelle un peu celle du *T. aurovittatus*, mais bien plus courte, beaucoup moins pubescente ; se reconnaît facilement à son prothorax court et fortement impressionné en avant, et à la coloration très différente des deux sexes.

Le *T. biskrensis*, qui se rapproche davantage de la ♀ du *T. dispar*, par sa forme courte, a les yeux peu saillants, le rostre bien moins large et un peu conique ; les écailles des élytres sont un peu détachées et forment une couche moins compacte.

39. Thylacites Sicardi. Long. 5-6 mill. — *Oblongus, niger, subconvexus, antennis pallidis, pedibus obscure rufis, dense cinereo-flavescente squamosus, brunneo-maculatus. Caput post oculos depressum, oculis modice prominulis, brunneo-hirsutum. Rostrum transversim subquadratum, medio sulcatum. Antennæ funiculi articulis 1^o latitudine vix longiore, incrassato, cæteris moniliformibus, ultimis transversis, clava ovata. Prothorax subtransversus, basi et apice constrictus, antice transversim impressus, a latere modice ampliatus, brunneo-subtrivittatus, vitta media subrhomboidale, brunneo parce hirsutus, sat tenuiter punctatus, squamis subelevatis. Elytra basi subtruncata, humeris rotundatis, a latere subparallela, apice obtusa, setis albidis brevioribus, non vere incurvis, subseriatis, prædita, parum distincte minute seriatim punctata, interstitiis extus, in mare magis elevatis. Pedes elongati, albo-pilosi, parcius albosquamosi, tibiis anticis in ♀ sublinearibus, in ♂ intus sinuatis, apice pallide-pectinatis.*

Tunisie, Gabès ; découvert par M. le docteur Sicard qui m'a toujours fait part très largement de ses récoltes dans notre Colonie.

La ♀ se rapproche de *dispar*, mais la forme est, ici, plus allongée, moins convexe, à côtés parallèles ; le prothorax est bien moins court, à peine transverse, les soies sont plus longues et plus abondantes ; la massue des antennes est de couleur pâle et transparente et les pattes sont entièrement roussâtres.

40. **Rhytirhinus simplicicostis.** Long. 5,5 mill. —

R. dilatatus proximus forma et colore, paulo angustior. Frons elevatione non tere tuberculata. Rostrum paulo angustius. Prothorax subquadratus, antice non tere dilatatus, fere similiter impressus, fossis anticis parum profundis indistincte punctatis, lobo antico paulo producto, a latere, medio, vix distincte sinuatus. Scutellum distincte elevatum. Elytra breviora, a latere paulo arcuata, non emarginata, sutura et costis dorsalibus minus elevatis, internis 2-primis basi non callosis, 2° apice tuberculo magno conico prædita, post medium obsolete transversim fasciata. Femora albo-annulata.

Algérie.

Diffère du *R. dilatatus* par la faible élévation de la base du rostre, par le lobe médian antérieur du prothorax presque aussi avancé que la saillie des angles antérieurs, par les fossettes moins profondes et sans trace de gros points; les saillies de ce segment moins prononcées, par l'écusson bien détaché; par les côtes des élytres moins saillantes, la 3° étant même effacée antérieurement, par la base des trois côtes et l'angle huméral sans épaississement. La saillie qui termine la deuxième côte est à peu près de même; le front est couvert d'une couche lisse de squamules, sans granulations distinctes.

Diffère du *R. clitellarius* par le prothorax non distinctement rétréci vers la base, par les saillies épaissies; la marge latérale est en forme de bourrelet interrompu antérieurement; le rostre est peu arqué, au lieu d'être brusquement recourbé. Le *R. socius* a, d'après la description, le prothorax aplani, (au lieu d'être convexe), rétréci vers la base, chargé de quatre tubercules à peine saillants, et la 2° côte des élytres se termine par un petit tubercule.

41. **Rhytirhinus angulipes.** Long. 5 mill. — *Oblongus.*

Caput utrinque antice tuberculo conico instructum, fronte cavata. Rostrum bicostatum, medio sulcatum. Antennæ sat graciles, clava ovata. Prothorax 3-sulcatus, transversim antice valde di-

latatus, 4-fossulatus, lobo antico elevato, postice a latere emarginatus. Elytra sutura costisque tribus antice crenulatis, postice tuberculatis, 2° tuberculo majore instructa, basi elevata, interstitiis biseriatim punctata. Tibiæ latæ, anticæ apice extus prolongato-angulatæ.

Oran.

Rappelle le *R. dilatatus* par la forme générale et surtout par celle du prothorax dilaté en avant; les impressions de ce segment sont plus obtuses; le rostre est bien plus épaissi, plus fortement recourbé; les élytres à soies peu distinctes, ont les côtes distinctement tuberculées dans leur moitié postérieure, avec un gros tubercule au sommet de la 2°, mais surtout les pattes sont beaucoup plus courtes avec les tibias bien plus larges, les antérieurs sinueux et largement angulés en dehors, tandis qu'ils sont linéaires et étroitement arrondis ou tronqués au sommet, chez le *R. dilatatus*.

42. Rhytirhinus papillatus. Long. 5-7 mill. — *Oblongo-quadratum elongatum, Rostrum sulcatum, carinis basi vix elevatis, crassum, curvatum. Antennæ graciles, articulis funiculi primis elongatis, ultimis transversis, clava oblonga. Prothorax 3-sulcatus, sulcis lateralibus arcuatis, costis tribus dense pupillatis, medio a latere minus profunde emarginatus. Elytra parallela, costis acute tuberculatis, plicatis, 2° postice tuberculo majore prædita, sutura postice tuberculis minoribus instructa. Pedes valde elongati, femoribus albo-maculatis, tibiis sublinearibus, apice sub'runcatis, intus breviter angulatis, tarsis angustis*

Espagne. Maroc.

Sa forme et sa sculpture, de même que le peu de saillie du front, rapprochent cette espèce du *R. crispatus*. Elle en diffère par le bord antérieur du prothorax tronqué, par le calus basal de la première côte très prononcé, par les pattes bien plus longues, plus grêles et surtout par les tubercules papilleux nombreux le long des côtes du prothorax. Les

mêmes caractères le séparent des *R. asper* (1), *atticus*, *horridus*, qui ont, en outre, le front distinctement tuberculé.

43. *Rhytirrhinus divaricatus*. Long. 7 mill. — *Oblongo-elongatus. Caput non cornutum. Rostrum late sulcatum, recurvum, angustius, 2-costatum. Antennæ obscure rubræ. Prothorax antice vix dilatatus, a latere obsolete emarginatus, basi et apice sub-trifossulatus, margo antica paulo elavata. Elytra thorace duplo non longiora, subparallela, costis tribus prædita, basi æqualiter elevata, 2^o extus angulatim producta; sutura postice elevata, humeris obtuse angulatis. Pedes sat validi.*

Oran.

Assez voisin du *R. clitellarius* par la forme générale, surtout celle du prothorax, quoique bien moins rétréci à la base, à saillies beaucoup plus élevées; les élytres sont pourvues d'assez longues soies grises, sériees, grossières sur les côtes et sur les intervalles, plus abondantes sur les premières et la forte la saillie anguleuse du sommet de la 2^e côte, dirigée en dehors, ne permet pas de les confondre.

44. *Rythirrhinus brevipennis*. Long. 4-5 mill. — *Oblongus, subquadratus, latus, brevior. Caput breviter bicornutum. Rostrum subrectum, subtus, apicem versus, incrassatum, medio profunde sulcatum, carinis lateralibus acutis. Prothorax longitudine duplo latior et ultra, antice subtruncatus, a latere in medio emarginatus, 3-sulcatus, sulco medio longitudinali a sulco transverso antico interrupto, costis mediis 2-vel 3-tuberculatis, margo antico valde elevata. Elytra basi ad scutellum utrinque subtuberculatim elevata, humeris supra oblique truncatim angulatis, non vere costata, sub-serie acute subæqualiter tuberculata. Pedes breviores, ciliati, tibiis latis, apice vix porrectim extus angulatis.*

Grèce.

(1) A cette espèce doit être rapportée comme variété ♀, le *R. leucofasciculatus*.

Bien reconnaissable à sa forme large et courte. Le *R. atticus*, beaucoup plus grand et plus oblong, se rapproche de cette espèce par les saillies du prothorax et par l'échancrure latérale de ce segment située tout-à-fait au milieu. Elle s'en distingue par le prothorax bien moins court, avancé au milieu, en avant, par la deuxième côte élevée à la base, par le sommet des tibias antérieurs tronqué droit, etc. Se distingue du *R. confusus*, plus petit, à élytres plus longues que larges, par le prothorax avancé en avant au milieu, par la saillie latérale située vers le dernier 1/3 postérieur, par les tibias antérieurs tronqués au sommet, etc.

45. *Rhytirhinus aspericollis*. Long. 6 mill. — *Oblongus, sat elongatus. Rostrum sulcatum, carinis basi obtuse angulatis. Antennæ graciles, articulis funiculi 3-7 transversis, clava oblonga. Prothorax brevissimus, distincte trisulcatus, 6-fossulatus, dense aspere minute tuberculatus. Elytra parallela, latitudine longiora, a latere in medio subemarginata, costis tribus tuberculatis, crenatis ac plicatis, basi elevatis, secunda apice brevissime angulata. Pedes sat elongati, tibiis anticis minus gracilibus, sublinearibus, extus apice oblique subtruncatis, intus angulatis.*

Espagne.

Assez voisin du *R. crispatus* par ses côtes crénelées et les rides des élytres. Tibias bien moins larges que chez cette espèce; bord antérieur du prothorax nullement avancé. Distinct, en outre, de cette espèce, et de toutes les autres voisines par les nombreuses saillies pointues du prothorax.

46. *Rhytirhinus gracilipes*. Long. 5,8 mill. — *Oblongus, caput non cornutum. Rostrum brevius, subsulcatum. Antennæ totæ læte ferrugineæ, funiculi articulis haud nodosis, clava oblongo-elliptica. Prothorax subtrisulcatus ac fossu-*

latus, punctatus. Elytra 3- costata, interstitiis bi-seriatim punctatis. Pedes elongati, graciles, tarsis elongatissimis.

Tanger.

On pourrait confondre cette espèce avec une des nombreuses variétés du *R. longulus* dont elle a la forme. Le rostre est moins épais et plus court; les derniers articles du funicule des antennes, chez cette dernière espèce, sont distinctement moniliformes et la massue est ovale. Chez le *R. gracilipes*, les pattes sont noires, même les tibias, et les tarses sont extrêmement déliés, à articles tous plus longs que larges, contrairement à ce qui a lieu chez le *R. longulus*.

47. *Rhytirhinus humeralis*. Long. 4,3 mill. — *R. Bouvuloiri proximus forma et colore, duplo major, latior. Rostrum sulcatum, lineatim punctatum. Antennarum clava crassior. Prothorax transversus, parum distincte 6- fossulatus, antice profundius impressus. Elytra subquadrata, humeris obtuse extus angulatim porrectis, costis serie-setulosis, Espagne.*

Diffère du *R. Bouvuloiri*, qui me semble n'être qu'une variété du *R. interruptus*, par les côtes des élytres plus élevées, la deuxième calleuse à la base, par les tibias plus densément, plus longuement garnis de spinules et surtout par l'expansion du calus huméral en dehors.

48. *Larinus brevisculus*. Long. 10-14 mill. lat. 5-7 mill. — *Oblongus, brevior, convexiusculus, flavescente-pulvereus, interdum in elytris griseo-maculatus. Rostrum crassius, subrectum, obsolete longitudinaliter carinatum, a latere non sulcatum, apice supra vix ampliatum. Antennæ crassæ, nigræ, articulo 2° funiculi longitudine non brevior, clava inflata. Prothorax brevis, apice constrictus, a latere modice arcuatus, angulis posticis subrectis, pilis hirsutis indistinctis, creberrime punctulatus, punctis majoribus sparsis. Elytra basi separatim arcuata, humeris rotundatis, ab humeris postice parum arcuatim attenuata,*

apice obtusa. Pedes sat validi, tibiis intus paulo sinuatis, apice rotundatis, unco valido intus armatis, tarsis articulo 1° elongato, 2° longitudine duplo brevior, 3° valde dilatato.

Akbès. Reçu de M. Delagrange et de MM. Standinger et Bang-Haas.

Voisin du *L. Scolymi* plus convexe, surtout plus brusquement déclive en arrière. Rostre sans impressions latérales. Antennes noires, bien plus épaisses et à 2° article du funicule non transverse. Elytres légèrement arquées latéralement en s'atténuant à partir des épaules qui sont arrondies ; tarsi bien plus larges et à 2° article très court.

49. *Larinus crassiusculus.* Long. 9-10 ; lat. 5-6 mill. — *Oblongo-subovatus, brevior, latior, contextus, flavo-virescente pulvereus. Rostrum crassum, thorace brevius, rugoso-punctatum, antice foveolatum, post foveam solummodo carinalum. Antennæ articulis 1° et 2° subæqualibus, longitudine vix brevioribus, clava oblonga. Prothorax transversus, angulis posticis acutis, rugoso-punctatus, punctis majoribus sparsis indistinctis. Elytra basi regulariter arcuata, non angulata, postice vix attenuata, apice late rotundata, anguste punctato-striata. Pedes validi, tibiis anticis vix arcuatis, tarsis dilatatis.*

Akbès, rapporté par M. Delagrange de qui je l'ai reçu, ainsi que de MM. Staudinger et Bang-Haas.

Bien plus court que le *L. breviusculus* ; rostre bien moins allongé ; prothorax à angles postérieurs pointus, à gros points épars. Diffère du *L. flavescens* par la forme beaucoup plus courte, par la carène du rostre distincte seulement en avant ; par la saillie des épaules des élytres nulle en dehors, par ces organes beaucoup plus courts, non distinctement atténués en arrière, etc.

50. *Lixus subquadrithorax.* Long. 6-9 mill. — *Elongatus, niger, tarsis rufescentibus, griseo-pulvereus. Frons depressa, indistincte foveata. Rostrum minus elongatum, thorace brevius, longitudinaliter obsolete carinatum, fortiter punctatum, leviter curvatum. Prothorax subquadratus, a latere griseo-pul-*

vereo marginatus, non carinatus, creberrime punctatus, punctis contiguis. Elytra a latere parallela vel postice paulo attenuata, supra subdepressa, apice separatim acuminata, striis tenuibus, interstitiis planissimis, coriaceis. Tibiæ latiores, sublineares, tarsi dilatatis. Subtus griseo-pubescens.

Akbès, reçu de MM. Staudinger et Bang-Haas.

Très voisin du *L. bicolor*. Rostre plus court, distinctement quoique légèrement arqué, à carène médiane perdue dans une ponctuation forte, entremêlée de rugosités. Front plus large; yeux beaucoup moins obliquement situés. Antennes à deuxième article bien plus court. Prothorax nullement conique, carré, brusquement étranglé tout à fait au sommet, sans trace de carène. Tibias plus larges, non sinueux sur les bords ni courbées en dedans, à denticules internes nuls ou peu distincts. Tarses beaucoup plus déliés.

51. **Rhynchites æreipennis**(♀). — Long. 8-10 mill. (rostr. excl.). — *Oblongo-subovatus, æneo-viridescens, parce cinereo-hirsutus. Caput transversum, oculis modice prominulis. Rostrum rectum, capite thorace que longius, basi purpureum, apice violaceo-nigrum. Antennæ pallide ferruginæ, articulis 3-ultimis fuscis. Prothorax fortiter creberrime punctatus, medio carina obsoleta lævi instructus, basi sulcatus, apice constrictus. Elytra minus regulariter sat grosse punctato-striata, interstitiis creberrime punctatis, post tertiam partem transversim impressa. Tibiæ anticæ ferruginæ, extus sinuatæ.*

Akbès, des chasses de M. Delagrange, reçu de MM. Staudinger et Bang Haas. Assez voisin du *R. smyrnensis*, qui habite, aussi, cette localité. La couleur est plus sombre et bien moins métallique. Rostre plus long ♀, pourpré seulement dans sa première moitié. Pubescence dressée bien moins abondante. Prothorax à ponctuation moins grossière, plus également serrée, sans trace de reliefs. Elytres dépourvues des rides grossières qu'on remarque chez le *R. smyrnensis*.

52. Magdalinus semicyaneus. — Long. 5-6 mill. — *Niger, elytris obscure-cyaneis. Caput sat dense punctulatum, intra oculos foveatum. Rostrum cylindricum, curvatum, nitidum, in ♂ paulo brevius, et magis punctatum. Antennæ dense ciliatæ, nigræ, articulis funiculi 2-primis elongatis, cæteris transversis, clava oblonga, paulo incrassata. Prothorax transversus, basi sulcatus, antice medium longitudinaliter carinatus, creberrime punctatus, angulis posticis paulo divaricatis, acutis. Scutellum oblongum, læve. Elytra basi subtruncata, striis subcrenato-punctatis, interstitiis creberrime punctatis, transversim rugulosis. Femora valde clavata, dente spiniformi valido armata, intus tillosa. Tibiæ latiores, basi curvatæ.*

Asie-Mineure, Akbès, reçu de MM. Delagrange et Staudinger.

Bien distinct du *M. duplicatus* par le rostre bien plus épais, par la ponctuation du prothorax beaucoup plus forte, par les points des stries des élytres bien moins serrés et surtout par les pattes ainsi que la dent des cuisses bien plus épaisses. Le *M. cyampennis* a les pattes beaucoup plus allongées, la tête très éparsement pointillée et les interstries non distinctement ridés en travers. Le prothorax et les pattes sont de la couleur des élytres.

53. Phyllobius pilidorsum. Long. 6-8 mill. — *Oblongus, (♂ angustior, magis parallelus) fulvus vel pallide fulvus, pedibus dilutioribus, supra in elytris longius griseo-hirsutus. Frons leviter impressa, oculis prominentibus. Rostrum longitudine latitudini subæquale. Antennæ funiculi articulo 1^o 2^o longiore. Prothorax modice transversus, antice transversim impressus, a latere non dilatatus, angulis posticis rectis, pilis fulvis, medio confluentibus, a latere pallidioribus, vestitus, parce punctatus. Scutellum oblongum. Elytra post basin transversim impressa, fortiter striato-punctata, interstitiis subconvexis. Femora omnia valde clavata, valide dentata. Tibiæ anticæ intus arcuatæ.*

Syrie, Liban.

Très voisin de *P. Brisouti* pour la forme et la coloration. Plus déprimé en dessus. Rostre σ plus étroit, aussi long que large, tandis qu'il est plus court que large, chez le *P. Brisouti*. Antennes à premier article du funicule distinctement plus long que le deuxième. Prothorax bien moins court et moins fortement impressionné antérieurement, garni de poils dressés assez courts, à pubescence plus longue en forme de cils plus épais et inclinés en arrière sur les élytres ; tandis qu'on ne remarque, chez le *P. Brisouti*, qu'une pubescence à peu près nulle sur les parties antérieures et extrêmement courte et peu distincte sur les élytres ; les stries de ces dernières sont fines, avec les interstries plans chez le *P. Brisouti*, tandis qu'elles sont, ici, bien plus fortes, surtout plus profondes avec les intervalles convexes, chez le *P. pilidorsum*.

54. *Phyllobius akbesianus*. Long. 6-9 mill. — *Elongatus, in σ angustus, antennis pedibusque rubris, clava tarsisque fuscescentibus griseo fulvo aut virescenti-squamosus. Frons vix foveata. Rostrum subquadratum vix recurvum, apice arcuatim emarginatum. Antennæ funiculi articulo 1^o 2^o valde longiore, clava fusca. Prothorax transversus, basi et apice constrictus, medio a latere valde rotundatus, subglobosus. Elytra sat profunde dense punctato-striata, interstitiis antice angustioribus, convexis. Femora maxime clavata, tibiis apice intus breviter angulatim productis, tarsis angustioribus, articulo 3^o lobato, modice dilatato.*

Akbès, des chasses de M Delagrangé, reçu de MM. Staudinger et Bang-Haas.

Voisin du *P. calcaratus*, mais bien plus étroit, $\sigma\phi$. Rostre peu courbé. Antennes à articles du funicule filiformes, non noueux au sommet, ayant les deux premiers articles subégaux ; cils raides un peu dressés sur les élytres, extrêmement courts et visibles seulement à un certain jour. Prothorax globuleux au lieu d'être faiblement arron-

di, (σ) presque droit, au contraire, sur les côtés, (φ) tandis qu'il est dilaté subanguleusement, au milieu, chez le *P. calcaratus* du même sexe.

RHINOSCYTHROPUS N. G.

Caput convexum. Oculi laterales, paulo obliqui, minus distantes.

Rostrum brevissimum, capitis dimidia parte vix longius, vix angustius, apice denudato-elevatum.

Scrobes subapicales, subtransversæ, supra approximatae.

Antennæ modice elongatæ, funiculo 7-articulato, articuli 2-primis valde elongatioribus, ultimis obconicis, sat elongatis, haud nodosis, clava angusta subelliptica, non distincte articulata.

Prothorax transversus, subquadratus, basi et apice truncatus. Scutellum subtriangulare.

Elytra oblonga, basi subtruncata, humeris obtusis, thorace basi latiora.

Pedes breviores femoribus clavatis, basi pedunculatis, inermibus, tibiis subrectis, tarsis articulo 3^e valde dilatato-lobato, unguiculis connatis.

Ce genre diffère des *Phyllobius* par l'extrême brièveté du rostre, à peine moins large que la tête, par les yeux obliques, assez rapprochés au milieu, par la massue des antennes presque linéaire, non distinctement articulée ; par les élytres non sinuées en dessous avant la pointe, qui paraît, ainsi, moins acuminée.

54. *R. asiaticus*. Long. 4-5 mil. — *Niger, antennis pedibusque totis pallide-rubris, dense viridi-squamosus. Rostrum apice rufum. Antennæ sat graciles, articulis 4-6 vix nodosis. Prothorax basi et apice a latere subsinuatus, antice transversim leviter impressus, minus distincte sparsim punctulatus. Elytra a latere subparallela, apice obtuse separatim acuminata, subsinuatim striato-punctata, interstitiis subplanis. Tibiæ intus brevius ciliatæ.*

Akbès, des chasses de M. Delagrangé, communiqué par MM. Standinger et Bang-Haas.

55. Trachodes asiaticus. Long. 5-5, 5 mill. — *Ovatus, piceus, rostro rubro, antennis rufescentibus, supra fulvogriseo que variegatus. Rostrum validius, læve, capite thoraceque subæquale, arcuatum, punctatum, basi striolatum. Antennæ minus graciles, ciliatæ, articulis 2-primis elongatis, illo valde crassiore, cæteris brevioribus, ultimis latioribus, nodosis, clava oblongo-ovata. Prothorax subtransversus, dorso brunneus, medio anguste a latere late pallide-squamosus, medio utrinque fasciculatus, sat crebre fortius punctatus. Elytra sat profunde punctato sulcata, interstitiis convexis, parcissime albido-setulosa, setis valde clacatis, macula scutellari fascia que sinuata ad medium transversa, brunneis. Pedes validissimi, femoribus obtuse-dentatis, albo-annulatis, tibiis latis, curvatis.*

Akbès, rapporté par M. Delagrangé, deux exemplaires reçus de MM. Staudinger et Bang-Haas.

Plus grand que le *T. hystrix*, plus convexe, de coloration analogue. Il en diffère, notamment, par les antennes plus fortes, par les deux premiers articles du funicule plus allongés ; par le rostre dépourvu de carène médiane ; par le prothorax bien plus convexe, plus arrondi latéralement, plus fortement ponctué ; par les élytres à stries beaucoup plus régulières et plus profondes, avec les interstries convexes. Pattes à cuisses énormes, à dent beaucoup plus grande, les tibias surtout beaucoup plus larges, ceux des deux paires postérieures fortement courbés en dedans et fortement échancrés à la base.

56. Mesites akbesianus. Long. 4-4, 5 mill. — *Rubropiceus, glaber. Frons foveolata. Rostrum basi sulcatum, brevius, parce punctulatum. Antennæ articulo 1^o funiculi latitudine longitudine æquale, cæteris brevissimis. Protho-*

rax sat crebre punctatus, non bi-impressus, medio linea lævi præditus. Elytra punctato-sulcata, interstitiis lævibus, subconvexis, sparsim punctulatis. Femora antica valde in-crassata, intus basi emarginata.

Akbès. Deux ♂ et deux ♀ reçus de MM. Staudinger et Bang-Haas.

Bien distinct des *M. aquitanus* et *cuneipes* par les interstries des élytres lisses, avec une série de points extrêmement fins assez peu régulière. Le prothorax n'est pas déprimé longitudinalement de chaque côté de la ligne médiane, comme cela a lieu chez le *M. cuneipes* et moins convexe que chez le *M. aquitanus*.

DESCRIPTION D'UN BRENTHIDE NOUVEAU D'ASIE-MINEURE.

57. *Amorphocephalus piliger*. — Long. 12 mill. — *Brunneus, supra parum dense pilis hirsutis fulvis longioribus, in thorace brevissimis munitus. Caput breve, oculis prominentibus, utrinque post oculos subacute angulatus. Rostrum læve, antice a latere angulatim productus, medio sulcatum, supra oculos subtridentum. Mandibulæ extus non angulatæ. Antennæ articulo 1^o oblongo, apice clavato, 2^o brevi, intus basi emarginato, 3^o obconico, elongato, 4-10 subquadratis, ultimis brevioribus, clava pyriformi. Prothorax elongatus, basi constrictus, antice attenuatus, distincte parce punctatus. Elytra sulcatim crenato-punctata, interstitiis acute carinatis. Pedes elongati, femoribus anticis extus arcuatis, tibiis anticis intus bisinuatis, posticis sublinearibus, glabris, tarsis elongatis, sat gracilibus.*

Akbès.

♀ ignota.

Un seul ♂ reçu de MM. Staudinger et Bang-Haas.

Très reconnaissable à la pubescence fine, dressée verticalement sur les élytres. Tête ne présentant pas, à la base, la touffe de poils dorés qu'on remarque chez le *corona-*

tus ♂ dont il diffère, d'ailleurs, abondamment par la structure de la tête du rostre et des mandibules.

Tours, ce 28 février 1895.

DESBROCHERS DES LOGES.

Tableau dichotomique des espèces du genre **SIBINIA**

En raison des nombreuses espèces décrites récemment, nous avons cru devoir résumer, dans ce tableau, les caractères de celles qui nous sont connues.

Pour faciliter la détermination, nous diviserons ce genre en trois sections.

Sectio prima. — Supra, in thorace saltem, pilis subsquamiformibus, sæpius metallicis, vestius. Prothorax plus minusve distincte vittatus. Elytra sæpius lineatim-maculata, vel albo-irrorata, nunquam serie-albo setulosa : (*primita*, *attalica*, *vittata*, etc.).

Sectio secunda. — Supra dense uniformiter cretaceo-squamosa, opaca. Prothorax vittis nullis vel fere nullis. Elytra immaculata (1), sæpius seriatim albo-setulosa : (*sodalis*, *Zuberi*, etc.).

Sectio tertia. — Prothorax et elytra pilosa, immaculata, sæpius olivacea ; setis albidis nullis : (*viscariæ*, *nigritarsis*, etc.).

SECTIO PRIMA.

1. Elytra litura suturali obscura, medium attingente, vel bilobata vel apice saltem luniformi ornata. 2
- Elytra litura suturali sublineari vix vel nullo modo dilatata. 8
- Elytra litura suturali nulla. 12

(1) Albo punctata apud 2-punctata.

2. Prothorax nigro-velutinus, basi albo 3-maculatus.
Elytra extus nigro-cincta. SUBTRIANGULIFERA
Db. (Corsica).
- Prothorax in fundo nigro-velutinus, vel brunneus, sæpius fulvo-aureus, raro albescente-squamosus, pallide 3-vittatus. Elytra extus concoloria. 3
3. Prothorax nigro-velutinus aut brunneus, pallide distincte medio-anguste 3-vittatus. Litura suturali elytrorum nigro-velutina, apice modice dilatata.
PHALERATA Steven (Europa) (1).
- Prothorax fulvo-aureus, minus distincte pallide 3-vittatus. Litura suturali elytrorum fulva, basi transversim dilatata. ASIATICA Db. (Syria').
- Prothorax fulvus aut pallide-fulvus, latius vage albedo-vittatus. Litura suturali elytrorum fulva, basi et apice dilatata. 4
4. Magis oblonga, plerumque minor, lateribus subparallelis. Tibiæ angustæ, sublineares. Tarsi angusti. 5
- Ovata, latior, a latere distincte ampliata. Tibiæ latiores, postice plus minusve dilatatæ. 6
5. Rostrum nigrum, apice ipso rufescens.
? SIGNATA Gyll. (Eur. Alg. Syr.). (2)
- Rostrum postice late rufescens. Minor.
v. ALGIRICA Db. (Alg.).
6. Rostrum atrum. Prothorax valde transversim dilatatus.
AURITHORAX Db. (Alg.).
- Rostrum in dimidia postica parte rufum. Prothorax vix ampliatus, subconicus. 7

(1) *vetulifera* Db.

(2) La synonymie des *S. primita*, *signata* et *arenariæ* ne présente aucune certitude. Ni la description ni la planche de Herbst n'indiquent une bande suturale élargie. Schœnherr cite le *arenariæ* parmi les « sp. invisæ » et quand il décrit le *variata*, il l'indique comme étant plus allongé que le *primita*, ce qui ferait croire qu'il considérerait ce dernier comme étant l'espèce assez large que nous avons désignée sous le nom de *Bohemanni*. Au reste, cette confusion des deux espèces subsiste dans les catalogues qui ont été publiés postérieurement. Peut-être ferait-on mieux de substituer au nom de *signatæ* celui de *Gyllenhali* ?

7. *Striæ elytrorum in fundo serie-albo-squamulatæ. Prothorax dorso late fulvo-aureus, vitta media obsoleta.*

V. *SERIATA* Db.

- *Striæ elytrorum squamulis albidis nullis. Prothorax albi-do-squamosus, anguste fulvo-bivittatus.*

BOHEMANNI Db. (Eur. Alg Syr.) (1)

8. *Litura suturali elytrorum libera, sæpe obsoleta.* 9

- *Litura suturali elytrorum arcuatim albido-fulvo vel brunneo-cincta.* 10

9. *Minor. Rostrum tenue, postice paulo attenuatum. Pedes graciles.* SIGNATA V. *VARIATA* Gyll. (Eur.).

- *Major. Rostrum crassum, non attenuatum. Pedes validiores. Prothorax a latere setis fulvis, sparsutus.*

REITTERI Db. (Cauc.).

10. *Brunnea. Pedes nigri. HARMONICA* Chevr. (2) (Algir).

- *Fulvo-aurea. Pedes rufi.* 11

11. *Prothorax valde convexus, a latere rotundato-ampliat, elytris vix angustior, ante apicem profunde transversim impressus. Elytra a latere subparallela, interstitiis planis.* STIERLINI Db (Ros. m.)

- *Prothorax subdepressus, a latere vix arcuatus, striga antica medio late interrupta. Elytra ovalia, interstitiis externis elevatis* INCLUSA Db.

12. *Prothorax plus minusve distincte pallide 3-vittatus. vittis lateralibus plerumque latioribus. Rostrum nigrum interdum postice rufum.* 13

- *Prothorax obsolete vel indistincte pallide 3-vittatus. Rostrum, antennæ, (scapo excepto rufo), tibiæque nigra.* ATTALICA V. *UNICOLOR* Db.

13. *Minor. Rostrum gracile, basi non crassius.*

TENUIROSTRIS Db. (3) (Ros. m. Austr.).

(1) *Arenariæ* Bedel Stephens.

(2) *Nigrovittata* Db. (ex typo, Chevr.).

(3) *Hoffgarteni* Tourn.; dans quelques collections sous le nom de *subtilis* (Hampe).

- Major. Rostrum validum, basi valde, (in ♂ fortius),
incrassatum. 14
- 14 Elytrorum sutura et interstitium 6^m albo-squamosa.
VITTATA Germ. (Eur. m. Gallia) .
- Elytra vitta pallida externa nulla. 15
15. Prothorax distincte albo 3-vittatus, vitta media angusta, interdum interrupta. Elytra distinctissime lineis albidis longitudinalibus interruptis variegata,
NIVEIVITTIS (Mars.) Db. (Algir.) (1).
- Prothorax vage tri-lineatus. Elytra interstitiis alternatim griseo-brunneo que vittatis.
- CANA v. ROELOFSI Db. (Eur.) (2).
- Prothorax plus minusve distincte latius albo-trivittatus, intra vittas fulvo-aureus vel pallide fulvus. Elytra immaculata vel obsolete irregulariter alternatim fulvo-pallido interrupte-lineolata, sutura sæpius pallidiore. 16
16. Tibiæ nigrae vel obscure rufæ. Rostrum nigrum, rarius apice ipso rufo. Corpus minus breve, magis oblongum. 17
- Tibiæ totæ rufæ. Rostrum in dimidia parte rufum. Brevior. 19
17. Rostrum sat tenue, basi vix crassius, apicem versus paulo attenuatum. Femora parum incrassata.
- ATTALICA v ? EXCEPTA Db. (Algir.).
- Rostrum sat validum, basi evidenter crassius, apice attenuatum. Femora valde clavata. 18
18. Suboblonga. Elytra pallide fulva ant viridescencia, uniformiter squamosa vel lineatim irregulariter maculata. ATTALICA (*genuina*) Db. (Eur. Alg.).
- Suboblonga. Supra dense setulis albidis sparsis.
- ATTALICA v. MIXTA (Algir. m.).

(1) Deux exemplaires de cette espèce sont étiquetés : Nice, dans la collection Sénac, mais cette provenance doit être erronée.

(2) *Emeryi* Tourn. i.l.

— Brevior. Elytra pallide fulva, macula triangulari maxima, fulvo-cincta, ornata. Scutellum solutum, minutum, semicirculare.

ATTALICA v? SCUTELLARIS Db. (Algir.) (1).

19. Rostrum ♂ supra in dimidia parte antica pluri striatum, longius, magis cylindricus.

ATTALICA v? DISTINCTIROSTRIS. (Algir.)

— Rostrum ♂ basi simplex, apicem versus perspicue attenuatum. 20

20. Prothorax vitta media deficiente, lateribus vage squamulis albidis irroratis. Supra fulvo-aureus.

AUREO FULVUS Db. (Syria).

— Prothorax plus minusve distincte 3-vittatus. 21

21. Prothorax et elytra setis squamiformibus albis sparsis. 22

— Prothorax et elytra squamis albis sparsis nullis. 23

22. Brevis. Prothorax a latere postice magis rotundatus, angulis posticis obtusis. Vitta media prothoracis latior.

ATTALICA v. LATERALIS Perris (Sard.).

— Elytra pallide subvirescente rufa, sæpius irregulariter fulvo-lineolata.

ATTALICA v. TIBIELLA Gyll. (Eur. m. Alg. Syr.) (2).

— Elytra uniformiter albida.

ATTALICA v. SILENES Perris (Gallia m.).

SECTIO SECUNDA.

1. Squamulæ elytrorum asperæ ; intervalla serie-setulosa, elevata. Prothorax obscure vage bilineatus, angustior, subtrapeziformis. 2

— Squamulæ elytrorum applicatæ, integræ. 3

(1) Il est probable que le *formosa* Aubé n'est qu'une variation de *attalica*.

(2) Gyllenhal indique le rostre comme étant noir, et les tibias ferrugineux. Le plus souvent ce rostre est plus ou moins largement rougeâtre, plus rarement, seulement tout à fait au sommet.

- Squamulæ elytrorum medio impressæ, subintricatæ.
Prothorax latior, convexior, antice late marginatus.
THERYI Db. (Algir.).
- 2. Angustior. Elytra a latere parallela, humeris elevato-
angulatis, postice vage albo-notata.
BIPUNCTATA Kirsch. (Egypt.).
- Latior, subovata. Elytra a latere paulo arcuata, hume-
ris vix elevatis, obtusis. REICHEI Tourn. (Syria).
- 3. Elytra postice saltem rufa. Pedes toti rufi. 4
- Elytra nigra. Pedes brunnei vel rufi. 5
- 4. Prothorax niger. Elytra squamigera, postice rufa.
FULVO-AUREA Db. (Algir.).
- Prothorax rufus. Elytra tota rufa, squamulis piligeris.
SUBPILIGERA Db. (Algir.).
- 5. Sat elongata, supra subdepressa. Elytra a latere sub-
parallela. 6
- Elytra subovata, breviora, sutura sæpius pallida. 9
- 6. Supra inordinatim, setulis squamiformibus albidis
variegata, angustior. Long. 1,5 mill.
SUBIRRORATA Faust. (Turcom.).
- Prothorax setis squamiformibus albidis nullis. Elytra
setis seriatis obsoletis. Long. 2,5 mill. 7
- 7. Elongata, elytris lateribus parallelis. Prothorax lon-
gior. Elytra distincte albo serie-setulosa.
PLANIUSCULA Db. Alg. Syr.) (1)
- Minus elongata, latior. Prothorax brevis. Elytra a la-
tere parum arcuata, interstitiis seriebus setularum
minus crassioribus, minus distinctis.. 8
- 8. Supra subconvexa. Rostrum tenue, subcylindricum.
Scutellum minutissimum Elytra seriebus setulorum
paulo elevatis. BECKERI Db. (Ros. m.) (2)
- Planiuscula. Rostrum basi incrassatum, brevius. Scu-
tellum majus, triangulare. Elytra seriebus setulorum
nullo modo elevatis. MODESTA Db. Syria).

(1) Heydeni Tourn.

(2) minutissima Tourn.

9. Minutissima: (vix 1,3 mill.). — Brevis, rufescens, supra a latere saltem niveo-dense cretatea, setis elytrorum nullis. Rostrum, antennæ pedesque læte rufa.
ZUBERI Db. (Ros. m.) (1).
- Paulo major: (1,5 à 1, 7 mill. — Nigra, supra cinereo-flavescente squamosa 10
10. Prothorax convexus, late profunde antice marginatus, a latere evidenter rotundatus Rostrum elongatum. Pedes obscuri. Elytra setis albidis distinctis. 11
- Prothorax subtrapezoidalis, a latere non ampliatus. Rostrum brevius. Pedes toti obscure rufi. Elytra setis seriatis fere nullis MERIDIONALIS C. Bris.
11. Brevior. Prothorax a latere minus rotundatus. (Fr. m.)
SODALIS. (Eur. Alg.)
- Major, magis oblongus Prothorax magis rotundato-apliatus. V. ROTUNDICOLLIS Db. (2). (Alg.)

SECTIO TERTIA

1. Ovata Rostrum capite thorace que simul sumptis longitudine subræquale (Clava antennarum valde incrassata, basi rotundata). 2.
- Oblonga, subelliptica. Rostrum capite cum thorace evidenter longius. 5.
2. Antennæ funiculi articulis ultimis distincte moniliformibus. 3.
- Antennæ funiculi articulis ultimis nullo modo nodosis. 4.
3. Corpus crassum, supra convexum. Prothorax et elytra separatim convexa. Rostrum & coxas inter medias vix superans. Elytra striis distinctis, interstitiis externis paulo elevatis. CANA. Hbst. (Eur. Alg. Syr.)
- Corpus minus crassum, supra subdepressum. Ros-

(1) *Tournieri* Tourn. Staticis (Beck) *pars*

(2) C'est au *sodalis* et non au *planuscula* que doit être rapportée cette variété.

trum ♀ coxas posticas attingens Elytra subsquamosa,
striis vix distinctis, interstitiis omnibus planis.

ABEILLEI. Db. (Syria.)

4. Albo-subargenteo squamosa.

VISCARIÆ V. LUGDUNENSIS Db. (Lugdun.)

— Griseo-olivaceo. VISCARIÆ. (*genuina*). (Eur. Alg. Syr.)

5. Clava antennarum ovali-incrassata, basi rotundata.

Prothorax subtransversus.

SCHAUMEI. Db. (1) (Sarepta).

— Clava antennarum subelliptica, (basi et apice attenuata). 6.

6. Rostrum thorace evidenter longius. 7.

— Rostrum thorace evidenter brevius. 10.

7. Tibiæ nigræ apice vix rufescentes. 8.

— Tibiæ totæ rufæ. 11.

8. Angustior. Rostrum subrectum. Elytra postice non arcuatim dilatata. SUBELLIPTICA Db. (2) (Gall. Germ.)

— Latior. Rostrum modice evidenter arcuatum. Elytra postice distincte arcuatim dilatata. 9.

9. Prothorax longitudine fere duplo latior, a latere modice arcuatus

CONSANGUINEA. Db. (Algér.)

— Prothorax longitudine non multo latior, subtrapeziformis.

FUGAX. Germ. (Eur. bor.)

10. Rostrum parum incrassatum, subcylindricum, vix arcuatum. Caput minus, oculis magis approximatis.

CURTIROSTRIS. Tourn. (Helvet. Gall.)

— Rostrum basi evidenter crassius, sat curvatum. Caput majus, oculis paulo distantibus. V? BREVINASUS

Db. (Alg.)

11. Rostrum tenue, thoraci longitudine æquale. Tibiæ tarsique rufi.

NITIDIROSTRIS Db. (Ros. m.)

— Rostrum crassius, thorace evidenter brevius. Tibiæ rufæ. Tarsi nigri.

NIGRITARSIS. Db. (3) (Ros. m.)

(1) Beckri Tourn.

(2) Perrisi Tourn.

(3) rumelica Tourn.

— Rostrum sat tenue. Tibiæ nigræ, tarsi concolores.
Striæ elytrorum distinctissimæ, interstitia elevata.
UNICOLOR (Ros. m. Hong.)

OBSERVATIONS

Sibinia pulchella. Db. Op. I. p. 25, doit être supprimé de la nomenclature. Il a dû y avoir nécessairement une confusion ou une interversion, lors de l'impression. La description le compare au « précédent » (*nigritarsis*), pour la coloration, tout en lui attribuant un 2^e article du funicule à peine plus long que large et un rostre ferrugineux, caractères qui n'existent chez aucune espèce de la section. Peut-être s'agit-il d'un *tychius*. Nous n'avons pu retrouver le type de la description.

L'espèce décrite récemment sous le nom de *S. crassirostris*, malgré son abdomen découvert, doit rentrer dans le genre *Tychius*, ayant 7 articles au funicule des antennes.

Les *Sibinia Cretosparsa* Fairm., ? *formosa* Aubé, *grandicollis* Walzl, *fusca* Tourn., *massageta* Faust, *exigua* Faust, *Taschkentica* Faust, *retusa* Faust, *rudopilosa* Faust, ? *cinerascens* Walk, *griseus* Tourn., ? *abdominalis* Tourn., *femoralis* Germ., *tibialis*, Gyll. et *statices* nous sont restés inconnus. Nous serions reconnaissant aux entomologistes qui en posséderaient des exemplaires authentiques de vouloir bien nous les communiquer.

Tours, le 1^{er} mars 1895.

DESBROCHERS DES LOGES.
