L'Échange, Revue Linnéenne

Descriptions ou diagnoses et notes diverses

(Suite.)

Sternoscælis diversepunctatus n. sp. — Robuste et large, brillant, éparsément pubescent de jaune, plus ou moins roux avec l'avant-corps et partie des cuisses obscurcis ; prothorax diversement ponctué, un peu éparsément sur le disque en arrière, plus ou moins fortement et densément sur presque toute sa surface, surtout vers les côtés, triangulairement impressionné près des angles postérieurs ; élytres à ponctuation écartée, assez forte, ornés, en outre du repli huméral, de 3 stries latérales, les internes raccourcies ; propygidium et pygidium à ponctuation écartée ; prosternum élargi en avant, creusé au milieu, mesosternum largement excavé ; pattes robustes, fortement aplatis. Long. 2,3 m. Chypre (coll. Pic). — Distinct de *robustus* Pic, par la ponctuation différente de diverses parties du corps, la forme du prothorax, etc.

Rhagonycha mandchurica n. sp. — Étroit et allongé, parallèle avec le prothorax à peine plus étroit que les élytres, un peu brillant, noir avec la base des antennes, les genoux et base des tibias testacés ou roussâtres ; prothorax carré, non rétréci en avant, largement impressionné sur le milieu du disque avec des bossettes assez marquées. Long. 4,5 mill. Mandchourie (coll. Pic). — Cette espèce est distincte à première vue par sa forme distinctement parallèle ; à cause du prothorax qui est à peine plus étroit que les élytres, peut se placer près de *rorida* Ksw.

Malthodes ungulopygus n. sp. ♂. — Peu allongé, brillant, pubescent de gris, extrémité des élytres jaune soufre, noir avec les côtés du prothorax testacés ; antennes un peu épaisses, amincies à l'extrémité ; prothorax un peu plus long que large, à peine élargi en avant, arqué antérieurement ; abdomen foncé avec les côtés variablement marqués de jaune, dernier segment abdominal large, subtriangulaire, pénultième formé par deux branches subtriangulairement dilatées au sommet, avant dernier segment dorsal allongé, dernier long, particulier, fortement élargi en forme de sabot de cheval et échancré au sommet, ce dernier foncé, à base testacée. Long. 4 mill. Chypre (coll. Pic). A placer près de *berytensis* Reiche.

Malthodes cypricus n. sp. — Peu allongé, brillant, pubescent de gris, extrémité des élytres jaune soufre, noir, en partie grisâtre sur le milieu des élytres, avec le pourtour du prothorax étroitement jaune ; antennes grêles, longues chez ♂ ; prothorax court, dilaté vers les angles antérieurs ; abdomen presque entièrement noir, simple ♀, en partie jaune chez ♂ et ainsi fait : dernier segment abdominal assez court, pénultième en palette, échancré au sommet, avant dernier segment dorsal large et grand, échancré au sommet, dernier plus étroit, un peu coudé, à peine échancré au sommet. Long. 2,5 mill. Chypre (coll. Pic). — Peut se placer près de *maronitus* Pic dont il diffère, à première vue, par les élytres à macule apicale jaune et la structure abdominale du ♂.

Malthodes subunicolor n. sp. — Allongé, pubescent de gris, brillant, noir avec les élytres teintés de gris, ceux-ci concolorés ; antennes assez longues ♂ ; prothorax court, non élargi en avant ; ♂ dernier segment abdominal court, pénultième en palette courte, échancré au sommet, avant dernier segment dorsal médiocre, simple, dernier court, subéchancré au sommet. Long. près de 3 mill. Asie Mineure (coll. Pic). — Peut se placer près de *crassicornis* Maekl.

Opilo mollis v. nov. **Guerini**. — Elytres ornés chacun de deux macules juxtaposées jaunes postmédianes, au lieu d'une fascie transversale, en outre dessins jaunes antérieurs plus ou moins oblitérés ou indistincts, en dehors d'une macule humérale nette. France : Flacé-les-Mâcon (Guérin in coll. Pic).

Notoxus excisus v. **reductus** Pic. — Cette variété, caractérisée par l'absence de macule latérale antérieure externe tandis que la fascie postérieure se réunit sur la suture à la macule scutellaire, m'a été cédée par notre collègue Montandon qui l'a recueillie en Moldavie.

Zonitis scutellaris v. nov. **prescutellaris**. — Elytres ornés, en plus d'une large macule apicale noire, d'une petite macule supplémentaire foncée placée sur la suture près de l'écusson. Boukharie (coll. Pic). La forme type présente une bande suturale complète et *Ballioni* Esch., que je considère comme une variété de l'espèce de Fairmaire, n'a qu'une macule apicale noire ; ma variété est intermédiaire entre *scutellaris* Fairm. et var. *Ballioni* Esch.

Chærocephalus distincticornis n. sp. — Subovalaire, convexe, noir, revêtu d'une pubescence pileuse fauve parsemée de quelques macules plus foncées ou grises, antennes et pattes rousses, ces dernières avec le milieu des cuisses foncé. Massue des antennes longue, faite de 3 articles bien distincts, à contours non réguliers ; rostre épais, fortement creusé au milieu ; prothorax court, dilaté-subarrondi latéralement ; élytres en ovale assez court, faiblement strié-ponctués ; cuisses assez fortement dentées. Long. 8 mill. Chypre (coll. Pic). Très voisin de *Chevolati* Reiche et paraissant en différer par la forme du rostre, la massue des antennes et le revêtement un peu différent.

Chærocephalus rufolimbatus n. sp. — Un peu allongé, noir de poix avec le pourtour des élytres roussâtre et les membres testacés, revêtu d'une pubescence pileuse fauve ou grisâtre, parsemée sur les élytres de macules foncées. Antennes longues et grêles ; tête à petite impression entre les yeux ; rostre élargi en avant, subsillonné en dessus ; prothorax court, rétréci en avant et en arrière, à ponctuation irrégulière faite en partie de points forts et espacés ; élytres en ovale allongé, rétrécis aux deux extrémités, modérément strié-ponctués ; cuisses inermes. Long. 6 mill. Algérie : Constantine (coll. Pic). Peut se placer près de *longipennis* Pic.

Phyllobius (Subphyllobius) gracilipes Schils. — En décrivant récemment cette espèce (*Kuster Kafer Eur.* XLVII, 1911, n° 13) Schilsky a omis de me mentionner comme possesseur et je viens réparer cette omission. C'est moi qui ai procuré gracieusement à l'auteur l'unique exemplaire qu'il possède de cette nouveauté originale des bords du fleuve Amour, en Sibérie, d'où je la possède également. Voici une note prise sur co-type (insecte vu par Schilsky, et qui m'a été retourné avec l'étiquette de sa main, *Ph. gracilipes* m. n. sp. ♂) et deux autres exemplaires. Assez allongé, fortement rétréci à l'extrémité, densément revêtu de squamules ovalaires entremêlées de petits poils, celles-ci plus ou moins argentées, parfois un peu dorées avec

les élytres nettement strié-ponctués, noir avec les antennes (sommet de certains articles rembruni), tibias et tarses plus ou moins testacés ; la ♀ a une forme élytrale plus élargie avec les tibias plus ou moins obscurcis. Long. 7 m.

Cryptocephalus signatus var. nov. Ravouxi. — Prothorax et élytres sans macules noires, prothorax simplement roussâtre sur une partie du disque et élytres à macule humérale roussâtre pouvant s'oblitérer. France méridionale : Nyons (Ravoux in coll. Pic).

(A suivre.)

M. PIC.

SIX MOIS DANS LES MONTS DE BRETAGNE

(SUITE)

- Platynus* Bon. — *Viridicupreus* Gæze. t. r. — Un seul exemplaire sur la plage de Kervigen, près Plomodiern.
- *Mülleri* Herbst. — Commun sous les pierres au bord des petites rivières. Plomodiern.
- *Dorsalis* Pont. — *Prasinus* Thunbg. — Très commun sous les pierres, surtout au printemps.
- *Viduus* Panz. — Très rare ; un seul exemplaire sous une pierre. Plomodiern.
- *Ruficornis* Gæze. — Très commun sous les pierres au bord des eaux, surtout au printemps.
- *Assimilis* Payk. r. — Un seul exemplaire dans un terrain humide. Plomodiern.
- *Obscurus* Herbst. — Extrêmement commun sous les pierres du bord des étangs. Plomodiern.
- Pæcilus* Bonelli. — *Dimidiatus* Oliv. — Très commun partout, surtout sur les routes ensoleillées. Plomodiern.
- *Cupreus* L. — Très commun, sur les routes avec le précédent. Plomodiern.
- *Versicolor* Sturm. — Rare, plusieurs exemplaires. Dans une prairie à Penfront, près Plomodiern.
- Pterostichus* Bon. — *Nigritus* F. — Assez commun, sous les pierres, se trouve partout. Plomodiern.
- *Anthracinus* Illig. — Avec le précédent mais moins commun, recherche l'humidité.
- *Minor* Gyll. — Rare, deux exemplaires sous une pierre au printemps. Plomodiern.
- *Madidus* F. — Très commun partout, sous les pierres en grand nombre. Plomodiern.
- *Madidus* F. var *Concinnus* Sturm. — Avec le type mais plus rare.
- Abax* Bonelli. — *Ater* Vill. — Assez rare ; deux exemplaires sous une pierre, sur le Ménez-Hom, près de Plomodiern.