

L'ÉCHANGE

Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (O. I. P., O. I.), Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13^e). — *Aphodiens paléarctiques. Histiéridés français.*

L. Falcoz, 5, Place de l'Eperon, VIRENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulidés, Cucujidés, Erotylidés, Phalacridés, Lathrididés.*

Maurice PIC, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Melyridés, Plinidés, Nanophytes, Anthicidés, Pedididés, Cricoceridés, etc. du globe. — Cerambycidés de la Chine, du Japon, etc. Cypricéphalides paléarctiques. Malacodermes du globe.*

A. Méquignon, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15^e). — *Coléoptères de France (Curculionidés exceptés.)*

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A M. M. PIC, à DIGOIN

(8 Février 1927)

SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. PIC (suite).

Hyménoptères nouveaux II, par M. PIC (fin).

Malacodermes exotiques, par M. PIC (suite du hors-texte).

Additions à la liste de Coléoptères et Hémiptères des environs de Clermont et des bords de l'Allier, par P. PIONNEAU.

Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. PIC (suite).

PRIX D'ABONNEMENT : UN AN, A PARTIR DU 1^{er} JANVIER

France : 7 francs. | Etranger : 12 francs.

MOULINS

LES IMPRIMERIES RÉUNIES

15, RUE D'ENGHEN, 15

L'Échange, Revue Linnéenne

Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

Rhagonycha barbara v. nov. Bettingeri. Thorace rufo, postice signaturis nigris M formantibus ornato. Tunisie (Dr Bettinger); Algérie (coll. Pic).

Ostoma grossa v. nov. discithorax. Supra rufus, capite thoraceque medio nigris. Valachie, à Sinaia (coll. Pic).

Pogonochærus hispidulus v. nov. Bickhardti. Elytris antice late albis, ad basin paulo nigro pilosis, carina interna nigro bifasciculata. Allemagne (Bickhardt in coll. Pic) — Variété caractérisée par la partie blanche non bordée de noir en arrière et la côte interne ayant deux fascicules noirs, au lieu de trois.

Pogonochærus Perroudi v. nov. Vaulogeri. Sat angustatus, elytris late albo pubescentibus, reducte assymetrico nigro fasciculatis. Algérie: Ouarsenis (Vauloger, in coll. Pic). — Chez cette variété les fascicules de poils noirs ne sont pas disposés régulièrement et se trouvent en nombre réduit sur l'une des élytres.

Agapanthia lateralis s.-esp. bilaterialis. Sat robustus, elytris non uniformiter luteo pubescentibus, externe griseo vittatis. Turkestan (coll. Pic). — Près de la bordure externe jaune se montre une bande grise longitudinale qui caractérise cette nouvelle race.

Agapanthia Dahli s.-esp. nicosiensis. Angustatus, nigro-subæneus, pro parte luteo pubescens, elytris irregulariter et longe hirsutis, luteo, lateraliter longiore, pubescentibus, his elongatis; articulo 1^o antennarum nigro, subarcuato, articulis 3 et sequentibus testaceis, apice nigris, 3^o longissimo, apice nigro fasciculato; vertice sulcato et luteo lineato; thorace parum breve, sat lato, fortiter denseque punctato, luteo trilineato; scutello luteo; elytris thorace paulo latioribus, subparallelis, postice attenuatis, mediocre et diverse sed parum dense punctatis; antennis corpore sat longe superantibus. Long. 16 à 18 mill. Chypre (coll. Pic). — Semble caractérisé par les élytres à mouchetures pubescentes peu distinctes, le 3^o article des antennes plus long que d'ordinaire.

Agapanthia asphodeli v. nov. mimica. Elytris dense et regulariter, lateraliter densiore luteo pubescentibus. Pyr.-Or. (coll. Pic). — Par son revêtement mime Kirbyi Gglb., en diffère par les élytres ornées postérieurement de longs poils dressés, le 3^o article des antennes plus long et dépourvu de houppette pileuse.

Agapanthia cynaræ v. nov. diversicornis. Articulis 3 et sequentibus antennarum pro parte nigris, pro parte rufis. Albanie (coll. Pic). — Variété caractérisée par la coloration des antennes.

J'ai reçu dernièrement en communication, par l'intermédiaire de notre collègue Clermont, un *Cryptocephalus* Geof. recueilli par le frère Hilaire, dans la vallée

d'Ossau, et que je considère comme étant *C. elongatus* Germ., espèce que je ne connaissais pas encore de France.

Leianisorhynchus pubescens n. sp. Oblongus, sat dense griseo pubescens, rufus, elytris nigris, sutura epipleurisque rufescentibus, capite postice subalutaceo, sparse et inæquale punctato, rostro robusto; antennis gracilibus; thorace subglobuloso, fortiter parum sparse punctato; scutello indistincte; elytris oblongis, valde convexus, antice et postice attenuatis, humeris nullis, lineato-punctatis, fere instriatis, intervallis latis, distincte et sparse punctatis; pedibus sat robustis, pilosis. Long. 5 mill. Asie M^e (coll. Pic). — Diffère de *brunnescens* Pic par le corps plus pubescent, la ponctuation moins espacée du prothorax, les élytres moins courtes, etc.

Sciaphilus innotatus n. sp. Elongatus, pro majore parte albo squamulosus, niger, rostro apice, membris pygidioque rufis; capite fortiter et sparse punctato, collo robusto, oculis prominulis, rostro breve, antice arcuate cicatricoso; antennis gracilibus; thorace sat breve et parum lato, antice paulo marginato, fortiter parum sparse punctato; elytris thorace paulo latioribus, humeris rotundatis, medio paulo dilatatis, postice attenuatis, substriatis, intervallis postice setis albidis parvis minatis; pedibus sat gracilibus. Long. 4 mill. Chypre (coll. Pic). — Sans doute voisin de *S. asiaticus* Desbr. que je ne connais pas en nature, et en différant, à première vue, par les élytres à revêtement uniforme.

(A suivre.)

M. Pic.

Hyménoptères nouveaux. II ⁽¹⁾

PAR M. PIC (fin).

Ichneumon ruficeps v. nov. **maximorufus** ♀ Metathorace rufo notato, abdomen fere uniformiter rufo. Haute-Savoie.

Ichneumon cessator v. nov. **oisanensis** ♀. Segmento 2^o abdominis rufo notato. Isère.

Amblyteles inaciculatus n. sp. — Angustatus, niger, luteo notatus, antennis nigris, pedibus pro majore parte rufis aut luteis, postpetiole et abdomen apice nigris, illo medio diverse rufo-luteo notato, 4^o segmento abdominis implicato. Long. 17-18 mill. Morvan (Pic). — Voisin de *culpatorius* Grav. et en différant, à première vue, par le postpétiole non aciculé, mais fortement plissé et ruguleux. Varie de coloration abdominale, la forme type avec le 2^e et 3^e segments entièrement roux; la var. **nigrobinotatus**: avec le 2^e segment largement, et le 3^e brièvement, marqués de noir.

Arge ustulata v. nov. **stigmatica**. Ailes ayant leur stigma largement foncé avec la trace d'une bande substigmatische foncée. Morvan (Pic).

Allantus Schæfferi Kl. Variétés nouvelles, de Saône-et-Loire ♂, à 2^o segment dorsal de l'abdomen noir, 4^o et 5^o fasciés, les autres maculés de jaune: v. **Viturati**; plusieurs segments tout noirs, 2^o et 6^o au moins, et 4^o fascié: v. **distinctiventris**.

Allantus amarus Grav. Variétés nouvelles, de Saône-et-Loire. ♂, à segments 5^o et 6^o, de l'abdomen, entièrement jaunes, les autres, sauf le 2^o qui est tout noir en dessus,

(1) Voir commencement, in l'*Echange*, n° 425, 1926, p. 11.