

L'ABEILLE



MÉMOIRES D'ENTOMOLOGIE

PAR

M. S.-A. DE MARSEUL

MEMBRE DE L'INSTITUT DES PROVINCES DE FRANCE ;
DES SOCIÉTÉS ENTOMOLOGIQUES DE FRANCE, DE BERLIN, DE STETTIN, DE BRUXELLES ET
DE SUISSE ; DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE LIÈGE,
D'HIPPONE, DE PHYSIQUE D'ÉDIMBOURG, DE CLIMATOLOGIE ALGÉRIENNE ; DES SOCIÉTÉS
LINNÉENNES DE LYON, DE NORMANDIE ; DES SCIENCES NATURELLES DE
FRANCPORT-SUR-MEIN ; D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE LA
SARTHE ; DE L'ASSOCIATION ZOOLOGIQUE DU LÉMAN,
ETC., ETC.

AVEC LA COLLABORATION DE

PLUSIEURS MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

ET AUTRES ENTOMOLOGISTES DISTINGUÉS

TOME V. — 1868-1869.



PRIX : 15 FRANCS.

PARIS

CHEZ { L'AUTBUR, rue Demours, Ternes, 24 ;
M. DEYROLLE fils, naturaliste, rue de la Monnaie, 19.

DESCRIPTIONS

DES

ESPÈCES NOUVELLES;

Par M. S.-A. DE MARSEUL.



Ce rapide voyage a produit d'intéressantes récoltes, et, quoique je n'en aie eu que des communications partielles, j'y ai trouvé beaucoup d'espèces nouvelles, surtout dans des groupes difficiles et disséminés. Je n'ai pas la prétention de les signaler toutes ici: il me faudrait plus de loisir pour les examiner d'une manière approfondie. Je me suis borné dans ce travail à décrire les plus saillantes, auxquelles j'ai joint quelques espèces des mêmes contrées, depuis longtemps indéterminées dans ma collection.

S. MM.

1. *Ditomus* (*Odontocarus*) **libanicola** 10* (*).

Allongé, d'un brun ferrugineux, peu luisant, hérissé de petits poils fauves. Tête ovale, peu convexe, rétrécie au col mais renflée par derrière, grossièrement ponctuée-ridée, avec deux fines stries transversales, dilatée latéralement, sous les yeux ronds, globuleux et noirs, en une forte dent mousse; rétrécie en devant avec le bord aminci et très-échancré; labre transverse, subsinué au bout. Antennes longues, filiformes et peu épaisses, plus claires; 1^{er} article long et un peu plus épais, 2^e cylindrique, de moitié moins long, 3^e deux fois plus long que le 2^e, un peu renflé au bout;

(*) Les numéros qui suivent les noms d'espèce indiquent la place que l'espèce décrite doit occuper parmi celles de mon *Catalogue* dans le genre correspondant.

les suivants cylindriques, presque d'égale longueur entre eux, mais un peu moins longs que le 3°. Palpes longs et aussi clairs; menton avec une petite dent aiguë dans son échancrure. Pronotum en cœur, très-large, déprimé sur le dos, avec une grosse ponctuation très-serrée et rugueuse, et la strie longitudinale médiane fine et bien marquée; un peu plus large que la tête, sinué en devant avec les angles arrondis et abaissés; bordé sur les côtés d'un rebord élevé qui se termine par derrière en angle droit à pointe saillante, et est accompagné en dessous d'un double sillon et d'une carène géminée. Ecusson triangulaire. Elytres de la largeur du pronotum, deux fois et demie plus longues, arrondies à l'épaule et sinuées en dedans, subparallèles au milieu, arrondies au bout; un peu aplaties sur le milieu du dos, entourées d'un mince rebord qui va jusqu'à la base, marquées de huit fortes stries, à peine crénelées, parallèles, la 1^{re} bifide à sa base, la strie supplémentaire se réunissant avec elle, réunies par paires postérieurement : 4 et 5, 3 et 6, 2 et 7, 1 et 8; 4-6 interstries plus larges que 7 et 8, égaux entre eux; marqués d'une série de gros points pilifères, peu serrés. Prosternum inégal, arrondi au bout, déprimé; flancs du propectus densément rugueux, ponctués. Pattes d'un ferrugineux clair. — Long., 13 mill. — Larg., 4,5 mill.

Syrie, Liban.

Voisin de l'*Asiaticus*, mais plus petit, plus déprimé sur le dos, d'une couleur plus ferrugineuse, plus densément et plus rugueusement ponctué sur le pronotum, sur la tête, et en général beaucoup moins luisant.

2. *Saprinus Manes* 42°.

Ovale, légèrement convexe, brun ferrugineux luisant. Tête ovale transverse, entourée d'une très-fine strie obsolète en devant; front assez convexe, égal, densément pointillé, rugueux; épistome rétréci subitement, tronqué au bout, continuant le niveau du front sans ligne de démarcation. Labre très-court, sinué au bout. Antennes courtes; scape fortement coudé; funicule très-menu et serré; massue plus claire, en large bouton circulaire. Pronotum transverse, très-large, convexe, élargi et bisinué à la base, avec l'angle

médian obtus et les angles latéraux aigus, dirigé obliquement sur les côtés et fortement arrondi un peu avant les angles antérieurs qui sont obtus et rentrés; très-rétréci et échancré en cercle par devant, finement rebordé dans son pourtour latéral et antérieur, creusé et strigusement ponctué le long des côtés, finement pointillé dans le reste de son pourtour. Ecusson petit, en triangle large. Elytres de la largeur du prothorax à la base, de moitié plus longues que lui, un peu convexes sur le dos, dilatées-arrondies à l'épaule, rétrécies sur les côtés, coupées droit au bout; bord infléchi bi-strié; stries dorsales obliques, également espacées, raccourcies 1-2 au-delà du milieu, 3-4 un peu moins, 4^e réunie en arc basal à la suturale qui se prolonge au bord apical; humérale peu nette au milieu des strigosités, subhumérale interne longue et droite, à peine disjointe, externe basale courte; ponctuation fine, aciculée, strigieuse sur les premiers interstries, obsolète à la base du 4^e. Pygidium densément ponctué, peu convexe, en triangle curviligne. Prosternum droit, assez large, parallèle, un peu convexe transversalement, coupé droit à la base, arrondi en devant, bordé de chaque côté d'une strie raccourcie en devant, et en devant d'une autre qui descend en dehors en embrassant les premières. Mésosternum en trapèze, finement rebordé. Pattes rousses; jambes antérieures minces, fortement dilatées et arrondies en dehors, crénelées de 5-6 petites dentelures espacées; postérieures étroites, garnies en dehors de quelques rares épines. — Long., 4 mill. — Larg., 3 mill.

Égypte supérieure.

Ressemble au *S. ægyptiacus* pour la forme, la couleur, le système strial, mais il en diffère par le pronotum creusé le long des côtés, les élytres finement ponctuées-aciculées, la ponctuation plus fine et moins serrée du pygidium, les stries du prosternum non réunies en devant, et surtout par les jambes antérieures dilatées-arrondies au bout et garnies de faibles denticules, au lieu de 5 fortes dents

3. *Anoxia cingulata* 1^a.

Allongé, assez convexe, d'un brun ferrugineux avec les

pattes plus claires, couvert de petites écailles blanches piliformes, garni d'une longue pubescence serrée sur le front et l'écusson et d'un duvet brun fourni sous la poitrine. Front court, transverse, avec les yeux gros, arrondis, noirs; épistome en carré large, creusé, un peu plus étroit à sa base et séparé du front par un sillon droit bien marqué, relevé et coupé droit en devant, avec les angles arrondis. Palpes maxillaires filiformes, dernier article allongé, creusé en dessus. Antennes à 1^{er} article renflé au bout, 2^e court triangulaire, 3^e cylindrique 2 fois plus long, 4^e court irrégulier, 5^e fortement élargi et encore plus court (les autres manquent). Pronotum en hexagone large, convexe, rétréci et bisinueusement échancré en devant avec les angles obtus, élargi en angle arrondi et finement rebordé sur les côtés, bisiné à la base avec les angles très-obtus et le lobe scutellaire arrondi, les poils-écailles plus jaunes au milieu forment deux bandes larges le long du dos, séparées par une ligne médiane plus blanche; de chaque côté deux plaques dénudées, lisses, luisantes, ovales, sont placées: l'antérieure contre l'angle latéral, et la postérieure plus en dedans. Ecusson ogival, avec la pointe anguleusement dénudée. Elytres un peu plus larges et 3 fois plus longues que le prothorax, finement rebordées sur les côtés, rétrécies par derrière, avec l'angle externe arrondi et l'interne aigu; très-finement chagrinées, élevées en bosses à l'épaule et longées de 2 ou 3 faibles côtes; entourées de macules irrégulières formées de poils écailleux plus serrés et plus blancs que le reste, sur deux lignes assez vagues. Pygidium en ogive, étroitement rebordé sur les côtés. Jambes antérieures à arête externe tranchante, inerme, terminée par une dent obtuse; crochets des tarse longs, acérés, arqués et munis à la base d'une forte dent aiguë. — Long., 25 mill. — Larg., 12 mill.

Cette charmante espèce vient se placer près de l'*A. orientalis*, auquel elle ressemble beaucoup, seulement les angles latéraux du pronotum sont plus marqués, ses places dénudées plus petites, plus allongées et placées plus en avant, la pubescence blanchâtre des élytres plus uniforme sur le dos et n'offrant des taches irrégulières de poils blancs condensés que le long du bord latéral.

Syrie, environs de Beyrouth; mai.

4. *Agrilus viridi cœrulans*. 21'.

Allongé, assez grêle, d'un vert métallique brillant, doré sur la tête et les bords latéraux du pronotum, bleu sur les élytres et encore plus sombre en dessous, avec de petites soies très-courtes, d'un jaune brillant. Tête grosse et ronde, verticale; vertex strigueux; yeux noirs, grands, ovales; front large, convexe, densément râpeux; épistome sinué au milieu, villeux, très-rétréci par les scrobes antennaires. Antennes grêles, assez courtes; 1-3 articles ovoïdes, 4-10 en triangle, allant en diminuant de longueur, dentés en scie, dernier petit en pointe. Pronotum à peine plus large que la tête, beaucoup plus large que long, peu convexe, densément strigueux en travers, impressionné au milieu, fortement creusé le long des bords latéraux, largement bisinué en devant avec les angles arrondis; à peine arqué sur les côtés qui sont longés de deux carènes tranchantes dont l'intervalle est ponctué rugueux, et qui se rejoignent à l'angle postérieur qui est un peu élevé et surmonté d'une autre carène contournée et courte; trisinué à la base. Ecusson en triangle, divisé dans sa largeur par une lame limitée d'un sillon. Elytres de la largeur du prothorax et quatre fois plus longues, concaves à la base avec le calus huméral saillant, sinuées sur les côtés au niveau des hanches postérieures, puis dilatées aux deux tiers, enfin atténuées en pointe, arrondies chacune et denticulées au bout, couvertes de squamules denses et fins. Mentonnière large, rebordée, rabattue, sans sinuosité. Prosternum assez large, plan, ponctué, arrondi au bout, villeux et rugueux ♂. 1^{er} et 2^e segments de l'abdomen soudés, très-grands; ventre couvert de rares petits points sétifères, finement granuleux ♂; dernier segment en demi-cercle, bordé d'un sillon. Pattes assez longues, grêles; jambes et tarses plus obscurs. — Long., 4,5 mill. — Larg., 1,2 mill.

Syrie, Beyrouth; très-commun en mai et juin sur la ronce.

Se rapproche pour la forme et la taille de l'*Olivicolor*, mais il est d'un beau vert-bleu avec la tête d'un vert doré, n'a pas la mentonnière sinuée non plus que le dernier seg-

ment de l'abdomen, et le ♂ est dépourvu des tubercules sur le 1^{er} segment abdominal, et de la fossette sur le dernier.

5. *Elater fulvago*. 23^a.

Ovale très-allongé, peu convexe, d'un rouge ferrugineux, plus clair en dessous, luisant, assez densément pointillé et finement pubescent de brun. Tête large, densément et plus fortement ponctuée; front convexe, arrondi à son bord antérieur qui est un peu relevé et surplombant l'épistome qui est transverse; yeux gros, arrondis, noirs. Antennes assez longues: 1^{er} article obconique, assez fort; 2^e petit, en bouton; 3^e obconique, aussi long que le suivant; 4-10 en triangle allongé, de même longueur, dentés en scie en dedans, allant en diminuant; dernier ovale, en pointe. Pronotum en trapèze, beaucoup plus long que large, convexe, rétréci et coupé droit en devant, avec les angles obtus et fort abaissés; étroitement rebordé et à peine arqué sur les côtés, renflé à la base en une bosse divisée par une courte impression, et limitée par une bande transverse très-enfoncée; angles postérieurs en pointe triangulaire, carénée dans sa longueur, très-longue et droite, serrant la base des élytres; ponctuation fine sur le dos, strigieuse et serrée le long des côtés. Ecusson plan, ponctué, long et arrondi au bout. Elytres de la largeur du pronotum à la base, deux fois plus longues, atténuées peu à peu et terminées en pointe arrondie, étroitement rebordées sur les côtés, sinuées au niveau des hanches postérieures, où se termine le bord infléchi qui est large et parallèle; stries ponctuées assez enfoncées, au nombre de 9, dont 5 intra-humérales plus espacées, rapprochées par derrière; interstries ruguleusement pointillés. Bord pectoral antérieur muni d'un lobe en arc, rabattu, limité de chaque côté par une entaille. Prosternum sillonné entre les hanches, terminé par une lame verticale aiguë. Hanches postérieures élargies en dedans en lame coupée droit par derrière, fortement rétrécies en dehors et devenant presque linéaires. Pattes peu robustes; cuisses courtes assez épaisses. — Long., 9 mill. — Larg., 2,8 mill.

Syrie, Beyrouth.

Vient se placer dans le voisinage du *Ruficeps*, mais il est deux fois plus grand, plus brun et plus fortement ponctué.

6. *Rhagonycha Kuleghana*. 4^a.

Très-allongé, subparallèle, luisant, corps et élytres avec une fine pubescence couchée, noirs ainsi que les yeux; tête, prothorax, antennes et pattes d'un jaune testacé clair, avec quelques rares poils courts de même couleur. Tête allongée, lisse, imponctuée, rétrécie derrière les yeux qui sont bombés, ronds; front plan, faiblement fovéolé entre les antennes; épistome largement arqué au bout avancé sur la bouche, flanqué de chaque côté d'un lobe. Antennes longues, un peu sétiformes: 1^{er} article long, un peu renflé au bout; 2^e petit, 3^e filiforme, deux fois et demie plus long que le 2^e, les suivants à peu près de sa longueur. Pronotum beaucoup plus long que large, en rectangle un peu élargi postérieurement, arqué en devant avec les angles, droit sur les côtés ainsi qu'à la base, avec l'angle droit, entouré d'un mince rebord élevé; lisse et imponctué en dessus, largement creusé de chaque côté avec les bosses dorsales peu saillantes ♂; beaucoup plus court, plus large, finement pointillé, un peu arrondi sur les côtés et sinué au-devant des angles postérieurs et au milieu de la base, un peu assombri et brunâtre sur le dos ♀. Ecusson en losange à pointe aiguë, creusée. Elytres un peu plus larges à la base que le prothorax, près de 5 fois plus longues, saillantes à l'épaule, rebordées sur les côtés, subparallèles sur les côtés, un peu rétrécies au milieu, arrondies au bout, déhiscentes, ruguleuses, avec 2 costules fines vers la base, noires avec le bord basal externe testacé, luisantes, finement pubescentes de noir. Dessous noir, avec une très-courte pubescence jaunâtre. Pattes longues, assez tenues. — Long., 10 mill. — Larg., 2,5 mill.

Cette belle espèce, de Kulegh, en Syrie, m'a été donnée par M. Lederer, le savant auteur de la Gazette entomologique de Vienne; elle vient dans le voisinage de la *Barbara*, mais sa coloration la distingue sans effort.

7. *Rhagonycha sareptana* 20^a.

Étroit, allongé, parallèle, peu convexe, luisant, parsemé d'une fine et rare pubescence jaune. Tête arrondie, large, noire à la base jusqu'aux antennes, jaune testacé pâle en devant, convexe sur le vertex; yeux noirs, ronds, assez saillants; épistome avancé, largement arrondi en devant. Palpes allongés, dernier article ovoïde, rembruni. Antennes assez fortes, de la longueur presque du corps, d'un jaune testacé pâle, rembrunies vers le bout: 1^{er} article long, renflé au bout; 2^e un peu plus court et plus menu, 3^e plus obconique et à peine plus long que le 2^e, les suivants filiformes, égaux entre eux et un peu plus longs. Pronotum en carré un peu transverse, légèrement courbé en devant, avec les angles obtus, presque droit sur les côtés avec le bord mince et réfléchi, avec une fossette en devant et une près de l'angle postérieur droit à pointe aiguë; base subsinuée, rebordée comme les côtés; dos élevé, largement creusé longitudinalement dans son milieu et divisé en deux bosses; dessus lisse, paraissant imponctué, jaune testacé clair, orné d'une large tache médiane en carré long, brune, étendue sur les deux tiers postérieurs. Ecusson noir, en lobe arrondi au bout. Elytres un peu plus larges à la base et quatre fois plus longues que le prothorax, saillantes et arrondies à l'épaule, rebordées et subparallèles sur les côtés, arrondies séparément au bout, déhiscentes, ruguleusement ponctuées, jaune testacé pâle, avec une pubescence rare, pâle. Corps noir, avec l'extrémité de l'abdomen testacé. Pattes allongées, assez robustes, jaune testacé pâle; crochets des tarses très-petits.—Long., 5 mill.—Larg., 1,3 mill.

Cette espèce gracieuse vient des environs de Sarepta en Russie; elle a de l'analogie avec l'*Herbea*.

8. *Malthinus syriacus*.

Oblong, subparallèle, déprimé. Tête ovale, finement chagrinée, un peu renflée sur l'occiput, rétrécie et impressionnée sur le col, noir mat, avec les mandibules testacées; yeux globuleux saillants; palpes maxillaires à dernier article long,

fusiforme, aigu au bout. Antennes longues, très-grêles, noires avec le 1^{er} article deux fois plus long que le 2^e, testacé dans sa 1^{re} moitié et renflé au bout; 2-4 allant en augmentant de longueur, subfiliformes. Pronotum de la largeur de la tête, jaune testacé luisant, à peine visiblement pointillé et faiblement pubescent de jaune, en carré long, arrondi en devant avec les angles, parallèle sur les côtés, coupé droit à la base avec les angles mousses, entouré d'un rebord élevé, relevé en bosse sur le col. Ecusson brun, lisse, en pointe arrondie. Elytres plus larges et quatre fois plus longues que le prothorax, avec les épaules saillantes, atténuées par derrière, d'un noir luisant, pointillées, peu pubescentes de gris, faiblement et vaguement sillonnées en dedans, arrondies séparément et marquées de jaune-soufre à l'extrémité. Pattes longues et grêles, brunes, avec les hanches testacées. Ailes brunes, dépassant notablement. — Long., 4 mill. — Larg., 1,2 mill.

Syrie, environs de Beyrouth.

9. *Malthinus sericellus*.

Allongé, subparallèle, déprimé; couvert en dessus d'une courte pubescence jaune soyeux-veloutée, serrée. Tête ovale, large, déprimée sur le front, densément pointillée ruguleuse, noir mat, avec une large bande longitudinale testacée qui va du milieu jusqu'au prothorax, mais devient quelquefois obsolète; bouche, palpes et 3 premiers articles des antennes testacés pâles, avec quelques taches brunes; yeux noirs, saillants, ovales; col très-rétréci avec une faible impression; dernier article des palpes ovoïde, terminé en pointe aiguë. Antennes brunes, filiformes, presque de la longueur du corps: 1^{er} article un peu épaissi au bout, de moitié plus long que le 2^e, qui est un peu renflé comme lui au bout et à peine moins long que les suivants. Pronotum moins large que la tête, oblong, subparallèle, cependant plus étroit par derrière, faiblement arqué en devant avec les angles arrondis et sans rebord, sinueux et un peu rabattus sur les côtés; presque droit mais sinué à la base, avec les angles obtus, muni devant et derrière d'un épais rebord élevé; lisse, luisant, noir, avec une bande médiane

dans toute sa longueur et un liseré étroit dans tout son pourtour d'un testacé pâle; inégal sur le dos. Ecusson en lobe arrondi, testacé pâle. Elytres plus larges à la base et quatre fois plus longues que le prothorax, dépassées par les ailes brunes, densément pointillées-chagrinées, avec une faible trace de deux nervures, d'un noir-brun peu luisant paraissant grises à cause de la pubescence, avec une bande testacée vague descendant de la base le long de la suture, et une tache apicale d'un jaune-soufre; saillantes à l'épaule, atténuées par derrière et terminées séparément en pointe arrondie. Poitrine jaune testacé pâle, ainsi que les pattes qui sont longues et grêles, avec les postérieures rembrunies au genou et marquées d'une ligne noire en dehors des hanches. Abdomen d'un jaune-soufre luisant, avec le pygidium noir entouré d'un rebord jaune; ♂ le dernier segment est très-long, rembruni et arrondi au bout, flanqué de deux lobes épais parallèles, arrondis à l'extrémité. — Long., 5 mill. — Larg., 1,3 mill.

Syrie, environs de Beyrouth.

10. *Malthinus Abd-el-Kader.*

Étroit, allongé, déprimé, d'un noir mat, peu luisant, garni d'une fine pubescence grise, serrée, assez longue sur les élytres. Tête ovale, large, densément pointillée-chagrinée, plane et égale sur le front, atténuée peu à peu en col par derrière, élargie en devant et largement ruguleuse, d'un jaune testacé jusqu'au-delà des antennes; palpes de cette dernière couleur, ainsi que les mandibules, dernier article ovoïde, terminé en pointe aiguë, rembrunie. Antennes filiformes, presque de la longueur du corps, noires, avec les 2 premiers articles et la moitié du 3^e testacés: 1^{er} long, arqué, un peu épaissi au bout; 2^e moins long même que le suivant, 3^e le plus long, les autres allant un peu en diminuant vers l'extrémité. Pronotum oblong, plus étroit que la tête, noir, finement granulé, terminé à ses deux extrémités par un bourrelet épais, jaune, qui se continue sur les côtés à la partie rabattue, arqué en devant, sinué et rétréci à sa base, limité latéralement par une carène lisse, sinuée, dilatée, arquée dans le premier tiers, aboutissant à un tuber-

cule luisant qui forme l'angle ; dessus marqué en devant d'une impression transverse, et par derrière d'une large fovéole au milieu. Ecusson en lobe arrondi au bout. Elytres beaucoup plus larges à la base et 3 fois plus longues que le prothorax, élargies à l'épaule qui est saillante obtuse, et formant une carénule qui se continue quelque temps par derrière, atténuées postérieurement, arrondies au bout séparément, et terminées par une tache jaune-soufre ; avec des stries ponctuées, séparées par des costules alternative-ment plus saillantes, plus marquées en devant et en dedans. Pattes grêles, allongées, d'un jaune testacé, avec les tarses rembrunis, ainsi que les genoux postérieurs. Dessous du corps noir-brun, avec la bordure apicale des segments du ventre jaune-soufre, et le dernier court, en grande partie roux ♀. Dans le ♂ l'abdomen est allongé, sub-cylindrique, les 5 premiers segments noirs avec une bordure testacée seulement sur les côtés, jaune-pâle au milieu ; dernier segment aussi long que les autres ensemble, arrondi au bout, roux, logé dans la concavité des bandes latérales en forme de spatule élargie au bout et d'un noir de poix luisant, avec une large tache d'un roux testacé à leur naissance interne ; pygidium noir-mat, creusé de chaque côté d'une fovéole oblique, et terminé au milieu par une carène tranchante. — Long., 5 mill. — Larg., 1 mill.

Il ressemble beaucoup au *Sericellus* pour la forme et la distribution des couleurs, mais son prothorax est plus allongé, plus rétréci par derrière, sans bande testacée médiane, ainsi que le front ; l'écusson est noir et les élytres sans bande vague rougeâtre le long de la suture ; l'armature de l'abdomen est aussi fort différente dans le ♂.

Un peu plus grand que le *Scriptus*, dont il se rapproche pour le port et les couleurs ; il s'en distingue par ses antennes avec les 3 premiers articles et les pattes en grande partie testacées, la tête sans ligne rouge au milieu du front, le pronotum plus long, arqué et plus fortement rebordé en devant, sans bordure latérale jaune, les élytres striolées longitudinalement.

Syrie, Beyrouth ; avec le précédent.

11. *Malaehius iridicollis* 38^a.

♀ Allongé, parallèle, faiblement pubescent de gris. Tête ovale assez grande, avec les yeux globuleux, ronds, saillants, noirs; front plan, légèrement impressionné de chaque côté entre les antennes, d'un pourpre doré, peu brillant; bord frontal et toute la bouche triangulaire d'un jaune-safran brillant, avec l'extrémité des mandibules et le dernier article des quatre palpes d'un noir très-tranché. Antennes noires, grêles, longues: 1^{er} article assez grand, renflé au bout et arqué, 2^e globuleux, 3^e et 4^e égaux entre eux en triangle long, à angle interne saillant mais obtus; les suivants au moins aussi longs, d'égale longueur, subfiliformes, diminuant peu à peu d'épaisseur, de manière que l'antenne devient sétiforme, dernier un peu plus long que le précédent, terminé en pointe. Pronotum de la largeur de la tête, en ellipse transverse, convexe sur le dos, un peu sinué de chaque côté à son bord antérieur, étroitement rebordé à la base avec le bord largement relevé aux angles ou plutôt à la partie de la courbe qui leur correspond, de la même couleur que la tête, à peine visiblement pointillé, avec les côtés largement bordés de jaune-orange ainsi que les côtés de la poitrine. Ecusson plan, arrondi au bout. Elytres 3 fois plus longues, et aussi larges que le prothorax, avec les épaules élevées en bosses arrondies, parallèles, un peu élargies postérieurement avec l'extrémité arrondie séparément; ruguleuses, densément et finement pointillées, pubescentes de blanc, d'un pourpre doré mat, avec une tache apicale jaune-safran ceinte en devant d'une bordure d'un vert émeraude brillant. Dessous d'un vert doré brillant, pubescent de gris, avec une tache pectorale, le milieu de l'abdomen, les bords latéraux et postérieurs de ses segments d'un jaune de safran. Pattes longues, peu épaisses, pubescentes, d'un même vert doré brillant, avec le dessous des tarsi et les crochets d'un jaune testacé. — Long., 6 mill. — Larg., 2 mill.

Cette espèce, dont je ne connais que la ♀, se distingue aisément à ses nuances éclatantes et tranchées. Elle est d'ailleurs plus longue et plus grande que le *M. maculi-*

ventris, dont elle se rapproche pour la distribution des couleurs.

Elle se trouve à Beyrouth, en Syrie.

12. *Anthocomus tripartitus*. 9^a.

Allongé, lisse, luisant. Tête noire, large, lisse, imponctuée et glabre, bouche testacée, palpes bruns; yeux gros, arrondis, saillants. Antennes grêles, longues, dépassant le milieu du corps, d'un jaune testacé, un peu rembrunies extérieurement et sur le 1^{er} article, qui est ovale assez long, 2^e petit, globuleux; 3-10 plus longs, obconiques, à peu près égaux entre eux, dernier de moitié plus long, subcylindrique, arrondi au bout. Prothorax rouge, lisse et très-luisant, assez convexe, largement et peu arqué en devant, arrondi et rebordé sur les côtés, rétréci et coupé droit à la base, avec un rebord élevé assez large, tous les angles arrondis. Ecusson large en arc. Elytres beaucoup plus larges à la base, avec les angles arrondis saillants, 3 fois plus longues que le prothorax, dilatées-arrondies postérieurement, à peine visiblement pointillées, finement pubescentes de gris, d'un noir-bleu jusqu'au milieu, jaune-paille ensuite, la limite dirigée obliquement et formant un angle rentrant à la suture; chacune des élytres munie d'une lamelle redressée, en conque irrégulière de même couleur. Dessous noir, luisant, pubescent; abdomen testacé au bout, dépassé de beaucoup par les élytres. Pattes grêles, allongées, d'un jaune testacé, avec les hanches, la base supérieure des cuisses de derrière et les tarses rembrunis en dehors; jambes postérieures un peu arquées. — Long., 2 mill. — Larg., 0,8 mill.

Cette charmante petite espèce vient de Syrie, Liban. Elle se rapproche du *Terminatus*, qui ne m'est connu que par la description.

♀ forme plus élargie, élytres plus dilatées-arrondies à l'extrémité, avec une large bordure d'un jaune pâle testacé.

13. *Anthocomus vesiculiger*. 9^b.

Ovale-oblong, assez convexe, peu luisant, noir, avec le prothorax rouge, le bout des élytres, les antennes et les

pattes en grande partie jaunes. Tête large, front plan, à peine visiblement pointillé; yeux ronds, assez grands. Antennes filiformes, longues, testacées, moins une tache brune sur le 1^{er} article, qui est renflé; 2^e petit, granuleux; 3-5 en triangle à angle interne saillant; 6-10 de même forme, mais allongés, sans angle saillant, égaux entre eux; dernier long, en ovale étroit, aigu au bout. Prothorax d'un rouge cerise, mat, densément pointillé, beaucoup plus large que long, convexe, bord antérieur arqué et avancé sur la tête; côtés rebordés, arrondis sous une même courbe avec l'angle antérieur; base coupée droit, rebordée, très-rétrécie, avec les angles à peine marqués. Ecusson noir, assez long, arrondi au bout. Elytres ovales, convexes, densément pointillées, vêtues d'une très-courte et fine pubescence, un peu plus larges à la base que le prothorax, avec les épaules rondes et saillantes, dilatées-arrondies vers le milieu, sinuées vers le bout qui est fortement atténué, creusé en dedans, renflé en vésicule en dehors et terminé par une lame mince, redressée, concave, avec un appendice brun en devant, et formant au bout une cavité à bords anguleux; la couleur est d'un noir-bleu jusqu'aux 4/5^{es}, puis d'un jaunepaille qui pénètre dans le noir en formant un angle sutural commun et un autre beaucoup plus grand au milieu; la vésicule est d'un jaune-orange. Pattes longues, grêles, testacées, avec la base des cuisses brune. — Long., 2 mill. — Larg., 0,8 mill.

Syrie, Beyrouth.

Voisin du *Tripartitus* pour la distribution des couleurs, mais il est plus terne, le pronotum plus ovale, la tache apicale jaune des élytres remonte moins haut et pénètre dans le noir en formant une pointe aiguë; elle est en outre marquée d'une vésicule lisse luisante, d'un jaune-safran.

14. *Ebæus flavobullatus*. 5^a.

♂ Oblong, peu convexe, vert-bleu métallique luisant. Tête large, triangulaire, avec les yeux noirs, arrondis, saillants; front plan, lisse, finement pubescent, marqué de chaque côté d'une petite strie oblique vers le milieu; épistome et bouche testacés, avec le labre et le bout des palpes

bruns. Antennes longues, assez épaisses, brun-noir, pubescentes : 1^{er} article plus épais, testacé au bout ; 2^e et 3^e obconiques, l'un plus court que l'autre, testacés avec une tache brune en dessus, ainsi que le 4^e ; les suivants subcylindriques, égaux entre eux ; dernier de moitié plus long, arrondi au bout. Pronotum ovale transverse, de la largeur de la tête, convexe, bien arrondi sur le pourtour, avec un étroit rebord sauf en devant ; ponctuation peu visible même à un fort grossissement ; caroncules rouges étroitement saillantes antérieurement sur les côtés. Ecusson presque entièrement caché. Elytres 2 fois 1/2 plus longues, plus larges à la base que le pronotum, avec les bosses humérales saillantes, très-finement pointillées avec une pubescence grise très-fine et très-courte, dilatées-arrondies par derrière, rétrécies à l'extrémité, qui est creusée d'un pli logeant un petit style brun et terminée par une excroissance jaune-safran, tenant par un pedoncule filiforme, contournée en haut en forme de spatule et concave en dehors. Dessous plus pubescent. Pattes longues, grêles, d'un noir-brun, avec le bout des cuisses, les jambes et les tarses antérieurs, les jambes et les tarses intermédiaires jaune testacé ; postérieures un peu ferrugineuses à l'extrémité des jambes et aux tarses. 1^{er} et 2^e segments de l'abdomen étroitement marginés de rouge ; dernier très-petit, échancré au bout. — Long., 2,6 mill. — Larg., 1 mill.

♀ plus dilatée-arrondie au bout des élytres, avec la marge près de l'angle sutural retroussée et bordée de rouge.

Syrie, Beyrouth.

Vient dans le voisinage du *Appendiculatus*, mais il est bleu, son pronotum aussi large que les élytres, et les antennes n'ont de testacé que l'extrémité du 1^{er} article et les 3 suivants.

15. *Ebæus pugio*. 5^a.

♂ Oblong, subparallèle, peu convexe, noir luisant, finement pubescent de gris, avec les élytres bleu très-foncé, finement pointillées. Tête triangulaire enfoncée jusqu'aux yeux, qui sont assez gros, ronds et assez saillants ; front lisse, plan, marqué de 2 fovéoles côte à côte entre les

yeux, et d'une plus large et plus profonde entre les antennes sur le devant. Antennes longues et assez épaisses, brun-noir, pubescentes : 1^{er} article renflé, 2^e subglobuleux, petit ; 3^e obconique, grêle, plus long, tous les trois testacés en dessous ; 4-6 obconiques, d'égale longueur ; les suivants devenant un peu plus longs et subcylindriques, dernier plus long que le précédent, terminé en pointe. Pronotum en ellipse transverse, convexe, rebordé dans tout son pourtour sauf en devant, plus large que la tête. Ecusson transverse, presque entièrement caché. Elytres 3 fois plus longues et aussi larges à la base que le pronotum, avec le calus huméral assez saillant ; dilatées-arrondies en ventre sur les côtés après le milieu, sinueusement rétrécies avant l'extrémité qui est irrégulièrement plissée et creusée, munie dans une coulisse le long de la suture d'un appendice d'un testacé brun, et au bout d'une saillie large mousse, cornée, noire, coudée et redressée en haut, avec une coulisse longitudinale postérieure. Pattes grêles, longues, brun-noir ; antérieures, avec le bout des cuisses, les jambes et les tarses d'un jaune testacé ; intermédiaires avec l'extrémité des jambes et les tarses également jaune testacé ; jambes postérieures arquées et un peu plus épaisses que les autres. Tous les tarses grêles et filiformes. 1-4 segments de l'abdomen étroitement bordés de brun testacé ; dernier profondément incisé au bout. — Long., 2,5 mill. — Larg., 1 mill.

Syrie, Beyrouth.

Il ressemble beaucoup pour la taille et la forme au *Flavobullatus* ; ses couleurs sont distribuées à peu près de même, mais plus obscures. Il se distingue aisément par la structure des élytres à leur extrémité et par la forme et la couleur de l'appendice.

16. *Antidipnis heteropalpus*. 1^{er}.

Ovale, élargi par derrière, assez convexe, noir peu luisant. Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux, qui sont ronds et bruns, très-élargie ♂, finement pubescente et peu visiblement pointillée, sillonnée faiblement dans son milieu, noire, rousse en devant, avec une espèce de museau concave, tronqué au bout, à l'angle duquel s'insère le 1^{er}

article des antennes qui est long, ovale, logé dans une fossette pratiquée au-devant des yeux, limitée en dedans par un rebord élevé; noire, plus petite et un peu convexe ♀; épistome, labre et bouche roux; palpes très-singuliers, noir-brun, les 2 derniers articles gros, longs, repliés les uns sur les autres, le dernier en spatule arrondie ♂; dernier article large, grand, tronqué au bout, précédé de deux autres petits, arrondis ♀. Antennes assez longues, plus épaisses ♂, d'un testacé pâle à la base, noir-brun après le 4^e article; 1^{er} ovale gros et plus long que les deux suivants ensemble, 2^e plus court que le 3^e, tous deux obliqués, les suivants de même forme et à peu près de même longueur, dernier plus long, terminé en pointe peu aiguë. Pronotum fortement transverse, finement pointillé et à peine pubescent, assez convexe, largement arrondi en devant et étroitement sur les côtés, un peu rétréci et rebordé par derrière, presque droit au milieu de la base, sans angles marqués, noir, avec une grosse tache latérale d'un testacé roux de chaque côté par derrière; ces taches reliées par une étroite bordure basale. Ecusson arrondi. Elytres pas plus larges à la base que le prothorax, assez convexes, arrondies à l'épaule, ovales, élargies postérieurement, arrondies ensemble au bout, avec l'angle sutural obtus; assez densément et fortement ponctuées, pubescentes de gris; ornées sur le bord latéral, aussitôt après l'épaule, d'un bourrelet obsolète testacé. Dessous noir. Pattes grêles allongées, cuisses noires avec les hanches et les genoux testacés; jambes testacées, postérieures presque droites; tarses de la couleur des jambes, antérieurs ♂ de quatre articles. — Long., 2 mill. — Larg., 1 mill.

Ressemble beaucoup au *Punctatus* pour la forme et les couleurs, mais il est plus allongé, ses jambes postérieures sont plus droites et plus longues, ses élytres moins fortement et moins rugueusement ponctuées, bordées d'un bourrelet testacé derrière l'épaule; la forme de la tête et sa couleur dans le ♂, les taches du pronotum l'en distinguent; la structure des palpes maxillaires surtout l'éloignent de tous ses congénères, et doivent en faire une coupe générique à part, si on suit les errements actuels, tous ces genres, *Antidipnis*, *Homæodipnis*, étant créés sur des modifications moins im-

portantes des palpes maxillaires des ♂ : on pourra l'appeler *Psauster* (ψάβω, palper).

Syrie, Beyrouth.

17. *Antidipnis palpator*. 1^b.

Ovale court, médiocrement convexe, luisant, à peine pubescent. Tête rouge testacé, verticale; front assez convexe, large, sillonné au milieu dans sa longueur, lisse; yeux ronds, assez grands, noirs; palpes maxillaires très-allongés, terminés par un article singulier implanté par un pédoncule mince sur le précédent, en forme de marteau à deux branches dont l'antérieure tronquée et brune au bout, et la postérieure amincée et taillée en biseau, creusé en dehors avec une tache noire. Antennes assez longues, grêles, filiformes, rouge testacé: 1^{er} article allongé, un peu épaissi vers le bout; 2^e petit, les autres subcylindriques, subégaux en longueur, 3 derniers bruns. Pronotum rouge comme la tête, aussi large, en ovale transverse, à courbe antérieure moins arquée que la postérieure, qui est finement rebordée, convexe, sans angles marqués. Ecusson noir, large, obtusément arrondi au bout. Elytres pas plus larges à la base que le pronotum, 2 fois 1/2 plus longues, avec la bosse humérale assez marquée, fortement dilatées-arrondies postérieurement, avec l'angle apical également arrondi; noir-bleu, avec l'extrémité largement bordée de jaune, ponctuées de points espacés assez visibles, avec quelques fines rides. Dessous noir, ainsi que la base des cuisses; dernier segment abdominal roux, prolongé, muni en dessous de 2 lanières. Pattes longues et grêles. Jambes antérieures filiformes et droites, postérieures un peu arquées, rembrunies au bout, ainsi que les tarses vers l'extrémité. — Long., 1,6 mill. — Larg., 0,8 mill.

Cette petite espèce, de Beyrouth, insignifiante au premier coup-d'œil, se fait remarquer par le dernier segment ventral et la forme des palpes maxillaires. Cette structure insolite, que je ne vois indiquée dans aucun auteur, annonce un genre distinct que le seul individu qui est sous mes yeux ne me permet pas d'établir avec connaissance de cause. Je le placerai provisoirement dans le groupe de l'*Ant. heteropalpus*.

18. *Troglops rhinoceros*. 1^a.

Lisse, noir luisant, comme vernissé. Tête en losange, large, dépassant de beaucoup les côtés du prothorax, d'un testacé pâle, avec les yeux noirs, ronds, proéminents, suivis par derrière d'une bande brune oblique; front traversé au-devant des yeux d'une large et profonde rigole en arc à concavité antérieure, autour d'une élévation triangulaire creusée à son sommet; épistome plan, sinué au bout; labre linéaire. Antennes filiformes, dépassant le milieu de la longueur, d'un testacé pâle: 1^{er} article renflé au bout, assez long; 2^e globuleux, 3-4 en triangle allongé, égaux entre eux; 5-10 subfiliformes, à peu près égaux, dernier ovalaire, étroit, un peu plus long que les précédents. Pronotum plus large que long et un peu plus étroit que la tête, arqué en devant, arrondi aux angles antérieurs sous une même courbe avec le devant des bords latéraux, oblique vers la base qui est relevée à la marge, tronquée avec les angles arrondis et avancée sur les élytres; assez convexe, lisse et luisant sur le dos; rouge testacé, orné dans son milieu d'une tache rectangulaire noire, large, partant du bord antérieur qu'elle occupe et sur lequel elle s'étend un peu en bordure de chaque côté et descendant jusque aux trois quarts. Ecusson arrondi. Elytres noires, luisantes, paraissant imponduées, débordant de beaucoup les côtés du prothorax avec les épaules arrondies et saillantes, 2 fois $\frac{1}{2}$ plus longues que larges, dilatées postérieurement et largement arrondies chacune au bout. Dessous noir luisant, dernier segment de l'abdomen en arc, creusé. Pattes grêles, longues, 4 antérieures d'un testacé pâle, avec la base des cuisses un peu rembrunie; cuisses postérieures noires; jambes presque droites, brunes ainsi que les tarses. — Long., 1,5 mill. — Larg., 0,6 mill.

Syrie, Beyrouth.

19. *Colotes flavocinctus*. 1^a.

Ovale-oblong, peu convexe, assez luisant. Tête noire, penchée, pointillée peu distinctement; vertex convexe, sillonné au milieu dans sa longueur; front large, creusé en

devant, plus fortement ♂ ; yeux subarrondis, assez saillants ; épistome étroit et bouche testacés. Antennes grêles, filiformes, longues, d'un jaune testacé, avec les 6 derniers articles bruns ♀ ; 1^{er} article long et assez épais, 2^e petit, les autres allongés, égaux entre eux, subcylindriques, dernier un peu plus long que le 10^e, arrondi au bout. Pronotum à peine visiblement pointillé, en ellipse transverse, convexe, largement arqué et sans rebords en devant, arrondi sur les côtés sans angles, coupé droit au milieu de la base, entouré dans son pourtour d'un rebord élevé, plus large de chaque côté et d'un testacé pâle ♀, largement bordé de roux testacé ♂, avec le milieu noir. Ecusson arrondi, noir. Elytres de la largeur du pronotum à la base, 2 fois 1/2 plus longues, avec les calus huméraux saillants et ronds, droites sur les côtés, dilatées-arrondies et convexes au bout, avec l'angle sutural obtus, ponctuées bien distinctement en avant, les points disparaissant par derrière, parsemées d'une rare et courte pubescence grise, noires avec une bande triangulaire au tiers et une bordure apicale d'un jaune testacé, plus étendues dans le ♂, ou jaune-pâle testacé avec une grande tache triangulaire scutellaire et une grosse arrondie aux 2/3, quelquefois rejoignant la basale le long de la suture. Dessous noir ; pattes grêles, allongées, testacé pâle, avec le milieu des cuisses brun ♀. — Long., 1,3 mill. — Larg., 0,8 mill.

Syrie, Beyrouth.

Se distingue de *Trinotatus* par sa taille plus petite, la ponctuation des élytres plus fine et plus serrée, et par la tache jaune latérale se dilatant jusqu'à la suture, qui n'offre pas de tache elle-même.

20. *Danacæa genistæ*. 22^a.

Oblong, d'un noir-bleu métallique assez luisant, densément pointillé, mais couvert d'une épaisse et courte pubescence couchée, d'un fauve lutacé terne en dessus, et d'un blanc soyeux en dessous. Tête triangulaire assez grande ; front plan, avec deux larges sillons longitudinaux superficiels entre les antennes ; yeux ronds, noirs ; épistome rétréci, sans ligne distincte qui le sépare, coupé droit au bout ; labre presque dénudé en demi-cercle ; bouche testacée avec

les palpes maxillaires noirs à dernier article ovale-oblong. Antennes d'un brun de poix luisant, finement ciliées, plus ou moins ferrugineuses à la base, assez épaisses, n'atteignant pas la base du prothorax : 1^{er} article globuleux, 2^e de même forme, moins gros ; 3^e obconique, un peu plus long que le 4^e ; 4-5 triangulaires, 6-10 transverses, courts, s'élargissant peu à peu, dernier turbiné, moins long que les deux précédents ensemble. Prothorax subcylindrique, de la largeur de la tête sans les yeux, un peu oblong, coupé droit en devant, un peu dilaté-arrondi sur les côtés après le milieu, arqué et rebordé à la base. Ecusson en carré large. Elytres coupées droit à la base, avec les épaules saillantes, quoique arrondies, et dépassant de beaucoup le prothorax, 3 fois plus longues que lui, fortement rabattues sur les côtés, un peu élargies par derrière et arrondies ensemble au bout, avec l'angle sutural obtus. Pattes avec les hanches d'un jaune testacé, assez allongées ; cuisses peu épaissies au milieu, jambes linéaires, droites ; tarsi linéaires, simples, 1^{er} article le plus long, 2-4 allant en diminuant de longueur, dernier rembruni, de la longueur des deux précédents ensemble. — Long., 2,8 mill. — Larg., 1 mill.

Cette jolie espèce se trouve sur le genêt, au Mont-Liban. Vient se placer près de *Serbica*, dont la diagnose lui va bien, sauf le dernier segment de l'abdomen qui est échancré et les antennes qui n'ont que 2 ou 3 articles de la base d'un testacé obscur.

24. *Pachyseelis chrysomeloides* Oliv. 7^a.

Arrondie, large et ventrue, d'un noir peu luisant, toute couverte de très-petits tubercules serrés, pilifères. Tête robuste, large, à granules très-fins ; front plan ; vertex renflé ; yeux étroits, verticaux. Antennes menues, n'atteignant pas la base du prothorax, insérées au-devant des yeux sous un large rebord du front, de 11 articles sétacés : 1^{er} gros, court, 2^e très-petit, 3^e deux fois plus long que le suivant, 4-8 obconiques, courts, presque de la même longueur ; 9^e en triangle plus large, 10^e transversal, dernier petit, beaucoup plus court et moins large. Pronotum coupé droit aux deux bouts, arrondi sur les côtés, deux fois plus large

que long, entouré d'un étroit rebord ; couvert également partout de petits granules ronds très-serrés, égaux. Ecusson élargi brusquement par derrière en deux lobes. Elytres paraissant en dessus comme une calotte sphérique, curvilinéairement entaillées en devant pour recevoir la base du prothorax, qui est beaucoup moins large et trois fois moins long ; épaules saillantes et arrondies, extrémité étroitement arrondie et surplombée par les élytres ; granules serrés partout, petits, plus arrondis, plus gros et par suite plus rapprochés sur le dos, plus aigus et plus fins dans le pourtour ; on aperçoit à peine quelques traces de lignes élevées en dehors vers le bout. Menton large, incisé au milieu du bord antérieur. Prosternum élargi et relevé au bout, se terminant sur la même ligne que les hanches. Pattes courtes, râpeuses, garnies de dents subépineuses ; tarsi grêles, courts, garnis de courtes soies noires. — Long., 16 mill. — Larg., 11 mill.

Syrie, Liban.

22. *Anthicus Lessepsi*. 41*.

Allongé étroit, noir, très-densément pointillé, vêtu d'une épaisse pubescence, avec quelques poils dressés plus longs, avec des bandes blanches et les antennes rousses, ainsi que les jambes et les tarsi. Tête ovale, presque carrée, convexe, d'un brun de poix, luisante et presque nue ; yeux ronds, noirs, peu saillants. Palpes maxillaires roux, longs, à dernier article largement sécuriforme. Antennes assez longues, testacées, filiformes : 1^{er} article dilaté en carré, 2-6 obconiques, plus longs, allant en diminuant ; 7-10 presque globuleux, plus courts, dernier terminé en pointe. Prothorax brun ferrugineux, densément pubescent de pâle, renflé et gibbeux en devant avec un col très-court et très-étroit, beaucoup plus long que large, atténué par derrière et coupé droit à sa base. Ecusson court, ferrugineux, en arc, caché. Elytres 2 fois plus larges et 3 fois plus longues que le prothorax, subparallèles, quoique un peu atténuées et arrondies par derrière, avec l'extrémité tronquée obliquement et laissant saillir le propygidium et le pygidium ; arrondies aux épaules, assez convexes, unies, très-densément

pointillées, couvertes de poils couchés brun-noir, avec deux bandes transverses jaune-pâle vêtues de poils blancs, l'une complète derrière l'épaule, rétrécie à la suture, l'autre subapicale droite, interrompue à la suture. Pattes assez longues et fortes; cuisses noires, renflées après le milieu; jambes linéaires droites, rouge testacé, ainsi que les tarsi. — Long., 3 mill. — Larg., 1 mill.

Egypte, Port-Saïd.

Très-voisin pour la forme et les couleurs du *A. 4-guttatus* Rossi; il s'en distingue par sa ponctuation très-fine et très-serrée, par la pubescence blanche condensée sur le pronotum et l'absence de ces longs poils hérissés qui garnissent ce dernier. Dédié à M. F. de Lesseps, le fondateur de Port-Saïd et l'illustre créateur du canal de Suez.

23. *Polydrosus (Eustolus) cedri*. 1^{er}.

Oblong, convexe, élargi et ventru par derrière, noir-brun, densément vêtu de petites écailles d'un soyeux brillant, marbrées de blanc, de roux et de brun en dessus. Tête grosse, arrondie, dégagée ou paraissant trop grosse pour pénétrer avant dans le prothorax; yeux noirs, assez petits, subarrondis, placés sur les côtés, plus distants du bord prothoracique que de l'épistome; front plan, large, avec une petite coulisse médiane en devant; rostre presque nul; épistome ferrugineux, en relief, transverse, sinué en devant, dénudé dans son pourtour, creusé en dessus d'une cavité transverse, squamuleuse. Scrobe court oblique, allant de l'épistome à l'angle inférieur de l'œil. Antennes longues, grêles, testacées; scape inséré tout au bout contre l'épistome, un peu arqué, 3 fois plus long que le scrobe et dépassant de beaucoup les yeux, épaissi au bout: 1^{er} article du funicule de même forme mais deux fois moins long; 2^e moins long, plus grêle; 3-7 allant en diminuant de longueur, massue brune, ovoïde, aussi longue que les 4 précédents ensemble, menue et terminée en pointe. Prothorax court, beaucoup plus large que long, tronqué et presque de même largeur aux deux bouts, convexe sur le dos, dilaté au milieu des côtés, avec un arc brun vague, adossé au bord antérieur sur le dos. Ecusson petit, en ogive. Elytres beau-

coup plus larges à la base que le prothorax, quatre fois plus longues, arrondies à l'épaule avec le calus marqué, ventruës par derrière et fortement rabattues dans leur pourtour, terminées ensemble en pointe au bout, avec 11 stries de points régulières, dont 6 en dedans du calus huméral; 4-5 se terminent ensemble et sont enveloppées par les autres. Pattes courtes, robustes, ferrugineuses; cuisses renflées aux deux tiers; jambes élargies au bout et terminées par une frange d'épines noires serrées. — Long., 5,5 mill. — Larg., 2 mill.

Cette jolie espèce, qui fait partie du sous-genre *Eustolus* et ne ressemble à aucune autre, vit dans le cèdre, aux environs de Blidah, Algérie. Je l'ai reçue de M. Lallemand et de Poupillier.

24. *Otiorynchus ventralis*. 79^a.

Noir, mat sur les élytres, court. Tête convexe; front avec quelques points, séparé en devant par un sillon anguleux; yeux petits, ronds et saillants; rostre épais, court, aplati en dessus, rugueusement pointillé avec de gros points. Antennes assez menues; scape plus long que tout le reste et dépassant le bord du pronotum, ponctué, renflé au bout; funicule de 7 articles, ciliés: 1-2 obconiques, plus longs que larges, égaux entre eux; massue compacte, pyriforme. Prothorax court, transverse, couvert de gros granules serrés, coupé droit aux deux bouts, dilaté-arrondi sur les côtés, plus étroit à la base que devant. Elytres subarrondies, ventruës, un peu déprimées sur le dos, renflées beaucoup au-dessus du niveau du pronotum, un peu enfoncées à la base de la suture, très-finement alutacées, marquées de 10 lignes de points fins, non enfoncées si ce n'est la 3^e; interstries larges, réguliers, avec une série de petits points à peine visibles. Pattes noires, luisantes, peu robustes; cuisses peu renflées au-delà du milieu, inermes — Long., 7 mill. — Larg., 4 mill.

Syrie, sur le Liban, au pied des neiges.

Cette espèce me semble appartenir au groupe de l'*Orbicularis*, dont elle a la sculpture sans avoir toutefois la forme du prothorax et des élytres de celui-ci.

25. *Otiorhynchus fallax*. 168^a.

Ovale-oblong, convexe, noir, pas très-luisant, avec de rares petits poils courts en dessus. Tête grosse, ronde et lisse derrière les yeux, peu enfoncée dans le prothorax; yeux petits, ovales, bruns, assez saillants; rostre large, aussi épais que le front, à peine séparé par une légère dépression, déprimé et inégal en dessus, densément criblé de points aciculés confluent, séparés par une mince carène longitudinale, profondément entaillé au bout. Antennes insérées au milieu d'un large scrobe ovalaire, robustes; scape aussi long que la tête, ponctué, un peu arqué et renflé au bout; funicule de 7 articles peu serrés, longuement ciliés: 1^{er} obconique, 2^e fusiforme, assez longs, égaux en longueur: 3-5 granuleux courts, 6-7 transverses; massue pyriforme aiguë, pubescente, compacte, paraissant de 5 articles. Prothorax guère moins long que large, tronqué droit aux deux bouts, un peu plus large à la base, dilaté arrondi un peu avant le milieu sur les côtés, peu convexe sur le dos, couvert de gros points nombreux qui latéralement se serrent, s'unissent et dont les intervalles forment des granulations. Ecusson en triangle large, lisse, incliné. Elytres elliptiques, de la largeur du pronotum à la base, arrondies largement sur les côtés, atténuées en pointe mousse au bout, égales et sans sillons, marquées de lignes de points en carré long, serrées, bien visibles sur le dos quoique peu enfoncés; les interstries avec une ou deux rangées irrégulières de points aciculés, plus rapprochés sur les côtés et sortant comme d'un granule de plus en plus marqué. Pattes robustes; cuisses renflées avant l'extrémité, inermes; jambes rugueusement ponctuées. — Long., 7 mill. — Larg., 3 mill.

Syrie, Beyrouth.

Cette espèce a quelques rapports de forme avec le *Monticola*, mais elle a les antennes plus fortes et plus longues, le rostre moins convexe et plus fortement ponctué, le pronotum moins dilaté sur les côtés et plus fortement ponctué, les élytres marquées de points carrés bien alignés et d'une ponctuation plus distincte sur les interstries.

26. **Otiorrhynchus** (*Eurychirus*) **Coeyi**. 345^a.

Ovale-oblong, assez convexe, d'un brun-noir luisant, avec les antennes et les pattes ferrugineuses. Front ponctué, rugueux, enfoncé à l'origine du rostre et renflé par derrière; yeux petits, arrondis, peu distants; rostre assez court, tricaréné et bicannelé, élargi au bout, séparé par un sillon de l'épistome qui forme un triangle sinué en avant et pointillé; labre grande, transverse, sinué au bout, arrondi aux angles, canaliculé au milieu. Antennes longues, peu épaisses, ciliées de jaune; scape grêle, un peu épaissi vers le bout et dépassant le bord antérieur du prothorax; funicule de la longueur du scape, 1-2 articles allongés, égaux entre eux, un peu épaissis au bout; 3-7 granuleux, assez courts; massue ovoïde, peu épaisse, terminée en pointe. Prothorax globuleux, dilaté et largement arrondi sur les côtés, coupé droit aux deux bouts, rebordé et plus large à la base qu'en avant, granulé avec de rares et courts poils dans l'intervalle, ponctué sur le milieu du dos avec une bande lisse assez vague, distant des élytres. Ecusson en large triangle, dont la pointe pénètre à peine entre les élytres. Elytres en ovale-oblong, plus larges et deux fois plus longues que le prothorax, convexes, fortement rabattues sur les côtés et au bout, arrondies à l'épaule, marquées de fines stries formées de points serrés, réguliers, peu profonds, émettant chacun un petit poil gris couché, et séparés par un tubercule bien marqué sur les côtés; les interstries présentent aussi chacun une série longitudinale de points pilifères, plus vagues et moins serrés. Cuisses renflées en massue avant l'extrémité, les antérieures munies en dedans d'un denticule à peine sensible; jambes dilatées au bout; antérieures bisinuées, denticulées en dedans dans la courbure, avec la dilatation apicale fortement acuminée à son angle interne. — Long., 7 mill. — Larg., 3,3 mill.

Découverte à Kab-Elias, en Syrie, par M. le major Coey, qui a bien voulu me la donner.

27. **Pholicodes brevisculus**. 7^a.

Pyriforme, assez convexe, brun de poix, avec les antennes

et les tarse plus ferrugineux, couvert de petites squamules blanches, marbrées de brun sur les élytres, avec de petits poils blancs couchés dans les intervalles. Tête assez grosse, un peu renflée au vertex, plane sur le front, qui va en s'amincissant vers le bout du rostre, profondément entaillé; yeux petits, ovales, globuleux, saillants sur les côtés à quelque distance du prothorax. Scrobe étroit, en crochet par devant, s'élargissant et devenant moins profond vers les yeux. Antennes longues, très-grêles; scape inséré un peu avant l'extrémité du scrobe, renflé au bout, atteignant au moins le bord du prothorax; funicule de 7 articles obconiques: 1^{er} un peu moins long que le 2^e, celui-ci de la longueur des 3 suivants ensemble, 3-7 égaux entre eux; massue de 4 articles, en ovale pointu. Prothorax beaucoup plus large que long, tronqué aux deux bouts, arrondi sur les côtés, plus large à la base qu'en devant, avec un vestige brunâtre peu apparent d'une ligne médiane et d'une autre arquée de chaque côté. Ecusson petit, en triangle. Elytres obovales, tronquées à la base et un peu plus larges que le prothorax, plus de 4 fois plus longues, arrondies à l'épaule, courbées sur les côtés, fortement rabattues au bout et terminées en pointe sinueuse, arrondie; 9 stries ponctuées peu profondes, parallèles, 4-5 réunies au bout; interstries égaux, plans; le sutural plus étroit. Hanches antérieures et intermédiaires globuleuses, saillantes, les unes adossées, les autres étroitement séparées, postérieures ovales. Pattes peu épaisses, cuisses inermes, renflées avant l'extrémité. Abdomen de 5 segments: 1-2 longs, inégaux, 3-4 courts, dernier en triangle équilatéral. — Long., 10 mill. — Larg., 4,5 mill.

Syrie, Liban.

Voisin du *Murinus*, mais moins trapu, à rostre plus étroit, à prothorax plus rétréci à la base, à élytres plus longues et plus en pointe; la couleur foncière est aussi moins obscure.

28. *Leucochromus gigas*. 1.

Très-grand, ovale, convexe, ventru, noir peu luisant, densément pointillé, parsemé de petites élévations ponc-

tuées, vêtu d'une pubescence blanche très-serrée, par-ci par-là squamuleuse. Tête grosse, arrondie; front bombé; yeux réniformes, latéraux, verticaux, déprimés. Rostre large, épais, 2 fois plus long que la tête, parallèle, longé dans son milieu d'une carène lisse luisante, commençant entre les yeux et se terminant par un espace élevé, triangulaire, dénudé, assez fortement ponctué; cette carène est marquée à la racine du rostre d'un gros point, et d'un autre entre les antennes. Scrobes profonds, partant de l'angle antérieur et s'obliquant en dessous l'un vers l'autre sans se rapprocher beaucoup. Antennes assez grêles; scape inséré au tiers antérieur, mince et un peu arqué d'abord, puis droit, renflé au bout, n'atteignant pas les yeux; funicule de 6 articles serrés, plus court que le scape: 1^{er} article obconique, plus court que le 2^e qui est de même forme et aussi long que les 2 suivants réunis; 3^e transverse, court; 4-6 en tranches coniques, un peu plus grands; massue ovale, peu épaisse, en pointe aiguë, dont le 1^{er} article, plus long que les deux suivants, est moins serré et pourrait également bien être compris dans le funicule; dernier de la longueur des deux précédents ensemble, très-aigu. Prothorax en tronc de cône, presque aussi large que long, atténué antérieurement avec le bord bisinué, faiblement dilaté latéralement, presque droit à la base, marqué dans son milieu d'une très-fine carène longitudinale. Ecusson triangulaire très-petit, caréné. Elytres bombées et fortement rabattues dans leur pourtour, plus larges à la base que le prothorax, 3 fois plus longues, presque droites sur les côtés, arrondies par derrière avec l'angle sutural obtus; calus huméral élevé, transverse, précédé d'un pli; stries profondes, ponctuées, au nombre de 10: 1-2, 4-5 réunies 2 par 2, les 6-10 atteignant la 3^e; interstries larges, sutural et 3^e élevés postérieurement. 1^{er} segment de l'abdomen sinué au bout, plus long que le 2^e, celui-ci plus long que les suivants qui sont, ainsi que lui, coupés droit par derrière; dernier en demi-cercle. Pattes robustes; jambes armées en dedans d'une forte épine apicale très-acérée et dirigée en dedans. — Long, 25 mill. — Larg, 13 mill.

Ce géant des Cléones, et même des Curculionites d'Europe ne ressemble à aucune autre. Il vient du Sahara algérien (Tuggurt).

29. *Stephanocleonus Amori* 26*?

Ovale-oblong, assez convexe, mat, noir, couvert d'une courte et dense pubescence gris-blanchâtre, qui çà et là forme en s'allongeant de petits pinceaux courts et sans ordre. Tête arrondie, enfoncée presque jusqu'aux yeux, qui sont noirs, étroits, presque perpendiculaires, longs, déprimés; front plan, incliné, avec une carène longitudinale tranchante; rostre épais, assez long, quadrangulaire, bilobé au bout, longé au milieu d'une carène mince, régulière, élevée; creusé latéralement de fovéoles, surtout vers la base; scrobes profonds, presque en ligne oblique, allant de l'angle antérieur jusque près de la pointe inférieure de l'œil, l'un vers l'autre. Antennes courtes, serrées, densément pubescentes de gris; scape inséré un peu avant la fin du scrobe, menu à la base, épaissi au bout, contourné et n'atteignant pas tout-à-fait les yeux; funicule de 6 articles serrés: 1^{er} plus long que le 2^e, 3-6 très-courts; massue de 5 articles, peu épaisse, allongée, ovale, terminée en pointe. Prothorax plus large que long, subparallèle, trisinué en devant avec les lobes oculaires larges et peu avancés; largement bisinué à la base, creusé dans son milieu en devant d'une cavité irrégulière limitée de chaque côté par une carène en S, frangée et divisée en deux par une mince carène longitudinale, et par derrière d'une autre ovale; ruguleusement et densément garni de gros points. Ecusson caché par une petite avance du prothorax. Elytres paraissant, vues en dessus, à la base de la largeur du prothorax, mais subitement dilatées en bosse à l'épaule, sinuées puis dilatées sur le bord latéral le long du métépistérne, sinuées au 1^{er} segment de l'abdomen, atténuées vers le bout et terminées chacune par une pointe courte; marquées de 10 lignes de gros points profonds, 3^e et 4^e présentant chacune deux lacunes au tiers et aux deux tiers; interstries plus étroites que les stries, quelques-uns, surtout 3^e et 5^e, élevés en carène; on remarque, en outre, de chaque côté de l'écusson un enfoncement basal limité par un rebord très-élevé du bord basal et du 3^e interstrie, un tubercule subapical assez saillant au bout des 4-5 stries ponctuées, des touffes de

poils blanchâtres placés irrégulièrement sur le dos depuis le tubercule huméral jusqu'au tubercule subapical, et d'autres plus petites placées en lignes le long du bord externe. Dessous densément pubescent de blanc, parsemé de petits points noirs très-fins, creusés et dénudés, et émettant chacun une petite soie. 1^{er} segment de l'abdomen très-grand, avec une petite impression au milieu de son bord postérieur, 2^e de moitié moins long, mais encore plus long que les deux suivants ensemble; 3-4 courts, égaux, coupés droit; 5^e arrondi en demi-cercle. Pattes vêtues de la même façon, mais ciliées de longs poils blancs. Hanches peu épaisses, et les postérieures beaucoup plus longues que les antérieures; antérieures globuleuses adossées, intermédiaires de même forme, séparées par un sternum assez large; postérieures transverses, 3 fois plus distantes; cuisses allongées, peu épaissies vers les 2/3; jambes linéaires, droites, terminées par une épine oblique à leur extrémité interne; crochets des tarses noirs, arqués, soudés à la base. — Long, 11 mill. (sans le rostre). — Larg., 4 mill.

Cette jolie espèce vient près du *Gaditanus* (Ramb.) et se reconnaît à première vue. Je rappelle par son nom la mémoire de l'entomologiste, du professeur de Cordoue Fernando Amor, qui me l'avait donnée.

30. *Bothynoderes soricinus*. 45^e.

Étroit, allongé, subcylindrique, noir, densément et finement chagriné, ruguleux, vêtu d'une courte et fine pubescence gris-blanchâtre. Tête grosse, arrondie, inclinée, enfoncée presque jusqu'aux yeux, qui sont en amande, peu convexes, distants en dessus, rapprochés en dessous; front égal, peu convexe, avec une toute petite ligne enfoncée à l'origine du rostre qui est large, droit, assez court, dénudé et lisse luisant au bout, avec une petite entaille de chaque côté. Scrobes assez profonds commençant peu après le bout, se dirigeant ensuite vers la pointe inférieure de l'œil l'un vers l'autre, en arc, et n'étant plus séparés que par un intervalle imperceptible. Antennes ferrugineuses, pubescentes, courtes; scape arqué, renflé au bout, inséré vers le milieu du scrobe de manière à ce qu'il atteigne le bout s'il

se tourne en devant, et dépasse un peu les yeux s'il se met au repos en se logeant en entier; funicule de 6 articles: 1^{er} un peu plus long que le 2^e et plus gros, 3-6 très-courts, serrés, égaux; massue de 4 articles, ovoïde, aussi longue que le funicule, peu épaisse et terminée en pointe aiguë. Prothorax oblong, coupé droit en devant et un peu rétréci, avec les lobes oculaires peu avancés; subcylindrique, largement bisinué à la base. Ecusson très-petit, à peine distinct. Élytres un peu plus larges à la base et 2 fois 1/2 plus longues que le prothorax, arrondies au bout ensemble avec l'angle obtus, fortement rabattues dans leur pourtour, marquées de 10 lignes de points longs et rapprochés, dont 6 en dedans du calus huméral qui est à peine marqué; l'intervalle sutural est plus large que les autres et relevé par derrière en bourrelet; on remarque quelque bandes plus noires et moins pubescentes qui traversent irrégulièrement les élytres. Les 4 premiers segments abdominaux sont coupés droit par derrière, 1^{er} un peu plus long que le 2^e, celui-ci aussi long que les 2 suivants ensemble, le dernier en demi-cercle. Pattes assez longues, assez épaisses; cuisses sans renflement; jambes moins longues, droites; antérieures hérissées en dedans de dents aiguës et peu serrées; tarses longs; dernier article long, inséré entre les lobes du 3^e profondément. — Long., 6 mill. — Larg., 1,6 mill.

Algérie, Biskra.

Son rostre court et aminci en pointe obtuse sans carène, son corps cylindrique le rapprochent de certaines espèces telles que *Jekeli* Wollast., *brevirostris* Gyl., *pulverulentus* Zubk. qui devraient former un petit groupe; sa petite taille, son étroite stature, sa pubescence blanchâtre traversée par des bandes dénudées le font reconnaître aisément.

31. *Zygopsides berytensis*. 1183*, 4.

Ovale allongé, d'un brun ferrugineux, avec le rostre, les antennes et les tarses d'un rouge moins foncé, couvert de squamules blanches serrées en dessous, jaunes et brunes sur le pronotum, transversalement rayées de bandes brunes et blanches sur les élytres. Tête verticale; yeux noirs, très-grands quoique peu convexes, ovales, un peu en pointe par

devant, n'étant séparés l'un de l'autre que par une très-fine ligne blanche longitudinale. Rostre assez long, robuste, arqué, élevé, caréné, rugueusement ponctué, squamuleux de blanc dans sa moitié basale, élargi et aplati, nu, peu ponctué dans la partie antérieure. Antennes ciliées de blanc, insérées vers le milieu; scrobes sinués, convergents en dessous; scape renflé au bout, remontant jusqu'à l'origine du rostre; funicule de 7 articles: 1^{er} et 2^e obconiques, à peu près d'égale longueur, mais le 1^{er} plus gros; 3-7 subégaux en triangle court; massue compacte de 3 articles, ovale, obscure. Prothorax coupé droit et pas plus large que la tête en devant, faiblement arqué sur les côtés, élargi et bisinué à la base avec un lobe scutellaire obtus, densément ponctué sur le dos, les squamules formant au milieu une espèce de crête longitudinale. Ecusson étroit, ovale. Elytres de moitié plus longues et beaucoup plus larges à la base que le prothorax, avec les calus huméraux peu saillants, atténuées au bout avec l'angle apical droit, densément ruguleuses, déprimées le long de la suture, marquées de 6 stries fines jusqu'à l'épaule et de 4 autres en dehors. Pygidium à découvert, terminé par une mince carène en arc. Prosternum sans coulisse; hanches antérieures saillantes, globuleuses, accolées; intermédiaires de même forme, un peu écartées; postérieures ovales, transverses; cuisses antérieures robustes, renflées après le milieu et armées en dedans d'une très-forte dent; jambes contournées en S, terminées par un crochet; 1^{er} article des tarses long, élargi vers le bout; 2^e plus court, en carré long; 3^e plus court encore, profondément bilobé; 4^e inséré entre les deux lobes, grêle, dépassant de beaucoup les lobes et terminé par deux crochets simples. Les cuisses intermédiaires sont bâties sur le même plan, mais moins fortes, avec la dent moins grande; les postérieures beaucoup plus allongées, moins renflées, plus finement dentées, avec une tache brune sur le renflement. Abdomen de 5 segments: 1^{er} et 2^e beaucoup plus longs que les 2 suivants, comme soudés au milieu; 5^e assez long, terminé par deux dents mousses saillantes. — Long., 5 mill. — Larg., 2 mill.

Ce charmant insecte, recueilli à Beyrouth, en Syrie, ressemble à un énorme *Coryssomerus*; on dirait un *Copturus*

ou un *Zygops* égaré dans les contrées méditerranéennes. Cependant il ne peut rentrer dans aucun de ces genres comme on peut le voir par les caractères signalés dans la description, qui, dans la structure soit du rostre, des antennes, du prosternum et des pattes, soit de l'abdomen, l'en éloignent considérablement. Il n'a pas le rostre allongé, les antennes grêles, le 3^e article du funicule plus long que le 1^{er} et le prosternum canaliculé des *Zygops*, le pygidium caché par les élytres et les cuisses carénées des *Copturus*; il se distingue aisément des *Coryssomerus* par ses grands yeux ovalaires contigus, sa tête enfoncée davantage dans le prothorax, qui ne présente pas d'étranglement. Je donnerai à cette coupe le nom de ZYGOPSIDES (de *Zygops*, et εἶδος, forme).

32. *Clytus gratiosus*. 42^a.

Cylindrique, pas très-allongé, noir luisant, garni de petits poils très-fins, couchés, visibles seulement à la loupe. Tête ruguleuse, creusée derrière l'insertion des antennes qui est fort élevée; front plan, incliné, ruguleusement pointillé; épistome bien limité, en ligne transverse ainsi que le labre; mandibules et palpes ferrugineux. Antennes ferrugineuses, médiocres, grêles, articles filiformes, 1^{er} plus épais, 2^e petit, 3-6 deux fois plus longs que le 1^{er}, 7-10 de moitié plus courts, décroissants, dernier terminé en pointe aiguë. Prothorax globuleux, plus long que large, atténué par derrière et beaucoup plus étroit que devant, couvert de petits granules serrés, rebordé aux deux bouts, avec une bande marginale de poils blancs à la base. Ecusson en triangle court, pubescent de blanc. Elytres près de 3 fois plus longues que larges, saillantes aux épaules et plus larges que le pronotum, rétrécies tout-à-fait au bout, avec l'angle obtus tronqué obliquement, couvert de petits points aciculés; ornées d'une petite moucheture post-scutellaire, de 2 étroites bandes un peu obliques, l'une au tiers, courte, placée au milieu, accompagnée d'un point externe, l'autre aux deux tiers allant de la suture presque jusqu'au bord externe; enfin d'une tache apicale de poils blanc de neige. Dessous couvert d'une pubescence brune serrée, avec des poils hérissés gris, et sur

les côtés de la poitrine et des deux premiers segments de l'abdomen de poils blanc de neige. Pattes longues, noires, avec la base des cuisses, les genoux et les tarses ferrugineux. — Long., 7 mill. — Larg., 2,3 mill.

L'un des deux individus que j'ai sous les yeux a le prothorax et la base des élytres brun ferrugineux, il est sans doute immature.

Syrie, Beyrouth; sur le chêne vert.

Cette gentille petite espèce a pour le dessin une grande analogie avec les *Cl. Massiliensis* et *Pelletieri*; cependant les bandes d'un blanc plus crayeux ne forment pas deux chevrons suturaux comme dans le premier, et la bande antérieure est oblique et non en forme de gros point comme dans le deuxième; en outre, ses antennes ferrugineuses, le bout des élytres obtus et sans dent externe, son pronotum sans tomentosité grise, rétréci et moins renflé vers la base, le distinguent aisément.

33. *Crioceris semirufa*. 1^a.

— ? *Cornuta* Fald., Faun. Transc. II. 323, 1836.

Corps noir luisant, tête, pronotum, élytres avec les cuisses, à l'exception de la base, et les jambes rouges. Tête inclinée, en triangle, étroitement étranglée derrière les yeux, qui sont très-saillants, bombés, échancrés en avant, et n'atteignant pas tout-à-fait la largeur du prothorax; col renflé, front plan, sillonné de 5 profonds sillons rayonnant autour d'un point central, dont 3 postérieurs et 2 antérieurs, limitant 2 bosses triangulaires adossées entre les yeux et une de chaque côté en dedans des antennes; épistome coupé droit en avant, formant avec le devant du front un espace triangulaire; labre court, échancré au bout; palpes maxillaires à dernier article ovoïde. Antennes longues, filiformes: 1^{er} article globuleux, 2^e en bouton, lisses, luisants; 3-4 obconiques, égaux, luisants, peu ponctués et pubescents; 5^e obconique, d'un tiers plus long que le précédent; 6-11 subcylindriques, à peine raccourcis, rugueux, obscurs, pubescents, ainsi que le 5^e; dernier un peu plus mince, muni d'un petit appendice. Pronotum un peu plus large que long, lisse sur le dos avec une rangée médiane

de 5 à 6 points écartés, droit au bord antérieur avec les angles en lobe très-saillant, profondément enfoncé sur les côtés, faiblement arqué à la base. Ecusson en triangle étroit, tronqué au bout. Elytres ensemble pas 2 fois plus longues que larges, légèrement convexes, coupées droit à la base, avec les bosses humérales fortement élevées et limitées en dedans par un enfoncement au fond duquel quelques gros points, finement rebordées en dehors et entourées d'un épais bourrelet limité en dedans par une ligne de fovéoles et de gros points, subsinuées après l'épaule, élargies par derrière, arrondies au bout ensemble et séparément, d'un éclat corné, marquées de gros points écartés, sérialement placés, fins et peu visibles au milieu et de larges rides transversales. Dessous garni d'une fine pubescence grise à l'extrémité des segments; cuisses renflées au milieu; jambes antérieures un peu arquées en dehors. — Long., 8 mill. — Larg., 3,3 mill.

Cette espèce vient se placer entre la *Stercoraria* et la *Merdigera*. Elle présente les gros points fovéolés qui rendent la première si remarquable, mais ils sont moins enfoncés, et elle a la tête et les pattes, moins les tarse et la base des cuisses, rouges. Elle ressemble à la *Brunnea* pour les couleurs, quoique l'extrémité de l'abdomen soit noire, mais les élytres sont plus allongées, moins convexes, plissées et parsemées de points fovéolés rares, tandis que dans celle-ci les lignes sont fines et formées de petits points rapprochés. Serait-ce, comme le pense M. Reiche, la *Cornuta* de Faldermann, dont M. Lacordaire a fait une variété de la *Brunnea*? Je n'ai pas pu étudier le type de Faldermann et n'ai pas vu assez d'individus pour me prononcer. Mais il me semble difficile d'admettre que l'individu trouvé à Beyrouth par M. Ancey, ne fasse qu'une même espèce avec nos *Brunnea*.

34. *Clythra* (*Gynandrophthalma*) *Hellenica* 82°.

♀ Subcylindrique, un peu élargie par derrière, d'un vert-bleu luisant, glabre en dessus, pubescente de gris en dessous. Tête enfoncée jusqu'aux yeux, verticale; vertex bombé; front fovéole, ridé, avec de gros points épars; yeux ovales, noirs; bouche d'un roux ferrugineux. Antennes courtes et

peu épaisses, testacées : 1-2 articles courts, assez gros ; 3-4 petits, obconiques ; 5-10 égaux entre eux, en triangle court, aplati, à angle interne en dent de scie, rembrunis ainsi que le 11^e qui est ovale et terminé par un petit article surnuméraire. Pronotum transversal, court, convexe, avec quelques points fins épars, entouré d'un rebord, un peu plus large sur les côtés, coupé droit en devant, bisinué à la base, arrondi sur les côtés avec les angles compris dans la même courbe, mais les postérieurs plus larges que les antérieurs. Ecusson en triangle presque équilatéral, avec quelques points s'élevant au sommet. Elytres 4 fois plus longues et à peine plus larges que le pronotum, subparallèles, avec un petit sinus sous l'épaule ; arrondies séparément au bout, entourées extérieurement d'un rebord élevé tranchant, avec la marge basale formant bourrelet, et tubercule derrière l'écusson ; calus huméral lisse, élevé ; ponctuation fine, assez rapprochée, un peu alignée, obsolète au bout. Pattes peu robustes, d'un rouge testacé, avec les crochets obscurs. Abdomen creusé d'une fovéole sexuelle, arrondi sous le dernier segment. — Long., 4 mill. — Larg., 2 mill.

Grèce ; Syrie, Beyrouth.

Ressemble beaucoup à la *Concolor* ; elle s'en distingue par ses pattes en grande partie d'un rouge testacé.

35. *Cryptocephalus Tappesi* 36^a.

Cylindrique, environ 2 fois plus long que large ; tête, corps et pattes noir luisant ; vêtu d'une pubescence blanchâtre, fine, soyeuse, pas assez épaisse pour cacher le fond ; dessus d'un noir lisse, luisant, glabre, avec des bandes rouges. Tête enfoncée jusqu'au milieu des yeux qui sont réniformes, échancrés en devant ; front plan, vaguement pointillé, marqué de 2 petits tubercules lisses entre les antennes, et d'une tache jaune de chaque côté au-dessous de l'œil ; épistome non limité du côté du front, avec deux petites taches rouges peu visibles à la base, sinué en devant ; labre transverse, légèrement échancré au bout, avec les angles arrondis. Antennes longues, plus grêles dans la ♀, avec les 4 ou 5 premiers articles testacés : 1^{er} obconique, courbé, médiocre ; 2^e plus petit, également obconique ; 3^e,

4^e et 5^e renflés au bout; celui-là le plus court, les suivants comprimés, élargis et obliques au bout, à peu près d'égale longueur, noirs. Pronotum fortement bombé, très-rabattu sur les côtés, moins en devant et peu à la base, bordé tout autour, sauf à la base, d'un sillon bien marqué avec la marge relevée; arqué en demi-cercle au bout, subitement rétréci aux angles antérieurs, qui sont peu marqués; bords latéraux presque droits, remontant vers l'épaule; bord basal largement bisinué, avec les angles bien marqués et le lobe médian tronqué; noir, lisse et luisant, avec une ponctuation fine, écartée, uniforme; orné d'une bordure rouge sur les côtés et en devant, et d'une ligne médiane qui se dilate anguleusement au-devant de l'écusson. Ecusson subovalaire, ascendant, avec une coulisse apicale. Elytres de la largeur du prothorax à la base, plus de 2 fois plus longues que lui, fortement rabattues latéralement, relevées en bosse à l'épaule, d'abord dilatées-arrondies sur les côtés, avec le bord infléchi lisse, atténué par derrière à partir du milieu; arrondies séparément au bout, étroitement rebordées dans leur pourtour, ridées et ponctuées peu densément et sans lignes de points régulières; d'un rouge luisant, ornées d'une bordure basale étroite, d'une suturale plus large qui s'étend presque jusqu'au bout, et de 2 bandes transverses noires, qui s'en vont rejoindre la bordure suturale, mais n'atteignent pas le bord externe, l'une au tiers, derrière la bosse humérale, souvent divisée en 2 taches dont l'interne remonte jusqu'à la base près de l'écusson, l'autre aux deux tiers. Si l'on veut considérer les élytres comme noires, elles seront bordées de rouge extérieurement jusqu'à l'angle sutural, avec 2 fascies transverses de même couleur: l'une sur l'épaule, raccourcie en dedans, l'autre derrière, communiquant quelquefois avec la première en dedans du calus huméral. Dessous noir, garni, ainsi que les pattes, de petits poils blanchâtres peu serrés, couchés; hanches antérieures très-distantes, insérées tout près du bord pectoral antérieur; cuisses antérieures très-épaisses dès leur base; jambes assez courtes, robustes, un peu sinuées, élargies au bout. ♂ Dernier segment ventral, refoulant les intermédiaires, creusé d'une profonde excavation transversale, à bord élevé et mince, prolongé en devant en une lame in-

clinée, mince, bilobée; pygidium ovale, convexe, pointillé, avec une large impression superficielle dans sa longueur.

♀ Dernier segment ventral creusé d'une fossette oviforme bien régulière, assez court, bisinueusement échancré au bout; pygidium strigusement pointillé, avec 3 carènes longitudinales tranchantes, médiane terminée insensiblement, externes raccourcies brusquement; séparées par de larges et profonds sillons. — Long., 6 mill. — Larg., 3 mill.

En outre, la femelle est plus large, plus fortement pointillée surtout sur le pronotum et a les élytres plus grêles.

Cette jolie espèce, qui se rapproche du *Cribratus*, se trouve au Mont-Kulegh, dans le Taurus. Je l'ai dédiée à M. Gabriel Tappes, qui prépare pour l'*Abeille* une monographie de ce groupe.

36. *Cryptocephalus pullus*. 128^a.

Subcylindrique, court, trapu, noir luisant, glabre en dessus. Tête fortement enfoncée dans le prothorax; front plan, d'un jaune testacé pâle, marqué au milieu de gros points, creusé d'un court sillon médian au haut du front formant une ligne noire, bordé de noir sur le vertex; yeux réniformes, aplatis; épistome en triangle large; labre petit, rembruni; parties de la bouche testacées. Antennes longues, filiformes, grêles, testacées, rembrunies à partir du 5^e article: 1-2 ovales, l'un beaucoup plus gros et plus long que l'autre; 3-5 égaux, assez longs, à peine épaissis au bout; 6-10 en triangle allongé; comprimés, allant en diminuant vers le bout; dernier ovale, à peu près égal au précédent. Pronotum beaucoup plus large que long, bombé sur le dos, atténué en devant avec les côtés fortement rabattus; coupé droit et un peu rabattu en devant avec les angles droits abaissés, largement bisiné et enfoncé à la base avec les angles droits, peu arqué sur les côtés, entouré d'un rebord mince et limité par une strie profonde dans tout son pourtour, accompagné d'une bande rousse peu régulière; surface parsemée de points assez visibles et peu serrés. Ecusson en triangle, lisse, ascendant. Elytres de la largeur du prothorax à la base et de moitié plus longues, un peu déprimées sur le dos, fortement rabattues sur les côtés et au bout, d'un noir de poix; en-

tourées d'une bordure d'un jaune testacé pâle, avec d'obscures linéoles jaunâtres sur les 3 et 4 interstries; marquées en en dedans et à l'extrémité d'un fin rebord, obtusément arrondies au bout; bosse humérale bien marquée, 10 lignes de points serrés bien marquées, dont 5 en dedans du calus huméral, équidistantes, obliques en dedans, non enfoncées, avec les interstries aplatis, et une demie juxtà suturale, et 5 autres externes, rapprochées et enfoncées. Dessous un peu vilieux. Prosternum plan, plus long que large, tronqué aux deux bouts, coupé en arc sur les côtés, avec quelques gros points. Pattes d'un jaune testacé clair, robustes; hanches antérieures globuleuses touchant au bord pectoral antérieur; cuisses fusiformes, épaisses; jambes à peu près de la longueur des cuisses et droites, épaissies au bout; tarses assez longs: 1^{er} article en carré, de la longueur des 2 articles suivants. Dernier article de l'abdomen ♂ large, arrondi au bout, sans excavation ni armature. — Long., 2,8 mill. — Larg., 1,2 mill.

Syrie, Beyrouth.

Se rapproche pour la taille et la forme générale des variétés obscures du *Minutus*, seulement son front est bordé de noir par derrière, avec une courte ligne longitudinale médiane de même couleur dans un sillon, le pronotum est plus élargi postérieurement, plus fortement ponctué, entièrement noir, avec une bordure jaune, son écusson est tout noir, ses élytres sont plus déprimées sur le dos, avec les stries superficielles sur le dos, formées de points plus petits et plus rapprochés.

37. *Cryptocephalus Dahdah*. 129^a.

Ovale, subcylindrique, d'un jaune pâle très-luisant, avec la poitrine et l'abdomen sur une plus ou moins grande étendue d'un noir-brun, le prothorax et les élytres à la base, l'écusson dans son pourtour bordés de noir, les 5 ou 6 derniers articles des antennes bruns, et 2 taches larges, carrées, d'un rouge-orange sur le pronotum. Tête fortement enfoncée; yeux réniformes, aplatis, noirs; front plan, nuancé de jaune-soufre et de roux, finement ponctué au milieu; épistome triangulaire échancré au bout. Antennes longues et grêles: 1^{er} article allongé, plus épais que les autres;

2^e ovoïde, beaucoup plus petit ; 3-5 très-menus, croissant en longueur ; 6-10 en triangle allongé, diminuant de longueur ; dernier ovale , égal au précédent. Prothorax transverse , beaucoup plus large que long, un peu bombé sur le dos, fortement rabattu sur les côtés qui sont rebordés et à peine arqués ; un peu rabattu, rétréci et rebordé en devant avec les angles droits, largement bisinué à la base avec les angles aigus et le lobe médian peu avancé et tronqué ; imperceptiblement pointillé. Ecusson en triangle étroit, ascendant. Elytres aussi larges à la base et plus de 2 fois plus longues que le pronotum , à peine élargies sous l'épaule avec une petite bosse humérale , obtusément arrondies au bout , finement rebordées, assez convexes ; lignes de points bruns, assez espacés, enfoncés en dehors, superficiels postérieurement, au nombre de 10, dont 5 en dedans de l'épaule avec le commencement d'une ligne scutellaire ; interstries égaux et lisses. Prosternum court, coupé droit aux 2 bouts, élargi par derrière, échancré en arc sur les côtés , par la cavité cotyloïde qui touche presque au bord pectoral antérieur. Pattes assez longues , robustes , d'un jaune testacé pâle ; cuisses fusiformes ; jambes droites un peu élargies au bout. Dernier segment de l'abdomen en arc assez long, sans enfoncement ♂ , plus court et coupé presque droit avec une fovéole ovigère ♀. — Long., 2 mill. — Larg., 1 mill

Syrie, Beyrouth.

Il est voisin du *Minutus*, mais il est plus petit et plus étroit ; son front est plus étroit avec de plus gros points épars ; son pronotum à peine distinctement pointillé et bordé de noir seulement à la base, avec les taches rousses bien limitées ; les stries ponctuées des élytres sont plus fines, à points plus petits et plus serrés, le dessous est jaune ou tout au plus rembruni au milieu ; il diffère du *Maculicollis* par sa tête sans taches brunes, ses antennes à peine rembrunies en dehors, son pronotum moins arrondi sur les côtés, moins convexe et à taches bien limitées, son écusson jaune bordé de noir, ses épaules sans tache noire ainsi que la couleur du dessous.

38. *Chrysomela Ancyi*. 31°.

Ovale large et fort bombée, d'un blond ferrugineux, lisse, luisante, glabre. Tête large, vaguement pointillée; front plan, sillonné longitudinalement au milieu, séparé de l'épistome par un sillon en circonflexe; labre transverse sinué au milieu, avec les angles arrondis. Yeux noirs, étroits. Palpes maxillaires à dernier article court, tronqué droit. Antennes longues et assez grêles: 1^{er} article renflé, 2^e en triangle 2 fois plus petit que le suivant, 3-6 décroissants, un peu épaissis au bout; 7-10 en tranches coniques, presque égaux; dernier plus long, ovale. Pronotum 2 fois plus large que long, convexe, finement ponctué sur toute sa surface, avec quelques gros points épars latéralement, entouré d'une strie marginale plus fine par derrière, rétréci et échancré en arc par-devant, avec les angles abaissés, obtus; arrondi sur les côtés avec le bord un peu épaissi, mais sans bourrelet bien marqué; largement arqué au milieu de la base, subsinué de chaque côté, avec les angles obtus, rentrés un peu sur les élytres. Ecusson en triangle allongé. Elytres arrondies presque régulièrement, avec un étroit rebord qui remonte le long de la suture mais en s'éloignant jusqu'aux 2/3, marquées de points assez petits, espacés, alignés par place, avec quelques autres visibles seulement à un fort grossissement. Pattes grêles, plus blondes. — Long., 11 mill. — Larg., 8 mill.

Liban, Aïn-Hamadi.

Voisine de la *Blanchei* pour la couleur, la ponctuation et un peu pour la forme; elle s'en distingue par le pronotum arqué sur les côtés et l'écusson en triangle isocèle aigu; elle a aussi des rapports avec la *Staphylæa*, mais celle-ci est moins ventrue, plus fortement ponctué, son écusson est arrondi et son pronotum bordé d'un bourrelet, et avec l'*Opulenta*, qui a les côtés du pronotum à peu près comme elle, mais qui est plus petite et dont la ponctuation est plus forte et plus serrée, l'écusson arrondi et les articles des antennes beaucoup plus courts et presque tous égaux.

Je l'ai dédiée à M. Ancy, entomologiste de Marseille, qui a rapporté du Liban beaucoup de rares et curieux coléoptères.

39. *Chrysomela libanicola* 70^a.

Elliptique, convexe, lisse, glabre, noire avec une teinte vert métallique en dessus, les antennes brun ferrugineux et les élytres bordées de rouge vif de sang. Tête large, parsemée de petits points, plus rapprochés en devant; front plan, marqué d'un faible sillon longitudinal médian raccourci, et séparé de l'épistome par un autre en circonflexe, mieux marqué. Dernier article des palpes maxillaires court, tronqué droit. Yeux étroits. Antennes longues et grêles: 1^{er} article gros, renflé; 2^e plus petit, obconique; le suivant 2 fois plus long, menu, un peu épaissi au bout; 4-6 de même forme, décroissants, 7 obconique, un peu plus gros; 8-10 plus cylindriques, subégaux; dernier en ovale allongé. Pronotum 2 fois plus large que long, peu convexe, vaguement pointillé avec de plus forts points épars sur les côtés, finement rebordé dans tout son pourtour, rétréci et fortement échancré en arc par-devant, avec les angles abaissés, assez aigus; arrondi sur les côtés, sans bourrelet, sinué de chaque côté avec le milieu arqué à la base; angles rentrés et obtus. Ecusson cordiforme. Elytres paraissant vues en dessus de la largeur du pronotum, subparallèles, arrondies au bout, avec un rebord qui remonte en s'écartant le long de la suture jusqu'au tiers; ponctuation fine, éparse, sans ordre; bordure rouge assez large et couvrant tout le bord infléchi. Pattes assez robustes, avec une transparence brune. — Long., 10 mill. — Larg., 7 mill.

Liban, Djebel-Keneisi, près des neiges.

Cette espèce n'est pas difficile à distinguer des espèces à bordure rouge, pas même de la *Limbata*, dont la ponctuation est beaucoup plus fine, le corps plus déprimé, la bordure rouge continuée à la base, le bourrelet du pronotum limité en dedans par un enfoncement profond, et les antennes noir-brun, moins les 2 premiers articles; ni de la *Carnifex*, beaucoup plus petite, noire, plus densément ponctuée et même ridée sur les élytres, creusée d'un sillon de chaque côté au prothorax, à écusson bien plus aigu et à articles des antennes plus courts, souvent même transverses.

40. Podagrica unicolor. 4^a.

Ovale-oblongue, convexe, d'un vert métallique luisant, glabre. Tête assez grande; front convexe, lisse; yeux ronds, pâles; épistome sinué et bordé de brun en devant, ponctué vaguement et impressionné; labre transverse, arrondi aux angles, avec une rangée de points sétifères. Antennes longues, insérées assez près l'une de l'autre en devant des yeux, d'un rouge ferrugineux, avec les 5 ou 6 derniers articles bruns: 1^{er} long et assez épais, fusiforme; 2^e ovale, plus court et moins gros; 3-5 obconiques, grêles, 3^e le plus long de tous, 4-5 égaux entre eux, les suivants de même forme, plus épais et plus courts, dernier ovale. Pronotum convexe, transverse, beaucoup plus large que long, avec des points faibles et écartés, courbé en devant, avec les angles abaissés rentrés, à pointe bien marquée; arrondi et bordé d'une strie sur les côtés, arqué à la base, avec une forte strie marginale et les angles très-pointus; de chaque côté, un court sillon longitudinal de moitié plus près du bord que du milieu. Ecusson en triangle curviligne, lisse et plan. Elytres plus larges et 3 fois plus longues que le pronotum, convexes, couvertes de points assez forts, surtout en devant où ils sont disposés en lignes irrégulières et vagues; arrondies à l'épaule sans calus marqué, subparallèles au milieu et largement arrondies au bout; très-finement marginées. Dessous noir, luisant; pattes d'un brun ferrugineux, avec le milieu des cuisses noirâtre. — Long., 3 mill. — Larg., 1,8 mill.

Syrie, Beyrouth.

Voisine de la *Saracena* Reiche, mais elle s'en distingue comme de toutes les autres *Podagrica*, par sa tête et son prothorax de la couleur des élytres.

41. Cassida Pellegrini. 13^a.

Ovale, fort convexe et comme gibbeuse, entièrement jaune-pâle, avec les extrémités des antennes et des tarse d'un vert-tendre, et une tache rouge de sang triangulaire sur les élytres autour de l'écusson, prolongée nébuleusement le long de la suture jusqu'aux 4/5^{es} de la longueur. Front lisse, plan; yeux obscurs, ovales. Antennes de 11 ar-

licles : 1^{er} un peu plus gros ; 3^e grêle, long ; 7-11 élargis en massue comprimée ; 11^e avec un petit appendice pointu. Pronotum convexe, vaguement ponctué, arqué en devant, avec les angles arrondis, sinué près du lobe anté-scutellaire, qui est tronqué droit. Ecusson finement alutacé, en triangle isocèle, à angles obtus. Elytres 2 fois plus longues que le pronotum, à angle huméral assez aigu quoique à pointe mousse, arquées latéralement, atténuées au bout avec l'angle sutural droit, élevées en sommet obtus derrière l'écusson, tombant en pente assez rapide sur les côtés, sans pli entre le corps et le bord latéral qui est vaguement ponctué, tandis que le reste de la surface est marqué de dix stries assez régulières, de 10 séries de points assez rapprochés en dehors, fort distants vers la suture ; on remarque de chaque côté de l'écusson une large cavité oblique ; tachées de rouge sanglant et fortement ponctuées. Dessous lisse et imponctué. Pattes assez fortes et courtes ; tarses larges, aplatis ; 3^e article profondément bilobé, 4^e enfoncé entre les 2 lobes, biongulé et ne sortant pas du précédent. — Long., 5 mill. — Larg., 3 mill.

Cette espèce, trouvée en abondance à Beyrouth, sur une plante saline qui croît au bord de la mer, a un peu en dessus le dessin de la *Thoracica* ou de la *Vibex*, mais elle affecte déjà cette disposition en cône qui devient si remarquable dans certaines espèces exotiques.

Je l'ai dédiée à M. Edouard Pellegrin, qui recherche dans ces pays intéressants les Coléoptères avec beaucoup d'ardeur et de goût.

42. *Cassida cornea*. 51^a.

Ovale court, bombée, d'un jaune lutacé, un peu corné, luisante, avec le dessous noir. Pronotum en ellipse transverse, convexe sur le dos, roussâtre avec les bords amincis, plus pâles et transparents ; vaguement ponctué çà et là, régulièrement arqué avec la marge retroussée, sinueusement avancé en lobé coupé droit au milieu de la base. Ecusson assez grand, en triangle équilatéral. Elytres 2 fois plus longues que le pronotum, l'enfermant dans ses angles huméraux qui sont avancés et arrondis ; arrondies et entourées

d'un large rebord mal limité, rugueusement parsémées de gros points, sans ordre; suture formant une carène étroite et saillante, accompagnée de 4 autres dont les 2 près de la suture sont très-bien marquées, raccourcies seulement devant et derrière. Front plan, peu ponctué, trapézoïde, jaune, encadré par les yeux qui sont grands et noirs; vertex sillonné au milieu; labre en demi-lune, Antennes insérées sur le haut du front entre les yeux, près l'une de l'autre, assez longues, dépassant le prosternum: 1^{er} article renflé, 2^e plus petit, tous deux d'un testacé pâle; 3-6 filiformes, à peine épaissis au bout, d'égale longueur, noir luisant, ainsi que le 7^e qui est triangulaire, plus court et plus épais. Les quatre derniers gris, pubescents, formant une massue obscure; 8-10 transverses, dernier ovoïde, terminé par un petit appendice. Dessous noir, luisant, peu ponctué; prosternum large et long, trisillonné en devant, arrondi par derrière; mésosternum court, transversal, échancré en devant pour recevoir le prosternum. Abdomen testacé dans son pourtour; segments presque de même longueur. Pattes assez robustes, insérées toutes à peu près à la même distance; d'un jaune testacé; cuisses épaissies au milieu et un peu obscurcies; jambes droites, élargies peu à peu vers le bout. — Long., 5 mill — Larg., 3,5 mill.

Cette espèce ressemble beaucoup à la *Ferruginea*, mais elle est plus brillante, plus petite et plus bombée; sa ponctuation est moins serrée et moins ruguleuse, et surtout les articles intermédiaires des antennes sont noirs, ce qui n'a lieu dans aucune *Ferruginea*.

Syrie, Beyrouth.

43. *Seymnus pharoides*. 8^e.

Ovale-subarrondi, convexe, noir luisant, avec 3 grosses taches jaune testacé sur les élytres, la bouche, les antennes et les pattes testacé clair, couvert d'une pubescence soyeuse blanchâtre. Front plan, lisse, large, terminé en devant par un bord mince, arqué; yeux ovales, assez grands. Pronotum court et très-large, convexe transversalement, largement échancré en devant, sinué de chaque côté derrière les yeux, avec les angles arrondis en oreilles saillantes, arrondi, rebordé et aminci sur les côtés, faiblement arqué

et finement rebordé à la base avec les angles obtus; assez également ponctué. Ecusson très-petit. Elytres un peu plus larges à la base et 3 fois plus longues que le pronotum; assez largement rebordées sur les côtés, qui vont en se rétrécissant et formant une courbe assez faible; terminées en pointe arrondie; bord infléchi roux, creusé, complet mais allant jusqu'au bout; bosses humérales largement arrondies; ponctuation assez rapprochée, un peu plus forte que sur le pronotum; taches jaune-pâle, grandes, assez régulières: 1^{re} triangulaire derrière l'épaule, 2^e en carré transverse au milieu tout près de la suture, 3^e ronde sur la ligne médiane au tiers postérieur. Pattes courtes; cuisses épaisses et un peu rembrunies en dessous. Prosternum en rectangle, rebordé sur les côtés. Plaques coxales postérieures atteignant presque le bord apical du 1^{er} segment, mais ouvertes complètement en dehors. — Long., 1,8 mill. — Larg., 1 mill.

Syrie, Beyrouth.

On dirait un *Pharus setulosus* plus petit et moins orbiculaire: même pubescence, même ponctuation, même système de couleurs, seulement il n'y a que 3 taches pâles au lieu de 4 sur les élytres; il vient dans le voisinage du *Kiesenwetteri*.

44. *Seymnus (Nephus) syriacus*. 35^e,

Ovale arrondi, convexe, luisant, noir en dessous avec les pattes testacées, jaune testacé en dessus avec des taches noires, couvert d'une pubescence jaunâtre assez épaisse. Tête enfoncée dans le prothorax; front plan, assez étroit; yeux grands, blanchâtres; épistome en carré, très-avancé. Pronotum court et très-large, finement ponctué, bisinué et très-rétréci en devant, avec les angles peu saillants, obtus, presque droit et rebordé sur les côtés, arrondi au milieu de la base et très-finement marginé, avec les angles droits; roux, plus ou moins rembruni sur le dos. Ecusson noir, en cœur. Elytres plus larges et 2 fois 1/2 plus longues que le pronotum, assez régulièrement arrondies et rebordées dans leur pourtour extérieur, assez fortement ponctuées; calus huméral saillant, lisse, jaune testacé; ornées de taches

noires, une large commune subtriangulaire autour de l'écusson, une étroite sur la suture aux $2/3$, reliée par du brun à la précédente, une grosse arrondie, bien limitée au milieu de chaque élytre, à peu près au même niveau; enfin une subapicale transverse, formant avec celle du côté opposé une bande qui longe l'extrémité. Dessous noir. Prosternum densément pointillé, étroit, limité par 2 petites carènes parallèles; plaques crurales en arc régulier, n'atteignant pas le bout du 1^{er} segment. Pattes roux testacé; cuisses épaisses au milieu avec une ombre obscure. — Long., 2 mill. — Larg., 1,7 mill.

Syrie, Beyrouth.

Ressemble beaucoup au *Binotatus* Bris. pour la taille, la forme et le dessin, mais ses élytres sont plus fortement ponctuées, la tache scutellaire commune ainsi que la bordure suturale est plus noire, la tache du milieu est plus au centre, plus grosse et ronde, et la bande subapicale est toujours bien marquée.

Il me semble utile de donner ici *in extenso* la description d'une remarquable espèce de *Dorcadion* d'Espagne, que me communiqua en 1856 le regrettable professeur de Cordoue, Fernando Amor, et dont le type s'est perdu. Cette description devait être publiée avec la figure dans la *Revue zoologique*, mais M. Guérin-Méneville s'est borné à en reproduire la diagnose.

Dorcadion Amori Mars. in Guér., *Revue zool.* 1856. 38.

Niger, nitidus, pube grisea vestitus, supra parce punctatus; fronte sulcata; pronoto utrinque obtuse dentato; elytris tenuiter costatis oblongo-ovalibus, apice singulatim rotundatis; tibiis apice bispinosis, intermediis extus obtuse dentatis, fulvo-hirtis.

Noir, luisant, couvert d'une pubescence grise peu épaisse, formant sur les élytres des mouchetures de couleur plus fauve, assez trapu et épais. Tête grosse, front bombé, sil-

onné longitudinalement dans son milieu; palpes grêles, bruns. Antennes courtes: 1^{er} article ponctué, gros; 2^e très-court, 3^e et suivants obconiques, décroissant progressivement, couverts d'une pubescence plus claire à la base. Pronotum plus large que long, de la largeur de la tête, bisinué à la base, coupé droit en devant, élargi sur les côtés en dent obtuse, couvert de points espacés fins, obsoletés au milieu. Ecusson en cœur très-large, sillonné. Elytres trois fois plus longues que le pronotum, un peu plus larges à la base, légèrement curvilinéaires sur les côtés et assez convexes, arrondies au bout, couvertes de points espacés et parcourues dans toute leur longueur par deux faibles côtes rapprochées en dedans de l'épaule. Dessous finement ponctué; pattes robustes; jambes terminées par deux courtes épines, intermédiaires garnies à l'extérieur d'une dent obtuse et d'une villosité épaisse et longue de couleur fauve; postérieures plus longues, courbées; tarses garnis en dessous de brosses ferrugineuses. — Long., 13 mill. — Larg., 4,5 mill.

Cette espèce, découverte en Espagne sur la Sierra-Nevada par M. F. Amor, ne peut se confondre avec aucune autre; elle se rapproche du *D. rufipes* pour la forme du corps et du *D. striatum* pour les couleurs.

ERRATA.

A la page 208, au lieu de *Cryptocephalus pullus*, lisez: *Crypt. pullatus*.

