

# L'Échange, Revue Linnéenne

## ESPÈCES ET VARIÉTÉS NOUVELLES DE COLÉOPTÈRES

**Aptinus creticus.** Brillant, roussâtre, les membres étant plus clairs avec les élytres, le pygidium et l'abdomen obscurs ; tête longue, à peu près de la largeur du devant du prothorax ; prothorax subcordiforme, plus long que large, sillonné et indistinctement ponctué sur le disque avec une faible dépression de chaque côté de la base, modérément rétréci à la base avec les angles presque droits ; élytres assez courts et larges, tronqués en oblique au sommet, subarrondis en courbe vers les épaules qui cependant restent distinctes, faiblement mais largement striés. Long. 9 mill. Crète (coll. Pic). — Paraît différer de *acutangulus* Chd. et *mutilatus* F. par les élytres plus courts ou plus larges avec la courbe des épaules distincte, le prothorax assez cordiforme à base presque droite, la coloration non foncée de l'avant-corps ; paraît se rapprocher par sa forme du *cordicollis* Chd. (différemment catalogué) mais *creticus* a les impressions basales du prothorax indistinctes et les interstries des élytres sont peu carénés, etc.

**Bythinus cythereias.** Assez robuste, entièrement roux-testacé, pubescent de flave ; tête à peu près de la largeur du prothorax ; antennes épaisses, le 1<sup>er</sup> article ♂ fortement dilaté anguleux à son sommet interne, 2<sup>me</sup> subglobuleux, moyen ; prothorax relativement court, impressionné devant la base ; élytres peu longs, faiblement ponctués, impressionnés à la base ; cuisses non épaissies chez ♂ avec les tibias antérieurs faiblement dentés avant l'extrémité. Long. 1,6-1,8 mil. Ile de Cérigo (coll. Pic). — Voisin de *corcyreus* Reitt. par sa structure antennaire mais 1<sup>er</sup> article ♂ plus fortement denté et cuisses non épaissies ; diffère en outre de *peloponnesius* Reitt. (ex-description) par les cuisses non dilatées, le 2<sup>me</sup> article des antennes ♀ plus étroit que le premier.

**Acmæodera bipunctata** Ol. var. *Jacqueti*. Elytres sans aucune macule jaune. France Méridionale : Nyons (coll. Pic).

**Malthodes argivus** Ksw. v. *hymettensis*. Prothorax plus ou moins testacé, variablement maculé de foncé, dernier arceau dorsal ♂ paraissant plus long que chez forme type, dont cette variété se distingue au moins par la coloration du prothorax. Grèce : Mont Hymette (Pic).

**Malthodes insulcatus.** Un peu allongé, brillant, noir à l'exception du pourtour du prothorax et du dessous du corps et d'une tache apicale aux élytres qui sont flaves, tête assez grosse ; antennes robustes, de la longueur du corps ♂ ; prothorax presque carré, à angles postérieurs peu saillants, foncé et un peu inégal sur le disque, jaune ou roux sur tout le pourtour ; élytres un peu plus larges que le prothorax, foncés mais teintés de gris sur le milieu avec une macule apicale jaune très distincte ; pattes foncées, segments abdominaux bordés de jaune, les derniers segments dorsaux chez ♂ simples et assez longs, l'avant-dernier segment ventral subtriangulaire, le dernier en forme de spatule presque droite et échancrée au bout. Long. 3,5-4 mil. Corfou (Pic). — Par sa structure abdominale voisin de *turcicus* Ksw., mais coloration différente ; distinct de *sulcatus* Brg., par son prothorax et les élytres non concolores au sommet.

**Malthodes maronitus.** Peu allongé, brillant, noir ou roux obscur avec la base des antennes, le bord postérieur du prothorax et le dessous du corps en partie testacés, élytres à macule apicale flave peu distincte ; tête robuste ; antennes ♂ à peu près de la longueur du corps ; prothorax transversal, à angles antérieurs marqués, en majeure partie foncé, plus ou moins testacé à la base ; élytres très peu plus larges que la base du prothorax, peu longs, ordinairement obscurs, parfois un peu flaves ; pattes plus ou moins foncées ; ♂ à derniers segments abdominaux à peu près comme *lautus* Ksw. mais segments dorsaux très longs, le terminal étant recourbé et fourchu au sommet. Long. 2,2-2,5 mil. Mont Liban (Pic).

**Pelochrous scutellaris** Ab. var. **flaviceps.** Tête entièrement testacée. Algérie : Inkermann (Pic). — **Pelochrous pallidulus** Er. var. **maculicollis.** Prothorax plus ou moins maculé de foncé sur le disque, pourtour de l'écusson d'ordinaire largement entouré de noir. Maroc : Tanger (coll. Pic).

**Danacæa Lysholmi** Pic, var. **subrobusta** (1<sup>er</sup> groupe). Modérément allongé, noir métallique orné en dessus d'une pubescence jaune assez dense, en dessous d'une pubescence blanche, antennes et pattes testacées. Long. 4,5 mil. Syrie (coll. Pic). Ayant comme *Lysholmi* Pic l'avant-corps gros mais celui-ci est un peu moins robuste, prothorax non, ou à peine, impressionné près des angles antérieurs.

**Danacæa splendida** (2<sup>e</sup> groupe). Allongé, métallique, orné en dessus d'une pubescence assez dense blanchâtre à reflets d'argent et en dessous d'une pubescence blanche, pattes et antennes testacées, ces dernières rembrunies au sommet ; tête aussi large que le prothorax, celui-ci plus long que large, peu élargi au milieu ; élytres longs, atténués et explanés au sommet. Long. 4,5 mil. Tokat (coll. Pic), aussi coll. Demaison. — Espèce facile à reconnaître par sa pubescence brillante à reflets d'argent et sa forme rappelant celle de *D. angulata* Kust.

**Microptinus melitensis.** Brillant, hérissé de longs poils clairs, brun roussâtre avec les élytres plus ou moins noirs (exceptionnellement bruns) ayant les stries ponctuées faibles mais distinctes, les intervalles assez larges, le prothorax orné de pustules saillantes, rapprochées. Long. 2-2,3 mil. Malte (Dr M. Cameron) (1) — Très voisin de *brunneus* Pic, en diffère par le dessus des élytres moins bombé, les antennes à dernier article plus court ou plus épais ; distinct en outre des *nobilis* Reitt. et *Reitteri* Pic soit par les stries, soit par la forme élytrale non distinctement étranglée près de la base.

**Eutagenia minutissima.** Peu pubescent, ferrugineux avec les élytres noirs, avant-corps peu brillant ; tête longue, un peu diminuée en arrière ; antennes relativement longues, peu épaisses ; prothorax assez étroit, un peu diminué en arrière, fortement ponctué ; élytres très brillants, en ovale allongé, un peu resserrés à la base avec les épaules proéminentes en avant, stries ponctuées, la ponctuation plus forte que celle du prothorax. Long. 3-3,2 mil. Ile de Cérigo (coll. Pic). — Distinct de *smyrnensis* Sol. par la ponctuation forte de l'avant-corps, la coloration ; de *hellenica* Reitt. par la tête un peu diminuée en arrière, les antennes moins grosses.

**Corticæus rufithorax.** Étroit et allongé, testacé ou roussâtre clair avec seulement l'extrémité des élytres, l'abdomen et les yeux noirs ; antennes épaisses ; prothorax robuste, plus long que large, légèrement déprimé, à ponctuation moyenne ; élytres à

(1) Les types de cette espèce, ainsi que ceux des *Podistrina Cameroni* et *Anthicus melitensis* sont dans les collections Cameron et Pic.

peu près de la largeur du prothorax, testacés avec environ le tiers apical noir, cette dernière coloration plus avancée sur la suture. Long. 3 mil. Grèce : *Olympia* (Pic). — Par sa forme voisin de *linearis* F. et bien distinct par sa coloration.

**Gonodera macrophthalma** Reit. v. *latior* ♀. Forme un peu trapue, tête robuste, prothorax sans échancrure distincte sur le milieu de sa base. Caucase (coll. Pic).

**Zonitis auricoma** Esch. var. *semideleta*. Chaque élytre orné seulement d'une macule apicale et d'une macule postmédiane noires. Anatolie : Smyrne, Bournabat (coll. Pic).

**Mylocerus curtipennis**. Assez large, noir, revêtu de squamules d'un gris terreux, antennes et pattes testacées ; tête courte, aussi large que le prothorax, faiblement sillonnée entre les yeux ; rostre épais, triangulairement échancré en avant ; 2<sup>e</sup> article du funicule de la longueur du 1<sup>er</sup>, 3<sup>e</sup> et suivants courts ; prothorax large, un peu plus étroit à la base, à ponctuation forte et espacée ; élytres relativement courts et larges, faiblement striés-ponctués avec les interstries ornés de squamules blanches peu distinctes. Long. 5,5 mil. Taurus cilicien (coll. Pic). Voisin de *damascenus* Mill. mais forme moins allongée, revêtement différent, etc.

**Mylocerus robusticeps**. Un peu allongé, noir revêtu de squamules blanches sur le dessous du corps et les côtés, en majeure partie fauves ou brunes sur le dessus, antennes et pattes brunes avec les cuisses foncées ; tête robuste, assez longue, à peu près de la largeur du prothorax, sillonnée jusque sur le vertex ; rostre épais, triangulairement échancré en avant ; antennes robustes, 2<sup>e</sup> article du funicule de la longueur du 1<sup>er</sup>, 3<sup>e</sup> et suivants courts ; prothorax large, faiblement arrondi sur les côtés, à ponctuation forte et espacée, orné d'une ligne longitudinale blanche médiane ; écusson à pubescence blanche ; élytres assez longs, assez fortement striés-ponctués avec les interstries indistinctement squamuleux. Long. 6 mil. Taurus cilicien (coll. Pic). — Espèce très facile à reconnaître par sa grosse tête jointe à son revêtement.

**Rhamnusium anatolicum** Pic ? var. *obscuripes*. Pattes et abdomen en partie foncés, antennes courtes, testacées, avant-corps rougeâtre, élytres bleus. Turquie (coll. Pic).

**Agapanthia subflavida**. Assez robuste et court, noir plombé, densément pubescent de jaunâtre en dessous avec les pattes pubescentes de gris et flave, orné d'une pubescence fine, celle-ci jaune sur le disque et le bord des élytres avec sur les côtés de ces organes une bande, faite de pubescence grise, partant des épaules et atteignant le sommet ; antennes courtes à 3<sup>e</sup> article, celui-ci muni d'une petite brosse pileuse, et articles suivants gris à la base ; prothorax large, atténué en avant, orné de 3 bandes longitudinales jaunes, la médiane non étroite. Long. 15 mil. Anatolie (coll. Pic). — Par sa forme et son dessin voisin de *Angelicæ* Reitt., mais pubescence du dessous du corps jaunâtre, 3<sup>e</sup> article des antennes muni à l'extrémité d'une petite brosse pileuse, bande jaune médiane du prothorax assez large (d'après la description), bande grise latérale des élytres non élargie en arrière.

**Parnops atriceps**. Allongé, très atténué à l'extrémité, noir plombé, peu densément pubescent de grisâtre, épistome roux, labre, palpes, antennes et pattes testacées. Long. 6,5 mil. Chine (coll. Pic). Moins pubescent, plus atténué au sommet que *P. Glasunowi* Jac. dont il diffère encore par la tête foncée (moins le labre roux), le prothorax et les élytres concolores.