

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

Natura maxime miranda in minimis.

5
Cinquième série.

— 4 —
TOME QUATRIÈME
—

PARIS

AU BUREAU DU TRÉSORIER DE LA SOCIÉTÉ

M. LUCIEN BUQUET,

rue Saint-Placide, 52 (Faub. Saint-Germain).

—
1874

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE



BULLETIN DES SÉANCES

Recueilli par M. DESMAREST, Secrétaire

ET

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Rédigé par M. BEDEL, Archiviste adjoint



Année 1874



MEMBRES DU BUREAU :

<i>Président</i>	MM. C.-E. LEPRIEUR.
<i>Vice-Président</i>	Eugène SIMON.
<i>Secrétaire</i>	Eugène DESMAREST.
<i>Secrétaire adjoint</i>	Hippolyte LUCAS.
<i>Trésorier</i>	Lucien BUQUET.
<i>Trésorier adjoint</i>	Émile RAGONOT.
<i>Archiviste-Bibliothécaire</i>	Jules FALLOU.
<i>Archiviste-Bibliothécaire adjoint</i> .	Louis BEDEL.





vu deux exemplaires de *Sarepta* présentant bien, non pas le premier caractère, qui est inappréciable, mais le second. Nos *Lasia* de France méridionale forment exactement le passage entre les *Lasia* du nord et ces exemplaires. Voilà probablement pourquoi on avait signalé la *meridionalis* comme française. Or, comme le caractère tiré des angles antérieurs du corselet est très-léger d'une part et de l'autre isolé, en l'état des passages qui existent, je ne puis le considérer comme spécifique.

19. *Hyperaspis concolor* Suff. — Espèce réunie à la *campestris* Herbst, dont on la considère comme une simple variété de coloration. A ce signe distinctif se joignent une forme un peu différente et une ponctuation sensiblement plus forte. Je crois donc, et M. Pandellé partage cette manière de voir, que le *concolor* doit former une espèce valable.

— M. Desbrochers des Loges adresse les diagnoses suivantes de Brachydérides nouveaux :

1. BARYNOTUS LATICEPS. — Long. 9 mill. — Elongatus, subellipticus, griseo-squamosus, lateribus albo-maculatus; capite brevi, thorace vix angustiore; rostro brevior, apice valde ampliato, carinato; antennis articulo 1° funiculi 2 sequentibus æquali; prothorace brevi; elytris lateribus subcompressis, apice obtusis, haud setosis.

Pyrénées.

2. BRACHYDERES ANALIS. — Long. 10—12 mill. — Forma et indumentum *B. incani*. Rostro magis conico; funiculi articulis 2 primis æqualibus; prothorace latiore, rude punctato, antice non constricto; elytris dorso depressis; ♂ abdomine segmento anali late impresso, ♀ tumefacto.

Ajaccio (M. Kozirowicz).

3. CHILONEUS BREVITHORAX. — Long. 4,5 mill. — Brevis ovatus, gibbus, obscure-ferrugineus, griseo-squamosus, nigro-maculatus; rostro transverso juxta carinam subapicalem non impresso; antennis articulo 2° funiculi 1° brevior; prothorace brevissimo, vix convexo, parum dilatato; elytris non costatis.

Chypre (de la Brûlerie).

4. *THYLACITES SERIE-SETULOSUS*. — Long. 6,2 mill. — Forma *T. tonsi*. Brunneus, griseo aspere squamosus; oculis leviter prominulis; rostro planissimo, leviter attenuato; antennis articulo primo funiculi dilatato secundoque longiore; prothorace transverso, angulis oblique truncatis; elytris serie-setulosis.

Anti-Liban (de la Brûlerie).

5. *TANYMECUS BIDENTULUS*. — Long. 10 mill. — Forma *T. palliati* ♀. Argenteo-squamosus, parce breviter setulosus; oculis prominentibus; rostro profunde sulcato; funiculi articulo 2° 1° brevior; prothorace subquadrato, rugoso; elytris sinuatim acuminatis, apice denticulo acuto instructis.

Sarepta (von Heyden).

6. *PSALIDIUM AURIGERUM*. — Long. 5-7 mill. — ♂ angustus, ♀ latior; niger, pedibus rufis, dense subaureo-squamosus; prothorace non ruguloso, sparsim punctato, subconico; elytris fortiter laxe striato-punctatis, interstitiis uniseriatim punctatis; ♂ tibiis anticis intus arcuatis.

Syrie (de la Brûlerie).

— M. Barbat, de Châlons-sur-Marne, écrit que, dans cette ville, il a fait, sur la *Galeruca crataegi* Först., des observations conformes à celles que M. H. Lucas a présentées dans la précédente séance.

— M. Lichtenstein donne les observations qui suivent :

1° J'ai le plaisir de vous annoncer que nous serons en mesure, M. Valéry Mayet et moi, de compléter tout à fait l'histoire du *Vesperus Xatarti* en donnant la description de la nymphe. Je viens, en effet, de recevoir une cinquantaine de ces insectes de Collioure (Pyrénées-Orientales) dans leurs divers états de développement. C'est donc en France, comme en Espagne, dans le mois de novembre que ces Longicornes sortent de terre pour s'accoupler, et c'est à présent le moment de leur faire la chasse.

2° J'élève en ce moment les larves du *Bromius vitis*; elles sont souterraines et ravagent les racines de la vigne. Quoique cet insecte, connu sous le nom de *Gribouri* ou d'*Écrivain*, soit des plus communs et fort nuisible, son histoire n'a pas encore été faite dans nos Annales. Je serai en mesure sous peu de combler cette lacune.