

187
IOH. CHRIST. FABRICII

HISTÓR. NAT. OECON. ET CAMERAL. PRÖF. KILONIENS.

ACAD. HAFNIENS. NORWEG. BEROLINENS. ET

LVND. SOC.

SPECIES INSECTORVM

EXHIBENTES


EORVM

DIFFERENTIAS SPECIFICAS, SYNONYMA

AVCTORVM, LOCA NATALIA, METAMORPHOSIN

A D I E C T I S

OBSERVATIONIBVS, DESCRIPTIONIBVS.



T O M. I.

HAMBVRGI et KILONII

IMPENSIS CAROL. ERNEST. BOHNII.

M D C C L V X X I .

1781

468
FIZ
1731



L E C T O R I .


Species Insectorum L. B. nunc offero, at
nunia copia obrutus vix omnes deter-
minare aut verbis distinguere valui. Vidi
eorum quotidie increcentem numerum, vi-
di quotannis species nouas in Europa dete-
ctas aut ex aliis regionibus allatas, quo
breui tempore plantarum cognitarum nu-
merum aequabit. Systema, genera distin-
cta, determinata, et species differentia mu-
nitiae ideoque magis necessaria, ne omnia
confundantur; at hic labor, hic opus. In-
fecta multa minutissima vix nudo oculo co-
gnoscenda, characteres genericos vix extri-
cabilis gerunt, et ingenue fateor, me inse-

Etā haud pauca vidisse, quae oculo quidem, at
haud differentia distinguere potui. Pertin-
ent huc in primis Noctuae et Phalaenae sic
dictae rusticae coloribus mixtis indistinctis,
Curculiones et Carabi minores, quorum dif-
ferentias distinctas eruere omni adhibita dili-
gentia nullo modo valui. Accedunt adhuc
varietates pluriiae et colorum inconstantia,
quibus determinatio et denominatio incer-
tiores redduntur. Optandum ideo foret, vt
monographiis accuratioribus genera amplio-
ra inuestigarentur, vti Coccinella, Curculio,
Carabus, Bombyx, Noctua, Phalaena, Ti-
nea, Musca, Syrphus, Ichneumon, Tenthre-
do aliaque, vt tandem determinatio specie-
rum, qua omnis nititur entomologia, fir-
miori stet talo.

Insectorum hic descriptorum numerum
in primis auxere itinera propria varia. Lu-
straui Sueciae montes, Norwegiae rupes
1778, Daniae campos, Germaniae sylvas, Hol-
satiae aquas, Belgii fabuleta, Heluetiae al-
pes, Galliae nemora, Italiae vineta, saepius-
que Angliae cretacea. Examinaui deinde
musea

musea Europae celeberrima *Gunneri Nidrosiae*, *Reginae Sueciae Drotningholm*, a *Linné Vpsaliae*, *Academiae Hafniensis*, *Comitis Tott Hafniae*, *D. Schulz Hamburgi*, *Edleri Lubecae*, *Schaller Halae Saxonum*, *Hermann Strasburgi*, *Cramer Amstelodami*, *Principis aurisiaci Hagae*, *Voet Hagae*, *Allemand Leidae*, *Bernoulli Basileae*, *Geoffroy, Mallet, Mauduit Parisiis*, *Allioni Taurini*, *Fortis Venetiae*, *Schaeffer Regensburgi*, et *Anglorum ditissima D. Banks, Hunter, Drury, Yeats, Blomfield Londini, Lee, Hammersmith, Blackburn Oxfordiae*. Amici Entomologi praeterea communica-
runt infecta riora, *Stroem Norwegica*, *de Slangbusch Danica*, *Schefted*, *Lund Holsatica*, *Hattorf*, *Edler Germanica*, *Allioni Italica*, *v. Rohr Americana*, *Koenig Indiae orientalis*, *Smeathmann Africana*, *D. Gray Lusitanica*, quo co-
piam insectorum collegi haud mediocrem.

A scriptoribus entomologicis pauca mu-
tuauit et haec tantum in **Glossatorum classe**. Reliqua haud visa de genere haerens semper
omisi, ne dubia certioribus miscerem. Fi-
lum systematis ariadneum nimis amisere, quo



determinatio et denominatio omnino vacillantes. *Glossata* quaedam in primis Papiliones e *Cramer* recepi, quem accuratiorem cognoui.

Insecta haud pauca antehac iam determinavi, denominaui partim in systemate entomologiae, partim in mantissa insectorum generibus adiecta, partim in itinere Norwagico. Nomina haec passim dispersa consultum duxi colligere inque unum opus propone, differentiis specificis saepius emendatis, quum nouis speciebus detectis haud amplius sufficerent, antea quamuis optimae.

Nouas species plurimas vndeque introduxi, nomine triuali, differentiaque specifica distinxii, descriptionibusque amplioribus muniui, ut determinatio facilitaretur. Genera etiam noua addidi pauca, vti, *Ips*, *Rhinomacer*, *Manticora*, *Squilla*, *Pycnogonum* characteribus sufficientibus distincta. Possem quidem plura addere, vti *Curculiones* antennis moniliformibus, *Papilionum* subdivisiones aliaque, quorum characteres mihi vero nondum satisfecere. Cauendum

femper,

semper, genus absque charactere distincto vel speciem absque differentia sufficienti proponere, ne in pristinam barbariem ruat scientia entomologica.

Synonyma auctorum praefantiora e systematicis et ichniographis addidi et systematis faepius erronea emendaui. Synonymia certe difficillime eruitur. Requirit plurimarum specierum cognitionem et laboriosam collationem, et tamen ob varietas et colorum inconstantiam faepius erronea euadit. Loca natalia, vbi licuit, semper adieci, vti et plantas, quibus victitant phytiphaga. Inservit collectoribus, oeconomis simulque viam ad oeconomiam naturae pandit. Collectores haud omnes in his fatis accurati. Metamorphosis insectorum diligenterem inspectionem meretur. Plura adhuc sunt genera, quorum metamorphosis adhuc omnino latet, quae in primis entomologis oculatis commendo. Larua et pupa specierum etiam annotandae, vt tandem cognitio infecti omnibus partibus completa.

Auctores entomologiae in hisce temporibus plurimi, systematici pauci, ichniographi praestantissimi, at damnandae memoriae *John Hill*, qui decadem insectorum Londini 1773. 4. figuris fictitiis edidit.

Hisce vtere L. B. usque dum alii plura melioraque fistant.

Dab. Kiliae d. xxiv. Sept. 1780.





SPECIES INSECTORVM.

PARS I.

CLASSIS I.

ELEVTERATA.

I. LVCANVS.

1. *L.* mandibulis exsertis apice quadridentatis. *Syst. Alces.*
Ent. 1. 1. *
Petiv. Gazoph. tab. 47. fig. 15.
Habitat in Asia.
2. *L.* mandibulis exsertis vnidentatis apice bifurcatis, labio deflexo: ruga transuersali eleuata. *Syst. Ent.*
1. 2.
Lucanus Ceruus scutellatus, maxillis exsertis apice bifurcatis, latere vnidentatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 559.
1. *Fn. Sv.* 405.
Platycerus fuscus, cornubus duobus mobilibus apice bifurcatis, latere vnidentatis, intus raimo denticulisque instructus. *Geoff. Ins.* 1. 61. 1. tab. 1. fig. 1.
Scarabaeus maximus platyceros, *Taurus nonnullis*, aliis *Ceruus volans* dictus. *Raj. Ins.* 74. 2.
Roef. Ins. 2. *Scarab.* 1. tab. 4. 5.
Bergstraess. Nomencl. 1. 18. 1. 2. 3. tab. 3. fig. 1.
2. 3. et tab. 4. fig. 1.
Olear. Mus. tab. 16. fig. 5
- Fabr. Spec. Ins.* A D

CLASS. I. ELEVTERATA Lucanus.

Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 1.

Voet. Scarab. tab. 29. fig. 1. 3.

Schaeff. Icon. tab. 133. fig. 1.

Schluga tab. 1. fig. 1.

8. *Platycerus fuscus*, elytris laeuis, capite laeui. *Geoff.*

Inf. 1. 60. 2.

Lucanus Dorcas Müll. *Zool. Dan. Prodr.* 444.

Roes. Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. 5. fig. 8.

Bergstraess. Nomencl. 1. 25. 2. 3. tab. 4. fig. 2. 3.

Voet. Scarab. tab. 29. fig. 2. 4.

Habitat in Europae ligno quercino putrescente.

Feminam ♂ multo minorem mandibulis haud exsertis pro distincta specie assumserunt *Geoffroy et O. F. Müller.*

Larua obesa, albida, capite pedibusque ferrugineis.

Elaphus. 3. L. mandibulis exsertis vnidentatis apice bifurcatis, labio deflexo conico. *Syst. Ent.* 2. 3. * *Voet. Scarab.* tab. 30. fig. 5.

Habitat in Virginia. *Mus. Brit.*

Capreolus. 4. L. mandibulis exsertis apice tantum bifurcatis, labio ruga transuersa eleuata interrupta. *Syst. Ent.* 2. 4.

Lucanus Capreolus scutellatus, maxillis exsertis apice tantum furcatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 560. 2. *Amoen. acad.* 6. 391. 4. *Mus. L. V.* 30.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 1.

Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 11. 12.

Habitat in America boreali.

Dens mandibularum lateralis omnino deest.

Dama. 5. L. mandibulis exsertis intus bidentatis longitudine capitis. *Syst. Ent.* 2. 5. *

Lucanus Capreolus ♂. *Linn. Mus. Lud. Vir.* 30.

Habitat in Virginia.

Feminam L. Capreoli *Linné* dicit, at distincta species videtur.

parallelo-pipedus. 6. L. mandibulis dente lateralí eleuato, corpore depresso.

Syst. Ent. 2. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 561. 6.

Platycerus niger, elytris laeuis, capití puncto duplice prominente. *Geoff. Inf.* 1. 62. 3.

Stara-

DSI

Scarabaeus parallelepipedus Pont. *Atl. Dan.* I. 666,
tab. 29. fig. 1.

Voet. Scarab. tab. 29. fig. 7.

Bergstr. Nomencl. I. 3. 3. tab. I. fig. 3. 4.

Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 9.

Schaeff. Elem. tab. 101. fig. 1.

— — *Icon.* tab. 63. fig. 7.

Habitat in Daniae, Germaniae, Angliae sylvis.

Sexus alter minor, mandibulis minoribus punctoque
capitis duplice, prominente.

7. *L. exscutellatus*, antennis arcuatis, corpore oblongo interru-
presso, vertice spina recumbente, thorace abdo- *ptus*,
mineque remotis. *Syst. Ent.* 3. 7. *Linn. Syst. Nat.*

2. 560. 4. *Mus. Lud. Vlr.* 33.

Dermestes Brown. Iamaic. 429. tab. 44, fig. 7.

Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 7.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 2.

Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 13.

Voet. Scarab. tab. 29. fig. 1.

Habitat in America sub Saccharo putrefcente.

Alter sexus maior spina capitis incumbente, mandibulis
truncato tridentatis, elytrorumque sulcis lateralibus
punctatis.

Alter spina capitis eleuata, arcuata, mandibulis acuto
tridentatis, elytrorumque sulcis omnibus laeuis.

8. *L. mandibulis tridentatis*, corpore viridi aeneo. *Syst. virescens.*
Ent. App. p. 817. *

Habitat in America.

9. *L. coerulescens*, mandibulis lunatis, thorace marginato. *caraboides*
Syst. Ent. 3. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 561. 7. *Fn. Sv.* des.
407. *Scop. Ent. carn.* 2.

Platycerus violaceo coeruleus elytris laeuis. *Geoff.*
Inf. I. 63. 4.

Platycerus Schaeff. *Icon.* tab. 6, fig. 8. tab. 75, fig. 7.
Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 11.

Voet. Scarab. tab. 29. fig. 8.

Habitat in Europae locis suffocatis,

Variat colore viridi et coeruleo,

2. SCARABAEVS.

* Scutellati thorace cornuto.

Hercules, 1. Sc. scutellatus, thoracis cornu incuruo maximo subtus barbato vtrinque vnidentato, capitis recurvato dentato. *Syst. Ent.* 3. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 541. *Mus. L. V.* 3.

Scarabaeus scutellatus niger, elytris griseis nigro maculatis, thorace incuruo cornu maximo, subtus bidentato, capitis recurvato, multidentato. *Degeer Inf.* 4. 304. 2. tab. 18. fig. 9.

Scarabaeus maximus indicus nitens piceus. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. A. fig. 1. et *Inf.* 4. tab. 5. fig. 3.

Taurus volans f. *Eruma*. *Margin. Bras.* 247. fig. 3.

Rhinoceros americanus cinereus rostro nigro nitente. *Petiv. Gazoph.* tab. 70. fig. 1.

Voet. Scarab. tab. 12. fig. 98.

Edw. Av. tab. 334.

Drury Inf. 1. tab. 30. fig. 1. 2.

Aubent. Miscell. tab. 41. fig. 2.

Habitat in America.

Thoracis cornu longissimum, subtus barbatum apice nudum, emarginatum. Femina mutica.

Variat elytris piceis et glaucis nigro punctatis.

Alcides, 2. Sc. scutellatus, thoracis cornu incuruo subtus barbato vnidentato, capitis recurvato mutico.

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis Sc. *Herculis* et forte eius inera varietas.

Differt tamen magnitudine duplo minore, cornu capitis omnino inermi, thoracis haud emarginato dentibusque versus basin insertis.

Gideon, 3. Sc. scutellatus thoracis cornu incuruo maximo apice bifido, capitis recurvato bifido supra vnidentato.

Syst. Ent. 4. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 541. 2.

Rhinoceros minor cornibus duobus furcatis. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. A. fig. 5.

Rhinoceros Siwammerd. Bibl. Nat. tab. 30. f. 2. *Aubent. Miscell.* tab. 40. fig. 3.

Edw.

Edw. Av. tab. 40.

Voet. Scarab. tab. 12. fig. 100.

Seligm. Av. 2. tab. 79.

Habitat in Indiis.

4. Sc. scutellatus, thoracis cornu incuruo basi bidentato *Centaur-*
apice bifido, capitis recurvato vñidentato, *rus.*

Scarabaeus Centaurus. Syst. Ent. 8. 19.

Scarabaeus Gideon. Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 1.

Habitat in India orientali, Africa. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo et statura Sc. Gideon, niger. Capitis clypeus
emarginatus, cornu magno, erecto, apice recurvo,
integro, intus dente valido obtuso notato. Thorax
ater, nitidus vtrinque dente transuersali, obtuso.
Cornu maximum, incuruum, basi vtrinque vñidenta-
tum, apice bifidum, Elytra picea. Tibiae valde den-
tatae.

5. Sc. scutellatus thoracis cornu breui emarginato, capitis *Orome-*
recurvato bifido. *Syst. Ent.* 4. 3. *

Scarabaeus Oromedon. Drur. Inf. 1. tab. 36. fig. 5. *don.*

Aubent. Miscell. 1. tab. 40. fig. 4.

Voet. Scarab. tab. 13. fig. 102.

Habitat in Indiis,

6. Sc. scutellatus rufus, thoracis cornu breui incuruo *Aegeon.*
subtus barbato, capitis recurvo subulato. *Syst. Ent.*

4. 4. *

Scarabaeus Aegeon. Drur. Inf. 2. tab. 30. fig. 5.

Habitat in Indiis,

7. Sc. scutellatus, thoracis cornu subulato protenso, ea- *dispar.*
pitis subulato subrecurvo, scutello cordato.

Scarabaeus Ammon. Pall. Iter. 3. 707.

Scarabaeus polyceros. Pall. Iter. 1. 461.

Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo Sc. stercorei, totus ater, nitidus, Maxillae
dente eleuato, thorax ciliatus, scutellum cordatum,
elytra striata.

Mas capitis thoracisque cornu subulato,

Femina capitis medio antico denticulis duobus erectis
acutis, thorace antice dentibus duobus eleuatis, pro-
minentibus.

6 CLASS. I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

- Chorinae-* 8. Sc. scutellatus, thoracis cornu incuruo basi crassissimo apice bifido, capitis longiori recurvo bifido. *Syst. Ent.* 5. 5. *
- Voet. Scarab.* tab. 13. fig. 104.
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Tunstall.*
Affinis Sc. Pan.
- dichotomus.* 9. Sc. scutellatus, thoracis cornu bidentato, capitis dichotomo, elytris rufis. *Syst. Ent.* 5. 6. *Linn. Mant.* 1. 529. *
- Aubent. Miscell.* tab. 40. fig. 5.
Voet. Scarab. tab. 14. fig. 107.
Sulz. Hist. Ins. tab. 1. fig. 1.
Habitat in Indiis.
- claviger.* 10. Sc. scutellatus rufus, thoracis cornu eleuato, capitis subulato recurvo. *Syst. Ent.* 5. 7. *Linn. Mant.* 1. 529.
Aubent. Miscell. 1. tab. 40. fig. 1.
Voet. Scar. tab. 14. fig. 108.
Habitat in Indiis.
- haftatus.* 11. Sc. scutellatus, thoracis cornu breui fornicato hastato subtus hirto, capitis recurvo. Habitat in America meridionali. *Mus. Dom. Banks.*
Medius. Capitis clypeus reflexus, dentatus cornu magno arcuato, acuto, inermi. Thorax punctatus cornu medio breui, incumbente, supra laeui, subtus fornicato hirto, apice hastato vel trilobo. Elytra punctata stria vnicula ad suturam. Color niger, elytris femoribusque testaceis.
- Pan.* 12. Sc. scutellatus thoracis cornu incuruo basi crassissimo apice bifido, capitis recurvo vndentato. *Syst. Ent.* 5. 8. *
- Habitat in Indiis. *Mus. Dom. Drury.*
Elytra nigra, glabra, stria vnicula ad suturam.
- bilobus.* 13. Sc. scutellatus, thorace prominente bilobo, capitis cornu simplici, elytris striatis. *Syst. Ent.* 6. 9. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 544. 12.
Edw. Av. tab. 105. fig. e.
Granov. Zooph. 414. tab. 14. fig. 1, 2.

Aubent.

Aubent. Miscell. tab. 15. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 2. 3.

Voet. Scar. tab. 14. fig. 106.

Habitat in Europa australi.

14. Sc. scutellatus, thoracis cornu crassissimo apice emarginato, capitis videntato bifido. *Syst. Ent.* 6. 10. * *Iason. Rhinoceros. Swam. Bibl. Nat.* tab. 30. fig. 5.
Voet. Scar. tab. 13. fig. 103.

Habitat in China.

Affinis videtur Sc. Chorinaeo.

15. Sc. scutellatus, thorace antice retuso, cornu conico validus, breuissimo, capite bituberculato. *Syst. Ent.* 6. 11. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo Sc. Rhinocerotis.
Pedis pilis elongatis ferrugineis ciliati.

16. Sc. scutellatus, thorace retuso, cornu breui truncato, truncato capite mutico. *Syst. Ent.* 6. 12. * *tus.*
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Banks.*
Magnitudo Sc. nasicornis.

17. Sc. scutellatus, thorace antice retuso, cornu breui in- *Eurytus.* cumbente emarginato, capite mutico. *Syst. Ent.*
7. 13. *
Habitat in America. *Dr. Hunter.*

Corpus nigrum, elytris stria vnica ad suturam.

18. Sc. scutellatus glaber, thorace bicorni, capitis cornu *Actaeon.* videntato apice bifido, elytris laeibus. *Syst. Ent.*
7. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 541. 3. *Mus. I. Vlr.* 4.
Rhinoceros maximus tricornis. Roe. Ins. 2. *Scarab.*
1. tab. A. fig. 2.
Enema Margr. Bras. 246.

Rhinoceros. Swammerd. Bibl. Nat. tab. A. fig. 2.

Aubent. Miscell. tab. 5. fig. infer.

Petiv. Gazoph. tab. 15. fig. 12.

Voet. Scar. tab. 16. fig. 111. 112.

Seb. Mus. 4. tab. 90. fig. 3. 4.

tab. 91. fig. 3.

Habitat in America, Brasilia.

8 CLASS. I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

- Simson.* 19. Sc. scutellatus thorace bicorni, capitis cornu apice bifido, clypeo denticulato. *Syst. Ent.* 7. 15.
Scarabaeus Simson scutellatus, thorace bicorni, capitis cornu apice tantum bifurcato, labio denticulato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 542. 4. *Mus. Lud. Vlr.* 5.
 Habitat in Indiis.
 Affinis Sc. Actaeon, Synonyma a Linnaeo citata nullo modo hue pertinent. Certe figura Sloanei ad Titulum spectat.
- Elephas.* 20. Sc. scutellatus villosus, thorace gibbo bicorni, capitis cornu vnidentato apiceque bifido. *Syst. Ent.* 7. 16.*
Olear. Mus. tab. 16. fig. 2.
 Habitat in Guinea. *Mus. Britannic.*
 Varietas forte Sc. Actaeonis, at totus villosus.
- Boas.* 21. Sc. scutellatus, thorace retuso excavato bidentato, capitis cornu recurvo simplici. *Syst. Ent.* 8. 17.*
 Habitat ad Sierra Leon. Africæ. *D. Drury.*
- Coryphaeus.* 22. Sc. scutellatus, thorace bicorni, corpore ferrugineo, *Syst. Ent. App.* 817.*
 Habitat ad Cap. bon, sp, *Dom. Lee.*
 Magnitudo et statuta Sc. vernalis.
- Tityus.* 23. Sc. scutellatus glaucus, thorace tricorni lateralibus breuissimis subulatis, medio subtus barbato, capitis recurvo, *Syst. Ent.* 8. 18.
Scarabaeus Tityus scutellatus, thorace tricorni; intermedio maximo simplicissimo, capitis cornu recurvato simplicissimo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 542. 5. *Amoen. acad.* 6. 391. 1.
Scarabaeus thorace tricorni laeui; intermedio maximo incurvo subtus barbato, capitis cornu maximo recurvo. *Gnon. Zooph. tab.* 14. fig. 8.
Aubent. Miscell. 1. tab. 14. fig. 8.
Voet. Scar. tab. 12. fig. 99.
Degeer Inf. 4. tab. 18. fig. 10.
 Habitat in America.
 Variat colore elytrorum nigro glauco maculato et glauco nigro maculato.

CLASS. I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 9

24. Sc. scutellatus, thorace tricorni: intermedio breuissimo, capitis recurvo. *Syst. Ent.* 8. 20. *

Scarabaeus Atlas scutellatus, thorace tricorni: antice breuissimo, capitis cornu adscendente. *Linn. Syst. Nat.* 2. 542. 6. *Mus. L. Vlr.* 6.

Rhinoceros Siwamerd. *Bibl. Nat.* tab. 30. fig. 3.

Edie. Av. 105. tab. 105. fig. 1.

Margraf. Brasil. 247. fig. 1.

Olear. Mus. tab. 16. fig. 3.

Voet. Scar. tab. 15. fig. 109. 110.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 1.

Habitat in America australiori.

25. Sc. scutellatus, thorace excauato tricorni, lateralibus *Geryon.* compressis videntatis, capitis recurvo simplici. *Syst. Ent.* 9. 21. *

Scarabaeus Geryon. *Drury Inf.* 2. tab. 30. fig. 6.

Habitat in Indiis.

26. Sc. scutellatus, thorace tricorni, intermedio longiori *Aloeus.* simplici, capite submutico, elytris vnitatis. *Syst. Ent.* 9. 22. *Linn. Syst. Nat.* 2. 542. 7. *Mus. Lud. Vlr.* 7.

Scarabaeus scutellatus niger, thorace tricorni, intermedio longiori truncato. *Degeer Inf.* 4. 302. 1.

Scarabaeus tricornis, capite mutico. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. A. fig. 6.

Nasicornis Taurocerus Marianus castanei coloris. *Pentiver. Gazoph.* tab. 24. fig. 10.

Aubent. Miscell. tab. 5. fig. 1.

Voet, Scar. tab. 18. fig. 122. *Mas.* tab. 19. fig. 128. *Fem.*

Habitat in America,

27. Sc. scutellatus, thorace tricorni: intermedio longiori *Antaeus.* simplici, capite mutico, elytris laeuissimis. *Syst. Ent.* 9. 23. *

Scarabaeus Antaeus. *Drury Inf.* 1, tab. 34. fig. 3.

Habitat in Americae Insulis,

Femina mutica.

10 CLASS. I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

Syphax. 28. Sc. scutellatus, thorace tricorni, intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris punctatis. *Syst. Ent.* 9. 24. *

Habitat in America. *Mus. Banks.*

Praecedenti nimis affinis.

Maimon. 29. Sc. scutellatus, thorace tricorni, cornubus aequalibus breuissimis, elytris laeuis. *Syst. Ent.* 10. 25. *

Habitat in America. *Mus. Banks.*

Typhoe- 30. Sc. scutellatus, thorace tricorni, intermedio minori, us. lateralibus porrectis longitudine capitis mutici. *Syst. Ent.* 10. 26. *Linn. Syst. Nat.* 2. 543. 9. *Mus. Lud. Vlr.* 8.

Copris niger, elytris striatis, thorace antrorsum tricorni. *Geoff. Ins.* 1. 72. tab. 1. fig. 3.

Scarabaeus ouinus 2. *Raj. Ins.* 103.

Scarabacus thorace cornuto. *Frisch. Ins.* 4. tab. 8.

Taurocerus Mouff. *Ins.* 152. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 4. ♂

— — — tab. 5. fig. 1. ♀

Bergstr. Nomencl. 1. 26. 6. tab. 4. fig. 6.

Petiv. Gazoph. tab. 23. fig. 3.

Degeer Ins. 4. tab. 10. fig. 5.

Voet. Scar. tab. 19. fig. 124. 125.

Habitat sub stercore bouino sub terra cuniculos profundos fodiens, nidulans.

Variat cornubus capite aequalibus et duplo longioribus.

Titanus. 31. Sc. scutellatus, thorace tricorni, intermedio longiori apice bifido, lateralibus subarcuatis acutis, capite mutico. *Syst. Ent.* 10. 27. *

Scarabaeus maior, niger, tricornis. *Sloan. Tom.* 2. 205. tab. 237. fig. 4. 5.

Scarabaeus Simson Drur. *Ins.* 1. tab. 36. fig. 3. 4.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

Aenobar- 32. Sc. scutellatus, thorace tricorni, medio longiori emarginato, lateralibus obtusis, capite bituberculato. *Syst. Ent.* 10. 28. *

Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*

Statura praecedentis, at minor.

33. Sc. scutellatus, thorace prominentia triplici, capitis cornu recurvo, elytris laeuis. *Syst. Ent.* II. 29. *nasicornis*.
- Scarabaeus nasicornis* scutellatus, thorace prominentia triplici, capitis cornu incurvato, antennis heptaphyllis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 544. 15. *Fn. Sv.* 378. *Voet. Scar.* tab. 18. fig. 120. 121.
- Scarabaeus* capite unicorni recurvo, thorace gibbo, abdomine hirsuto. *Geoff. Inf.* 1. 68. 1.
- Scarabaeus nasicornis Friesch.* *Inf.* 3. tab. 3. fig. 4.
Rhinoceros Roes. *Inf.* 2. *Scar.* 1. tab. 6. 7.
Drur. *Inf.* 1. tab. 34. fig. 7. 8.
Olear. Mus. 27. tab. 16. fig. 4.
- Habitat in Europae simetis, vaporariis.
- Femina submutica.
- Larua grisea*, capite, pedibus spiraculisque rufis, deletatur simo, sed acidulo et subadstringenti.
- Inuentor speciei *Clusius*, qui illam *Mouffeto* communicavit.
34. Sc. scutellatus, thorace retuso prominentia triplici, *Syluanus*. intermedia obsoleta, capitis cornu recurvo. *Syst. Ent.* II. 30. *
Habitat in Brasilia, *Mus. Dom. Banks.*
35. Sc. scutellatus, thorace bituberculato, capitis cornu *Lazarus*; breui emarginato. *Syst. Ent.* II. 31. *
Habitat in Newjork Americae. *Dom. Teats.*
Parvus, elytris striatis, rufis.
36. Sc. scutellatus, thorace retuso prominentia quadruplici, capitis cornu recurvo. *quadruplicis*. *spinofus.*
Habitat in Indiis, *Mus. Dr. Hunter.*
Magnus. Capitis clypeus reflexus, subemarginatus cornu magno, recurvo, simplici. Thorax in medio retusus postice tuberculo elevato quadridentato; dentibus intermediis paullo maioribus. Elytra nigra stria unica ad suturam. Pedes pilosi femoribus ferrugineis.
37. Sc. scutellatus, thorace quadridentato, capitis clypeo quadridentato, corpore ferrugineo. *quadridens.*
Habitat in India orientali. *Dr. Koenig. Mus. Dom. Banks.*

Corpus

Corpus paruum, gibbum, ferrugineum. Capitis clypeus antice bidentatus posticeque linea transuersa elevata. Thorax gibbus antice dentibus quatuor elevatis, erectis lateralibus paullo minoribus. Elytra striata.

mobilicor- 38. Sc. scutellatus, thorace quadridentato, capitis cornu nis. recurvo mobili. *Syst. Ent.* 11. 32. *
Habitat Herfordiae Anglorum.

cylindri- 39. Sc. scutellatus, thorace antice truncato quinquedentato, capite antice cornu erecto, corpore cylindrico. *Syst. Ent.* 12. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 544. 11. *Fn. Sv.* 380.
Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 2.
Voet. Scar. tab. 20. fig. 131.
Habitat in Pruni Cerasi truncis Europae borealis.

** Scutellati, thorace inermi, capite cornuto.

Rhinoce- 40. Sc. scutellatus, thorace retuso subbituberculato, capite cornu simplici, clypeo bisido, elytris punctatis. *Syst. Ent.* 12. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 544. 14. *Mus. Lud. Vlr.* 10.

Rhinoceros Laconensis nigricans, capite vaginisque punctulatis. *Petiv. Gazoph.* tab. 44. fig. 9. et tab. 100. fig. 3.

Rhinoceros cornu unico. *Rof. Inf.* 2. *Scar.* 1. tab. A, fig. 7.

Barrel. Icon. tab. 163.

Voet. Scar. tab. 18. fig. 117. 118.

Habitat in Asia.

Barba- 41. Sc. scutellatus, thorace inermi antice scabro, capitis rossa, cornu recurvo breui. *Syst. Ent.* 12. 35. *
Habitat in noua Hollandia, *Mus. Dom. Banks.*

Satyrus. 42. Sc. scutellatus, thorace inermi antice truncato, capitis cornu recurvo capite longiori. *Syst. Ent.* 12. 36. *
Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*
Femina clypeo tuberculato, thorace plano.

43. Sc. scutellatus, thorace inermi antice retuso, capitis *iamaicensis*-cornu recurvo, elytris striatis. *Syst. Ent.* 13. 37. * *sis.*
Scarabaeus iamaicensis. *Drur. Inf.* 1. tab. 34.
 fig. 1. 2.
- Habitat in America meridionali.
 Femina mutica.
44. Sc. scutellatus thorace inermi antice excavato, capiti cornu recurvo, elytris laeuisimis. *Syst. Ent.* 13. 38. *
Scarabaeus excavatus. *Forst. Cent. Inf.* 1. 1. 1. ?
Voet. Scar. tab. 18. fig. 119.
- Habitat in Gallo Provincia.
45. Sc. scutellatus, thorace inermi rotundato, capitis cornu recurvo. *Syst. Ent.* 13. 39. * *Syrich-*
tus.
 Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
46. Sc. scutellatus, thorace inermi, capitis cornu breuissimo, elytris cinereis punctis eleuatis atris. *Apelles.*
 Habitat ad Cap. bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*
 Parvus. Clypeus rotundatus, integer suturis eleuatis cornuque medio eleuato, breui griseo fuscus, ante marginem flauus. Thorax inermis, inaequalis, griseo fuscus, margine punctisque duobus anticis flauis. Elytra griseo fusca lineis eleuatis striata et in his puncta eleuata, oblonga, atra. Pedes flavi, nigro maculati.
47. Sc. thorace inermi, capitis clypeo eleuato postice *corona-*
emarginato. *tus.*
 Habitat in Iaua. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus piceum. Caput singulare clypeo vtrinque eleuato postice emarginato. Thorax punctatus. Elytra laeua. Femora postica brevia, incrassata.
48. Sc. scutellatus, thorace inermi, capitis cornu emarginato, tibiis posticis breuissimis apice spinosis. *Hylax.*
Syst. Ent. App. 817. *
 Habitat in Africa. *Dom. Lee.*
49. Sc. scutellatus depresso, thorace fossula exarato, capite tricuspidi, elytris striatis. *Syst. Ent.* 13. 40. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 545. 19. *Mus. L. V.* 14.

Scarabaeus didymus. Drur. Inf. 1. tab. 32. fig. 3.

Voet. Scar. tab. 19. fig. 126.

Habitat in America.

Alter sexus in antico thoraci mucrone paruo eleuato armatus.

Polyphe- 50. Sc. scutellatus thorace inermi, capite tricorni, antico porrecto bifido.

Habitat in Africa. Mus. Dom. Banks.

Affinis Sc. Goliato, at minor. Caput depresso, albo villosum, antennis nigris. Cornua tria, atra, nitida, antico apicis porrecto, longiori, recurvo, bifido, laciniiis arcuatis; lateralibus minoribus, subarcuatis. Thorax inermis, viridis lineis quinque albis, intermedia abbreviata. Elytra viridia, lineis tribus macularibus albis. Subtus albidus, sterno porrecto obtuso ab domine que viridibus nitidis. Pedes virides, femoribus vtrinque linea alba. Tibiae anticae vtrinque dentatae, posticae intus ciliatae.

Goliatus. 51. Sc. scutellatus, thorace inermi, clypeo bifurco. Syst. Ent. 13. 41.

Scarabaeus goliatus scutellatus, thorace inermi, capite rostro bifurco. Linn. Mant. 530.

Drur. Inf. 1. tab. 31.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 2.

Voet. Scar. tab. 22. fig. 51.

Habitat in Africa, Guinea.

Hircus. 52. Sc. scutellatus, thorace inermi scabro, capite linea transuersa carinata, clypeo bidentato. Syst. Ent. 13. 42. *

Habitat Tranquebariae Indiae orientalis. Koenig.

An femina muti alius Scarabaei.

farctus. 53. Sc. scutellatus brunneus, capite subbicorni, elytris punctato-striatis apice nigris. Syst. Ent. 14. 43. *

Habitat in Pensyluania. Mus. Brit.

retusus. 54. Sc. scutellatus, thorace retuso, capitis cornu brevi plano, femoribus posticis incrassatis.

Habitat ad promontorium Bon. sp. Mus. Dom. Banks.

Minor Sc. nasicorni. Caput antice eleuatum, planum, apice subemarginatum. Thorax muticus, obscurus, niger, antice parum retusus. Elytra laevia, nigra. Subtus hirtus, ferrugineus. Pedes rufi, femoribus posticis valde incrassatis.

55. Sc. scutellatus piceus, thorace inermi glabro, capite *piceus*. subbicorni, elytris striatis. *Syst. Ent.* 14. 44. *

Habitat in Indiis. *Dom. Drury.*

Magnitudo Sc. Fosforis.

56. Sc. scutellatus, thorace *inermi quadripunctato*, capite *Inuuus*: quadrituberculato, tarsis anticis nullis.

Scarabaeus Sphinx. Syst. Ent. 14. 45. *

Habitat in Sierra Leon. Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus supra viridiaeneum, obscurum.

57. Sc. scutellatus, thorace *inermi quadripunctato*, capite *Aygulus*: tuberculato, elytris testaceis, tarsis anticis nullis.

Habitat in India. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis praecedenti affinis, at duplo fere maior. Capitis clypeus integer, viridis, lineolis quinque transuersis tuberculoque postico eleuatis. Thorax inermis, aeneus, puncto vtrinque unico et duobus dorsalibus approximatis ad marginem posticum. Scutellum paruum, virescens. Elytra striata, testacea. Femora et tibiae valde dentata. Tibiae anticae et intus dentatae, quod haud in Sc. Inuo.

58. Sc. scutellatus, thorace inermi, capite tuberculis tribus, elytris striis crenatis. *Syst. Ent.* 14. 45. *Linn. subterra-*

Syst. Nat. 2. 548. 28. *Fn. Sv.* 582. *nens.*

Habitat in Europæ stercore.

Affinis Sc. Fosfori, at multo minor.

59. Sc. scutellatus, thorace inermi retuso, capite tuberculis tribus, medio subcornuto. *Syst. Ent.* 14. 47. *Fn. Sv.* 384. *Fosfor.*

Scarabaeus totus niger spinulis tribus capitis transuersim positis. Geoff. Inf. 1. 82. 20.

Scarabaeus atro rubens, corpore subcylindrico atro rubente. *Ast. Nidr.* 4. 266. 2. tab. 16. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 144. fig. 78.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 7.

Voet. Scar. tab. 21. fig. 141.

Habitat in Europae fabulosis, stercoratis.

scybala- 60. *Sc. scutellatus*, thorace inermi, capite tuberculis tribus, intermedio acuto, elytris striatis testaceis.

Habitat in Germania. *Mus. Dom. Banks.*

terrefris. Minor *Sc. fossore*. Caput et thorax atra, nitida tuberculis capitinis tribus intermedio acutiori. Elytra striata testacea macula marginali nigra.

61. *Sc. scutellatus*, thorace inermi, capite tuberculis tribus aequalibus, elytris striatis. *Syst. Ent.* 15. 48. *

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Sc. Fossori triplo minor.

maurus. 62. *Sc. scutellatus*, thorace inermi, capite mucronibus tribus, corpore violaceo, abdomine testaceo. *Syst. Ent.* 15. 49. *Linn. Syst. Nat.* 2. 548. 304.

Habitat in Mauritania.

Corpus oblongum, coerulescens, abdomine villoso testaceo.

testaceus. 63. *Sc. scutellatus testaceus*, capite bituberculato, elytris punctato striatis. *Syst. Ent.* 15. 50. *

Habitat in Angliae stercoratis. *Dom. Lee.*

fimetari- 64. *Sc. scutellatus*, ater, thorace inermi, capite tuberculato, elytris rubris. *Syst. Ent.* 15. 51. *Linn. Syst. Nat.* 2. 548. 32. *Fn. Sv.* 385.

Scarabaeus capite thoraceque nigro, antennis elytrisque rubris. *Geoff. Inf.* 1. 81. 18.

Scarabaeus pillularius nonus. *Raj. Inf.* 106. 9.

Scarabaeus equinus medius, coleoptris rubris, collaris nigro. *Frisch. Inf.* 4. 35. tab. 19. fig. 3. *Step. Ent. carn.* 20.

Schaeff. Icon. tab. 144. fig. 6.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 8.

Voet. Scar. tab. 21. fig. 147.

Habi-

Habitat frequens in Europae stercore.

Tubercula capitinis tria, eleuata.

65. Sc. scutellatus, thorace subinermi, capite tuberculo *bicolor.*
vnico, elytris nigris, abdomine rufo. *Syst. Ent.*
*15. 52. **
- Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
66. Sc. scutellatus, thorace inermi laeui, capite tuberculo *erraticus.*
vnico, elytris fuscis. *Syst. Ent. 16. 53. Linn. Syst.*
Nat. 2. 548. 29. Fn. Sv. 383.
Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 9.
- Habitat in Europae stercore, viis.
67. Sc. scutellatus, thorace inermi, marginibus laterali-
bus albidis, capite tuberculato, elytris griseis macu-
latis. *Syst. Ent. 16. 54. Linn. Syst. Nat. 2. 549. 34.*
Fn. Sv. 387.
- Scarabaeus capite thoraceque nigro glabro, elytris gri-*
seis, pedibus pallidis. Geoff. Inf. 1. 82. 19.
- Scarabaeus pillularius decimus. Raj. Inf. 108.*
- Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 8.*
- Pontop. Atl. Dan. tab. 1. fig. 82.*
- Voet. Scar. tab. 21. fig. 144.*
- Habitat in Europae stercore frequens.
- Affinis sequenti, at minor.
68. Sc. scutellatus, capite tuberculato, thorace nigro, *sordidus.*
margine pallido puncto nigro, elytris griseis. *Syst.*
*Ent. 16. 55. **
- Habitat in Angliae stercore.
69. Sc. scutellatus, capite tuberculato ater, elytris griseis *luridus.*
nigro striatis. *Syst. Ent. 29. 69. **
- Habitat in Angliae. *Mus. Dom. Banks.*
- Caput tuberculo paruo.
70. Sc. scutellatus niger thorace mutico, clypeo tuberculo
solitario, elytris postice testaceis. *Syst. Ent. 16.*
56. Linn. Syst. Nat. 2. 547. 23.
71. *Scarabaeus haemorrhoidalis* scutellatus thorace in-
ermi, capite tuberculato, elytris apice rubris. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 548. 33. Fn. Sv. 386.

Habitat in Europae locis suffocatis.

Elytra interdum ultra dimidium testacea.

- mari-* 71. Sc. scutellatus, capite tuberculato, elytris laeuis
nus. glaucis fusco punctatis. *Syst. Ent.* 16. 57. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 549. 35.

Habitat in America.

Magnitudo Sc. Aloei. Abdomen et femora ferruginea.
Vix distincta species videtur, sed potius femina
mutica Sc. Herculis.

*** Scutellati mutici capite thoraceque
inermi.

- scaber.* 72. Sc. scutellatus, clypei centro prominulo, elytris ante
scabris. *Syst. Ent.* 17. 58.

Scarabaeus scaber scutellatus muticus, thorace elytris
que antice scabris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 549. 37. *Mus.*
Lud. Vlr. 17.

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Elytra apice glauca. Affinis videtur Sc. Herculis fe-
mina.

- longima-* 73. Sc. scutellatus muticus, pedibus anticis arcuatis lon-
nus. gissimis. *Syst. Ent.* 17. 59. *Linn. Syst. Nat.* 2. 549.
39. *Mus. Lud. Vlr.* 18.

Aubent. Miscell. tab. 41. fig. 1.

Voet. Scar. tab. II. fig. 97.

Habitat in India.

Femora antica dente valido armata.

- stercora-* 74. Sc. scutellatus muticus ater, clypeo rhombeo, verti-
rius. ce prominulo, elytris sulcatis. *Syst. Ent.* 17. 60. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 551. 42. *Fn. Sv.* 388.

Scarabaeus ater dorso glabro, elytris sulcatis, capi-
tis clypeo rhomboide centro prominulo. *Geoff. Inf.*
I. 75. 9.

Scarabaeus magnus niger vulgatissimus, antennis articulatis. *Raj. Inf.* 74. 1.

Scarabaeus magnus e purpura niger, tibiis omnium
pedum serratis. *List. Scar. Angl.* 380. 4.

Scarabaeus stercorarius niger maior. Frisch. Inf. 4.

13. tab. 6.

Schaeff. Icon. tab. 23. fig. 9.

Voet. Scar. tab. 20. fig. 134.

Degeer Inf. 4. tab. 9. fig. 10. 11.

Habitat in Europa sub stercore.

Ab Aegyptiis soli consecratur, qui semper marem credebant absque copula oua ponentem.

Vesperi circumvolitat ingenti cum susurro, serenum diem annuntians. Infestatur Acaris, Ichneumone.

Alium simillimum, at subtus aeneum, nitidissimum ex Italia misit Dom. Allioni.

Varietatem vidi elytris sulcatis, obscure rufis.

5. Sc. scutellatus muticus, elytris glabris laeuisimis, cly-*vernalis*, peo rhombeo, vertice prominulo. Syst. Ent. 17. 61.

Linn. Syst. Nat. 2. 551. 43. Fn. Sv. 389.

Scarabaeus coeruleocephalus, dorso elytrisque glabris laeuisimisque, capitis clypeo rhomboide, centro prominulo. Geoff. Hist. 77. 10.

Scarabaeus vernalis. Scop. carn. 27.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 6.

Voet. Scar. tab. 20. fig. 135.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 4.

Habitat sub Europae stercore.

Praecedenti simillimus, at minor, glaber et nitidus. Forte tamen eius mera varietas.

Variat colore coerulecente, virescente et obscuro.

6. Sc. scutellatus muticus, thorace antice impresso mu-*iuencus*, cronato. Syst. Ent. 18. 62. *

Habitat in America. Mus. Dom. Banks.

7. Sc. scutellatus muticus viridi nitens, elytris striatis. *splendens*. Syst. Ent. 18. 63. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Drury.

8. Sc. scutellatus muticus rufus, elytrorum sutura apici-*Cephus*, busque nigris. Syst. Ent. 18. 64. **

Habitat Mus. Dom. Banks.

20 CLASS. I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

laborator. 79. Sc. scutellatus muticus ater, thorace punctato, elytris striatis, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* 18. 65. *
Habitat in Brasiliae stercore. *Mus. Dom. Banks.*

globator. 80. Sc. scutellatus muticus, thorace elytrisque obscure nigris punctatis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo Sc. fossoris. Capitis clypeus rotundatus margin'e reflexo et striga in medio eleuata. Thorax obscure rufus punctis plurimis impressus. Elytra itidem nigra obscura punctis plurimis impressa. Corpus subtus hirtum, piceum.

zmacula- 81. Sc. scutellatus muticus, elytris striatis pallidis nigrotus.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura Sc. conspurcati, at paullo maior et omnino muticus. Capitis clypeus rotundatus, integer, pallens macula media nigra. Thorax subpunctatus, obscure rufus maculis dorsalibus atris. Elytra striata, pallida maculis tribus atris. Corpus vti et pedes picea.

arator. 82. Sc. scutellatus muticus niger, thorace laeui, elytris punctato striatis. *Syst. Ent.* 18. 66. *

Habitat ad Cap. bon. sp.

barbatus. 83. Sc. scutellatus muticus laeuis niger, ano barbato. *Syst. Ent.* 19. 67. *

Habitat in India. *Mus. Tottianum.*

rufipes. 84. Sc. scutellatus muticus ater, thorace glabro nitido, elytris striatis. *Syst. Ent.* 19. 68.

Scarabaeus rufipes muticus ater, antennis pallidis, elytris laeuiibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 559. 86. *Fr. Sv.* 403.

Degeer Ins. 4. tab. 10. fig. 6.

Habitat in Europae borealis stercore.

Varietas duplo minor pedibus nigris vix specie differt.

Blackbur- 85. Sc. scutellatus muticus, thorace nigro aeneo, elytris striatis atris.

Habitat in America boreali. *Mus. Blackburn.*

Praecedenti paullo maior. Clypeus rotundatus centro sub prominulo. Thorax rotundatus puncto vtrinque impresso, nigro aeneus, obscure nitens. Elytra atra, striata.

86. Sc. scutellatus muticus oblongus niger, elytris maculatis duabus rubris. *Syst. Ent.* 19. 70. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 558. 84. *Fn. Sv.* 398.
Habitat in Angliae stercore.
87. Sc. scutellatus muticus niger, elytris plaga rufescente. *plagius.*
Syst. Ent. 19. 71. *Linn. Syst. Nat.* 2. 539. 85. *tus.*
Habitat Vpsaliae.
Varietas forte Sc. subterranei.
88. Sc. scutellatus muticus niger, thoracis elytrorumque marginel-
magine testaceo. *marginellus.*
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Paruus, Capitis clypeus rotundatus, integer, niger fascia media obscure rufa. Thorax niger, nitidus margine exteriori testaceo. Elytra crenato striata, nigra margine testaceo, qui color ante apicem extenditur. Pedes picei.
89. Sc. scutellatus muticus niger, elytris sulcatis piceis fer-
ruginoso punctatis. *testudinarius.*
Syst. Ent. 19. 72. *
Habitat in Anglia. *Dr. Solander.*
90. Sc. scutellatus muticus ater, elytris testaceis, sutura merda-
nigra. *Syst. Ent.* 19. 73. *
Habitat in Europaë stercore.
91. Sc. scutellatus muticus ater, elytris liuidis. *Syst. Ent.* quisqui-
20. 74. *lius.*
Scarabaeus quisquilius exscutellatus ater glaber, elytris
liuidis testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 558. 83. *Fn.*
Sv. 397.
Scarabaeus minimus. *Scop. Ent.* 29.
Habitat in Europae stercore.
Scutellum paruum, nigrum.
92. Sc. scutellatus muticus fuseus, elytris porcatis. *Syst. porcatus.*
Ent. 20. 75. *
Habitat in Lipsiae stercore.

- stercorator.* 93. Sc. scutellatus muticus ater laevis, elytris striato cretato, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* 19. 76. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
- asper.* 94. Sc. scutellatus muticus, capite thoraceque transuersim fulcatis, elytris striatis. *Syst. Ent.* 19. 77. *
Habitat in Europae plantis putridis.
- unipunctatus.* 95. Sc. scutellatus muticus ater, coleoptris flavescentibus, puncto communi nigro. *Syst. Ent.* 19. 78.
Coccinella unipunctata coleoptris flavescentibus puncto communi nigro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 579. 6. *Fn. Sv.* 470.
Habitat in Europa boreali.
Antennae lamellatae huius generis. Tempore sereno per aëra volitat.

***** Exscutellati thorace cornuto.

- nemestri-nus.* 96. Sc. exscutellatus, thoracis cornubus duobus porrectis acutis, capitis erecto subulato.
Scarabaeus tricornutus exscutellatus, niger splendens, capitis clypeo lunato, cornu erecto, thorace retuso, cornubus duobus porrectis. *Degeer Ins.* 7. 637. tab. 47. fig. 16.
Habitat in Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Affinis Sc. Iaccho. Capitis clypeus rotundatus, integer. Cornu erectum basi crassiusculum apice subulatum. Thorax antice retusus cornubus duobus dorsibus porrectis, rotundatis, acutis. Punctum vtrinque impressum. Elytra striata. Corpus subtus hirtum.
- Iacchus.* 97. Sc. exscutellatus, thorace prominente bilobo, capitis cornu recurvo simplici. *Syst. Ent.* 20. 79. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Femina capitis cornu breuissimo truncato, thoracisque tuberculo antico transuerso eleuato.
- Oedipus.* 98. Sc. exscutellatus, thoracis cornu plano, subtus dentato, capitis truncato tridentato. *Syst. Ent.* 21. 80. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

99. Sc. exscutellatus, thorace prominentia dupli, capitis cornu erecto simplici. *Sabaeus.*

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo omnino Sc. Iacchi. Capitis clypeus porrectus, rotundatus margine parum reflexo vix emarginato. Cornu simplex, erectum. Thorax ater, nitidus in medio prominentia dupli obtusa punctoque lateralí impresso. Elytra striata, atra nitida.

Femina tuberculis thoracis cornuque capití minóribus.

100. Sc. exscutellatus, thorace aeneo, cornubus duobus *splendidus* compressis nigris, capití cornu erecto apice *complenus*. impresso.

Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter.*

Magnitudo Sc. Carnifícis. Clypeus rotundatus, vix emarginatus, niger lateribus aeneis, cornu magno, erecto, apice compresso, obtuso. Thorax margine angulato aeneus, nitidus, in medio cornubus duobus compressis, obtusis, subarcuatis, atris. Elytra sulcata, obscura, viridia. Pedes nigri femoribus aeneis.

101. Sc. exscutellatus, thorace gibbo bicorni, capití cornu erecto, elytris rubro aeneis. *festivus.*

Scarabaeus festivus exscutellatus muticus, thorace nigro maculato, elytris rubro aeneis, sterno porrecto.

Syst. Ent. 28. III. *Linn. Syst. Nat.* 2. 552. 52.

Roef. Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. B. fig. 8.

Voet. Scar. tab. 23. fig. 5. 7.

Degeer Inf. 4. tab. 8. fig. 15.

Habitat in America meridionali.

Mas cornutus, *femina mutica*.

102. Sc. exscutellatus, thorace bicorni, cornubus breuissimi, *Pithecius.* mis, capití cornu erecto subulato. *Syst. Ent.* 21. 81.*

Habitat in Indiis. *Mus. Britann.*

103. Sc. exscutellatus, thorace antice, clypeo postice bicorni. *Seniculus.*

Habitat in Coromandel. *Dr. Schulz.*

Statura omnino Sc. Bonasi. Clypeus niger, antice sub-acuminatus lateribus subemarginatis, postice ater, cornubus duobus breuibus, erectis, compressis. Thorax gibbus, niger, aeneo colore tinctus margine flavescente, antice cornubus duobus, breuibus, diuergentibus, depresso, obtusis. Elytra substriata nigra strigis duabus baseos e punctis ferrugineis. Pedes breues, validi, ferruginei.

Variat punto uno alteroue ferrugineo apicis.

Rosalius. 104. Sc. exscutellatus, thorace antice bicorni, postice eleuato tricorni, capitis cornu compresso serrato. *Syst. Ent.* 21. 82.

Habitat in America meridionali.

Ammon. 105. Sc. exscutellatus, thorace tridentato, capitis cornu recurvo, elytris striatis.

Scarabaeus Silenus. *Syst. Ent.* 21. 83. *

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Midas. 106. Sc. exscutellatus, thorace tricorni, clypeo sinuato bicorni. *Syst. Ent.* 21. 84. *

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Hama-dryas. 107. Sc. exscutellatus, thorace tricorni, intermedio plano acuto bidentato, clypeo reflexo bicorni. *Syst. Ent.* 22. 85. *

Voet. Scar. tab. 27. fig. 38. ? at noster omnino niger.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

lunaris. 108. Sc. exscutellatus, thorace tricorni, intermedio obtuso bifido, capitis cornu erecto, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* 22. 86. *Linn. Syst. Nat.* 2. 543. 10. *Fn. Sv.* 379. *Scop. Ent. carn.* 22.

Copris capitis clypeo lunulato, in margine eleuato, corniculo denticulato. *Geoff. Ins.* 1. 88. 1.

Scarabaeus ouinus tertius f. capite operculato. *Raj. Ins.* 103.

Scarabaeus nasicornis medius. *Frisch. Ins.* 4. 25. tab. 7.

Pet. Gazoph. tab. 138. fig. 4.

Berg-

Schlaeff. Icon. tab. 63. fig. 2. 3. ♂. ♀.

Bergstraess. Nomencl. 1. 5. 9. tab. 1. fig. 9. et
tab. 4. fig. 7.

Poda Mus. tab. 1. fig. 1.

Voet. Scar. tab. 25. fig. 24. 25.

tab. 26. fig. 26.

Habitat in Europae stercoratis.

Clypeus in utroque sexu cornutus, at femina thorace
inutico.

109. Sc. exscutellatus, thorace late foucolato antice cor. *Rhadami-*
nus recurvo, capite inermi, elytris rufis, futura *ftus.*
punctisque duobus nigris. *Syst. Ent.* 22. 87. *

Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*

110. Sc. exscutellatus, thorace prominentia triplici, capi- *Belzebul.*
te tricorni, intermedio maiori. *Syst. Ent.* 23. 88. *

Habitat in America. *Mus. Dom. Drury.*

111. Sc. exscutellatus, thorace prominentia triplici, capi- *bifascia-*
tis cornu erecto, elytris nigris, fasciis duabus rufis. *tus.*

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo Sc. nuchicornis. Capitis clypeus rotunda-
tus, integer, niger, in medio cornu erecto, breui,
obtuso. Thorax rotundatus, ater, nitidus antice
prominentia triplici. Elytra striata, atra fasciis dua-
bus rufis altera baseos, altera apicis, quae tamen su-
turam haud attingunt.

112. Sc. exscutellatus, thorace quadricorni, intermediis *Faunus-*
breuissimis, capitis cornu recurvo ferrato. *Syst.*
Ent. 23. 89. *

Voet. Scar. tab. 24. fig. 15.

Habitat Cajennae. *Dom. Mauduit.*

Femina simillima, at cornibus minoribus, lateralibus
haud truncatis, sed acutis, conicis, compressis.

113. Sc. exscutellatus, thorace quadridentato, capitis cor- *capuci-*
nus nu recumbente, vtrinque vnidentato.

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo et statura Sc. carolini. Capitis clypeus ro-
tundatus, integer cornu eleuato, recumbente in me-

dio vtrinque denticulo paruo. Thorax eleuatus, niger, antice quadridentatus puncto que vtrinque impresso. Elytra striata, nigra, interdum picea.

***** Exscutellati thorace inermi capite cornuto.

Bonafus. 114. Sc. exscutellatus, thorace prominentia duplici, capite tricorni, lateralibus maioribus arcuatis. *Syst. Ent.* 23. 90. *

Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*

Bison. 115. Sc. exscutellatus, thorace antice mucronato, capite cornibus duobus lunaribus. *Syst. Ent.* 23. 91. *Linn. Syst. Nat.* 2. 547. 27.

Habitat in Hispania.

Thorax postice punctis duobus impressis.

Femina thoracis margine antico carinato eleuato mucrone que capitis paruo distincta.

sagitta- 116. *rius.* Sc. exscutellatus, thorace antice mucronato, capitinis cornu solitario erecto. *Syst. Ent.* 24. 92. *

Habitat ad Cap. bon sp. *Mus. Dom. Banks.*

Bucephala- 117. *lus.* Sc. exscutellatus, thorace retuso quadridentato, capitis clypeo angulato unicorni. *Syst. Ent.* 24. 93. *

Habitat in Indiis. *Mus. Britann.*

Molossus. 118. Sc. exscutellatus, thorace retuso bidentato vtrinque impresso, clypeo unicorni lunato integro, clytris laevis. *Syst. Ent.* 24. 94. *Linn. Syst. Nat.* 2. 543. 8. *Mus. Lud. Vlr.* II.

Linn. Amoenit. Acad. 6. 391.

Drury Ins. 1. tab. 32. fig. 2.

Schroet. Abh. 1. tab. 3. fig. 3.

Degeer Ins. 4. tab. 18. fig. 11.

Habitat in China in officinis introductus.

lancifer. 119. Sc. exscutellatus violaceus, capitis cornu angulato, thorace dentato, elytris sulcatis. *Syst. Ent.* 24. 95.

Scara-

Scarabaeus lancifer exscutellatus, violaceus, capite cornu angulato, thorace inaequali, elytris sulcatis. Linn.
Syst. Nat. 2. 544. 13.

Lancifer violaceus. Voet. Scar. tab. 23. fig. 1. 2.

Taurus. Margr. Brasil. 247.

Schroet. Abh. 1. tab. 3. fig. 4.

Habitat in Indiis.

Maior Sc. Mima et totus violaceus.

120. Sc. exscutellatus, thorace retuso eleuato, capitibus cornu recurvo, clypeo fisso. *Paniscus.* Syst. Ent. 24. 96. *

Scarabaeus valgus thorace mutico, capite cornuto, femoribus secundi paris remotis. Linn. Syst. Nat. 2. 546. 20. Mus. Lud. Vlr. 15. 2.

Scarabaeus marianus. Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 8. Roef. Inf. 2. Scarab. 1. tab. B. fig. 2.

Habitat in America.

121. Sc. exscutellatus, capitibus cornu erecto breuissimo, *carolinus.* clypeo integro, elytris sulcatis. Syst. Ent. 25. 97. *

Scarabaeus carolinus exscutellatus, thorace retuso, capite ovali integro vnicorni, clytris striatis. Linn. Syst. Nat. 2. 545. 16.

Scarabaeus carolinus. Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 2. Voet. Scar. tab. 24. fig. 14.

Habitat in America boreali.

122. Sc. exscutellatus, thorace inermi, punctis quatuor *Sphinx.* impressis, capite subcornuto, tarsis anticis nullis. Syst. Ent. 25. 98. *

Scarabaeus spinipes. Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 8. Act. Soc. Berolin. phys. 4. tab. 7. fig. 10.

Habitat in America meridionali.

123. Sc. exscutellatus, thorace inermi, punctis quatuor *Nicanor.* impressis, capitibus cornu recurvo bidentato, elytris striatis.

Scarabaeus Sphinx β. Syst. Ent. 25. 98.

Scarabaeus sulcatus. Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 1.

Habitat in America.

Marem Sc. Sphingis olim credidi, at vix iure. Clypeus porrectus antice emarginatus cornu brevi erecto basi vtrin-

vtrinque vñidentato. Thorax niger, antice truncatus puncto vtrinque impresso, postice rotundatus punctis duobus impressis, approximatis. Elytra striata nigra.

Mimas. 124. Sc. exscutellatus, thorace inermi retuso angulato, capite obsolete bicorni, elytris inauratis striatis. *Syst. Ent.* 25. 99. *Linn. Syst. Nat.* 2. 545. 17. *Mus. Lud. Vlr.* 9.

Copris viridis splendens. *Voet. Scarab.* tab. 23. fig. 4. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 1. fig. 4.

Scarabaeus inaequalis farctus viridi nitens, capite bicorni. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. B. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

Clypeus omnino integer.

Taurus. 125. Sc. exscutellatus, thorace inermi, occipite cornubus binis reclinatis arcuatis. *Syst. Ent.* 26. 100. *Linn. Syst. Nat.* 2. 547. 26.

Scarabaeus illyricus. *Scop. carn.* 25.

Scarabaeus ouinus 2. *Raj. Inf.* 103. 2.

Scarabaeus taurus capite cornubus duobus lunatis lateralibus. *Schreb. Inf.* tab. 1. fig. 6. 7.

Copris niger, capite pone bicorni, corniculis tenuibus arcuatis longitudine thoracis, thorace vtrinque sinuato. *Geoff. Inf.* 1. 92.

Voet. Scar. tab. 24. fig. 16.

Schaeff. Inf. tab. 73. fig. 2. 3. ♂. ♀.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 5.

Habitat in Europa australiori.

Vacca. 126. Sc. exscutellatus, thorace inermi retuso, occipite spina erecta gemina. *Syst. Ent.* 26. 101. *Linn. Syst. Nat.* 2. 547. 25.

Copris obscure aeneus, capite pone bicorni, thorace antice prominente, elytris rufis nigro maculatis. *Geoff. Inf.* 1. 90. 5.

Schaeff. Inf. tab. 73. fig. 4. 5. ♂. ♀.

Schroet. Miscell. 1. tab. 3. fig. 5.

Habitat in Europa australiori.

127. Sc. exscutellatus, thorace quadridentato, occipite *Vitulus.*
cornibus duobus erectis brevibus, corpore atro.

Gen. Inj. Mant. 209. *

Habitat in Austria. *Dr. Schulz.*

128. Sc. exscutellatus, thorace inermi angulato, capitis cor- *Carnifex.*
nu eretto, corpore aeneo. *Syst. Ent.* 26. 102.

Scarabaeus Carnifex exscutellatus, thorace inermi
plano angulato, capitis cornu reflexo, corpore ae-
neo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 546. 22.

Scarabaeus Carnifex. *Drury Inf. tab.* 35. fig. 3—5.
Voet. Scar. tab. 26. fig. 31. 32.

Habitat in America.

Synonyma a Linnaeo citata pleraque falsa.

129. Sc. exscutellatus, thorace inermi cupreо, capite basi *tridens.*
tridentato, elytris nigris.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo Sc. Carnificis. Clypeus rotundatus, integer
antice niger, postice cupreus, in medio striga trans-
uersa, eleuata, integra et alia tridentata ad basin.
Thorax cupreus punctis eleuatis scaber, antice subre-
tusus. Elytra, ut et corpus, nigra vix striata.

130. Sc. exscutellatus, thorace inermi, clypeo cornuto *hispanus.*
emarginato, elytris striatis. *Syst. Ent.* 26. 103. *Linn.*

Syst. Nat. 2. 546. 21. *Mus. Lud. Vlr.* 12.

Rhinoceros lusitanicus, niger splendens vaginis striatis.

Petiv. Gazoph. tab. 8. fig. 4.

Habitat in Europa australiori.

131. Sc. exscutellatus, thorace retundato inermi, occipite *spinifex.*
spina recurva.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo omnino Sc. nuchicornis. Capitis
clypeus rotundatus, integer occipite spina recurva
longitudine thoracis. Thorax rotundatus, glaber,
dorso planiusculo, niger, viridi nitidus. Elytra stria-
ta nigra viridi colore nitida. Pedes nigri femoribus
incrassatis.

- nuchicornis*. 132. Sc. exscutellatus, thorace rotundato inermi, occipitale spina erecta armato. *Syst. Ent.* 26. 104. *Linn. Syst. Nat.* 2. 547. 24. *Fn. Sv.* 381.
Copris fusco niger, capite clypeato angulato pene cornuto, elytris ferrugineo nebulosis breuibus striatis. *Geoff. Ins.* 1. 89. 3. ♂.
Copris fusco niger, capite clypeato angulato non cornuto, elytris breuibus striatis. *Geoff. Ins.* 1. 89. 4. ♀.
Schaeff. Icon. tab. 96. fig. 1.
Voet. Scar. tab. 25. fig. 18.
Scarabaeus ouinus tertius s. capite aperto. *Raj. Ins.* 103. 2.
Scarabaeus capite thoraceque atro opaco, elytris cinereis nigro nebulosis. *Linn. It. Gotl.* 41.
Roef. Ins. 2. *Scarab.* 1. tab. A. fig. 4.
Habitat in Europae stercore.
Mas a tergo cornutus, femina mutica.
- scabrosus*. 133. Sc. exscutellatus, thorace inermi rugosa, capitis cornu erecto breuissimo, elytris testaceis nigro scabris. *Gen. Ins. Mant.* 209. *
Voet. Scar. tab. 25. fig. 23.
Habitat in America meridionali. *Dr. Schulz.*
Paullo maior Sc. nuchicorni.
- furcatus*. 134. Sc. exscutellatus, thorace inermi rotundato, capite cornubus tribus erectis approximatis, intermedio breuiori.
Habitat in Arabia. *Forskahl. Mus. Dom. Banks.*
Minor Sc. nuchicorni. Clypeus antice emarginatus postice cornubus tribus basi approximatis erectis intermedio breuiori. Thorax muticus, laevis, glaber, postice rotundatus. Elytra striata, fusca. Pedes nigri.
- verticicornis*. 135. Sc. exscutellatus, thorace inermi griseo nigro punctato, capitis cornu erecto breuissimo. *Syst. Ent.* 27. 105. *
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Tunstall.*
Nimis affinis Sc. nuchicorni.

136. Sc. exscutellatus, ater, capitis tuberculo vnico, ely- *fulcator.*
tris striatis. *Syst. Ent.* 27. 106. *

Habitat Cajeunae. *Dr. Mallet.*

137. Sc. exscutellatus, ater, thorace inermi, capite bitu- *apustula.*
berculato, elytris maculis duabus rubris. *Syst. Ent.* *tus.*
27. 107. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

138. Sc. exscutellatus niger, thorace inermi crenato, ely- *cristatus.*
peo tuberculato quadridentato. *Syst. Ent.* 27. 108.

Habitat in Aegypto. *Dom. Prof. Forskahl.*

***** Exscutellati mutici.

139. Sc. exscutellatus, clypeo sexdentato, thorace inermi *sacer.*
crenulato, tibiis posticis ciliatis, elytris laeuis.
Syst. Ent. 28. 109. *Linn. Syst. Nat.* 2. 545. 18. *Mus.*
Lud. Vlr. 13. *Amoen. acad.* 6. tab. 3.

Scarabaeus cornutus exscutellatus niger, capitis cly-
peo lunato, margine antice denticulato, thorace
elytrisque laeuis. *Degeer Ins.* 7. 638. 36. tab. 47.
fig. 18.

Scarabaeus laevis, thorace inermi, capite antice sex-
dentato. *Osb. It.* 51.

Scarabaeus pilularius niger, clypeo antice ferrato, ely-
tris nebulose maculatis submollibus planiusculis.
Loefl. It. 20.

Petiv. Gazoph. tab. 42. fig. 2.

Sulz. Hift. Ins. tab. 1. fig. 3.

Voet. Scar. tab. 27. fig. 39. 40.

Habitat in regionibus australioribus.

140. Sc. exscutellatus muticus niger, clypeo sexdentato, *laticollis.*
elytris fulcatis. *Syst. Ent.* 28. 110. *Linn. Syst. Nat.*
2. 549. 38.

Copris niger capite clypeato, margine ferrato, thora-
ce lato laeui, elytris striatis. *Geoff. Ins.* 1. 89. 2.

Scarabaeus pilularius. *Raj. Ins.* 105. 4.

Voet. Scar. tab. 27. fig. 41.

Habitat in Europa australi, China.

Praecedenti nimis affinis videtur.

32 CLASS. I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

- miliaris.* 141. Sc. exscutellatus muticus, clypeo sexdentato, thorace elytrisque nigris, maculis eleuatis atris. *Syst. Ent. Append.* p. 817. *
 Habitat in India. *Mus. Dr. Hunter.*
- Bacchus.* 142. Sc. exscutellatus muticus, clypeo quadridentato thorace gibbo elytrisque glabris.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Schulz.*
Magnus gibbus. Capitis clypeus porrectus medio dentibus quatuor rotundatis obtusis. Thorax eleuatus valde gibbus, glaber, ater margine omni integro. Elytra laevia, glabra, nigra. Tibiae omnes valde dentatae.
- gibbosus.* 143. Sc. exscutellatus muticus, clypeo quadridentato, elytris basi gibbere notatis. *Syst. Ent.* 28. 112. *
 Habitat in America.
- Hollandiae.* 144. Sc. exscutellatus muticus, clypeo quadridentato, elytris sulcatis. *Syst. Ent.* 29. 113. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- Koenigii.* 145. Sc. exscutellatus muticus, clypeo bidentato, thorace scabro, elytris variolosis. *Syst. Ent.* 29. 114. *
 Habitat Tranquebariae. *Koenig.*
- cupreus.* 146. Sc. exscutellatus muticus nigro cupreus, clypeo emarginato, thorace gibbo. *Syst. Ent.* 29. 115. *
 Habitat in Africa. *Dom. Teats.*
- flagella-* 147. Sc. exscutellatus muticus niger opacus, clypeo emarginato, elytris scabris. *Syst. Ent.* 29. 116. *
 Habitat ad Cap. bon. sp.
- Schaeferi.* 148. Sc. exscutellatus muticus, thorace rotundato, clypeo emarginato, elytris triangulis, femoribus posticis elongatis dentatis. *Syst. Ent.* 29. 117. *Linn. Syst. Nat.* 2. 550. 41.
Scarabaeus longipes. *Scop. carn.* 84.
Copris niger, pedibus longis femorum posteriorum basi denticulata, elytris postice gibbis. *Geoff. Ins.* 1. 92. 9.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 8.
Voet. Scar. tab. 25. fig. 17.
 Habitat in Germaniae collibus apricis, globulos e stercore ouino confectiones voluens, sepeliens.

149. Sc. exscutellatus muticus niger opacus laevis subtus *pilularis*-
aeneus, thorace postice rotundato. *Syst. Ent.* 29. us.
118. Linn. *Syst. Nat.* 2. 550. 40. *Mus. Lud. Vlr.* 19.
Scarabaeus laevis. *Drury Inf.* 1. tab. 352. fig. 7.
Pilularius. *Plin. nat.* 11. 34.
Schaeff. *Icon.* tab. 3. fig. 7.
Degeer *Inf.* 4. tab. 18. fig. 14.
Habitat in Europa australiori globulos e stercore confi-
ciens, voluens.
Niger, elytris laeuis.
50. Sc. exscutellatus muticus ater, clypeo emarginato, *squalidus*.
elytris striatis. *Syst. Ent.* 30. 119. *
Habitat in stercore bouino Brasiliae.
51. Sc. exscutellatus muticus ater glaber, elytris maculis *Schreberi*.
duabus rubris. *Syst. Ent.* 30. 120. *Linn. Syst. Nat.*
2. 551. 45.
Copris niger nitidus, thorace antice gibbo, elytro sin-
gulo macula duplaci rubra. *Geoff. Inf.* 1. 91. 7.
Schaeff. *Icon.* tab. 73. fig. 6.
Voet. *Scar.* tab. 28. fig. 49.
Habitat in Europa australiori.
52. Sc. exscutellatus muticus ater, elytris basi macula ru- 2 *pustula-*
fa. *Syst. Ent.* 30. 121. * *tus*.
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.
53. Sc. exscutellatus muticus, capite thoraceque pallido *pallipes*.
viridique variegatis, pedibus pallidis.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks*.
Paruus, capitis clypeus inaequalis, integer pallido vi-
ridique variegatus. Thorax rotundatus, pallescens,
maculis viridibus variegatus. Elytra substriata, ob-
scura. Pedes omnes vti et antennae pallidi.
54. Sc. exscutellatus muticus niger, thoracis margine fe- *triangu-*
moribusque pallidis, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* *laris*.
30. 122.
Scarabaeus triangularis. *Drury Inf.* 1. tab. 36. fig. 7.
Habitat in America meridionali.
Statura omnino Sc. nuchicornis.
Fabr. *Spec. Inf.*

- cinctus.* 155. Sc. exscutellatus muticus niger, elytrorum margine pallido, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* 30. 123. *
Habitat in China. *Dom. Drury.*
- aeneus.* 156. Sc. exscutellatus muticus viridi aeneus, thorace bituberculato.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus paruum, supra viridi aeneum, obscurum, subitus nigrum viridi nitidum. Clypeus rotundatus, integer, niger basi viridis lineis durabus eleuatis abbreviatis. Thorax rotundatus, glaber antice tuberculatis duobus approximatis. Elytra striata, obtusa.
- smaragdulus.* 157. Sc. exscutellatus muticus aeneus nitidus, clypeo bidentato.
Habitat in America meridionali. *Mus. Dr. Hunter.*
Corpus paruum totum aeneum, nitidum, glaberrimum. Capitis clypeus dentibus duobus obtusis. Elytra obtusa, laevissima.
- ouatus.* 158. Sc. exscutellatus muticus niger, thorace rotundato subaeneo, elytris abbreviatis. *Syst. Ent.* 30. 124. *Linn. Syst. Nat.* 2. 551. 46.
Habitat in stercore bouino Germaniae, Angliae.
Sc. nuchicorni quadruplo minor.

3. T R O X.

- sabulosus.* 1. T. thorace elytrisque rugosis, thorace integerrimo.
Syst. Ent. 31. 1.
Scarabaeus sabulosus scutellatus muticus niger opacus, tuberculis rugosis, antennis basi pilosis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 551. 48. *Fn. Sv.* 390.
Scarabaeus rugosus. *Scop. Ent. carn.* 23.
Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 12.
Habitat in Europae collibus fabulosis, apricis.
- suberosus.* 2. T. griseus, thorace marginato, margine postice dento, elytris striatis. *Syst. Ent.* 31. 2. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
- horridus.* 3. T. ater, thorace elytrisque spinosis. *Syst. Ent. App.* p. 818. *
Habitat in India. *Mus. Dr. Hunter.*

4. T. nigricans, thorace postice vtrinque emarginato, spinis et
antennis spinosis. *Syst. Ent.* 31. 3. * *nisi.*
Habitat - - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*

4. MELOLONTHA.

1. M. testacea albo maculata, scutello macula dupli, an- *Fullo.*
tennis heptaphyllis. *Syst. Ent.* 31. 1.

Scarabaeus Fullo scutellatus muticus, antennis hepta-
phyllis, corpore nigro pilis albis, scutello macula
dupli alba. *Linn. Syst. Nat.* 2. 553. 57. *Fn. Sv.*
394. *Scop. Ent. carn.* 12.

Scarabaeus antennarum lamellis maximis, corpore
nigro squamis albis varie maculato. *Geoff. Inf.* 1.
69. 2.

Scarabaeus Fullo. *Raj. Inf.* 93. 9.

Scarabaeus albo maculatus Iulii. *Frisch. Inf.* 11. tab.
1. fig. 1.

Scarabaeus variegatus. *Roef. Inf.* 4. tab. 30.

Ephem. Nat. Curios. Dec. 2. Ann. 6; obs. 239.

Aubent. Miscell. tab. 16. fig. ined.

Schaeff. Icon. tab. 23. fig. 2.

Petiv. Gazoph. tab. 138. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. 1. 1.

Hoefn. Inf. 2. tab. 7.

Voet. Scarab. tab. 6. fig. 48. 49.

Habitat in Europae arenosis.

1. M. obscure testacea, clypeo emarginato, thoracis mar- *ferratu-*
gine ferrato.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo M. vulgaris. Capitis clypeus fuscus, apicem
eleuatus, emarginatus. Thorax laeuis obscure te-
staceus margine dentibus nigris ferrato. Elytra te-
stacea lineis aliquot eleuatis, obsoletis. Varietatem
triplo minorem e Sibiria clypeo minus emarginato
in *Mus. Dom. Banks* vidimus.

- M. testacea, thorace villoso, incisuris abdominis albis. *vulgaris.*
Syst. Ent. 32. 2.

Scarabaeus Melolontha scutellatus muticus testaceus,
thorace villoso, cauda inflexa, incisuris abdominis
albis. *Linn. Syst. Nat. 2. 554. 60. Fn. Sv. 392.*
Geoff. Inf. 1. 70. 1. Scop. Ent. carn. 16.

Scarabaeus arboreus vulgaris maior. *Raj. Inf. 104. 1.*

Scarabaeus maximus rufus vropygio deorsum inflexo.
Lift. Sc. Angl. 379.

Scarabaeus maior arboreus castaneus. *Petiv. Gazoph.*
29. tab. 19. fig. 2.

Melolontha vulgaris. *Roef. Inf. 2. Scarab. 1. tab. 1.*
Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 1. 2.

Elem. tab. 8. fig. 3.

tab. 109. fig. 4.

Voet. Scar. tab. 6. fig. 45. 46.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 14.

Habitat in Europa borealibus vulgatissimus.

Larua grisea capite pedibusque testaceis deuorat radices
plantarum.

Imago vesperi volitans foliis arborum viicitat, tilia
intacta.

Deuoratur a vespertilione murino, autumnalis morbos
copiosior praenuntiat, oleum infusum cimicifugum
reddit. *Scopoli.*

Variat thorace rufo et nigro et vtraque varietas alter-

nat annuatim.

Mas cauda acuta, inflexa.

occidenta. 4. M. testacea, thorace pubescente, elytris lineis quatuor
niueis. *Syst. Ent. 32. 3.*

Scarabaeus occidentalis scutellatus muticus testaceus,
thorace pubescente, elytris lineis quatuor niueis
parallelis. *Linn. Syst. Nat. 2. 555. 62. Drury Inf.*
2: tab. 32. fig. 2.

Habitat in Europa australiori.

M. vulgari simillima et forte eius mera varietas.

feruida. 5. M. testacea glabra, clypeo emarginato. *Syst. Ent.*
32. 4. *

Habitat in America septentrionali.

Corpus testaceum rore coerulescente tectum.

6. M. glabra testacea, clypeo reflexo. *reflexa.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Nimirae praecedenti affinis, at paullo minor. Corpus totum testaceum glabrum punctatum. Clypeus haud emarginatus, at apice reflexus.
7. M. testacea, thorace villoso, elytris luteo pallidis, lineis tribus pallidioribus. *Syst. Ent.* 33. 5. *soltitialis,*
Scarabaeus solstitialis scutellatus muticus testaceus, thorace villoso, elytris luteo pallidis, lineis tribus albis parallelis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 554. 61. *Fn. Sv.* 593. *Geoff. Inf.* 1. 74. 7. *Scop. Ent. carn.* 3.
Scarabaeus secundus arboreus. *Raj. Inf.* 105. 2.
Scarabaeus ex flavo subcinereus. *Lift. Scar.* 301. 2.
Scarabaeus lanuginosus arboreus. *Mouff. Inf.* 160. fig. 3.
Scarabaeus pectinatus minor villosus. *Petiv. Gazoph.* 36. tab. 22. fig. 9.
Scarabaeus Junii f. solstitialis. *Frisch. Inf.* 9. p. 30, tab. 15. fig. 3.
Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 3.
Voet. Scarab. tab. 6. fig. 51. 52.
Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 15.
 Habitat in Europae arboreis praecedenti senior, ad solstium aestuum frequentissima.
8. M. villosa testacea, abdomine albicante. *Syst. Ent.* *ruficornis.* 33. 6. *
Voet. Scar. tab. 6. fig. 50.
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorff.*
 Forte praecedentis mera varietas.
9. M. oblonga glabra nigra, elytris obsolete striatis. *Gen. oblonga.* *Inf. Manfiff.* 209. *
Scarabaeus oblongus. *Scop. Ent. carn.* 19.
 Habitat in Germania australiori.
10. M. subitus lanata, capite thoraceque aureis, elytris *lanigera.* luteis. *Syst. Ent.* 33. 7.
Scarabaeus lanigerus scutellatus muticus, subitus lanatus, capite thoraceque auratis, elytris luteis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 555. 67. *Mus. Lud. Vlr.* 20.
Drury Inf. 1. tab. 34. fig. 6.
 Habitat in India orientali.

punctata, 11. M. testacea, elytris punctis tribus fuscis distantibus.

Syst. Ent. 33. 8.

Scarabaeus punctatus scutellatus muticus testaceus,
elytris punctis tribus subfuscis obsoletis distantibus.

Linn. Syst. Nat. 2. 557. 76. *Mus. Lud. Vlr.* 23.

Drur. Inf. 1. tab. 34. fig. 5.

Voet. Scarab. tab. 8. fig. 65.

Gronov. Zooph. 438.

Habitat in America.

Vngues arcuati, acutissimi,

glabrata, 12. M. testacea nitida, sterno antice porrecto obtuso. *Syst.*

Ent. 34. 9. *

Habitat in Indiis. *Mus. Britann.*

viridis, 13. M. glabra supra viridis, subtus aurea. *Syst. Ent.*

*34. 10. **

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

aenea, 14. M. glabra aenea, abdominis lateribus albis, elytris

acuminatis. *Syst. Ent.* 34. 10. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

futuralis, 15. M. viridis, elytrorum futura flauescente. *Syst. Ent.*

*34. 12. **

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

bicolor, 16. M. glabra supra viridis subtus testacea, pedibus apice

aureis. *Syst. Ent.* 34. 13. *

Voet. Scar. tab. 8. fig. 66.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

dorsalis, 17. M. glabra testacea, capite thoracis elytrorumque dor-

so nigris. *Syst. Ent.* 35. 14. *

Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*

glacialis, 18. M. glabra picea, antennis pedibusque testaceis. *Syst.*

Ent. 35. 15. *

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.* *

turida, 19. M. thorace nigro, margine pallido, elytris griseis ni-

gro punctatis. *Syst. Ent.* 35. 16. *

Habitat - - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*

20. M. glabra aenea, elytris striatis, futura lineisque quatuor cupreis. *Syst. Ent.* 35. 17.*
Habitat in Terra del Fuego. Mus. Dom. Banks.
21. M. thorace villoso obscuro, elytris laeuiibus testaceis, *tristis*, scutello albido.
Habitat in America boreali. Dom. Blackburn.
Affinis M. testacea. Caput et thorax obscura, hirta. Scutellum rotundatum hirsutie densa albidum. Elytra laevia, testacea. Corpus obscurum,
22. M. glabra testacea, capite obscuriore, elytris striatis, *testacea*.
Syst. Ent. 35. 18.*
Habitat in Terra del Fuego. Mus. Dom. Banks.
23. M. glabra testacea, capite elytrorumque futura nigris. *pallida*.
Syst. Ent. 35. 19.*
Habitat ad Cap. bon, sp. Mus. Dom. Banks.
24. M. glabra punctata ferruginea, elytris testaceis. *ruficollis*.
Habitat in Coromandel. Mus. Dom. Banks.
Maior M. brunnea. Clypeus rotundatus, integer, obscure ferrugineus in medio lineis duabus eleuatis transuersis. Thorax glaber, valde punctatus rufus, immaculatus. Elytra glabra, punctata, testacea.
25. M. glabra pallida, thorace lineis duabus, elytris maculis tribus nigris. *signata*.
Habitat in Ianaica Insula. Mus. Dom. Banks.
Corpus magnitudine praecedentis. Capitis clypeus integer, pallidus, basi ater. Thorax pallidus lineis duabus atris, quae tamen nec basin, nec apicem attingunt. Elytra glabra, laevia, pallida, maculis tribus 2. 1., quarum exterior reliquis minor. Subtus pallida abdomine nigro. Tibiae antice apice compressae, dentatae. Tarsi picei basi apiceque spinosi.
26. M. glabra testacea, elytris striatis, thorace vtrinque *brunnea*. puncto notato. *Syst. Ent.* 36. 20.
Scarabaeus brunneus scutellatus muticus testaceus, elytris striatis, thorace vtrinque puncto notato. Linna.
Syst. Nat. 2. 556. 72.

Scarabaeus fulvus oculis nigris thorace glabro. Geoff.
Inf. 1. 83. 22.

Scarabaeus fulvus scutellatus flavo rufus, oculis ni-
gris, thorace punctis binis nigris, pedibus longissi-
mis. Degeer Inf. 4. 277. 23. tab. 10. fig. 17.

Scarabaeus pellucidus. Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 9.
Voet. Scar. tab. 7. fig. 53. 54.

Habitat in Europae arboretis.

Laruæ deuorant radices plantarum, declaratae folia.

melanocephala. 27. M. glabra rufescens, capite nigro, elytris pallidis.

Syst. Ent. 36. 21. *

Voet. Scar. tab. 9. fig. 80.

Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.

erythrocephala. 28. M. glabra pallida, capite rufo basi nigro.

Habitat in Coromandel. Mus. Dom. Banks.

Affinis M. melanocephalæ at duplo minor. Corpus to-
tum glabrum, laeve, immaculatum capite solo obscu-
re rufo basi nigro.

obscura. 29. M. obscure picea immaculata, pilis breuissimis ere-
ctis albis.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. Dom. Banks.

Corpus magnitudine M. rufæ totum obscure rufum, at
pilis breuissimis albis vix nudo oculo conspicuis
tectum.

rufa. 30. M. glabra rufescens, elytris testaceis, clypeo quin-
quedentato. Syst. Ent. 36. 22. *

Voet. Scar. tab. 9. fig. 76.

Habitat ad Cap. bon. sp. Mus. Dom. Banks.

festiva. 31. M. supra glabra viridis, thorace linea dorsali, elytris
sutura nigris. Syst. Ent. 36. 23. *

Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.

laeta. 32. M. supra glabra aurea, thoracis linea dorsali scutello-
que sanguineis. Syst. Ent. 36. 24. *

Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.

33. M. nigro aenea, elytris testaceis. *Syst. Ent.* 37. 25. * *Frischii.*
Scarabaeus Iulii f. *Vitis*. *Frisch. Inf.* 4. 29. tab. 14.
Poet. Scar. tab. 6. fig. 55.
tab. 7. fig. 58.
Habitat in Vite, Rosa Germaniae, in Brasilia. *Mus.*
Dom. Banks.
Variat rarius elytris thorace concoloribus.
34. M. viridis, thoracis lateribus flauis. *Syst. Ent.* 37. *Vitis.*
26. *
Scarabaeus dubius. *Scop. Ent. carn.* 4.
Poet. Scar. tab. 6. fig. 56. 57.
Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 11.
Habitat in Europae, Americae Vite.
Nimis praecedenti affinis.
Aliam vidimus elytris testaceis, at huius mera varietas
videtur.
35. M. testacea, thorace maculis duabus nigris, pedibus *errans.*
rufis. *Syst. Ent.* 37. 27. *
Habitat in - - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*
36. M. villosa virescens, capite nigro. *Syst. Ent. Append.* *rūpicola.*
818. *
Habitat ad Cap. bon. sp.
37. M. clypeo reflexo, thorace elytrisque punctatis nigro *rauca.*
aeneis.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Clypeus punctatus niger margine reflexo. Thorax
punctatus nigro aeneus obscure nitidus. Elytra pun-
ctata nigro aenea linea vna alteraue eleuata. Corpus
subtus nigrum.
38. M. rufa, thorace elytrisque vase punctatis. *ferrugi-*
nea.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Praecedentis affinis, at duplo minor et color rufus ni-
tidus.
39. M. atra, elytris vitta abbreviata aurea. *splendida.*
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Parua. Capitis clypeus punctatus, ater apice emarginatus. Thorax punctatus ater immaculatus. Elytra punctata atra vitta vel potius macula oblonga aurea.

aulica. 40. *M. cupreο nitida*, clypeo emarginato.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Caput cupreum, nitidum, late emarginatum. Thorax punctatus, cupreus, nitidus. Elytra punctata, cuprea, nitida.

horticola, 41. *M. capite thoraceque coeruleo pilosis*, elytris testaceis, pedibus nigris. *Syst. Ent.* 37. 28.

Scarabaeus horticola scutellatus muticus, capite thoraceque coeruleo subpilosus, elytris griseis, pedibus nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 554. 59. *Fn. Sv.* 391.

Scarabaeus capite thoraceque coeruleo pilosus, elytris rufis. *Geoff. Inf.* 1. 75. 8.

Scarabaeus ex nigro virescens, pennarum thecis rufis. *Lift. Scar.* 380. 3.

Scarabaeus viridicollis scutellatus, elytris obscure flavis, capite thoraceque violaceis, pedibus nigris. *Degeer Inf.* 4. 278. 24. tab. 10. fig. 18.

Scarabaeus frisius. *It. Scan.* 116. 321.

Schaeff. Icon. tab. 23. fig. 4.

Habitat in Europae hortis.

Larua Radices Brassicae Botrydis et capitatae destruit, intactis viridis et Savoyen. *Iniago Pomonam deuastat*, intacta pyro communi.

aruicola, 42. *M. capitis clypeo reflexo*, corpore nigro immaculato.

Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis affinis videtur *M. horticola* at color totius corporis niger.

praticola, 43. *M. thorace nigro flauoque vario subpiloso*, elytris testaceis.

Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis *M. agricolae*, at clypeus haud reflexus.

Variat colore vti *M. agricola*. Thorax mox magis flavus, mox magis niger. Scutellum nigrum. Elytra pallide testacea interdum fascia media nigra.

44. M. capite thoraceque coeruleo pilosis, elytris liuidis, *agricola*.
clypeo apice reflexo. *Syst. Ent.* 37. 29.
Scarabaeus agricola scutellatus muticus, thorace vil-
loso, elytris liuidis, limbo fasciaque nigris. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 553. 58.
Scarabaeus cyathiger. *Scop. carn.* 6.
Scarabaeus agricola. *Pod. Inf.* 21.
 Schaeff, *Icon. tab.* 65. fig. 1.
 Voet. *Scarab. tab.* 8. fig. 67.
 Habitat in spicis fecaliniis Germaniae, Angliae.
 Clypeus semper apice reflexus, at elytra mox maculata,
 mox immaculata,
45. M. atra sericea, elytris rufis, margine nigro. *Syst. ruricola*
Ent. 38. 30. *
Scarabaeus niger elytris croceis, margine niger. *Geoff.*
Inf. 1. 80. 15.
 Habitat in Angliae graminosis.
 Variat rarius elytris obscuris, margine tamen semper
 obscuriore.
46. M. albo farinosa, thorace canaliculato atro, elytris *atomaria*.
 fuscis, abdomine albo, punctis lateralibus atris.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et magnitudo M. farinosae, Caput et thorax atra
 atomis plurimis albis adspersa pilisque rarioribus
 erectis. Thorax canaliculatus. Elytra fusca atomis
 albis. Abdomen niueum linea laterali punctorum ni-
 grorum. Pedes nigri.
47. M. supra coeruleo, subtus argenteo squamosus nitens, *farinosa*.
 clypeo integro. *Syst. Ent.* 38. 31. **
Scarabaeus farinosus scutellatus muticus niger, polline
 virescente, elytris abbreviatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 555.
 64. *Fn. Sv.* 399.
Scarabaeus violaceus et squamosus squamis subtus ar-
 genteis. *Geoff. Inf.* 1. 79. 13.
Scarabaeus scutellatus niger, squamulis griseo viridi-
 bus, corpore depresso. *Degeer Inf.* 4. 302. 30. tab.
 10. fig. 23.
Scarabaeus coeruleus. *Drury Inf.* 2. tab. 32. fig. 4.
 Voet. *Scarab. tab.* 9. fig. 71.
 Habitat in Europa australiori.

- argentea.* 48. M. clypeo marginato niger subtus argenteo nitens
elytris testaceis. *Syst. Ent.* 38. 32. *
- Scarabaeus argenteus.* *Scop. Ent. carn.* 9.
Scarabaeus argenteus. *Pod. Inf.* 20.
Voet. Scar. tab. 8. fig. 68.
Habitat frequens in Angliae floribus.
Distincta omnino species.
- proboscidea.* 49. M. clypeo porrecto subreflexo nigra hirta, elytris te-
staceis, margine nigro. *Syst. Ent. App.* p. 818. *
Habitat in India. *Mus. Dr. Hunter.*
- spinipes.* 50. M. nigra immaculata, pedibus posticis elongatis, fe-
moribus basi vniispinosis.
Habitat ad promontorium bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Statura omnino M. crassipedis. Clypeus apice eleuatus,
niger, obscurus. Thorax et elytra obscure nigra,
minime nitida. Pedes postici elongati, incrassati fe-
moribus ad basin interiorem spina valida, acuta.
- dentipes.* 51. M. nigra, elytris testaceis, clypeo quadridentato, fe-
moribus tibiisque posticis spinosis.
Habitat ad promontorium bon sp. *Mus. Dom. Banks.*
Affinis praecedenti. Caput et thorax villosa, atra,
elytra testacea, abdomen retusum, femora postica
compressa, vniispinosa, tibiae spinis duabus aequa-
libus.
- podagrica.* 52. M. nigra, clypeo tridentato, femoribus tibiisque po-
sticis spinosis.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentium. Caput et thorax atra, vix hirta,
immaculata clypeo apice denticulis tribus eleuatis.
Thorax postice rotundatus. Elytra laevia, atra, ma-
cula vna altera grisea. Pedes nigri femoribus po-
sticis incrassatis, compressis apice interiori vniispino-
sis. Tibiae breues, incuruae spina breui valida ba-
seos et altera elongata apicis.
- arthritica.* 53. M. nigra, elytris griseis, clypeo tridentato, femori-
bus tibiisque posticis incrassatis subinermibus.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Praecedentibus paullo minor. Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen atrum vtrinque albo maculatum.

54. M. grisea, pedibus rufis, femoribus posticis incrassatis muticis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Praecedentibus minor. Clypeus subbidentatus. Abdomen retusum, atrum. Pedes omnes rufi femoribus posticis incrassatis, compressis, muticis. Tarsi nigri vngulis arcuatis.

55. M. atra albo maculata, pedibus posticis elongatis *crassipes*, crassissimis. *Syst. Ent. Append.* pag. 818. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

56. M. corpore polline virescenti argenteo, elytris pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 39. 33. * *puluerula*
Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 8. *lenta*.

Habitat Strasburgi.

Duplo minor M. argentea.

57. M. clypeo inflexo integro, corpore nigro glabro. *Syst. sylvicola*. *Ent.* 39. 34. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Variat interdum elytris fuscis.

58. M. flauescens, pedibus rufis, thorace subspinoso. *Syst. subspinosa*. *Ent.* 39. 35. *

Habitat in Iamaica, insulisque Americae meridionalis.

59. M. villosa nigra, clypeo tridentato, elytris abbreviatatis testaceis. *abbreviata*.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Capitis clypeus breuis, niger, villosus, apice tridentatus. Thorax canaliculatus, pilosus, ater. Elytra abdomine multo breuiora, angustiora, laevia, testacea. Corpus atrum pilis aliquot albis.

60. M. atra, tomento cinereo villosa. *Syst. Ent.* 39. 36. * *mutabilis*. *Voet. Scar.* tab. 9. fig. 75.

Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*

46 CLASS. I. ELEVTERATA. Melolontha.

- variabilis.* 61. M. atra, elytris auro nitentibus, antennis pedibusque testaceis. *Gen. Inf. Append.* 210. *
 Habitat in America boreali, in Holsatia.
 Variat nostra colore nigro et rufso tomento que cinereo tecta.
- versicolor.* 62. M. obscure aenea, elytris tomento cinereo nitidulis. *Syst. Ent.* 39. 37. *
 Habitat ad Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*
- capicola.* 63. M. nigra hirta, scutello abdome neque albidis.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Parua. Caput, thorax, elytra nigra, immaculata pilis erectis albis hirta. Scutellum ut abdome subtus albo villosum. Pedes nigri.
- picea.* 64. M. glabra ferruginea, elytris striatis.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura gibba praecedentium. Corpus totum ferrugineum, capite thorace que tamen obscurioribus omnino glabrum. Pedes postici compressi tibiis ferratis.
- lineata.* 65. M. obscure virescens, elytris lineis duabus rufis.
 Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus paruum, gibbum. Caput et thorax obscure viridia ore nigro. Elytra obscure viridia lineis duabus rufis ad basin coeuntibus, quae tamen apicem haud attingunt. Subtus nigra pedibus piceis.
- gibba.* 66. M. gibbo testacea tomento cinerascente nitidula.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura magis gibba. Capitis clypeus reflexus. Corpus totum testaceum cinereo tomento tenuissimo nitidulum. Tibiae posticae intus ferratae, extus vnidentatae, apice truncatae, spinosae.
- monticola.* 67. M. clypeo integrō reflexo testacea glabra, capite atro. *Syst. Ent.* 39. 38. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- humuræ.* 68. M. atra, elytris basi puncto que medio pallidis. *Syst. Ent.* 40. 39. *
 Habitat in Europæ graminosis. *Mus. Dom. Tunstall.*

69. M. atra hirsutissima, pedibus quatuor anticis testaceis. *Syst. Ent. App.* pag. 818. * *Vrjus.*
Voet. Scar. tab. 9. fig. 74.
 Habitat ad Cap. bon sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Variat pedibus omnibus nigris, an distincta species?
70. M. nigra hirta, elytrorum margine aureo. *Gen. Inf. Mant.* 210. * *Lynx.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*
71. M. hirta supra viridis, subtus nigra. *Gen. Inf. Mant.* *crinita.* 210. *
Scarabaeus longipes scutellatus muticus atro cyaneus, pedibus nigris, posticis elongatis vniunguiculatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 555. 66. *Mus. L. V.* 20.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*
72. M. hirta, capite thoraceque viridibus, elytris fuscis. *hirta;*
 Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentium. Caput et thorax viridia, nitida pilis albis elongatis hirta antennisque piceis. Scutellum viride. Elytra fusca pilis albis hirta margineque pilis erectis nigris ciliato. Sutura parum viscerit. Subtus pilis albis densioribus tecta. Pedes virides, nitidi.
73. M. aurea fuluo hirta, abdomine ferrugineo. *vulpes.*
 Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*
 Clypeus breuis, integer, aureus margine nigricante. Thorax aureus, pilis fuluis elongatis densissimis testus. Elytra magis testacea, itidem pilis elongatis fuluis tecta. Abdomen rufum basi nigrum apice pube, forte maris, cornea, inflexa, bidentata. Pedes aurei.
74. M. cyanea pilosa, elytris testaceis lineis tribus albocantibus. *Syst. Ent.* 40. 40. * *vittata.*
Petiv. Gazoph. tab. II. fig. 12.
Voet. Scarab. tab. 5. fig. 35.
 Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

5. TRICHIVS.

fasciatus. 1. *T. niger tomentoso flauus, elytris fasciis tribus nigris abbreuiatis.* *Syst. Ent.* 40. 1.

Scarabaeus fasciatus scutellatus muticus niger tomentoso flauus, elytris fasciis duabus luteis coadunatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 556. 70. *Fn. Sv.* 395

Scarabaeus niger hirsuto flauus, elytris luteis, fasciis tribus nigris interruptis. *Geoff. Ins.* 1. 80. 16.

Drury Ins. 1. tab. 36. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 4.

Act. nidros. 4. tab. 16. fig. 2.

Voet. Scar. tab. 5. fig. 43.

Degeer Ins. 4. tab. 10. fig. 19.

Habitat in Europa boreali in floribus umbellatarum frequens.

indus. 2. *T. thorace hirsuto, elytris liuidis fusco maculatis.* *Syst. Ent.* 40. 2.

Scarabaeus Indus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 556. 71. *Mus. Lud. Vir.* 27.

Habitat in Indiis.

Cetoniis affinis videtur.

bibens. 3. *T. capite thoraceque viridi aeneis pilosis, elytris testaceis viridi nitentibus.* *Syst. Ent.* 40. 3. *

Habitat in America. *Dom. Tunstall.*

hemipterus. 4. *T. thorace tomentoso, rugis duabus longitudinalibus, elytris abbreuiatis.* *Syst. Ent.* 41. 4.

Scarabaeus hemipterus scutellatus muticus, thorace tomentoso rugis duabus longitudinalibus marginato, elytris abbreuiatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 555. 63.

Scarabaeus ater depresso et squamosus, maculis albis variegatus, elytris abbreuiatis, femina aculeo ani. *Geoff. Ins.* 1. 78. 17.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 11. fig. 7.

Scarabaeus variegatus. *Scop. Ent. carn.* 28.

Voet. Scar. tab. 10. fig. 88 — 90.

Habitat in Europa. Larua in ligno, imago in floribus. Femina aculeo brevi, rigido ani.

5. T. glaber cyaneus, elytris lunulis duabus albis. *Syst. lunulatus.*
*Ent. 41. 5. **
 Habitat in Carolina. *Mus. Brit.*
6. T. viridis pubescens, ano albo bimaculato. *Syst. Ent. viridulus.*
*Append. 820. **
 Habitat in India. *Mus. Dr. Hunter.*
7. T. capite thoraceque aeneis villosis, elytris testaceis *piger.*
 albo maculatis. *Syst. Ent. 41. 6. **
 Habitat in America boreali. *Mus. Britann.*
8. T. thorace nigro, triangulo albo, elytris testaceis, *Delta.*
 punto fuso. *Syst. Ent. 41. 7. **
Scarabaeus Delta scutellatus muticus flauus, thorace
 atro, triangulo flavo, elytris testaceo flavis nigro
 maculatis. *Forst. Cent. 1. 7. 7.*
Scarabaeus Delta. *Drury Ins. 2. tab. 30. fig. 1. 2.*
 Habitat in Americae floribus.
9. T. pubescens, thorace fulvo nigro lineato, elytris te- *lineatus.*
 staceis, sutura fulua. *Syst. Ent. App. 820. **
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
10. T. hirtus fuscus, elytris subtestaceis. *nigripes.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino praecedentium. Caput et thorax nigra,
 hirta. Elytra testacea margine apicis interdum cine-
 reo. Abdomen cinereum pilis albidis hirtum. Pe-
 des nigri.
11. T. supra glaber cinereo maculatus, capite thoraceque *macula-*
 nigris, elytris piceis. *tus.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentis. Caput nigrum, immaculatum
 clypeo apice emarginato. Thorax glaber, ater, mar-
 gine tenuissimo punctisque vtrinque duobus cinereis.
 Elytra picea cinereo maculata. Subtus cinereo pu-
 bescens abdominis apice flavescente. Pedes nigri ti-
 biis posticis brevibus, truncatis.

6. CETONIA.

- micans.* 1. *C. viridis nitens*, clypeo porrecto recurvo bifido, tibiis anticis ferratis. *Syst. Ent.* 42. 1. *

Scarabaeus micans. *Drury Inf.* tab. 32. fig. 3.
Habitat in Africa, Sierra Leon.

chinensis. 2. *C. aenea*, clypeo emarginato subspinoso, thorace postice lobato, elytris acuminatis. *Syst. Ent.* 42. 2. *
Scarabaeus Chinensis. *Forst. Cent. Inf.* 2. 2.
Voet. Scar. tab. 5. fig. 40.
Habitat in China. *Mus. Dom. Banks.*

nigrita. 3. *C. glabra atra*, clypeo emarginato subspinoso, thorace postice lobato. *Syst. Ent.* 43. 3. *
Hermann. Mus. pag. 17. 257.
Petiv. Gazoph. tab. 28. fig. 3.
Habitat Ceylonae. *Mus. Britann.*

aurata. 4. *C. aurata*, segmento abdominis primo lateribus vnidentatis, elytris albo maculatis. *Syst. Ent.* 43. 4.
Scarabaeus auratus scutellatus muticus auratus, segmento abdominis primo lateribus vnidentatis, clypeo planiusculo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 557. 78. *Fn. Sv.* 40c
Scop. carn. 17.
Scarabaeus viridi aeneus, thoracis parte prona antic prominente. *Geoff. Inf.* 1. 73. 5.
Scarabaeus arboreus viridis s. *Scarabaeus auratus* ditus. *Frisch. Inf.* 12. 25. tab. 3. fig. 1.
Scarabaeus maior, corpore breuiore, alarum elytri et thoracis tegmine colore viridi splendentibus. *Raj Inf.* 76. 7.
Scarabaeus auratus. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. 2.
Scarabaeus Smaragdus scutellatus viridi aureus, elytris glabris, lineis transuersis albidis, pectore porrecto, lateribus vnidentato. *Degeer Inf.* 4. 279. 25 tab. 11. fig. 1.
Bergstraess. Nomencl. 1. 14. 5. 6. 7. tab. 2. fig. 5. 6. 7.
Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 2. 3. 7.
tab. 50. fig. 8. 9.
Voet. Scar. tab. 1. fig. 1. 2. 3.
Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 1.

Habitat in Europae lignis putrescentibus, formicarum
aceruis larua, imago in floribus.

Imago tacta per anum eiicit liquorem foetidissimum,
Variat magnitudine et colore.

5. C. nigra obscura, corpore subtilis nitidiore. *Morio.*
Scarabaeus lugubris. Voet. Scarab. tab. 2. fig. 14.
 Habitat in Europa australi, Italia. *Dr. Allioni.*
 Nimis affinis videtur C. auratae, at tota nigra.

6. C. aurata, abdomine postice albo punctato, elytris rugosis. *Syst. Ent. 43. 5. nobilis.*

Scarabaeus nobilis scutellatus muticus auratus, abdo-
mine postice albo punctato. Linn. Syst. Nat. 2. 558.
81. Fn. Sv. 401.

Scarabaeus viridis nitens, thorace infra aequali, non
prominente. Geoff. Inf. 1. 73. 6.

Scarabaeus viridi aeneus, thorace sulcato, elytris ru-
gosis. Vdm. Diff. 1.

Scarabaeus auratus secundus. Roef. Inf. 2. Scarab. 1.
tab. 3. fig. 1 — 5.

Scarabaeus viridulus scutellatus aureo viridis nitidus,
elytris rugosis, abdomine postice albedine maculato,
pectore mutico. Degeer Inf. 4. 297. 26.

Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 5.

Voet. Scar. tab. 4. fig. 28.

Habitat larua in Europae ligno putrescente, imago in
floribus praesertim umbellatis.

Larua grisea, capite sanguineo, pedibus flavescensibus.

7. C. nigra, thorace utriusque puncto baseos elytrisque 8 puncta-
duobus flavis. *Syst. Ent. 44. 6. ** ta.

Scarabaeus variabilis scutellatus muticus laetus opa-
cus ater, elytris albo punctatis. Linn. Syst. Nat. 2.
558. 79. Fn. Sv. 402.

Scarabaeus albo punctatus scutellatus niger, corpore
depresso. Degeer Inf. 4. 301. 29. tab. 10. fig. 22.

Roef. Inf. 2. Scarab. 1. tab. 2. fig. 8: 9. at nostra
omnino nigra.

Schaeff. Icon. tab. 198. fig. 8.

Voet. Scar. tab. 5. fig. 42.

Habitat in Germania.

- 4 puncta-* 8. *C. nigra*, thorace punctis quatuor albis.
ta. Habitat in agro Pedemontano. *Dr. Allioni.*
 Magnitudo et statura omnino *C. Morionis*, at puncta quatuor minutissima alba in thorace.
- nitida.* 9. *C. thorace postice lobato*, capite spina recumbente, sterno cornuto. *Syst. Ent.* 44. 7.
Scarabaeus nitidus scutellatus muticus, thorace postice lobato, capite spina recumbente, sterno porrecto. *Linn. Syst. Nat.* 2. 552. 51. *Mus. Lud. Vlr.* 20.
Scarabaeus scutello minimo, viridis obscurus, thorace angulato, elytrisque flavo marginatis, capite spina recumbente. *Degeer Inf.* 4. 321. 16. tab. 19. fig. 8. 9.
Scarabaeus nitidus. *Drury Inf.* 1. tab. 33. fig. 5. 6.
Roef. Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. B. fig. 4.
Voet. Scar. tab. 3. fig. 23.
 Habitat in America, Carolina.
- Chrysis.* 10. *C. scutello elytris dimidio breuiore*, sterno porrecto, corpore viridi. *Syst. Ent.* 44. 8.
Scarabaeus Chrysis scutellatus muticus, sterno porrecto, scutello elytris dimidio breuiore. *Linn. Syst. Nat.* 2. 551. 49. *Mus. Lud. Vlr.* 21.
Scarabaeus scutello longissimo, corpore ouato conuexo, supra viridi nitente, infra viridi aeneo, pectore porrecto. *Degeer Inf.* 4. 319. 12. tab. 19. fig. 4.
Gron. Zooph. 428. tab. 15. fig. 8.
Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 10.
Voet. Scar. tab. 8. fig. 63.
 Habitat in America australiori.
- Lanius.* 11. *C. exscutellata* liuida nigro maculata, sterno antice cornuto. *Syst. Ent.* 44. 9. *
Scarabaeus Lanius exscutellatus muticus ruber, adspersus punctis nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 557. 77.
Scarabaeus e rubro cinereus minor, maculis nigris notatus. *Sloane Iam.* 2. tab. 237. fig. 7. 8.
Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 8.
Voet. Scar. tab. 5. fig. 44.
 Habitat in America meridionali.

12. *C. scutellata rubra*, elytris nigro maculatis. *Carnifex.*
Scarabaeus rufus, elytris nigro maculatis. *Roef. Inf.*
 2. *Scarab. 1. tab. B. fig. 3.*
Voet. Scar. tab. 2. fig. 16.
- Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*
 Differt manifeste a *C. Lanio*. Caput rufum ore nigro.
 Thorax punctatus, rufus, vix maculatus margine baseos subemarginato. Scutellum distinctum, triangulare nigrum. Elytra substriata, rubra nigro maculata. Subtus atra sterno vix porrecto, obtuso rufo. Abdomen lineis tribus punctorum rubrorum intermediis maioribus. Pedes antici nigri. Femora quatuor postica rufa nigro marginata. Tibiae nigrae apice rufae.
13. *C. picea*, abdominis segmentis margine albis, clypeo *trifitis*: emarginato, sterno cornuto. *Syst. Ent. 45. 10. **
 Habitat in America boreali. *Mus. Dr. Hunter.*
14. *C. ferrugineo flavescentis*, elytris virescentibus, sterno *smaragno* cornuto. *Syst. Ent. 45. 11. ** *dula.*
 Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*
15. *C. aeneo atra*, thorace inaequali, scutello sulco longitudinali. *Eremita.* *Syst. Ent. 45. 12.*
Scarabaeus Eremita scutellatus muticus, aeneo ater, thorace inaequali, scutello sulco longitudinali. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 556. 74. Scop. Ent. carn. 15.
- Scarabaeus coriarius* scutellatus aenco niger nitidus, corpore planiusculo glabro, thorace futuris binis totidemque tuberculis. *Degeer Inf. 4. 300. 28. tab. 10. fig. 22.*
- Scarabaeus magnus piceus*. *Roef. Inf. 2. Scarab. 1. tab. 3. fig. 8.*
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 10. fig. 1.
Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 1.
- Scarabaeus lugubris*. *Voet. Scar. tab. 3. fig. 21.*
 Habitat in truncis putridis Pyri, Salicis.
 Recens odorem spargit corii Russici.
16. *C. thorace lineis quatuor albis*, elytris viridibus, ab- *fascicula-* dominis incisuris barbatis. *Syst. Ent. 45. 13. ris.*

Scarabaeus fascicularis scutellatus muticus, thorace lineolis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis incisuris barbatis. Linn. Syst. Nat. 2. 557. 75. Mus. Lud. Vlr. 26.

Scarabaeus fascicularis. Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 2.
Voet. Scar. tab. 3. fig. 17.

Habitat in Africa.

aulica. 17. *C. viridis nitida*, thoracis margine elytrorumque maculis albis.

Habitat ad Cap. bon. sp. Mus. Dom. Banks.

Magna, caput viride punctis duobus paruis albis ante oculos. Clypeus emarginatus. Thorax viridis, nitidus margine tantum exteriori albo. Scutellum triangulare, immaculatum. Elytra obtusa, viridia, nitida, macula baseos, quinque marginalibus, duabus dorsalibus et vnlca apicis albis. Subtus viridis pectore villoso, -albo. Abdomen lineis quatuor macularum albarum. Ultimum abdominis segmentum prominet maculis duabus magnis albis. Pedes virides femoribus posticis macula alba.

capensis. 18. *C. hirta rufa* albo punctata. Syst. Ent. 46. 14.

Scarabaeus capensis scutellatus muticus rufus, hirtus, adspersus punctis albis. Linn. Syst. Nat. 2. 556. 73
Mus. Lud. Vlr. 30.

Scarabaeus albopunctatus scutellatus obscure rubro purpureus capite nigro, thorace linea alba marginali, elytrisque punctis albis. Degeer Inf. 7. 640. 40. tab. 48. fig. 2.

Scarabaeus capensis pilosus vaginis rubris plurimis punctulis albis adspersus. Petiv. Gazoph. tab. 8. fig. 6.

Scarabaeus rufus albo punctatus. Roef. Inf. 2. Scarab. 1. tab. B. fig. 6.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 3.

Voet. Scar. tab. 2. fig. 11.

Habitat in Africa.

fignata. 19. *C. thorace nigro*, margine albo, elytris testaceis, sutura marginaque nigris. Syst. Ent. App. 818. *

Scarabaeus folium mortuum. Voet. Scarab. tab. 2.

fig. 13.

Habitat ad Cap. bon. sp. Mus. Dom. Banks.

20. *C. glabra atra, thoracis elytrorumque marginibus ru-* *margina-*
fis. Syst. Ent. 46. 15. * *ta.*

Scarabaeus marginatus. Drury Inf. 2. tab. 32. fig. 1.

Voet. Scar. tab. 1. fig. 4.

Habitat in Sierra Leon Africæ. Mus. Dom. Banks.

21. *C. viridis, thoracis elytrorumque margine ferrugineo.* *marginel-*
*Syst. Ent. 46. 16. ** *la.*

Habitat in Sierra Leon Africæ. Mus. Dom. Tunstall.

22. *C. nigra, lineola flava a capite ad scutellum ducta.* Syst. lineola.
 Ent. 46. 17.

Scarabaeus lineola. Linn. Syst. Nat. 2. 552. 53.

Scarabaeus parvus niger, lituris flavo brunneis. Roes.
 Inf. 2. Scarab. 1. tab. B. fig. 7.

Scarabaeus scutellatus niger nitidus flavo maculatus,
 capite thoraceque linea flava, thoracis margine fla-
 uo. Degeer Inf. 4. 320. 13. tab. 19. fig. 5.

Voet. Scarab. tab. 9. fig. 81.

Habitat in America.

Variat rarius elytris albo maculatis.

23. *C. fusco viridis, thorace elytrisque margine punctis-* *sinuata.*
que duobus flavis. Syst. Ent. App. 818. *

Scarabaeus punctato marginatus. Degeer Inf. 7. 639.
 38. tab. 47. fig. 20.

Habitat ad Cap. bon. sp. Mus. Dom. Banks.

24. *C. nigra thoracis margine elytrisque testaceis, elytris fasciata.*
 futura fasciaque dentata nigris. Syst. Ent. 46. 18. *

Habitat Alexandriae. Dom. Prof. Forskahl.

25. *C. nigra, thorace ferrugineo, elytris nigris subpur-* *thoraci-*
purascentibus. Syst. Ent. 47. 19. * *ca.*

Habitat Alexandriae. Prof. Forskahl.

26. *C. testacea, thorace lineis punctisque duobus, elytris olinacea.*
 maculis quatuor transuersis nigris. Syst. Ent. 47. 20. *

Habitat in Sierra Leon Africæ. Mus. Dom. Tunstall.

piðia. 27. *C. nigra*, thorace quinque-lineato, elytris acumina-natis albo maculatis. *Syst. Ent.* 47. 21. *
Habitat in Oriente. *Prof. Forskahl.*

trilinea- 28. *C. nigra*, thorace lineis tribus, elytris fascia flexuo-ta. *fa scutelloque albis.* *Gen. Inf. Mant.* p. 210. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*

5lineata. 29. *C. nigra*, thorace quinque-lineato, elytris albo macu-latis clypeo reflexo spinaque incumbente.

Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Caput nigrum, immaculatum clypeo apice eleuato, erec-to et in medio spina incumbente, acuta. Thorax ni-ger lineis impressis, albis. Scutellum triangulum mar-gine lineolaque baseos albis. Elytra fusca albo ma-culata futura lineisque duabus eleuatis rubris in-teriori abbreviata. Abdomen atrum vtrinque linea e-punctis albis.

limbata. 30. *C. nigra*, thoracis margine ferrugineo. *Syst. Ent.* 47. 22. *
Habitat in Aegypto. *Dom. Prof. Forſkahl.*

splendida. 31. *C. cyanea*, thoracis margine elytrisque testaceis. *Syst. Ent.* 47. 23. *
Voet. Scar. tab. 8. fig. 62.

Habitat in India.

elegans. 32. *C. viridis nitidissima*, elytrorum sutura puncto-que apicis atris.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo omnino *C. auratae*. Capitis clypeus viridis nitidus apice subreflexo spinaque minutissima incum-bente. Thorax viridis, nitidissimus, immaculatus. Scutellum triangulare, concolor. Elytra viridia, ni-tidissima sutura puncto-que apicis gibbo atris, ob colo-ris nitorem vix conspicuis. Subtus concolor primo abdominis segmento margine testaceo. Sternum pro-minens, subrecurvum, obtusum.

Variat rarius puncto adhuc baseos nigro.

4macula- 33. *C. viridis fulvo micans*, elytris maculis duabus nigris, ta. sternio obtuso.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Capitis

Capitis clypeus obtusus, subemarginatus, fuluus. Thorax, elytra, scutellum, viridia, laeuia fuluo colore inicantia. Punctum nigrum ad basin et alterum ad apicem elytrorum. Subtus viridis, nitensano obscurro. Femora vtrinque linea fulua.

34. C. cuprea nitida, thorace scutello elytrisque viridi- *cuprea*.
bus. *Syst. Ent.* 48. 24. *

Habitat - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*

35. C. aenea nitens capitis spina incumbente, sterno por- *africana*.
recto, elytris punctis nigris striatis. *Syst. Ent.* 48.
25. *

Scarabaeus africanus. Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 4.

Habitat in Africa, Sierra Leon.

36. C. thorace nigro, margine rufo, elytris aeneo nititi- *futuralis*.
dis, sutura nigra. *Syst. Ent.* 48. 26. *

Habitat in Africa. *Mus. Dom. Drury.*

37. C. viridi aenea hirta, elytris testaceis, vitta media nigra futuraque aenea. *Syst. Ent. App.* p. 819. *

Voet. Scar. tab. 7. fig. 60.

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

38. C. aenea nitidissima, abdominis ultimo segmento prominente quadripunctato. *Syst. Ent.* 48. 27. *

Scarabaeus tarchesinus. Voet. Scarab. tab. 3. fig. 24. ?

Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*

39. C. viridis nitidissima fusco micans immaculata. *Iris.*

Habitat Surinami. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnitudine praecedentis, totum viride, nitidissimum, at fusco colore micans. Capitis clypeus emarginatus, at absque vlla spina. Thorax elytraque subtilissime punctata. Sternum porrectum, breve, orbiculatum.

40. C. atra nitida, clypeo truncato reflexo, sterno obtuso. *gagates.*
Syst. Ent. 49. 28. *

Scarabaeus gagates. Forster. Cent. Inf. 6. 6.

Habitat ad Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

- tetrada-* 41. *C. atra*, scutello elytris dimidio breuiore, pedibus triunguiculatis, pollice fixo. *Syst. Ent.* 49. 29.
tylea. *Scarabaeus tetradastylus* scutellatus muticus niger, pedibus triunguiculatis, pollice fixo. *Linn. Mant.* 530.
Scarabaeus tetradastylus. *Drury Ins.* 1. tab. 33. fig. 7.
Scarabaeus maior niger. *Sloan. Lam.* 2. 237. fig. 2.
Habitat in America meridionali.
- turida.* 42. *C. nigro aenea*, elytris lineis duabus eleuatis alboque maculatis. *Syst. Ent.* 49. 30. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
- aurichal-* 43. *C. aenea opaca*, elytris accuminatis albo maculatis.
cea. *Syst. Ent.* 49. 31. *
Habitat ad Suratte Indiae. *Mus. Britann.*
- philippen-* 44. *C. aenea nitida*, thorace margine punctisque duobus
sis. albis, elytris maculatis acuminatis. *Syst. Ent.* 49.
32. *
Petiv. Gazoph. tab. 26. fig. 7.
Habitat in Insulis Philippinis. *Mus. Britann.*
- fiolata.* 45. *C. viridi fusca*, thorace niargine punctisque, elytris
fascia media inaculisque niueis postice acuminatis.
Syst. Ent. 50. 33. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- maculata.* 46. *C. aenea nitida*, thorace vtrinque macula, elytris
plurimis albis, sterno obtuso.
Antheus. *Voet. Scarab.* tab. 1. fig. 8.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Statura C. acuminatae. Caput aeneum, immaculatum.
Thorax aeneus, nitidus vtrinque macula magna si-
nuata alba. Elytra laeuia, aenea albo maculata, qua-
rum anterior maior fere fasciam constituit apice vix
acuminata. Subtus cuprea pectore vtrinque macula
magna alba. Abdomen lineis quatuor punctorum
alborum. Sternum vix prominet obtusum.
- acumina-* 47. *C. obscure aenea pallido maculata*, elytris acuminatis.
ta. *Syst. Ent.* 50. 34. **
Voet. Scar. tab. 4. fig. 37.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

48. *C. nigra*, elytris viridibus nitidis, thoracis margine haemor-
anoque rufis. *Syst. Ent. App.* 819. * *rhoidalis*.
Habitat ad Cap. bon. sp. Dr. Hunter.

49. *C. nigra pubescens*, elytris disco rufo. *Syst. Ent. areata*:
50. 35. *
Habitat in Virginia. *Mus. Britann.*

50. *C. nigricans hirta*, elytris pallido maculatis, thorace carinato. *Syst. Ent.* 50. 36. *hirta*.

Scarabacus hirtellus scutellatus muticus hirtus, testaceo nigricans, elytris pallido maculatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 556. 69.

Scarabaeus hirtus. *Scop. Ent. carn.* 8.

Scarabaeus hirtus. *Pod. Inf.* 21.

Voet. Scar. tab. 4. fig. 34.

51. *Scarabaeus squalidus* scutellatus muticus niger hirtus, thorace subcarinato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 556. 68.

Scarabaeus squalidus. *Scop. Ent. carn.* 13.

Voet. Scar. tab. 4. fig. 33.

Habitat in Europa australiori.

51. *C. clypeo emarginato nigra* albo maculata, abdome *stictica*.
subtus punctis quatuor albis. *Syst. Ent.* 51. 37.

Scarabaeus sticticus scutellatus muticus nigroglaber,
punctis albis sparsis, abdome subtus punctis albis
quaternis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 552. 54.

Scarabaeus nigro coerulescens maculis albis sparsis, or-
dine macularum abdominalium longitudinali. *Geoff.*
Inf. 1. 79. 14.

Raj. Inf. 104. 8.

Scarabaeus funestus. *Scop. Ent. carn.* 7.

Habitat in Galliae Carduis.

52. *C. nigra*, thorace rufo nigro maculato, elytris nigris *verficolor*.
albo punctatis, dorso rufo. *Syst. Ent.* 51. 38. *

Scarabaeus Thebanus. *Acta Societ. Berol. Phys.* 4.
tab. 1. fig. 8.

Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl.*

Variat maculis atris thoracis albo pupillatis et coecis.

lugubris. 53. *C. glabra atra*, elytris macula laterali anoque albis.
Syst. Ent. Append. 819. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

histrio. 54. *C. testacea*, capite thoracis lineis duabus elytrorum
 futura maculisque tribus nigris. *Syst. Ent.* 51. 39. *
Habitat in Aegypto. *Dom. Prof. Forstkahl.*

variega. 55. *C. atra*, thorace margine elytrisque maculis sparsis al-
 bis. *Syst. Ent.* 51. 40. *
Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*

hottentot- 56. *C. atra glabra*, elytris postice punctis duobus albis.
ta. *Syst. Ent.* 52. 47. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

7. H I S T E R.

maior. 1. *H. ater*, elytris substriatis, thoracis marginibus ciliatis.
Syst. Ent. 52. 1. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 566. 2.
Voet. Scar. tab. 31. fig. 6.
Habitat in Africa.

unicolor. 2. *H. ater*, elytris oblique striatis. *Syst. Ent.* 52. 1. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 567. 3. *Fn. Sv.* 440.

Attelabus totus niger, elytris laeuis nonnihil striatis. *Geoff. Inf.* 1. 94. tab. 1. fig. 4.

Scarabaeus antennis globulosis, media parte in annulum flexis, septimus. *Raj. Inf.* 91. 7.

Hister niger nitidus, elytris striatis. *Degeer Inf.* 4. 342.
 1. tab. 12. fig. 12.

Hister unicolor. *Scop. Ent. carn.* 30.
Att. nidros. 4. tab. 16. fig. 4.
Schaeff. Icogn. tab. 42. fig. 10.
Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 8. 9.

Habitat in Europae, Americae arena, stercore.

cyaneus. 3. *H. thorace aeneo*, elytris coerulecentibus. *Syst. Ent.*
 52. 3. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

4. *H. ferrugineus*, elytris substriatis. *Syst. Ent.* 52. 4. * *brunneus*.
Habitat in Sueciae stercore. *Mus. Dom. Banks.*
5. *H. ater*, elytris laeuissimis. *Syst. Ent.* 53. 5. *Linn. Syst. pygmaeus*-
Nat. 2. 567. 4. *Fn. Sv.* 441. *us.*
Hister nigro fuscus, elytris dimidio striatis. *Degeer*
Inf. 4. 344. 4.
Schaeff. Icon. tab. 42. *fig.* 10.
Habitat in Europa boreali.
Nimis affinis *H. vnicolori*.
6. *H. ater*, elytris crenato striatis, striis interioribus ab *abbreuiatus*-
breuiatis. *Syst. Ent.* 53. 6. * *tus.*
Habitat in America boreali. *Dom. Drury*.
Statura omnino *H. pygmaei*.
7. *H. ater*, elytris postice rubris. *Syst. Ent.* 53. 7. *Linn. 2 macula-*
Syst. Nat. 2. 567. 5. *Fn. Sv.* 442. *tus.*
Attelabus niger, elytro singulo macula rubra. *Geoff.*
Inf. 1. 95. 2.
Hister fimetarius. *Scop. Ent. carn.* 31.
Coccinella atra glabra, elytris abdomine breuioribus,
maculis duabus rubris. *Vdm. Diff.* 80.
Hister niger nitidus, elytris singulis macula obscura
rubra. *Degeer Inf.* 4. 343. 2.
Schaeff. Icon. tab. 3. *fig.* 9.
Elem. tab. 24. *fig.* 1.
Voet. Scar. tab. 31. *fig.* 1.
Habitat in Europae stercore bouino.
8. *H. ater*, elytris bimaculatis. *Syst. Ent.* 53. 8. *Linn. 4 macula-*
Syst. Nat. 2. 567. 6. *Fn. Sv.* 443. *tus.*
Scarabaeus ouatus niger glaber maculis duabus rubris
in singulo elytro. *Gad. satag.* 76.
Hister niger nitidus, elytris singulis maculis binis ob-
scure nitidis. *Degeer Inf.* 4. 344. 3.
Schaeff. Elem. tab. 24. *fig.* 2.
Voet. Scar. tab. 31. *fig.* 3.
Habitat in Europa boreali.
Maculae elytrorum interdum cohaerent in unicam lu-
natam.

aeneus. 9. *H. aeneus*, elytris basi striatis apice punctatis. *Syst. Ent.* 53. 9. *

Attelabus nigro cupreus, capite nonnihil prominulo. *Geoff. Inf.* 1. 95. 3.
Habitat in Anglia, Gallia.

detritus. 10. *H. ater nitens*, elytris piceis apice obscuris. *Syst. Ent.* 53. 10. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

8. A P A T E.

murica- 1. *A. elytris reticulatis postice retusis dentatis*, thorace muricato gibbo. *Syst. Ent.* 54. 1. *
tus.

Dermeutes muricatus niger, elytris postice retusis, dentatis, thorace muricato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 562. 6.

Ligniperda terebrans. *Pall. Spicileg. Zoolog.* fasc. IX. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Americae meridionalis lignis.

Mona- 2. *A. elytris obtusis*, thorace gibbo truncato. *Syst. Ent.* 54. 2. *
chus.

Ligniperda cornuta. *Pall. Spicil. Zoolog.* fasc. IX. 8. tab. 1. fig. 4.

Habitat in Americae meridionalis lignis. *Dom. Drury.*

Iesuita. 3. *A. elytris integris variolosis*, thorace antice truncato. *Syst. Ent.* 54. 3. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

capuci- 4. *A. elytris integris nigris*, thorace antice scabro.
nus. Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis *A. minuto* at paullo maior et elytra omnino nigra. Thorax ater antice denticulis eleuatis numerosis. Elytra laevia, nigra, apice retusa.

minutus. 5. *A. niger*, elytris integris piceis, thorace antice scabro. *Syst. Ent.* 54. 4. *
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

9. D E R M E S T E S.

1. *D. niger*, elytris antice cinereis. *Syst. Ent.* 55. 1. *Linn.* *larda-*
Syst. Nat. 2. 561. 1. *Fn. Sv.* 408. *Geoff. Inf.* 1. *rius.*
101. 5.

Scarabaeus antennis clauatis, clavis in annulos diuisis.
Raj. Inf. 107. 1.

Scarabaeus lardi paruus fascia transuersali elytrorum
 nigrofuscum albida. *Frisch. Inf.* 5. 25. tab. 9.

Dermestes niger, elytris antice cinereis nigro puncta-
 tis. *Degeer Inf.* 4. 192, 1. tab. 7. fig. 15.
Schaeff. Elen. tab. 7. fig. 1. 2.
Icon. tab. 42. fig. 3.

Habitat in Europa.

Larua ouata, cinerea, hirsuta degit in animalibus diu
 asseruatis, lardo, carnibus, repositoriis culinariis et
 museis infesta.

Imago scybala inter vorandum ex ano protrudit conca-
 tenata, pendula. Olea et pinguedines expedit reli-
 quis insectis letalia.

Varietatem misit de Hattorf elytris antice ferrugineis;
 vix tamen distincta species videtur.

2. *D. niger*, elytris antice testaceis, abdomine albo. *Syst. carniuo-*
Ent. 55. 2. *

Habitat in noua Hollandia, Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

3. *D. niger*, ore ferrugineo. *Syst. Ent.* 55. 3. * *cadaueri-*
Habitat in Insula St. Helena. Mus. Dom. Banks. *nus.*
 Nimis praecedenti affinis.

4. *D. niger glaber*, pedibus piceis. *macella-*
Habitat in Germania. Dom. de Hattorf. *rius.*
 Statura praecedentium, at totus niger glaber pedibus
 solis piceis.

5. *D. niger*, elytris puncto albo. *Syst. Ent.* 55. 4. *Pellio.*
Dermestes Pellio niger coleopteris punctis albis binis.
Linn. Syst. Nat. 2. 562. 4. *Fn. Sv.* 411. *Geoff. Inf.*
1. 100. 4. Scop. Ent. carn. 37.

Dermestes 2punctatus ouatus niger, elytris singulis
 puncto albo. *Degeer Inf.* 4. 197. 3.

Scara-

Scarabaeus paruus corpore breui fuscō, elytris puncto
albo notatis. *Raj. Inf.* 85. 35.

Scarabaeus lardi, larua brunnea, cauda setosa longiori.
Frisch. Inf. 5. 22. tab. 8.

Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 4.

Habitat in Pellitiis, Lardo.

Elytra colore variant, mox obscuriora, mox dilucidiaria.

Larua oblonga pilosa, cauda setosa.

vndatus. 6. D. oblongus niger, elytris fascia alba linearī duplicita.
Syst. Ent. 56. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 562. 3. *Fn. Sv.* 410.

Dermestes oblongus niger, elytris fascia alba duplicita transuersa vndata. *Degeer Inf.* 4. 199. 5.

Schaeff. Icon. tab. 157. fig. 7. a. b.

Habitat in Europae putridis, suffocatis.

2ogutta- 7. D. oblongus ater, punctis viginti albis. *Syst. Ent.*
tus. 56. 6. *

Dermestes 4punctatus. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 2. fig. 3.
Habitat Halae Saxonum. *Schaller.*

bicolor. 8. D. oblongus niger subtus testaceus, elytris striatis.
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Statura omnino D. murini. Caput nigrum. Thorax niger, glaber margine subtestaceo. Elytra nigra, immaculata, striata. Pedes et abdomen testacea.

vulpinus. 9. D. oblongus laevis niger, thoracis lateribus cinereo villosis, subtus albidus.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis affinis D. carniuoro eiusdemque magnitudinis.
Corpus supra nigrum, capite thoracisque lateribus cinereo tomentosum. Scutellum testaceo villosum.
Elytra glabra, laevia, nigra immaculata. Pectus et abdomen alba. Pedes nigri.

murinus. 10. D. oblongus tomentosus, nigro alboque nebulosus, abdomine niveo. *Syst. Ent.* 56. 7.

Dermestes murinus tomentosus oblongus fuscō cinereo que nebulosus, scutello luteo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 563. 18. *Fn. Sv.* 426. *Geoff. Inf.* 1. 102. 7.

Dermes-

Dermestes nebulosus niger cinereo nebulosus, corpore subtus albido cinerascente, scutello hirsuto rufo. *Degeer Inf.* 4. 197. 2.

Scarabaeus Erucae nigrae glabrae pinguedinis. *Frisch. Inf.* 4. 34. tab. 18.

Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 1. 2.

Voet. Scar. tab. 31. fig. 11.

Habitat in Europa frequens cadaueribus vicitans.

Larua oblonga brunnea, ore atro.

11. D. oblongus, tomentosus fusco cinereoque nebulosus, *tessellatus.* abdomine fusco. *Syst. Ent.* 56. 8. *

Dermestes flaescens pilosus oculis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 100. 8.

Habitat in Angliae, Galliae cadaueribus.

12. D. elongatus ferrugineo fuscus, oculis atris. *Syst. Ent. naualis.* 56. 9. *

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

D. murino quadruplo minor.

13. D. nigro coerulescens, thorace villoso, pedibus nigris, *violaceus.* *Syst. Ent.* 57. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 56. 13. *Fn.* *Sv.* 422.

Dermestes violaceus thorace elytrisque villosis. *Scop. Ent. carn.* 67.

Clerus coeruleus oblongus nigro coeruleus nitidus, elytris punctis excavatis. *Degeer Inf.* 5. 163. 4. tab. 5. fig. 13.

Clerus nigro coeruleus. *Geoff. Inf.* 1. 304. 2.

Scarabaeus antennis clauatis 12. *Raj. Inf.* 100.

Habitat in Europae cadaueribus frequens.

14. D. nigro coerulescens, thorace villoso, pedibus rufis. *rufipes.* Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis affinis D. violaceo et forte eius mera varietas.

Differunt tantum pedibus rufis.

15. D. violaceus, thorace elytrorumque basi rufis. *Syst. ruficollis.* *Ent.* 57. 11. *

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

66 CLASS. I. ELEVTERATA. *Dermestes*.

- fumatus.* 16. *D. oblongus testaceus oculis nigris.* *Syst. Ent.* 57. 12.
Linn. Syst. Nat. 2. 564. 22. *Fn. Sv.* 432. *Geoff. Inf.*
 1. 104. 12.
Dermestes Rosae. *Scop. Ent. carn.* 59.
Ips testaceo flavius, oculis nigris, elytris punctis exca-
uatis. *Degeer Inf.* 4. 195. 3.
Habitat in Europae floribus.
- tomento-* 17. *D. oblongus villosus griseus, capite punctis duobus*
fuscis. *Syst. Ent.* 57. 13. *
Dermestes tomentosus oblongus villosus griseo murinus,
oculis nigris, pedibus fuluis. *Degeer Inf.* 4. 199. 4.
tab. 7. fig. 18.
Habitat in Angliae, Sueciae floribus.
- paniceus.* 18. *D. oblongus ferrugineus, oculis rufis.* *Syst. Ent.* 57.
 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 564. 19. *Fn. Sv.* 431.
Scarabaeus parvus luteus panis. *Frisch. Inf.* 2. 36. *tab. 8.*
Habitat in pane diutius asseruato.
Larua ouata, alba, nitida.
- testaceus.* 19. *D. oblongus testaceus, oculis abdominis basi nigris.*
Syst. Ent. 57. 15. *
Habitat in Belgio.
- scaber.* 20. *D. griseus, thorace elytrisque scabris.* *Syst. Ent.* 57.
 16. *
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
- chinensis.* 21. *D. oblongus ferrugineus, elytris striatis.* *Syst. Ent.*
 58. 17. *
Habitat in feminibus e China allatis.
- scanicus.* 22. *D. ater, thorace punctoque elytrorum testaceis.* *Syst.*
Ent. 58. 18. *
Dermestes scanicus fuscus, thorace testaceo. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 564. 26. *Fn. Sv.* 437.
Habitat in Suecia.
- limbatus.* 23. *D. fuscus, elytris punctatis, limbo cinereo.*
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus parvum, fuscum. Thorax rotundatus antice
parum griseus. Elytra punctata, fusca limbo magno
cinereo. Pedes nigri apice grisei.

24. D. castaneus, capite nigricante, thorace fusco. *Syst. fenestra-*
Ent. 58. 19. *Linn. Syst. Nat.* 2. 563. 15. *Fn. Sv.* 423. *lis.*
Ips spinosus fusco castaneus, pedibus rufis, elytris po-
 stice sex spinosis. *Degeer Inf.* 5. 197. 7.
Byrrhus fenestratus castaneus, elytris punctato striatis,
 oculis nigris. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 57. 505.
 Habitat in Europa boreali, frequens in fenestris.

IO. M E L Y R I S.

1. M. viridis, elytris lineis eleuatis tribus. *Syst. Ent.* *viridis.*
 58. 1. *
 Habitat ad Cap. bon. sp.

2. M. niger, elytris lineis eleuatis tribus. *niger.*
 Habitat - - - *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino praecedentis, at triplo minor. Caput
 sub thorace inflexum, nigrum antennis perfoliatis.
 Thorax submarginatus margine subreflexo, niger
 antice parum prominens. Elytra nigra scabra lineis
 eleuatis tribus. Abdomen et pedes nigra.

II. B O S T R I C H V S.

1. B. niger, elytris abdomineque rubris, thorace emarginato retuso. *Syst. Ent.* 59. 1. *Capuci-*
nus.
Bostrichus niger, elytris rubris. *Geoff. Inf.* 1. 302. 1. tab.
 5. fig. 1.
Schaeff. Elem. tab. 28.
Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 5. 6. c.
Dermeutes capucinus niger, elytris abdomineque rubris,
 thorace emarginato retuso. *Linn. Syst. Nat.* 2. 562.
 5. *Fn. Sv.* 416.
 Habitat in Europae truncis emortuis rarius.
2. B. piceus, elytris apice spinoso-dentatis, antennis fla- *flavicor-*
 uis. *Gen. Inf. Mant.* 211. * *nis.*
 Habitat in America boreali.
3. B. testaceus pilosus, elytris striatis retulis praemorfo *typogra-*
 dentatis. *Syst. Ent.* 59. 2. *phus.*

Dermestes typopraphus testaceus pilosus, elytris stria-
tis retusis praemorso dentatis. *Linn. Syst. Nat. 2.* 562. 7. *Fn. Sv. 418.*

Scarabaeus antennis clauatis. *Raj. Inf. 100.* 10.

Ips pilosus fuscus, elytris postice oblique truncatis den-
tatis. *Degeer Inf. 5.* 193. 1. tab. 6. fig. 1. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 4.

Act. Holm. 14. pag. 163.

Habitat intra cortices truncorum labyrinthos puluere
repletos formans.

Variat colore testaceo et fusco.

calcogra- 4. B. ater, elytris praemorso dentatis rufis. *Syst. Ent.*
phus. 59. 3.

Dermestes calcographus ater, elytris praemorso dentata-
tis rufis, lateribus basique nigricantibus. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 562. 8. *Fn. Sv. 417.*

Habitat intra arborum cortices.

polygra- 5. B. nigricans, elytris glaucis obtusiusculis. *Gen. Inf.*
phus. *Mant. 211.* *

Dermestes polygraphus. *Linn. Syst. Nat. 2.* 562. 10.
Fn. Sv. 420.

Ips rufo fuscus, elytris postice rotundatis. *Degeer*
Inf. 5. 196. 5.

Habitat in Europa boreali sub arborum corticibus.

scolytus. 6. B. glaber, elytris truncatis integris, abdomine retuso.
Syst. Ent. 59. 4. *

Scolytus. *Geoff. Inf. 1.* 310. 1. tab. 5. fig. 5. mal.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 112.

Habitat sub corticibus vimi Angliae, quas misere de-
struct. *Dom. Lee.*

piniper- 7. B. niger subuillosus, elytris piceis integris, plantis ru-
fis. *Syst. Ent. 60.* 5.

Dermestes piniperda niger subuillosus, elytris piceis
integratis, plantis rufis. *Linn. Syst. Nat. 2.* 563. 11.
Fn. Sv. 421.

Ips subuillosus niger nitidus, elytris punctis excavatis,
antennis plantisque rufis. *Degeer Inf. 5.* 194. 2. tab.
6. fig. 8. 9.

Habi-

Habitat in ramulis inferioribus pini, quos perforat, exsiccat, destruit naturae hortulanus. Statura fere curculionis.

8. B. subvillosum, corpore nigro cinereoque vario. *Syst. varius.*
Ent. 60. *
- Habitat in Hafniae arboretis.
- Antennarum clava acuminata.
9. B. elytris integris glaber ater immaculatus. *Gen. Inf. minutus.*
Mant. 211. *
- Habitat Kiliae in boleto vericolore.

12. BYRRHVS.

1. B. fuscus, elytris striis atris interruptis. *Syst. Ent. 60.* *pilula.*
1. *Linn. Syst. Nat. 2.* 568. 4.
Dermestes pilula tomentosus ouatus fusco nebulosus.
Linn. Fn. Sv. 427.
Cistela subvillosa viridescens, fasciis longitudinalibus fuscis interruptis. *Geoff. Inf. 1.* 116. 1. tab. 1. fig. 8.
Dermestes ouatus, supra nigro aeneus, subtus totus niger, elytris fasciis interruptis aeneis. *Degeer Inf. 4.* 213. 9. tab. 7. fig. 23.
Habitat in Europae fabulosis.
Variat colore nigro et fusco, striis tamen semper obscurioribus.
2. B. niger immaculatus. ater.
Cistela nigra nitens glabra. *Geoff. Inf. 1.* 117. 3.
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Statura et magnitudo B. pilulae, at totus ater. Caput et thorax atra, glabra, laevia, obscure nitida. Elytra obsoleta striata.
3. B. niger, thorace aeneo, elytris fuscis, striis tribus abbreviatis viridibus nigro maculatis. *Syst. Ent. 60.* 2. *
Habitat in Anglia captus prope Henly die 28 Iun. *Mus. Dom. Banks.*

aeneus. 4. *B. totus aeneus.* *Syst. Ent.* 60. 3. *

Habitat Upsiloniae.

Scutellum albidum.

13. A N T H R E N V S.

Pimpinel- 1. *A. niger,* clytris fascia alba apice ferrugineus, litura lae. *alba.* *Syst. Ent.* 61. 1. *

Anthrenus squamosus niger, fascia punctisque co-leoptrorum albis, suturis fuscis. *Geoff. Ins.* 1. 114. 1.

Habitat in pimpinellae floribus Galliae.

Scrophu- 2. *A. niger,* elytris albo maculatis, sutura sanguinea. *Syst. lariae.* *Ent.* 61. 2.

Byrrhus Scrophulariae niger, elytris albo maculatis, sutura sanguinea. *Linn. Syst. Nat.* 2. 568. 1.

Dermeutes tomentosus maculatus sutura elytrorum rubra. *Linn. Fn. Sv.* 429.

Scarabaeus parvus corpore subrotundo, collo oblongo, alarum elytris nigris, binis punctis albicantibus notatis. *Raj. Ins.* 85. 37.

Dermeutes ouatus niger, maculis squamosis albis, sutura elytrorum rubra. *Degeer Ins.* 4. 200. 6. tab. 7. fig. 20.

Sulz. Hist. Ins. tab. 2. fig. 11. h.

Bergstraess. Nomencl. 1. tab. 11. fig. 9. 10.

Schaeff. Elem. tab. 17.

Icon. tab. 176. fig. 4.

Habitat in Europae scrophulariis.

museo- 3. *A. nebulosus,* elytris subnebulosis. *Syst. Ent.* 61. 3.

Byrrhus museorum nebulosus, elytris subnebulosis

puncto albo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 568. 2.

Dermeutes tomentosus maculatus, elytris puncto albo. *Linn. Fn. Sv.* 430.

Dermeutes ouatus fuscus obscurus, maculis squamosis griseis. *Degeer Ins.* 4. 203. 7. tab. 8. fig. 11. 12.

Habitat in museis, animalia asseruata destruens.

Verbasci. 4. *A. niger,* elytris fasciis tribus vndatis albis. *Syst. Ent.* 61. 4.

Anthreus, squamosus niger, elytris fuscis, fascia tripli vndulata alba. *Geoff. Inf.* 1. 115. 2.

Byrrhus Verbasci fuscus, elytris fasciis tribus vndulatis pallidis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 568. 3.

Bergstræff. Nomencl. 1. tab. 11. fig. 11, 12.

Habitat in Verbasco Galliae.

14. A N O B I V M.

1. A. fuscum immaculatum. *Syst. Ent.* 62. 1. *pertinax.*
Ptinus pertinax fuscus vnicolor. *Linn. Syst. Nat.* 2.
 565. 2.
Byrrhus totus nigro fuscus. *Geoff. Inf.* 1. 112. 4.
Dermestes pertinax. *Linn. Fn. Sv.* 414.
Byrrhus nigro fuseus, elytris striatis, thorace ad angulos macula fulua. *Degeer Inf.* 4. 227. 1. tab. 8. fig. 24. 25.
 Habitat in Europa frequens. Destruit e ligno confecta in primis quercino. Deuoratur a Clero formicario. Captum se contrahit immobile.

2. A. testaceum, oculis nigris. *Syst. Ent.* 62. 2. *molle.*
Ptinus mollis testaceus, oculis fuscis. *Linn. Syst. Nat.*
 2. 565. 3.
Byrrhus testaceus glaber, oculis nigris. *Geoff. Inf.* 1.
 112. 2.
Byrrhus rufo fuscus, oculis nigris, elytrorum apice rufo. *Degeer Inf.* 4. 230. 4. tab. 8. fig. 29.
Dermestes mollis. *Linn. Fn. Sv.* 415.
 Habitat in Europae quisquiliis.

3. A. testaceum, thorace ciliato, dorso plano carinato. *frumentarium.*
Syst. Ent. 62. 3. *
 Habitat in pane diutius asseruato, captum in naue prope Brasiliam. *Mus. Dom. Banks.*

4. A. villosum nigrum, antennis pedibusque testaceis. *flavipes.*
Gen. Inf. Mant. 212. *
 Habitat Hamburgi. *D. Schulz.*

5. A. pilosum nigrum, elytris molliusculis. *Syst. Ent. nigrum.*
 62. 4.
Derme-

Dermestes niger oblongus pilosus niger, elytris molliusculis. Linn. Syst. Nat. 2. 564. 28. Fn. Sv. 439.
Cantharis pilosa nigra longis pilis ubique pubescens, antennis extrosum crassioribus. Scop. Ent. carn. 131.
 Habitat in Europae floribus.

lineatum. 6. A. pilosum nigrum, elytris lineis sesquitertiis rufis.
 Syst. Ent. 62. 5. *

Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.
 Statura exacte praecedentis.

cyanum. 7. A. subuillosum cyaneum, antennis nigris. Syst. Ent. 63. 6.

Habitat in Europa australiori.

Statura et magnitudo omnino A. nigri.

minutum. 8. A. subuillosum nigrum, thorace elytrisque cyaneis.

Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.

Statura omnino A. cyanei, at duplo minus et corpus nigrum.

Variat rarius elytris virescentibus.

15. P T I N V S.

Gigas. 1. P. griseis, elytris postice cinereis. Syst. Ent. 63. 1. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

De genere adhuc haereo.

germanus. 2. P. fuscus, thorace quadridentato, elytris villoso cinereo variis.

Ptinus germanus fuscus, thorace transuersim rugoso, pedibus ferrugineis. Linn. Syst. Nat. 2. 566. 6.

Habitat in Europa, Anglia.

Maior P. fure, cui affinis. Thorax eleuatus fuscus dentibus quatuor. Elytra villoso, fusca, cinereo varia. Pedes ferruginei.

longicornis. 3. P. ater nitidus, pedibus flaucentibus,

Habitat in Germania. Dom. de Hattorf.

Magnitudo Pt. furis. Antennae filiformes corpore longiores. Corpus atrum, nitidum, inumaculatum. Pedes flavi plantis nigris.

4. P. testaceus, thorace quadridentato, elytris fasciis duabus albis. *Syst. Ent.* 63. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 566. 2. *Fur.*

Bruchus testaceus, elytrorum fascia duplice alba. *Geoff. Inf.* 1. 164. 4. tab. 2. fig. 6. mal.

Byrrhus rapax ouatus rufo fuscus, albedine maculatus, thorace angulato, villis flavis, antennis longitudine corporis. *Degeer Inf.* 4. 231. 5. tab. 9. fig. 5. 6.

Buprestis Fur. Scop. Ent. carn. 210.

Cerambyx Fur. Linn. Fn. Sv. 651.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 8.

Schaeff. Elem. tab. 30.

Frisch. Inf. 13. tab. 15.

Habitat in semenibus, in museis pessimus, destruens herbaria, insecta, aues, vix pellendus.

Larua hexapoda obesa mollis pilosa segmentis dorsibus prominulis.

Pupa intra globum glutinosum.

Mas alatus, femina aptera.

5. P. fuscus, thorace subcarinato, coleoptris macula alba imperialis aquilam expansam referente. *Syst. Ent.* 63. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 565. 4. *Fur.*

Bruchus imperialis subouatus cinereus, elytris fuscis, macula futurae alba pennata. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 57. 507.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 7.

Habitat in Europae borealis arboribus.

6. P. thorace bidentato testaceus immaculatus. *Syst. Ent. Latro.* 63. 4. * *Fur.*

Habitat Strasburgi. *Mus. Dom. Prof. Hermann.*

7. P. thorace quadriseptato villoso, albido, elytris con- sulcatus. natis fusco testaceis nitidis.

Habitat in plantis siccis ex Insulis Canariis missis.

Animalculum singulare, at hoc genus evincunt statura, antennae, palpi, elytra connata, vinctus. Corpus P. Fure minus. Antennae porrectae longitudine corporis filiformis, albae. Caput paruum, sub thorace absconditum, pallidum. Thorax albido sulcis quatuor

profundis exaratus. Elytra gibba, laeuiissima, conata, nitida, obscure testacea, immaculata. Pedes albi.

Scotias. 8. P. thorace lacui piceo, elytris connatis fuso testaceis nitidis.

Scotias psylloides. Czenpinski *Dissert.* 51. 155.

Bruchus totus testaceus, elytris coadunatis. Geoff. *Inf.* 1. 164. 2.

Gibbiun. Scopol. *Introd. ad histor. natur.* 505.?

Habitat in aedibus Europae australioris. *Mus. Dom.* Banks.

Statura omnino praecedentis, paullo maior. Antennae porrectae albo villosae. Caput paruum reconditum, eum thorace glabrum, laeve, piceum. Elytra conata, laevia, nitida, obscure testacea, immaculata. Pedes villoso albidi.

16. B R V C H V S.

spinosus. 1. B. griseus, thorace elytrisque spinosis. *Syst. Ent.* 64. 1. *

Habitat in Iamaica. *Dom. Drury.*

Gigas in hoc genere.

Pisi. 2. B. elytris nigris albo maculatis, podice albo, punctis binis nigris. *Syst. Ent.* 64. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 604. 1. *Mus. Lud. Vlr.* 35.

Mylabris fusca cinereo nebulosa, abdominis apice cruce alba. *Geoff. Inf.* 1. 267. 1. tab. 4. fig. 9.

Bruchus nigro fuscus, maculis villosis sparsis albescen-tibus, abdominis apice albo maculis binis nigris. *Deger Inf.* 5. 278. 1. tab. 16. fig. 3. 4.

Bruchus Americae septentrionalis. *Kalm. It.* 294.

Curculio Pisorum. *Linn. Amoen. acad.* 3. 347.

Laria Salicis. *Scop. Ent. carn.* 63.

Ledermüller Microsc. tab. 99. fig. 2.

Habitat in America septentrionali, nuperrime in Europa australi incepit. Victitat Pisis, deuoratur a *Gracula Quiscula.*

2. B.

3. B. griseo nitidulus, elytris vix abdomine brevioribus. *Robiniae.*
 Habitat in Robiniae pseudacaciae, Americae seminibus.
Mus. Dom. Banks.
 Magnus in hoc genere. Corpus totum villis griseis nitidulum. Abdomen minus quam in reliquis prominet.
4. B. thorace gibbose cupreо, elytris nigris tuberculato gibbosus.
 spinosis. *Gen. Inf. Mant.* 212. *
 Habitat in America boreali.
5. B. niger, elytris rufis eleuato striatis, punctis nigris scabrosus.
 sparsis. *Syst. Ent.* 64. 3. *
 Habitat in Anglia. *Mus. Britann.*
6. B. corpore fusco griseo maculato. *Syst. Ent.* 64. 4. * *Cacao.*
 Habitat in Theobromae seminibus.
7. B. elytris griseis nigro maculatis, pedibus rufis, scutello albo. *Syst. Ent.* 65. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. *Theobroma.*
 mae. 605. 2.
 Habitat in Theobromae seminibus.
8. B. niger, elytris cinereis, maculis tribus nigris marginatae connexis. *Gen. Inf. Mant.* 212. * *marginalis.*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
9. B. subferrugineus, elytris apice atris, anō atro, linea analis.
 media alba.
 Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus paruum. Caput testaceum supra tomento cincinneto subvillosum. Thorax ferrugineus macula baseos alba. Elytra striata ferruginea apice late atra et ante apicem macula atra, quae cum apice iungitur. Abdomen ferrugineum ano prominente atro linea media alba.
10. B. cinereus, elytris fuscis, puncto baseos ocellari atro. *Bruchus punctatus. Sulz. Hist. Inf.* tab. 4. fig. 2. *tus.*
 Habitat in Heluetiae plantis.
 Distinctus puncto magno ocellari nigro iride flava ad basin elytrorum.

grana- 11. B. elytris nigris, atomis albis, femoribus posticis vni-
rius. dentatis. *Syst. Ent.* 65. 6. *

Bruchus granarius elytris nigris, atomis albis, pedi-
bus anticis rufis, posticis dentatis. *Linn. Syst. Nat.*
2. 605. 5.

Curculio atomarius. *Linn. Fu. Sv.* 628.
Habitat in seminibus plantarum.

Cisti. 12. B. ater immaculatus, femoribus muticis. *Syst. Ent.*
65. 7. *

Habitat in floribus *Cisti Helianthemi* frequens. *Mus.*
Dom. Banks.

abdomi- 13. B. niger, abdomine cinereo immaculato, pedibus an-
nalis. ticeis testaceis.

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Paruus. Caput et thorax nigra lateribus cinereo villo-
sis. Elytra striata, nigra, immaculata. Abdomen
cinereo villosum, immaculatum. Pedes quatuor an-
tici testacei.

semina- 14. B. ater, antennarum basi pedibusque anticis testaceis,
rius. femoribus muticis. *Syst. Ent.* 65. 8. *

Bruchus seminarius ater, antennarum basi pedibusque
anticis testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 605. 6.

Mylabris nigra, abdome albo sericeo. *Geoff. Ins.*
1. 268. 3.

Habitat in floribus, captus d. 28. Jun. prope Henly An-
glorum.

Pedes antici testacei.

macula- 15. B. elytris punctatis testaceis nigro maculatis, podice
tus. griseo, punctis binis nigris. *Syst. Ent.* 659. *

Habitat in Americae seminibus. *Dom. v. Rohr.*

Mimosae. 16. B. testaceus immaculatus, elytris substriatis, femoribus
posticis acute dentatis.

Habitat in *Mimosae* seminibus Americae meridionalis.
Dom. Lund.

Paullo maior B. seminario. Corpus supra mox obscu-
rius, mox dilutius testaceum, immaculatum. Ely-
tra

tra substriata, glabra. Subtus magis cinerascens. Femora postica acute dentata.

17. B. antennis pectinatis corpore longioribus, corpore griseo fusco maculato. *Syst. Ent.* 65. 10. *serraticornis.*
Habitat in Oriente. *Dom. Prof. Forskahl.*
18. B. antennis pectinatis corpore ferrugineo longioribus. *Syst. Ent.* 66. 11. *pectinicornis.*

Bruchus pectinicornis antennis pectinatis corpore longioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 605. 7.

Bruchus rufus rufo fuscus, elytris pedibusque rufis, corpore griseo maculato, antennis ferratis. *Degeer Inf.* 5. 201. 2.

Schaeff. Elem. tab. 86. fig. 1.

Habitat in seminibus e China allatis.

17. E L O P H O R V S.

1. E. fuscus, thorace rugoso elytrisque fusco aeneis. *Syst. Ent.* 66. 1. *aquaticus.*

Silpha aquatica cinerea, elytris substriatis, thorace emarginato longitudinaliter rugoso virescente. *Linn. Syst. Nat.* 2. 573. 25.

Dermetes viridi aeneus, thorace fasciis quatuor cleavatis, elytris punctato striatis. *Geoff. Inf.* 1. 105. 15.

Hydrophilus aeneus viridi aeneus, thorace virescente sulcato, elytris punctato striatis, antennis pedibusque rufis. *Degeer Inf.* 4. 379. 5. tab. 15. fig. 5. 6.

Habitat frequens in Europae aquis stagnantibus.

2. E. griseus, thorace elytrisque sulcato rugosis. *Gen. nubilus.*
Inf. Mant. pag. 213. *

Habitat Hamburgi. *Dr. Schulz.*

3. E. fuscus, thorace rugoso aeneo, elytris pallidis. *Syst. minutus.*
Ent. 66. 2. *

Habitat in Angliae aquis stagnantibus.

Affinis E. aquatico, at triplo minor.

18. SPHAE-

18. SPHAERIDIVM.

- scarabae-* 1. *S. ouatum atrum*, elytris maculis duabus ferrugineis.
oides. *Syst. Ent.* 66. 1.
Dermestes scarabaeoides ouatus ater glaber, elytris
 maculis duabus obsolete ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.*
 2. 563. 17. *Fn. Sv.* 428.
Dermestes niger, coleoptris punctis rubris quaternis,
 elytris lacuibus subrotundis. *Geoff. Inf.* 1. 106. 17.
Scarabaeus ouatus, niger, glaber maculis duabus ru-
 bris in singulo elytro. *Gad. Satag.* 67.
Hister testudinarius ouatus niger glaber, pedibus
 fuscis, elytris antice macula rubra postice fulua. *De-
 geer Inf.* 4. 345. tab. 12. fig. 17.
Scop. Ent. carn. 36.
 Habitat in Europae borealis stercore frequens.
- pustula-* 2. *S. atrum nitidum*, elytris macula apicis rubra, pedibus
tum. piceis.
 Habitat Kiliae in stercoribus.
 Affine praecedenti, at minus.
- dytiscoi-* 3. *S. ferrugineum*, elytris atris. *Syst. Ent.* 67. 2. *
des. Habitat in Insula St. Helena. *Mus. Dom. Banks.*
- glabra-* 4. *S. atrum*, antennis pedibusque rufis, elytris laeuis.
tum. Habitat in Madera Insula. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino praecedentium, at paullo minus. Cor-
 pus totum atrum, laeve, nitidum antennis pedibus-
 que ferrugineis.
- atoma-* 5. *S. laeve atrum*, elytris crenato striatis, pedibus palli-
 dis. *Syst. Ent.* 67. 3. *
Silpha atomaria nigra subouata, elytris immarginatis,
 pedibus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 574. 35.
Dermestes niger subrotundus, elytris striatis. *Geoff.*
Inf. 1. 117. 19.
 Habitat in Europae stercoribus.
- melanoce-* 6. *S. atrum glabrum*, elytris griseis, macula communis
phalum. baseos nigra. *Syst. Ent.* 67. 4. *
Derme-

Dermestes melanocephalus niger ouatus glaber, elytris griseis. Linn. Syst. Nat. 2. 563. 16. Fn. Sv. 425.
Habitat in Europae stercore frequens.

7. *S. atrum*, elytris apice rufus, pedibus nigris. Syst. Ent. haemorrhoidale.
67. 5. *

Anthribus niger ouatus, elytris apice punctis duobus rubris. Geoff. Inf. 1. 308. 5.

Habitat in Europae stercore bouino. Mus. Dom. Banks.

8. *S. atrum nitidum*, thoracis margine elytrorumque macula sanguineis. Syst. Ent. 67. 6. * pustulatum.

Habitat in noua Hollandia.

9. *S. atrum immaculatum*, elytris lacuissimis. Syst. Ent. fimbriatum.
68. 7. *

Habitat in Angliae stercore. Mus. Dom. Banks.

10. *S. atrum*, abdomine pedibusque rufis.

Silpha seminulum ouata atra nitida immaculata, abdome rubro. Linn. Syst. Nat. 2. 570. 8. Fn. Sv. 447.

Habitat in Europae hortis, floribus.

Parua, distincta abdomine pedibusque rufis.

seminulum.

11. *S. atrum*, elytris striatis, pedibus concoloribus. Syst. minutum.
Ent. 68. 8. *

Habitat in Anglia. Mus. Dom. Banks.

12. *S. nigrum oblongum*, elytris abbreviatis, abdomine acuto. Syst. Ent. 68. 9. pulicarium.

Silpha pulicaria nigra oblonga, elytris abbreviatis, abdome acuto. Linn. Syst. Nat. 2. 574. 33.

Dermestes pulicarius oblongus niger, elytris abbreviatis, abdomine acuto, Linn. Syst. Nat. 2. 564. 24. Fn. Sv. 370.

Anthribus niger, elytris abdomine brevioribus. Geoff. Inf. 1. 308. 4.

Scarabaeus antennis clauatis, clavis in annulos diuisis. Raj. Inf. 108. 29.

Habitat in Europae floribus frequens, cursitans.

19. TRITOMA.

- 2puftula*- 1. *T. atra*, elytris macula laterali coccinea. *Syst. Ent.*
ta. 68. 1. *
- Tritoma*. *Geoff. Inf.* 1. 335. 1. tab. 6. fig. 2. ?
 Habitat in Boletis arboreis Angliae, capt. d. 17. Aprilis
 ad Hamstead.
- rufipes*. 2. *T. atra*, capite thorace pedibusque ferrugineis.
 Habitat in Norwegiae fungis arboreis, capt. d. 15. Iun.
 prope Swinesund.
 Statura et magnitudo praecedentis tota glabra nitida.
 Antennae breues, perfoliatae, nigrae. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra et abdomen atra, nitida laevissima. Pedes rufi.
 Varietatem simillimam, at duplo maiorem e Germania misit. *Dom. de Hattorf.*
- dubia*. 3. *T. nigra*, elytris pedibus testaceis. *Gen. Inf. Mant.* 213.
 Habitat Kiliae Holsatorum. *Dom. Lund.*
 De genere adhuc haereo.
- collaris*. 4. *T. nigra*, thoracis lateribus abdomeque rufis. *Syst.*
Ent. 69. 2. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

20. IPS.

- fasciata*. 1. *I. atra*, elytris fasciis duabus rufis, anteriori nigro maculata. *Gen. Inf. Mant.* 213. *
 Habitat in America boreali.
- 4puftula*- 2. *I. oblonga nigra*, elytris punctis duobus ferrugineis.
ta. *Gén. Inf. Mant.* 213. *
Tritoma 4puftulata. *Syst. Ent.* 69. 3.
Silpha 4puftulata oblonga nigra, elytris punctis duobus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 570. 5. *Fn.*
Sv. 446.
Silpha nigra oblonga depressa, elytris singulis maculis duabus rubris. *Deger Inf.* 4. 185. 12. tab. 6. fig.
 20. 21.

Derme.

Dermestes niger, coleoptris punctis rubris quaternis,
elytris striatis, oblongus. *Geoff. Inf.* 1. 106. 16?

Scarabaeus parvus luteo maculatus, erucae lanigerae.
Frisch. Inf. 9. 36. tab. 19.

Habitat in Europae ligno putrescente.

Larua oblonga, hirsuta grisea.

Varietatem quadruplo maiorem ex America boreali habui, vix tamen distinctam.

De Synonymo *Geoffr.* dubito, quum in nostris elytra semper laevissima.

3. I. picea, elytris nigris, basi fasciaque postica ferrugineis. *Gen. Inf. Mant.* 214. *

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Minor I. 4pustulata.

4. I. oblonga nitida atra, elytris maculis duabus albis, 4guttata. anteriore sinuata. *Gen. Inf. Mant.* 214. *

Habitat Kiliae Holsatorum. *Dom. de Scheftedt.*

5. I. oblonga nigra, thorace rugoso, elytris striato crenata. natis, maculis duabus rubris. *Gen. Inf. Mant.* 214.

Tritoma crenata. *Syst. Ent.* 69. 4. *

Habitat in Suecia.

Quadruplo minor I. quadripustulata et distincta.

6. I. oblonga glabra atra, fronte pedibus maculisque duabus elytrorum ferrugineis. *Gen. Inf. Mant.* 214.

Tritoma rufifrons. *Syst. Ent.* 69. 5. *

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

21. HISPA.

1. H. antennis pectinatis, elytris testaceis albo punctatis. *mystacea*. *Syst. Ent.* 70. 1. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Gigas in hoc genere.

2. H. antennis pectinatis, elytris laeuis atris. *flabellicornis*. *Syst. Ent.* 70. 2. *

Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*

- pectini-* 3. H. antennis pectinatis fusca, pedibus luteis. *Syst. Ent.*
cornis. 70. 3.
Ptinus pectinicornis fuscus, antennis luteis pectinatis.
Linn. Syst. Nat. 2. 565. 1.
Dermestes pectinicornis. *Fn. Sv.* 412.
Ptilinus atro fuscus, thorace conuexo, pedibus anten-
nisque pallidis. *Geoff. Inf.* 1. 65. 2.
Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 6.
Habitat in Europae quisquiliis, in Corylo. *Prof. Her-
mann.*
- bicornis.* 4. H. ? antennis pectinatis, thorace elytrisque viridi ac-
neis, capite bicorni. *Gen. Inf. Mant.* 215. *
Habitat in America boreali. *Dom. Teats.*
De genere adhuc dubium.
- cornige-* 5. H. antennis ferratis, thorace rufo, elytris coeruleis,
ra. capite bicorni.
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
Forte proprii generis. Antennae fere totae perfolia-
tae simillimae Diaperis *Geoffroy nigrae* basi ferrugi-
neae. Caput nigrum, obicurum, antice emarginata
tum basi cornubus duobus, erectis, validis, atris.
Thorax laevis, rufus, nitidus. Elytra striata, coe-
rulea. Abdomen nigrum. Pedes ferruginei.
- hirta.* 6. H. antennis ferratis atra hirta. *Syst. Ent.* 70. 4. *
Dermestes hirtus ater hirtus. *Linn. Syst. Nat.* 2.
563. 14.
Habitat in Europae australioris tritico.
- coerulea.* 7. H. antennis subserratis coerulea hirta. *Syst. Ent.*
70. 5. *
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
- apustula-* 8. H. antennis ferratis atra hirta, elytris macula baseos
ta. rufa.
Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
Minor H. hirta. Corpus atrum, nitidum, pilis erectis
nigris. Macula magna marginalis, rufa ad basin
elytrorum.

CLASS. I. ELEVTERATA. *Nicrophorus.* 83

9. *H. antennis pilosis nigra, elytris striatis.* *Syst. Ent.* *mutica.*
71. 6.
Hispa mutica inermis, antennis pilosis. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 604. 4.
Tenebrio hirticornis alatus niger, capite depresso, an-
tennis pilosis, thorace bicarinato, elytris punctato
striatis. *Degeer Inf.* 5. 47. tab. 3. fig. 1.
Dermestes clavicornis niger, antennis clavatis pilosis,
Linn. Fn. Sv. 413.
 Habitat in Europa quisquiliis, museis.
10. *H. antennis fusiformibus, thorace elytrisque spinosis, atra.*
corpo atro. *Syst. Ent.* 71. 7.
Hispa atra corpore toto atro. *Linn. Syst. Nat.* 2.
603. 1.
Hispa atra. *Act. Soc. Berol.* 4. tab. 7. fig. 6.
Croceris atra spinis horrida. *Geoff. Inf.* 1. 243. 7.
 Habitat in Europa australi ad radices graminum.
11. *H. antennis fusiformibus, corpore testaceo, antennis testacea-*
aculeisque nigris. *Syst. Ent.* 71. 8. *Linn. Syst. Nat.*
2. 603. 2.
 Habitat in Africā.
 Aculei elytrorum sparsi, nigri.
12. *H. antennis fusiformibus, thorace elytrorumque basi sanguini-*
rufis, elytris ferratis. *Syst. Ent.* 71. 9. * *collis.*
Hispa sanguinicollis inermis atra, thorace sanguineo.
Linn. Mantiss. 530.
 Habitat in America meridionali.
 Variat rarius elytris et basi nigris.

22 N I C R O P H O R V S.

- i. *N. ater, thorace obrotundo inaequali.* *Syst. Ent.* 71. i. *germani-*
Silpha germanica oblonga atra, clypeo obrotundo in-
aequali marginato, elytris obtusissimis, margine la-
terali ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 569. 12.
Silpha tota atra elytris truncatis abdome breuiori-
bus. *Degeer Inf.* 4. 173. 2. tab. 6. fig. 4.
Dermestes thorace marginato, elytris abscessis, totus ni-
ger. *Geoff. Inf.* 1. 99. 2.

Scarabaeus antennis clauatis, clavis in annulos diuisis. *Raj. Inf.* 107. 1.

Scarabaeus maiusculus ex toto niger. List. 381.

Pollinctor niger. Voet. Scar. tab. 30. fig. 4. 5.

Sulz. Inf. tab. 2. fig. 10.

Habitat in Germania, cadavera ouo in praegnata sepeliens.

Varietates vidi plures maiores uno alteroue puncto elytrorum ferrugineo, vix tamen distinctas credo.

Conf. Silpha speciosa Naturf. 6. tab. 4.

Silpha humator. Bergstr. I. tab. 10. fig. 9. vix distinctae.

Vespillo. 2. N. ater, elytris fascia dupli ferruginea. *Syst. Ent.* 72. 2.

Silpha Vespillo oblonga atra, clypeo orbiculato inaequali, elytris fascia dupli ferruginea. Linn. Syst. Nat. 2. 569. 2. *Fn. Sv.* 444.

Silpha nigra elytris truncatis ab domine breuioribus, fascia lata dupli ferruginea transuersa vndata. Degeer Inf. 4. 168. 1. tab. 6. fig. 1.

Dermeutes thorace marginato, elytris abscissis nigris, fasciis duabus transuersis vndulatis luteis. Geoff. Inf. 1. 98. 1. tab. 1. fig. 5.

Scarabaeus foetidus primus. Raj. Inf. 106.

Scarabaeus maiusculus niger, duabus luteis fasciis vndulatis transuersim ductis supra alarum thecas. List. Loqu. 381. 2.

Scarabaeus Moschi odore. Frisch. 12. 28. tab. 3. fig. 2.

Cantharis tertius. Mouf. Inf. 149. fig. 1.

Pollinctor vulgaris. Voet. Scarab. tab. 30. fig. 1. 2. 3.

Vespillo. Roef. Inf. 4. tab. 1. fig. 1. 2.

Bergstr. Nomencl. 1. 10. 14. tab. 1. fig. 14.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 4.

Pet. Gazoph. tab. 13. fig. 6.

Habitat in Europa, America, cadavera ouo in praegnata sepeliens.

Moschum spirat, oculis volitat elytris erectis approximatis. Acaris infestatur.

Varietates in primis magnitudinis et Americanas et Europeas vidi plures, at vix distingui merentur.

23. S I L P H A.

1. *S. atra*, elytris fascia postica flava, femoribus posticis *suri-*
dentatis. Syst. Ent. 72. 1. *menfis.*
Habitat in America meridionali.
2. *S. atra*, elytris laeuis, lineis elevatis tribus, thorace *littoralis.*
orbiculato nitido. Syst. Ent. 72. 2. Linn. Syst. Nat.
2. 570. 11. Fn. Sv. 450.
Silpha rufo clavata oblonga nigra, thorace orbiculato
- nitido, elytris lineis elevatis tribus, clava antennarum rufa. Degener Inf. 4. 176. 4.
*Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis, prima et se-
cunda gibbositate connexis, thorace laeui. Geoff. Inf.
1. 120. 3.
Bergstræss. Nomencl. 1. 24. 6. tab. 3. fig. 6.
Scarabaeus campestris. Frisch. Inf. 6. 12. tab. 5.
Silpha littoralis. Scop. Ent. 55.
Habitat in Europæ cadaueribus.
Larua ouata, depresso-fusca, voracissima.
*Conf. *Silpha clavipes* femoribus posticis incurvis cras-
fissimis. Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 14. Bergstr.
*Nomencl. 1. tab. 11. fig. 3. an distincta species?***
3. *S. nigra*, elytris fasciis duabus ferrugineis, thorace *indica.*
antice bidentato. Syst. Ent. 73. 3. Linn. Syst. Nat.
2. 570. 6. Mus. Lud. Vlr. 38.
Habitat in India.
4. *S. depressa nigra*, thorace flavo, centro nigro. *Syst. america-
*na. Ent. 73. 4. ***
- Silpha americana ouata fusca, clypeo flavo, centro ni-
gro intra annulum fuluum. Linn. Syst. Nat. 2.
570. 7.
Blatta americana. Catesby Car. 3. tab. 10. fig. 5.
Seligm. Av. 4. tab. 108. fig. 7.
*Habitat in Americae cadaueribus.**
5. *S. oblonga rufa*, antennis, elytris pectoreque nigris. *russica.*
Syst. Ent. 73. 5. Linn. Syst. Nat. 2. 570. 10. Fn. Sv.
449.

Anthribus ruber ouato oblongus ruber nitidus, anten-
nis elytrisque nigris nitidis. *Degeer Inf.* 5. 283. 1.
tab. 8. fig. 12.

Dermestes elytris nigris, capite clypeo et abdomine ni-
gro. *Vdm. Diff.* 7.

Habitat in Europa boreali.

thoracica. 6. *S. nigra*, elytris linea eleuata vnica, thorace testaceo,
Syst. Ent. 73. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 571. 13. *Fn. Sv.*
452. *Stroem. Att. Nidros.* 3. tab. 6. fig. 1.

Silpha nigra thorace ferrugineo, elytris lineis tribus
longitudinalibus, vnica eleuata. *Degeer Inf.* 4. 174.
3. tab. 6. fig. 7.

Peltis nigra, lineis tribus eleuatis acutis, thorace te-
staceo. *Geoff. Inf.* 1. 121. 6.

Scarabaeus primo similis parum canaliculatus scapulis
croceis. *Raj. Inf.* 90. 10.

Cassida nigra, clypeo latissimo pallide rufo, macula la-
ta nigra nitida. *Gadd. Satag.* 25.

Silpha thoracea. *Scop. carn.* 54.

Bergstr. Nomencl. 1. 23. 5. tab. 3, fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 4.

Sulz. Inf. tab. 2, fig. 12.

Habitat in Europae cadaueribus.

laeuicola. 7. *S. gibba nigra*, elytris rugosis, lineis eleuatis tribus,
lis, thorace laeui emarginato. *Syst. Ent.* 73. 7. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

margina 8. *S. atra*, thoracis marginē pallido, elytris fuscis. *Gen.*
lis, *Inf. Mant.* 215. *

Silpha noveboracensis. *Forst. Cent. Inf.* 1. 17. 17.
Habitat in America boreali.

rugosa, 9. *S. nigricans*, elytris rugosis, lineis eleuatis tribus,
thorace rugoso postice sinuato. *Syst. Ent.* 74. 8.
Linn. Syst. Nat. 2. 571. 16. *Fn. Sv.* 455. *Scopol.*
carn. 53.

Silpha nigra opaca, elytris tuberculatis lineis tribus
eleuatis inaequalibus. *Degeer Inf.* 4. 182. 7.

Tenebrio rugosus alatus niger, corpore ouato, thorace
rugoso, elytris tuberculatis sebris. *Degeer Inf.* 5. 43.
5. tab. 2. fig. 21.

Bergstr.

Bergstr. Nomencl. 1. 23. 4. tab. 3. fig. 4.

Peltis nigra, elytris lineis eleuatis tribus acutis, spatio interiecto veluti complicato, thorace scabro. *Geoff. Inf.* 1. 120. 4.

Scarabaeus inter cadauera frequens. *Raj. Inf.* 90. 9.

Habitat in Europa frequentissime, cadauera, pices, carnes consumens.

Capta humorem foetidissimum euomit.

Conf. S. pellaeocephalos. *Bergstr. Nomencl.* tab. 9. fig. 8.

10. *S. atra*, elytris punctatis, lineis eleuatis tribus laeui-
bus, thorace integro. *Syst. Ent.* 74. 9. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 571. 12. *Fn. Sv.* 451.

Silpha punctata nigra nitida, elytris punctatis, lineis eleuatis tribus laeuibus, clava antennarum nigra. *Degeer Inf.* 4. 177. 5. tab. 6. fig. 15.

Peltis nigra, elytris lineis tribus eleuatis, spatio inter-
iecto punctato, thorace laeui. *Geoff. Inf.* 1. 118. 1.
Schaeff. Elem. tab. 96. fig. 1.

Icon. tab. 93. fig. 5.

Habitat in Europae agris et viis frequens.

11. *S. atra*, elytris laeuibus, lineis eleuatis tribus, thora-
ce inaequali emarginato. *inæqua-*
lis.

Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*
Affinis praecedentibus. Thorax antice late emarginatus haud punctatus, at lineis eleuatis irregularibus, eleuatis inaequalis. Elytra valde marginata vix punctata lineis eleuatis tribus, quarum exterior abbreviata,

12. *S. atra*, elytris punctatis, lineis eleuatis tribus laeui-
bus, thorace transuerso emarginato. *Gen. Inf. Mant.*
215. *

Habitat in Austria, *Dr. Schulz.*

13. *S. atra*, elytris laeuibus subpunctatis. *Syst. Ent.* 74. 10. *laeuigata.*

Peltis nigra tota, elytris laeuibus, punctis minimis excauatis. *Geoff. Inf.* 1. 122. 8.

Silpha polita. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 2. fig. 16.

Habitat in Europae syluis.

- obscura*. 14. S. nigra, elytris punctatis, lineis eleuatis tribus, thorace antice truncato. *Syst. Ent.* 74. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 572. 18. *Fn. Sv.* 457. *Scop. carn.* 57.
Cassida ouata nigra, lineis tribus eleuatis, media longissima. *Vdm. Diff.* 8.
 Habitat in Europa boreali rarius.
- opaca*. 15. S. fusca, elytris concoloribus, lineis eleuatis subternis, thorace antice truncato. *Syst. Ent.* 74. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 571. 15. *Fn. Sv.* 454.
Peltis opaca nigra supra murina tomentosa, clypeo truncato, elytris lineis binis eleuatis subternis, vngibus rubris. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 63. 585.
Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 6.
 Habitat in Europae viis.
- sinuata*. 16. S. thorace emarginato scabro, elytris lineis eleuatis tribus apice sinuatis. *Syst. Ent.* 75. 13. *
Peltis nigra, elytris lineis tribus eleuatis, spatio interiecto minutissime punctato, thorace scabro. *Geoff. Inf.* 1. 119. 2.
Silpha appendiculata. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 2. fig. 15.
 Habitat in Anglia.
- 4punctata*. 17. S. nigra, elytris pallidis, puncto baseos medioque nigro, thorace emarginato. *Syst. Ent.* 75. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 571. 14.
Silpha 4punctata nigra, elytris exalbidis, maculis quatuor nigris. *Schreb. Inf.* 2. fig. 5.
Silpha corpore nigro, thorace testaceo, macula magna nigra, elytris flavo testaceis, punctis duobus nigris. *Degeer Inf.* 4. 181. 6.
Silpha flauicans. *Lepech. Itin.* 1. 202. tab. 16. fig. 4.
Peltis nigra, thorace elytrisque testaceis, thoracis macula coleoptrorumque punctis quinque nigris. *Geoff. Inf.* 1. 122. 7.
 Habitat frequens in Quercu Angliae.
- pedemontana*. 18. S. testacea, antennis apice nigris. *Syst. Ent.* 75. 15. *
Peltis tota testacea. *Geoff. Inf.* 1. 123. 9.
 Habitat in agris Pedemontanis. *Dr. Allioni.*

19. *S. ferruginea*, elytris lineis eleuatis liminis, thorace emarginato capite latiore. *Syst. Ent.* 75. 16. *Linn. Syst.* *ferruginea*.
Nat. 2. 572. 19. *Scop. Ent. carn.* 60.
Silpha cimicoides supra fusco castanea rufo marginata subtus rufa, elytris lineis eleuatis liminis, punctisque excavatis. *Degeer Inf.* 4. 183. 9.
Scarabaeus minor e rufo fordide nigricans, elytris stria-
tis. *Raj. Inf.* 84. 33.
Schaeff. Icon. tab. 40. fig. 7.
Habitat in Europa boreali.
20. *S. nigra*, elytris striato punctatis, lineis eleuatis senis, *oblonga*.
thorace emarginato. *Syst. Ent.* 75. 17. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 572. 22. *Fn. Sv.* 460.
Silpha oblonga fusco-nigra, elytris lineis octo eleuatis punctisque excavatis. *Degeer Inf.* 4. 185. 71.
Habitat in Europa boreali.
21. *S. nigra*, thoracis elytrorumque margine subferrugi-*limbata*.
neo, elytris lineis eleuatis plurimiis obsoletis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Statura *S. ferruginea*, at paullo minor. Caput nigrum
antennis perfoliatis. Thorax marginatus, laevis,
niger margine ferrugineo. Elytra nigra lineis eleuatis
plurimiis substriata margine subferrugineo. Pe-
des nigri.

24. O P A T R V M.

1. *O. cinereum*, thorace piano marginato, elytris striis *griseum*.
tribus eleuatis postice dentatis.
Habitat in Italia. *Dr. Allioni*.
Maior *O. fabuloso*. Corpus supra *cinereum*, immacu-
latum, subtus fuscum. Thorax planus marginé par-
rum eleuato. Elytra striis tribus eleuatis, abbrevia-
tis, postice dentatis.
2. *O. fuscum*, elytris lineis eleuatis tribus dentatis, tho-
race emarginato. *Syst. Ent.* 76. 1. *sabulo-*
sum.
Silpha sabulosa fusca, elytris lineis eleuatis tribus vtrin-
que dentatis, thorace subemarginato. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 572. 17. *Fn. Sv.* 456.

Tenebrio atra, clytris striis quinque vtrinque dentatis.
Geoff. Inf. 1. 350. 7.

Dermestes niger inter elytrorum lineas quatuor eleuatis scrobiculis exaratus. Vdm. Diff. 5.

Habitat in Europae, Americae borealis campis apricis, sabulosis.

gibbum. 3. *O. nigrum*, clytris lineis eleuatis plurimis obsoletis.
Syst. Ent. 76. 2. *

Habitat in Sueciae collibus arenosis.

laeviga- 4. *O. nigrum*, clypeo antice piceo, elytris substriatis.
tum, Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.

Statura omnino praecedentium. Caput et thorax laeua, nigra, clypeo apice integro, piceo. Thorax antice posticeque truncatus, subsinuatus. Elytra nigra, immaculata, obsolete striata. Pedes nigri.

arena- 5. *O. griseum*, elytris striatis. Syst. Ent. 76. 3. *
rium. Habitat ad Cap. bon. sp. Mus. Dom. Banks.

orientale. 6. *O. cinereum*, thorace elytrisque rugosis, tibiis anticis dilatatis triangularibus. Syst. Ent. 76. 3. *

Silpha multifasciata. Forstahl Descript. 77. 1.

Habitat in Orientis arenosis.

tibiale. 7. *O. nigrum*, elytris punctato subrugosis, tibiis anticis compresso triangularibus.

Habitat sub lapidibus Scaniae. Mus. Dom. Banks.

Corpus paruum. Capitis clypeus emarginatus. Caput et thorax laeua, nigra, immaculata. Elytra lineis eleuatis, obsoletis rugosa. Tibiae antice basi bidentatae, apice triangulares, compressae.

minutum. 8. *O. cinereum*, thorace rugoso, elytris lineis eleuatis quatuor laeuibus. Syst. Ent. 77. 5. *

Habitat in Sueciae arenosis.

Praecedentibus quadruplo minus,

25. NITIDULA.

1. *N. ouata nigra, elytris puncto rubro. Syst. Ent. 77. 1. 2puſtula-*
Silpha 2puſtulata oblonga nigra, elytris singulis pun-
ta. Etio vnico rubro. Linn. Syst. Nat. 2. 570. 4. Fn.
Sv. 445.
Silpha nigra, corpore obtuso, elytris singulis macula
vnica rubra. Degeer Inf. 4. 186. 13. tab. 6. fig. 22. 23.
Dermestes niger, coleoptris punctis rubris binis. Geoff.
Inf. 1. 100. 3.
Habitat in Europae cadaueribus.
2. *N. ouata nigra obscura, pedibus piceis. Gen. Inf. Man- obscura.*
*tiff. 215. **
Habitat in Germania. Dom. de Hattorf.
3. *N. ouata nigra obscura, elytris laeuis obtusis abbre- abbrevia-*
uiatis. ta.
Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.
Statura et magnitudo praecedentis. Corpus totum ni-
grumi, subtomentosum, minime nitidum. Elytra
valde obtusa et fere truncata abdomine multo bre-
uiora.
Variat pedibus flauis et nigris.
4. *N. ouata, elytris sulcatis, margine punctisque disci marginar-*
ferrugineis. ta.
Habitat in Italia. Dr. Allioni.
Statura N. 2puſtulatae. Corpus subitus piceum. Tho-
rax niger margine late ferrugineo. Elytra marginata,
nigra margine punctisque aliquot disci ferru-
gineis.
5. *N. testacea subtomentosa, thorace emarginato, oculis aestiuas.*
nigris. Syst. Ent. 77. 2.
Silpha aestiva testacea subtomentosa, thorace emargi-
nato, oculis nigris. Linn. Syst. Nat. 2. 574. 32. Fn.
Sv. 465.
Habitat in Europae floribus.
6. *N. ouata, thorace marginato, ferruginea, capite fu- ferrugi-*
*laco. Syst. Ent. 77. 3. **
neq;
Derme-

Dermestes ferrugineus oblongus ferrugineus semicylindricus, elytris abbreviatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 564. 21. ? *Fn. Sv.* 433. ?

Habitat in Angliae Lycoperdis, capt. d. 9. Iul.

varia. 7. N. ouata, thorace elytrisque nigro ferrugineoque variis.

Habitat Kiliae in hortis.

Statura omnino praecedentis. Corpus fuscum. Thorax marginatus, variegatus margine ferrugineo. Elytra striata, marginata, variegata margine ferrugineo. Pedes ferruginei.

bicolor. 8. N. ferruginea, elytris nigris, fascia baseos puncto apicis ferrugineis. *Gen. Inf. Mant.* 216. *

Habitat in aruis Kiloniensibus. *Dom. Lund.*

Colon. 9. N. nigra, elytris ferrugineo variis, thorace emarginato. *Syst. Ent.* 78. 4.

Silpha Colon nigra, elytris ferrugineo variis, thorace emarginato, tergo duplice puncto impresso. *Linn. Syl. Nat.* 2. 573. 27. *Fn. Sv.* 462.

Silpha Colon rufo fusca nigro maculata, thorace duplice puncto impresso, corpore subtus toto fusco. *Degeer Inf.* 4. 117. 14. tab. 6. fig. 24.

Habitat in Europae borealis graminosis.

haemorrhoidalis. 10. N. nigra, elytris apice ferrugineis. *Gen. Inf. Mant.* 216. *

Habitat Hamburgi. *Dr. Schulz.*

discoidea. 11. N. thorace marginato nigra, elytrorum disco ferrugineo. *Syst. Ent.* 78. 5. *

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

pediculata. 12. N. nigra, elytris laeuis, thorace marginato. *Syst. Ent.* 78. 6.

Silpha pedicularia nigra, elytris laeuis, thorace marginato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 574. 34. *Fn. Sv.* 466.

Dermestes psyllius ouatus niger, abdomine obtuso, thorace elytrisque marginatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 564. 25. *Fn. Sv.* 436.

Habitat in Europae borealis hortis, floribus.

13. N. thorace marginato viridiaenea, antennis pedibusque nigris. *Syst. Ent.* 78. 7. *
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
14. N. thorace elytrisque griseis pubescentibus. *pubescens.*
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Antennae clava solida. Corpus paruum supra griseum
nitidum pilis erectis brevibus adspersum.
15. N. atra, thorace elytrisque pubescentibus. *hirta.*
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Nimis praecedenti affinis, differt tamen colore toto
atro.
16. N. nigra nitida, pedibus pallidis. *Syst. Ent.* 78. 8. *rufipes.*
Silphia rufipes nigra lacuis, thorace subemarginato, pe-
dibus ferrugineis. Linn. Syst. Nat. 2. 573. 24.
Habitat in Europae, Angliae hortis.

26. C O C C I N E L L A.

1. C. coleoptris rubris, margine nigro, thorace vtrinque *margina-*
puncto marginali albo. Syst. Ent. 79. 1. *ta.*
Coccinella marginata coleoptris flavis immaculatis,
margine nigro, thoracis margine punctis duobus al-
bis. Linn. Syst. Nat. 2. 579. 1.
Habitat in America meridionali.
2. C. coleoptris rubris immaculatis, thorace capiteque *nigri-*
gris. Syst. Ent. 79. 2. *Linn. Syst. Nat. 2. 579. 2. surina-*
mensis.
Amoen. acad. 6. 393. 12.
Habitat in America meridionali.
3. C. coleoptris sanguineis immaculatis, thorace maculis *sangui-*
nigris. Syst. Ent. 79. 3. *Linn. Syst. Nat. 2. 579. 3. nea.*
Amoen. acad. 6. 393. 4.
Habitat in America meridionali.
Parua, subtus atra.
4. C. coleoptris rubris, puncto nullo. *Syst. Ent.* 79. 4. *impuncta-*
Linn. Syst. Nat. 2. 579. 4. ta.
Degeer Inf. 5. 369. 1.
Habitat in Sueciae hortis.

5. C.

- dimidia-* 5. *C. coleoptris sanguineis apice atris.*
ta. Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Magna. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra sanguinea futura apiceque late atris. Corpus et pedes flavescentes.
- lineola.* 6. *C. elytris rubris, lineola baseos apicisque nigra.* *Syst. Ent.* 79. 5. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- vnipecta-* 7. *C. coleoptris rubris, fascia media atra.* *Gen. Inf. Mant.*
ta. 217. *
Habitat Hamburgi. *Dr. Schulz.*
Variat punctis duobus capitum thoracisque margine albis.
- annulata.* 8. *C. coleoptris rubris, macula subannulari nigra.* *Linn.*
Syst. Nat. 2. 579. 5.
Habitat in Germania.
- elineata.* 9. *C. coleoptris flavis, lineis sex punctisque tribus nigris.*
Habitat in Sibiria. *Pallas. Mus. Dom. Banks.*
Magna. Corpus nigrum. Caput punctis duobus baseos albis. Thorax ater punctis duobus baseos albis. Margo exterior albus macula nigra. Elytra flava lineis tribus atris, quae tamen nec basin nec apicem attingunt, exterioribus duabus ante basin coëuntibus. Punctum praeterea oblongum versus apicem et commune bifidum.
- apuncta-* 10. *C. coleoptris rubris, punctis nigris duobus.* *Syst. Ent.*
ta. 79. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 580. 7. *Geoff. Inf.* 1. 320.
Scarabaeus alter niger exiguus, pennarum crustis minutulis, in quibus duae tantum maculae nigrae. *Lift. Scarab. Angl.* 383. 8.
Scarabaeus hemisphaericus minor, elytris e flavo rubentibus, singulis maculis seu punctis nigris media parte notatis. *Raj. Inf.* 86. 2.
Coccinella anglica bimaculata seu minor rubra. *Petiv. Gazoph.* 34. tab. 21. fig. 4.
Coccinella secundae magnitudinis, punctis coleoptorum duobus. *Frisch. Inf.* 9. 33. tab. 16. fig. 4.

Schaeff.

Schaeff. *Ins.* tab. 9. fig. 9.

Sulz. *Hist. Ins.* tab. 3. fig. 3.

Aet. *Nidros.* 3. tab. 6. fig. 2.

Reaum. *Ins.* 3. tab. 31. fig. 16.

Degeer *Ins.* 5. 369. 2.

Habitat in Europae hortis frequens, visitans Aphidibus.

11. *C. coleoptris luteis*, maculis duabus nigris longitudinalibus sinuatis. *Syst. Ent.* 80. 7. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 580. 14. *Fn. Sv.* 476. *hieroglyphica.*

Coccinella coleoptris flavo rubris, fasciis irregularibus sinuatis nigris. *Degeer Ins.* 4. 382. 15.

Sulz. *Hist. Ins.* tab. 3. fig. 4.

Habitat in Europae hortis.

12. *C. coleoptris luteis*, fascia flexuosa punctisque duobus nigris. *Gen. Ins. Mant.* 217. *

Habitat Hamburgi. *Dr. Schulz.*

13. *C. coleoptris flavis*, punctis anticis tribus, futura fascia que apicis nigris. *Syst. Ent.* 80. 8. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.* *inaequata.*

14. *C. coleoptris rubris*, fasciis nigris tribus. *Syst. Ent.* trifascia 80. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 580. 13. *Fn. Sv.* 475. *ta.*

Scarabaeus hemisphaericus minor, elytris ex albo lumentibus, lineolis nigris in medio dorsi pictis. *Raj. Ins.* 87. 9.

Habitat in Europae hortis.

15. *C. coleoptris ferrugineis*, fasciis duabus punctisque 2fasciata, duobus nigris.

Habitat - - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Caput et thorax ferruginea, immaculata. Elytra ferruginea antice fasciis duabus inaequalibus postice punctis duobus maguis nigris. Corpus nigrum margine ferrugineo. Pedes ferruginei.

16. *C. coleoptris flavis*, punctis nigris quatuor. *Syst. Ent.* 4punctata 80. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 580. 9.

Habitat in Europa: media.

- 5puncta-* 17. *C. coleoptris sanguineis*, punctis nigris quinque. *Syst. Ent.* 80. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 580. 4. *Fn. Sv.* 474. *Geoff. Inf.* 1. 320. 2.
Coccinella coleoptris rubris, punctis tribus magnis, duobusque minimis. *Degeer Inf.* 5. 370. 7.
Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 8.
Merian. Europ. tab. 69.
Habitat in Europae arboribus.
- 6puncta-* 18. *C. coleoptris rubris*, punctis nigris sex. *Linn. Syst. Nat.* 2. 580. 12.
Habitat in Europae hortis.
Parua. Caput atrum punctis duobus albis. Thorax ater nitidus margine punctisque duobus dorsalibus albis. Elytra rubra punctis duobus pone medium et unico versus apicem nigris.
- glacialis.* 19. *C. coleoptris rubris*, punctis sex nigris, intermediis maioribus sinuatis. *Syst. Ent.* 80. 12.*
Habitat in America boreali. *Dom. Drury.*
- 6macula-* 20. *C. coleoptris rubris*, punctis sex nigris, anticis quatuor transuersis sinuatis.
Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Caput albidum. Thorax antice albus macula atra, postice ater. Elytra rubra sutura atra maculisque tribus 1. 1. 1. quarum duae anteriores, maiores, transuersae, sinuatae. Corpus pallide flavescentes.
- 7puncta-* 21. *C. coleoptris rubris*, punctis nigris septem. *Syst. Ent.* 81. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 581. 15. *Fn. Sv.* 477. *Geoff. Inf.* 1. 321. tab. 6. fig. 1.
Coccinella anglica vulgatissima rubra septem nigris maculis punctata. *Petiv. Gazoph.* tab. 21. fig. 3.
Coccinella maior. *Frisch. Inf.* 4. tab. 1. fig. 4.
Scarabaeus subrotundus f. hemisphaerius rubens maior vulgatissimus. *Raj. Inf.* 86. 1.
Scarabaeus alter niger. *List. Scar. Engl.* 382. 7. *Roef. Inf.* 2. *Scar.* 3. pag. 7. tab. 2.
Hollar tab. 4. fig. 8.

Schaeff.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 7.

Degeer Ins. 5. 370. 4. tab. 10. fig. 14.

Habitat in Europae plantis frequens.

Puncta elytrorum in triangulum posita.

22. *C. coleoptris rubris*, punctis nigris septem, communis maculae trilobo, corpore oblongo. *Gen. Ins. Mant.* ta. 218. *

Habitat in Germania. *D. Schulz.*

Differit manifeste a praecedente.

23. *C. coleoptris rubris*, punctis nigris octo. *Syst. Ent.* 8punctata. 81. 14. *

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Punctum unicum ad basin et tria in medio.

24. *C. coleoptris luteis*, maculis octo nigris, anticis quadratis transuersis sinuatis. *transuersalis.*

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Caput nigrum. Thorax ater, nitidus maculae vtrinque apicis alba. Elytra flava, nitida maculis quatuor 1. i. 2., quarum duae anteriores maiores, transuersae, sinuatae. Sutura nigra. Corpus nigrum.

25. *C. coleoptris luteis*, punctis nigris octo, anticis sex transuersis sinuatis. *transuersata.*

Habitat - - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Caput obscure luteum oculis nigris. Thorax luteus maculae baseos palmata nigra. Elytra flava sutura nigra. Puncta quatuor 1. i. 1. i., quorum tria anteriora maiora, transuersalia, sinuata, ultimum apicis. Corpus nigrum.

26. *C. coleoptris rubris*, punctis nouem nigris, postico communis, thorace bipunctato. *9maculata.*

Coccinella 9punctata. Syst. Ent. 81. 15. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

27. *C. coleoptris rubris*, punctis nigris nouem. *Linn. 9punctata.* *Syst. Nat.* 2. 581. 16. *Fn. Sv.* 478.

Coccinella 10punctata. Syst. Ent. 81. 16.

Coccinella coleoptris rubris punctis nouem nigris, thorace nigro lateribus albis. Geoff. Inf. 1. 322. 4.

Coccinella nigra, elytris rubris punctis nouem nigris
Vdm. Diff. 14.

Degeer Inf. 5. 373. 6.

Habitat in Europae hortis.

Puncta 2. 2. oblique posita et communis maiori.

13punctata- 28. *C. coleoptris fuluis, punctis nigris decem, thorace quadrimaculato.* Syst. Ent. 82. 17. Linn. Syst. Nat. 2. 581. 17. Fn. Sv. 479. Scop. carn. 237.

Coccinella coleoptris flavo rubris, punctis nigris decem in cruce directis. Degeer Inf. 5. 374. 7.

Habitat in Europae plantis.

14omaculata- 29. *C. oblonga, elytris fuluis, punctis nigris decem, duobus communibus.*

Habitat in America boreali. Mus. Dom. Banks.

Statura oblonga C. 13punctatae. Caput atrum linea frontali sanguinea. Thorax niger margine sanguineo. Elytra sanguinea punctis quatuor 1. 1. 1. 1. et duobus communibus. Corpus atrum.

dilatata. 30. *C. subrotunda, coleoptris marginatis fuluis, punctis nigris decem, thorace bipunctato.* Syst. Ent. 82. 18.*
Habitat in America. Mus. Brit.

15punctata- 31. *C. coleoptris rubris, punctis nigris undecim.* Syst. Ent. 82. 19. Linn. Syst. Nat. 2. 581. 18. Fn. Sv. 480.

Coccinella coleoptris rubris, punctis undecim nigris, thorace rubro immaculato. Geoff. Inf. 1. 325. 9.

Stroem. Act. Nidr. 3. tab. 6. fig. 2.

Degeer Inf. 5. 375. 8.

Habitat in Europa boreali.

Puncta 1. 2. 2. obliqua et baseos communi.

16punctata- 32. *C. coleoptris flavis, punctis nigris duodecim, extimus linearibus repandis.* Syst. Ent. 82. 20. Linn. Syst. Nat. 2. 581. 19.

Habitat in Europae hortis.

33. *C. coleoptris flauis, punctis nigris duodecim fascia-* *variega-*
que media nigris. *ta.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Media. Caput flauum oculis nigris. Thorax flauus
 punctis quinque baseos nigris. Elytra flava punctis
 duobus baseos, fascia in medio maculis tribus orta et
 versus apicem punctis 3. 1. atris.
34. *C. coleoptris rufis, punctis nigris duodecim, thorace chrysome-*
immaculato. *Syst. Ent. 82. 21. ** *lina.*
 Habitat in Insula St. Helena. *Mus. Dom. Banks.*
 Puncta elytrorum 2. 2. 2.
35. *C. coleoptris flauis, punctis nigris duodecim, duobus borealis.*
communibus, vltimis orbiculatis. *Syst. Ent. 82. 22. **
 Habitat in America boreali. *Dom. Drury.*
 Puncta elytrorum 3. 3. 1. vltimo maiore.
36. *C. oblonga rubra, coleoptris punctis duodecim, tho-* *cassidea.*
race quatuor nigris. *Syst. Ent. 82. 23. **
 Habitat in America boreali. *Mus. Brit.*
37. *C. coleoptris flauis, punctis nigris tredecim corpore 13macu-*
orbiculato. *Syst. Ent. 83. 24. ** *ta.*
Coccinella 13maculata coleoptris luteis, punctis nigris
tredecim, thorace albo nigro punctato. *Forst. nou.*
sp. Cent. 1. 18. 18.
 Habitat in Europa boreali.
 Puncta elytrorum 1. 3. 2. et communi.
38. *C. coleoptris luteis, punctis nigris tredecim corpore 13punctu-*
oblongo. *Syst. Ent. 83. 25. Linn. Syst. Nat. 2. 582. ** *ta.*
~~20. Geoff. Inf. 1. 323. 6.~~
Coccinella coleoptris rubris, punctis nigris tredecim,
Degeer Inf. 5. 375. 9.
Reaum. Inf. 3. tab. 31. fig. 79.
Schaeff. Icon. tab. 48. fig. 6.
 Habitat in Europa frequens.
 Puncta elytrorum 1. 2. 2. 1. et communi baseos.
39. *C. coleoptris flauis, punctis nigris quatuordecim, qui-* *14punctata.*
busdam contiguis. *Syst. Ent. 83. 26. Linn. Syst. Nat. ** *ta.*
~~2. 582. 21. Fn. Sv. 482.~~

Coccinella tessulata. Scop. carn. 243.

Schaeff. Icon. tab. 62. fig. 6.

Habitat in Europae hortis frequens.

ocellata. 40. *C. coleoptris luteis, punctis nigris quindecim subocellatis*. Syst. Ent. 83. 27. Linn. Syst. Nat. 2. 582. 23. Fn. Sv. 484.

Coccinella elytris flavo luteis, punctis 15 nigris, ocello flavo cinctis. Gad. Sat. 16.

Coccinella coleoptris rubris punctis quindecim nigris flavo marginatis. Degeer Inf. 5. 376. 10. tab. II. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 2.

Elem. tab. 47. fig. 1.

Merian. Inf. Europ. 48. fig. 5.

Habitat in Europae hortis.

Thorax ater margine albo puncto atro. Punctaque duo alba ad basin. Puncta elytrorum 1. 3. 3. posticis ferre obsoletis.

16puncta- 41. *C. coleoptris luteis, punctis nigris sedecim*.

ta. Habitat in Italia. Dr. Allioni.

Maior, oblonga. Caput albidum punctis quatuor nigris. Thorax albidus punctis plurimis approximatis. Elytra lutea punctis 1. 3. 3. 1. distinctis nigris.

18puncta- 42. *C. coleoptris flavis, punctis nigris octodecim, ultimo arcuato*. Syst. Ent. 83. 28. Linn. Syst. Nat. 2. 582. 24.

ta. Habitat in Europa boreali.

Thorax lateribus flavis.

19puncta- 43. *C. coleoptris flavis, punctis nigris nouendecim*. Syst.

ta. Ent. 83. 29. Linn. Syst. Nat. 2. 582. 25. Fn. Sv. 485. Geoff. Inf. 1. 325. 10.

Coccinella lutea, thorace punctis sex elytris nouendecim nigris. Müll. Zool. Dan. prodr. 67. 632.

ta. Habitat in Europae plantis.

Puncta elytrorum 2. 3. 3. 1. et unico communi.

20puncta- 44. *C. coleoptris flavis, punctis nigris viginti*. Syst. Ent.

ta. 84. 30. Geoff. Inf. 1. 329. 17.

Scopol. Carn. 242.

Habi-

Habitat in Europa rarius.

Elytrorum puncta 3. 3. et quatuor apicis in quadrato.

5. *C. coleoptris flavis*, punctis nigris viginti duobus. *22punctata*.
Syst. Ent. 84. 31. *Linn. Syst. Nat.* 2. 582. 26. *Fn.* *ta.*
Sv. 486.

Coccinella coleoptris flavo citreis, punctis viginti duo-
 bus thoraceque quinque nigris. *Degeer Inf.* 5.
 379. 12.

Scarabaeus hemisphaericus flavus maculis nigris cre-
 bris. *Raj. Inf.* 87. 6.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 10.

Habitat in Europae hortis.

Parua. Puncta elytrorum 4. 4. 3.

6. *C. coleoptris rubris*, punctis nigris viginti tribus di- *23punctata*-
 stinctis. *Syst. Ent.* 84. 32. *Linn. Syst. Nat.* 2. *ta.*
582. 27.

Habitat in Germaniae plantis.

Thorax ruber punctis tribus nigris. Puncta elytrorum
 3. 3. 3. 2. et communis baseos.

7. *C. coleoptris rubris*, punctis nigris viginti quatuor. *24punc-*
Syst. Ent. 84. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 583. 28. *Fn.* *ta.*
Sv. 487. *Geoff. Inf.* 1. 326. 11.

Coccinella coleoptris rufo fuscis, maculis quatuorde-
 cim quibusdam connexis punctisque decem nigris.
Degeer Inf. 5. 381. 14.

Habitat in Europae hortis.

Puncta elytrorum 3. 4. 3. 2. ultimis obliquis.

8. *C. coleoptris rubris*, punctis nigris viginti octo. *Syst. 28punctata*-
Ent. 84. 34. *

Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*

Puncta elytrorum 3. 4. 3. 2. 2.

9. *C. coleoptris flavescentibus*, punctis nigris plurimis *conglome-*
 contiguis. *Syst. Ent.* 84. 35. *Linn. Syst. Nat.* 2. 583. *rata.*
31. Fn. Sv. 490.

Coccinella coleoptris rubris, punctis plurimis nigris
 quibusdam connexis sutura longitudinali nigra. *Geoff.*
Inf. 1. 316. 12.

Coccinella tessellata coleoptris pallide flauis, maculis plurimis quadratis nigris connexis. *Degeer Inf.* 5. 383. 17.

Scarabaeus hemisphaericus flauus, maculis nigris variae figurae depictus. *Raj. Inf.* 87. 5.

Scarabaeus luteus nigris maculis distinctus. *Lift. Logr.* 383. 9.

Frisch. Inf. 9. 34. tab. 17. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 171. fig. 1. a. b.

β. *Coccinella conglobata* coleoptris rubris, punctis nigris plurimis subcontiguis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 583. 30. *Geoff. Inf.* 1. 326. 12.

Coccinella rosea coleoptris rubris roseis, punctis sedem nigris quibusdam connexis, thorace flavo punctis nigris. *Degeer Inf.* 5. 378. 11.

Habitat in Europae hortis frequens.
α. et β. vix distinctae species.

detrita. 50. *C. flava*, coleoptris immaculatis, thorace albo maculato. *Syst. Ent.* 85. 36. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

rogutta- 51. *C. coleoptris luteis*, punctis albis decem. *Syst. Ent.* ta. 85. 37. *Linn. Syst. Nat.* 2. 583. 33.

Habitat in Sueciae hortis.
Puncta elytrorum 2. 2. 1.

ragutta- 52. *C. coleoptris rufis*, punctis albis quatuordecim. *Syst. Ent.* ta. 85. 38. *Linn. Syst. Nat.* 2. 34. *Fn. Sv.* 492. *Geoff. Inf.* 1. 327. 13.

Scarabaeus hemisphaericus, elytris fuluis maculis albis pictus. *Raj. Inf.* 86. 3.

Scarabaeus subrufus. *Lift. Scar. Angl.* 383.
Schaeff. *Icon.* tab. 9. fig. 11.

Degeer Inf. 5. 385. 20.
Habitat in Europae salicibus.
Puncta elytrorum 1. 3. 2. 1.

ragutta- 53. *C. coleoptris luteis*, punctis quindecim albis, communi medio, obsoleto. *Gen. Inf. Mant.* 219. *

Coccinella coleoptris rubris, punctis quatuordecim
limboque albis. *Geoff. Inf.* 1. 327. 14.

Habitat in Europa australiori. *D. Schulz.*

Puncta elytrorum 2. 2. 2. 1.

54. *C. coleoptris luteis*, punctis albis sedecim. *Syst. Ent.* 16gutta-
85. 39. *Linn. Syst. Nat.* 2. 584. 35. *Fn. Sv.* 493. ta.

Coccinella 16guttata. *Scop. carn.* 240.

Degeer Inf. 5. 385. 21.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 5.

Habitat in Europa.

Puncta elytrorum 3. 3. 1. 1.

55. *C. coleoptris rubris*, punctis albis octodecim. *Syst. Ent.* 18gutta-
Ent. 85. 40. *Linn. Syst. Nat.* 2. 385. 37. ta.

Scop. Ent. carn. 241.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 12.

Habitat in Europa.

Puncta elytrorum 1. 2. 3. 2. 1.

56. *C. coleoptris rubris*, punctis albis viginti. *Syst. Ent.* 20gutta-
85. 41. *Linn. Syst. Nat.* 2. 584. 37. *Fn. Sv.* 495. ta.

Coccinella flavo rubra seu nigra, coleoptris maculis
magnis albis viginti. *Degeer Inf.* 5. 386. 22.

Habitat in Europa.

Puncta elytrorum 2. 2. 3. 2. 1. anticis obliquis.

57. *C. coleoptris rubris*, lineis punctisque albis. *Syst. oblongo-*
Ent. 85. 42. *Linn. Syst. Nat.* 2. 584. 38. *Fn. Sv.* 496. *guttata.*

Coccinella coleoptris flavo rufis, lineis maculisque oblon-
gis fordide albis. *Degeer Inf.* 5. 384. 19.

Scop. Ent. carn. 242.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 10.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 9. fig. 6.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 14.

Habitat in hortis rarius.

58. *C. coleoptris nigris*, puncto nullo. *Syst. Ent.* 85. 43. *impustu-*
Linn. Syst. Nat. 2. 584. 40. *lata.*

Habitat in Germaniae nemoribus.

Thoracis latera flava puncto nigro.

haemorrhoidalis. 59, *C. coleoptris atris apice rubris, fascia nigra.* *Gen. Mant.* 219. *

Habitat Hamburgi. *D. Schulz.*

Variat frequens puncto communi sanguineo in medio dorsi.

Cacti, 60, *C. coleoptris atris, maculis duabus rubris.* *Syst. Ent.* 85. 44. *Linn. Syst. Nat.* 2. 584. 41.

Coccinella coleoptris marginatis nitidis atris, macula solitaria subrotunda vtrinque. *Gron. Zooph.* 609.

Scarabaeus hemisphaericus cochenillifer. *Petiv. Gatzoph.* tab. 1. fig. 5.

Sloan. Iam. 2, tab. 237. fig. 31. 33.
tab. 9. fig. 13.

Habitat in Americae cactis, saepius inter coccus caeti lecta.

apustula-ta, 61, *C. coleoptris nigris, punctis rubris duobus compositis, abdomine sanguineo.* *Syst. Ent.* 86. 45. *Linn. Syst. Nat.* 2. 585. 42. *Fn. Sv.* 498.

Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, fascia transuersa rufa. *Geoff. Inf.* 1. 334. 26.

Coccinella coleoptris nigris, maculis duabus ouatis rubris, abdomine sanguineo. *Degeer Inf.* 5. 387. 27. tab. 10. fig. 25.

Coccinella media nigra, punctis duobus rubris dorsali bus. *Frisch. Inf.* 9. 34. tab. 16. fig. 6.

Roes. Inf. 2. *Scarab.* 3. p. 10. tab. 3.
Habitat in Europa hortis frequens.

variabilis, 62, *C. coleoptris nigris, punctis duobus rubris orbiculatis submarginalibus, corpore oblongo.* *Gen. Inf. Mant.* 219. *

Habitat Hamburgi. *D. Schulz.*

Variat minor elytris lutescentibus puncto flavescente, acetate elytra nigra et puncta rubra euadunt.

apustula-ta, 63, *C. coleoptris nigris, punctis rubris quatuor, interioribus longioribus.* *Syst. Ent.* 86. 46. *Linn. Syst. Nat.* 2. 585. 43. *Fn. Sv.* 499.

Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, punctis quatuor rubris. *Geoff. Inf.* 1. 333. 25.

Cocci-

CLASS. I. ELEVTERATA. Coccinella. 105

Coccinella coleoptris nigris, maculis quatuor rubris, anterioribus lunatis, posterioribus rotundis. *Degeer Inf.* 5. 389. 24.

Bergstræss. Nomencl. 1. tab. 9. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 16. 17.

Habitat in Europæ hortis.

Saepius hanc cum *C. 2punctata* copula iunctam vidi.

64. *C. coleoptris nigris*, punctis rubris sex. *Syst. Ent.* 6*pustula-* 86. 47. *Linn. Syst. Nat.* 2. 585. 44. *Fn. Sv.* 500. *ta.*

Coccinella acuta coleoptris nigris, punctis rubris sex.

Geoff. Inf. 1. 331. 10.

Coccinella coleoptris nigris maculis duabus magnis quatuor minoribus rubris. *Degeer Inf.* 5. 390. 25.

Scarabaeus hemisphaericus minor, elytris nigris rubris maculis pictis. *Raj. Inf.* 87. 4.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 12.

Habitat in Europæ hortis.

Puncta elytrorum 1. 1. 1.

Variat rarius puncto adhuc minutissimo ad futuram rubro.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 6.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 9. fig. 4.

65. *C. coleoptris nigris*, maculis decem rubris, sex lunatis. *Syst. Ent.* 86. 48. *

Habitat in Insula St. Helena. *Mus. Dom. Banks.*

66. *C. coleoptris nigris*, punctis fuluis decem. *Syst. Ent.* 10*pustula-* 87. 49. *Linn. Syst. Nat.* 2. 585. 35. *Fn. Sv.* 501. *ta.*

Coccinella coleoptris nigris, punctis decem flavescentibus aut rubris. *Geoff. Inf.* 1. 330. 19.

Coccinella coleoptris nigris, maculis decem fuluis, anterioribus saepe connexis. *Degeer Inf.* 5. 391. 26.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 10.

tab. 171. fig. 2.

Habitat in Europæ hortis.

Variat punctis flauis et rubris.

Puncta elytrorum 2. 2. 1., duo baseos lunata interdum connata,

- 12pustu-* 67. *C. coleoptris nigris*, punctis duodecim albis, exte-
lata. rioribus margine connexis. *Gen. Inf. Mant.* 219. *
Habitat Hamburgi. *D. Schulz.*
- 14pustu-* 68. *C. coleoptris nigris*, punctis albis quatuordecim. *Syst.*
lata. *Ent.* 87. 50. *Linn. Syst. Nat.* 2. 585. 46. *Fn. Sv.* 502.
Geoff. Inf. 1. 530. 18.
Coccinella coleoptris nigris, maculis quatuordecim ae-
qualibus flavis. *Degeer Inf.* 5. 391. 27.
- Coccinella 14maculata.* *Pod. Mus.* 26.
Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 10.
Habitat in Europae floribus.
Puncta elytrorum 2. 2. 2. 1. interdum flava, interdum
rubra.
- guttato-* 69. *C. coleoptris nigris*, punctis duobus flavis quatuor-
pustulata. que rufis. *Syst. Ent.* 87. 51. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom.* Banks.
- felina.* 70. *C. coleoptris atris*, punctis sex albis, corpore globo-
so. *Syst. Ent.* 87. 52. *
Habitat in America boreali. *Dom. Drury.*
- pantheri-* 71. *C. coleoptris nigris*, punctis flavis octo. *Syst. Ent.*
na. 87. 53. *Linn. Syst. Nat.* 2. 585. 48. *Fn. Sv.* 504.
Coccinella coleoptris nigro fuscis, maculis decem albo-
flavescensibus. *Degeer Inf.* 5. 392. 28.
Habitat in Europa boreali.
Puncta elytrorum 1. 2. 1.
- pardali-* 72. *C. coleoptris nigris*, punctis decem margineque si-
nuato albis.
Habitat - - - - - *Mus. Dom.* Banks.
Magna. Caput atrum maculis duabus baseos albis. Tho-
rax ater fascia media valde sinuata margineque late-
rali albis. Elytra margine sinubus tribus albo. Pun-
cta in disco quinque 1. 2. 1. 1. Corpus atrum.
- leonina.* 73. *C. coleoptris atris*, punctis albis sedecim. *Syst. Ent.*
87. 54. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom.* Banks.

74. *C. coleoptris nigris, punctis albis viginti. Syst. Ent. tigrina.*
88. 55. *Linn. Syst. Nat. 2. 586. 49. Fn. Sv. 505.*

Coccinella coleoptris nigris, punctis viginti albis. Vdm.
Diss. II.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 9.

Habitat in Europa boreali.

Varietatem *C. roguttatae* credit *Degeer*.

75. *C. coleoptris nigris, punctis albis viginti, capite thoro canina-*
raceque villoso immaculatis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Distincta sane a *C. tigrina*. Magna. Caput et thorax nigra cinereo villosa, immaculata. Elytra nigra punctis albis viginti intermedio lunato 2. 3. 2. 2. 1.
Corpus nigrum.

27. C A S S I D A.

1. *C. viridis, corpore nigro. Syst. Ent. 88. 1. Linn. Syst. viridis.*
Nat. 2. 574. 1. Fn. Sv. 467. Geoff. Inf. 1. 313. 1.
Scop. carn. 117.

Cassida Cardui viridis, corpore nigro, pedibus flave-
scentibus. *Degeer Inf. 5. 174. 2.*

Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos diuisit.
Raj. Inf. 107. 5.

Testudo viridis. Goedart. Belg. 1. 94. tab. 43.

Roef. Inf. 2. Scarab. 3. tab. 6.

Reaum. Inf. 3. tab. 18.

Merian. Europ. tab. 115.

Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 5.

Habitat in Europae carduis frequens.

Larva depressa hexapoda spinis lateralibus acutis, cauda biseta, proprio stercore testa obambulat.

2. *C. viridis, elytris rarius, sutura dorsali confertius nigro maculata;*
maculatis. *Syst. Ent. 88. 2. Linn. Syst. Nat. 2.*
575. 6.

Cassida viridis maculis nigris variegata. Geoff. Inf. 1.
314. 5. tab. 5. fig. 6.

Cassida

Cassida supra viridis, subitus nigra, elytris aliquot nigro inaculatis, pedibus nigris. *Degeer Inf.* 5. 175. 3.
Habitat in Germaniae plantis.
Forte praecedentis mera varietas.

affinis. 3. *C. elytris griseis nigro punctatis*, thorace flavescente immaculato. *Syst. Ent.* 88. 3. *
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf*.
Praecedentibus nimis affinis.

vibex. 4. *C. virens*, futura dorsali sanguinolenta. *Syst. Ent.* 89.
4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 575. 5.
Habitat in Germaniae plantis.

nebulosa. 5. *C. pallido nebulosa fusco punctata*. *Syst. Ent.* 89. 5.
Linn. Syst. Nat. 2. 575. 3. *Fn. Sv.* 468.
Cassida nebulosa pallida, corpore nigro. *Geoff. Inf.* 1.
313. 2.

Scarabaeus minor sordide fuluus punctis et maculis aliquot nigris temere sparsis notatus. *Raj. Inf.* 88. 13.

Cassida viridis. *Frisch. Inf.* 4. 30. tab. 15.
Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 4.

Habitat in Europae carduis,

murræa, 6. *C. nigra*, clypeo rubro, elytris sanguineis, punctis nigris sparsis. *Syst. Ent.* 90. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2.
575. 2.

Cassida rubra inaculis nigris variegata. *Geoff. Inf.* 1.
314. 5. β.

Habitat in Europæ plantis.

Varietatem C. niaculatae credit *Geoffroy*.

ferrugi- 7. *C. nigra*, thorace elytrisque ferrugineis immaculatis,
nea. *Cassida subferruginea*. *Schrink. Beytr.* 62. 3.

Habitat in Germania.

Paullo minor C. viridis supra tota ferruginea. Elytra punctata.

Forte omnes praecedentes merae varietates. Statura omnium simillima.

marginal- 8. *C. viridis*, thoracis elytrorumque marginibus flavis.
la. *Syst. Ent.* 89. 6. *

Habitat in Brasilia. *Muf. Dom. Banks*.

9. C. thorace elytrisque obscuris, margine flauescente, cincta.
 elytris ante marginem macula albo hyalina.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino C. interruptae. Thorax rotundatus,
 integer obscurus margine flauescente. Elytra obscu-
 ra margine flavo et ante marginem macula magna
 albo hyalina.
 Variat rarius macula magna marginis ad basin et ante
 apicem.
10. C. pallida, coleoptris lineolis numerosissimis difformi- hebraea.
 bus nigris.
 Habitat Cajennae. *D. Schulz.*
 Parua. Corpus flauescens. Thoracis coleoptrorumque
 margo pallidus, immaculatus, discus lineolis nume-
 rosus, difformibus nigris. Pedes pallidi.
11. C. ferruginea, coleoptrorum disco punctis impressis iudaica.
 maculisque nigris.
 Habitat Cajennae. *D. Schulz.*
 Praecedente minor. Thorax ferrugineus, immacula-
 tus in margine pallidiore. Coleoptera ferruginea mar-
 gine pallidiore disco punctato maculisque nigris.
12. C. flauescens, coleoptrorum disco fusco, annulo fla- annulus.
 uescente.
 Habitat Cajennae. *D. Schulz.*
 Statura praecedentium. Thorax flauescens, immacula-
 tus. Coleoptera in medio dorsi annulo flauescente.
13. C. flauescens, coleoptrorum disco ferrugineo, punctis 6punctata-
 sex nigris.
 Habitat Cajennae. *D. Schulz.*
 Margo omnis pallidus. Puncta elytrorum duo ad mar-
 ginem, tertium ad futuram.
14. C. flauescens, thorace immaculato, elytris ante mar- inter-
 ginem punctisque nigris. *Syst. Ent.* 89. 7. * rupta.
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
15. C. rufescens, thorace punctis duobus, elytris nume- deusta.
 rosis cyaneo nigris, clypeo integro. *Syst. Ent.*
 89. 8. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

- cribraria*. 16. *C. rufescens*, thorace punctis quatuor, elytris numerosis nigris, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* 90. 9. *
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
- nobilis*. 17. *C. grisea*, elytris linea coerulea nitidissima. *Syst. Ent.* 90. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 575. 4.
Cassida pallida, linea duplice longitudinali deaurata. *Geoff. Ins.* 1. 313. 3.
Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos diuisis. *Raj. Ins.* 107. 7.
Schaeff. Icon. tab. 96. fig. 6.
Habitat in Europae plantis stellatis carduis.
Linea elytrorum cum vita perit, in aqua calida reuinificit.
- eruciata*. 18. *C. flavescentis*, coleoptris disco nigro, maculis quatuor flavescentibus. *Syst. Ent.* 90. 12. *
Cassida cruciata pallida, elytris disco fusco cruciato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 576. 9.
Cassida hyalina pallide flava, elytris disco macula magna fusca cruciata. *Degeer Ins.* 5. 187. 12. tab. 15. fig. 15.
Habitat in Europae plantis.
- Crux*. 19. *C. flava*, thoracis linea dorsali ferruginea, coleoptris disco ferrugineo maculis quatuor flavis.
Habitat Cajennae. *D. Schulz.*
Nimis praecedenti affinis. Thorax flavius linea media ferruginea. Coleoptra disco ferrugineo lineola basos et apicis ad marginem excurrente, maculisque duabus flavis, anteriore maiore, posteriore margine connexa.
- ripunctata*. 20. *C. flavescentis*, thoracis puncto medio, coleoptris vnde-
ta. cin nigris.
Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter.*
Corpus medium totum flavescentis marginibus obscurioribus. Punctum nigrum in medio thoracis. Coleoptra punctis vnde- 2. 1. communi, 1. 2. Corpus subtus dilute ferrugineum.
- tuberculata*. 21. *C. testacea*, margine thoracis elytrorumque flavis, coleoptris basi trituberculatis. *Syst. Ent.* 90. 13. *
Cassida

CLASS. I. ELEVTERATA. *Cassida.* III

Cassida marginata testacea, margine thoracis elytrorumque flauo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 576. 14.

Cassida cincta ferruginea, thorace aeneo, elytrisque punctatis, margine flauo. *Degeer Inf.* 5. 186. 11. tab. 15. fig. 14.

Habitat in Sierra Leon Africæ.

22. *C. brunnea*, elytris flauis, futuris brunneis. *Gen. Inf. futuralis.* *Mant.* 219. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*

23. *C. thorace flauo*, elytris rufescentibus, margine nigro, *bigutta-* maculis duabus flauis. *Syst. Ent.* 91. 14. * *ta.*

Habitat Cajennæ. *Dom. Mauduit.*

24. *C. flava*, thorace immaculato, elytris nigro punctatis, *miliaris.* margine bifasciato. *Syst. Ent.* 91. 15. *

Habitat in Insula St. Helena. *Mus. Dom. Banks.*

25. *C. cyaneo nigra*, elytris testaceis, margine nigro. *Syst. marginata.* *Ent.* 91. 16. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 578. 23. *ta.*

Cassida marginata. *Naturf.* 9. tab. 2.

Cassida thorace violaceo nigro, elytris testaceis, margine punctisque duobus nigris. *Degeer Inf.* 5. 185. 10.

Habitat in Indiis.

26. *C. thorace obscuro*, elytris sanguineis, margine cyaneo, maculis duabus rubris. *4pustulata.*

*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Corpus medium, atrum. Thorax obscure rufus, immaculatus. Elytra rufa margine exteriori late cyaneo maculis duabus magnis rufis. Sutura nigra.

27. *C. luteo aenea*, elytris immaculatis excavato puncta- *iamaicensis.* *Syst. Ent.* 91. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 577. 21. *sis.*

Sloan. Iam. 2. 208. tab. 233. fig. 27. 28.

Habitat in America meridionali.

E spiritu vini extraæta colorem aeneum in triste testaceum mutat, aqua calida vero immissa naturalis color reuiuiscit.

28. *C. testacea*, elytris angulo antico spinoso basique perforatis. *Gen. Inf. Mant.* 219. *

*

Cassida

Cassida perforata. Pall. spicil. Zool. fasc. 9. 3. tab. 1. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

bicornis. 29. C. cyanea, elytris angulo antico spina truncata. Syst. Ent. 91. 18. Linn. Syst. Nat. 2. 576. 8. Amoen. acad. 6. pag. 393. 9.

Habitat in Indiis.

cyanea. 30. C. cyaneo aenea, elytris immaculatis excauato punctatis. Syst. Ent. 91. 19. Linn. Syst. Nat. 2. 577. 22. Mus. Lud. Vlr. 39.

Degeer Ins. 5. 181. 5. tab. 15. fig. 9.

Petiv. Gazoph. tab. 57. fig. 6.

Habitat in America. Mus. Brit.

spinifex. 31. C. ferruginea, elytris angulo antico spina porrecta, thorace vtrinque spina transuersa. Syst. Ent. 92. 20. Linn. Syst. Nat. 2. 576. 7. Amoen. acad. 392. 7.

Habitat in India.

Linea nigra ad basim elytrorum.

bidens. 32. C. atra, elytris antice porrectis, spina suturali erecta. Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.

Magna. Thoracis clypeus rotundatus, subemarginatus dorso carinato niger maculis duabus ferrugineis obsoletis. Elytra reticulata, atra, immaculata, basi ultra caput porrecta, carinata, spinaque in medio suturae elongata, acuta, atra nitida. Corpus atrum femoribus anticis intus pallidis.

gibbosa. 33. C. atra, thorace maculis duabus villoso aureis, elytris virescenti reticulatis, spina suturali obtusa.

Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.

Corpus magnum, atrum. Thoracis clypeus rotundatus, emarginatus maculis duabus magnis villoso aureis. Elytra atra viridi villoso reticulata margine nigro. Sutura in medio eleuata in spinam obtusam. Pedes nigri plantis fuscis.

truncata. 34. C. rufa, elytris subreticulatis nigro maculatis dorso gibbis.

Habitat - - - - - Mus. Dom. Banks.

Magna

Magna. Antennae nigrae. Thorax rufus maculis duabus dorsilibus nigris. Elytra basi truncata, gibba, rufa, subreticulata, nigro maculata. Margo rufus maculis simplicibus limboque ipso tenuissime nigro. Corpus nigrum.

35. C. flava immaculata, corpore testaceo, puncto scutellati nigro. *Syst. Ent.* 92. 21. *Linn. Syst. Nat.* 2. 276. II. *flavida*

Cassida pallide flava immaculata, corpore subtus pedibusque rufis. *Degeer Inf.* 5. 184. tab. 15. fig. 13.
Habitat in America australi.

36. C. testacea; margine punctisque flavis. *Syst. Ent.* 92. 22. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 576. 13. *Amoen. acad.* 6. 393. 10. *leucophaea*

Habitat in America.

37. C. flava, elytris coeruleo variegatis, lateribus vniuersaliatis. *Syst. Ent.* 92. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 576. 15. *reticulata*

Cassida pellucida albo flavescentia, elytrorum disco nigro reticulato. *Degeer Inf.* 5. 188. 14. tab. 15. fig. 17.

Habitat in America meridionali.

38. C. rufa, elytris coeruleo variegatis, lateribus bifasciatis. *Syst. Ent.* 92. 24. *Linn. Syst. Nat.* 2. 576. 16. *variegata*

Cassida fusco rubra, elytris scabris, nigro variegatis, thorace angulato. *Degeer Inf.* 5. 178. 2. tab. 15. fig. 6.

Habitat in America.

39. C. coerulea, thorace maculis duabus, elytris annulis *annulata*; rufis.

Cassida annulata. *Naturforsch.* 9. tab. 2. fig. 6.

Habitat in Indiis. *D. Schulz*.

Magna. Thorax obscurus, minime nitens maculis duabus latis obscure rufis. Elytra gibba obscure coerulea. annulis sex rufis, quibusdam flexuosis. Subtus nigra abdominis segmentis vtrinque puncto rufo.

40. C. sanguinea, elytris disco punctis nigris sparsis, matrice lineis ramosis nigris. *Syst. Ent.* 92. 25. *Linn. Syst. Nat.* 2. 577. 17. *grossa*

Fabr. Spec. Inf.

H

Cassida

Cassida grossa. *Naturforsch.* 6. tab. 4. fig. 1.
Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 1.
Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 5.
 Habitat in America meridionali.

exclama- 41. *C. elytris lineis ternis nigris, intermedia signum!*
tionis. referente. *Syst. Ent.* 92. 27. *Linn. Syst. Nat.* 2.
 577. 20.
 Habitat in America meridionali.

inaequa- 42. *C. ferrugineo aenea, elytris macula flava subouata*
lis. *disci.* *Syst. Ent.* 93. 28. *Linn. Syst. Nat.* 2. 578. 24.
Cassida bimaculata supra fusco aenea, subtus viridis
 nitens, elytrorum disco macula magna flava. *Degeer*
Inf. 5. 182. 6. tab. 16. fig. 10.
Naturforsch. 9. tab. 2. fig. 5.
Mus. Petropol. 650. n. 130.
 Habitat in America meridionali.

lateralis. 43. *C. fusco aenea, elytris macula flava lateralii.* *Syst. Ent.*
 93. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 578. 26.
Cassida fusco aenea, abdomine nigro nitido, elytrorum
margine exteriore macula magna flava. *Degeer*
Inf. 5. 184. 8. tab. 15. fig. 12.
Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 2.
 Habitat in America meridionali.
 Praecedenti duplo minor.

discoides. 44. *C. viridi aenea, elytris macula didyma flava disci.*
Syst. Ent. 93. 30. *Linn. Syst. Nat.* 2. 578. 27.
Cassida 4maculata viridi aenea, nitida, abdomine ni-
 gro, elytrorum disco maculis binis magnis flavis.
Degeer Inf. 183. 7. tab. 15. fig. 11.
 Habitat in America meridionali.

2puftula- 45. *C. elytris viridi aeneis, maculis duabus sanguineis.*
ta. *Syst. Ent.* 93. 31. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 578. 30.
Amoen. acad. 6. 392. 8.
Cassida 2puftulata. *Naturforsch.* 6. tab. 4.
 Habitat Caiennae.

6puftula- 46. *C. cyanea, elytris maculis tribus rubris.*
ta. Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Media.

Media. Thoracis clypeus transuersus, cyaneus, immaculatus, antice subemarginatus. Elytra medio gibba, cyanea maculis tribus rubris, prima baseos, secunda in margine et tertia versus marginem.

47. C. nigra, thorace punctis duobus, elytris septem *rpustula*-
ta. rubris.

Habitat in America meridionali. *Mus. Dr. Hunter.*

Medius. Clypeus vtrinque depresso, niger punctis duobus, apicis magnis rubris. Elytra nigra punctis septem magnis rubris 1. 2. 3. 1. Corpus et pedes nigra.

48. C. nigro coerulescens, elytris flavo maculatis, macu- *decussata*.
lis dorsalibus reticulatis, lateralibus distinctis, *Syst.*

*Ent. 93. 32. **

Habitat in Iamaica. *Mus. Brit.*

49. C. flauescens, elytris punctis duobus nigris. *Syst. apuncta*.
Ent. 93. 33. Linn. Syst. Nat. 2. 578. 29. ta.

Habitat in India orientali.

Variat elytrorum punctis tribus.

28. A L V R N V S.

1. A. ater, thorace coccineo, elytris flavis. *Syst. Ent. grossus.*
*94. 1. **

Habitat in Indiis.

2. A. viridi aeneus, femoribus tibiisque posticis dentatis. *femora-*
Tenebrio femoratus. Drury Ins. 2. tab. 34. fig. 5. tus.

Tenebrio viridis. Sulz. Hist. Ins. tab. 7. fig. 8.

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum, laeve, viridi aeneum, nitidum an-
tennis corpore dimidio brevioribus filiformibus ar-
ticulis ultimis nigris. Femora postica incrassata, bi-
dentata dente anteriori maiori. Tibiae elongatae,
obscurioris apice sinuatae, unidentatae.

29. C H R Y S O M E L A.

- tenebrio-* 1. *C.* aptera ouata atra antennis pedibusque violaceis.
sa. *Syst. Ent.* 94. 1.
Chrysomela atro purpurea, clytris coadunatis, alis nullis. *Geoff. Ins.* 1. 295. 19.
Tenebrio laeugatus apterus niger laevis, clytris lae-
 uibus, thorace lunato, subtus coeruleus. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 678. 29.
 Habitat in Europa australiori.
Larva gibba violacea, ano rufo, plantis vicitans, po-
 lyphaga.
- goettin-* 2. *C.* ouata atra, pedibus violaceis. *Syst. Ent.* 94. 2.
gensis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 586. 4. *Fn. Sv.* 506.
Chrysomela violaceo nigra ouata, thorace corporeaque
 conuexis. *Degeer Ins.* 5. 298. 8.
Roef. Ins. 2. *Scarab.* 3. tab. 5.
 Habitat in Germaniae gramine.
 Plantae rufae.
- vittata.* 3. *C.* ouata, cyanea, elytris margine vittaue media
 flauis.
 Habitat in America. *D. Schulz.*
 Magna, crassæ, ouata. Corpus totum cyaneo nitidum.
 Elytra laevia margine vittaue lata media flauis, quæ
 antice posticeque coeunt.
- bicolor.* 4. *C.* ouata viridi aenea, subtus violacea. *Syst. Ent.*
5. 3. *
Chrysomela viridi coerulea. *Forsk. Descript.* 77. 2.
 Habitat Alexandriae.
- lusitanica.* 5. *C.* ouata, thorace cupreo, elytris aeneis, subtus vio-
 lacea.
 Habitat in Lusitania. *Mus. Dom. Banks.*
 Maior *C. Bankii.* Caput nigrum primo antennaruin ar-
 ticulo violaceo. Thorax cupreus, obscure nitidus.
 Elytra vase punctata, aenea. Corpus subtus cum pe-
 dibus violaceum.
 Differt manifeste a *C. bicolor* elytris haud punctato
 striatis.

CLASS. I. ELEVTERATA. Chrysomela. 117

6. C. ouata, ferruginea, subtus nigra. *ferrugi-*
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. Dom. Banks. nea.
Magna. Caput ferrugineum antennis nigris basi ferru-
ginea. Thorax et elytra laevia, glabra, obscure
ferruginea, immaculata. Corpus subtus atrum.
7. C. ouata, supra aenea, subtus testacea. *Syst. Ent. Bankii.*
*95. 4. **
Habitat in Lusitania. Mus. Dom. Banks.
8. C. ouata nigra, elytris flavis, fasciis duabus punctis- *gibbosa.*
*que baseos nigris. Syst. Ent. 95. 5. **
Chrysomela gibbosa ouata nigra, elytris testaceis nigro
punctatis, fascia media posticaque nigris. Linn. Syst.
Nat. 2. 586. 2. Amoen. acad. 6. 393. 13.
Gran. Zooph. 606. tab. 14, fig. 5.
Habitat in America meridionali.
9. C. cyanea, coleoptris flavis, fascia maculisque duabus *trimacu-*
*nigris. Syst. Ent. 95. 6. ** *lata.*
Chrysomela trimaculata ouata nigra, elytris flavis,
maculis tribus oblongis nigris, intermedia suturae
communi. Linn. Syst. Nat. 2. 592. 45.
Habitat in America.
10. C. atra, thoracis margine flavo, puncto nigro, elytris *Adonidis.*
*flavis, sutura vittaque nigris. Gen. Inf. Mant. 220. **
Chrysomela Adonidis. Pall. It. 1. 463. 29.
Habitat in Austria. D. Schulz, in Adonide Sibiriae.
11. C. atra, thoracis margine testaceo, puncto nigro, ely- *dorsalis.*
tris testaceis, sutura abbreviata atra. Gen. Inf. Mant.
*220. **
Habitat in Austria. D. Schulz.
12. C. aenea, elytris flavis, sutura vittaque aeneis. *Syst. futuralis.*
*Ent. 95. 7. **
Habitat in America boreali. Mus. Dom. Banks.
13. C. ouata testacea, coleoptris flavis, punctis sedecim *14punctata-*
nigris, duobus communibus. *Chryso-*

118 CLASS. I. ELEVTERATA. Chrysomela.

Chrysomela 14punctata cylindrica, femoribus posticis incrassatis dentatis, thorace rufo, coleoptris flavis, punctis 14 nigris. *Linn. Syst. Nat. 2. 599. 94.*

Habitat in India.

Corpus testaceum, immaculatum. [Femora postica crassiora, vñidentata.

surinamensis. 14. *C. cyanea glaberrima*, antennis plantisque fuscis. *Syst. Ent. 96. 8.**

Chrysomela americana. *Sutz. Hist. Inf. tab 3. fig. 16.*

Habitat Surinami, in Europa boreali rarius.

Variat corpore toto aeneo.

asiatica. 15. *C. ouata viridi aenea nitidissima*, elytris cyaneis.

Chrysomela asiatica. *Pall. It. 1. 463. 30.*

Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*

Maior *C. surinamensi*. Caput, thorax, corpus viridia nitidissima, glabra. Elytra cyanea, nitida.

graminis. 16. *C. ouata viridi coerulea nitida*, antennis pedibusque concoloribus. *Syst. Ent. 96. 9. Linn. Syst. Nat. 2. 587. 7. Fn. Sv. 509.*

Chrysomela viridi coerulea. *Geoff. Inf. 1. 260. 10.*

Chrysomela ouata viridi coerulea, aurata, antennis dimidio fuscis, pedibus viridibus. *Degeer Inf. 5. 304. 16.*

Coccinella graminis. *Scop. carn. 220.*

Schaeff. Inf. tab. 21. fig. 10.

Habitat in Europae plantis, gramine.

cuprea. 17. *C. ouata*, capite thoraceque aeneis, elytris cupreis, corpore atro. *Syst. Ent. 96. 10. **

Chrysomela supra rubro cuprea, infra nigro nitens.

Geoff. Inf. 1. 263. 15.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

haemoptera. 18. *C. ouata violacea*, plantis alisque rubris. *Syst. Ent. 96. 11. Linn. Syst. Nat. 2. 587. 11. Fn. Sv. 572.*

Chrysomela tota violacea. *Geoff. Inf. 1. 258. 5.*

Chrysomela Hyperici ouata subglobosa violaceo coerulea, thorace ampio. *Degeer Inf. 5. 312. 20, tab. 9. fig. 13.*

Chryso-

CLASS. I. ELEVTERATA. Chrysomela. 119

Chrysomela graminis. Pod. Inf. 26.

Habitat in Europae hyperico.

19. *C. ouata nigra, elytris flauis, fascia media nigra, an. semiſtriatice posticeque nigro striatis. Syst. Ent. 96. 12. * ta.*
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

20. *C. ouata, thorace coerulescente, elytris rubris apice Populi: nigris. Syst. Ent. 96. 13. Linn. Syst. Nat. 2. 590. 30. Fn. Sv. 523.*

Chrysomela nigro coerulea, elytris rubris apice nigris.
Geoff. Inf. 1. 256. 1.

Chrysomela ouata obscure coerulea nitida, elytris flavo rubris, puncto terminali nigro. Degeer Inf. 5. 290.
1. tab. 8. fig. 16.

Scarabaeus viridis, alarum thecis miniatis. Lst. Scar.
Angl. 381. 6.

Coccinella Populi. Scop. Ent. 228.

Merian. Inf. 14. tab. 27.

Albin Inf. 63. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 9.
tab. 47. fig. 4. 5.

Habitat in populo tremula, folia saepius deuastans.

Larua hexapoda albo nigroque varia, duplice serie tuberculorum, e quibus humoris lacteis guttulas fundunt. Odorem spargunt grauem et ingratum.

Varietas rario elytris apice concoloribus.

21. *C. ouata obscure testacea. Syst. Ent. 97. 14. Linn. - staphylaea.*
Syst. Nat. 2. 590. 26. Fn. Sv. 518.

Chrysomela supra rubro cuprea, infra nigro nitens.
Geoff. Inf. 1. 263. 15.

Chrysomela cuprea ouata rubro cuprea, nitida oculis nigris. Degeer Inf. 5. 294. 3. tab. 8. fig. 24.

Habitat in Europae pratis.

22. *C. ouata testacea, elytris aeneis, margine testaceo. feruida.*
*Syst. Ent. 97. 15. **

Habitat in Insula Iava. *Dr. Mauduit.*

23. *C. ouata, thorace aurato, elytris testaceis. Syst. Ent. polita.*
97. *Linn. Syst. Nat. 2. 590. 27.*

Chrysomela viridi aenea, elytris rubicundis, punctis
sparsis. *Geoff. Inf.* 1. 257. 2.

Chrysomela ouata viridi aurata nitida, elytris flavo
rubris. *Degeer Inf.* 5. 294. 2. tab. 8. fig. 2, 3.

Coccinella polita. *Scop. Ent. carn.* 229.

Schaeff. *Icon.* tab. 65, fig. 9,
Habitat in salice, populo,

lurida. 24. *C. ouata nigra*, elytris castaneis, *Syst. Ent.* 97. 17.
Linn. Syst. Nat. 2. 590. 28.

Chrysomela nigra, elytris rubris striatis, striis puncta-
tis. *Geoff. Inf.* 1. 258. 3.

Habitat in Galliae vite.

Boleti. 25. *C. ouata nigra*, elytris fasciis tribus flavis repandis,
Syst. Ent. 97. 18. *Linn. Syst. Nat.* 2. 591. 36. *Fn.*
Sv. 52. 7. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 3. fig. 9.

Diaperis. *Geoff. Inf.* 1. 337. tab. 6, fig. 3. mal,

Diaperis. Schaeff. *Elem. tab.* 58.

Icon. tab. 77, fig. 6,

Dermeutes ater nitens, clytris nigris, fasciis duabus
flavis vndulatis. *Vdm. Diff.* 4, fig. 3.

Tenebrio Boleti alatus ouatus gibbus niger nitidus ely-
tris fasciis tribus transuersis vndatis fuluis. *Degeer*
Inf. 5. 49. 9. tab. 3. fig. 3.

Coccinella fasciata. *Scop. Ent.* 247.

Habitat in boletis arboreis.

vittata. 26. *C. ouata*, thorace nigro aeneo, coleoptris flavis, vit-
tis nouem fuscis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo *C. Boleti*. Caput et thorax nigro aenea,
obscura, immaculata. Elytra flava sutura vittisque
quatuor fuscis, quarum 2. 4. longiores apice coeunt.
Vittae hae fuscae vtrinque stria punctorum impresso-
rum. Corpus subtus fuscum.

stolidia. 27. *C. ouata ferruginea*, capite thoraceque flavis, elytris
variegatis. *Syst. Ent.* 98. 19, *

Habitat in America.

CLASS. I. ELEVTERATA, Chrysomela, 121

28. *C. ouata nigro aenea, capite thoracis lateribus elytrorumque macula duplice baseos ferrugineis.* *Syst. nis. Ent. 98. 20.* *
- Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.*
- Varietatem vidimus duplicem, alteram macula ferruginea in apice elytrorum, alteram punctis duobus in medio et maiori ad apicem ferrugineis.*
29. *C. ouata violacea, thoracis marginibus albis, puncto collaris nigro.* *Syst. Ent. 97. 21. Linn. Syst. Nat. 2. 591. 37. Fn. Sv. 528.*
- Chrysomela ouata violacea, thorace marginibus rubro, puncto nigro.* *Degeer Inf. 5. 302. 13.*
- Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 11. 12.*
- Habitat in Europae, Americae borealis salice.*
30. *C. ouata nigra, thorace rufo bimaculato, elytris rufi.* *Syst. Ent. 98. 22.*
- Chrysomela viminalis ouata nigra, thorace bimaculato, elytris testaceis.* *Linn. Syst. Nat. 2. 590. 31. Fn. Sv. 524.*
- Chrysomela rubra, thorace punctis duobus nigris, coleoptrorum sutura nigra.* *Geoff. Inf. 1. 265. 18.*
- Degeer Inf. 5. 297. 6.*
- Coccinella signata.* *Scop. Ent. carn. 233.*
- Habitat in Europae salice.*
- Hanc cum C. haemorrhoidali copula connexam vidit Degeer.*
31. *C. ouata rufa, elytris punctis posticeque cyaneis.* *Syst. cyanipes. Ent. 98. 23.* *
- Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.*
32. *C. ouata rufa, thorace macula dorsali punctisque duabus, coleoptris maculis octo cyaneis.* *Syst. Ent. 99. 24.* *
- Chrysomela rubra, elytro singulo maculis quinque nigris.* *Geoff. Inf. 1. 258. 4.*

Chrysomela rufipes ouata supra rufa, subtus nigra, elytris punctis subquinis nigris, pedibus rufis. *Degener*
Ins. 5. 294. 4. tab. 8. fig. 25.

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 13.

Habitat in Europae populo.

Elytrorum puncta mox plura, mox pauciora.

pallida. 34. C. ouata flavescentia, oculis nigris. *Syst. Ent. 99. 26.*
Linn. Syst. Nat. 2. 589. 25. Fn. Sv. 521.

Crioceris pallida oculis nigris. *Geoff. Ins. 1. 243.*

Habitat in Europae salice.

striata. 35. C. ouata atra nitida, elytris striatis testaceis, sutura atra.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Media, gibba. Caput, thorax, corpus atra, nitida, immaculata. Elytra testacea sutura nigra punctato striata, striis apice per paria coeuntibus.

notata. 36. C. ouata, thorace fulvo, punctis quatuor nigris, elytris pallidis nigro variis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura C. pallidæ. Caput fuluum basi nigrum. Thorax fuluus, nitidus punctis quatuor nigris transuersim positis. Elytra glabra, laevia, nitida, pallida fasciis duabus anticis valde vndatis punctoque postico nigris. Corpus pallidum abdomine basi nigro.

vulpina. 37. C. ouata atra, elytris margini punctis quatuor apice que nigro maculato albis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentis. Caput, thorax, corpus nigra, obscure nitida, immaculata. Elytra nigra margini punctisque quatuor anticis flavis. Apex late flauus maculis tribus nigris.

crafficornis. 38. C. ouata flavescentia, elytris maculis duabus nigris.
*Syst. Ent. 99. 27. **

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

variolosa. 39. C. ouata nigra, elytris rubris, punctis sparsis impressis coeruleis. *Syst. Ent. 99. 28. Linn. Syst. Nat. 2. 591. 33.*

Habitat in Africa.

CLASS. I. ELEVTERATA. Chrysomela. 123

40. C. ouata, thorace viridi, elytris rubris, fascia inter *lapponi-*
punctum maculamque lunatam coerulea. *Syst. Ent.* *ca.*
 99. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 591. 34. *Fn. Sv.* 526.
Chrysomela curuilinea ouata viridi aenea nitida, elytris
 fasciis curuis testaceis. *Degeer Inf.* 5. 302. 12. tab.
 9. fig. 3.
Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 2.
 Habitat in Europa boreali.
 Elytrorum sutura coerulea.
41. C. ouata rufa, elytris fasciis tribus atro coeruleis vn- *vndulata.*
 dulatis. *Syst. Ent.* 100. 30. *Linn. Syst. Nat.* 2. 591.
 35. *Amqen. acad.* 6. 393. 14.
 Habitat in India.
42. C. ouata, elytris fuscis, punctis octo pallidis quibus- *18gutta-*
 dam connexis. *Syst. Ent.* 100. 31. * *ta.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
43. C. ouata coerulea, thorace femoribus anoque rufis. *Polygoni.*
Syst. Ent. 100. 32. *Linn. Syst. Nat.* 2. 589. 24. *Fn.*
Sv. 520.
Chrysomela nigra, elytris coeruleo viridibus, thorace
 pedibus antennarumque basi rufis. *Geoff. Inf.* 1.
 283. 4.
Chrysomela ouata violacea, thorace lato pedibusque
 rufo flavis. *Degeer Inf.* 5. 322. 26.
Reaum. Inf. 3. tab. 17. fig. 14. 15.
Schaeff. Icon. tab. 51. fig. 5.
 tab. 161. fig. 4.
 tab. 173. fig. 4.
 Habitat in polygono aruensi.
 Femina grauida ultra coleoptra ventricosa euadit.
 Pedes interdum rufi plantis solis nigris.
44. C. ouata testacea, elytris sutura lineolaque media *brunnea.*
 fuscis.
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Parua. Corpus totum obscure testaceum. Thorax lae-
 uis, nitidus punctis duobus nigris. Elytra puncticata
 sutura lineolaque media fuscis, quae mox longior,
 mox breuior.

cerealis. 45. C. ouata aurata, thorace lineis tribus coleoptrisque quinque coeruleis. *Syst. Ent.* 100. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 588. 17.

Chrysomela aurea fasciis coeruleis cupreisque alternis, punctis inordinatis. *Geoff. Inf.* 1. 262. 14.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Europae australioris segete, in spartio scopario. *D. Prof. Hermann.*

Variat rarius colore purpureo loco aurei.

america- 46. C. ouata viridi aenca, elytris striis quinque sanguineis. *Syst. Ent.* 100. 34.

Habitat in America.

Caput aeneum macula verticis coccinea.

festuca. 47. C. ouata nigro aenea, elytris lineis tribus suturaque antica flavis. *Syst. Ent.* 100. 35.*

Habitat in America. *Mus. Brit.*

fastuosa. 48. C. ouata aurea, coleoptris lineis tribus coeruleis. *Syst. Ent.* 101. 36. *Linn. Syst. Nat.* 2. 588. 18.

Chrysomela viridis nitida, thorace antice excavato, fasciis elytrorum longitudinalibus coeruleis. *Geoff. Inf.* 1. 261. 11.

Coccinella fastuosa. *Scop. Ent. carn.* 232.

Habitat in Europae laniio albo.

speciosa. 49. C. ouata viridi sericea, elytris lineis duabus aureis. *Syst. Ent.* 101. 37. *Linn. Syst. Nat.* 2. 588. 19.

Coccinella speciosissima. *Scop. Ent. carn.* 231.

Hollar. Inf. tab. 6. fig. 2.

Habitat in Germaniae syluis.

Lineae elytrorum antice posticeque coeunt.

cyanæa. 50. C. ouata, thorace rotundato cylindrico, corpore cyaneo nitido, pedibus nigris.

Habitat in Americae meridionalis insulis. *Dom. Lund.* Manifeste differt a C. Surinamensi thorace osinino cylindrico minime marginato, vti in C. aurata.

aurata. 51. C. ouata, thorace rotundato cyaneo, elytris aureis, margine cyanco. *Syst. Ent.* 101. 38.*

Habitat in America boreali.

CLASS. I. ELEVTERATA. Chrysomela. 125

52. C. ouata atra, coleoptrorum limbo sanguineo. *Syst. limbata.*
Ent. 101. 39. *

*Chrysomela nigro coerulea, elytris luridis, punctatis,
margine exteriori et anteriori rubris.* *Geoff. Ins. 1.
260. 9.*

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 20.

Habitat in Europa australiori.

53. C. ouata atra, elytris margine exteriori sanguineis. *sanguino-*
*Syst. Ent. 101. 40. Linn. Syst. Nat. 2. 591. 38. Fn. lenta.
Sv. 529.*

*Chrysomela nigro coerulea, elytris atris punctatis, mar-
gine exteriori rubro.* *Geoff. Ins. 1. 259. 8. tab. 4.
fig. 8.*

*Chrysomela rubro marginata ouata supra nigra subtus
violacea nitida, elytris scabris rubro marginatis.* *De-
geer Ins. 5. 298. 7. tab. 8. fig. 26.*

Buprestis sanguinolenta. *Scop. carn. 203.*

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 15.

Sulz. Hist. Ins. tab. 3. fig. 10.

Habitat in Europa.

54. C. ouata nigro aenea, elytris margine luteis. *Syst. marginata*
Ent. 101. 41. Linn. Syst. Nat. 2. 591. 39. Fn. Sv. 529. la.

*Chrysomela ouata supra viridi aenea, obscura nitida,
subtus nigra, elytris margine luteo rubris.* *Degeer
Ins. 5. 303. 14.*

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 19.

Sulz. Hist. Ins. tab. 3. fig. 10.

Habitat in Europae pratis apricis.

Elytra striato punctata.

55. C. ouata nigro coerulea, thorace elytrisque margine *marginea*.
luteis. *Syst. Ent. 102. 42. Linn. Syst. Nat. 2. 591. 40. la.
Fn. Sv. 531.*

*Chrysomela Ranunculi oblongo ouata viridi aenea, ob-
scura, nitida, thorace elytrisque margine luteis.* *De-
geer Ins. 5. 304. 15.*

Scarabaeus antennis clauatis tertius. *Raj. Ins. 99.*

Habitat in Europae ranunculis.

- hannoue-* 56. *C. ouata cyanea*, thorace margine elytris margine
riana. vittaque ferrugineis. *Syst. Ent.* 102. 43. *
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
- litura.* 57. *C. ouata rufescens*, elytris futura lineaque longitudi-
nali nigris. *Syst. Ent.* 102. 44. *
Habitat in Anglia, capta in fabuletis Richmondensibus
die VI. Maji.
- lineola.* 58. *C. ouata flava*, coleoptris punctis vndeциm lineisque
duabus nigris. *Syst. Ent.* 102. 45. * *Linn. Syst. Nat.*
2. 593. 47.
Habitat in America.
- sacra.* 59. *C. ouata supra rufa*, thoracis linea punctisque duo-
bus, elytrorumque futura nigris. *Syst. Ent.* 102. 46.
Linn. Syst. Nat. 2. 593. 49. *Mus. Lud. Vlr.* 40.
Habitat in Palaestina.
Alae sanguineae.
- haemor-* 60. *C. ouata nigra nitida*, antennis basi flavescentibus,
rhoidalis. ano supra rubro. *Syst. Ent.* 102. 47. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 587. 6. *Fn. Sv.* 508.
Chrysomela ouata nigra seu rufa, thorace punctis duo-
bus nigris, antennarum basi subflava. *Degeer Inf.*
5. 287. 6.
Coccinella haemorrhoidalis. *Scop. Ent. carn.* 225.
Habitat in betula, alno.
Elytra striato - punctata.
- fucata.* 61. *C. ouata atra*, thorace elytrisque viridi aeneis.
Habitat in Italia. *Dom. Allioni.*
Statura et magnitudo *C. haemorrhoidalis.* Caput uti
corpus subtus pedisque atra, immaculata. Thorax vi-
ridis, glaber, nitens. Elytra obscuriora vase punctata.
- fuscicor-* 62. *C. ouata viridi aenea*, antennis tibiisque nigris.
nis. Habitat in Russia. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo et statura *C. haemorrhoidalis.* Caput, tho-
rax, elytra viridi aenea, immaculata, glabra, nitida.
Corpus subtus magis obscurum. Antennae et pedes
nigri.

63. C. ouata nigra, thorace rotundato angustiori, pedibus posticis elongatis. *Syst. Ent.* 203. 48.*

Chrysomela obscura subcylindrica, thorace pedibusque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 299. 96.

Chrysomela nigro quadrata subcylindrica nigra, abdome subquadrato, thorace globoso, antennis longis. *Degeer Inf.* 5. 336. 40.

Habitat in Europae plantis.

Thorax valde gibbus, elytris angustior.

64. C. ouata testacea, elytris macula fusca.

spundata

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura C. philadelphicae, at maior. Antennae fuscae basi testacea. Caput et thorax laevia, testacea, immaculata. Elytra laevia, testacea macula magna fusca pone medium. Pedes testacei apice fusci.

65. C. ouata viridis, elytris flavis viridi maculatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 103. 49.

philadelphica

Chrysomela philadelphica ouata viridis, elytris flavis, punctis virescentibus oblongiusculis, antennis pedibusque ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 592. 44.

Chrysomela ouata viridi aenea obscura, elytris flavis punctis virescenti aeneis oblongiusculis, antennis pedibusque rufis. *Degeer Inf.* 5. 353. 6. tab. 16. fig. 13.

Petiv. Gazoph. tab. 26. fig. 11.

Habitat in Pensyluania.

Variat futura viridi et flava.

66. C. ouata coerulescens nitida subtus nigra. *Syst. Ent.* 103. 50. *Linn. Syst. Nat.* 2. 588. 16. *Fn. Sv.* 515.

armorae

Chrysomela Plantaginis subglobosa supra violacea nitida, subtus nigra punctis excavatis striatis. *Degeer Inf.* 5. 322. 25.

Habitat in cochlearia armoracia, ranunculo aquatili, flammula, plantagine.

67. C. oblonga atra, elytris testaceis, macula atra. *Syst. Ent. App.* 820. *

maculata

Habitat in America. *Dom. Drury.*

fasciata. 68. *C. oblonga atra*, elytris fasciis tribus flavis. *Syst. Ent.*
App. 820. *
Habitat in America. Dom. Drury.

ruficollis. 69. *C. oblonga viridi aenea*, thorace pedibusque rufis.
Syst. Ent. App. 820. *

Chrysomela nigra, elytris coeruleo viridibus, thorace
pedibus antennarumque basi rufis. *Geoff. Inf. 1.*
263. 16.

Habitat in Europa australiori. Dom. Lee.

Tanaceti. 70. *C. oblonga nigra punctata*, elytris coriaceis. *Syst.*
Ent. 103. 51.

Chrysomela Tanaceti ouata atra punctata, antennis
pedibusque nigris. *Linn. Syst. Nat. 2. 587. 5. Fn.*
Sv. 507.

Chrysomela ouata atra opaca punctata. *Degeer Inf. 5.*
299. 4. tab. 8. fig. 27.

Galleruca atro fusca, elytris lineis tribus eleuatis pun-
ctis numerosis. *Geoff. Inf. 1. 252. 1. tab. 4. fig. 6.*
Merian. Inf. tab. 68.

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 14.

Habitat in Europae tanaceto.

Variat rarius colore toto obscure griseo.

12puncta- 71. *C. oblonga*, thorace flavescente, elytris viridibus,
punctis sex nigris. *Syst. Ent. 103. 52.* *

Habitat - - - -

Alni. 72. *C. oblonga violacea*, elytris vage punctatis; pedibus
antennisque nigris. *Syst. Ent. 103. 53. Linn. Syst.*
Nat. 2. 587. 9. Fn. Sv. 511.

Chrysomela ouata supra violacea subtus nigra, punctis
excauatis sparsis, thorace minuto, antennis longis
nigris. *Degeer Inf. 5. 314. 21. tab. 9. fig. 18.*

Cryptocephalus violaceus punctis inordinatis. *Geoff.*
Inf. 1. 332. 1.

Scarabaeus Alni coeruleus. *Frisch. Inf. 7. 13. tab. 8.*
Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 13.

Schaeff. Elem. tab. 53. fig. 1. 2.

Habitat in betula, alno:

CLASS. I. ELEVTERATA. Chrysomela. 129

73. C. oblonga pallida, thorace macula, elytris lineis tribus nigris. *Absinthii.*

Chrysomela Absinthii. Pall. It. 2. 725. 70.

Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnitudine C. Tanaceti. Caput pallidum, basi nigrum. Thorax pallidus macula media nigra. Elytra pallida lineis tribus atris, quae tamen nec basin nec apicem attingunt, exteriore apice coeunt. Pedes ferruginei geniculis nigris.

74. C. oblonga flavescentia nitida, oculis fuscis. *concolor.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Paullo major C. Tanaceti. Corpus totum pallide flavescentia omnino concolor, glabrum, nitidum.

75. C. oblonga picea, pedibus testaceis. *picea.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum, piceum sive obscure ferrugineum, glabrum, nitidum. Thorax puncto vtrinque impresso. Pedes pallide testacei.

76. C. oblonga violacea, elytris punctato striatis. *Syst. Betulae.*

Ent. 104. 54. Linn. Syst. Nat. 2. 587. 10. Fn.

Su. 514.

Chrysomela nigro purpurea, punctis excauatis striata.
Geoff. Ins. 1. 264. 17.

Chrysomela coerulea salicis subglobosa viridi-coerulea
nitida obscura punctis excauatis sparsis. *Degeer Ins.*
5. 318. 24. tab. 9. fig. 24. a. b.

Coccinella Betulae. Scop. Ent. carn. 221.

Roef. Ins. 2. Scar. 3. tab. 1.

Habitat in betulae albae foliis paginam inferiorem exedens.

7. C. oblonga, thorace fulvo viridi punctato, elytris vi. tricoloribus nitidis, abdomine nigro.

Habitat *Mus. Dom. Banks.*

Maior C. Betulae. Caput viride nitens, ore fulvo antennisque fuscis. Thorax laevis, nitens, fulvus punctis quinque viridibus ad basin 4. 1. Elytra glabra, laetitia, nitida, viridia, immaculata. Pectus fuluum, abdomen nigrum cinereo subtomentosum. Pedes fului.

Fabr. Spec. Ins.

I

78. C.

130 CLASS. I. ELEVTERATA. Chrysomela.

- Vitelli-* 78. *C. oblonga viridi aenea.* *Syst. Ent.* 104. 55. *
nae. *Chrysomela Vitellinae ouata viridi coerulea.* *Linn.*
Syst. Nat. 2. 589. 23. *Fn. Sv.* 519.
Chrysomela oblongo ouata aenea nitida, abdomine su-
pra nigro, apice flauescente, elytris striato puncta-
tis. *Degeer Inf.* 5. 323. 27.
Coccinella Vitellinae. *Scop. carn.* 224.
Roes. Inf. 2. *Scarab.* 3. p. 5. tab. 1.
Habitat in Europae salice.
- vulgatissi-* 79. *C. oblonga coerulea, antennis basi ferrugineis.* *Syst.*
ma. *Ent.* 104. 56. *Linn. Syst. Nat.* 2. 589. 22. *Fn.*
Sv. 517.
Chrysomela coerulea Betulae oblongo ouata, supra coe-
ruleo violacea, subtus virescens, punctis excavatis
striatis, thorace amplio, antennis longis. *Degeer*
Inf. 5. 317. 23.
Coccinella vulgatissima. *Scop. carn.* 222.
Habitat in Europae salice.
Praecedenti paullo maior.
- aenea.* 80. *C. oblonga viridis nitida, elytris aeneis.* *Syst. Ent.*
104. 57.
Chrysomela aenea ouata viridis nitida, abdomine posti-
ce ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 587. 8. *Fn.*
Sv. 510.
Chrysomela viridis Alni ouata viridi aurata nitida, tho-
race antice excavato, abdomine supra nigro apice
testaceo, elytris punctis sparsis. *Degeer Inf.* 5. 305.
18. tab. 9. fig. 4.
Habitat in betula, alno.
- analis.* 81. *C. oblonga atra, elytris fuscis, margine exteriori te-*
staceo. *Syst. Ent.* 104. 58. *Linn. Syst. Nat.* 2. 582. 42.
Habitat ad praedium ill. Archiatri à Linné, Ham-
marby.
- cruenta.* 82. *C. oblonga sanguinea, thorace immaculato, elytris*
punctis tribus nigris.
Habitat in India orientali. *Muf. Dom. Banks.*

Statuta

CLASS. I. ELEVTERATA. Chrysomela. 131

Statura omnino C. coccineae. Caput et thorax sanguinea, immaculata, nitida. Elytra, laevia, sanguinea, nitida puncto unico baseos duobusque paribus in medio nigris. Corpus pallidius sanguineum, immaculatum.

33. C. oblonga, thorace marginato sanguineo, macula nigra, elytris sanguineis, maculis duabus nigris. *Syst. Ent.* 105. 59. *Linn. Syst. Nat.* 2. 592. 43. *Fn. Sv.* 532. *coccinea.*

Chrysomela 4maculata ouata, thorace quadrato rufo macula nigra, elytris rubris, maculis duabus nigris, capite pedibus antennisque nigris. *Degeer Infl.* 5. 301. 10. tab. 9. fig. 1.

Coccinella coleoptris rubris maculis 4 nigris. *Vdm.* *Diss.* 13.

Habitat in Europae borealis corylo.

34. C. oblonga; thorace testaceo immaculato, elytris testaceis, maculis duabus nigris. *Gen. Infl. Mant.* 221. * *4maculata.*

Habitat in nemoribus Kiloniensibus. *Dom. Lund.*

35. C. oblonga nigra, coleoptris rubris, punctis decem immaculatis, duobus communibus. *Syst. Ent.* 105. 60. * *lata.*

Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*

36. C. oblonga viridi aenea, thoracis marginibus albis, 20punctatis elytris albis, maculis decem aeneis. *Syst. Ent.* 105. 61. * *ta.*

Chrysomela vicies maculata elytris pallidis, maculis decem nigris. *Bergstr. Nomencl.* 1. 87. tab. 13. fig. 10; *Pet. Gazoph.* tab. 29. fig. 5.

Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*

- ** Alticae saltatoriae femoribus posticis incrassatis.

37. C. saltatoria flavia, thorace nigro punctato, elytris thoracicae violaceis.

Altica thoracica. *Syst. Ent. App.* 821. *

Habitat in America boreali. *Dom. Lee.*

132 CLASS. I. ELEVTERATA. Chrysomela.

2guttata. 88. C. saltatoria ferruginea, thorace elytrorumque maculis duabus albis.

Altica 2guttata. *Syst. Ent. App.* 821. *

Habitat in America. *Dom. Drury*.

4guttata. 89. C. saltatoria ferruginea, thorace elytrorumque punctis quatuor albis.

Habitat Cajennae. *D. Schulz*.

Nimis affinis videtur C. 2guttatae, at puncta elytrorum quatuor magna distincta. Pedes femoribus posticis incrassatis.

cincta. 90. C. saltatoria nigra, elytris viridi aeneis, margine punctisque duobus albis.

Habitat in Lusitania. *Dr. Gray. Mus. Dom. Banks*.

Magna inter C. saltatorias. Caput nigrum. Thorax obscure aeneus margine albo. Margo et anticus et posticus in medio albus. Elytra viridi aenea margine punctisque duobus dorsalibus albis. Corpus atrum. Femora postica valde incrassata.

marginalia. 91. C. saltatoria flavescentia, elytris viridibus, margine pallido.

Altica marginata. *Syst. Ent. App.* 822. *

Habitat in America boreali. *Dom. Drury*.

bicolor. 92. C. saltatoria rufa, elytris femoribusque posticis coeruleis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 593. 52.

Chrysomela saltatoria rubra, elytris coeruleis nitidissimis. *Degeer Inf.* 5. 357. 12. tab. 16. fig. 20.

Altica bicolor. *Syst. Ent.* 112. 1.

Habitat in America.

aequinoctialis. 93. C. saltatoria, thorace rubro, elytris violaceis, maculis quatuor albis alternis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 596. 71.

Chrysomela saltatoria, thorace carneo elytris violaceis nitidis, singulo maculis quatuor albis. *Degeer Inf.* 5. 356. 11. tab. 16. fig. 19.

Altica aequinoctialis. *Syst. Ent.* 112. 2.

Habitat in America meridionali.

CLASS. I. ELEVTERATA. Chrysomela. 133

94. C. saltatoria viridi coerulea. *Linn. Syst. Nat. 2. 593. oleracea.*
Fn. Sv. 534.
Chrysomela saltatoria ouata tota viridi coerulea, antennis nigris. Degeer Inf. 5. 344. 49.
Altica oleracea. Syst. Ent. 112. 3. Geoff. Inf. 1. 245. 1. Scop. Ent. carn. 212.
 Habitat in Cotyledonibus plantarum, in primis tetradynamistarum, brassicae, rapae, raphaui, quas misere destruit. Immersione seminum ante seminacionem celerius crescunt et magnitudinem attingunt, qua damnum inferre haud amplius valent.
 Pellitur cineribus vegetabilium, in primis tabaci.
95. C. saltatoria, thorace pallido, elytris aeneis, maculis *albicollis.* duabus fasciaque aureis.
*Altica albicollis. Syst. Ent. 112. 4. **
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
96. C. saltatoria, thorace rufescente, elytris pallidis, *su-fuluicollis.* tura maculisque duabus nigris.
 Habitat - - - - *Dr. Forster. Mus. Dom. Banks.*
 Media. Caput atrum, nitidum. Thorax rufescens im- maculatus margine tamen pallidiore. Elytra laenia, nitida, pallida; futura, quae postice puncto maiori terminatur, maculisque duabus, altera baseos, altera medii magnis, atris. Subtus pallida geniculis pedum nigris. Femora postica incrassata, rufa.
97. C. saltatoria viridis nitida, pedibus testaceis, femori- *Hyoscyam.* bus posticis violaceis. *Linn. Syst. Nat. 2. 594. 94. mi.*
Fn. Sv. 536.
Chrysomela ouata saltatoria viridi coerulecenti aenea, elytris punctatis, pedibus rufis, femoribus posticis viridi aeneis. Degeer Inf. 5. 345. 51.
Altica Hyoscyami. Syst. Ent. 113. 5.
Altica coerulea, elytris striatis, tibiis ferrugineis. Geoff. Inf. 1. 248. 11.
Capricornus exiguus saltatorius. Raj. Inf. 98. 9.
 Habitat in Europae hyoscyamo, brassica.
8. C. saltatoria viridi aenea, pedibus nigris. *nigripes.*
*Altica nigripes. Syst. Ent. 113. 6. **
 Habitat in Anglia. *Mus. Dr. Hunter.*

nitidula, 99. C. saltatoria viridis nitens, capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis.

Chrysomela nitidula saltatoria, elytris coeruleis, capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 60. *Fn. Sv.* 542.

Chrysomela saltatoria ouata, elytris coeruleis, thorace aureo, antennis pedibusque rufis, femoribus posticis coeruleis. *Degeer Inf.* 5. 346. 54.

Altica nitidula. *Syst. Ent.* 113. 7.

Altica nigra aurata, thorace aureo femoribus ferrugineis. *Geoff. Inf.* 1. 249. 13.

Schaeff. Icon. tab. 87. fig. 5.

Habitat in Europae falice,

Helxines, 100. C. saltatoria viridi aenea, antennis fuscis, pedibus testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 58. *Fn. Sv.* 543.

Chrysomela viridi aurata saltatoria ouata nitidissima, pedibus antennisque rufis, elytris punctatis. *Degeer Inf.* 5. 345. 52.

Chrysomela Helxines. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 3. fig. 12.

Altica Helxines. *Syst. Ent.* 113. 8.

Altica aurea, pedibus flaviis. *Geoff. Inf.* 1. 249. 14.

Habitat in polygono fagopyro aliisque.

trifascia- 101. C. saltatoria supra albida, fasciis tribus fuscis. *Linn. ta.* *Syst. Nat.* 2. 594. 61.

Altica trifasciata. *Syst. Ent.* 113. 9.

Habitat in Europae plantis.

Fascia unica capitisi, duae elytrorum. Femora rufa.

Modeeri, 102. C. saltatoria viridi aenea, elytris macula postica pedibusque anticeis flaviis.

Chrysomela Modeeri saltatoria aenea nitida, elytris apice flaviis, pedibus anterioribus tibiisque posticis luteis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 57. *Fn. Sv.* 539.

Habitat in Europae plantis.

erythrocephala- 103. C. saltatoria atro coerulea, capite geniculisque pedum rufis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 56. *Fn. Sv.* 538.

Altica erythrocephala. *Syst. Ent.* 114. 10.

Altica nigro aenea, elytris striatis, pedibus ferrugineis. *Geoff. Inf.* 1. 246. 4.

Habitat in Europae plantis.

104. C. saltatoria nigra, thorace clytrisque cinereis. *atricilla.*
Chrysomela atricilla nigra, thorace elytris tibiisque
 testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 55. *Fn. Sv.* 537.
Altica atricilla. *Syst. Ent.* 114. 11.
Altica elytris pallido flavis, capite nigro. *Geoff. Inf.*
 1. 251. 19.
 Habitat in Europae plantis.
105. C. saltatoria nigra, thorace clytrorumque margine *dorsalis*.
 pallidis.
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino C. atricillae et forte eius mera varie-
 tas. Differt tantum dorso coleoptrorum nigro.
106. C. saltatoria atra, elytris tibiisque pallidis. *anglica.*
Altica anglica. *Syst. Ent.* 114. 12. *
 Habitat in Angliae plantis. *Mus. Dr. Hunter.*
107. C. saltatoria nigra, coleoptris punctis quatuor rufis. *4puſtula-*
Altica 4puſtulata. *Syst. Ent.* 114. 13. * *Geoff. Inf.* 1. *ta.*
 250. 15.
 Habitat in Angliae, Galliae hortis.
108. C. saltatoria coerulea, capite thorace pedibus anten- *rufipes.*
 narumque basi rufis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 595. 65.
Fn. Sv. 545.
Chrysomela saltatoria ouata coerulea, capite thorace
 pedibusque rufis, antennis dimidio rufis fuscisque,
 elytris laevis. *Degeer Inf.* 5. 343. 47. tab. 10.
 fig. 11.
Altica rufipes. *Syst. Ent.* 114. 14.
Altica nigra, elytris coeruleis, thorace pedibusque ru-
 fis. *Geoff. Inf.* 1. 245. 2.
Schaeff. Icon. tab. 166. fig. 5.
 Habitat in Europae plantis.
 Si in illimam, at maiorem, ex Africa aequinoctiali, in
Mus. Dom. Banks vidi.
109. C. saltatoria violacea, capite thoraceque rufis, pedi- *fusipes.*
 bus nigris.

Altica fuscipes. *Syst. Ent.* 114. 15. *

Habitat in Angliae maluis.

Forte praecedentis varietas.

testacea. 110. C. saltatoria testacea gibba, elytris laevissimis.

Altica ouata ferruginea, elytris punctis sparsis. *Geoff. Inf.* 1. 250. 17.

Altica testacea. *Syst. Ent.* 114. 16. *

Habitat in Angliae plantis. *Mus. Dom. Banks.*

exoleta. 111. C. saltatoria ferruginea, elytris striatis.

Chrysomela exoleta saltatoria liuida, pedibus testaceis, capite abdomineque fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 59. *Fn. Sv.* 541. ?

Chrysomela cylindrica flavo testacea, abdomine nigro elytris punctatis. *Degeer Inf.* 5. 338. 42. at haud saltatoria.

Altica exoleta. *Syst. Ent.* 115. 17.

Altica oblonga ferruginea, elytris striatis. *Geoff. Inf.* 1. 250. 16.

Habitat in Echii floribus.

holistica. 112. C. saltatoria nigra nitida, elytris apice puncto rubro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 995. 67. *Fn. Sv.* 544.

Altica holistica. *Syst. Ent.* 115. 18.

Habitat apud nos frequens, olera depascens.

tabida. 113. C. saltatoria pallida, oculis nigris.

Altica tabida. *Syst. Ent.* 115. 19. *

Habitat in Angliae plantis. *Mus. Dom. Banks.*

nemorum. 114. C. saltatoria atra, elytris flavis, margine omni nigro.

Chrysomela nemorum saltatoria, elytris linea flava, pedibus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 995. 62. *Fn. Sv.* 543.

Chrysomela fasciata saltatoria ouata nigra nitida, elytris fascia flava longitudinali. *Degeer Inf.* 5. 347. 55.

Altica nemorum. *Syst. Ent.* 115. 20.

Altica atra, elytris longitudinali in medio flavescentibus. *Geoff. Inf.* 1. 247. 9.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 11.

Habitat

CLASS. I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus.* 137

Habitat in pulmonaria, dentaria, et cardamine; polyphaga.

Varietates duae magnitudine tantum differunt.

115. *C. saltatoria atra nitida, antennarum basi plantisque piceis.* *atra.*

*Altica atra. Syst. Ent. 115. 21. **

Altica nigra subrotunda, tibiis ferrugineis. Geoff. Ins. 1. 247. 8.

Habitat Hafniae.

116. *C. saltatoria suborbiculata deppressa nigra. Linn. Syst. hemisphaerica.* *Nat. 2. 595. 68.*

Chrysomela saltatoria subglobosa obscure fusca nitida.

Degeer Ins. 5. 348. 8.

Altica hemisphaerica. Syst. Ent. 115. 22.

Habitat in Saxoniae corylo.

117. *C. saltatoria flauescens, elytris margine fasciaque sanguineis. Linn. Syst. Nat. 2. 595. 69.* *surinamensis.*

Chrysomela saltatoria, thorace rubro pallido, elytris rufis, fascia transuersali coccinea, antennis pedibusque griseis. Degeer Ins. 5. 355. 10. tab. 16. fig. 17.

Altica surinamensis. Syst. Ent. 116. 23.

Habitat Surinami.

118. *C. saltatoria pallida, elytris nigris, linea longitudinali flexuosa alba. Linn. Syst. Nat. 2. 595. 70.* *S. littera.*

Chrysomela saltatoria griseo flava, elytris fuscis, fascia longitudinali flexuosa albida. Degeer Ins. 5. 357. 13. tab. 16. fig. 21.

Altica S. littera. Syst. Ent. 116. 24.

Habitat Surinami.

30. CRYPTOCEPHALVS.

1. *C. niger obscurus, elytris pallidis, maculis tribus nigris, pedibus anticis elongatis. Syst. Ent. 105. 1. ** *longipes.*

Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 3.

Habitat in Germaniae corylo, salice

6macula- 2. *C. niger*, thorace rubro immaculato, elytris rubris, tuis. punctis tribus nigris.

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Paullo maior C. 4punctato. Antennae breues, serratae, nigrae. Thorax rufus, nitidus, immaculatus. Elytra glabra, rufa, nitida puncto unico ad basin et duobus in medio nigris.

4puncta- 3. *C. niger*, elytris rubris, punctis duobus nigris, anten- tuis. punctis breibus serratis. *Syst. Ent.* 106. 2.

Chrysomela 4punctata cylindrica, thorace nigro, elytris rubris, punctis duobus nigris, antennis breibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 596. 76. *Fn. Sv.* 432.

Chrysomela 4punctata thorace nigro, elytris rubris, maculis duabus rubris, antennis serratis. *Degeer Inf.* 5. 32. tab. 10. fig. 7.

Melolontha coleoptris rubris maculis quatuor nigris, thorace nigro. *Geoff. Inf.* 1. 195. tab. 3. fig. 4.

Buprestis 4punctata. *Scop. Ent. carn.* 206, *Schaeff. Elem.* tab. 83. fig. 1.

Icon. tab. 6. fig. 1. 2. 3.

Habitat in Europae corylo frequens.

Atrapha- 4. *C. niger*, thorace rubro trimaculato, elytris testaceis, maculis tribus nigris, tibiis rufis.

Chrysomela Atraphaxidis. *Pallas It.* 2. 725. 68.

Habitat in Sibiriae atraphaxide. *Mus. Dom. Banks.* Magnitudo C. 4punctati. Caput atrum, antennis serratis cinereis. Thorax rufus maculis tribus approximatis nigris ad basin. Elytra pallidiora maculis tribus posteriori maiori, transuersa. Pedes rufi femoribus nigris. Abdomen nigrum, cinereo villosum.

lunulatus. 5. *C. ater* nitidus, elytris flavis, lunula fascia punctoque apicis nigris.

Habitat - - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Paullo minor C. 4punctato. Antennae serratae. Caput et thorax atra, immaculata. Scutellum atrium. Elytra flava macula antica lunata fascia que pone medium atris.

6. *C. niger*, thorace elytrisque rubris, punctis quatuor *12macus*
nigris. *Syst. Ent.* 106. 3. * *latus*.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks*,
Magnitudo et statura praecedentis.
7. *C. testaceus*, antennis elytrorumque margine nigris. *obitus*.
Syst. Ent. 106. 4. *
Habitat in America meridionali. *Dom. Drury*.
8. *C. coerulescens*, elytris testaceis. *Syst. Ent.* 106. 5. *tridenta-*
Chrysomela tridentata cylindrica, thorace coeruleo, *tus*,
elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 596. 73. *Fn.*
Sv. 546.
Chrysomela coerulea nitida, elytris testaceis, thorace
angulato gibbo. *Degeer Inf.* 5. 333. 36. tab. 10. fig. 10,
Melolontha nigro viridis, elytris luteo pallidis. *Geoff.*
Inf. 1. 196. 3.
Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 5.
Habitat in Lonicera xylosteo, corylo,
Pedes antici in altero sexu elongati.
9. *C. rufescens*, thorace maculis, elytris lineis duabus *lineatus*,
nigris. *Syst. Ent.* 106. 6. *
Habitat in Brasiliá. *Mus. Dom. Banks*.
10. *C. ater glaber*, thorace elytrisque punctis quatuor *Gorte-*
flavescensibus. *Syst. Ent.* 107. 7. * *riæ*.
Chrysomela Gorteriae. *Linn. Syst. Nat.* 2. 596. 74.
Amoen. acad. 6. 394. 16.
Habitat in Cap. bon. sp. gorteriis.
11. *C. capite thoraceque fuluis*, elytris flavis, puncto ba- *maxillo-*
seos scutelloque nigris. *sus*.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks*,
Medius. Antennæ ferratae nigrae, basi fuluae. Caput
et thorax glabra, laevia, fulua, immaculata. Scu-
tellum atrum. Elytra glabra, laevia, flava puncta
baseos atro. Abdomen cinereo villosum. Pedes
fului geniculis nigris.
12. *C. ater*, thorace vtrinque macula lutea, tibijis flavis. *auritus*,
Syst. Ent. 107. 8.

Chry-

Chrysomela aurita subcylindrica nigra, thorace vtrinque macula lutea, tibiis flauis. *Linn. Syst. Nat. 2. 596. 75.*

Habitat in Saxonae corylo.

didymus. 13. *C. rufus*, elytris maculis tribus nigris, anteriore postice didyma. *Syst. Ent. 107. 9. **

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

4macula- 14. *C. thorace pedibusque luteis, elytris luteis, maculis duabus coerulescenti nigris.* *Syst. Ent. 107. 10.*

Chrysomela 4maculata. *Linn. Syst. Nat. 2. 596. 77.*

Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 6. 7.

Pontopp. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Habitat in Saxonia.

flavicollis. 15. *C. niger*, thorace fuluo, punctis sex nigris, elytris pallidis, punctis duobus.

Habitat in Sibiria. *Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Nimis affinis videtur *C. 4maculato*. Caput nigrum lineola inter antennas punctis duobus in oculorum orbita fuluis. Antennae nigrae basi fuluae. Thorax glaber, nitidus, fuluis punctis sex nigris in strigam digestis. Elytra pallida puncto baseos apicisque nigris. Pedes rufi geniculis nigris. Punctum apicis elytrorum interdum deest.

longimana- 16. *C. obscure aeneus*, elytris testaceis. *Syst. Ent. 107. 11. nus.*

Chrysomela longimana subcylindrica obscure aenea elytris liuido flauis, pedibus anticis longissimis. *Linn. Syst. Nat. 2. 599. 95.*

Habitat in trifolio montano, euphorbia cyparissia et Europae borealis.

Affinis videtur *C. tridentato* at minor. Pedes in altero sexu elongati.

marginalis- 17. *C. nigro aeneus*, elytris flauis, margine nigro. *tus.*

Habitat in Germania.

Nimis praecedenti affinis, cuius forte mera varietas. Corpus totum nigro aeneum. Punctum flauum ad os. Elytra flava margine omni nigro.

CLASS. I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus*. 141

18. *C. thorace elytrisque obscure aeneis pubescentibus. pubescens.*
*Gen. Inf. Mant. 221. **
Habitat in America boreali.
19. *C. niger nitidus, elytris rubris, punctis duobus nigris antennis longitudine corporis. Syst. Ent. 108. 12.* *spumata-*
tus.
Cryptocephalus niger, elytris rubris striatis, maculis quatuor limboque nigris. Geoff. Inf. 1. 234. 1.
Chrysomela spumata cylindrica, thorace nigro nitido, elytris rubris, punctis duobus nigris, antennis longis. Linn. Syst. Nat. 2. 597. 78. Fn. Sv. 548.
Chrysomela atra elytris rubris, punctis quatuor nigris.
Vdm. Diff. 21. 22.
Petiv. Gazoph. tab. 31. fig. 4.
Degeer Inf. 5. 332. 35.
Habitat in Europae borealis corylo.
Variat rarius linea longitudinali loco punctorum, ut et interdum puncto elytrorum posteriori duplici.
20. *C. niger obscurus, thorace fuluo, elytris testaceis, macula- punctis duobus nigris.* *tus.*
Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
Nimis praecedenti affinis et forte mera eius varietas.
Differt tantum thorace haud atro sed fuluo.
21. *C. thorace variegato, elytris rubris, punctis duobus cordiger.*
nigris. Syst. Ent. 108. 13.
Cryptocephalus niger, thoracis lineis flauis, elytris rubris punctatis, maculisque quatuor limboque nigris. Geoff. Inf. 1. 235. 7.
Chrysomela cordigera. Linn. Syst. Nat. 2. 598. 91. Fn.
Sv. 558.
Chrysomela cylindrica, thorace nigro maculis flauis, elytris rubris punctis duobus nigris, antennis filiformibus flauis nigrisque. Degeer Inf. 5. 330. 33.
Chrysomela nigra, elytris subflauis, punctis quatuor nigris. Vdm. Diff. 23.
Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 1.
Habitat in Europae corylo, salice.
Macula thoracis intermedia interdum cordata.

142 CLASS. I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus.*

- bothnicus.* 22. C. ater, thorace linea longitudinali rubra. *Syst. Ent.*
 108. 14.
Chrysomela bothnica. Linn. *Syst. Nat.* 2. 598. 90. *Fn.*
Sv. 557.
- Chrysomela cylindrica nigra,* pedibus testaceis, thora-
 ce linea longitudinali capiteque macula irregulari
 flavis. *Degeer Inf.* 5. 335. 39.
 Habitat in Suecia.
 Frons macula quadrata rufa.
- Vitis.* 23. C. niger glaber, elytris rufis. *Syst. Ent.* 108. 15. *Geoff.*
Inf. 1. 233. 2.
 Habitat in vite vinifera Europae australis, quam misere
 saepius depascit.
 An a sequenti satis distinctus?
- Coryli.* 24. C. niger, thorace elytrisque testaceis immaculatis.
Syst. Ent. 109. 16.
Chrysomela Coryli cylindrica, thorace elytrisque testa-
 ceis, pedibus nigris. Linn. *Syst. Nat.* 2. 598. 88.
Fn. *Sv.* 555.
 Habitat in Europae corylo.
- ruficollis.* 25. C. niger, thorace rufo, elytris testaceis. *Syst. Ent.*
 109. 17. *
 Habitat in Insula St. Helena. *Mus. Dom.* Banks.
 Variat thoracis margine pallido et concolore, femori-
 busque basi rufis atrisque.
- nigripes.* 26. C. capite thoraceque rufis, elytris pallidis, pedibus
 apice nigris. *Gen. Inf. Mant.* 221. *
 Habitat in America boreali.
- 6punctata-* 27. C. niger, thorace variegato; elytris rubris; maculis
tus: tribus nigris. *Syst. Ent.* 109. 18.
Chrysomela 6punctata. Linn. *Syst. Nat.* 2. 599. 92.
Fn. *Sv.* 559.
Chrysomela rubra, elytris maculis tribus nigris, tho-
 race maculis, magnis binis nigris rubro cinctis. *De-
 geer Inf.* 5. 331. 34. tab. 10. fig. 9.

Bupre-

CLASS. I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus*. 143

- Buprestis punctata*, Scop. Ent. carn. 203. Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 18. Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 1-3. Habitat in Europa borealis corylo. Genicula tibiarum puncto albo notata.
28. *C. cyaneus nitidus*, antennis fuscis. *coerulans*. Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. Dom. Banks. Statura oblonga. Corpus totum cyaneum, nitidum, immaculatum: antennis ferratis solis fuscis. *tus*.
29. *C. violaceus*, capite thorace femoribusque dentatis calcaturis. Syst. Ent. 109. 19. * Habitat in Sierra Leon Africæ. Mus. Dom. Banks.
30. *C. cyaneus*, thorace pedibusque rufis. *Syst. Ent. cyaneus*. 109. 20. * *Melolontha coerulea*, thorace pedibusque ferrugineis. Geoff. Inf. 1. 197. 4. Habitat in Gallia. Dr. Mallet.
31. *C. cyaneus nitidus*, thoracis lateribus elytrorum apicibus femoribusque rufis. *collaris*. Habitat in Sibiria. Dr. Pallas. Mus. Dom. Banks. Maior *C. sericeo*. Caput cyaneum antennis basi rufis. Thorax glaber nitidus, medio cyaneus lateribus rufis. Elytra cyanea macula magna apicis rufa. Corpus nigrum. Pedes nigri femoribus rufis.
32. *C. viridi coeruleus*, antennis nigris. *Syst. Ent. 109. 21. sericens*. *Cryptocephalus viridi auratus sericeus*. Geoff. Inf. 1. 233. 3. *Chrysomela sericea cylindrica*, thorace coeruleo, elytris pedibusque coeruleis. Linn. Syst. Nat. 2. 598. 86. Fn. Sv. 554. *Chrysomela cylindrica viridi aurata*, thorace gibbo, antennis longis nigris, elytris scabris dehiscentibus. Degeer Inf. 5. 334. 37. Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 13. Habitat in Europa salicibus. Variat rarius corpore toto aeneo.

nitens. 33. *C. viridis nitens*, ore pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 110. 22.

Chrysomela nitens cylindrica, thorace coeruleo nitido, elytris coeruleis, pedibus testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 598. 84. *Fn. Sv.* 551.

Chrysomela cylindrica coeruleo violacea nitida, capite antice pedibusque flauis. *Degeer Inf.* 5. 334. 38. *Habitat* in Europae salice.

glabra- 34. *C. violaceus*, thorace elytrisque viridiæneis, anten-
tus fuscis. *Syst. Ent.* 110. 23. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

quadratum. 35. *C. ater*, elytris flavis, vitta media abbreviata atra. *Gen. Inf. Mant.* 221. *

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

vittatus. 36. *C. niger*, elytris margine striaque abbreviata flava. *Syst. Ent.* 110. 24. *

Cryptocephalus elyro singulo dupli linea longitudi-
nali flava. *Geoff. Inf.* 1. 233. 4.

Habitat in Europæ australioris graminosis.

Moraei. 37. *C. ater*, elytris maculis duabus flavis marginalibus. *Syst. Ent.* 110. 25.

Cryptocephalus niger, capite thoraceque antice luteis,
elytro singulo externe macula dupli flava. *Geoff.* *Inf.* 1. 234. 5.

Chrysomela Moraei cylindrica, thorace nigro, elytris
nigris, maculis duabus rubris marginalibus. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 597. 82. *Fn. Sv.* 550.

Buprestis Moraei. *Scop. Ent. carn.* 202.

Cassida nigra nitida, clypeo caput fere integrum te-
gentem, macula ad apicem et basin elytrorum lutæa.
Vdm. Diff. 28.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 5.

Habitat in Europæ hypericis. *Dom. Lund.*

Caput et thorax interdum albo maculata.

15gutta- 38. *C. rufus*, thorace maculis tribus, elytris sex flavis.
tus. *Syst. Ent.* 110. 26. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

39. *C. capite thoraceque variegatis, coleoptris flauis pun- 10punctata-*
ctis decem nigris. *Syst. Ent.* III. 27. * *tus.*
Chrysomela 10punctata cylindrica, thorace variegato,
 elytris flauis, punctis quinque nigris. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 597. 79. *Fn. Sv.* 560.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
40. *C. ater, elytris macula apicis rufa.* *Syst. Ent. App. 2pustula-*
*821. ** *tus.*
 Habitat in Heluetia. *Dom. Lee.*
41. *C. rufus, thorace maculis duabus, elytris fasciis dua-* *2fascia-*
bus nigris. *tus.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Caput rufum oculis reniformibus fuscis. Thorax gib-
 bus, nitidus, laevis, rufus maculis duabus dorsalibus
 atris. Elytra punctato striata fascia baseos alteraque
 pone medium nigris.
42. *C. niger, elytris rufo bimaculatis.* *Syst. Ent.* III. 28. * *4pustula-*
Chrysomela 14punctata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 597. 80. *tus.*
Fn. Sv. 549.
 Habitat in Sueciae nemoribus.
 Maculae elytrorum remotae, altera maior ad basin, al-
 tera minor ad apicem.
43. *C. niger, thorace elytrisque ferrugineo variegatis, pe-* *Histrio.*
dibus ferrugineis, geniculis nigris.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Magnitudo C. Scopolini. Caput nigrum orbita oculo-
 rum rufa. Thorax niger margine lineolisque tri-
 bus abbreviatis ferrugineis. Elytra punctata nigra
 maculis apiceque ferrugineo. Pedes ferruginei ge-
 niculis femorumque posticorum fascia fusca.
44. *C. niger, thorace rufo, elytris rufis, fasciis duabus Scopoli-*
cyaneis, pedibus nigris. *Syst. Ent.* III. 30. *nus.*
Chrysomela Scolina cylindrica, thorace rufo, elytris
 rufis, fasciis duabus nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2.
 597. 81.
 Habitat in Europa australi, America.
 Fasciae elytrorum nec marginem, nec suturam attin-
 gunt.

- Koenigii.* 45. *C. rufus*, elytris punctis duobus coerulecentibus.
Syst. Ent. 111. 29. *
 Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*
 Praecedenti nimis affinis, forte eius mera varietas.
- paracen-* 46. *C. elytris flauis, lineola punctisque tribus nigris.* *Syst.*
thesis. *Ent.* 111. 31.
Chrysomela paracenthesis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1066. 1.
 Habitat in Europa australi.
 Supra flauis thorace nigro variegato.
- Pini.* 47. *C. testaceus*, elytris pallidis, antennis fuscis. *Syst.*
Ent. 112. 32.
Chrysomela Pini cylindrica testacea, elytris pallidioribus, pedibus concoloribus, antennis fuscis. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 598. 89. *Fn. Sv.* 556.
 Habitat in Sueciae pino.
- pusillus.* 48. *C. thorace fulvo*, elytris testaceis nigro maculatis.
Gen. Inf. Mant. 221. *
 Habitat Hamburgi. *D. Schulz.*
- tabiatus.* 49. *C. ater nitidus*, ore pedibus basique antennarum lutescentibus. *Syst. Ent.* 112. 33.
Chrysomela labiata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 598. 87. *Fn. Sv.* 553.
 Habitat in Europae rosis. Minutus.
- *flauipes.* 50. *C. ater nitidus*, capite pedibusque luteis.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Praecedenti affinis, at quadruplo maior.

31. C I S T E L A.

- ceruina.* 1. *C. liuida*, pedibus fuscis. *Syst. Ent.* 116. 1.
Chrysomela ceruina oblonga liuida, thorace postice transuerso. *Linn. Syst. Nat.* 2. 602. 115. *Fn. Sv.* 575.
 Habitat in Europa boreali.
- cinerea.* 2. *C. liuida*, elytris pedibusque fuscis.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Statura et summa affinitas praecedentis. Differt solis elytris obscurioribus. Forte mera varietas.

3. *C. liuida*, antennis fuscis. *Syst. Ent.* 116. 2. * *liuida*.
 Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*
 Affinis praecedenti, at duplo minor.
4. *C. atra*, elytris striatis testaceis. *Syst. Ent.* 116. 3. *ceramboi-*
Chrysomela ceramboides oblonga nigra, elytris testa- *des.*
 ceis, antennis serratis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 602. 117.
Fn. Sv. 576.
- Mordella nigra*, elytris fuluis striatis. *Geoff. Inf.* 1.
 354. 3.
 Habitat in Europa boreali.
5. *C. nigra*, thorace elytris abdomineque testaceis. *Syst. testacea,*
Ent. 116. 4. * *sulphurea*.
 Habitat in Oriente. *Prof. Forskahl.*
6. *C. flava*, elytris sulphureis. *Syst. Ent.* 117. 5. *sulphur-*
Chrysomela sulphurea oblonga flava tota. *Linn. Syst.* *rea,*
Nat. 2. 602. 114.
Tenebrio luteus. *Geoff. Inf.* 1. 351. 11.
 Habitat in floribus umbellatarum Europae,
 Antennae fuscae.
7. *C. atra*, thorace ferrugineo, elytris striatis. *ruficollis.*
 Habitat in Lusitania. *D. Gray. Mus. Dom. Banks.*
 Corpus statura et magnitudine *C. sulphureae*. Anten-
 nae filiformes nigrae. Caput atrum, immaculatum,
 nitidum. Thorax ferrugineus, nitens. Elytra striata.
8. *C. rufescens*, anteniis macula elytorum anoque ni- *analis.*
 gris. *Syst. Ent.* 117. 6. *
 Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*
 Variat elytris maculis duabus nigris, altera baseos, alte-
 ra apicis.
9. *C. nigra*, elytris pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 117. 7. *murina.*
Chrysomela murina oblonga nigra, elytris pedibusque
 testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 602. 118. *Fn. Sv.* 577.
Mordella nigra, elytris fuluis laevis. *Geoff. Inf.* 1.
 355. 4.
 Habitat in Europa boreali.

- angusta-* 10. *C. thorace elytrisque obscure rufis medio nigris.*
ta. *Habitat in Anglia. Mus. Dom. Banks.*
Statura omnino C. multinae, at angustior. Caput ni-
grum antennis fuscis. Thorax obscure rufus, me-
dio niger. Elytra ferruginea sutura nigra. Abdo-
mum ferrugineum linea media et laterali fuscis. Pe-
des ferruginei.
- pallida.* 11. *C. pallida, capite elytrorumque apicibus fuscis.* *Syst.*
*Ent. 117. 8. **
Habitat in Anglia. Mus. D. Hunter.
- aerugi-* 12. *C. flava, capite pectoreque nigris, elytris viridibus.*
nea. *Syst. Ent. 117. 9. **
Habitat in Africae plantis.
- festiu-* 13. *C. ferruginea, elytris cyaneo viridibus, margine fer-*
rugineo.
Habitat ad Cap. bon. sp. Forster. Mus. Dom. Banks.
Parua. Antennae fuscae basi ferrugineae. Caput rufum,
basi nigrum. Thorax glaber, subpunctatus, nitidus,
ferrugineus, immaculatus. Elytra glabra, vi-
ridia, nitida. Corpus ferrugineum pedibus apice
nigris.
- aulica.* 14. *C. atra, thorace rufo, elytris cyaneis.*
Habitat ad Cap. bon. sp. D. Forster. Mus. Dom. Banks.
Caput atrum. Thorax suborbiculatus, glaber, nitidus,
rufus, immaculatus. Elytra cyanea, nitida.
Abdomen atrum segmentorum marginibus rufis.
- innuba.* 15. *C. nigra, thorace rufo, elytris nigris, margine vitta-*
*que luteis. Syst. Ent. 117. 10. **
Habitat in America. Dom. Drury.
- melanoce-* 16. *C. thorace flavo, elytris pallidis, vitta media nigra.*
phala. *Syst. Ent. 118. 11. **
Habitat in America septentrionali. Mus. Dom. Banks.
- quinque-* 17. *C. testacea, elytrorum marginibus vittaque media ni-*
vittata. *gris. Syst. Ent. 118. 12. **
Habitat in America boreali. Mus. Monson.

18. *C. hirta*, capite thoraceque rufis, elytris cyaneis. *hirta.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *D. Forster. Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino oblonga hirsuta Lagiae, at palpi anten-
 naeque huius generis. Caput ferrugineum antennis
 valde ferratis apice fuscis. Thorax hirtus, ferrugi-
 neus, punctis duobus in medio nigris. Elytra hirta,
 cyanea, nitida. Corpus cyaneum pedibus rufis.
19. *C. ferruginea*, elytris flaviis, lineolis tribus nigris. *sexlinea-*
 Habitat - - - *Mus. Dom. Banks.* *ta.*
 Antennae filiformes, extrorsum subcrassiores, articulo
 primo basi ultimisque tribus ferrugineis. Caput fer-
 ruginosum. Thorax laevis, nitidus, pallidior, im-
 maculatus. Elytra laetitia, nitida, flava lineolis tri-
 bus nigris, exterioribus duobus basi coëuntibus, in-
 teriori breviori. Subtus ferruginea pectore pedum-
 que geniculis nigris.
20. *C. nigra*, elytris pubescentibus pedibusque griseis. *minuta.*
Syst. Ent. 118. 13.
Chrysomela minuta ouata nigra, elytris pedibus tho-
 racisque lateribus griseis. *Linn. Syst. Nat. 2. 593.*
 50. *Fn. Sv. 533.*
 Habitat in Europae plantis aquaticis.
 Facies Dytisci, at huius generis.

32. C R I O C E R I S.

1. *C. capite thoraceque flavescentibus nigro maculatis, triloba.*
 elytris griseis, corpore nigro.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Magna. Caput flavescentia macula baseos antennisque ni-
 gris. Thorax flavescentia maculis tribus nigris, in-
 termedia triloba. Elytra subpubescentia, grisea, im-
 maculata. Corpus nigrum minime nitidum.
2. *C. grisea, thorace lineola dorsali, elytris puncto ba-* *lineola.*
 seos nigris.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Statura sequentis. Caput griseum antennis nigris. Tho-
 rax griseus linea media nigra lateribusque subangu-
 latis

latis. Elytra grisea puncto baseos nigro. Corpus subtus fuscum cinereo pubescens.

Nymphæa 3. C. fusca, elytrorum margine prominulo flavescente.
ae. *Syst. Ent.* 118. 1.

Chrysomela Nymphææ oblonga fusca, elytris margine prominulo flavescentibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 600. 99. *Fn. Sv.* 565.

Chrysomela ouata nigro fusca, thorace angusto, maculis duabus nigris, elytris margine flavis, antennis fuscis. *Degeer Inf.* 5. 326. 31. tab. 20. fig. 1. 2.

Galleruca pallida, thorace nigro variegato, elytris vnicoloribus pallidis. *Geoff. Inf.* 1. 254. 4.

Habitat in Europæ Nymphaeis tarda.

Capreæ. 4. C. thorace nigro maculato elytrisque griseis, antennis nigris. *Syst. Ent.* 118. 2.

Chrysomela Capreæ oblonga, thorace nigro punctato elytrisque griseis, antennis nigris longis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 600. 100. *Fn. Sv.* 516.

Chrysomela grisea Alni ouata grisea opaca, thorace angusto, puncto nigro, antennis variegatis. *Degeer Inf.* 5. 325. 30.

Galleruca nigra, thorace elytrisque luteo liuidis. *Geoff. Inf.* 1. 254. 5.

Habitat in Europæ salicibus.

Abdomen nigrum.

cincta. 5. C. pallida, elytrorum margine omni atro. *Syst. Ent.* 119. 3. *

Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*

calma- 6. C. ouata cinerea, elytris vitta lineolaque baseos nigris. *riensis.* *Syst. Ent.* 119. 4.

Chrysomela calmariensis oblongiuscula ferruginea, elytris macula longitudinali nigricante. *Linn. Syst. Nat.* 2. 600. 101.

Galleruca pallida, thorace nigro variegato, elytris fasciis duabus longitudinalibus nigris. *Geoff. Inf.* 1. 253. 3.

Habitat in Europæ salice, alno,

7. *C. flava*, antennis abdomineque fuscis, ano flauo. *abdominalis.*
 Habitat in Insulis Oceani pacifici. *Dr. Forster.*
 Antennae fuscae basi flavescentes. Caput et thorax glabra, flavescentia maxillis nigris. Elytra laevia, flava, immaculata. Subtus flava abdomine fuso, ano flauo.
8. *C. nigra obscura*, pedibus ferrugineis. *Morio.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Forster. Mus. Dom. Banks.*
 Corpus minus, totum nigrum, obscurum, minime nitidum. Antennarum basis pedesque ferruginei.
9. *C. ouata rufa*, antennis oculisque nigris. *Syst. Ent. sanguinea.*
 119. 5. *
 Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.*
 Pedes cinerei, rarius sanguinei.
10. *C. ferruginea*, thorace elytrorumque margine flavis. *tenella.*
Syst. Ent. 119. 6.
Chrysomela tenella oblongiuscula ferruginea, elytris margine thoraceque flavis. *Linn. Syst. Nat. 2. 600.*
 102. *Fn. Sv. 564.*
 Habitat in Europae salice.
11. *C. ferruginea*, elytris violaceis, antennis nigris. *Syst. nigricornis.*
*Ent. 119. 7. **
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
12. *C. fulua*, elytris pallidis, margine omni fuluo. *atuberculata.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino *C. melanocephala*. Caput et thorax pallide fulua oculis nigris. Scutellum fuscum. Elytra pallida margine omni fuluo. Pedes fului plantis fuscis. Specimina quaedam vidi tuberculis coleoptrorum duobus versus apicem approximatis, eleuatis fuluis.
13. *C. flava*, elytris nigris apice rufescens. *bidentata.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino praecedentis. Caput, thorax, abdomen, pedes flava. Elytra nigra apice rufescens

tuberculo paruo eleuato ad suturam. Plantae omnino nigrae.

melanocephala. 14. *C. rufa*, capite nigro, elytris violaceis. *Syst. Ent.* *Ent.* 119. 8. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

cantharoides. 15. *C. violacea*, capite thorace pedibusque rufis. *Syst. Ent.* *Ent.* 120. 9. *

Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*

Statura omnino *C. Nymphaea*.

maculata. 16. *C. pallida*, elytrorum maculis duabus abdomineque atris.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Forst. Mus. Dom. Banks.*

Caput pallidum antennis fuscis. Thorax laeuis, nitidus, pallidus, inimaculatus linea transuersa, impressa. Elytra laevia, pallida maculis duabus atro coeruleis, altera ad basin, altera pone medium. Subtus pallida abdomine atro.

minuta. 17. *C. nigra*, thorace elytrisque pallidis immaculatis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Forster. Mus. Dom. Banks.*

Caput nigrum puncto baseos pallido. Thorax et elytra glabra, pallida, immaculata. Corpus nigrum.

erythrocephala. 18. *C. nigra*, capite thoraceque ferrugineis, elytris viridibus.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Forster. Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentium. Antennae filiformes nigrae. Caput obscure ferrugineum puncto baseos nigro. Thorax obscure ferrugineus laevis puncto medio nigro. Elytra laevia, viridia, nitida. Corpus et pedes atra.

merdigera. 19. *C. rubra*, thorace cylindrico vtrinque impresso. *Syst. Ent.* 120. 10.

Chrysomela merdigera oblonga rubra, thorace cylindrico vtrinque impresso. *Linn. Syst. Nat. 2. 599. 97. Fn. Sv. 563.*

Chry-

Chrysomela rubra *Liliorum*, thorace tereti, capite, antennis, pedibus abdomineque subtus nigris. *Degeer* *Inf.* 5. 338. 43.

Crioceris rubra. *Geoff.* *Inf.* 1. 239. 1.

Attelabus Lilii. *Scop.* *Ent. carn.* 112.

Sulz. *Hist. Inf.* tab. 3. fig. 14.

Schaeff. *ELEM.* tab. 52. fig. 1.

Icon. tab. 4. fig. 4.

Reaum. *Inf.* 3. tab. 17. fig. 12.

Merian. *Europ.* 3. tab. 21.

Habitat in Conuallaria maiali.

Habitus ab hoc genere alienus, vix tamen distinctum.

20. C. thorace cylindrico rubra, elytris punctis sex nigris. *12punctata*-
Chrysomela *12punctata* oblonga rufa, elytris punctis sex, pectore pedumque geniculis nigris. *Linn. Syst.*

Nat. 2. 601. 110. *Fn. Sv.* 568.

Crioceris rubra, punctis tredecim nigris. *Geoff.* *Inf.* 1.

241. 2. tab. 4. fig. 5.

Attelabus *12punctatus*. *Scop.* *Ent. carn.* 114.

Frisch. *Inf.* 13. tab. 28.

Schaeff. *Icon.* tab. 4. fig. 5.

Habitat in Asparago frequens.

21. C. thorace cylindrico fulvo, punctis quinque nigris, *14punctata*-
elytris flaviis, punctis septem. *Gen. Inf. Mant.* ta.
222. *

Attelabus *14punctatus*. *Scop.* *Ent. carn.* 116.

Habitat in Germania australiori.

22. C. thorace cylindrico rufa, elytris fasciis duabus atris. *2fasciata*.
Syst. Ent. 120. 12. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

23. C. thorace cylindrico rufa, elytris fascia atra. *Syst. unifasciata*.
Ent. 120. 13. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Forte praecedentis mera varietas.

24. C. thorace cylindrico flava, antennis pectore pedibus- *nigripes*.
que nigris. *Syst. Ent.* 120. 14. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

grisea. 25. C. pallida, capite senioribusque ferrugineis, antennis tibiisque nigris.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Caput ferrugineum antennis nigris. Thorax obscure pallidus. Elytra laevia, pallida. Corpus pallidum, nigro mixtum. Pedes nigri femoribus rufis.

oculata. 26. C. thorace cylindrico flava, elytris basi nigris, puncto flavo. *Syst. Ent. 121. 15.* *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

bioculata. 27. C. testacea, thorace immaculato, elytris maculis duabus ocellaribus albis.

Habitat - - - *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino C. ocellatae. Antennae nigrae basi ferrugineae. Caput et thorax glabra, nitida, testacea, iminaculata. Elytra testacea maculis duabus magnis albis, quarum anterior puncto antico nigro, posterior pone medium annulo nigro cincta. Tibiae fuscae.

pallens. 28. C. thorace subcylindrico pallida, antennis nigris.

Habitat - - - *Mus. Dom. Banks.*

Praecedentibus paullo minor. Corpus totum glabrum, pallidum, laeve. Caput magis obscurum antennis elongatis nigris. Pedes pallidi.

aulica. 29. C. viridi aenea nitida, elytris testaceis, maculis duabus cyaneis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Forster. Mus. Dom. Banks.*

Antennae filiformes fuscae. Caput et thorax viridi aenea, nitidissima ore testaceo. Elytra glabra, laevia, testacea maculis duabus cyaneis posteriori maiori. Corpus viridi aeneum. Pedes testacei femoribus posticis aeneis.

cyanella. 30. C. coerulea, thorace cylindrico, lateribus gibbis. *Syst. Ent. 121. 16.*

Chrysomela cyanella oblonga coerulea, thorace cylindrico, lateribus gibbis. *Linn. Syst. Nat. 2. 600. 104. Fn. Sv. 572.*

Chryso-

Chrysomela coeruleo violacea, thorace tereti, lateribus gibbis. Degeer Inf. 5. 340. 44.

Crioceris tota coeruleo viridis. Geoff. Inf. 1. 243. 5.

Habitat in Europae plantis.

31. C. oblonga coerulea, thorace pedibusque rufis. *Syst. melanopha.* Ent. 121. 17.

Chrysomela melanopa. Linn. *Syst. Nat.* 2. 601. 105.
Fn. Sv. 573.

Chrysomela oblonga viridi coerulea nitida, thorace tereti pedibusque flauo rufis. Degeer Inf. 5. 342. 46.

Sulz. Hist. tab. 3. fig. 19.

Habitat in Europa,

32. C. oblonga nigra, thorace pedibusque flauis. *flauipes.*

Chrysomela flauipes. Linn. *Syst. Nat.* 2. 601. 106.

Habitat in Germania frequens.

Praecedenti nimis affinis, at nigra,

33. C. oblonga nigra, capite thorace pedibusque rufis, *subspinosa.*

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis. Caput rufum antennis filiformibus nigris, basi rufis. Thorax vtrinque vniispinosus, subpunctatus, rufus, immaculatus. Elytra punctata obscure nigra. Abdomen nigrum. Pedes rufi.

34. C. cyanea, thorace rufo, antennis pedibusque fuscis. *cyanophala.*

Ent. 121. 18.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

35. C. oblonga, thorace rubro, punctis duobus nigris, *Asparagi.*

elytris obscure cyaneis, maculis quatuor albis. *gi.*

Crioceris Asparagi, thorace rubro, punctis duobus nigris, coleoptris flauis, cruce punctoque quatuor nigris. *Syst. Ent.* 121. 19. *Linn. Syst. Nat.* 2. 601. 112.
Fn. Sv. 567.

Crioceris thorace rubro, punctis duobus nigris, coleoptris flauis, cruce nigra. Geoff. Inf. 1. 241. 3.

Attelabus Asparagi. Scop. Ent. carn. 113.

Roes.

Roef. Inf. 2. Scarab. 3. tab. 4.

Frisch. Inf. 1. p. 27. tab. 6.

Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 9. 10.

Habitat in Europa, asparagos depascens.

Varietatem rariorem elytrorum maculis duabus baseos connatis ex Italia misit Dr. Allioni.

Phellandri. 36. *C. oblonga nigra*, thorace elytrisque lineis duabus flavis. *Syst. Ent. 122. 20.*

Chrysomela Phellandrii oblonga nigra, thorace elytrisque lineis duabus luteis. *Linn. Syst. Nat. 2. 601. III.*
Fn. Sv. 569.

Chrysomela oblonga nigra, elytrorum lineis duabus longitudinalibus luteis. *Geoff. Inf. 1. 266. 20.*

Chrysomela oblonga nigro aenea, obscure nitida, thorace marginibus flavis, elytris fasciis duabus longitudinalibus flavis. *Degeer Inf. 5. 324. 28. tab. 9.*
fig. 34.

Habitat ad phellandrii aquatrici radices.

elongata. 37. *C. elongata nigra*, elytris vitta flava.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Forster. Mus. Dom. Banks.*

Statura magis elongata quam in reliquis. Caput, thorax, corpus nigra viridi colore paullo nitentia. Elytra nigra in medio vitta lata flava. Corpus et pedes atra.

carolinia. 38. *C. oblonga flava*, thorace punctis duobus, coleoptris na. que vittis quinque nigris. *Syst. Ent. 122. 21.*

Habitat in America boreali. *Dom. Drury.*

glabrata. 39. *C. oblonga*, thorace pallido, punctis tribus nigris, elytris nigris, vittis duabus albis. *Syst. Ent. 122. 22.**

Chrysomela tomentosa oblonga, elytris subtomentosis nigris, linea longitudinali margineque pallidis. *Linn. Syst. Nat. 2. 601. 107.?*

Habitat in Africa aequinoctiali.

vittata. 40. *C. oblonga*, thorace rufo, elytris flavis, vitta nigra. *Syst. Ent. 122. 23. **

Habitat in Carolina. *Mus. Dom. Monson.*
Pedes flavescentes geniculis nigris.

33. E R O T Y L V S.

1. *E. ouatus niger, coleoptris punctis fuluis numerosissimis. Syst. Ent. 123. 1.* *giganteus.*
Chrysomela gigantea. Linn. Syst. Nat. 2. 586. 1.
- Chrysomela oblonga nigra, thorace depresso, abdomen gibbo, elytris maculis subrotundis rubris numerosissimis. Degeer Ins. 5. 349. tab. 16. fig. 8.*
- Coccinella gigantea. Sulz. Hist. Ins. tab. 3. fig. 15.* *Hist. Ins. tab. 3. fig. 8.*
- Habitat in India.
2. *E. testaceus, antennis tibiisque nigris. Syst. Ent. App. testaceus.* 822. *
Habitat in America. *Dom. Drury.*
3. *E. niger, elytris flavescentibus nigro punctatis, fascia gibbosus. media posticaque nigris.*
Chrysomela gibbosa. Linn. Syst. Nat. 2. 586. 2. Amoen. acad. 6. 393. 13.
- Coccinella. Gron. Zooph. 606. tab. 14. fig. 5.*
Habitat in America meridionali.
Magna. Thorax vtrinque impressus. Coleoptra in medio valde gibba.
4. *E. ouatus, elytris nigris, punctis quinque rubris. Syst. 5punctata. Ent. 123. 2.*
Chrysomela 5punctata. Linn. Syst. Nat. 2. 586. 3.
- Coccinella coleoptris nigris punctato impressis, maculis deceim rubris. Gron. Zooph. 613. tab. 16. fig. 7.*
- Habitat in America.
5. *E. niger, elytris flavis, punctis numerosissimis nigris. punctatissimus. Syst. Ent. 123. 3. **
Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*
6. *E. ater, elytris punctatis medio fuluo maculatis. variegatus.*
Habitat Surinami. *Mus. Dom. Banks.*
- Statura omnino praecedentium, at minor. Corpus totum atrum, haud gibbosum, elytris punctatis atris, in medio fuluo variegatis.*

fasciatus. 7. E. ater, elytris fasciis tribus flavescentibus.

Habitat - - - Mus. Dom. Banks.

Medius. Corpus, caput, thorax laevia, atra, obscura, immaculata. Elytra fasciis tribus flavis atrisque alternis, e quibus flava baseos, nigra apicis.

Morio. 8. E. oblongus ater immaculatus. *Syst. Ent.* 123. 4. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

cupreus. 9. E. oblongus ater, thorace elytrisque cupreis. *Syst. Ent.*

123. 5. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

nebulosus. 10. E. ater, thorace elytrisque ferrugineo variis.

Habitat in Americae meridionalis insulis. *Mus. D. Hunter.*

Medius. Caput cum antennis nigrum. Thorax glaber rufus margine tenuissimo maculisque tribus dorsibus, difformibus, connexis nigris. Elytra laevia, atra fasciis tribus vndatis punctoque apicis ferrugineis. Fascia baseos nigro punctata. Corpus et pedes atra.

dilatatus. 11. E. oblongus ater, thorace elytrisque ferrugineis. *Gen. Inf. Mant.* 223. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*

smaragdulus. 12. E. oblongus ater, elytris viridibus striatis. *Syst. Ent.* 123. 6. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

amethystinus. 13. E. oblongus ater, thorace elytrisque cyaneis. *Syst. Ent.* 124. 7. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

bicolor. 14. E. oblongus ater supra aeneus. *Syst. Ent.* 124. 8. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

rufipes. 15. E. oblongus niger, pedibus piceis. *Gen. Inf. Mant.* p. 222. *

Habitat Kiliae Holsatorum. *Dom. Lund.*

16. *E. oblongus viridis nitidus punctatus, antennis pedibusque flauiscentibus.* *flauipes.*

Habitat in Iamaica. *Mus. Dom. Banks.*

Caput viride nitidum ore piceo. Antennae elongatae, filiformes, flauiscentes. Thorax viridi nitens punctis plurimis impressis. Elytra viridia, nitida, striato punctata. Abdomen obscurius. Pedes flauiscentes.

34. L A G R I A.

1. *L. obscura aenea immaculata. Syst. Ent. 124. 1. ** *aenea.*

Habitat in Americae meridionalis insulis. *Mus. Dom. Banks.*

2. *L. liuida, oculis nigris. Syst. Ent. 124. 2. ** *liuida.*

Habitat in Insula Otaheiti maris australis. *Mus. Dom. Banks.*

3. *L. liuida, thorace lineis elytris vitta fuscis. Syst. Ent. 124. 3. * lineata.*

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

4. *L. coerulea, antennis fuscis. Syst. Ent. 125. 4. ** *cyanea.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

5. *L. rufa, elytris fuscis, marginibus lineaque media rufis. marginata.*

Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter.*

Statura L. vittatae, at duplo maior. Caput rufum antennis nigris oculisque globosis coeruleiscentibus. Thorax glaber, rufus, immaculatus. Scutellum rufum. Elytra laevia, fusca margine omni lineaque media nec basin nec apicem attingente rufis. Pedes nigri femoribus rufis.

6. *L. rufa, elytris vitta ab domine que apice fuscis. Syst. Ent. 125. 5. ** *vittata.*

Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*

7. *L. cyanea, capite thorace que rufis. Gen. Inf. Mant. rufifrons.*

*p. 223. **

Habitat in America boreali.

- elongata*. 8. L. atra, thorace rufo villoso. *Syst. Ent.* 125. 6.
Chrysomela elongata atra, thorace rubro subuilloso.
Linn. Syst. Nat. 2. 603. 122.
Habitat in Europa, Anglia.
- villosa*. 9. L. villoso atra, thorace elytrisque viridibus.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Forster. Mus. Dom. Banks.*
Statura et summa affinitas L. hirtae, at thorax et elytra
viridia. Abdouen pedesque atra.
- pubescens*. 10. L. nigra, thorace marginato villoso, elytris glabris
testaceis. *Syst. Ent.* 125. 7.
Chrysomela pubescens elongata, thorace nigro villoso,
elytris plantisque testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2.
603. 120.
Habitat in Germania.
Affinis L. hirtae, at paullo maior.
- hirta*. 11. L. villosa nigra, thorace tereti, elytris testaceis. *Syst.*
Ent. 125. 8.
Chrysomela hirta oblonga villoso nigra, thorace tere-
tiusculo, elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 602.
119. *Fn. Sv.* 578.
Tenebrio alatus villosus niger, elytris villosis fuluis,
thorace teretiusculo. *Degeer Ins.* 5. 446. tab. 2.
fig. 23. 24.
Habitat in Europae Saponariis.
- tomento-* 12. L. villosa cyanea, abdomine femoribusque rufis. *Syst.*
fa. *Ent.* 125. 9. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Variat rarius elytris fuscis.
- glabrata*. 13. L. glabra, thorace rufescente, elytris flauis. *Syst.*
Ent. 125. 10. *
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
- antheri-* 14. L. nigra, elytris fasciis duabus ferrugineis. *Syst. Ent.*
na. 126. 11.
Meloe antherinus alatus niger, elytris fasciis duabus
ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 681. 16. *Fn. Sv.* 829.
Habitat frequens in floribus, agilis, cursitans, vix pedi-
culo maior, at certe huius generis.

15. L. nigra, thorace ferrugineo. *Syst. Ent.* 126. 12. *floralis.*
Meloe floralis alatus niger, elytris maculis duabus pal-
lidis obsoletis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 681. 15. *Fn.*
Sv. 829.?
Habitat in Europae plantis.

35. Z Y G I A.

1. Zygia. *Syst. Ent.* 126. 1. * *oblonga.*
Habitat in Oriente. *Forskahl.*
Corpus oblongum rufum, capite elytrisque obscure
cyanis.

36. Z O N I T I S.

1. Z. flava, elytris puncto medio apiceque nigris. *Syst. chrysome-*
Ent. 126. 1. * *lina.*
Habitat in Oriente, Aegypto. *Prof. Forskahl.*
Corpus subitus atrum ano rufescente.
2. Z. rufescens, elytris flavis apice nigris. *Syst. Ent.* *flava.*
*127. 2. **
Habitat in Oriente. *Prof. Forskahl.*

37. A P A L V S.

1. *Apalus.* *Syst. Ent.* 127. 1. *2macula-*
Meloe bimaculatus alatus niger, elytris luteis, macula
nigra postica. *Linn. Syst. Nat.* 2. 680. 9. *Fn. Sv.*
828. Vdm. Diff. 82.
Pyrochroa 2maculata nigra, thorace orbiculato, de-
preslo, elytris fulvis puncto nigro, antennis sim-
plicibus. *Degeer Ins.* 5. tab. 1. fig. 18.
Habitat primo vere in Sueciae arenosis.

38. C V R C V L I O.

* Longirostres femoribus simplicibus.

1. C. longirostris, thorace elytrisque scabris, antennis *gigas.*
apice albis. *Syst. Ent.* 127. 1. *
Habitat in Iaponia. *Mus. Brit.*

Fabr. Spec. Ins.

L

2. C.

Palmarum. 2. *C. longirostris ater*, thorace supra plano, elytris abbreviatis striatis. *Syst. Ent.* 128. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 506. 1. *Mus. Lud. Vlr.* 42.

Curculio longirostris, antennis fractis clava truncata, femoribus muticis, corpore nigro depresso, thorace ouato planiusculo, elytris abbreviatis striatis. *Degeer Inf.* 5. 269. 4. tab. 15. fig. 26.

Cossus saguaricus. *Rumph. Amb.* 1. 79. tab. 17. fig. 9. *Scopol. Ann. Histor. nat.* 5. 89. 40.

Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 5.

Gron. Zooph. 578. tab. 16. fig. 4.

Merian. Surin. tab. 48. fig. 3.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 20.

Habitat in Indiae palmis.

cruenta- 3. *C. longirostris ater*, thorace lineis elytrisque punctis duobus sanguineis. *Syst. Ent.* 128. 3. *

Habitat in Carolina. *Mus. Dom. Banks.*

Praecedente minor.

longipes. 4. *C. longirostris nigricans*, elytris ferrugineis, rostro emarginato, pedibus anticis longioribus. *Syst. Ent.* App. 822. *

Curculio longipes. *Drury Inf.* 2. tab. 33. fig. 3.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*

indus. 5. *C. longirostris ater*, thorace subouato excavato punctato, elytris rugoso sulcatis, tibiis spinosis. *Syst. Ent.* 128. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 506. 2. *Mus. Lud. Vlr.* 43.

Curculio longirostris antennis fractis, femoribus dentatis, corpore nigro depresso, thoracis lateribus tuberculo villoso, elytris rugoso sulcatis. *Degeer Inf.* 5. 265. 1. tab. 15. fig. 22.

Habitat in India.

paganus. 6. *C. longirostris griseus*, thoracis dorso fusco, arcubus cinereis, rostro bisuleato. *Syst. Ent.* 128. 6. *

Habitat in Indiis. *D. Torstenson.*

Elephas. 7. *C. longirostris fuscus*, thorace elytrisque variolosis, elytris postice spinosis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnus.

Magnus. Caput basi atrum rostro cylindrico fuscō.
Thorax dorso plano valde variolosus, fuscus maculatis indistinctis obscurioribus. Elytra itidem variolosa fusca maculis obscurioribus apice spinis plurimis elevatis brevibus acutis. Pedes inermes, fusi.

Variat colore mox obscuriore, mox magis ferrugineo.

8. C. longirostris obscure purpurascens, elytris abbreviatis maculatis. *Syst. Ent.* 128. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 506. 3. *Mus. Lud. Vlr.* 44. *hemipterus.*

Curculio rufo fasciatus longirostris antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo rufo, thorace magno fasciis longitudinalibus nigris. *Degeer Inf.* 5. 271. 5. tab. 15. fig. 25.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 5.

Habitat in India.

9. C. longirostris rufo nigroque varius, rostro apice nigro. *Gen. Inf. Mant.* 223. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*

10. C. longirostris cinereus, coleoptris macula communi cordata fusca. *Syst. Ent.* 129. 7. *melano-*
cardius.

Curculio melanocardius longirostris cinereus, coleoptris fascia cordata fusca. *Linn. Syst. Nat.* 2. 608. 18. *Mus.*
Lud. Vlr. 18.

Sulz. Hist. Inf. 40. tab. 4. fig. 11.

Habitat in India.

11. C. longirostris niger, thorace subspinoſo, lineis elytris postice cruce albis. *Syst. Ent.* 129. 8. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

12. C. longirostris niger, elytris holosericeo striatis. *Syst. striatulus.*
Ent. 129. 9. *

Habitat in Insula Terre neuve Americae. *Banks.*

13. C. longirostris, elytris rufescensibus, fasciis nebuloſis. *Syst. Ent.* 129. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 608. 19. *Pini.*
Fn. Sv. 589.

Curculio longirostris, antennis fractis, senioribus muticis, corpore oblongo testaceo, maculis lineisque

transuersis flauis, elytris gibbosis. *Degeer Inf. 5.*
222. 15.

Frisch. Inf. 11. tab. 23. fig. 5.

Habitat in pini sylvestris cortice.

Affinis *C. abietis* et ambos copula iunctos vidi a *Linné*, at femora simplicia.

vittatus. 14. *C. longirostris ferrugineo fuscus albo lineatus, rostro nigro vtrinque sulco abbreviato baseos.*

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Corpus maiuscum. Rostrum cylindricum, nigrum, inter oculos sulcis duobus abbreviatis. Thorax ferrugineo fuscus lineis quinque albidis. Elytra laevia margine lineaque media albidis.

Iaceae. 15. *C. longirostris niger cinereo irroratus, elytris puncto baseos distincto.* *Syst. Ent. 129. 11. **

Habitat in *Centaurea Iacea*. *Prof. Hermann.*

Iunior atomis plurimi e villo cinereo conflatis, adultior vero magis glaber et niger.

Colon. 16. *C. longirostris griseus, elytris puncto albo.* *Syst. Ent. 130. 12. **

Curculio oblongus fuscus, thoracis lateribus albis, elytris striatis, puncto albo. *Geoff. Inf. 1. 280. 6.*

Curculio palustris. *Scop. Ent. carn. 104.*

Curculio Colon longirostris canescens, femoribus antecis subdentatis, thorace vtrinque linea, elytrisque puncto albo. *Linn. Mant. 531.*

Schaeff. Icon. tab. 155. fig. 2.

Habitat in Germania.

bigutta- 17. *C. longirostris niger, elytris puncto eleuato, abdome pedibusque posticis flauis.* *Syst. Ent. 130. 13. **

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

bilinea- 18. *C. longirostris fuscus, elytris lineis duabus punctorum alborum.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Medius. Rostrum brevius, crassiusculum nigrum. Thorax niger lineis tribus albis. Elytra striata nigra lineis

neis duabus e punctis quadratis albis, quarum altera ad marginem, altera ad futuram. Pedes simplices, nigri.

19. *C. longirostris cinereus*, elytris apice striis albis nigro punctatis. *tessellatus.*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
 Medius. Caput et antennae fusca. Thorax et elytra grisea, at elytra apice striis quinque albis et in his puncta distincta atra.
20. *C. longirostris*, thorace laeui, elytris muricatis nigris, punctis duobus apiceque albis. *Syst. Ent.* *Equiseti.*
 130. 14. *
 Habitat in equifeto aruensi Angliae.
21. *C. longirostris supra fuscus*, elytris fascia media alba, *Bufo.*
 subtus candidus.
 Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
 Rostrum elongatum, inflexum fuscum litura dorsali cinerea antennisque piceis. Thorax fuscus dorso plano punctis duobus minutissimis albis. Latera scutellumque alba. Elytra plana fusca rufo subvillosa fascia in medio lata communi alba. Litura alba ad apicem.
22. *C. longirostris aureus*, rostro plantisque nigris. *Syst. Bachus.*
Ent. 130. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 611. 38.
Rhinomacer niger, elytris rubris, capite thoraceque aureis, proboscide longitudine corporis. *Geoff. Inf.* 1. 270. 4.
Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 37. fig. 13.
 Habitat in Europae australioris vite, corylo.
23. *C. longirostris*, corpore viridi aurato subtus concolor. *Betulae.*
Syst. Ent. 130. 16. *Linn. Syst. Nat.* 2. 611. 39.
Fn. Sv. 605.
Curculio longirostris antennis rectis nigris, corpore subquadrato viridi aurato nitidissimo, pedibus purpureo aeneis. *Degeer Inf.* 5. 248. 5. tab. 7. fig. 25.

Rhinomacer totus viridi coeruleus. *Geoff. Inf.* 1. 270. 2.
Frisch. Inf. 12. 17. *tab. 8. fig. 2.*
Sulz. Hist. Inf. *tab. 4. fig. 5.*
Schaeff. Icon. *tab. 6. fig. 4.*

Habitat in betula alba, et vite, folia contorquens.
 Variat saepius colore omnino coeruleo. Alter sexus
 thorace in antrorsum spinosum gerit.

Populi. 24. *C. longirostris*, corpore viridi ignito subtus atro coerulecente. *Syst. Ent.* 131. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 511. 40. *Fn. Sv.* 606.

Curculio longirostris antennis rectis nigris, corpore subquadrato, supra viridi aurato, nitido, subtus violaceo, pedibus violaceis. *Degeer Inf.* 5. 249. 37.

Rhinomacer viridi auratus, subtus nigro violaceus.
Geoff. Inf. 1. 270. 3.

Habitat in betula, populo.

Thorax in altero sexu antrorsum spinosus.

bicolor. 25. *C. longirostris* niger, thorace elytrisque rufis. *Syst. Ent.* 131. 18. *

Habitat in America. *Mus. Dom. Hunter.*

cupreus. 26. *C. longirostris* obscure aeneus subtus obscurior. *Syst. Ent.* 131. 20. *Linn. Syst. Nat.* 2. 608. 21. *Fn. Sv.* 593.

Habitat in Europae hortis.

Tragiae. 27. *C. longirostris* aeneus, rostro pedibusque nigris. *Syst. Ent.* 131. 21. *

Habitat in tragiae volubilis seminibus e Brasilia allatis.

aeneus. 28. *C. longirostris* niger, clytris aeneis. *Syst. Ent.* 131. 22. *

Habitat in Angliae nemoribus. *D. Hunter.*

curviro- 29. *C. longirostris* ater nitidus, rostro areuato.

stris. Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum totum atrum, immaculatum. Rostrum elongatum, cylindricum, areuatum. Thorax punctatus, elytra striata, femora mutica,

30. *C. longirostris ater*, antennis ferrugineis, thorace bi- Pruni.
tuberculato. *Gen. Inf. Mant.* 223. *Linn. Syst. Nat.*
2. 507. 12.
Habitat in pruni, cerasi foliis.
Tuberculo thoracis vtrinque eleuato distinguitur.
31. *C. longirostris niger ouatus*, elytris striatis obtusis. Campa-
Gen. Inf. Mant. 224. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 506. 7. nulae.
Curculio longirostris, antennis fractis fuscis, corpore
subgloboso cinereo nigro, elytris lineis griseis. *De-*
geer Inf. 5. 226. 23.
Habitat in campanulae rotundifoliae pericarpiis.
32. *C. longirostris griseus*, pedibus rufis, rostro femori- fusciro-
busque basi nigris. *Syst. Ent.* 131. 23. * stris.
Habitat in Germaniae plantis. *Dom. de Hattorf.*
33. *C. longirostris viridis*, rostro atro. *Syst. Ent.* 132. 24. * nigriro-
Habitat in Angliae aruis. *Mus. Dom. Banks.* stris.
34. *C. longirostris subtestaceus*, thorace viridi lineato, variabi-
rostro apice fusco. *Gen. Inf. Mant.* 224. * lis.
Habitat Hamburgi. *Mus. D. Schulz.*
35. *C. longirostris niger*, rostro dimidiato pedibusque ru- rufiro-
fis. *Syst. Ent.* 132. 25. * stris.
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
36. *C. longirostris niger*, antennarum basi, coleoptro-salicariae.
rum disco pedibusque pallide testaceis.
Habitat in lythro salicaria Angliae. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus paruum, nigrum. Antennae clavatae nigrae
basi testaceae. Rostrum elongatum, striatum et tho-
rax nigra immaculata. Coleoptra striata disco testa-
ceo margine omni nigro. Pedes testacei femoribus
apice fuscis.
37. *C. longirostris subglobosus nebulosus*, elytrorum su- pericar-
tura basi alba. *Syst. Ent.* 132. 26. * pius.
Curculio pericarpinus longirostris subglobosus, co-
leoptris macula cordata alba. *Linn. Syst. Nat.* 2.
609. 31. *Fn. Sv.* 602.
Habitat in scrophulariae pericarpiis.

- Sisymbrii.* 38. *C. longirostris* albo fuscoque varius, elytris puncto baseos eleuato atro, rostro nigro. *Gen. Inf. Mant.* 224. *
Habitat in sisymbrio amphibio, Kiliae captus d. xx. Maii.

- Capreae.* 39. *C. longirostris*, coleoptris fasciis duabus abbreviatis vndatis albis.

Habitat in salice capraea Angliae. Mus. Dom. Banks.
Parvus. Caput, thorax, corpus atra. Thorax linea dorsali cinerascente. Elytra striata, atra fasciis duabus sinnatis albis, quae tamen marginem exteriorem haud attingunt. Pedes inerius, nigri.

- Alliariae.* 40. *C. longirostris* violaceus totus. *Syst. Ent.* 132. 27.
Linn. Syst. Nat. 2. 506. 4. *Fn. Sv.* 581.

Curculio coeruleus longirostris, antennis rectis, corpore obtuso villoso, coeruleo violaceo nitido. Degeer Inf. 5. 251. 39.

Frisch. Inf. 9. 35. tab. 18.

Habitat in erysimi alliariae caulis.

- cyanus.* 41. *C. longirostris* ater, elytris violaceis. *Syst. Ent.* 132. 28. *Linn. Syst. Nat.* 2. 506. 5. *Fn. Sv.* 581.

Curculio longirostris antennis rectis, corpore oblongo nigro, elytris nigro coeruleis. Degeer Inf. 5. 252. 41.
Habitat in Europae borealis salicibus.

- Craceae.* 42. *C. longirostris* gibbus supra ater subtus cinereus. *Syst. Ent.* 132. 29.

Curculio Craccae longirostris niger ouatus, rostro subulato, abdomine pallido. Linn. Syst. Nat. 2. 506. 6.

Curculio Viciae longirostris, antennis rectis, corpore oblongo villoso cinereo nigro, elytris sulcatis. Degeer Inf. 5. tab. 6. fig. 31. 32. ?

Habitat in Europae viciis.

- Maluae.* 43. *C. longirostris* griseus, elytris pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 132. 30. *

Habitat in Angliae maluis. Mus. Dom. Banks.

44. *C. longirostris nigricans*, coleoptris maculis quatuor *4macula-*
albidis. *Syst. Ent.* 133. 31. *Linn. Syst. Nat.* 2. 609. *tus.*
29. Fn. Sv. 600.
Curculio cinereus, elytrorum puncto quadruplici albo,
proboscide thorace longiori. *Geoff. Inf.* 1. 287. 22.
 Habitat in Europa.
45. *C. longirostris niger*, elytris fasciis duabus cinereis, *bifascia-*
baseos maiore vndata. *Gen. Inf. Mant.* 225. *tus.*
 Habitat in Kiliae plantis. *Dom. Lund.*
46. *C. longirostris piceus*, abdomine ouato. *Syst. Ent.* 133. 32. *acridu-*
Linn. Syst. Nat. 2. 507. 13. *Fn. Sv.* 584. *lus.*
Curculio pyriformis nigro coerulescens, abdomine oua-
to. *Geoff. Inf.* 1. 291.
Curculio longirostris, antennis fractis fuscis, femoribus
muticis, corpore ouato nigro fusco, tibiis pallidis.
Degeer Inf. 5. 235. 22.
 Habitat frequens in floribus tetrodynamis Europae bo-
realis.
47. *C. longirostris ater*, femoribus luteis. *Syst. Ent.* *flavipes.*
133. 33. *
Rhinomacer subglobosus niger striatus, femoribus ru-
fis. *Geoff. Inf.* 1. 272. 8.
 Habitat frequens primo vere in Europae locis apricis
calidis.
48. *C. longirostris purpureus nitens*, rostro longissimo. *purpu-*
Linn. Syst. Nat. 2. 607. 14. *Fn. Sv.* 585. *reus.*
Curculio rostro longissimo, antennis rectis, corpore
villoso subquadrato purpureo aurato nitidissimo.
Degeer Inf. 5. 250. 38.
- Scarabaeus miniatus minimus*. *Petiv. Gazoph.* tab. 22.
fig. 5. *Bergstr. Nomencl.* 1. 16. 12. tab. 2. fig. 12.
 Habitat in Europae plantis.
 Sequenti nimis affinis.
49. *C. longirostris sanguineus*. *Syst. Ent.* 133. 34. *Linn. frumen-*
Syst. Nat. 2. 608. 15. *Fn. Sv.* 586. *tarius.*
Rhinomacer sanguineus. elytris striato punctatis. *Ait.*
Nidros. 3. 391.

Curculio sanguineus longirostris antennis rectis, corpore oblongo sanguineo. *Degeer Inf.* 5. 251. 40.
Act. Holm. 1750. p. 186. 1.

Leuvenh. arc. 168. aug. 6. p. 83. fig. 3.

Habitat in frumento diutius asperuato.

dorsalis. 50. *C. longirostris*, elytris rubris, sutura nigra. *Syst. Ent.* 133. 35. *Linn. Syst. Nat.* 2. 608. 17. *Fn. Sv.* 588.
Habitat in ranunculo sicaria Europae borealis.
Tibiae flauae.

suturalis. 51. *C. longirostris* ouatus fuscus, linea longitudinali alba.
Syst. Ent. 133. 36. *
Habitat in Germaniae salice.

erux. 52. *C. longirostris* ater, thorace punctis duobus baseos,
elytris sutura punctisque sparsis albis. *Gen. Inf. Mant.* 225. *
Habitat Hamburgi. *Mus. D. Schulz.*

exclama- 53. *C. longirostris* ater, elytris puncto lineolaque apicis
tionis. albis. *Syst. Ent.* 133. 37. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

venustus. 54. *C. longirostris* fuscus thorace elytrisque albo lineatis,
pedibus testaceis.
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Parvus. Caput fuscum antennis testaceis lineaque dor-
fali albida. Thorax fuscus lineis tribus albidis.
Elytra punctato striata, dilutiora lineis duabus sub-
interruptis, albis. Pedes testacei femoribus muticis.

Rumicis. 55. *C. longirostris* griseus nigro nebulosus, antennis fu-
scis. *Syst. Ent.* 134. 38. *Linn. Syst. Nat.* 2. 614. 60.
Fn. Sv. 590.

Curculio longirostris femoribus muticis, antennis fra-
ctis, corpore oblongo griseo fuso nebuloso, thorace
fasciis duabus nigricantibus. *Degeer Inf.* 5. 231. 20.
tab. 7. fig. 10. 11.

Scarabaeus parvus, corpore sublongo totus obscure
rufus seu fuscus, punctis nigricantibus adspersus.
Raj. Inf. 85. 36.

Habitat in Europae rumice.

56. *C. longirostris piceus*, thorace punctato longitudine granari-
elytrorum. *Syst. Ent.* 134. 39. *Linn. Syst. Nat.* 2. us.
608. 16. *Fn. Sv.* 587.
Curculio rufo testaceus oblongus, thorace elytrorum
fere longitudine. *Geoff. Inf.* 1. 285. 18.
Curculio longirostris, antennis fractis, corpore oblon-
go fusco castaneo. *Deger Inf.* 5. 239. 25.
Scarabaeus parvus sordide fulvus, proboscide longa
deorsum arcuata. *Raj. Inf.* 88.
Ioblot. Obs. microsc. 1754. tab. 7. fig. 1.
 Habitat in frumento diutius asperuato in granariis pes-
simus. Pellitur isatide, hyoscyamo, sambuco, thla-
spide.
57. *C. longirostris piceus*, thorace punctato longitudine *Oryzae*.
elytrorum, elytris punctis duobus rufis. *Syst. Ent.*
134. 40. *
Curculio Oryzae longirostris oblongus niger, elytris
maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis.
Linn. Amoen. acad. 6. 395. 19.
 Habitat in *Oryza* diutius asperuata.
58. *C. longirostris ferrugineus*, thorace longitudine ely- *tubercu-*
trorum punctisque duobus dorsalibus eleuatis. *latus.*
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et summa affinitas *C. granarii*. Corpus totum
obscure ferrugineum. Thorax punctatus et praete-
rea punctis duobus dorsalibus eleuatis. Elytra pun-
ctato striata. Femora simplicia.
59. *C. longirostris cylindricus*, rostro longissimo subtus *barbicor-*
barbato, elytris elongato clavatis. *Syst. Ent.* 134. 41. * *nus.*
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
60. *C. longirostris cylindricus*, rostro apice glabro, atro *affimilis.*
elytris ferrugineo subfasciatis. *Syst. Ent.* 134. 42. *
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
61. *C. longirostris cylindricus*, thorace lineis, elytris pun- *semipun-*
ctis albis. *Syst. Ent.* 135. 43. * *ctatus.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks..*

- paraplecticus.* 62. *C. longirostris cylindricus subcinereus*, clytris mucronatis. *Syst. Ent.* 135. 44. *Linn. Syst. Nat.* 2. 610. 34. *Fn. Sv.* 634. *It. Scan.* 184.
Curculio oblongus, clytris villoso cinereis, sutura nigra. *Geoff. Inf.* 1. 279.
Curculio Phellandrii longirostris, antennis fractis, corpore oblongo cylindrico griseo viridi flavescente, clytris acuminatis remotis. *Degeer Inf.* 5. 224. 18. tab. 7. fig. 8.
Schreb. Sammlung 11. 336. tab. 4.
Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 7.
Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 1.
Habitat larua intra caulem umbellatarum aquaticarum, in primis phellandrii. Paraplegiam equorum causare fertur.
- filiformis.* 63. *C. longirostris cylindricus subcinereus*, thorace lineis tribus fuscis.
Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
Statura omnino *C. paraplectici*, at quadruplo minor. Rostrum cylindricum, fuscum. Thorax cinereus lineis tribus fuscis. Elytra cinerea, immaculata, minime punctata, obtusa. Pedes fusi.
- cylindrus.* 64. *C. longirostris cylindricus supra niger*, elytris acuminatis, fascia pallida.
Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
Statura oblonga *C. paraplectici*, at minor. Rostrum cylindricum, atrum antenuarum clava acuminata. Thorax supra fuscus, subtus albus. Elytra substriata, acuminata, nigra fascia pone medium lata alba, quae antice ad suturam extenditur. Abdomen nigrum apice album. Pedes breues, simplices.
- barbirostris.* 65. *C. longirostris niger*, rostro barbato, tibiis anticis tridentatis. *Syst. Ent.* 135. 45. *
Seb. Mus. 4. tab. 95. fig. 5.
Habitat in Indiis. *Mus. Dom. Kramer.*
- angusta-* 66. *C. longirostris cylindricus ater*, elytris obtusis punctatis. *Syst. Ent.* 135. 46. *
Habitat in Anglia rarius.

67. *C. longirostris cylindricus ater, lateribus subcoerulescentibus.* *Syst. Ent.* 135. 47. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 610. 36.
Habitat in Europa australiori.
68. *C. longirostris cylindricus niger, elytris vitta testacea.* *lineola.* *Syst. Ent.* 136. 48. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
69. *C. longirostris elongatus niger, antennis pedibusque linearis.*
piceis, rostro basi attenuato. *Syst. Ent.* 136. 49. **
Habitat Strasburgi. *Mus. Prof. Hermann.*
Variat rarior totus ferrugineus.
70. *C. longirostris, femoribus anticis subclauatis, corpore crassipes.*
re atro. *Syst. Ent.* 136. 50. *
Habitat Strasburgi. *Mus. Prof. Hermann.*
71. *C. longirostris elongatus ater, thorace nitido, elytris Atriplicis obtusis.* *Gen. Inf. Mant.* 225. *
Habitat in atriplici littorali floriae Kiloniensis *Dom. Lund. Norwegiensis.*
- ** *Longirostres, femoribus dentatis.*
72. *C. longirostris, femoribus posticis dentatis niger, elytris vniispinosis.* *bidens.* *Syst. Ent.* 136. 51. *
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
73. *C. longirostris obscurus scaber, thorace vtrinque fasciculato tuberculato, elytris striatis.* *iamaiensis.*
Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter.*
- Corpus magnum. Rostrum elongatum, cylindricum, incuruum, nigrum antennis capitatis cinereis. Thorax planus obscure griseus, punctis plurimis, eleuatis, atris, nitidis irroratus, lateribus vtrinque tubculo e pilis ferrugineis angulatis. Elytra striata, obscure grisea punctis itidem eleuatis atris irrorata. Femora acute dentata, tibiae apice dentatae.
74. *C. longirostris, femoribus quatuor anticis dentatis, mucoreus.*
elytris polline flauescentibus, supra apicem gibbosus.
Syst.

Syst. Ent. 136. 52. *Linn. Syst. Nat.* 2. 612. 49. *Mus. Lud. Vlr.* 53.

Habitat in Indiis.

pugio. 75. *C. longirostris*, femoribus quatuor posterioribus dentatis, elytris striatis nigris, linea repanda grisea. *Syst. Ent.* 136. 53. *Linn. Syst. Nat.* 2. 612. 50. *Mus. Lud. Vlr.* 46.

Habitat in Indiis.

spinipes. 76. *C. longirostris*, femoribus dentatis niger, thorace lineis duabus, elytris strigis quatuor albis, tibiis anticis spinosis.

Habitat in Americae meridionalis insulis. *Mus. D. Hunter.*

Magnus. Rostrum elongatum, cylindricum, incuruum atrum. Thorax antice attenuatus, punctatus, ater, linea vtrinque alba. Elytra punctis eleuatis scabra strigis tribus albis, quarum baseos arcuata cum secunda ad marginem exteriorem coit. Pedes nigri. Femora omnia acute dentata. Tibiae antice in medio vñidentatae.

scaber. 77. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace carinato, elytris sulcatis tuberculato spinosis. *Syst. Ent.* 137. 54. *

Habitat Caiennae. *D. Mallet.*

cylindri- 78. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace scabro; *rostris.* elytris postice bituberculatis. *Syst. Ent.* 137. 55. *

Habitat in noua Hollaudia. *Mus. Dom. Banks.*

stigma. 79. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris inacula inagna ferruginea. *Syst. Ent.* 137. 56. *Linn. Syst. Nat.* 2. 612. 52. *Mus. Lud. Vlr.* 48.

Habitat in Indiis.

Macula magna in medio elytrorum.

lebes. 80. *C. longirostris*, femoribus subdentatis, thorace scabro, elytris sulcatis tuberculatis, ore barbato.

Habitat in Bengal. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Rostrum mediocre, scabrum, atrum ore pilis fasciculatis, ferrugineis. Thorax rotundatus punctis eleuatis scaber, immaculatus. Elytra sulcata sulcis per paria apice coëuntibus tuberculisque nouem. 3. 3. 3. oblique positis, atra maculis duabus cinereis, altera ad marginem exteriorem, altera ad apicem. Pedes scabri atri, femoribus subdentatis.

81. C. longirostris pallidus, femoribus dentatis, thorace annulatus elytrisque strigis nigris. *Syst. Ent.* 137. 57.

Curculio annulatus longirostris, femoribus dentatis, thorace elytrisque fasciis linearibus nigris. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 613. 54. *Mus. Lud. Vlr.* 51.

Habitat in Indiis.

Striga vñica in thorace et duae in elytris.

82. C. longirostris oblongus, femoribus dentatis, elytro. caliginosum striis punctatis approximatis. *Syst. Ent.* 137. 58.* fus.

Habitat in Anglia rarius. *Mus. Brit.*

83. C. longirostris femoribus dentatis brunneus, rostro brunneus. fuscō, elytris testaceis punctato striatis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom.*: *Banks.*

Magnus. Caput brunneum rostro fuscō basi vtrinque sulcato. Antennae fuscae primo articulo longiori, reliquis brevibus pilosis, vltimis clauatis cinereis. Thorax punctatus, brunneus. Elytra striato punctata striis per paria apice coëuntibus, testacea apice puncto eleuato gibboso. Pedes testacei femoribus omnibus acute dentatis.

84. C. longirostris, femoribus dentatis, elytris fuscis, *Abietis.* fasciis duabus linearibus interruptis albidis. *Syst. Ent.* 138. 59. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 613. 57. *Fn.* *Sv.* 615.

Curculio subfuscus. *Linn.* *It. Oeland.* 26.

Curculio longirostris antennis fractis, corpore oblongo nigro, maculis griseo flavis. *Degeer Ins.* 5. 205. 1. tab. 6. fig. 11.

Curculio Norvegicus. *Petiv. Gazoph.* 14. tab. 8. fig. 9. *Schaeff. Icon.* tab. 25. fig. 1.

Habitat in pini sylvestris cortice et resina.

Forte varietas sexus C. pini.

- reticula-* 85. *C. longirostris oblongus piceus, femoribus dentatis, tuis.* elytris reticulatis, fasciis obliquis pallidis, tibiis annulis spinosis. *Syst. Ent.* 138. 60. *
Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*
- Lapathi.* 86. *C. longirostris femoribus bidentatis albo nigroque varius, thorace elytrisque muricatis.* *Syst. Ent.* 138. 61. *
Curculio Lapathi longirostris albido nigroque varius muricatus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 608. 20. *Fn. Sv.* 591.
Curculio albicaudis longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore ouato nigro, fasciculis pilis pilosis, elytris postice albis. *Degeer Ins.* 5. 223. 16. tab. 7. fig. 1. 2.
Habitat in Europae salice.
Descriptio *Linnaei* conuenit, at femora in nostris speciminiibus omnia bidentata.
- 6gutta-* 87. *C. longirostris, femoribus dentatis niger, elytris maculis tribus albis.* *Syst. Ent.* 138. 62. *
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
- turidus.* 88. *C. longirostris femoribus dentatis ouatus obscure niger, elytris punctato striatis.* *Syst. Ent.* 138. 63. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- flolidus.* 89. *C. longirostris, femoribus dentatis fuscus, tibiis posticis incuruis dentatis.*
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Medius. Caput rostro cylindrico nigrum basi ferrugineum. Antennae fractae, nigrae. Thorax punctis eleuatis numerosissimis scaber, niger maculis aliquot indistinctis, ferrugineis. Elytra striato punctata, fusca ferrugineo subfasciata. Pedes obscuri femoribus dentatis, posticis annulo cinereo. Tibiae posticæ breues, incuruae apice denticulis duobus obtusis altero latere interiori, altero exteriori.
- medita-* 90. *C. longirostris femoribus dentatis, elytris striatis postice acuminatis.* *Syst. Ent.* 139. 64. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

91. *C. longirostris femoribus dentatis niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris subspinotis.*
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.
92. *C. longirostris femoribus dentatis griseus, thorace linea punctisque duobus dorsalibus albis.* *Mangiferae. Syst. Ent. rae.*
 139. 66. *
Habitat in nucleis mangiferae. D. Koenig.
93. *C. longirostris femoribus dentatis villoso griseus, rostro testaceo.*
Habitat Surinami. Mus. Dom. Banks.
Medius. Rostrum elongatum, cylindricum, glabrum, testaceum. Thorax griseus lineis tribus cinereis. Elytra brevia, striata, grisea. Femora acute dentata.
94. *C. longirostris femoribus dentatis ater, thorace vtrinque punctis duobus testaceis.* *Syst. Ent. 139. 67. ** *germanus.*
Curculio germanus longirostris femoribus subdentatis corpore ouato nigro punctis testaceis adsperso. Linn. Syst. Nat. 2. 613. 58.
Scopol. Ann. Hist. nat. 5. 91. 44.
Sulz. Hist. Ins. 39. tab. 4. fig. 8.
Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 2.
Frisch. Ins. 13. 28. tab. 26.
Habitat in Europa, frequens in Germania.
95. *C. longirostris femoribus dentatis, coleoptris maculis duabus dorsalibus atris.* *Syst. Ent. 140. 68.* *Scrophulariae.*
Curculio Scrophulariae longirostris subglobosus coleoptris maculis duabus dorsalibus atris. Linn. Syst. Nat. 2. 614. 61. Fn. Sv. 603.
Curculio subglobosus niger, punctis duobus atris suturae longitudinalis coleoptrorum, thorace exalbido. Geoff. Ins. 1. 296. 44.
Curculio longirostris antennis fractis, corpore subgloboso fusco griseoue, coleoptris maculis duabus rotundis nigris. Degeer Ins. 5. 208. 3. tab. 6. fig. 17. 18. 19. 20.
Scarabaeus exiguus cinereus, duabus maculis nigris in alarum thecis insignitus. Lst. Scarab. Angl. 395. 35.
Fabr. Spec. Ins. *M* *Reaum.*

Reaum. Inf. 3. tab. 2. fig. 12.

Habitat in serophularia, verbasco.

Folliculus ouatus, operculatus, fuscus.

grauis. 96. *C. longirostris femoribus dentatis niger, elytris ferrugineo variis, femoribus canaliculatis.* *Syst. Ent.* 140. 69. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

5punctata- 97. *C. longirostris femoribus dentatis, elytris sutura punctisque duobus albis.* *Syst. Ent.* 140. 70. *

Curculio 5punctatus longirostris femoribus dentatis, elytris sutura alba maculisque duabus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 614. 64. *Fn. Sv.* 618.

Habitat in Europa boreali.

didymus. 98. *C. longirostris femoribus dentatis supra fuscis, elytris striatis, macula laterali transuersa alba.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Paruus. Corpus supra fuscum subtus griseum. Rostrum elongatum, atrum. Elytra obscura, valde striata macula transuersa laterali alba e punctis tribus composita. Femora acute dentata.

haemorrhoidalis. 99. *C. longirostris femoribus dentatis, thorace fusco, lateribus cinerascentibus, elytrorum sutura apice ferruginea.* *Syst. Ent.* 140. 71. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

trimaculatus. 100. *C. longirostris femoribus dentatis, coleoptris nigris, maculis tribus cinereis, postica communi lunata.* *Syst. Ent.* 141. 72. *

Habitat in Alsatia. *Prof. Hermann.*

Femora fusca annulo albo.

litura. 101. *C. longirostris femoribus dentatis albo nigroque varius, rostro vario.* *Syst. Ent.* 141. 73. *

Habitat in Europa.

villosus. 102. *C. longirostris femoribus dentatis villosus griseus, scutello fasciaque elytrorum postica albis.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Magnitudo praecedentium. Rostrum porrectum, cylindricum, atrum. Thorax griseus linea longitudinali albicante. Scutellum album. Elytra grisea postice fascia obliqua alba, quae tamen marginem exteriores haud attingit. Pedes grisei femoribus omnibus dentatis.

103. *C. longirostris* femoribus dentatis ater, elytris nitidis. *Syst. Ent.* 141. 74. *Linn. Syst. Nat.* 2. 607. 10. *aterris-*
mus. *Fn. Sv.* 582.

Habitat in Europae plantis frequentissimus.

Statura et magnitudo omnino *C. Alliariae*, at color ater.

104. *C. longirostris* femoribus dentatis ater, elytris opacis oblongis. *Syst. Ent.* 141. 75. *Linn. Syst. Nat.* 2. 607. 11. *Fn. Sv.* 583.

Curculio niger thorace vtrinque dentato. *Geoff. Inf.* 1. 299. 48.

Curculio Cerasi. *Scop. Ent. carn.* 84.

Frisch. Inf. 11. 31. tab. 23. fig. 1. 3.

Habitat in pruni, cerasi foliis.

Variat sexu thorace antice subspinoso.

105. *C. longirostris* femoribus dentatis violaceus totus. *violaceus.* *Syst. Ent.* 141. 76. *Linn. Syst. Nat.* 2. 614. 63. *Fn. Sv.* 579.

Curculio longirostris antennis fractis, corpore oblongo nigro coerulescente nitido, elytris striatis. *Degeer Inf.* 5. 213. 5.

Bergstr. Nomencl. 1. 16. 13. tab. 2. fig. 13.

Rhinomacer subuillosus coeruleus. *Geoff. Inf.* 1. 271. 5.

Habitat in Europae pinetis.

106. *C. longirostris* femoribus dentatis, corpore griseo *Nucum.* longitudine rostri. *Syst. Ent.* 141. 77. *Linn. Syst. Nat.* 2. 673. 59. *Fn. Sv.* 616.

Curculio rufo marmoratus, scutello cordato albo, proboscide subulata longissima. *Geoff. Inf.* 1. 295. 42.

Curculio longirostris antennis fractis, corpore oblongo nigro, pilis viridi flauis. *Degeer Inf.* 5. 205. 2. tab. 6. fig. 14. 15. 16.

Curculio ouatus griseus rostro filiformi longitudine corporis. Vdm. Diff. 24.

Roef. Inf. 3. tab. 67. fig. 6. 7.

Schaeff. Elem. tab. 55. fig. 1.

Icon. tab. 50. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 22.

Habitat in coryli auellanae nucibus frequens.

*probosci- 107. C. longirostris femoribus dentatis griseus, rostro
deus. corpore duplo longiore. Syst. Ent. 142. 78. **

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*

Atfinis forte varietas C. Nucum.

*varius. 108. C. longirostris femoribus omnibus dentatis; griseo
nigroque varius, rostro pedibusque rufis. Syst. Ent.
142. 79. **

Habitat Caiennae. *D. Mallet.*

*Ceraso- 109. C. longirostris femoribus dentatis fuscus, scutello
rum. elytrorumque fasciis obsoletis cinereis. Syst. Ent.
142. 80. **

Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*

Triplo minor C. Nucum.

*amoenus. 110. C. longirostris femoribus dentatis ater, thorace pun-
ctis duobus, coleoptris quinque niueis. Syst. Ent.
142. 81. **

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

*bicornis. 111. C. longirostris, femoribus acute dentatis, capite bi-
dentato.*

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus griseum siue fuscocinereoque mixtum. Ro-
strum cylindricum, fuscum. Denticuli duo breves,
erecti in fronte. Pedes fuscii femoribus acute den-
tatis. Elytra substriata.

*tenuiro- 112. C. longirostris, femoribus dentatis niger, elytris al-
stris. bo subfasciatis, antennis rufis.*

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura C. cerasorum, at minor. Caput nigrum rostro
porrecto, tenui, glabro, atro. Antennae rufae cla-
ua cinerea. Thorax niger pilis breuissimis, cine-
reis.

reis. Scutellum cinereum. Elytra nigra fasciis plurimis, vndatis, pallidioribus.

113. *C. longirostris femoribus dentatis, elytris testaceis Drupa-*
obsolete fasciatis. Syst. Ent. 143. 82. Linn. Syst. Nat. rum.
2. 614. 62. Fn. Sv. 617.

Curculio flavesiensis, elytris luteo et rufo tessellatis.
Geoff. Inf. 1. 296. 43.

Curculio longirostris antennis fractis, corpore oblongo
rufo fusco, elytris obsolete fasciatis. Degeer Inf. 5.
214. 7.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 11.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 21.

Habitat in cerasi padi nucleis.

114. *C. longirostris femoribus dentatis, thorace depresso, depressus.*
lateribus obtuse angulatis. Syst. Ent. 143. 83. Linn.
Syst. Nat. 2. 612. 53. Mus. Lud. Vlr. 49.
Seb. Mus. 4. tab. 95. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

115. *C. longirostris femoribus anticis dentatis, corpore Pomo-*
griseo nebuloso. Syst. Ent. 143. 84. Linn. Syst. Nat. rum.
2. 612. 46. Fn. Sv. 612.

Curculio in floribus arborum. Frisch. Inf. 1. 32. tab. 8.
 Habitat in Pomonae floribus

116. *C. longirostris, femoribus dentatis, corpore testaceo, Tortrix.*
pectore fusco. Syst. Ent. 143. 85. Linn. Syst. Nat. 2.
615. 67. Fn. Sv. 622.

Curculio ferrugineus, elytris striatis, oculis nigris.
Geoff. Inf. 1. 300. 51.

Curculio fulvus longirostris antennis fractis corpore
oblongo flavo testaceo. Degeer Inf. 5. 214. 16.

Habitat in populo tremula folia contorquens.

118. *C. longirostris femoribus dentatis, thorace nigro, taeniatus.*
margine antico posticoque rufis, elytris pallidis ni-
gro maculatis.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Minor *C. tortrice. Rostrum nigrum ore sanguineo. An-*
tennae testaceae clava cinerea. Thorax laevis, ni-
ger,

ger, margine antice posticeque rufis. Elytra subvillosa, substriata, pallida nigro maculata.

- anchora-* 118. C. longirostris femoribus dentatis, elytris flavo striatis, thorace elongato. *Syst. Ent.* 143. 86. *Linn. Syst. Nat.* 2. 613. 56. *Mus. Lud. Vlr.* 52.

Curculio longicollis longirostris antennis rectis femoribus dentatis, corpore longissimo nigro, thorace elongato cylindrico, elytris flavo striatis. *Degeer Inf.* 5. 273. 8. tab. 15. fig. 28.

Gron. Zooph. 583. tab. 15. sig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 6.

Habitat in Indiis.

Antennae moniliformes et statura depressa elongata proprium genus indicare videntur. Mihi haud rite examinatus.

- nafutus.* 119. C. longirostris femoribus omnibus tibiisque anticis dentatis, thorace elongato aeneo, elytris acuminatis.

Habitat in Iamaica. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis C. anchoragini paullo maior. Antennae omnes filiformes, articulis rotundatis, nigrae longitudine capitis. Caput cylindricum, viridi aeneum rostro longissimo apice depresso crassiori. Thorax elongatus, subcylindricus, canaliculatus, viridi aeneus. Elytra plana, punctato striata nigra lineis variis abbreviatis ferrugineis apice valde acuminatis. Pedes nigri femoribus omnibus dentatis tibiisque anticis videntatis.

- dispar.* 120. C. longirostris femoribus dentatis elongatus niger, elytris maculis quatuor rufescensibus. *Syst. Ent.* 143. 87. *

Curculio dispar longirostris femoribus dentatis, elytris emarginatis rubro striatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 613. 55. *Mus. Lud. Vlr.* 50.

Curculio minutus. *Drury Inf.* 1. tab. 42. fig. 37. ?

Habitat in America. *Dom. Drury.*

Aliud vidiimus insectum simillimum, at loco rostri maxillis duabus prominentibus vndentatis. An varietas sexus?

Antennae moniliformes, vti in C. anchoragine. Ad Atelabos refert *Geoffroy*, at vix iure.

121. C. longirostris femoribus dentatis niger, elytris maculis duabus ferrugineis. *Syst. Ent.* 144. 88. * *4pustulatus.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at antennae clauatae nigrae clava apice albida.

122. C. longirostris femoribus dentatis, thorace elongato, tibiis anticus bidentatis. *Syst. Ent.* 144. 89. *

Habitat in Insula Iamaica. *Dom. Drury.*

*** Longirostres, femoribus posticis incrassatis saltatoriis.

123. C. pedibus saltatoriis niger, coleoptris testaceis, maculis duabus obscuris. *Syst. Ent.* 144. 90. * *Alni.*

Curculio Alni longirostris, elytris liuidis, maculis duabus obscuris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 611. 42. *Fn. Sv.* 608.

Curculio rufus femoribus posticis crassioribus, elytris maculis quatuor nigris. *Geoff. Inf.* 1. 286. 20.

Curculio Alni saltator longirostris, corpore ouato testaceo elytris maculis binis fuscis, capite nigro. *Degeer Inf.* 5. 262. 49.

Habitat in Europae alno.

124. C. longirostris, pedibus saltatoriis niger cinereo variegatus. *pilosus.*

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum hirtum nigro cinereoque variegatum.

Antennae testaceae. Femora postica incrassata.

125. C. longirostris pedibus saltatoriis, elytris atris, fasciis duabus albis. *Syst. Ent.* 144. 91. *Linn. Syst. Nat.* 2. 611. 43. *Fn. Sv.* 610. *salicis.*

Curculio longirostris, corpore subgloboso atro, elytris fasciis duabus albis maculaque fulua. *Degeer Inf.* 5. 264. 51.
Habitat in salicis floribus.

viminalis. 126. *C. longirostris* pedibus saltatoriis, corpore testaceo. *Syst. Ent.* 145. 92. *

Curculio Quercus longirostris pallide flavus, oculis nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 609. 25. *Fn. Sv.* 596.

Curculio Vlmi longirostris saltator, corpore ouato flavo testaceo, oculis nigris. *Degeer Inf.* 5. 260. 48. tab. 8. fig. 5.

Curculio rufus saltator, elytris rufis. *Geoff. Inf.* 1. 286. 19.

Reaum. Inf. 3. 31. tab. 3. fig. 17. 18.

Habitat in salice, quercu, vlno Europae.

Fagi. 127. *C. longirostris* pedibus saltatoriis, corpore atro, femoribus pallidis. *Syst. Ent.* 145. 93. *Linn. Syst. Nat.* 2. 611. 44. *Fn. Sv.* 609. *Iter Scan.* III. *Scop. carn.* 73.

Habitat in foliis fagi syluaticae.

***** Breuirostres femoribus muticis.

argyreus. 128. *C. breuirostis* femoribus submuticis, corpore toto viridi argenteo aureoque maculato. *Syst. Ent.* 145. 94. *Linn. Syst. Nat.* 2. 615. 74. *Mus. Lud. Vlr.* 54.
Habitat in Indiis.

imperia. 129. *C. breuirostis*, elytris striis eleuatis atris sulcisque punctatis viridi aureis alternis, basi gibbis apice acuminatis.

Curculio imperialis. *Drury Inf.* 2. tab. 33. fig. 1.

Naturforsch. 10. tab. 2. fig. 1.

Habitat in America meridionali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus maximum, pulcherrimum. Antennae fractae nigrae. Rostrum atrum pilis viridibus. Thorax dorso atro in medio canaliculato viridi. Pectus et latera viridi aurea, nitida. Elytra basi gibba constant lineis eleuatis atris, glabris et sulcis punctatis squamoso aureis, nitidissimis, quae postice per paria coëunt. Pedes squamosi virides, inermes.

130. *C. breuirostris*, corpore viridi sericeo, fasciis aureis repandis. *Syst. Ent.* 145. 95. *Linn. Syst. Nat.* 2. 616. 75.
 Habitat in America meridionali.
 Femora fusca annulo aureo.
131. *C. breuirostris fuscus*, elytrorum sutura, abdominis marginaque marginibus aureis. *Syst. Ent.* 145. 96. * *tus.*
 Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
132. *C. breuirostris canescens*, thorace punctis nigris quadratuor, coleoptris nouendecim. *Syst. Ent.* 145. 97. * *tus.*
 Habitat Caiennae. *D. Mauduit.*
 Puncta elytrorum 1. 2. 2. 2. et unico communi.
133. *C. breuirostris coerulescens*, thorace punctis nigris 16punctata quatuor, coleoptris sedecim. *Syst. Ent.* 146. 98. *Linn. tus.*
Syst. Nat. 2. 618. 92. *Mus. Lud. Vlr.* 58.
 Habitat in Brasilia.
 Thoracis latera aurea. Punctum elytrorum posticum geminatum.
134. *C. breuirostris supra fuscus*, thorace coleoptrisque decorus, vittis duabus viridi aureis. *Syst. Ent.* 146. 99. *
 Habitat in America meridionali. *Mus. Dom. Banks.*
135. *C. breuirostris femoribus muticis viridi tomentosus*, *nitidulus.* elytris punctatis. *Syst. Ent.* 146. 100. *
 Habitat Caiennae.
136. *C. breuirostris*, elytris spinosis albis, macula lateralii *candidus.* fusca. *Syst. Ent.* 146. 101. *
 Habitat Caiennae. *D. Mallet.*
137. *C. breuirostris albus auro nitidulus*, elytris sulcatis *laeteus.* acuminatis.
 Habitat in Iamaica. *Mus. D. Hunter.*
- Medius. Caput album rostro breui emarginato. Thorax rotundatus albus aureo colore paullo splendens linea laterali fusco aurea. Elytra sulcata sulcis punctatis alba postice acuminata. Pedes albi tibiis coeruleoscentibus.

modestus. 138. *C. brevirostris cinereus*, thorace elytrisque fusco maculatis.

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Medius cinereus. Thorax latior, quam in reliquis, planus punctis dorsalibus fuscis. Elytra striata fusco maculata.

viridis. 139. *C. brevirostris virescens*, thoracis elytrorumque lateribus flauis. *Syst. Ent.* 146. 102.

Curculio viridis brevirostris femoribus muticis, corpore viridi, supra obscurō, subtus flauidoire. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 616. 76.

Curculio flavo cinctus brevirostris, antennis rectis, corpore oblongo viridi, fascia laterali flaua. *Deger. Inf.* 5. 256. 45.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 24.

Schaeff. Elem. tab. 108.

Icon. tab. 53. fig. 6.

Habitat in Europae Pomona.

aurifer. 140. *C. brevirostris*, corpore ferrugineo aureo maculato. *Syst. Ent.* 147. 103. *

Curculio aurifer. *Drury Inf.* 1. tab. 32. fig. 1.

Habitat in America.

Pedes anteriores elongati.

splendidus. 141. *C. brevirostris viridi nitens*, coleoptrorum disco cinereo cupreο nigro fasciato.

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino C. argentati, at minor et femora inermia. Caput cinereum rostro apice subtestaceo. Thorax viridis nitens dorso cinerascente lineis duabus atris. Coleoptrā limbo viridi nitente, disco cinereo cupreο, fascia media angulata lituraque postica nigris. Corpus viridi nitens. Femora inermia.

nebulosus. 142. *C. brevirostris canus*, elytris fasciis obliquis nigris.

Syst. Ent. 147. 104. *Linn. Syst. Nat.* 2. 617. 84. *Fn. Sv.* 635.

Curculio albo nigroque varius, proboscide planiuscula carinata thoracis longitudine. *Geoff. Inf.* 1. 278. 1. tab. 4. fig. 8.

Curcu-

Curculio carinatus antennis fractis, corpore oblongo nigro, maculis fasciisque albidis, elytris gibbosis.

Degeer Inf. 5. 241. 27.

Frisch. Inf. 11. 32. tab. 23. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 3.

Habitat in Europae campis frequens.

143. *C. breuirostris oblongus cinereus subnebulosus, rostro trisulcato.* *Linn. Syst. Nat. 2. 617. 85.* *falcirostris.*

Habitat in Europae plantis.

Statura et magnitudo omnino *C. nebulosus*, at rostrum trisulcatum.

144. *C. breuirostris oblongus supra fuscus, elytris macula baseos alba.* *lusitanicus.*

Habitat in Lusitania. *Dom. D. Gray.*

Statura et magnitudo *C. incani*. Corpus supra fuscum, subitus squamoso aureum. Elytra macula oblonga baseos alba.

145. *C. breuirostris cinereus, elytris lineis eleuatis tribus crenulatis atris.* *Syst. Ent. 147. 105.* * *crenulatus.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

146. *C. breuirostris niger, elytris punctis nigris albisque punctatis alternis holosericeis striatis.* *punctatus.*

Habitat in Terra noua Americae. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo *C. Ligustici*. Caput nigrum griseo pubescens. Thorax rotundatus niger griseo pubescens. Elytra nigra striis plurimis e punctis albis nigrisque alternis villosis exarata. Pedes simplices nigri.

147. *C. breuirostris oblongus fuscus, thoracis dorso plano.* *incanus.* no. *Syst. Ent. 147. 106.*

Curculio incanus *breuirostris cinereus oblongus, elytris obtusiusculis.* *Linn. Syst. Nat. 2. 616. 81. Fn. Sv. 631.*

Curculio cinereo squamosus, alis carens, elytris striatis. *Geoff. Inf. 1. 282. 10.*

Curculio griseo apterus *breuirostris antennis fractis longissimis rufis, corpore oblongo nigro fuscō, pilis nitidis griseis.* *Degeer Inf. 5. 242. 28.*

Scarabaeus fuscus lanugine incanus. *List. Scar. Angl.*

394. 30.

Habitat in Europae pinetis.

inter-ruptus. 148. *C. breuirostris obscurus, coleoptrorum fascia interrupta alba.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Medius rusticus. Antennae frætae. Orbita oculorum alba. Thorax fuscus scutello albo. Elytra striata albo irrorata et pone medium fascia albida obliqua sutura interrupta. Pedes cinerei femoribus inermibus.

longima-nus. 149. *C. breuirostris fuscus, thoracis margine punctisque duobus ferrugineis, pedibus anticis elongatis.* *Syst. Ent.* 147. 107. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Variat thorace elytrisque ferrugineis, linea nigra, thoracis dorsali, elytrorum ad marginem crassiorem. Pedes nigri.

raucus. 150. *C. breuirostris nigricans, elytris griseis cinereo punctatis.* *Gen. Inf. Mant.* 226.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Polygoni. 151. *C. breuirostris, thorace lineato, elytris cinereis, lineolis fuscis suturaque nigro punctata.*

Curculio Polygoni longirostris testaceis, coleoptrorum sutura nigra. *Linn. Syst. Nat.* 2. 609. 26. *Fn. Sv.* 597.

Habitat in Europæ polygono.

Medius. Rostrum griseum linea longitudinali alba. Thorax griseus lineis tribus albidis. Elytra cinerea lineola baseos duabusque aliis in medio fuscis. Sutura punctis distinctis fuscis. Pedes grisei femoribus inermibus.

griseus. 152. *C. breuirostris supra griseo fuscus subtus cinereus, rostro canaliculato.* *Syst. Ent.* 148. 108. *

Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*

3gutta-tus. 153. *C. breuirostris nigricans, elytris griseis, maculis duabus albis, posteriori maiori communi.* *Syst. Ent.* 148. 109. *

Sulz.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. II.

Habitat in Anglia, captus d. VI. Maii in fabuletis Richmondensibus.

154. C. breuirostris cinereo fuscoque varius, elytrorum *coryli*. futura dimidiata atra. *Syst. Ent.* 148. 110. *

Habitat in Angliae corylo, captus d. XX. Maii in nemoribus Richmondensibus.

155. C. breuirostris fuscus, thorace striis tribus pallidioribus. *lineatus.* *Syst. Ent.* 148. III. *Linn. Syst. Nat.* 2. 616. 80. *Fn. Sv.* 630.

Curculio breuirostris, antennis fractis, corpore oblongo griseo, thorace striis tribus pallidioribus. *Degeer Inf.* 5. 247. 35.

Curculio rostro thoracis longitudine, thorace striis tribus pallidioribus. *Geoff. Inf.* 1. 283.

Schaeff. Icon. tab. 103. fig. 8.

Habitat in Europae plantis variis.

156. C. breuirostris, coleoptris eleuato striatis, fascia semicirculari maculaque postica albis, lunula nigra. *lunatus.* *Syst. Ent.* 148. 112. *

Habitat in Anglia, captus die VI. Maii in fabuletis Richmondensibus.

157. C. breuirostris fuscus, elytris apice pallidis, striga *undatus*. *vndata fusca.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Parvus statura omnino C. lunati.

158. C. breuirostris fuscus, thorace cinereo lineata, elytris *hispida*. *hispidis*, punctis obscurioribus striatis. *Gen. Inf.* 1. *Mant.* 226. *

Habitat Kiliae in plantis aquaticis. *Dom. Lund.*

159. C. breuirostris, corpore cintereo hispido. *Syst. Ent.* *scabriculus.* 149. 113. *

Curculio scabriculus *breuirostris*, femoribus muticis cinereus, elytris hispidis. *Linn. Mant.* 531.

Habitat in Sueciae arenosis.

ceruinus. 160. *C. breuirostris griseus*, antennis basi rufescentibus. *Syst. Ent.* 149. 114. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 615. 70. *Fn. Sv.* 627.

Curculio griseo aeneus antennis fractis rufis, corpore oblongo griseo aeneo nitido. *Degeer Ins.* 5. 220. 13. Habitat in Europa.

In nostris femora omnino inermia.

lacerta. 161. *C. breuirostris griseus*, elytris striatis, antennis apice nigris.

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino *C. ceruini*, at triplo maior. Rostrum breue, crassum, apice emarginatum. Antennae fractae, griseae clava apice nigra. Thorax rotundatus griseus lateribus obscurioribus. Elytra striata, striis crenatis postice coëuntibus. Pedes inermes.

ruficor- 162. *C. breuirostris ater*, antennis rubris, thorace vtrinque bituberculato. *Syst. Ent.* 149. 115. *Linn. Syst. Nat.* 2. 616. 78. *Fn. Sv.* 636.

Habitat in Europa.

Thorace vtrinque tuberculato distinctus.

cloropus. 163. *C. breuirostris niger*, antennis pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 149. 116. *Linn. Syst. Nat.* 2. 617. 82. *Fn. Sv.* 635.

Habitat in Europae plantis.

Parvus et valde oblongus.

tristis. 164. *C. breuirostris niger*, elytris striatis cinereis. *Syst. Ent.* 149. 117. *

Habitat in Anglia, Suecia.

adspersus. 165. *C. breuirostris ater*, elytris postice albo maculatis. *Syst. Ent.* 149. 118. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

punctatus. 166. *C. breuirostris fuscus*, elytris punctis holosericeis eleuatis margineque flavo. *Syst. Ent.* 150. 119. *

Habitat in Europa boreali.

Elytra striato punctata et praeterea punctis eleuatis holosericeis atris albisque alternis adspersa.

167. C. breuirostris ouatus ferrugineo fuscus. *Syst. Ent.* obscurus.
150. 120. *
Habitat in Europa boreali.
168. C. breuirostris ouatus scaber niger, pedibus rufis. *niger.*
Syst. Ent. 150. 121. *
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
169. C. breuirostris niger, thorace carinato variolofo, variolo-
elytris striatis. *Syst. Ent.* 150. 122. * sus.
Habitat in Saxoniae campis.
170. C. breuirostris, thorace elytrisque variolosis nigris sticticus.
albo punctatis. *Gen. Inf. Mant.* 226. *
Habitat ad Cap. bon. sp.
171. C. breuirostris ater nitens, elytris punctato striatis, valgus.
femoribus annulo cinereo. *Syst. Ent.* 150. 123. *
Habitat in America meridionali. *Mus. Tottianum.*
172. C. breuirostris ater, elytris margine lineolisque dua-
bus albis. *Gen. Inf. Mant.* 226. * succin-
Habitat ad Cap. bon. sp. etus.
173. C. breuirostris ater, elytris striis albis rubrisque ab-
breuiatis. *Syst. Ent.* 150. 124. * vittatus.
Curculio vittatus longirostris, elytris lineis albis lu-
teisque. *Linn. Syst. Nat.* 2. 610. 33.
Scarabaeus Curculio proboscide longa, dorsum arcua-
tum, elytris fasciis albis et luteis variegatis. *Sloan.*
Iam. 2. p. 210.
Habitat in America meridionali.
174. C. breuirostris, elytris flauis, lineis atris glaberri. *Spengle-*
ri. *mis abbreviatis.* *Syst. Ent.* 151. 125. *
Curculio Spengleri longirostris fuscus, elytris flauis,
lineis atris glaberrimis abbreviatis inaequalibus, pe-
dibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 609. 3.
Curculio Spengleri. Acta Soc. Berol. phys. 4. tab. 7. fig. 7.
Habitat in America.
175. C. breuirostris griseus, thorace elytrisque cinereo liuidus.
atreque maculatis.

Curcu-

Curculio liuidus. Brown. Illust. 129. tab. 49. fig. 8.
Habitat in America meridionali.

Magnus. Rostrum cylindricum, crassum, laeve, ferrugineo griseum. Thorax griseus lineis tribus cinereis maculisque eleuatis atris. Elytra concolora maculis cinereis eleuatisque atris numerosis. Femora inermia.

pulcher. 176. C. breuirostris, coleoptris atris, striis sex dorsalibus approximatis abbreviatis albis.

Curculio pulcher. Brown. Illust. 126. tab. 49. fig. 6.

Habitat in Iamaica insula. Mus. Dom. Banks.

Statura omnino C. vittati. Caput et thorax punctata, atra, nitida. Elytra punctata, atra striis tribus approximatis, abbreviatis albis et parua marginali rubra. Apex fere obtusus parum cinerascit. Pedes atri.

histrioni. 177. C. breuirostris griseus, thorace lineis lateralibus fuluis, elytris albis, maculis atris fuluisque. Gen. Inf. Mant. 227. *

Habitat ad Cap. bon. sp. Dom. Lee.

Rohrii. 178. C. breuirostris, clytris acuminatis griseis, margine baseos flaquecente. Syst. Ent. 151. 126. *

Habitat in Americae insulis. Dom. v. Rohr.

impressus. 179. C. breuirostris niger, thorace elytrisque punctis impressis albis.

Habitat in Iamaica insula. Mus. Dom. Banks.

Statura praecedentium. Rostrum breve, crassiusculum, atrum vtrinque linea alba. Thorax ater punctis vtrinque duobus lateralibus, duobusque maioribus dorsalibus baseos impressis albis. Elytra punctato striata, atra lineis duabus punctorum alborum impressis. Pedes nigri.

albinus. 180. C. breuirostris niger fronte anoque albis, thorace tuberculato. Syst. Ent. 151. 127. Linn. Syst. Nat. 2. 616. 79. Fn. Sv. 632.

Curculio brérirostris antennis longis rectis, corpore oblongo nigro hispido, capite elytrorumque apice albis, rostro planiusculo lato. *Degeer Inf.* 5. 255.
44. tab. 8. fig. 1.

Curculio niger, aculeis thoracis tribus, elytrorum sex.

Vdm. Diff. 27.

Curculio albinus. *Scop. Ent. carn.* 66.

Habitat in Europa borealiori.

181. *C. breuirostris* rostro latissimo plano, elytris apice *latiro-*
albis, punctis duobus nigris. *Syst. Ent.* 151. 128. * *striis.*
Habitat Halae Saxonum.
Affinis *C. albino* et forte eius mera varietas.
182. *C. breuirostris niger*, thoracis elytrorumque margini-*marginel-*
ne albis. *lus.*
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Statura cylindrica *C. vernicosi*, at paullo minor. Caput
nigrum rostro breui, sulcato. Thorax punctis ele-
uatis maioribus scaber, niger margine laterali albo.
Elytra connata, scabra, nigra margine postice dupli-
cato albo. Pedes nigri femoribus inermibus.
183. *C. breuirostris aeneo niger* eleuato punctatus, elytris *verruco-*
postice verrucosis. *Syst. Ent.* 152. 129. * *Linn. Syst. sus.*
Nat. 2. 618. 90. *Mus. Lud. Vlr.* 60.
Curculio verrucosus. *Drury Inf.* 1. tab. 32. fig. 5.
Habitat in Aethiopia.
184. *C. breuirostris ater*, thorace eleuato punctato, ely-*capensis.*
tris striis crenatis. *Syst. Ent.* 152. 130. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 618. 82. *Mus. Lud. Vlr.* 59.
Habitat ad Cap. bon. sp.
185. *C. breuirostris niger*, fronte bidentato, elytris *vni-**vitulus.*
spinosis. *Syst. Ent.* 152. 131. *
Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*
186. *C. breuirostris griseus*, thorace inaequali antice pro-*inaequa-*
minulo, elytris sulcatis postice bidentatis, rostro *lis.*
trisulco.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Rostrum breve, crassum sulcis tribus latioribus exaratum. Thorax canaliculatus, inaequalis mucrone parvo obtuso antice prominens. Elytra sulcata sulcis subdentatis dentibus duobus posticis maioribus, distinctis.

rostratus. 187. C. breuirostris fuscus, capite thoraceque cylindricis angustioribus, elytris postice spinosis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Antennae mihi desunt, sub antennis vtrinque spina brevis, acuta. Caput cylindricum, canaliculatum, griseo fuscum ore atro. Thorax cylindricus, vix capite latior, sulcatus, griseo fuscus. Elytra griseo fusca, immaculata, postice lineis duabus spinarum erectarum. Pedes fusi, inermes.

spectrum. 188. C. breuirostris fuscus, thorace coleoptrisque globosis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum singularis statura. Rostrum breve, crassum, inaequale. Thorax brevis, elytris angustior, globosus. Coleoptera connata, striata punctisque eleuatis, acutis subspinosa, fere globosa. Pedes grisei.

acuminatus. 189. C. breuirostris cylindricus fuscus, elytris apice acuminatis. *Syst. Ent.* 152. 132. *

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

emeritus. 190. C. breuirostris niger, thorace elytrisque spinosis, fronte excavata. *Syst. Ent.* 152. 133. *Linn. Syst. Nat.* 2. 617. 87. *Mus. Lud. Vtr.* 35.

Habitat in Indiis.

barbarus. 191. C. breuirostris, thorace subspinoso, elytris angulo dupli crispato. *Syst. Ent.* 152. 134. *Linn. Syst. Nat.* 2. 617. 88.

Habitat in Africa, in Gallia duplo minor.

crispatus. 192. C. breuirostris, thorace mutico scabro, elytris lineis tribus eleuatis dentatis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Rostrum sulcatum. Thorax punctis magnis elevatis scaber. Stria punctorum elevatorum inter lineas eleuatas elytrorum.

193. C. breuirostris, thorace spinoso quinquesulcato, *globosus*. elytris laeuis. *Syst. Ent.* 153. 135. *

Curculio globosus. *Drury Ins.* 1. tab. 32. fig. 4.

Habitat in India. *Dom. Drury*.

194. C. breuirostris ater, thorace spinoso inaequali, elytris rubris, punctis nigris confertis. *Syst. Ent. App.* 822.

Habitat ad Cap. bon. sp.

195. C. breuirostris, thorace spinoso inaequali ater, elytris striis rufis denticulatis. *Gen. Ins. Mant.* 228. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. D. Schulz*.

196. C. breuirostris thorace tuberculis duobus compressis, *cultratus*. elytris tuberculatis postice cinereis. *Syst. Ent.* 153. 136. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.

197. C. breuirostris cinereus, thorace elytrisque subspicato *cornutus*, nosis, capite spinis fasciculato pilosis. *Syst. Ent.* 153. 137. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 618. 91. *Mus. Lud. Vlr.* 57.

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.

198. C. breuirostris cinereus, thorace scabro antice impresso, elytris spinosis. *Syst. Ent.* 153. 138. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.

Rostrum longitudine fere thoracis apice incrassatum.

199. C. breuirostris griseo fusca, elytris postice retusis *retusus*, dentatis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks*.

Statura praecedentium. Rostrum breve, crassum, inaequale, apice emarginatum. Thorax inermis, inaequalis. Coleoptra striis subelevatis, dentatis fere obsoletis, griseo fusca macula communi dorsali fusca, postice utrinque retusa dentibus acutis prominulis. Pedes grisei.

- 4dens.* 200. *C. breuirostris cinereus thorace scabro, elytris spinosis, spinis quatuor posticis longioribus.* *Syst. Ent.* 153. 139. *
- Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- 4spinofus.* 201. *C. breuirostris albidus, elytris quadrispinosis, rostro fusco.* *Gen. Inf. Mant.* 128. *
- Habitat ad Cap. bon. sp.
- Clavus.* 202. *C. breuirostris albicans, thorace canaliculato, coeloeptris spinosis, lineolis tribus baseos rubris.* *Syst. Ent.* 154. 140. *
- Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- nodulosus.* 203. *C. breuirostris, thorace lineis sex nodulosis, elytris spinosis.* *Syst. Ent.* 154. 141. *
- Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- rubifer.* 204. *C. breuirostris cinereus, thorace scabro, elytris spinis eleuatis sanguineis.* *Syst. Ent. App.* 822. *
- Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- globifer.* 205. *C. breuirostris, thorace scabro, elytris spinosis, postice acuminatis.* *Syst. Ent. App.* 823. *
- Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- apterus.* 206. *C. breuirostris, thorace spinoso, cruce impresso, elytris ferrugineo punctatis.* *Syst. Ent.* 154. 142. *
- Curculio apterus breuirostris*, pedibus muticis, corpore atro, thorace spinoso, elytris coadunatis, abdome punctato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 619. 95.
- Curculio cruciatus apterus*, breuirostris carinatus, antennis rectis, corpore ouato atro subtus maculis rubris, thorace spinoso crucigero. *Degeer Inf.* 5. 275. tab. 16. fig. 1.
- Habitat in India.
- ocellatus.* 207. *C. breuirostris, thorace spinoso antice excavato, elytris cinereis, punctis atris subspinosis.* *Syst. Ent.* 154. 143. *
- Habitat in Insula Madagascar. *Mus. Brit.*

***** Breuirostres femoribus dentatis.

208. *C. breuirostris femoribus dentatis, corpore viridi spectabilis nigroque variegato. Syst. Ent. 155. 144. **
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
209. *C. breuirostris femoribus dentatis, corpore obscuro. Ligustici. Syst. Ent. 155. 145.*
Curculio Ligustici breuirostris femoribus dentatis, abdome subouato murino. Linn. Syst. Nat. 2. 615. 68. Fn. Sv. 621.
Curculio apterus antennis fractis, corpore oblongo nigro fuscō, squamulis griseis nitidis. Degeer Inf. 5. 218. 10.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 12.
Habitat in Ligustico leuisticō.
210. *C. breuirostris femoribus dentatis griseus, elytris nubilus. punctis obscurioribus numerosis. Gen. Inf. Mant. 228. **
Habitat Hainburgi. *D. Schulz.*
211. *C. breuirostris, femoribus dentatis niger obscurus, nigrita. thorace scabro, elytris crenato striatis.*
Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
Statura et magnitudo C. sulcati, at elytra immaculata.
212. *C. breuirostris femoribus dentatis ater, elytris stria- sulcatus. tis ferrugineo maculatis. Syst. Ent. 155. 146. **
Habitat in Saxoniae nemoribus.
213. *C. breuirostris femoribus dentatis ater, elytris pun- gemma- etis viridibus. Gen. Inf. Mant. 229. **
Curculio gemmatus. Scop. Ent. carn. 90.
Curculio gemmatus. Naturforsch. 6. tab. 4.
Habitat in Europa.
214. *C. breuirostris femoribus dentatis griseus, elytris picipes. nebulosis, femoribus posticis rufis. Gen. Inf. Mant. 229. **
Habitat in Kiliae plantis. *Dom. Lund.*

Morio. 215. *C. breuirostris femoribus dentatis ater nitens, elytris glabris.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Magnus totus ater, glaber nitidus. Thorax rotundatus, immaculatus. Femora dentata.

fulcatus. 216. *C. breuirostris, femoribus dentatis niger, coleoptorum limbo cinereo, rostro bisulcato.*

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Statura C. sulcati. Rostrum breve sulcis duobus dorsibus impressis, apice incrassatum. Thorax supra niger, lateribus cinereis. Elytra obsolete striata nigra margine antico et lateralí cinereis. Pedes nigri femoribus dentatis.

Pyri. 217. *C. breuirostris femoribus dentatis aeneo fuscus. Syst. Ent. 155. 147. Linn. Syst. Nat. 2. 615. 72. Fn. Sv. 623.*

Curculio squamoso viridis rostro thorace breuiore, pedibus rufis. Geoff. Inf. 1. 282.

Curculio breuirostris, antennis fractis rufis, corpore oblongo aeneo nitido, pedibus rufis. Degeer Inf. 5. 246. 34.

Curculio viridis opacus, pedibus antennisque magis fuscis. Linn. It. Scan. 355.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 11.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 23.

Habitat in pyri foliis, in corollis declaratus.

Variat pedibus rufis et nigris.

argenta- 218. *C. breuirostris femoribus dentatis, corpore viridi argenteo. Syst. Ent. 155. 148. Linn. Syst. Nat. 2. 615. 75.*

Curculio squamosus, viridi auratus. Geoff. Inf. 1. 293. 38.

Curculio Vrticæ breuirostris, antennis fractis femoribus dentatis, corpore oblongo viridi nitido, pedibus viridibus. Degeer Inf. 5. 219. 12.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 9.

Habitat in Europæ vrtica, betula, quercu.

virida- 219. *C. breuirostris femoribus dentatis viridis, ore antennisque nigris, oculis atris. Syst. Ent. 155. 149. **

Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*

CLASS. I. ELEVTERATA. Rhinomacer. 199

220. *C. breuirostris femoribus dentatis, antennis elytris oblongus.*
pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 156. 150. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 615. 21. *Fn. Sv.* 625.
Curculio oblongus niger, elytris pedibusque testaceis.
Geoff. Inf. 1. 294. 39.
Habitat in Europa.
221. *C. breuirostris femoribus dentatis, corpore nigro, ouatus.*
pedibus antennisque rufis. *Syst. Ent.* 156. 151. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 615. 69. *Fn. Sv.* 626.
Curculio Rosae apterus breuirostris pedibus antennis-
que fractis rufis, corpore oblongo nigro fusco. *De-*
geer Inf. 5. 219. 11.
Habitat in Europae Pomona.
222. *C. breuirostris femoribus dentatis, rostro elytrisque attelaboi-*
vnituberculatis. *Syst. Ent.* 156. 152. * *des.*
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

39. R H I N O M A C E R.

- I. Rhinomacer. *eurculioi-*
Habitat in Italia. *Dr. Allioni.* *des.*
Statura omnino curculionis, at distinctum genus. Pal-
pis quatuor extorsum crassioribus articulo vltimo
oblique truncato, antennisque setaceis rostro insi-
dentibus thoracis longitudine. Rostrum crassiuscu-
lum, planum in medio impressum. Thorax elytra-
que laeuia, grisea, immaculata. Corpus subtus ci-
nereum pedibus nigris.

40. A T T E L A B V S.

- I. *A. niger, elytris rufis reticulatis. Syst. Ent.* 156. 1. *Coryli.*
Attelabus Coryli niger, elytris rubris. Linn. Syst. Nat.
2. 619. 1. *Fn. Sv.* 638.
Curculio niger, elytris rubris, capite postice elongato.
Linn. It. Oel. 153.
Curculio excoriato ruber breuirostris, antennis rectis,
corpore breui subquadrato nigro, elytris rubris, ca-
N 4 pite

pite ouato postice attenuato. *Degeer Inf.* 5. 257. 46.
tab. 8. fig. 3.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 1.

Pontop. Atl. Dan. 205. 1. tab. 16.

Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 8.

3. *Attelabus Auellanae* niger, elytris thorace pedibusque rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 619. 2.

Rhinomacer thorace elytrisque rubris, capite parce elongato. *Geoff. Inf.* 1. 273. 11.

Curculio collaris. *Scop. Ent. carn.* 71.

Schaeff. Icon. tab. 56. fig. 5. 6.

Habitat in *Coryli* foliis, quae in cylindrum conuoluit et vtrinque claudit.

apustula- 2. A. ater, elytris macula baseos rufa. *Gen. Inf. Mant.*
tus. 229. *

Habitat in America septentrionali. *Dom. Teats.*

curculio- 3. A. niger, thorace elytrisque rubris. *Syst. Ent.* 157. 2.
noides. *Attelabus Curculionoides* niger, thorace elytrisque rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 619. 3.

Rhinomacer niger, thorace elytrisque rubris proboscide longitudine capitis. *Geoff. Inf.* 1. 273. 10.

Curculio nitens. *Scop. Ent. carn.* 72.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 12.

Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 8.

Habitat in *Europae corylo*, falice.

ruficollis. 4. A. rufus, capitis vertice nigro, elytris coeruleis nitidis.

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Statura A. *Coryli.* Caput rufum vertice late nigro.

Antennae apice cinereae. Thorax gibbus, rufus, immaculatus. Elytra cyanea, nitida, immaculata. Abdomen rufum subtus nigrum margine tamen rufo. Pedes rufi.

pubescens. 5. A. violaceus hirtus, rostro atro.

Curculio pubescens. *Syst. Ent.* 131. 19. *

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Antennae et caput omnino huius generis. Corpus totum violaceum, hirtum rostro solo nigro, magis, quam in reliquis elongato.

6. A. ater, pedibus saltatoriis. *Syst. Ent.* 157. 3. *Betulae.*
Attelabus Betulae pedibus saltatoriis, corpore toto atro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 620. 7. *Fn. Sv.* 640.
Curculio excoriato niger brevirostris, antennis rectis, corpore breui subquadrato nigro nitido, capite quanto postice attenuato, femoribus posticis maximis. *Degeer Inf.* 5. 259. 47.
Habitat in Betulae soliis, quae rodendo pulcre crispa reddit. Ocissime salit.

41. C L E R V S.

1. C. niger, elytris fascia triplici alba. *Syst. Ent.* 157. 1. * *mutillarius.*
Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.*
2. C. rufus, elytris nigris, fascia duplice alba basique rufis. *Gen. Inf. Mant.* 229. * *dubius.*
Habitat in America boreali. *Dom. Yeats.*
3. C. capite thoraceque rufis, elytris nigris, fascia media ichneumonrufa strigaque apicis alba. *Gen. Inf. Mant.* 230. * *nius.*
Habitat in America boreali. *Dom. Yeats.*
4. C. niger, elytris fascia duplice alba basique rubris. *Syst. formicarius.*
Ent. 157. 2.
Attelabus formicarius niger, elytris fascia duplice alba basique rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 620. 8. *Fn. Sv.* 641.
Clerius formicarius niger, thorace elytris antice abdomineque rubris, elytris fasciis binis albis. *Degeer Inf.* 5. 160. 3. tab. 5. fig. 8.
Cantharis xxix. Raj. Inf. 103. 29.
Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 8.
Habitat in Europa, America boreali.
5. C. niger, fronte cinerascente, elytris maculis tribus albis. *Syst. Ent. App.* 823. *sexguttatus.*
Habitat in America meridionali. *Dom. Drury.*

tricolor. 6. *C. rufus*, capite nigro, elytris basi coeruleis medio rufis apice violaceis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Minor C. formicario. Caput atrum, immaculatum antennis extrorsum crassioribus piceis. Thorax glaber laevis, obscure rufus. Elytra striato punctata basi coerulea, nitida, in medio rufa, apice violacea, nitida. Pedes fusti femoribus basi rufis.

2fascia- 7. *C. viridi aeneus pubescens*, elytris cyaneis, fasciis duabus coccineis.

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo C. formicarii. Caput et thorax virescenti coerulea pubescentia immaculata. Elytra glabra, nitida, cyanea fasciis duabus coccineis, altera in medio, altera ante apicem. Corpus pubescens, viridi aeneum.

sipyulus. 8. *C. viridis*, elytris fascia dupli flava interrupta, thorace hirsuto. *Syst. Ent.* 158. 3.

Attelabus sipyulus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 620. 9. *Mus. Lud. Vlr.* 63.

Habitat in Africa.

apiarius. 9. *C. elytris rubris*, fasciis tribus coerulescentibus. *Syst. Ent.* 158. 4.

Clerus nigro violaceus hirsutus, elytris fascia triplici coccinea. *Geoff. Ins.* 1. 304. 1. tab. 5. fig. 4.

Clerus coeruleo violaceus, elytris rubris fasciis tribus transuersis violaceis. *Degeer Ins.* 5. 157. 1. tab. 5. fig. 3.

Attelabus apiarius coerulescens, elytris rubris fasciis tribus nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 620. 10.

Sulz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 6.
tab. 4. fig. 14.

Schaeff. Elem. tab. 46.

Icon. tab. 48. fig. 11.

Habitat larua frequens in Europae, et Americae apum alueariis, declarata in floribus.

42. NOTOXVS.

1. *N. pubescens*, elytris nigris, fasciis tribus pallidis. *Syst. Ent.* 158. 1. *mollis*,
Attelabus mollis griseus pubescens, elytris fasciis tri-
 bus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 621. 11. *Fn. Sv.* 642.

Clerus fuscus villosus, elytris flaviis, cruce fusca. *Geoff.*
Inf. 1. 305. 3.
Clerus fuscus fasciatus elytris flavo griseis fasciis dua-
 bus transuersis fuscis, abdomine rubro. *Degeer Inf.*

5. 159. 2. tab. 5. fig. 6..
Curculio oblongus ruber, elytris nigris, fascia triplici
 albicante. *Vdm. Diff.* 28. tab. 1. fig. 9.

Habitat in Europae floribus.

2. *N. thorace in cornu supra caput protenso*. *Syst. Ent.* *monoce-*
tos.
158. 2.

Notoxus. *Geoff. Inf.* 1. 356. 1. tab. 6. fig. 8.

Meloe monoceros alatus, thorace in cornu supra caput
 protenso. *Linn. Syst. Nat.* 2. 681. 14.

Attelabus monoceros. *Linn. Fn. Sv.* 638.

Habitat in Europae floribus.

43. SPONDYLS.

1. *S. atra*, thorace subgloboso. *Syst. Ent.* 159. 1. *buprestoi-*
des.
Attelabus buprestoides ater, elytris neruosis, thorace
 subgloboso. *Linn. Syst. Nat.* 2. 621. 3.

Cerambyx maxillosus niger, thorace mutico subglobo-
 so, antennis longitudine thoracis, articulis compres-
 sis, dentibus maximis. *Degeer Inf.* 5. 84. 21. tab.
 3. fig. 21.

Scarabaeus arboreus collo crasso. *Frisch. Inf.* 13. pag.
 23. tab. 19.

Habitat in Europae sylvis.

Metamorphosis adhuc omnino latet.

2. *S. atra*, elytris rugosis thorace latioribus. *Syst. Ent.* *ceramboi-*
des.
159. 2.

Attelabus ceramboides ater, elytris rugosis. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 621. 12. *Fn. Sv.* 643.

Curcu-

Curculio maximus ater oblongus, elytris irregulariter reticulatis. *Vdm. Diff.* 26. tab. 1. fig. 1.

Tenebrio variolosus alatus ater, elytris rugosis. *Degeer Inf.* 5. 32. 2.

Habitat in Boleto fomentario.

44. P R I O N V S.

longimanus. 1. *P.* thorace spinis mobilibus, elytris basi videntatis apiceque bidentatis, antennis longis. *Syst. Ent.* 159. 1.

Cerambyx longimanus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 621. 1.
Mus. Lud. Vlr. 64.

Cerambyx thorace spinoso, pedibus anticis longissimis, elytris basi videntatis apiceque bidentatis, antennis longissimis. *Degeer Inf.* 5. 102. 6.

Scarabaeus capricornus maximus nigricans fasciis elytrorum coccineis et flavis. *Sloan. Iam.* 2. 209.

Nocoonaca. *Grew. Mus.* 161. tab. 13.

Roef. Inf. 2. p. 11. tab. 1. fig. 2.

Aubent. Miscell. tab. 64. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

In altero sexu tibiae anticae longissimae.

fuligino- 2. *P.* thorace marginato crenato videntato ater, elytris fus. apice crenato dentatis. *Syst. Ent.* 160. 2. *

Habitat in America meridionali. *Mus. Brit.*

lineatus. 3. *P.* thorace marginato crenato videntato niger, albo vittatus, elytris apice crenato dentatis. *Syst. Ent.* 160. 3.*

Cerambyx lineatus thorace marginato ferrato dentato, elytris nigris, linea alba, antennis compressis brevioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 624. 14.

Sloan. Iam. 2. 209. tab. 237. fig. 34.

Brown Iam. 430. tab. 43. fig. 7.

Habitat in America meridionali. *Mus. Brit.*

Faber. 4. *P.* thorace marginato vtrinque videntato rugoso, elytris piceis, antennis mediocribus.

Cerambyx Faber. *Linn. Syst. Nat.* 2. 622. 6. *Fn. Sv.* 646.

Bergstraess. Nomencl. 1. tab. 13. fig. 1.

Frijch. Ins. 13. pag. 2. tab. 17.

Schaeff. Icon. tab. 72. fig. 3.

tab. III. fig. 1.

Habitat in Europae ligno rarius.

5. P. thorace marginato bidentato, elytris rufis mucronatis. *Syst. Ent.* 160. 4. *

mucronatus.

Habitat in America meridionali. *Dom. Drury.*

6. P. thorace marginato multispinoso, mandibulis, porrectis vnidentatis apice bifidis, pedibus anticis elongatis. *Syst. Ent.* 160. 5. *

Petiv. Gazoph. tab. 47. fig. 1.

Habitat in Insulis Luzonum. *Mus. Brit.*

7. P. thorace marginato multispinoso, mandibulis porrectis apice tridentatis, pedibus spinoso ferratis. *ferripes.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Summa affinitas praecedentis. Caput canaliculatum, nigrum ore intus barbato. Mandibulae validae basi vnidentatae apice tridentatae. Antennae mediocres longitudine corporis secundo articulo subtus scabro. Thorax margine spinis duodecim, ater, immaculatus. Elytra subferruginea. Pedes omnes spinis acutis validis ferrati.

8. P. thorace marginato vtrinque tridentato, mandibulis ceruicor- porrectis extus vniispinosis, antennis breuibus. *Syst. nis.* *Ent.* 161. 6. *

Cerambyx ceruicornis thorace marginato dentato, maxillis porrectis corniformibus vtrinque spinosis, antennis breuibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 622. 3. *Mus. Lud. Vlr.* 65.

Cerambyx fasciis longitudinalibus vndulatis ferrugineis, thorace depresso dentato, maxillis porrectis corniformibus dentatis, antennis breuibus. *Deger Inf.* 5. 94. 1.

Sloan. Iam. 2. tab. 237. fig. 6.

Merian. Surin. tab. 48.

Roes. Inf. 2. *Scar.* 2. p. 12. tab. 1. fig. 8.

Brown.

Brown. Jam. 249. tab. 44. fig. 8.

Aubent. Misc. tab. 90. fig. 3.

Habitat in Americae lingno bombacis.

Larua Americanis in deliciis.

coriarius. 9. P. thorace marginato tridentato, corpore piceo, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 161. 7.

Prionus. Geoff. Inf. 1. 198. 1. tab. 3. fig. 9.

Cerambyx coriarius. Linn. Syst. Nat. 2. 622. 7. *Fn. Sv.* 647.

Cerambyx maximus cornubus magnis articulatis. Raj. Inf. 95. 1.

Cerambyx cinereo nigricans antennis et pedibus rufis. Gad. Satag. 79.

Cerambyx niger antennis ferratis. Frisch. Inf. 13. tab. 9.

Cerambyx Prionus fusco castaneus obscurus nitidus, thorace depresso dentato, corpore lato, antennis breuioribus. Degeer Inf. 5. 59. 1. tab. 3. fig. 5.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 26.

Roef. Inf. 2. *Scar.* 2. tab. 1. fig. 1. 2.

Schaeff. Elem. tab. 103.

Icon. tab. 67. fig. 3.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 13. fig. 3. 4. 5. 6.

Voet. Scar. 2. tab. 3. fig. 9.

13. *Cerambyx imbricornis* thorace marginato bidentato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, antennis perfoliato imbricatis breuioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 622. 5. huius mera varietas.

Habitat in Europae, Americae borealis betulis putridis. Ova magna, oblonga, flavescentia.

Lucanus tridentatus. Linn. Syst. Nat. 2. 560. 3. huius specimen mutilatum mihi videtur.

giganteus. 10. P. thorace vtrinque tridentato, corpore nigro, elytris ferrugineis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 161. 8.

Cerambyx giganteus. Linn. Mant. 1. 531.

Aubent. Misc. tab. 64. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

Mandibulae bidentatae.

- ii. P. thorace marginato vtrinque quadridentato, elytris armilla-
ferrugineis nigro marginatis. *Syst. Ent.* 162. 9. *tus.*

Cerambyx armillatus thorace marginato vtrinque qua-
dridentato, elytris ferrugineis nigro marginatis, fe-
moribus posticis vnidentatis. *Linn. Syst. Nat.* 2,
622. 4.

Gron. Zooph. 525. tab. 15. fig. 6.

Habitat in India.

12. P. thorace marginato denticulato, mandibulis porre-
ctis bidentatis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 162. 10.* *damicor-*
nis.

Cerambyx damicornis thorace marginato crenulato an-
gulato, maxillis porrectis corniformibus, introrsum
bidentatis, antennis mediocribus. *Linn. Mant.* 1. 532.

Cerambyx damicornis castaneus, thorace depresso fer-
rato, maxillis porrectis intus villosis apice tridenta-
tis, antennis breuibus. *Degeer Inf.* 5. 97. 2.

Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

Larua Americanis in deliciis.

13. P. thorace marginato denticulato, corpore nigro, ely-
tris rubris, fasciis duabus atris, antennis breuibus. *bifascia-*
tus.

Syst. Ent. 162. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 624. 16.

Gronov. Zooph. 532. tab. 14. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

14. P. thorace marginato tridentato obscurus, pectore ab-
domineque ferrugineis, antennis breuibus. *cylindri-*
cus.

Habitat in America boreali. *Mus. D. Blackburn.*

Medius. Antennae breues, compressae. Caput et tho-
rax nigra. Elytra picea. Pectus, abdomen ferrugi-
nea. Statura magis cylindrica quam in reliquis con-
generibus.

15. P. thorace marginato crenulato, corpore nigro, ely-
tris glabris ferrugineis, margine luteo. *Syst. Ent.* *Thomae.*
162. 12.

Cerambyx Thomae thorace marginato denticulato, cor-
pore nigro, elytris ferrugineis, margine luteo. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 623. 9.

Cerambyx Thomae. *Act. Soc. Ber. phys.* 4. tab. 7. fig. 9.
Habitat in Insulis Americae meridionalis.

- bilineatus.* 16. P. thorace marginato crenato albo bilineato, clytris ferrugineis, atomis albis margineque luteo. *Syst. Ent.* 163. 13. *
- Habitat in Americae Insulis. *Dom. v. Rohr.*
- spinibarbis.* 17. P. thorace marginato crenato, capite sub mandibulis spinoso scabro, mandibulis tridentatis. *Syst. Ent.* 163. 14. *
- Cerambyx spinibarbis* thorace marginato subcrenulato, capite sub maxillis spinoso scabro, antennis brevibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 624. 4. *Mus. Lud. Vlr.* 67. *Merian. Surin.* 24. tab. 24.
- Habitat in America meridionali.
- maxilliferus.* 18. P. thorace marginato crenato, mandibulis porrectis intus hirsutis quadridentatis. *Syst. Ent.* 163. 15. *
- Cerambyx maxilliferus.* *Drury Inf.* 1. tab. 38. fig. 3.
- Habitat in America meridionali.
- Affinis videtur praecedenti.
- cinnamomeus.* 19. P. thorace marginato denticulato, mandibulis porrectis tridentatis. *Syst. Ent.* 163. 16.
- Cerambyx cinnamomeus* thorace marginato denticulato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 623. 10. *Mus. Lud. Vlr.* 66. *Merian. Sur.* 24. tab. 24. *Drury Inf.* 1. tab. 40. fig. 2. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 5. fig. 2.
- Habitat in America meridionali.
- melanopus.* 20. P. thorace marginato dentato, maxillis porrectis multidentatis, elytris mucronatis.
- Cerambyx melanopus* thorace marginato ferrulato, corpore nigro, antennis brevibus, elytris mucronatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 623. 8. *Cerambyx crenulatus.* *Drury Inf.* 1. tab. 38. fig. 2. *Gron. Zooph.* 531. *Merian. Surin.* tab. 24. fig. 1.
- Habitat in America meridionali.
- barbatus.* 21. P. thorace marginato integro, mandibulis ferrugineo hirsutissimis, antennis mediocribus.
- Habitat in America meridionali. *Mus. Dom. Banks.* *Magnus.*

Magnus. Antennae longitudine corporis scabrae nigrae articulo ultimo compresso, laeui. Caput atrum mandibulis porrectis labiisque ferrugineo hirsutissimis. Thorax marginatus margine inermi, niger. Elytra picea. Abdomen villoso album. Pedes nigri.

45. C E R A M B Y X.

1. C. thorace spinoso, punctis quatuor luteis, elytris obtusis nebulosis, antennis longissimis. *Syst. Ent.* 164. *aedilis.*

Linn. Syst. Nat. 2. 628. 37. *Fn. Sv.* 653.

Cerambyx nebulosus, antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis. *Linn. It. Oel.* 8.

Cerambyx thorace spinoso punctis quatuor luteis, elytris griseo cinereis fuscō maculatis, antennis longissimis. *Degeer Inf.* 5. 66. 5. tab. 4. fig. 1. 2.

Capricornus ruficollis. *Petiv. Gazoph.* tab. 8. fig. 8.

Mouff. Inf. 151. fig. 2.

Frisch. Inf. 13. tab. 12.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 27.

Axt. Nidros. 4. tab. 16. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 7.

Bergstraess. Nomencl. 1. 3. 5. tab. 1. fig. 5. 6.

tab. 2. fig. 1.

Habitat in truncis arborum Europae borealis.

Antennae longitudine secundum sexum differunt.

2. C. thorace spinoso tuberculatoque, elytris porosis, *aranei-* antennis longis, articulo quinto vnidentato. *Syst. formis.* *Ent.* 164. 2. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 625. 22.

Sloan. Iam. 2. tab. 237. fig. 24.

Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

3. C. thorace spinoso, elytris cinereis nigro maculatis, *nodosus.* antennis longissimis, articulo tertio apice nodoso. *Syst. Ent.* 164. 3. *

Habitat in Marylandia Americae. *Mus. Brit.*

4. C. thorace multidentato, dorso plano, elytris tibiis-*cancriforme* que anticis vnidentatis. *Syst. Ent.* 165. 4. *

Fabr. Spec. Inf.

O

Ceram-

Cerambyx pustulatus. Drury Ins. 2. tab. 35. fig. 1.
Habitat in America meridionali.

hebraeus. 5. C. thorace acute dentato, dorso bicarinato, elytris cinereis fusco striatis maculatisque.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Hunter.

Caput grossum, porrectum, obtusum, integrum. Antennae nigrae corpore breuiores. Thorax cinereus vtrinque spina porrecta valida basi anteriori vnidentata, dorsoque lineis duabus eleuatis, glabris, atris. Elytra rotundata, cinerea sutura striisque tribus fuscis et inter has maculae plurimae difformes eiusdem coloris. Pedes cinerei.

Scorpio. 6. C. thorace quadrispinoso, elytris tuberculato granulatis, tibiis anticis apice dilatatis.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Hunter.

Antennae breues, cinereae articulis apice nigris. Caput grande, cinereum mandibulis atris. Thorax cinereus spinis quatuor dorsalibus eleuatis apice atris. Elytra cinerea tuberculis variis eleuatis obtusis granis glabris atris adspersis. Pedes breues cinerei tibiis quatuor anticis apice dilatatis.

glaucus. 7. C. thorace quinquespinoso glaucus, elytris muricatis latere fasciaque nigris, antennis longis. Syst. Ent. 165. 5. * Linn. Syst. Nat. 2. 626. 28.

Cerambyx tuberculatus cinereus, thorace quinquespinoso, elytris spinosis postice vnidentatis latere fasciaque nigris, antennis longioribus. Degeer Ins. 5. III. 13. tab. 14. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

bidentatus. 8. C. thorace subspinoso, elytris bidentatis scabris cincereo fuscis. Syst. Ent. 165. 6. *

Habitat in America meridionali. Dom. v. Rohr.

moscha. 9. C. thorace spinoso viridis nitens, antennis cyaneis mediocribus. Syst. Ent. 165. 7.

Cerambyx moschatus thorace spinoso, elytris obtusis viridibus nitentibus, femoribus muticis antennis mediocribus. Linn. Syst. Nat. 2. 627. 34. Fn. Sv. 652.

Ceram-

CLASS. I. ELEVTERATA. Cerambyx. 211

Cerambyx odoratus thorace spinoso viridi aureo nitidus, antennis mediocribus coeruleo violaceis. *Degeer Ins.* 5. 64. 2.

Cerambyx viridi coerulescens. *Geoff. Ins.* 1. 203. 5.

Scarabaeus maior viridis odoratus. *Raj. Ins.* 81. 17.

Scarabaeus suauiter olens. *Lister. Scarab.* 384. 11.

Scarabaeus arboreus coeruleo viridis. *Frisch. Ins.* 13. tab. 11.

Cerambyx tertius. *Mouff. Ins.* 149. fig. vlt.

Bergstr. Nomencl. 1. 13. 2. tab. 2. fig. 2.

Habitat in Europae salice.

Odorem spargit gratum et soporiferum, qui cum vita perit. Oua candida, sapida. *Lister.*

Variat antennis pedibusque cyaneis et fuscis.

10. C. thorace rotundato spinoso, corpore viridi, femoribus rufis. *Syst. Ent.* 166. 8. *virens.*

Cerambyx virens thorace spinoso, elytris obtusis, corpore viridi, antennis longioribus, femoribus unidentatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 627. 33.

Drury Ins. 1. tab. 40. fig. 1.

Habitat in Americae insulis.

Variat antennis corpore longioribus et breuioribus, femoribus muticis et dentatis.

11. C. thorace rotundato subspinoso viridi nitens, femoribus clavatis, clava antecorum rufa. *nitens.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis C. virenti. Antennae corpore duplo longiores, nigrae. Thorax rotundatus, subspinosus vel potius tuberculatus. Corpus totum viride, nitidum. Pedes nigri, femoribus omnibus clavatis, clava quatuor anteriorum ferruginea. Tibiae posticae compressae.

12. C. thorace rotundato spinoso, corpore viridi, antennis pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 166. 9. * *afer.*

Cerambyx afer. *Linn. Mant.* 532.

Drury Ins. 1. tab. 39. fig. 4.

Habitat in Africa.

- festivus.* 13. *C. thorace spinoso viridi, elytris violaceis basi viridibus, femoribus ferrugineis videntatis.* *Syst. Ent.* 166. 10. *
Habitat ad fluum Gaboon Africæ. Mus. Dom. Banks.
- vittatus.* 14. *C. thorace spinoso viridis nitens, thorace elytrisque nigro lineatis.* *Syst. Ent.* 166. 11. *
Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.
- velutinus.* 15. *C. thorace spinoso niger, vitta atra.* *Syst. Ent.* 167.
12. *
Habitat in America meridionali.
C. virenti nimis affinis.
- futuralis.* 16. *C. thorace spinoso ater, elytris futura vittaque media aureis,*
Habitat in America meridionali. Mus. D. Hunter.
Nimis praecedenti affinis. Antennæ longitudine corporis, nigrae. Corpus atrum quasi velutinum ab domine subtus coerulescente nitido. Elytra atra futura dorsali vittaque media, quæ postice coëunt, aureis. Pedes nigri femoribus clauatis, postici femoribus tibiisque compressis.
- spinicor-* 17. *C. thorace subspinoso niger, elytris viridibus apice nis.* *spinosis.* *Syst. Ent.* 167. 13. *
Habitat in Sierra Leon Africæ. Mus. Dom. Banks.
- Cerdo.* 18. *C. thorace spinoso rugoso niger, antennis longis.* *Syst. Ent.* 157. 14.
Cerambyx Cerdo thorace spinoso rugoso nudo, corpore nigro antennis longis, articulis quatuor primis clauatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 629. 39.
Cerambyx ater elytris rugosis integris, antennis corpore longioribus. *Gevff. Inf.* 1. 201. 2.
Cerambyx Cerdo. *Scop. Ent. carn.* 162.
Bergstr. Nomencl. 1. 8. 10. tab. 1. fig. 10.
et tab. 2. fig. 3.
Frisch. Inf. 13. tab. 8.
Mouff. Inf. 149. fig. 1.
Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 1.

β . *Cerambyx Heros.* Scop. Ent. carn. 163.

Cerambyx Heros. Bergstr. Nomencl. 1. tab. II, fig. 5. 6.

Cerambyx fusco niger, elytris rugosis apice interiori spinosis, antennis corpore longioribus. Geoff. Inf. 1. 200.

Habitat in Europae ligno,

Antennae longitudine differunt.

Varictates α et β vix species distinctae. Differunt in primis magnitudine.

19. *C. thorace spinoso*, coleoptris fascia maculisque quatuor atris, antennis longis. Syst. Ent. 168. 15. Linn.

Syst. Nat. 2. 628. 35. Fn. Sv. 654. It. Scan. 260.

Cerambyx cinereo coerulescens, elytrorum maculis sex fuscis. Geoff. Inf. 1. 202. 4.

Capricornus primus Mouffeti coloris fere cinerei, cuius venter, crura et cornua coerulea, articulis nigris interstincta, scapulae cauda et elytra nigris quibusdam maculis variegata. Scheuchz. Itin. 1. tab. 1, fig. 5.

Ionst. Inf. tab. 15. fig. 3.

Sutz. Hist. Inf. tab. 4. fig. d.

Drury Inf. 2. tab. 31, fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 123. fig. 1.

Habitat in Europae montosis,

20. *C. thorace spinoso fuscus*, linea longitudinali alba, scalaris. antennis longissimis.

Habitat in America meridionali. Mus. Dom. Banks.

Medius. Antennae corpore triplo longiores. Caput fuscum orbita oculorum lineaque dorsali albis. Thorax acute spinosus, fuscus linea dorsali alba. Scutellum album. Elytra fuscata puncto medio suturaque dentata albis. Pedes fuscatae.

21. *C. thorace bispinoso rugoso*, elytris fascia flava, antennis longioribus compressis. Syst. Ent. 168. 16.

Linn. Syst. Nat. 2. 627. 32. Mus. Lud. Vlr. 72.

Cerambyx fusco castaneus, thorace rugoso spinoso, elytris fascia flava. Degeer Inf. 5. 113. 14. tab. 14. fig. 5.

Quici Margr. Bras. 254.

Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 2.

Habitat in America, Brasilia.

depressus. 22. C. thorace multispinoso depressus niger cinereo variegatus, elytris acuminatis, antennis longis.

Habitat in Americae meridionalis insulis. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo C. succincti, at depressus, planus. Antennae corpore longiores, nigrae articulo primo longiori valde clauato. Caput inaequale, nigrum maculis impressis cinereo villosis. Thorax vtrinque spinis 4 - 5 brevibus, approximatis dorso plano niger villis cinereis variegatus. Elytra striata, plana, acuminata, nigra maculis cinereis et in his puncta atra. Pedes atri.

fasciatus. 23. C. thorace spinoso cyaneus, elytris fascia flava, antennis mediocribus ante apicem flavis. *Syst. Ent. 168.*
17. *

Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*

barbicor- nis. 24. C. thorace spinoso, antennarum quatuor primis articulis nigro barbatis, corpore testaceo nigro variegato. *Syst. Ent. 168. 18. Linn. Syst. Nat. 2. 625. 18. Mus. Lud. Vlr. 68.*

Habitat in Asia.

farinosus. 25. C. thorace spinoso piceus, elytris punctis sparsis farinosis, antennis longis. *Syst. Ent. 168. 19. Linn. Syst. Nat. 2. 626. 24.*

Cerambyx niger thorace spinoso, elytris maculis rotundatis pilosis flavo albidis sparsis, abdomine bidentato. *Degeer Inf. 5. 108. 9. tab. 13. fig. 17.*

Cerambyx Chinensis. *Forster. n. sp. Cent. 1. 39. 39.*

Drury Inf. 2. tab. 31. fig. 4.

Merian. Surin. tab. 24.

Habitat in radice Argeimones mexicanae.

Larua albicans, capite caudaque nigris.

Imago lineolis duobus in medio elytrorum approximatis glabris.

26. C. thorace spinoso, elytris punctis fasciisque nigris, *nebulosus*.
antennis longioribus. *Syst. Ent.* 168. 20. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 627. 29. *Fn. Sv.* 650.

Cerambyx niger, elytris vellere cinereo marmoratis,
antennis pedibusque cinereo intersectis. *Geoff. Inf.*
1. 204. 7.

Cerambyx thorace spinoso, elytris cinereis punctis
fasciisque nigris, antennis mediocribus cinereo in-
groque maculatis. *Degeer Inf.* 5. 71. 8.

Cerambyx nebulosus. *Scop. carn.* 173.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 7.

Habitat in abietum truncis.

27. C. thorace spinoso, elytris apice bidentatis, antennis *hispidus*,
mediocribus hirtis. *Syst. Ent.* 169. 21.

Cerambyx hispidus thorace spinoso, elytris subpraemorsis punctisque tribus hispidis, antennis hirtis
longioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 627. 30. *Fn. Sv.*
651.

Cerambyx ouatus fuscus, elytris antice cinereis apice
bidentatis. *Geoff. Inf.* 1. 206. 9.

Cerambyx fasciculatus thorace spinoso, elytris fuscis,
fascia transuersa alba fasciculisque sex nigris, anten-
nis longioribus. *Degeer Inf.* 5. 71. 9. tab. 3. fig. 17.

Scarabaeus antennis articulatis longis. *Raj. Inf.* 97. 4.
Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 9.

Frisch. Inf. 13. p. 22. tab. 16.

Habitat in Europa.

28. C. thorace inermi, dorso plano, corpore fusco gri- *longicor-*
seoque vario, antennis longissimis. *ninis.*

Habitat in Coromandel. *Muf. Dom. Banks.*

Medius. Antennae corpore triplo longiores nigrae ar-
ticulorum basi subcinerascente. Caput cinereum basi
lineaque laterali nigris. Thorax omnino inermis
dorso fere plano et fere impresso fusco cinereoque
varius. Elytra punctato striata fusco cinereoque
varia. Corpus cinereum.

29. C. thorace inermi, elytris subtestaceis, margine omni *margina-*
nigro. *Syst. Ent.* 169. 22. *

lis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Muf. Dom. Banks.*

breuicor- 30. *C. thorace inermi viridi*, elytris obscuris, antennis
nis. breuibus nigris. *Syst. Ent.* 169. 23. *
Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

Iuuencus. 31. *C. thorace inermi rugoso*, elytris acuminatis nigris
lanuginoso canescens, antennis longissimis. *Syst.
Ent.* 169. 24. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 631. 53.
Habitat in America meridionali.

46. L A M I A.

Tribulus. 1. *L. thorace quadrispinoso*, scutello elytrisque spinosis,
antennis longioribus. *Syst. Ent.* 170. 1. *
Habitat ad fluuium Gaboon Africæ. *D. Solander e
Mus. Dom. Banks.*

fronticor- 2. *L. thorace spinoso*, frontis cornu porrecto apice emar-
ginato recurvo, antennis longis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Antennæ longæ, fuscae articulorum apicibus nigris.
Caput fuscum mandibulis atris. Frontis cornu por-
rectum, crassum, fuscum, supra planum, hirtum,
apice late emarginatum, apicibus recurvis, atris.
Thorax spinosus, subrugosus, fuscus, supra immacu-
latus, subtus vero vtrinque linea lata alba. Elytra
fuscæ, glabra basi punctis aliquot eleuatis scabra,
ante medium maculae duæ ocellares, atrae et pone
has macula maior albida. Pedes fuscæ.

pedicor- 3. *L. thorace elytrisque spinosis*, femoribus anticis cor-
nis. nutis. *Syst. Ent.* 170. 2. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

hystrix. 4. *L. thorace quinquespinoso*, elytris fasciculato pilosis,
antennis mediocribus serratis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Antennæ longitudine corporis, pilosæ, valde serra-
tae, testaceæ articulorum apicibus fuscis. Caput
hispidum griseum. Thorax rotundatus spinis quin-
que erectis, atris intermedia paullo minori. Prae-
terea tubercula duo eleuata atra ante spinam inter-
medium. Elytra fasciculato pilosa carneo variegata.

5. L. thorace acute spinoso grisea, clytris basi tuberculo *crista*, compresso tridentato. *Syst. Ent.* 170. 3. *
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
6. L. thorace antice vtrinque bispinoso, corpore nebuloso. *ambulator.*
Syst. Ent. 171. 4. *
Pet. Gazoph. tab. 37. fig. 6.
Habitat in Insulis Luzonum. *Mus. Dom. Banks.*
7. L. thorace spinoso, elytris conuexis atris, antennis *textor.*
mediocribus. *Syst. Ent.* 171. 5.
Cerambyx textor thorace spinoso, elytris obtusis conuexis atris punctatis, antennis mediocribus. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 629. 41. *Fn. Sv.* 656.
Cerambyx ater, elytris punctis eleuatis, antennis corpore breuioribus. *Geoff. Inf.* 1. 201. 3.
Cerambyx nigro rugosus thorace spinoso nigro opacus, antennis breuioribus crassis, elytris conuexis.
Degeer Inf. 5. 64. 3.
Cerambyx sordide niger, punctis eleuatis sparsis, antennis crassis corporis longitudinem subaequantibus.
Vdm. Diff. 29.
Cerambyx textor. *Scop. carn.* 164.
Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 1.
Bergstr. Nomencl. 1. 5. 8. tab. 1. fig. 8.
Habitat in truncis arborum Europae.
8. L. thorace spinoso nigra antice fasciis, postice punctis *pulchra*, viridibus, elytris basi mucroratis. *Syst. Ent.* 171. 6. *
Cerambyx pulcher. *Drury Inf.* 1. tab. 32. fig. 6.
Habitat in Africa. *Dom. Drury.*
9. L. thorace spinoso viridi fasciato, elytris viridi irroratis, maculisque tribus fuluis. *regalis.*
Cerambyx regalis. *Brown. Illust.* tab. 50. fig. 1.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentis. Antennae corpore longiores, nigrae. Caput atrum viridi lineatum macula suboculare fulua. Thorax spinosus, ater fasciis tribus impressis viridibus. Elytra substriata, nigra atomis viridibus numerosissimis, et praeterea maculae tres ferre marginales fuluae. Subtus viridis abdomine vtrinque linea punctorum fuluorum.

nigricor- 12. L. thorace mutico grisea, elytris dorso planis, antennis brevibus nigris.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae corpore breviores, nigrae. Corpus griseum supra testaceo mixtum. Thorax omnino inermis. Elytra dorso plana punctis aliquot marginalibus basos atris impressis apice obtusa et fere truncata.

sternuta- 12. L. thorace spinoso, elytris basi porosis, antennis mediocribus. *Syst. Ent. 172. 7.* *

Habitat in Insula Barbados. *Dom. Drury.*

guttura- 12. L. thorace spinoso, elytris testaceis albo irroratis, basi punctis eleuatis glabris. *Syst. Ent. 172. 8.* *

Habitat in Africa. *Mus. Brit.*

nebulosa. 13. L. thorace inermi ferrugineo nigro lineato, elytris fusco ferrugineoque variis, macula marginali cinerea, antennis mediocribus.

Habitat in Germania. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Antennae longitudine corporis nigrae articulis basi cinereis. Caput et thorax rotundatus, inermis, ferruginea nigro lineata. Elytra punctata ferrugineo fuscoque varia, macula magna cinerea in medio marginis exterioris. Pedes fusi.

ariolator. 14. L. thorace spinoso lineato, elytris fuscis, linea semi-circulari alba. *Syst. Ent. 172. 9.* *

Habitat in India.

sutor. 15. L. thorace spinoso, elytris atris ferrugineo maculatis, scutello luteo, antennis longissimis. *Syst. Ent. 172. 10.*

Cerambyx sutor thorace spinoso, elytris obtusis atris subnebulosis, scutello luteo, antennis longissimis. *Linn. Syst. Nat. 2. 628. 38. Fn. Sv. 655.*

Cerambyx nigro nebulosus, scutello pallido, elytris fusco aeneis. *Vdm. Diff. 27.*

Cerambyx atomarius thorace spinoso niger nitidus atomis albescientibus, antennis longissimis, scutello albicante. *Deger Inf. 5. 65. 4.*

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 4.

Scopol. carn. 162.

Habitat in Europae syluis.

Aliam vidimus maiorem elytris minus maculatis, vix tamen distinctam.

16. L. thorace spinoso nigra, thorace elytrisque fuluis, *reticulata*, thorace nigro lineato elytris reticulatis. *tor.*

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo L. Sutoris. Caput atrum, immaculatum. Antennae mediocres, ferrugineae articulo primo toto nigro, secundo basi apiceque clauato, villoso, nigro. Thorax supra fuluus, lineis duabus dorsalibus, nigris. Elytra fulua, nigro reticulata apice emarginata. Corpus et pedes nigra.

17. L. thorace spinoso, elytris cinereo fusco glaucoque *titillator*, nebulosis, antennis longissimis rufis. *Syst. Ent.* 172. II. *

Habitat in Carolina. *Mus. Brit.*

18. L. thorace spinoso, elytris cinereo puluerulentis, vittatis duabus flavis nigro marginatis. *Syst. Ent.* 173. 12.*

Petiv. Gazoph. tab. 24. fig. 6.

Habitat ad Sinus Campechani littora. *Mus. Brit.*

19. L. thorace spinoso nigra, elytris maculis quatuor flavi subocellaribus, antennis longis. *Syst. Ent. App.* 822. *

Cerambyx ocellatus thorace spinoso niger, antennis longissimiis, elytris singulis maculis ocellatis quatuor albis. *Degeer Inf.* 7. tab. 49. fig. 1. *Voet. Ceramb.* tab. 7. fig. 21.

Habitat ad Cap. bon. sp.

20. L. thorace spinoso nigra, elytris sanguineis, macula *Kaehleri*, nigra. *Syst. Ent.* 173. 13.

Cerambyx Kaehleri thorace spinoso niger, thorace elytrisque sanguineis, macula magna nigra. *Linn. Syst. Nat.* 2. 631. 50.

Cerambyx niger elytris thoracisque lateribus rufis.
Geoff. *Inf.* 1. 204. 6.

Schaeff. *Inf.* tab. 1. fig. 1.

Scop. *Ann. Hist.* 5. 96. 56.

Habitat in Europa australiori.

Thorax variat immaculatus et macula lateralii rufa.

Elytra apice emarginata inox immaculata, mox macula nigra,

capensis. 21. L. thorace bispinoso nigra, elytris fasciis quatuor rufis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 173. 14. *

Cerambyx capensis thorace spinoso niger, elytris fasciis quatuor rufis, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 628. 36.

Cerambyx pilosus. *Pod. Mus.* 32. 3.

Pet. *Gazoph.* tab. 3. fig. 8.

Drury *Inf.* 1. tab. 39. fig. 3.

Habitat ad Cap. bon. sp.

hottentot- 22. L. thorace spinoso rufo, elytris nigris, fascia maculata, duabus marginalibus sanguineis, *Syst. Ent.* 172. 15. *

Cerambyx punctatus niger, thorace rufo, elytrisque punctis excavatis. *Brown. Illust.* 118. tab. 49. fig. 1.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Teats.*

humera- 23. L. thorace spinoso, elytris flavis nigro fasciatis antice lis, mucronatis.

Habitat in - - - - *Dom. Drury.*

trifascia- 24. L. thorace subspinoso atra, elytris fasciis tribus flava, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 174. 17. *

Habitat ad Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

bifascia- 25. L. thorace spinoso postice sinuato, elytris flavis, fasciis duabus maculaque rhombæa cyaneis, *Syst. Ent.* 174. 18. *

Habitat in Jamaica. *Mus. Brit.*

aethiops. 26. L. thorace spinoso atra, elytris fasciis duabus puncto que apicis luteis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 174. 19. *

Habitat

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Brit.*

Elytra apice puncto fulvo, rarius immaculata.

27. L. thorace spinoso cinereo, thorace elytrisque fusco variegato variis, antennis longis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Antennae corpore longiores, fuscae, immaculatae. Caput, thorax, elytra fusca cinereo variegata coloribus mixtis indistinctis, ore nigro. Corpus cinereum.

28. L. fusca, thorace coleoptrisque ocellis quatuor atris. *curculionoides.*
Syst. Ent. 175. 20.

Cerambyx curculionoides thorace mutico, ocellis quatuor nigris, elytris ocello sesquialtero, antennis longis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 634. 84.

Leptura nigro cinerea, thorace elytrisque maculis ocularis atris, circulo cinereo, thorace subcylindrico.
Geoff. Inf. 1. 210. 5.

Leptura curculionoides. *Scopol. Ann. Histor. nat.* 5. 101. 75.

Schaeff. Icon. tab. 39, fig. 1.
tab. 155, fig. 5.

Habitat in Europa australiori.

29. L. thorace spinoso fusca, elytris maculis duabus atris, tristis. antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 175. 21.

Cerambyx tristis thorace spinoso niger, elytris fuscis, maculis duabus atris, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 629. 42.

Scopol. Ann. Histor. nat. 5. 95. 54.

Habitat in ligno cupressi Europae australioris.

Antennae vix longitudine corporis.

30. L. thorace spinoso ater, elytris albo punctatis, antennis longis. *Gen. Inf. Mant.* 230. * *punctata.* tor.

Habitat in China. *D. Fothergill.*

31. L. thorace spinoso, elytris lineis tribus elevatis ferrugineis, antennis mediocribus, corpore cinereo. *Gen. Inf. Mant.* 230. * *crispa.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lett.*

rotator. 32. L. thorace spinoso cinerea, elytris subfasciatis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 175. 22. *

Habitat in India. *Mus. Dom. Banks.*

Glycyrrhizae. 33. L. thorace spinoso niger, elytris albo lineatis bicarinatis, pedibus ferrugineis, antennis breuibus.

Cerambyx Glycyrrhizae. *Pall. It.* 2. 723. 60.

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Triplo maior L. fuliginatore. Caput atrum litura bafeos albida. Antennae breues, crassae, nigrae primo articulo ferrugineo apice nigro. Thorax utrinque spinosus lineis tribus albis. Elytra nigra lineis duabus lateralibus eleuatis, carinatis laevis, suci inter has villoso albi. Sutura alba. Pedes ferruginei apice nigri.

Variat saepius aetate, thorace elytrorumque sutura totis nigris lanagine alba derafa.

fuligina- 34. L. thorace subspinoso nigra, elytris cinerascentibus, tor. antennis breuibus. *Syst. Ent.* 175. 23.

Cerambyx fuliginator. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 43.

Cerambyx ater ouatus, antennis corpore dimidio breuioribus, elytris vellere cinereo albidis. *Geoff. Ins.* 1. 205. 8.

Cerambyx niger, thorace spinoso, elytris cinereis, corpore ouato, antennis breuioribus. *Degeer Ins.*

5. 70. 7.

Frisch. Ins. 13. tab. 19.

Habitat in Europa australiori.

carinata. 35. L. thorace spinoso nigra, elytris piceis, carina laterali eleuata albida, antennis breuibus.

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo L. fuliginatoris. Antennae breues, crassae, nigrae. Caput et thorax punctata lineaque media impressa nigra. Elytra obtusa, picea, linea laterali eleuata villoso albida. Corpus subtus villoso cinereum.

coquus. 36. L. thorace subspinoso hirsuto, elytris obtusis sulcatis atris antice ferrugineis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 176. 24.

Ceram-

Cerambyx eoquus. Linn. Syst. Nat. 2. 630. 44.

Habitat in America boreali.

Spinae thoracis minutissimae.

37. L. thorace spinoso fusco, maculis duabus ferrugineis, *ruspator.* elytris fuscis cinereo variegatis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Antennae corpore paullo longiores, fuscae.

Caput fuscum. Thorax acute spinosus, punctatus, fuscus vtrinque macula magna ferruginea. Scutellum ferrugineum. Elytra punctata, obtusa, fusca cinereo varia, qui color postice fuscum constituit.

Corpus et pedes fusca.

38. L. thorace spinoso quadripunctato, elytris rufis, maculis quatuor nigris, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 176. 25. *

Habitat in America boreali.

39. L. thorace subspinoso grisea, elytris ferrugineo irrorata fasciisque duabus cinereis. *Banckii.* *Syst. Ent.* 176. 26.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

40. L. thorace spinoso cornuque breui recumbente, corpore testaceo, antennis breuibus apice nigris.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum, breue, villosum, testaceum. Antennae breues, testaceae apice nigrae. Caput magnum fronte plano. Thorax vtrinque spinosus et praeterea in medio dorsi cornu recumbens, breue, latum, retusum. Elytra villosa, striata, immaculata.

41. L. thorace spinoso atra, vitta integra alba, antennis pedestris. mediocribus. *Syst. Ent.* 176. 27.

Cerambyx pedestris thorace spinoso apterus niger, elytris tomentosis atris, sutura alba, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 631. 51.

Cerambyx pedestris. *Pod. Inf.* 34. 9.

Cerambyx arenarius. *Scop. Ent. carn.* 168.

Habitat in Europa australiori.

molitor. 42. L. thorace subspinoso fusca, vittis tribus integris albis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 176. 28. *
 Habitat in India. *Mus. Dom. Banks.*
 Varietas forte L. pedestris.

tuberculato. 43. L. thorace mutico grisea, coleoptris basi bituberculatis, maculisque duabus communibus albis, antennis brevibus.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Parua. Antennae breues, cinereae. Caput et thorax grisea, immaculata. Coleoptera concolora tuberculitis duobus baseos eleuatis, compressis iuxta futuram. Praeterea maculae duae, magnae, albidae communes, altera ad basin, altera versus apicem.

Rubus. 44. L. thorace spinoso bimaculato, elytris bidentatis basi scabris mucronatis. *Syst. Ent.* 177. 29.

Cerambyx Rubus thorace spinoso, antennis subtus hispidis longis, elytris bidentatis basique mucronatis albo bimaculatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 625. 21.

Cerambyx albofasciatus niger thorace spinoso, antennis longis aculeatis, elytris basi viidentatis apice que bidentatis, maculis quatuor albis. *Degeer Ins.* 5. 106. 7. tab. 13. fig. 16.

Habitat in India.

Elytrorum puncta nimis variant.

spinicornis. 45. L. thorace spinoso rugoso, elytris griseis truncatis, antennis compressis; articulis apice spinosis.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Paullo minor L. Rubo. Antennae mediocres, compressae, articulis apice exteriori acute spinosis. Caput nigrum. Thorax acute spinosus, valde rugosus, griseus. Elytra laevia, grisea apice truncata subspinosa. Corpus fuscum griseo pubescens.

scabratior. 46. L. thorace spinoso subtestacea, elytris punctis atris baseos scabris.
 Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
 Antennae mediocres, cinereae articulorum apicibus nigris. Caput et thorax acute spinosus subtestacea. Elytra

tra concolora, at basi punctis eleuatis, atris, numerosis scabra apice subemarginata, ad suturam acuminate. Corpus subtus et pedes concolores.

47. L. thorace spinoso tuberculato cinerea, elytris scabris, maculis duabus lateralibus atris. *Gen. Inf. Mant. ri. 230.* *

Habitat in America meridionali. *Dom. Spengler.*

48. L. thorace acute spinoso grisea, elytris apice bidentatis. *Syst. Ent. 177. 30.* *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

49. L. thorace subspinoso nigra, elytris bidentatis fuscis *Solandri.* cinereo irroratis. *Syst. Ent. 177. 31.* *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

50. L. thorace obtuse spinoso, mandibulis basi cornutis, cornutor, antennis longissimis. *Syst. Ent. 177. 32.* *

Habitat in America. *Mus. Brit.*

51. L. thorace spinoso, elytris basi variolosis cinereis, leprosa, macula laterali nigra, antennis longis. *Syst. Ent. 178. 33.* *

Habitat in America. *Dom. Drury.*

47. S T E N O C O R V S.

1. S. thorace subspinoso, elytris fastigiatis; pectore nitente. *meridiana. Syst. Ent. 178. 1.* *nus.*

Cerambyx meridianus thorace subspinoso, elytris subfastigiatis fuscis antice testaceis, pectore nitente. *Linn. Syst. Nat. 2. 630. 47. Fn. Sv. 648.*

Cerambyx elytris spadiceis, ventre argenteo. *Raj. Inf. 96. 1.*

Leptura fuscō cinerea, thorace spinoso, femoribus rufis apice nigris, corpore subtus nitente, abdominis apice rufo. *Degeer Inf. 5. 305.*

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 13.

tab. 79. fig. 7.

Habitat in Europa boreali.

Femina nigricans, mas testaceus.

Larua subterranea pedibus longissimis. *Raius.*

Fabr. Spec. Inf.

P

2. S.

cyaneus. 2. *S. thorace subspinofo cyaneus, elytris basi flavis. Syst. Ent. App. 823. **

*Cerambyx blandus violaceus, elytris antice luteis, antennis brevibus. Syst. Ent. 182. 2. **

Cerambyx palliatus thorace spinoso violaceus, elytris subfastigiatis a basi ad medium testaceis, antennis brevibus, articulis quatuor clavatis. Forster. Cent. Inf. I. 40. 40.

Habitat in India.

lamed. 3. *S. thorace spinoso pubescente, elytris fastigiatis luidis, taenia obscura longitudinali sinuata. Syst. Ent. 178. 2.*

Cerambyx lamed. Linn. Syst. Nat. 2. 630. 46. Fn. Sv. 649.

Stenocorus niger, elytris rubescensibus apice suturae medietate nigris. Geoff. Inf. 1. 226. 6.

Habitat in Europa.

gargani- 4. *S. thorace spinoso, elytris bidentatis testaceis, macula pallida, antennis longis. Syst. Ent. 178. 3. **

Habitat in Marylandia. *Mus. Brit.*

festivus. 5. *S. thorace vtrinque bidentato, elytris bidentatis viridibus, linea laterali lutea. Syst. Ent. 179. 4.*

Cerambyx festivus. Linn. Syst. Nat. 2. 623. 11.

Cerambyx spinosus thorace depresso rufo vtrinque bidentato, fasciis longitudinalibus quinque nigris, elytris bidentatis viridibus, linea lutea. Degeer Inf. 5. 100. 4. tab. 13. fig. 14.

Cerambyx sulcatus. Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 6.

Gron. Zooph. 541. tab. 16. fig. 5.

Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 5.

Habitat in Americae Insulis.

mariyan- 6. *S. thorace depresso tuberculato mutico, elytris bidentatis fusco cinereoque nebulosis, antennis mediocribus. Syst. Ent. 179. 5. **

Habitat in Marylandia. *Mus. Brit.*

trilinea- 7. *S. thorace mutico, elytris apice vndentatis, margine omni albo. Syst. Ent. 179. 6. **

Ceram-

Cerambyx trilineatus thorace cylindrico, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, marginibus dentatis albis, antennis longissimis. *Linn. Mant.* 532.

Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 1.

Habitat in Americae insulis. *Dom. Drury*.

8. S. thorace inermi tuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis. *Syst. Ent.* 179. 7. * *spinicornis*.

Habitat in Americae meridionalis insulis. *Dom. Drury*.

9. S. thorace spinoso inaequali, elytris bidentatis basi semipunctatis apice glabris. *Syst. Ent.* 180. 8. * *semipunctatus*.

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.

10. S. thorace mutico inaequali, elytris apice bidentatis *irroratus*. albo irroratis, antennis longioribus aculeatis. *Syst. Ent.* 180. 9.

Cerambyx irroratus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 633. 62.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 3.

Habitat in Americae meridionalis insulis.

11. S. thorace mutico cinereo, linea glabra fusca, elytris glabra-bidentatis. *Syst. Ent.* 180. 10. * *tus*.

Habitat in Insula Americæ St. Croix. *D. v. Rohr*.

12. S. thorace scabro spinoso, elytris bidentatis, maculis 4macula-duorum parium glabris. *Syst. Ent.* 180. 11. * *tus*.

Cerambyx 4maculatus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 626. 27.

Sloan. Iam. 2. tab. 237. fig. 21.

Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 3.

Habitat in America meridionali.

Femora quatuor postica apice spinosa.

13. S. thorace mutico atro, elytris bidentatis basi testaceis *fasciatus*. apice atris, fascia pallida.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks*.

Antennæ setaceæ longitudine corporis, nigrae. Caput flauum basi lineisque tribus atris, lateralibus sub oculis. Thorax villosus, ater, immaculatus, subtus flavescentes. Elytra basi punctata, testacea, tunc usque ad apicem atra fascia ante apicem pallida. Abdomen testaceum macula vtrinque baseos flava apice-atrum. Pedes testacei.

- annulatus.* 14. *S. thorace lineato, elytris vndentatis, antennis longioribus, annulis tribus albis.* *Syst. Ent.* 180. 12. *
Habitat - - - *Mus. Dom. Banks.*
- tomaculatus.* 15. *S. thorace subspinoso quadrimaculato, elytris bidentatis ferrugineis flavo cinereoque maculatis.* *Syst. Ent.* 181. 13. *
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
- lineola.* 16. *S. thorace spinoso ferrugineo, elytris acuminatis testaceis, lineolis tribus glabris flavis.*
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
Praecedentibus minor. Caput obscure ferrugineum, immaculatum. Antennae corpore longiores nigrae primo articulo ferrugineo. Thorax ferrugineus immaculatus. Elytra apice unispinosa, testacea linea la baseos duabusque in medio approximatis, exteriori longiori glabris, flavis. Pedes nigri femoribus posticis quatuor flavis apice spina valida, nigra.
- Drurii.* 17. *S. thorace subspinoso, elytris truncatis bidentatis ferrugineis cinereo fasciatis, antennis brevibus.* *Syst. Ent.* 181. 14. *
Habitat in America meridionali. *Dom. Drury.*
- vindatus.* 18. *S. thorace spinoso cinereus, elytris bidentatis, fasciis duabus vindatis nigris.* *Syst. Ent.* 181. 15. *
- rufisticus.* 19. *S. thorace spinoso ferrugineo fuscus, elytris bidentatis pallidioribus, antennis longis.*
Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
Medius. Antennae corpore longiores, fuscae. Caput et thorax pubescens, obscure ferruginea. Elytra laevia, multo dilutiiora, apice bidentata.

48. C A L O P V S.

- serraticornis.* 1. *C. fuscus, antennis compressis.* *Syst. Ent.* 182. 1. *
Cerambyx serraticornis thorace mutico subovali, corpore lurido fuscō, antennis compressis antice ferratis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 634. 65. *Fu. Sv.* 665.

Ceram-

Cerambyx thorace mutico cylindrico griseo fuscus oculis nigris, antennis serratis mediocribus, tentaculis longis, pedibus teretibus. *Degeer Inf.* 5. 79. 6.

Habitat in Europa boreali.

Corpus elongatum, cylindricum, statura fere Cleri.

49. R H A G I V M.

1. R. thorace spinoso, elytris nebulosis fusco subfasciatis. *inquisitor.*
Syst. Ent. 182. 48.

Cerambyx inquisitor. *Linn. Syst. Nat.* 2. 630. 49. *Fn.*
Sv. 659.

Stenocorus niger vellere flavo variegatus, elytris lineis duabus eleuatis, thorace spinoso. *Geoff. Inf.* 1.
223. 2.

Leptura inquisitor thorace spinoso fusca, maculis punctisque cinereis villosis, antennis breuibus. *Degeer Inf.* 5. 126. 2. tab. 4. fig. 1.

Frisch. Inf. 13. tab. 14.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 10.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 7.

2. *Stenocorus glaber* e fusco niger, elytro singulo lineis tribus eleuatis, maculis duabus luteis, thorace spinoso. *Geoff. Inf.* 1. 222. 1.

Leptura mordax thorace spinoso nigra, maculis punctisque griseis villosis, elytris fascia duplice fulva maculaque nigra, antennis breuibus. *Degeer Inf.* 5. 124. 1. tab. 4. fig. 6.

Schaeff. Elem. tab. 118. fig. 1.

Icon. tab. 8. fig. 2. 3.

Habitat in Europae truncis arborum.

Merae varietates mihi videntur α et β .

Larua hexapoda nuda alba, capite collarique cornicis fuscis, dorso canaliculato. *Dom. Stroem.*

R. thorace spinoso, elytris rufis, sutura lineaque nigris. *cursor.*
Syst. Ent. 183. 2.

Cerambyx cursor thorace spinoso, elytris obtusis rufis margine lineaque nigris, antennis mediocribus. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 630. 45. *Fn.* *Sv.* 658.

Leptura cursor thorace spinoso nigro, elytris rufis viridi griseo tomentosis, fasciis binis longitudinalibus nigris, antennis longis rufis. *Degeer Inf.* 5. 127. 3.

Scop. Ent. carn. 167.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 7.

Habitat in Europa boreali.

Noctis. 3. R. thorace spinoso nigrum, antennarum basi ferruginea.

Cerambyx Noctis, thorace spinoso totus niger, antennarum basi ferruginea. *Linn. Syst. Nat.* 2. 630. 48.
Habitat in Europa boreali.

Nimis affinis R. cursori et forte eius mera varietas sexus. Differt tantum colore toto nigro.

bifascia- 4. R. thorace spinoso, elytris fuscis, fasciis duabus obliquis flauis. *Syst. Ent.* 183. 3. *

Stenocorus glaber e fusco niger, elytro singulo lineis tribus eleuatis, maculis duabus luteis, thorace spinoso. *Geoff. Inf.* 1. 222. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 8.

Habitat in Anglia, Gallia.

ornatum. 5. R. thorace spinoso nigrum, elytris fascia lata flava. *Syst. Ent.* 183. 4. *

Habitat in Pensylvania. *Mus. Dom. Banks.*

50. S A P E R D A.

carcharias. 1. S. corpore griseo nigro punctato, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 184. 1.

Cerambyx carcharias thorace mutico cylindrico, corpore griseo nigro punctato, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 631. 52. *Fu. Sv.* 660.

Cerambyx punctatus thorace mutico cylindrico, flauo griseus nigro punctatus, antennis mediocribus griseo nigroque maculatis. *Degeer Inf.* 5. 73. 10. tab. 3. fig. 19.

• *Leptura cinerea nigro punctata*, thorace cylindraceo. *Geoff. Inf.* 1. 208. 1.

Capricornus norwegicus nigrescens, vaginis punctatis maculisque pallidis adspersis. Petiv. Gazoph. 5. tab. 2. fig. 1.

Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 5.

Bergstr. Nomencl. 1. 5. 7. tab. 1. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 4.

Goedart. Inf. 2. tab. 51.

Habitat in Europae syluis.

2. *S. coleoptris linea suturali dentata punctisque flauis, scalaris.*
antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 184. 2.

Cerambyx scalaris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 632. 55. *Fn.*
Sv. 697.

Scop. Ent. carn. 175.

Cerambyx flauouridis thorace mutico cylindrico, macula nigra; elytris nigris fascia dentata punctisque flauo viridibus, antennis mediocribus. *Degeer Inf.*
5. 77. 14.

Leptura scalaris. *Scop. Ann. Hist. nat.* 5. 102. 77.

Cerambyx elytris nigris albo variegatis. *Frisch. Inf.*
12. 29. tab. 3. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 5.

Huffnag. Inf. tab. 7.

Habitat in Europae populo.

3. *S. nigra, capite thorace anoque ferrugineis.* *modesta.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo S. oculatae. Caput et thorax ferruginea, immaculata. Antennae nigrae. Elytra punctato striata apice emarginata, nigra, immaculata. Abdomen nigrum tomento cinereo nitidulum ano ferrugineo. Pedes nigri.

4. *S. thorace luteo, punctis duobus atris, elytris nigris.* *oculata.*

Syst. Ent. 184. 3.

Cerambyx oculatus thorace mutico cylindrico luteo, punctis duobus nigris, elytris fastigiatis linearibus, nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 633. 60. *Fn. Sv.* 664.

Cerambyx thorace mutico cylindrico rufo flauo, punctis duobus nigris, capite antennisque nigris, elytris cinerascentibus. *Degeer Inf.* 5. 74. 11. tab. 3. fig. 20.

*Cerambyx ferrugineo rufus, clytris nigro cinereis,
punctis excavatis nigris.* Vdm. Diff. 31.

Schaeff. Icon. tab. 128. fig. 4.

Huffnag. Ins. tab. 13.

Habitat in Europae syluis.

hirta. 5. *S. grisea villosa, scutello flavo.* Syst. Ent. 184. 4. *

Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.

Palporum articulus exterior oblique subtruncatus.

linearis. 6. *S. cylindrica nigra, pedibus luteis, antennis mediocribus,* Syst. Ent. 185. 5.

Cerambyx linearis thorace cylindrico mutico niger, pedibus omnibus totis luteis, antennis mediocribus.

Linn. Syst. Nat. 2. 632. 58. Fn. Sv. 663.

Leptura parallela. Scop. carn. 153.

Habitat in Europae syluis.

cylindri. 7. *S. cylindrica nigra, pedibus anticis luteis.* Syst. Ent. 185. 6.

Cerambyx cylindricus thorace cylindrico mutico, linea albida, elytris fastigiatis nigris, pedibus anticis pallidis. Linn. Syst. Nat. 2. 633. 59. Fn. Sv. 662.

Cerambyx cinereus coeruleo niger, thorace mutico cylindrico linea albida, pedibus anticis flavis, antennis mediocribus. Degcer Ins. 5. 75. 12.

Leptura tota coeruleo nigra, capite thoraceque subviloso. Geoff. Ins. 1. 208. 2.

Leptura cylindrica. Scop. carn. 157.

Roef. Ins. 2. Scarab. 2. tab. 3.

Habitat in pyri, pruni ramis.

fasciata. 8. *S. thorace subspinoso cyanea, elytris fasciis duabus flavis.*

Habitat in Sibiria. D. Pallas. Mus. Dom. Banks.

Statura omnino S. clauicornis paullo minor. Antennae longitudine corporis, atrae. Corpus totum cyaneum subtus paullo cinereo nitidum. Elytra fasciis duabus latis flavis.

clauicor. 9. *S. thorace rotundato viridis, elytris maculis tribus flavis.* Syst. Ent. App. 824. *

Habitat ad Cap. bon. sp. Mus. Dom. Banks.

10. *S. thorace subgloboso violacea, antennis longioribus, longipes*
*femoribus clauatis. Syst. Ent. App. 824.**
Habitat ad Cap. bon. sp.
11. *S. grisea, vittis tribus dentatis albis, antennis lon. vittata.*
*gis. Gen. Inf. Mant. 231.**
Habitat in India. D. Fothergill.
12. *S. nigra, thoracis lateribus, elytrorumque vitta late- lateralis.*
*rali ferrugineis. Syst. Ent. 185. 7.**
Habitat in America boreali. Mus. Dom. Banks.
Antennae longitudine corporis nigrae.
13. *S. thorace atro, puncto vtrinque ferrugineo, elytris tyncea.*
*griseis acuminatis. Syst. Ent. 185. 8.**
Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.
14. *S. grisea, scutello margine, elytris lineolis flauescen-* *grisea.*
*tibus. Syst. Ent. 186. 9.**
Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.
15. *S. testacea, elytrorum apicibus quoque nigris.* *analis.*
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. Dom. Banks.
Corpus mediocre. Antennae mediocres, nigrae, inter-
dum articulorum apicibus testaceis. Caput testaceum
mox immaculatum, mox linea mox punctis baseos
nigris. Thorax itidem testaceus mox immaculatus,
mox punctis quatuor aut sex nigris. Elytra sulcata
sulcis striato punctatis testacea apice nigra. Corpus
testaceum anno nigro.
16. *S. fusca, thorace lineato, scutello flavo, antennis Cardui.*
*longis. Syst. Ent. 186. 10.**
Cerambyx Cardui thorace mutico cylindrico, corpore
fusco, linea longitudinali flavicante, antennis lon-
gioribus. Linn. Syst. Nat. 2. 632. 56.
Scop. Ann. Hist. nat. 5. 101. 74.
Habitat in Europae australioris carduis.
17. *S. thorace quadrispinoso, corpore fusco. Syst. Ent. trifitis.*
*186. 11.**
Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.

populnea. 18. S. thorace flavo lineato, elytris punctis quatuor flavis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 186. 12.

Cerambyx populneus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 632. 57. *Fn. Sv.* 661.

Cerambyx popunctatus nigro plumbeus, elytris punctis quinque flavis. *Degeer Inf.* 5. 78. 15.

Cerambyx fuscocinereus, antennis nigro alboque variegatis, elytrorum punctis octo luteis. *Gadd. Sat.* 79.

Leptura nigra, thorace lineis tribus, elytrorumque maculis villoso flavis, thorace cylindraceo, antennis corpus aequantibus. *Geoff. Inf.* 1. 208. 3.

Schaeff. Icon. tab. 48. fig. 5.

Habitat in Europae, Americae populeis.

Conf. *Bergstraess. Nomencl.* 1. tab. 2. fig. 4. Vix distincta videtur, at triplo minor.

tremula. 19. S. viridis, thorace punctis duobus, elytris quatuor nigris. *Syst. Ent.* 186. 13. *

Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schreber.*

Antennae longitudine corporis.

punctata. 20. S. thorace cylindrico viridis, punctis nigris numerosis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 187. 14.

Cerambyx punctatus thorace mutico subcylindrico totus viridis, punctis nigris, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1067. 7.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 10.

Schaeff. Icon. tab. 101. fig. 1.

Habitat in Europa australiori.

Antennae et pedes nigrae.

longicornis. 21. S. thorace cylindrico fusca, pedibus testaceis, antennis longissimis nigris, annulo albo.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum, lineare. Antennae corpore triplo longiores, hirtae, nigrae articulo nono toto albo. Caput et thorax fusca, immaculata. Elytra picea apice bidentata. Pedes testacei apice nigri.

22. *S. thorace cylindrico ferruginea, antennis pedibusque ferruginea nigris.*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
 Media. Antennae longitudine corporis fuscae. Thorax cylindricus ytrinque parum prominens, ferrugineus, immaculatus. Pedes nigri femoribus clauatis.
23. *S. thorace cylindrico nigra, elytris testaceis. testacea.*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
 Statura praecedentium. Antennae longitudine corporis nigrae. Corpus totum nigrum elytris solis testaceis.
24. *S. thorace cylindrico, corpore violaceo. Syft. Ent. violacea.*
^{187. 15. *}
 Habitat in regione Pedemontana. *Mus. Dr. Allioni.*
25. *S. nigra, elytris flavis apice nigris. Syft. Ent. 187. praeusta.*
^{16. *}
Leptura praeusta thorace subgloboso fuscō, elytris flavis apice nigris, pedibus quatuor pallidis. *Linn. Syft. Nat. 2. 641. 24.*
Leptura nigra, elytris flavis apice nigris. Geoff. Inf.
^{1. 209. 4.}
Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 8.
Scopol. Ann. Hist. nat. 5. 103. 80.
 Habitat in Europae syluis.
26. *S. nigra, thoracis linea dorsali femoribusque apice lineola. rufis.*
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Parua. Corpus cylindricum, nigrum. Antennae longitudine corporis. Linea rubra in dorso thoracis. Femora omnia apice vti et tibiae anticae rubra.
27. *S. thorace cylindrico fusca, femoribus clauatis, antennis mediocribus. minuta.*
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
 Parua tota fusca, immaculata. Femora omnia clavata.

51. C A L L I D I V M.

Bainlus. 1. C. thorace villoso, tuberculis duobus, corpore fuscō.
Syst. Ent. 187. 1.

Cerambyx Bainlus thorace mutico subrotundo villoso,
tuberculis duobus, antennis breuibus. Linn. Syst.
Nat. 2. 636. 76. Fn. Sv. 672.

Cerambyx caudatus fuscō obscurus, thorace mutico
subrotundo depresso cinereo villoso, punctis duo-
bus nigris glabris, antennis breuibus. Degeer Inf.
5. 86. 82.

Leptura Bainula. Scop. carn. 156.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 29.

Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 4. 5.

Frisch. Inf. 13. tab. 10.

Schaeff. Elem. tab. 76. fig. 4.

Habitat in Europae borealis truncis.

Elytra in altero sexu pallida.

fennicum. 2. C. thorace tuberculato rufo, elytris violaceis, anten-
nis mediocribus. Syst. Ent. 188. 2.

Cerambyx fennicus thorace mutico subrotundo, tuber-
culis subferrugineo obsoletis, elytris violaceis, anten-
nis longiusculis. Linn. Syst. Nat. 2. 636. 77. Fn.
Sv. 674.

Cerambyx elytris nigro coeruleis, apice abdominis fer-
ragineo. Vdn. Diff. 33.

Leptura atra, thorace testaceo, femoribus crassis. Geoff.
Inf. 1. 219. 19.

Habitat in Europae pinetis.

ruficollis. 3. C. thorace subcylindrico hirto rufo, elytris violaceis,
antennis mediocribus piceis, pedibus nigris.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

Dissert manifeste a C. fennico. Corpus minus. Caput
nigrum antennis mediocribus piceis. Thorax fere
cylindricus, subspinosus, hirtus, rufus. Elytra viola-
cea. Pedes nigri femoribus subclauatis.

clavipes. 4. C. nigrum opacum, femoribus omnibus clauatis, au-
tannis longioribus. Syst. Ent. 188. 2. *

Habitat in Germania. Dom. de Hattorf.

5. C. thorace subpubescente, corpore violaceo, antennis *violaceo*-
breuibus. *Syst. Ent.* 188. 4. *um.*

Cerambyx violaceus thorace mutico subrotundo pubescente, corpore violaceo, antennis mediocribus. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 635. 70. *Fn. Sv.* 667.

Cerambyx violaceus nitens, corpore thoraceque mutico subrotundo depresso, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Degeer Ins.* 5. 88. 24.

Stenocorus violaceus. *Scopol. Ann. Hist. nat.* 597. 59.

Cantharis nigra thorace rotundato, elytris coerulescen-
tibus. *Gadd. Diff.* 28.

Frisch. Ins. 12. tab. 3.

Habitat in Europa boreali frequens.

6. C. thorace nudo, corpore atro opaco, femoribus ru- *femora-*
bris, antennis mediocribus. *tum.*

Cerambyx femoratus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 634. 69.

Degeer Ins. 5. 93. 31.

Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 7.

Habitat in Germania.

Statura omnino C. violacei, at tam non distincta species.

7. C. thorace verrucoso, nigricante, elytris acuminatis *acumina-*
viridibus, sutura cyanea. *Gen. Ins. Mant.* 131. * *tum.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*

8. C. thorace verrucoso nigrum, elytris testaceis, macula *ruficium.*
media apiceque nigris. *Gen. Ins. Mant.* 132. *

Habitat in Russiae sylvis. *Dom. Lee.*

9. C. thorace glabro, corpore fulvo aeneo, antennis pedi- *variabile.*
busque fulvis. *Syst. Ent.* 188. 5.

Cerambyx variabilis thorace mutico subrotundo inae-
quali glabro, pectore quoque ferrugineis, anten-
nis ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 635. 74. *Fn.*
Sv. 669.

Cerambyx scaber. *Pod. Mus. gr.* p. 36.

Frisch. Ins. 12. 345. tab. 6. fig. 3. 4.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 12.

Habitat in Europae borealis pinetis.

ruficum. 10. C. thorace nudo, corpore lurido, antennis breuibus.
Syst. Ent. 188. 6.

Cerambyx ruficlus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 634. 67. *Fn. Sv.* 666.

Cerambyx griseo fuscus, thorace mutito subrotundo depresso punctis impressis, antennis subulatis breuioribus. *Degeer Ins.* 5. 83. 20.

Sulz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 20.

Schaeff. Elem. tab. 76. fig. 1.
tab. 13. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 6.

Habitat in Europae syluis.

stigma. 11. C. thorace punctato, corpore atro, elytris laeuis
stigmate albo. *Syst. Ent.* 189. 7.

Cerambyx stigma. *Linn. Syst. Nat.* 2. 635. 72.

Cerambyx niger, thorace submutico semilunari punctato, corpore depresso, elytris laeuis, stigmate flavo. *Degeer Ins.* 5. 119. 22. tab. 14. fig. 13.

Habitat in America.

barba- 12. C. thorace rotundato subtus vtrinque macula tomentosa ferruginea, antennis longioribus barbatis. *Syst. Ent.* 189. 8.*

Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*

variega- 13. C. thoracis dorso glabro atro, lineis quatuor albis,
tum. elytris flavo irroratis. *Syst. Ent.* 189. 9. *

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

lineatum. 14. C. thorace lineis duabus, elytris quatuor albis, mediis coëuntibus abbreviatis. *Syst. Ent.* 189. 10.*

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

fulcatum. 15. C. thorace tomentoso cinereo, elytris albo nigroque striatis. *Syst. Ent.* 189. 11. **

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

sanguineum. 16. C. thorace subtuberculato elytrisque sanguineis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 190. 12.

Cerambyx sanguineus thorace mutico subrotundo elytrisque sanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 636. 80.

Ceram-

Cerambyx thorace mutico subrotundo depresso angulo, elytrisque sanguineis, corpore nigro. Degeer
Inf. 5. 92. 29.

Cerambyx minor. Raj. Inf. 97. 3.

Leptura nigra, thorace coleoptrisque sericeo rubris.

Geoff. Inf. 1. 220. 21.

Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 1.

Habitat in Europae sylvis.

17. C. thorace subtuberculato, corpore testaceo, antennis *testaceum*, mediocribus fuscis. Syft. Ent. 190. 13.

Cerambyx testaceus thorace subrotundo mutico glabro, corpore testaceo, antennis mediocribus. Linn. Syft. Nat. 2. 635. 75. Fn. Sv. 670.

Cerambyx testaceus. Degeer Inf. 5. 93. 30.

* *Leptura testacea,* thorace glabro. Geoff. Inf. 1. 218. 18.
Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 6.

Habitat in Europae sylvis.

18. C. thorace subtuberculato nudo nigrum, elytris testaceis. *luridum.* Syft. Ent. 190. 14.

Cerambyx luridus thorace mutico subrotundo, corpore nigro, elytris luridis. Linn. Syft. Nat. 2. 634. 68.

Habitat in Europae borealis pinetis.

19. C. thorace laeui obscure ferrugineo, elytris testaceis. *raucum.* Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. Dom. Banks.

* Statura praecedentium. Antennae ferrugineae longitudo corporis. Caput et thorax plana, laeua, obscure ferruginea, immaculata. Elytra laeua, glabra, testacea. Abdomen conicum, testaceum. Pedes simplices.

20. C. thorace subuilloso nigro, lineis quatuor albis, intermediis abbreviatis, antennis breuibus. Syft. Ent. 190. 15. *

Habitat Hafniae.

21. C. thorace laeui nitido, corpore nigro opaco, elytris *aulicum.* laeubus, antennis breuibus. Syft. Ent. 190. 16. *

Habitat Hafniae.

- rufipes.* 22. C. thorace laeui nitido, elytris violaceis, tibiis rufis, antennis breuibus. *Gen. Inf. Mant.* 231. *
Habitat in Germania boreali. *Dom. de Hattorf.*
- striatum.* 23. C. thorace glabro, corpore nigro, elytris striatis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 191. 17.
Cerambyx striatus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 635. 73. *Fn. Sv.* 668.
Cerambyx niger nitidus; thorace mutico subrotundo subdepresso, elytris striatis, antennis breuibus. *Degeer Inf.* 5. 90. 26.
Habitat in Europae sylvis.
- lynceum.* 24. C. thorace subspinoso rotundato villoso, nigrum, elytris macula subdidyma fulua. *Syst. Ent.* 191. 18.*
Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Teats.*
- macula-* 25. C. thorace rotundato villoso, fuscum, elytris maculatum.
Habitat ad Cap. bon. sp. *D. Forster. Mus. Dom. Banks.*
Medium. Antennae vix longitudine corporis. Corpus villosum, fuscum, obscurum, minimie nitidum. Elytra maculis duabus ferrugineis, altera in medio, altera ad apicem. Femora subclauata.
- flavum.* 26. C. thorace subrotundo mutico, corpore flavo, femoribus clauatis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 191. 19.*
Habitat in Americae meridionalis insulis. *Mus. Tottianum.*
- vndatum.* 27. C. thorace tuberculato, elytris nigris, fasciis duabus vndatis albis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 191. 20.*
Cerambyx undatus thorace mutico subrotundo tuberculato, elytris fasciis duabus vndulatis, antennis submediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 636. 79. *Fn. Sv.* 675.
Cerambyx nigro fuscus, thorace mutico subrotundo, depresso tuberculato, elytris fasciis duabus vndulatis albidis. *Degeer Inf.* 5. 91. 28.
Schaeff. Icon. tab. 68. fig. 1.
Habitat in Europa boreali.

28. C. thorace rotundato, elytris liuidis, fasciis tribus *colonum*. fuscis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 191. 21. *
 Habitat in Carolina.
29. C. thorace rotundato rufo, elytris nigris basi rufis, *varium*. fasciis duabus albis. *Gen. Inf. Mant.* 132. *
 Habitat in America boreali. *Dom. Teats.*
30. C. thorace rotundato flavo fasciato, elytris fasciis *flexuo-* septem flavis, anticis antrorsum, posticis retrorsum *sum*. arcuatis. *Syst. Ent.* 191. 22. *
Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 3. ?
 Habitat in America. *Dom. Drury.*
31. C. testaceum, elytris fascia abbreviata alba. *Syst. Ent. minutum*. 192. 23. *
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Femora valde clauata basi alba.
32. C. thorace globoso nigro flavo fasciato, elytris nigris, *angula-* fasciis sex flavis, secunda tertiaque angulatis. *Syst. tum.* *Ent.* 192. 24. *
 Habitat in America boreali. *Mus. D. Hunter.*
33. C. thorace globoso albo fasciato, elytris nigris, fasciis *florale*. quinque albis, secunda tertiaque lunatis.
Cerambyx floralis. *Pall. Iter.* 2. 724. 63.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Statura praecedentium. Caput nigrum antennis fer- rugineis. Thorax globosus niger fasciis duabus al- bis. Elytra nigra fasciis quinque prima baseos, quin- ta apicis. Pedes rufi.
34. C. thorace globoso maculato, elytris nigris, fasciis vn- dato angulatis albis. *Syst. Ent.* 192. 25. * *fulmi-* *nans.*
 Habitat *Mus. Dom. Banks.*
35. C. thorace rotundato, elytris fasciis quatior flavis, *arcua-* prima interrupta, reliquis retrorsum arcuatis. *Syst. tum.* *Ent.* 192. 26.
Leptura arcuata, thorace globoso nigra, elytris fa- sciis linearibus flavis, tribus retrorsum arcuatis, pe- *Fabr. Spec. Inf.* *Q.* *dibus*

dibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat. 2. 640. 21. Fn. Sv. 696.*

Leptura nigra, elytrorum lineis quatuor arcuatis punctisque flavis, pedibus testaceis. *Geoff. Inf. 1. 212. 10.*
Cerambyx niger, elytris fasciis quatuor flavis arcuatis. *Vdm. Diff. 30.*

Scarabaeus arboreus luteo pictus. *Frisch. Inf. 12. fig. 3.*

Cerambyx niger, elytris fasciis quatuor flavis arcuatis. *Leche nou. spec. 30.*

Scarabaeus maior corpore longo angusto nigro, cum tribus in utraque ala lineis transuersis lutescentibus. *Raj. Inf. 83. 23.*

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 6.

tab. 107. fig. 2. 3.

Habitat in Europae hortis.

arietis. 36. *C. thorace rotundato nigro*, elytris nigris, fasciis flavis, secunda anterius arcuata, pedibus ferrugineis. *Syst. Ent. 193. 27.*

Leptura arietis. *Linn. Syst. Nat. 2. 640. 23. Fn. Sv. 695.*

Leptura nigra, elytrorum lineis tribus transuersis punctisque flavis, pedibus testaceis. *Geoff. Inf. 1. 214. 11.*

Cerambyx 4fasciatus niger, thorace mutico subglobo-fo, elytris fasciis flavo vitreis, secunda obliqua, pedibus ferrugineis. *Degeer Inf. 5. 81. 18.*

Stenocorus arietis. *Scop. Ann. Hist. nat. 5. 96. 57.*

Scarabaeus medius niger, lineolis et maculis luteis pulchre variegatis. *Raj. Inf. 82. 22.*

Scarabaeus niger lineolis quibusdam luteis distinctus.

List. Scar. 385. 14.

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 6.

Frisch. Inf. 12. 32. tab. 3. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 7.

Habitat in Europae hortis.

Conf. Bergstr. Nomencl. 1. 9. 12. tab. 1. fig. 12. Vix distincta species videtur, quamvis magnitudine differat.

37. C. thorace globoso immaculato, elytris nigris, fasciis *plebeium*. linearibus albis. *Syst. Ent.* 193. 28.

Leptura rustica thorace globoſo tomentoſo, elytris cinereis, fasciis linearibus albidis vndatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 17. *Fn. Sv.* 692.

Leptura nigra, elytrorum lineis transuersis punctisque albis. *Geoff. Inf.* 1. 215. 12.

Scarabaeus niger, elytris lineis duabus albis. *Raj. Inf.* 83. 25.

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 7.

Habitat in Europae hortis.

38. C. thorace rotundato maculato, elytris mucronatis *mucronata*- nigris, strigis tribus arcuatis flauis, basi ferrugineis. *tum.* *Syst. Ent.* 193. 29. *

Habitat in America. *D. Solander.*

39. C. thorace rotundato subspinoso, elytris bidentatis *acuminata*- fuscis, strigis quatuor flauis, femoribus clauatis com- *tum.* pressis. *Syst. Ent.* 194. 30. *

Habitat in America boreali. *D. Solander.*

40. C. thorace rotundato flavo fasciato, elytris nigris, *detritum*. fasciis quinque flauis, pedibus ferrugineis. *Syst. Ent.* 194. 31.

Leptura detrita thorace globoſo nigricante, elytris fuscis, fasciis quatuor transuersis flauis, pedibus rufis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 640. 20. *Fn. Sv.* 694.

Leptura nigra, elytris pallido fuscis, signaturis flauis. *Geoff. Inf.* 1. 216.

Schaeff. Elem. tab. 76. fig. 2.

Icon. tab. 38. fig. 9.

tab. 64. fig. 3.

Habitat in Europae hortis.

41. C. thorace rotundato nigrum, elytris glaucis basi nigro maculatis. *glaucum.*

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Medium. Corpus totum nigrum pube glaucescente nitidum. Antennae breuissimae vix thorace longiores,

nigrae. Elytra obtusa, glauca basi maculis aliquot nigris.

trifascia- 42. C. thorace globoso ferrugineo, elytris nigris, fasciis tribus atris, prima annulari.

Habitat in Lusitania. *D. Gray.*

Statura omnino C. verbasci. Caput atrum antennis rufis. Thorax globosus, ferrugineus tomento cinereo tectus. Elytra atra fasciis tribus albis, prima annulari. Abdomen subtus annulis albis.

Verbasci. 43. C. thorace rotundato nigro maculato, elytris subuirscentibus, fasciis tribus nigris, prima lunari. *Syst. Ent.* 194. 32:

Leptura Verbasci thorace subouato nigro, elytris fasciis tribus nigris, prima semiannulata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 640. 22.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5, fig. 12.

Habitat in Europae australioris verbasco.

aegyptia- 44. C. thorace rotundato ferruginoso, elytris cinerascentibus, fasciis tribus fuscis, prima annulari. *Syst. Ent.* 194. 33. *

Habitat in Oriente. *Dom. Prof. Forskahl.*

mysticum. 45. C. thorace rotundato, elytris fuscis, fasciis apiceque cinereis, basi rufis. *Syst. Ent.* 194. 34.

Leptura mystica thorace globoso tomentoso, elytris fusco cinereis antice rufis, fasciis linearibus arcuatis lateque canis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 18. *Fn. Sv.* 693.

Leptura nigra, elytris maculis testaceis nigris albidis lineisque nigris et albicantibus variegatis. *Groff. Inf.* 1. 217. 15.

Cerambyx albo fasciatus niger, thorace mutico subgloboso, elytris lineis tribus arcuatis fasciaque transuersa griseis, antennis breuioribus. *Degeer Inf.* 5. 82. 19.

Cerambyx quadricolor. *Scop. Ent. carn.* 177.

Scarabaeus parvus, elytris triplici colore, rufo, albo, nigro. *Raj. Inf.* 83. 26.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 9.

46. C. thorace rotundato nigrum; elytris fasciis duabus albis, elytrorum basi antennis tibiisque ferrugineis. *Alni.*
Syst. Ent. 195. 35.

Leptura Alni. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 19.
 Habitat in Europa, Anglia.

52. DONACIA.

1. D. femoribus posticis clauatis dentatis. *Syst. Ent.* 195. 1. *craßipes.*

Leptura aquatica deaurata, antennis nigris, femoribus posticis dentatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 637. 1. *Fu.*
Sv. 677.

Leptura aquatica spinosa viridi deaurata, antennis nigris, pedibus fuscis, femoribus posticis magnis dentatis. *Degeer Inf.* 5. 140. 80. tab. 4. fig. 14. 15.

Stenocorus deauratus femoribus posticis dentatis. *Geoff.*
Inf. 1. 229. 12.

Cantharis arundines frequentans prima. *Raj. Inf.*
100. 1.

Searabaeus arboreus purpureo aureus medius. *Frisch.*
Inf. 12. 33. tab. 6. fig. 2.

Habitat in plantis aquaticis, nymphaeis, phellandriis, aliisque.

Variat rarius femoribus posticis clauatis, muticis.

2. D. femoribus simplicibus. *Syst. Ent.* 195. 2. * *simplex.*

Habitat in Anglia.

53. LEPTVRA.

1. L. nigra villosa, elytris liuidis, sutura puncto medio apiceque nigris. *spunctata-*

ta.

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Differt a L. melanura, quamvis valde affinis. Corpus maius nigrum, tomento cinereo villosum. Elytra liuida, rarius testacea, sutura, puncto medio apiceque nigris. Elytra apice rotundata nec emarginata.

2. L. nigra, elytris rubescentibus liuidisue, sutura apiceque nigris. *melanura-* *Syst. Ent.* 196. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. *ra.*
637. 2. Fu. Sv. 671.

Leptura variabilis nigra, pedibus posticis corpore longioribus, elytris maris flavo testaceis apice nigris, feminae obscure rubris. *Degeer Inf.* 5. 137. 14.

Stenocorus niger, elytris rubescentibus liuidisue. *Geoff. Inf.* 1. 226. 7. tab. 4. fig. 1.

Leptura thorace nigro nitido, elytris obsolete fordindeque flavescentibus. *Gad. Diff.* 27.

Cerambyx niger elytris flauis, extremitatibus nigris. *Raj. Inf.* 97. 6.

Capricornus exiguus, vaginis rubescentibus apice nigro. *Petiv. Gazoph.* tab. 30. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 4.

Habitat in Europa frequens in floribus.

lunata. 3. L. nigra, elytris testaceis immaculatis, pedibus nigris. *Gen. Inf. Mant.* 232. *

Habitat in floribus Kiloniensibus. *Dom. Lund.*

sanguino- 4. L. nigra, elytris sanguineis. *Syst. Ent.* 196. 2. *Linn. lenta.* *Syst. Nat.* 2. 638. 4. *Fn. Sv.* 679.

Scopol. carn. 150.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 9.

Habitat in Europae floribus.

villica. 5. L. ferruginea, antennis elytrisque fuscis. *Syst. Ent.* 196. 3. *

Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*

rubra. 6. L. nigra, thorace elytris tibiisque purpureis. *Syst. Ent.* 196. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 638. 3. *Fn. Sv.* 500.

Leptura nigra thorace elytris tibiisque obscure rufis. *Degeer Inf.* 5. 132. 7.

Scarabaeus arboreus maior purpureo ruber. *Frisch. Inf.* 12. tab. 3. fig. 6.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 30.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 2.

Habitat in Europae floribus.

testacea. 7. L. nigra, elytris testaceis, tibiis rufis, thorace postice rotundato. *Syst. Ent.* 197. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 638. 5. *Fn. Sv.* 680.

Leptu-

Leptura nigra, elytris tibiis pedibusque flavo testaceis. *Degeer Inf.* 5. 135. 11.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 3.

Habitat in Europa boreali.

8. L. sericeo virescens, antennis fusco viridiique variis. *virens.*

Syst. Ent. 197. 6.

Leptura virens viridi flava, antennis luteo viridiique flavis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 638. 7. *Fn. Sv.* 682.

Leptura flavo viridis, antennis nigro luteoque variis.

Degeer Inf. 5. 131. 6.

Habitat in Europa boreali.

9. L. corpore toto nigro. *Syst. Ent.* 197. 7. *

atra.

Leptura Aethiops. Pod. Mus. p. 28.

Stenocorus totus niger. Geoff. Inf. 1. 228. 10.

Habitat in Europa australiori.

Variat pedibus nigris et testaceis.

10. L. nigra, scutello albo.

scutellata.

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Maior L. atra. Corpus nigrum solo scutello albo. Elytra apice emarginata. Abdomen serico albo nitet.

11. L. nigra, antennis pedibusque rufis.

ruficor-
nis.

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Minuta. Corpus totum nigrum pube flavescente sericeum. Antennae rufae. Pedes rufi femoribus posticis apice nigris.

Variat femoribus omnibus apice nigris.

12. L. nigra, elytrorum margine tibiisque posticis rufis. *margina-*

ta.

Habitat in Norwegia. *Dom. Lund.*

Statura L. nigrae. Corpus totum nigrum, obscurum exceptis margine elytrorum tibiisque posticis rufis.

13. L. elytris attenuatis, corpore nigro nitido, abdome nigra.

rubro. *Syst. Ent.* 197. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 14.

Fn. Sv. 689. *Degeer Inf.* 5. 144. 24.

Stenocorus niger nitidus, abdome fusco rubente.

Geoff. Inf. 1. 227. 9.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 7.

Habitat in Europae floribus.

- luteicor-* 14. L. lutea, thorace lineis duabus, elytris fasciis quatuor nigris. *Syst. Ent.* 197. 9. *
Habitat in Carolina. Mus. Brit.
- 4macula-* 15. L. nigra, elytris liuidis, maculis quatuor nigris. *Syst. Ent.* 197. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 638. 9. *Fn. Sv.* 684.
Schaeff. Elem. tab. 118. fig. 2.
Icon. tab. 1. fig. 7.
Habitat in Europae plantis.
- 6macula-* 16. L. nigra, coleoptris testaceis, maculis sex nigris marginé connexis. *Syst. Ent.* 197. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 638. 11. *Fn. Sv.* 686.
Leptura testaceo maculata nigra fasciis tribus elytro-rum transuersis vndulatis testaceo flauis. Degeer Ins.
5. 133. 9.
Scarabaeus elytris pallidis nigris maculis pictis. Raj.
Inj. 81. 18.
Habitat in Europae plantis.
- 12macu-* 17. L. nigra, elytris flauis, maculis quinque flauis.
lata. *Habitat in Sibiria. D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
Statura L. 6maculatae, at paullo maior. Corpus totum nigrum, immaculatum. Elytra laevia, glabra, flaua maculis sex nigris, 1. ad scutellum, 2. ad marginem exteriorem, 3. ad marginem interiorem, 4. ad marginem exteriorem, 5. in medio, 6. ad apicem. Pedes nigri.
- attenua-* 18. L. elytris attenuatis flauis, fasciis quatuor nigris, pedibus testaceis. *Syst. Ent.* 198. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 13. *Fn. Sv.* 688.
Prionus attenuatus. Scop. Ann. Hist. nat. 5. 99. 66.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 6.
Habitat in Europa.
Fascia elytrorum anterior variat mox integra, mox in-terrupta, interdum omnino deest.
- 4fasciata.* 19. L. nigra, elytris testaceis, fasciis quatuor dentatis nigris. *Syst. Ent.* 198. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 12. *Fn. Sv.* 687.

Leptura ostomaculata nigra maculis quatuor flauis in singulo elytro. Degeer *Ins.* 5. 132. 8. tab. 4. fig. 11.
Cerambyx fasciatus. Scop. *carn.* 172.

Schaeff. *Icon.* tab. 59. fig. 6.

Habitat in Europa.

Affinis praecedenti, feminam credit Scopoli.

20. L. nigra subuillosa, elytris testaceis nigro punctatis, *dubia.*
 pedibus nigris.

Habitat in Sibiria. D. Pallas. *Mus. Dom.* Banks.

Nimis affinis videtur L. attenuatae. Corpus totum nigrum tomento fulvo nitidulum. Elytra glabra, testacea antice punctis tribus paruis, intermedio anteriore, in medio puncto maiusculo, et versus apicem altero paullo minori. Pedes nigri.

21. L. nigra, clytris maculis tribus flauis. *Syst. Ent. sexguttata.*
 198. 14. *

Habitat in Germania. Dom. de Hattorf.

22. L. viridi coerulea, elytris subfastigiatis. *Syst. Ent. sericea.*
 198. 15. Linn. *Syst. Nat.* 2. 638. 8. Fn. Sv. 683.

Schaeff. *Icon.* tab. 84. fig. 1.

Habitat in Europa boreali.

23. L. thorace globo abdomeque rubris, elytris nigris. *collaris.*
Syst. Ent. 198. 16. Linn. *Syst. Nat.* 2. 639. 16. Fn.
 Sv. 691. Scop. *carn.* 159.

Leptura ruficollis nigra thorace abdomeque rufis.

Degeer *Ins.* 5. 143. 22.

Stenocorus niger thorace rubro. Geoff. *Ins.* 1. 228. II.

Schaeff. *Icon.* tab. 58. fig. 9.

Habitat in Europa.

24. L. thorace globo nigro, elytris violaceis, abdome *virginella.*
 ne rufo. *Syst. Ent.* 198. 17. Linn. *Syst. Nat.* 2. 639.
 15. Fn. Sv. 690.

Leptura violacea nigra, elytris violaceis nitidis, abdo-
mine flavo rufo. Degeer *Ins.* 5. 144. 23.

Leptura nigra, elytris coerulecentibus, toto abdome
ne rubro. Gad. *Diss.* 26.

Schaeff. *Icon.* tab. 58. fig. 8.

Habitat in Europa boreali.

abbreuia- 25. L. elytris dimidiatis ferrugineis immaculatis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 199. 18.

Necydalis maior. *Linn. Syst. Nat.* 2. 641. 1.

Necydalis ichneumonea nigra, elytris abbreuiatis rufo fuscis, pedibus rufis, antennis corpore breuioribus. *Degeer Ins.* 5. 148. 1. tab. 5. fig. 1.

Musca Cerambyx maior. *Schaeff. Monogr.* 1753. fig. 1. 2.

— — *Elem. tab.* 13. fig. 2.

— — *Icon. tab.* 10. fig. 10.11.

Habitat in Europa.

variega- 26. L. elytris abbreuiatis, abdomine atro, fasciis fuluis. ta. *Syst. Ent.* 199. 19. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

dimidia- 27. L. elytris dimidiatis testaceis, apice lineola alba, au- ta. tennis longis. *Syst. Ent.* 199. 20.

Necydalis minor. *Linn. Syst. Nat.* 2. 641. 2. *Fn. Sv.* 837.

Necydalis ceramboides fusca, elytris abbreuiatis, li- neola abbreuiata alba, capite thoraceque nigris, antennis rufis corpore longioribus. *Degeer Ins.* 5. 151. 2.

Musca Cerambyx minor. *Schaeff. Monogr.* 1753. fig. 6. 7.

Icon. tab. 95. fig. 5.

Sulz. Hist. Ins. tab. 7. fig. 51.

Habitat in Europa in primis boreali.

vmbella- 28. L. elytris dimidiatis testaceis immaculatis, antennis tarum. longis. *Syst. Ent.* 199. 21.

Necydalis vmbellatarum. *Linn. Syst. Nat.* 2. 641. 3.

Necydalis minima. *Scop. carn.* 180.

Necydalis elytris apice nigris. *Schreb. Ins.* 4.

Schaeff. Icon. tab. 95. fig. 4.

Sulz. Hist. Ins. tab. 6. fig. 1.

Habitat in Germaniae vmbellatis.

54. L A M P Y R I S.

1. L. oblonga fusca, clypeo cinereo. *Syst. Ent.* 200. 1. *noctiluca*.
Linn. Syst. Nat. 2. 643. 1. *Fn. Sv.* 699.
Lampyris noctiluca communis oblonga supra nigro
fusca, subtus albido flava. Degeer Ins. 4. 31. 1. tab.
 1. fig. 19. 20.
Cantharis mas coleopterus. Leche nou. sp. 23. 47.
 Habitat in Europae borealis iuniperetis.
2. L. oblonga fusca, clypeo apice hyalino. *Syst. Ent.* 200. 2. *splendidula*.
Lampyris splendidula oblongiuscula fusca, clypeo su-
la. pra oculos fenestrato. Linn. Syst. Nat. 2. 644. 3.
Lampyris femina aptera. Geoff. Ins. 1. 166. 1.
Cassida noctiluca. Scop. carn. 118.
Scarabaeus lampyris fordide nigricans, corpore longo
angusto. Raj. Ins. 78. 15.
Noctiluca terrestris. Colum. ecphr. 1. 38. fig. 36.
Mouff. Ins. p. 109. fig. 1. mas. fig. 2. fem.
Bradl. nat. tab. 26. fig. 3. A. mas. B. fem.
 Habitat in Europae syluaticis, tempestate pluuiosa im-
 primis lucem spargens.
 Vix a praecedente satis distincta.
3. L. obscure nigra, clypeo vtrinque lunula rosea. *corusca*.
Lampyris corusca oblongiuscula fusca, clypeo vtrin-
que intra marginem fuluo. Linn. Syst. Nat. 2. 644.
 2. *Vdm. Diff.* 47.
 Habitat in America boreali. *Mus. D. Blackburn*.
 Corpus totum obscure nigrum minime nitidum. Cly-
 peus vtrinque lunula rosea ab apice ad basin ducta.
4. L. nigra, clypeo vtrinque macula rufa. *Syst. Ent. obscura*.
 200. 3. *
 Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks*.
5. L. clypeo rufo medio nigro, elytris nigris, margini- *pyralis*.
 bus abdomineque albis. *Syst. Ent.* 200. 4.
Lampyris pyralis oblonga fusca, elytris margine rufe-
scentibus, clypeo intra marginem rufescente. Linn.
Syst. Nat. 2. 644. 4. *Mus. Lud. Vlr.* 78.
 1. Feminae totius generis apterae larvis simillimae.

Lampyris oblonga, elytris obscure fuscis margine rufescentibus, abdomine atro postice flauissimo, pedibus fuscis. *Degeer Inf.* 4. 52. 7. tab. 17. fig. 7.
Habitat in America meridionali.

margina- 6. *L. oblonga nigra* thoracis elytrorumque margine omnia. scutello abdominalisque postico flavis. *Syst. Ent.* 201. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 644. 5.
Habitat in America meridionali.

pechinata. 7. *L. atra*, clypei lateribus basi exteriore, elytrorum abdominalisque apicibus albis, antennis pectinatis. *Syst. Ent. App.* 824. *

Lampyris atra antennis pectinatis, thorace lateribus flavis, elytris striatis reticulatis. *Degeer Inf.* 4. 57. II. tab. 17. fig. 13.

Cantharis pectinata clypei lateribus basique exteriori elytrorum luteis, antennis pectinatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 649. 17.

Habitat in America meridionali.

flabelli- 8. *L. nigra*, clypeo ante marginem, elytris lineola marginali baseos abdomineque apice albis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Antennae maxime valde pectinatae vel potius flabellatae. Clypeus niger ante marginem exteriorem et anticum pallidus. Elytra vix striata, nigra lineola pallida ante marginem exteriorem baseos. Corpus nigrum ano albo.

Hespera. 9. *L. ouata*, elytris fuscis, macula marginali triangulari flava. *Syst. Ent.* 201. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 644. 6.

Lampyris surinamensis ouata, elytris fuscis, macula marginali triangulari flava, abdomine subtus fuscus apice flavo. *Degeer Inf.* 4. 48. 1. tab. 17. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

ignita. 10. *L. ouata*, elytris fuscis, macula marginali ouata lutea. *Syst. Ent.* 201. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 645. 7.

Lampyris ouata, elytris fuscis, macula marginali ouata flava, abdomine subtus toto flavo. *Degeer Inf.* 4. 49. 2. tab. 17. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

11. L. oblonga, elytris fuscis, margine exteriore luteo, *lucida*,
abdomine flavo. *Syst. Ent.* 201. 8. *Linn. Syst. Nat.*
2. 645. 8.
Cantharis lucida. *Degeer Inf.* 4. 51. 5. tab. 17. fig. 5.
Cantharis lucida. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 5. fig. 22.
 Habitat in America meridionali.
12. L. oblonga fusca, thorace flauescente, macula media *nitidula*.
nigra, abdomine apice maculis duabus flavis.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentium. Caput atrum. Clypeus flavus
macula media fusca. Elytra vix striata, fusca, im-
maculata. Abdomen fuscum apice siue ultimo seg-
mento subtus maculis duabus flavis.
13. L. oblonga subtestacea, abdomine atro postice flauissi- *phospho-*
mo. *Syst. Ent.* 201. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 645. 9. *rea.*
Lampyris oblonga, elytris fuscis margine exteriore
flavis, abdomine atro postice flauissimo, pedibus te-
staceis. *Degeer Inf.* 4. 51. 6. tab. 17. fig. 6.
 Habitat in America meridionali.
14. L. liuida, thorace flauescente, abdomine postice fla- *capensis*.
uissimo. *Syst. Ent.* 201. 10. *
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Variat thorace maculis duabus fuscis.
15. L. flauicans, capite elytrisque fuscis. *Syst. Ent.* 201. *australis.*
11. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
16. L. elytris fuscis, thorace transuerso rufo. *Syst. Ent.* *italica.*
202. 12.
Lampyris italica elytris fuscis, clypeo antice transuer-
so rufo medio nigro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 645. 11.
Lampyris oblonga, elytris nigro fuscis, thorace ru-
fo, macula nigra in medio, capite nigro. *Degeer*
Inf. 4. 53. 9. tab. 17. fig. 9. 10.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 3.
 Habitat in Italiae arboribus.
 In nostra thorax immaculatus.

maurita. 17. L. elytris liuidis, corpore flauo. *Syst. Ent.* 202. 13.
nica. *Linn. Syst. Nat.* 2. 645. 10.
 Habitat in Africæ plantis.

depressa. 18. L. fusca, clypei elytrorumque margine dilatato piano.
 Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks*.
 Magna tota fusca minime nitida. Margo et clypei, et
 elytrorum valde dilatatus, planus vix reflexus. Ely-
 tra stria vnica in medio eleuata. Antennæ extor-
 sum parum crassiores.

55. PYROCHROA.

coccinea. 1. P. nigra, thorace elytrisque sanguineis immaculatis.
Syst. Ent. 202. 1.

Pyrochroa. Geoff. Inf. 1. 338. 1. tab. 6. fig. 4.

Lampyris coccinea nigra thorace elytrisque sanguineis,
elytris striatis. Linn. Syst. Nat. 2. 646. 18. *Fn.*
Sv. 705.

Lampyris villosa nigra, thorace elytrisque villosis ru-
bris. Degeer Inf. 4. 47. 4.

Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 4.

Habitat in Europæ sepibus.

Variat capite nigro aut rufo. Elytra in nostris nullo
 modo striata, vti et *Linné* in *Fn. Sv.* testatur.

Conf. *Cantharis pectinicornis* thorace orbiculato, ely-
 tris rufo testaceis, antennis pectinatis. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 650. 20. *Fn. Sv.* 715.

sanguineæ. 2. P. nigra, thoracis lateribus elytrisque sanguineis. *Syst.*
Ent. 202. 2.

Lampyris sanguinea. Linn. Syst. Nat. 2. 646. 17. *Fn.*
Sv. 704.

Lampyris elytris rubris, thorace rubro, nigra macula.
Geoff. Inf. 1. 168. 3.

Lampyris sanguinea nigra, thorace rubro maculis
quinque nigris, elytris rubris venis reticulatis. De-
geer Inf. 4. 452. tab. 2. fig. 1.

Cassida sanguinea. Scopol. carn. 119.

Cantharis prioribus similis quarta. Raj. Inf. 101.

Scarabaeus arboreus parvus ruber, elytris longis, clypeo pectorali linea nigra. *Frisch. Inf.* 12. 40. 3. tab. 7. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 7. fig. 1.

Habitat in Europac lapidosis.

3. P. sanguinea, elytris postice violaceis. *Syst. Ent.* bicolor. 203. 3.

Lampyris bicolor. Linn. *Syst. Nat.* 2. 646. 16.

Cantharis bicolor. Amoen. acad. 6. 395. 21.

Habitat in Africa.

4. P. atra, thoracis margine flavo, elytris flavis, fascia reticulata apiceque nigris. *Syst. Ent.* 203. 4. *

Habitat in America boreali.

5. P. flava, elytris macula marginali posticeque nigris, latissima. margine laterali maximo dilatato. *Syst. Ent.* 203. 5. *

Lampyris latissima. Linn. *Syst. Nat.* 2. 646. 14.

Habitat ad Sierra Leon Africæ.

6. P. elytris coriaceis latissimis testaceis apice nigris. *Syst. palliata.* Ent. 203. 6. *

Habitat ad Cap. bon. sp. Dom. Yeats.

7. P. nigra, thoracis lateribus elytrisque dilatatis flavis rostrata. antice posticeque nigris. *Syst. Ent.* 203. 7. *

Lampyris rostrata elytris testaceis antice posticeque nigris. Linn. *Syst. Nat.* 2. 646. 15. *Mus. Lud.* Vlr. 78.

Lampyris rostrata ouata, elytris flavo fulvis antice posticeque nigris, thorace flavo, macula nigra, capite rostrato. *Degeer Inf.* 7. 622. 19. tab. 46. fig. 11.

Habitat in Africæ plantis.

8. P. nigra, thoracis lateribus elytrisque flavis postice proboscidea. nigris.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et summa affinitas P. rostratae, a qua tamen differt elytris minus dilatatis, apice tantum nigris,

- ferrati-* 9. *P.* nigra, thorace elytrisque rufescentibus, elytris apice nigris. *Syst. Ent.* 203. 8. *
cornis. Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Species 5 — 8 ob os porrectum, cylindricum rostrum simulans, singulares, attamen huius generis.

56. LYMEXYLON.

- testaceum.* 1. *L.* rufum, pedibus nigris.
 Habitat - - - *Mus. Dom. Banks.*
 Antennae desunt. Corpus magnum, cylindricum rufo testaceum pedibus solis nigris femoribus basi ferrugineo testaceis.
- dermestoi-* 2. *L. testaceum*, oculis alis pectoreque nigris. *Syst. Ent.* 204. 1.
Cantharis dermestoides testacea oculis alis pectoreque nigris, antennis longitudine thoracis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 650. 25. *Fn. Sv.* 702.
 Habitat in Europa media.
 Abdomen nigrum apice testaceum.
- nauale.* 3. *L.* luteum, elytris margine apiceque nigris. *Syst. Ent.* 204. 2.
Cantharis naualis thorace teretiusculo, corpore luteo, elytris margine apiceque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 650. 26. *Fn. Sv.* 718. *It. Westr.* 155. tab. 2.
Frisch. Inf. 13. 24. tab. 20.
Schaeff. Icon. tab. 59. fig. 1.
 Habitat intra quercus lignum, quod destruit.
- probosci-* 4. *L.* nigrum, elytris testaceis apice nigris, palpis hantato irregularibus.
 Habitat in Germaniae lignis. *Dom. de Hattorf.*
 Forte proprii generis insectum. Caput et thorax plana, depressa, nigra, immaculata. Palpi porrecti nigri articulo penultimo maiori, subtus appendiculo ouato, irregulari, fisso, ultimo arcuato hainato, acuto. Elytra laenia, testacea apice nigra. Abdomen nigrum apice testaceum.

57. C V C V I V S.

1. C. thorace denticulato rufo, pedibus simplicibus nigro depresso. gris. *Syst. Ent.* 204. 1. *
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
2. C. ruber, thorace sulcato, femoribus clavatis rufis. *clauipes.*
Gen. Inf. Mant. 233. *
Habitat in America boreali. *Dom. Yeats.*
3. C. thorace denticulato rufo, elytris nigris, antennis filiformibus longitudine corporis. *dubius.*
Gen. Inf. Mant. 233.
Habitat in America boreali.
De genere adhuc haereo.
4. C. thorace denticulato nigro, pedibus flavescentibus, *flauipes.*
antennis filiformibus longitudine corporis. *Iter.*
Norweg. d. 14. Iun. *
Habitat in arborum truncis decorticatis Norwagiae
d. 14. Iun.
5. C. thorace mutico nigro, puncto utrinque impresso, *muticus.*
elytris striatis fuscis.
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Statura depressa praecedentium. Antennae filiformes
corpo breviores. Caput et thorax atra, immaculata,
ad basin thoracis puncta duo impressa. Elytra
filiformia, striata, obscura sive fusca. Pedes simplices, nigri.

58. C A N T H A R I S.

1. C. thorace marginato rubro, macula nigra, elytris fuscis. *fusca.*
Syst. Ent. 205. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 647. 2.
Fn. Sv. 700.
Cantharis sepiarius maior, elytris nigricantibus. *Raj.*
Inf. 84. 29.
Cicindela elytris nigricantibus, thorace rubro nigra
macula. *Geoff. Inf.* 1. 170. 1.

Fabr. Spec. Inf.

R

Thel-

Thelephorus fuscus thorace flavo rubro macula nigra,
elytris obscuris cinereo nigris. *Degeer Inf.* 4. 60. 1.
tab. 2. fig. 12.

Frisch. Inf. 12. 3. tab. 6. fig. 5.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 33.

Schaeff. Elem. tab. 123. fig. 1. 2.

Icon. tab. 16. fig. 10.

tab. 26. fig. 9 — 12.

Habitat frequens in Europae sepibus.

Animal rapacissimum in propriam speciem saeuit.

tiuida. 2. C. thorace marginato tota testacea. *Syst. Ent.* 205. 2.
Linn. Syst. Nat. 2. 647. 3. *Fn. Sv.* 701.

Cantharis sepiarius maior e rufo flauicans, elytris non
maculatis. *Raj. Inf.* 84. 28.

Cicindela thorace rubro immaculato, geniculis posti-
cis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 171. 2.

Thelephorus flavius thorace flavo rufo, elytris testaceis
femorum posteriorum apice nigro. *Degeer Inf.* 4.
70. 2.

Habitat in Europa, America boreali.

Nimis praecedenti affinis.

obscura. 3. C. thorace marginato, marginibus rubris, corpore ni-
gro. *Syst. Ent.* 205. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 648. 5.
Fn. Sv. 706. *Att. Nidros.* 3. 396. tab. 6. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 16. fig. 8.

Habitat in Europa boreali.

Variat thoracis margine rubro et pallide fusco pedibus
rubris et nigris.

limbata. 4. C. thorace marginato, fronte elytrorumque margini-
bus rufis, corpore nigro.

Habitat in Iamaica. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Antennae nigrae. Caput rufum vertice nigro.

Thorax marginatus, rufus, immaculatus. Elytra
laevia, atra margine omni rufo. Corpus atrum.

lateralis. 5. C. thorace marginato rubro, corpore fusco, elytris
margine exteriori flavescentibus. *Syst. Ent.* 206. 4.
Linn. Syst. Nat. 2. 648. 6. *Fn. Sv.* 707.

Habitat in Europa boreali.

6. *C. thorace marginato flavo macula viridi, elytris viridibus nitidis.* *smaragdula.*
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
 Media. Caput flavescentes basi nigrum. Antennae flavescentes apice parum fuscescentes. Thorax marginatus, flavus, macula in medio magna, sinuata, virescens et praeterea punctis vtrinque duobus. Elytra laevia, viridia, nitida. Abdomen et pedes flava. Pedes fuscum.
7. *C. thorace marginato, corpore toto atro.* *Syst. Ent.* 206. *atra.*
S. Linn. Syst. Nat. 2. 649. 16.
 Habitat in Europa boreali.
8. *C. thorace marginato nigra, thoracis elytrorumque marginatibus rubris.* *Syst. Ent.* 206. 6. * *marginata.*
 Habitat in America. *Dom. Eaton.*
9. *C. thorace marginato ferrugineo, macula nigra, elytris testaceis, macula apicis nigra.* *maculata.*
 Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*
 Antennae nigrae. Caput nigrum mandibulis basi flavis. Thorax marginatus flavus in medio macula magna nigra. Elytra laevia, testacea macula magna apicis nigra. Corpus nigrum, abdominis segmentis apice flavis. Pedes nigri. Femora interdum rufa.
10. *C. thorace marginato, atra elytris pallidis apice fuscis.* *pallipes.*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
 Statura praecedentium. Caput atrum palpis pallidis. Antennae fuscae basi pallidae. Thorax marginatus ater. Elytra glabra pallida apice fusca. Pedes pallidi.
11. *C. atra, thorace abdomineque rufis.* *Syst. Ent.* 206. 7.* *ruficollis.*
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 6.
 Habitat in Anglia.
12. *C. testacea, capite thoracis macula media elytrisque flauipes.*
dimidiato nigris.
 Habitat in China. *Mus. Dom. Banks.*
 Magna. Antennae desunt. Caput nigrum macula inter antennas tridentata testacea. Elytra glabra, nitida

tida basi testacea, apice nigra margine tamen testaceo. Pedes testacei.

melanocephala. 13. *C. testacea*, capite elytrorum apicibus tibiisque nigris. Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Caput cum antennis atrum, immaculatum. Thorax marginatus, testaceus, immaculatus. Elytra laevia, testacea, apice nigra. Abdomen testaceum. Pedes nigri femoribus testaceis.

apunctata. 14. *C. thorace marginato*, punctis duobus nigris, elytris testaceis apice nigris. *Syst. Ent.* 206. 8. * Habitat Lipsiae.

nigripes. 15. *C. thorace rotundato lutea*, ab domine pedibus, elytrorumque apicibus atris.

Habitat in Europa boreali. *Dom. Lund.*

Caput et thorax lutea. Antennae fuscae et punctum fuscum inter antennas. Elytra pallide testacea, apice nigra. Abdomen et pedes atra. Similis *C. melanurae*, attamen omnino distincta.

melanura. 16. *C. thorace rotundato*, corpore luteo, elytris apice nigris. *Syst. Ent.* 206. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 651. 27. *Fn. Sv.* 719.

Cantharis sepiarius; elytrorum apicibus nigris. *Raj. Ins.* 84. 27.

Cicindela rubra, elytris testaceis apice nigris. *Geoff. Ins.* 1. 173. 5.

Schaeff. Icon. tab. 16. fig. 14.

Habitat in Europae hortis.

pulicaria. 17. *C. thorace marginato rufo*, macula nigra, elytris atris. Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Parua tota atra, exceptis thoracis marginibus tentaculisque abdominalibus.

minima. 18. *C. thorace marginato rufo*, macula nigra, corpore fusco, elytris apice flauis. *Syst. Ent.* 207. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 649. 12. *Fn. Sv.* 713. *Scop. carn.* 128.

Necydalis elytris puncto flauo. *Geoff. Ins.* 1. 372. 1. tab. 7. fig. 2.

Habitat in Europae hortis.

19. *C. thorace marginato flavo, macula nigra, corpore nigro, elytris pedibusque liquidis.* *Syst. Ent.* 207. 11. *testacea.*
Linn. Syst. Nat. 2. 649. 15. *Fn. Sv.* 714.
- Cicindela nigra, thoracis margine flavo, elytris pedibusque pallidis.* *Geoff. Inf.* 1. 173. 6. b.
- * *Thelephorus niger, thorace rufescente, macula nigra, elytris testaceis, tibiis flavis.* *Degeer Inf.* 4. 71. 4.
Scop. carn. 123.
Schaeff. Icon. tab. 52, fig. 8.
 Habitat in Europae hortis.
20. *C. thorace marginato medio atro, elytris abbreviatis biguttata, nigris apice flavis.* *Syst. Ent.* 207. 12. *Linn. Syst. ta.*
Nat. 2. 648. 11. *Fn. Sv.* 712.
Cicindela fusca, elytris apice flavis, thorace fusco.
Geoff. Inf. 1. 176. 11.
Thelephorus niger, femoribus flavis, elytris apice luteis. *Degeer Inf.* 4. 77. 10.
 Habitat in Europae nemoribus, hortis,

59. M A L A C H I V S.

1. *M. corpore viridi aeneo, elytris extrorsum sanguineis.* *aeneus.*
Syst. Ent. 207. 1.
Cantharis aenea thorace marginato, corpore viridi aeneo, elytris extrorsum vnde rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 648. 7. *Fn. Sv.* 708.
- Cicindela viridi aenea, elytris extrorsum rubris.* *Geoff. Inf.* 1. 174. 7.
Thelephorus aeneus viridi aeneus, elytris extrorsum rubris, capite antice flavo. *Degeer Inf.* 4. 73. 6. tab. 2. fig. 16, 17.
- Scarabaeus minor, corpore longiusculo, elytris rubicundis.* *Raj. Inf.* 77. 12.
Schaeff. monogr. 1754. tab. 2. fig. 10, 11.
Icon. tab. 18. fig. 12, 13.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6, fig. 5.
 Habitat in Europae plantis.
 Exserit tentacula duo basi connata, obtusa, sanguinea utrinque ad basin abdominis, et duo alia ad apicem thoracis.

Varietas minor elytris fere totis sanguineis 4 hebdomades senior prouenit, vix tamen distincta species.

2puftula- 2. M. aeneo viridis, elytris apice rubris. [Syst. Ent. 208. 2.

Cantharis 2puftulata thorace marginato, corpore aeneo viridi, elytris apice rubris. Linn. Syst. Nat. 2. 648. 8. Fn. Sv. 709.

Cantharis vix $\frac{3}{8}$ unciae longa. Raj. Inf. 101. 7.

Cicindela aeneo viridis, elytris apice rubris. Geoff. Inf. 1. 175. 8.

Thelephorus viridi aeneus, nitidus, elytris apice rubris. Degeer Inf. 4. 75. 7.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 10. 11.

tab. 19. fig. 14.

Habitat in Europa frequens.

Vicitat rapina minimorum insectorum.

pedicula- 3. M. ater, elytris apice rubris. Syst. Ent. 208. 3.

rius. *Cantharis pedicularia* thorace marginato, corpore atro, elytris apice rubris. Linn. Syst. Nat. 2. 648. 9. Fn. Sv. 710.

Habitat in Europae hortis.

Pediculo paullo maior.

pulica- 4. M. niger, thorace margine elytrisque apice rubris.

rius. Gen. Inf. Mant. 133. *

Habitat in Kiliae nemoribus. Dom. Lund.

fasciatus. 5. M. elytris nigris, fasciis duabus rubris. Syst. Ent. 208. 4.

Cantharis fasciata thorace subrotundo virescente, elytris nigris, fasciis duabus rubris. Linn. Syst. Nat. 2. 648. 10. Fn. Sv. 711.

Cantharis valde exigua. Raj. Inf. 102. 22.

Cicindela elytris nigris, fasciis duabus rubris. Geoff. Inf. 1. 177. 12.

Thelephorus thorace obscure viridi aeneo, elytris nigris, fasciis duabus transuersis rubris. Degeer Inf. 4. 76. 9.

Schaeff. Icon. tab. 189. fig. 3.

Habitat in Europae muscis.

60. N E C Y D A L I S.

1. N. thorace teretiusculo, corpore viridi. *Syst. Ent.* viridissima.
208. 1. *ma.*
Cantharis viridissima. *Linn. Syst. Nat.* 2. 650. 23. *Fn.*
Sv. 717.
Cantharis viridi aenea nitida, antennis nigris thorace
tereti elongato. *Degeer Inf.* 5. 15. 3. tab. 1. fig. 13.
Cicindela viridi coerulea. *Geoff. Inf.* 1. 177. 14.
Habitat in Europae hortis frequens.
2. N. thorace teretiusculo, corpore coeruleo subopaco. *coerule-*
Syst. Ent. 208. 2. *scens.*
Cantharis coerulea. *Linn. Syst. Nat.* 2. 650. 22. *Fn.*
Sv. 716.
Thelephorus villosus violaceo coeruleus, antennis pe-
dibusque nigris. *Degeer Inf.* 4. 76. 8.
Habitat in Europa boreali.
3. N. thorace teretiusculo abdomineque rufis, capite ely- *ruficollis.*
trisque viridi aeneis.
Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
Statura et magnitudo omnino N. coerulecentis. Caput
viride, nitidum antennis nigris. Thorax teretiuscu-
lus, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra viridia.
Abdomen rufum. Pedes nigri.
4. N. elytris subulatis nigra, femoribus omnibus clauatis. *atra.*
Syst. Ent. 209. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 642. 5.
Habitat in Europa australi.
Corpus totum nigrum, opacum, immaculatum.
5. N. elytris subulatis nigris basi flavis. *Syst. Ent.* 209. 4.* *humura-*
Cantharis nigra, elytris attenuatis antice flavis. *Geoff. lis.*
Inf. 1. 342. 2.
Necydalis muralis elytris subulatis fusca, humeris fla-
uis, pedibus simplicibus. *Forst. n. sp. Cent.* 1. 48. 48.
Habitat in Anglia.
6. N. elytris subulatis nigra, femoribus omnibus clauatis, *rufa.*
elytris antennisque rufis. *Syst. Ent.* 209. 5.

Necydalis rufa elytris subulatis nigra, femoribus omnibus clauatis, elytris antennisque rufis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 642. 6.

Leptura nigra, elytris pedibusque rubescentibus liuidis, coleoptris attenuatis. *Geoff. Ins.* 220. 22.
Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 8.

Habitat in Europa.

Scutellum album. Elytra basi puncto nigro.

coerulea. 7. N. elytris subulatis coerulea, femoribus posticis clavatis arcuatis. *Syst. Ent.* 209. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 642. 4.

Cantharis viridi coerulea, elytris attenuatis, femoribus posticis globosis. *Geoff. Ins.* 1. 342. 3.

Cantharis nobilis. *Scop. Ent. carn.* 145.

Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 7.

Sulz. Hist. Ins. 48. tab. 6. fig. 2.

Habitat in Europa australiori, Oriente.

Variat pedibus simplicibus.

Podagra- 8. N. elytris subulatis testaceis, corpore nigro, femoribus posticis clavatis basi testaceis. *Syst. Ent.* 209. 7.

Linn. Syst. Nat. 2. 642. 9.

Cantharis nigra, elytris attenuatis fuluis, femoribus posticis globosis. *Geoff. Ins.* 1. 343. 4.

Cantharis femorata. *Scop. carn.* 144.

Schaeff. Icon. tab. 85. fig. 7.?

β. *Necydalis flavescentia nigra*, elytris testaceis subulatis, femoribus posticis clavatis. *Deger Ins.* 5. 155. 4.
Linn. Syst. Nat. 2. 642. 8.

Habitat in Aegopodio podagraria.

β. Vix distincta videtur.

simplex. 9. N. elytris subulatis testaceis, pedibus simplicibus. *Syst. Ent.* 210. 8.

Necydalis simplex, *Linn. Syst. Nat.* 2. 643. 10.

Cantharis phthysica. *Scop. carn.* 144.

Habitat in Europa.

Forte praecedentis mera varietas.

61. ELATER.

1. E. fuscus, antennarum fasciculo flabelliformi. *Syst. flabelli-*
*Ent. App. 824. * Linn. Syst. Nat. 2. 651. 1. cornis.*
 Habitat in India.
2. E. albus nigro maculatus. *Syst. Ent. 210. 1. speciosus.*
Elater speciosus albus lineis punctis maculisque nigris.
Linn. Syst. Nat. 2. 652. 2.
 Habitat in India.
3. E. cinereo tomentosus, elytris substriatis, plantis luridus.
 fuscis.
 Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus magnuni totum cinereum, subtomentosum,
plantis solis fuscis. Thorax punctatus. Elytra substriata.
4. E. thorace ocellis duobus atris, corpore nigro albo oculatus.
 maculato. *Syst. Ent. 210. 2.*
Elater oculatus thorace ocellis binis atris, iridibus albis,
corpore nigricante. Linn. Syst. Nat. 2. 651. 3.
Elater niger thorace maculis binis ouatis villosis ater-
rimis. Degeer Ins. 4. 159. 1. tab. 17. fig. 28.
Scarabaeus elasticus maior, capite bimaculato. Petiv.
Gazoph. tab. 10. fig. 4.
Att. Angl. 246. 396. 13. et 271. 842. 32.
 Habitat in America meridionali.
5. E. thorace ocellis binis atris, corpore nigro immacu- *fuscus.*
 lato. *Syst. Ent. App. 824. **
 Habitat in America. *Dom. Drury.*
6. E. ater, thorace maculis duabus ocellaribus, elytris *coecus.*
 strigis duabus arcuatis punctoque postico ferrugi-
 neis. *Gen. Ins. Mant. 235. **
 Habitat in Africa. *Dom. Lee.*
7. E. thoracis lateribus macula flava glabra, *Syst. Ent. nodilu-*
210. 3. Linn. Syst. Nat. 2. 657. 4. Mus. Lud. Vlr. 82. cus.
Elater fuscus, thoracis lateribus macula flava glabra
conuexa nitida. Degeer Ins. 4. 160. 2. tab. 18. fig. 1.

Elater maior fuscus phosphoricus. Brown. *Iam.* 432.
tab. 44. fig. 10.

Scarabaeus medius fuscus, thorace angulato lucem
emittente. Sloan. *Iam.* 2. 206. tab. 237. fig. 1.

Cocuias. Mouff. *Inf.* 112.

Habitat in America meridionali.

phospho- 8. E. thorace postice maculis duabus flavis. *Syst. Ent.* 210.
reus. 4. Linn. *Syst. Nat.* 2. 652. 5.

Elater fuscocastaneus, thorace postice maculis duabus
flavis glabris, antennis pedibusque rufo fuscis. Degeer
Inf. 4. 161. 3. tab. 18. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

Praecedenti nimis affinis, quamvis duplo minor.

fuscipes. 9. E. ater, antennis pedibusque fuscis. *Syst. Ent.* 211. 5. *
Habitat in India orientali. D. Koenig.

ligneus. 10. E. ferrugineus, elytris mucronatis, antennis nigris.
Syst. Ent. 211. 6. Linn. *Syst. Nat.* 2. 652. 7. *Amoen. acad.* 6. 395. 24.

Elater testaceus, thorace antice truncato, elytris po-
stice acuminatis. Gron. *Zooph.* 477. ?

Habitat in America meridionali.

ferrugi- 11. E. thorace elytrisque ferrugineis, corpore thoracis-
nneus. que margine postico nigris. *Syst. Ent.* 211. 7. Linn.
Syst. Nat. 2. 654. 20. Fn. Sv. 729.

Elater thorace elytrisque rubris. Geoff. *Inf.* 1. 130. 1.
tab. 2. fig. 4.

Schaeff. *Icon.* tab. 19. fig. 1.

Habitat in Europa.

porcatus. 12. E. viridi aeneus, elytris sulcatis, sulcis villoso albis.
Syst. Ent. 211. 8.

Elater porcatus fuscus, elytris nigris porcatis, sulcis
eleuatis glabris. Linn. *Syst. Nat.* 2. 652. 6.

Sulz. *Hist. Inf.* tab. 6. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

Pectoris futura atra nitida.

sulcatus. 13. E. villoso albidus, elytris striis tribus eleuatis glabris
atris. Gen. *Inf. Mant.* 235. *

Habitat in America meridionali. Dom. Spengler.

14. E. thorace atro nitido, elytris striatis nigris. *Syst. Ent.* 211. 9. *aterrimus.*
Elater aterrimus ater, thorace opaco punctato, elytris striatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 653. 17. *Fn. Sv.* 726.
Elater totus niger nitidus. *Geoff. Inf.* 1. 136. 13.
 Habitat in Europa boreali.
15. E. thorace obscure cinereo, elytris cinereo nebulosis, *murinus:* plantis rufis. *Syst. Ent.* 211. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 22. *Fn. Sv.* 738.
Elater niger, elytris villoso murinis. *Geoff. Inf.* 1. 135. 10.
Elater rufipes nigro fuscus, maculis nebuloso villoso viridi griseis, plantis rufis. *Degeer Inf.* 4. 150. 10.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 6.
 Habitat in Europa.
16. E. elytris aeneis maculis pallidioribus confertis, vnguis rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 29. *Fn. tessellatus.* *Sv.* 739.
Elater niger villoso vndatus. *Geoff. Inf.* 1. 135. 9.
Elater rufo vnguiculatus fusco aeneus nitidus maculosis villoso viridi griseis, antennis nigris vnguis rubris. *Degeer Inf.* 4. 148. 7.
Elater thoracicus. *Scop. carn.* 282.
Elater niger pilis minimis flavo aeneis iunctim intermixtis. *Gad. Sat.* 80.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 7.
 Habitat in Europae hortis.
 Scutellum pallidum.
17. E. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigricantibus, fascia alba vndulata. *Syst. Ent.* 212. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 27. *Fn. Sv.* 737. *fasciatus.*
Scopol. carn. 281.
 Habitat in Europae hortis.
18. E. thorace elytrisque aeneis, antennis nigris simplicibus. *Syst. Ent.* 212. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 31. *aeneus.*
Fn. Sv. 740.

Elater

Elater aeneus rufipes viridi aeneus nitidus, pedibus fuluis. *Degeer Inf.* 4. 149. 8.

Að. Nidros. 3. tab. 4. fig. 6.

18. *Elater germanus*, thorace elytrisque atro coeruleis, corpore toto pedibusque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 30. *Fn. Sv.* 730.

Elater nitens, *Scop. carn.* 279.

Elater latus. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 6. fig. 8.

Habitat in Europae nemoribus.

pectinicornis. 19. E. thorace elytrisque aeneis, antennis maris pectinatis. *Syst. Ent.* 212. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 32. *Fn. Sv.* 741.

Elater fuscus aeneus. *Geoff. Inf.* 1. 133. 7.

Elater aeneo pectinicornis viridi aeneus obscurus nitidus, antennis pectinatis. *Degeer Inf.* 4. 145. 2. tab. 5. fig. 3.

Scarabaeus antennis articulatis septinus. *Raj. Inf.* 92. 7.

Scarabaeus e nigro virens, corniculis altero tantum versu pectinatis. *List. Angl.* 387. 19.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 36.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 13. fig. 11.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 4.

Elem. tab. 11. fig. 1.

tab. 60. fig. 3.

Habitat in Europae nemoribus.

cupreus. 20. E. cupreus, elytris dimidiato flavis. *Syst. Ent.* 212. 15.* *Schaeff. Icon.* 1. tab. 38. fig. 2.

Habitat in Anglia.

Antennae nigrae pectinatae rarius simplices.

cruciatus. 21. E. thorace nigro, lateribus ferrugineis, coleoptris flavis, cruce margineque nigris. *Syst. Ent.* 212. 16. *Linn. Syst. Nat.* 2. 653. 12. *Fn. Sv.* 722.

Elater thorace nigro circulo rubro, elytris fuluis cruce rubra. *Geoff. Inf.* 1. 133. 6.

Elater pedibus rufis, thorace nigro lateribus rubro, clytris fuluis, cruce maculisque binis nigris. *Degeer Inf.* 4. 149. 9.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 10.

Habitat in Europae graminosis,

22. E. thorace rufo, elytris fascia duplice alba, corpore *syriacus*. nigro. *Syst. Ent.* 212. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 653. 11. *Mus. Lud. Vlr.* 83.
Habitat in Oriente.
23. E. thorace testaceo pubescente, elytris flavis apice nigro. *castaneus*. gris, corpore nigro. *Syst. Ent.* 213. 18. *Linn. Syst. Nat.* 2. 654. 18. *Fn. Sv.* 727.
Elater flavi pectinicornis thorace fusco pilis rufis, elytris flavis apice rufis, corpore subtus nigro, antennis pectinatis. *Degeer Ins.* 4. 153. 15.
Elater thorace villoso, elytris testaceis apice nigris. *Geoff. Ins.* 1. 132. 4.
Scarabaeus antennis articulatis. *Raj. Ins.* 92. 6.
Scarabaeus ex fusco rufescens f. *castaneus*. *Lift.* *Loqu.* 387.
Schaeff. Icon. tab. II. fig. 9.
tab. 31. fig. 4.
Habitat in Europae campis.
24. E. niger, thorace glaberrimo rubro, elytris testaceis. *liuens*. *Syst. Ent.* 213. 19. *Linn. Syst. Nat.* 2. 654. 19. *Fn. Sv.* 728.
Schaeff. Icon. tab. II. fig. 8.
Habitat in Europa boreali.
25. E. thorace rufo medio fusco, elytris testaceis linearibus. *linearis*. *Syst. Ent.* 213. 20. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 13. *Fn. Sv.* 723.
Elater variabilis thorace rufo, capite corporeque nigri, elytris mari flavis, feminae fuscis flavi marginatis. *Degeer Ins.* 4. 154. 17.
Pontop. Atl. Dan. tab. 16.
Habitat in Europa boreali.
26. E. piceus, thorace elytrisque obscure nigris. *Syst. obscurus*. *Ent.* 213. 21.
Elater obscurus thorace fusco obscuro, elytris obscure testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 25. *Fn. Sv.* 735.
Habitat in Europae borealis plantis frequens.
Color tristis, fuscus, minime nitidus.

- flavipes.* 27. E. thorace obscure nigro, elytris striatis fuscis, pedibus testaceis. *Syst. Ent.* 213. 22. *
 Habitat in Americae insulis. *Dom. v. Rohr.*
- filiformis.* 28. E. cinereo fuscus immaculatus.
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Corpus filiforme, E. obfuso duplo minus, totum cinereo fuscum, immaculatum.
- tristis.* 29. E. thorace atro nitido, elytris basi margineque extiore liuidis. *Syst. Ent.* 213. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 26. *Fn. Sv.* 735.
Schaeff. Icon. tab. 194. fig. 1.
 Habitat in ligno putrescente.
- marginalis.* 30. E. thorace fusco, elytris testaceis margine vndique nigro. *Syst. Ent.* 213. 24. *Linn. Syst. Nat.* 2. 654. 23.
Fn. Sv. 733.
Att. Nidros. 3. 16. tab. 6. fig. 6.
 Habitat in Europa boreali.
- mesome-* 31. E. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore lytrisque nigris. *Syst. Ent.* 214. 25. *Linn. Syst. Nat.* 2. 653. 16. *Fn. Sv.* 725.
 Habitat in Europa boreali.
 Larua in ligno putrescente hexapoda, filiformis, duriuscula, caudae scuto corneo lateribus dentato, subtus tuberculo conico pediformi tubuloso. *D. Stroem.*
- thoraci-* 32. E. niger, thorace toto rufo. *Syst. Ent.* 214. 26.*
cus. *Elater niger*, thorace rufo. *Geoff. Ins.* 1. 132. 5.
 Habitat prope Henly Anglorum.
 Affinis sequenti.
- ruficollis.* 33. E. niger, thorace postice rubro nitido. *Syst. Ent.* 214. 27.
Elater ruficollis thorace rubro nitido antice nigro, elytris corporeque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 653. 14.
Fn. Sv. 724.
Elater thorace rubro nitido antice nigro, elytris corporeque nigris. *Degeer Ins.* 4. 153. 16.

Scarabaeus elytris nigris, scapulis rubris. Raj. Inf.
92. 8.

Elater gramineus. Scop. carn. 290.
Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 3.

Habitat in Europae graminosis.

34. E. thorace rufo medio nigro, elytris corporeque ferrugineis. *Elater brunneus.*
Syst. Ent. 214. 28.

Elater brunneus thorace nigro vtrinque rufo, elytris corporeque ferrugineis. Linn. Syst. Nat. 2. 653. 10.
Fn. Sv. 721.

Habitat in Europae hortis.

35. E. niger, thorace pubescente fuluo, elytris sanguineis. *haemato-*
*Gen. Inf. Mant. 235. ** *des.*

Elater antennis pectinatis secundus. Schaeff. Icon. tab.
2. fig. 6. at thorax niger.

Elater sanguineus. Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 9.

Habitat Hamburgi.

36. E. ater, elytris sanguineis. *Syst. Ent. 214. 29.* *sanguineus.*

Elater sanguineus thorace atro, elytris rubris, corpo-
re nigro. Linn. Syst. Nat. 2. 654. 21. Fn. Sv. 731.

Elater niger, elytris rubris. Geoff. Inf. 1. 151. 2.

Elater niger, elytris rubris. Degeer Inf. 5. 151. 13.
Scop. carn. 287.

Schaeff. Elem. tab. 60. fig. 2.

Icon. tab. 31. fig. 7.

Bergstr. Nomencl. tab. 10. fig. 10.

Habitat in Europae graminosis.

Elytrorum sumimus apex niger.

Variat rarius macula elytrorum magna communi atra.

37. E. thorace rufo, elytris antice dimidiato rufis, cor- *balteatus.*
pore nigro. *Syst. Ent. 215. 30. Linn. Syst. Nat. 2.*
654. 22. Fn. Sv. 732.

Elater niger, elytris antice dimidiato rufis postice ni-
gris. Degeer Inf. 4. 152. 14.

Scarabaeus minor, elytris bicoloribus e fuluo et ni-
gro saltatrix. Raj. Inf. 78. 23.

Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 2.

Habitat in Europae aruis.

melanoce- 38. E. sanguineus, capite thoracis linea dorsali elytrorum. *phalus.* que apicibus nigris.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo et statuta E. balteati. Caput et antennae nigra, immaculata. Thorax laevis, nitidus, sanguineus linea dorsali nigra, quae tamen basin haud attingit. Elytra punctato striata, sanguinea apice nigra. Corpus sanguineum abdominis apice nigro. Pedes sanguinei.

speculator. 39. E. thorace fuscō nitido, elytris cinereis, corpore nigro. *Syst. Ent.* 215. 31. *Linn. Syst. Nat.* 2. 654. 24. *Fn. Sv.* 734. *Scop. carn.* 583.

Elater fuscus flauipes capite thoraceque nigris, elytris rufō fuscis, pedibus flauis, antennis rufis. *Deger. Inf.* 4. 151. II.

Schaeff. Icon. tab. 19. fig. II.

Habitat in Europa boreali.

striatus. 40. E. niger, elytris fuscis lineatis. *Syst. Ent.* 215. 32. *
Habitat in Sueciae graminosis.

minutus. 41. E. thorace atro nitido, elytris nigris. *Syst. Ent.* 215. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 656. 34. *Fn. Sv.* 744.

Habitat in Europae plantis.

Parvus, niger, nitidus, immaculatus.

limbatus. 42. E. thorace atro nitido, elytris testaceis, limbo nigro. *Gen. Inf. Mant.* 235. *

Habitat Kiliae. *Dom. Lund.*

marginalis. 43. E. thorace nigro, margine ferrugineo, elytris testaceis.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Simillimus E. limbati, at paullo maior. Corpus nigrum. Thorax niger obscurus margine omni ferrugineo.

pulchellus. 44. E. capite thoraceque atris, elytris nigris, maculis flavicantibus, pedibus flauis. *Syst. Ent.* 215. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 656. 35. *Fn. Sv.* 745.

Habitat in Europa boreali.

45. *E. thorace rufo nigro bimaculato, elytris basi rufis, notatus.*
apice nigris, maculis duabus albis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura parua *E. pulchelli.* Caput atrum fronte cinereo
villoso. Thorax rufus antice maculis duabus magnis
atris annulo cinereo tomentoso cinetis. Elytra stria-
ta basi rufa ultra medium nigra maculis duabus trans-
uersis albis. Abdomen nigrum cinereo nitidulum.
Femora nigra, tibiae pallescentes.

46. *E. thorace ferrugineo, elytris atris, fasciis duabus fla- festivus.*
uis. *Syst. Ent. 215. 35. **

Habitat in Aegypto. *Dom. Prof. Forstahl.*

47. *E. niger nitidus, elytris puncto baseos rubro.* *Syst. 2pustula-*
Ent. 215. 36. Linn. Syst. Nat. 2. 652. 9. *tus.*

Elater niger elytrorum basi maculis rubris. *Geoff. Inf.*
I. 136. 15.

Habitat in Germaniae graminosis.

62. B V P R E S T I S.

1. *B. elytris vnidentatis aeneis, margine aureo.* *Syst. Ent. vnidenta-*
216. I. * *ta.*

Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*

2. *B. elytris acuminatis viridi aeneis, macula flava, pecto- bicolor.*
re abdomeque flavis. *Syst. Ent. App. 825. **

Habitat in America meridionali. *Dom. Drury.*

3. *B. elytris bidentatis rugosis, thorace laeui, corpore in- gigantea.*
aurato. *Syst. Ent. 216. 2. Linn. Syst. Nat. 2. 659.*

I. *Mus. Lud. Vlr. 85.*

Buprestis gigantea viridi aenea nitidissima, elytris ru-
gofo sulcatis, thorace maculis binis nigro aeneis.
Degeer Inf. 4. 134. I.

Cantharis maxima, elytris cuprei coloris sulcatis.

Sloan. Iam. 2. 210. tab. 236, fig. I. 2.

Cerambyx Indiae orientalis maximus. *Grew. Mus.*
165. tab. 13.

Mordella gigantea. *Scopol. Ann. Histor. nat. 5.*
104. 84.

Fabr. Spec. Inf.

§

Pet.

Pet. Guzoph. tab. 147. fig. 16. 17.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 38.

Merian. Sur. tab. 50. fig. inf.

Seb. Mus. 3. tab. 84. fig. 12.

Habitat in America, Asia.

vittata. 4. B. elytris bidentatis punctatis, lineis eleuatis quatuor, viridi aeneus, vitta lata aurea. *Syst. Ent.* 216. 3.*
Habitat in India. *Mus. Dom. Banks.*

fastuosa. 5. B. elytris truncatis bidentatis punctato striatis viridibus, dorso aureo. *Syst. Ent.* 216. 4.*
Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*

punctatis. 6. B. elytris bidentatis cupreis, punctis violaceis, numerosis. *Syst. Ent.* 216. 5. *
Habitat in Sierra Leon Africæ. *Dom. Drury.*

decora. 7. B. elytris truncatis bidentatis viridibus, vitta coeruleo-scente marginibusque aureis. *Syst. Ent.* 217. 6. *
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

lurida. 8. B. elytris bidentatis obscure, ano tridentato. *Syst. Ent.* 217. 7. *
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

obscura. 9. B. elytris bidentatis obscure aenea, punctis eleuatis obscurioribus.
Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Blackburn.*
Parua. Corpus totum supra obscure aeneum punctis eleuatis obscurioribus. Elytra apice bidentata. Subtus tota cuprea nitida.

striata. 10. B. elytris truncatis subbidentatis cupreis, lineis eleuatis quatuor. *Syst. Ent.* 217. 8. *
Habitat in Pensyluania. *Mus. Dom. Banks.*

utilans. 11. B. elytris tridentatis viridibus nigro maculatis, margine aureo. *Gen. Inf. Mant.* 236. *
Habitat in Austria. *Mus. D. Schulz.*

ignita. 12. B. elytris tridentatis, thorace impresso, corpore inaurato. *Syst. Ent.* 217. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 659. 3.
Mus. Lud. Vlr. 86.

Beetle Grew. Mus. 166. tab. 13.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 14.

Petiv. Gazoph. tab. 20. fig. 8.

Kaempf. tab. 1. p. 132. tab. 10. fig. 7.

Habitat in Indiis.

13. B. elytris truncatis subtridentatis nigro aeneis, vittis *lineata*, duabus aureis. Syst. Ent. 217. 10. *

Habitat in America meridionali. Mus. Dom. Banks.

14. B. viridi nitens, elytris tridentatis, maculis duabus *ocellata*. aureis ocellarique flava. Syst. Ent. 218. 11. *

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 15.

Habitat in Indiis.

15. B. elytris tridentatis, corpore aeneo immaculato. *aenea*.

Habitat in Coromandel. Mus. Dom. Banks.

Minor. Corpus totum aeneum obscure nitidum. Elytra striata apice tridentata.

16. B. elytris tridentatis cyaneis flavo maculatis. *maculata*.

Habitat in Siberia. D. Pallas. Mus. Dom. Banks.

Media. Caput cyaneum ore flavo. Frons flauus punctis duobus nigris maculisque duabus cyaneis margine flavo. Elytra tridentata, striata, cyanea maculis duabus magnis, lunatis, flavis, quarum posterior interdum in duas diuisa. Corpus subtus aeneum, ab domine vtrinque punctorum flauorum.

17. B. elytris serrato tridentatis viridibus, punctis cine- sternicornis impressis; sterno porrecto conico. Syst. Ent. 218. 12. * Linn. Syst. Nat. 2. 660. 5. Mus. Lud.

Vlr. 88.

Carabus orientalis crassus. Grew. Mus. 167. tab. 13.

Habitat in India.

Varietas elytrorum punctis consolidatis vix distincta.

18. B. elytris serrato tridentatis castaneis, sterno conico Chrys. porrecto. Syst. Ent. 218. 13. *

Buprestis sternicornis β. Linn. Syst. Nat. 2. 660. 5. Mus. Lud. Vlr. 88.

Buprestis viridi aurata, elytris fusco castaneis serrato tridentatis, thorace punctato, sterno porrecto. *Degeer Ins.* 4. 136. 2. tab. 17. fig. 25.

Habitat in India orientali, China.

Varietatem praecedentis credit a *Linné*, at tamen distincta videtur.

depressa. 19. B. elytris ferratis sulcatis, corpore depresso obscuro. *Syst. Ent.* 219. 14. *

Habitat in Aegypto. *Dom. Prof. Forskahl.*

mariana. 20. B. clytris ferratis longitudinaliter rugosis, maculis duabus impressis, thorace sulcato. *Syst. Ent.* 219. 21. *Linn. Syst. Nat.* 2. 660. 6. *Fn. Sv.* 754. *Mus. Lud. Vlr.* 89.

Buprestis nitida supra fusco aenea subtus rubro cuprea, elytris rugosis postice dehiscentibus. *Degeer Ins.* 4. 128. 1. tab. 4. fig. 18.

Cantharis marianus viridis perelegans, vaginis sulcatis, signaturis flavescentibus notatis. *Pet. Gazoph.* tab. 2. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 49. fig. 1.

Habitat in Europa, America boreali.

farinosa. 21. B. elytris ferratis viridibus, sulco abbreviato suturali impresso. *Syst. Ent.* 219. 15. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

modesta. 22. B. elytris ferratis corpore obscurioribus, maculis tribus impressis aureis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo praecedentis. Caput impressum, viride, nitidum oculis testaceis. Thorax punctatus, aeneus, nitidus maculis tribus impressis. Elytra ferrata, sub-sulcata, obscuriora basi nitidiora maculis tribus impressis aureis.

blanda. 23. B. elytris ferratis attenuatis sulcatis viridi aeneis, sulcis cupreis.

Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter.*

Corpus medium subtus viridi aeneum, nitidum. Thorax linea dorsali impressa viridi cupreoque rutilans.

Elytra

Elytra ferrata, apice attenuata, sulcata lineis eleuatis viridibus sulcisque depresso cupreis.

24. B. elytris serratis aenea nitida, thorace lineis duabus elegans. elytrorumque vnicia aureis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Caput viridi, nitidum, seabrum. Thorax punctatus et fere variolosus aeneus, nitens lineis duabus approximatis, dorsalibus, aureis. Elytra valde ferrata lineis quatuor eleuatis interstitiisque punctatis fere variolosis viridia, nitida linea longitudinali aurea. Subtus aenea, nitida.

25. B. elytris serratis porcatis, thorace angulato, corpore porcata. fusco nitido. *Syst. Ent.* 219. 17. *

Habitat in Oriente. *Prof. Forskahl.*

- 26 B. elytris serratis longitudinaliter sulcatis, maculis chrysoduabus aureis impressis, thorace punctato. *Syst. Ent. stigma.* 219. 18. *Linn. Syst. Nat.* 2. 660. 7. *Fn. Sv.* 755.

Buprestis fusca, elytris singulis maculis tribus rubro aureis impressis, abdomine subtus viridi aureo, margine purpureo nitido. *Deger Inf.* 4. 129. 3.

Cucuius aureus fossulis elytrorum quatuor impressis nientibus. *Geoff. Inf.* 1. 125. 1.

Schaeff. Elem. tab. 31. fig. 1. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 39.

Habitat in Europa.

27. B. elytris serratis aeneis, punctis tribus impressis. *impressa.* *Syst. Ent.* 220. 19. *

Habitat in Indiis. *Mus. Dom. Bernoulli, Basileensis.*

28. B. elytris serratis obscuris albomaculatis. *Syst. Ent. ornata.* 220. 20. *

Habitat in Pensyluania. *Mus. Dom. Banks.*

29. B. elytris serratis striatis, corpore cylindrico nigro. *cylindrica.* *Syst. Ent.* 220. 21. *

Habitat in Oriente. *Dom. Prof. Forskahl.*

30. B. elytris integris, fronte sulcato, corpore scabro aureo. *scabra.* *Syst. Ent.* 220. 22. *

Habitat in Indiis. *Dom. Mallet.*

- Trochilus.* 31. B. elytris integris aurea nitidissima, dorso elytris pedibusque viridibus. *Gen. Inf. Mant.* 236. *
- Habitat in Austria. *D. Schulz.*
- 8guttata.* 32. B. elytris integris, maculis quatuor albis, corpore coeruleo. *Syst. Ent.* 220. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 659. 2. *Fn. Sv.* 753.
Buprestis albo punctata coeruleo violacea nitida, thoracis lateribus albis, elytris striatis, maculis quinque albis. *Degeer Inf.* 4. 132. 5. tab. 4. fig. 20.
Cucuius viridi aeneus, punctis quatuor impressis. *Geoff. Inf.* 1. 126. 2.
Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 1.
Habitat in Europae nemoribus.
- fascicula-* 33. B. elytris integerrimis striatis, punctis fasciculato villosis, corpore inaurato hirsuto. *Syst. Ent.* 220. 24.
Linn. Syst. Nat. 2. 661. 12. *Mus. Lud. Vlr.* 90.
Scarabaeus amboinensis. *Seb. Mus.* 2. p. 22. tab. 20. fig. 5.
Scarabaeus viridis aureus, papillis pilis albis obtusis vnde hirtus. *Petiv. Gazoph.* 4. tab. 13. fig. 5.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 4.
Degeer Inf. 7. tab. 47. fig. 6.
Habitat ad Cap. bon. sp.
Variat rarius corpore nigro. *Mus. Dom. Banks.*
- variola-* 34. B. elytris integris obscuris, punctis impressis numerosis; thorace carinato.
Buprestis variolaris. *Pall. Iter.* 1. 464. 37.
Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo et statura B. fascicularis, cui affinis videtur.
Caput et thorax obscura, scabra, nigra minime nitida lineaque dorsali thoracis eleuata. Elytra scabra, nigra punctis plurimis impressis cinereo villosis. Subtus hirta cupreо paullo nitens.
- hirta.* 35. B. elytris integerrimis, pedibus ferrugineis, corpore hirsuto. *Syst. Ent.* 221. 25. *Linn. Syst. Nat.* 2. 661. 13. *Mus. Lud. Vlr.* 91.
Habitat in Africa.
Varietas huius a colore plures.

36. B. elytris integris sulcatis aeneis, capite thoraceque *austriaca*.
viridibus. *Syst. Ent.* 221. 26.

Buprestis austriaca elytris striatis bidentatis, capite
thoraceque viridi, abdome violaceo. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 661. 9.

Mordella gigantea. *Scop. carn.* 187.

Habitat Idriae.

Elytra in nostro specimine truncata nec bidentata.

37. B. elytris integerrimis atris, vittis duabus cinereo to- *sibirica*.
mentosis impressis.

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Corpus medium, at latiusculum atrum, subtus ciuereo
villosum. Caput et thorax scabra, immaculata. Ely-
tra glabra, atra vittis duabus impressis tomento ci-
nereo repletis, interiore obliqua a margine exterio-
ri baseos ad suturam apicis ducta, exteriori marginali.

38. B. elytris integris viridibus, margine omni aureo, li- *splendens*.
neisque tribus eleuatis. *Syst. Ent.* 221. 27. *

Habitat in China.

39. B. elytris integris obscure fuscis, subtus aenea, abdo- *fusca*.
mine punctis lateralibus fuluis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo et statura praecedentium. Caput rugosum,
fuscum oculis flauescentibus. Thorax obscure fu-
scus lateribus scabris impressis. Elytra subtilissima
punctato striata fusca, obscurea. Corpus subtus ae-
neum utrinque linea macularum fuluarum,

40. B. elytris emarginatis striatis obscure aeneis. *Syst. rustica*.
Ent. 221. 28.

Buprestis rustica elytris striatis fastigiatis, thorace pun-
ctato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 660. 8. *Fu. Sv.* 756.

Buprestis violacea viridi aenea, elytris striatis. *Degeer*
Ins. 4. 130. 4. tab. 4. fig. 10.

Cucuius viridi auratus oblongus, thorace punctato,
elytris striatis. *Geoff. Ins.* 1. 126. 3.

Mordella rustica. *Scop. carn.* 188.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 1.

Habitat in Europae nemoribus.

- plebeia*. 41. B. elytris emarginatis cupreis fusco maculatis. *Gen. Inf. Mant.* 236. *
Habitat in India. *D. Schulz.*
- lugubris*. 42. B. elytris integris obscuris nigro scabris, corpore sub-tus cupreo. *Gen. Inf. Mant.* 237. *
Habitat in Austria. *D. Schulz.*
- Tenebrio-* 43. B. atra, elytris integris truncatis, thorace variolofo-nis. *Syst. Ent.* 221. 29.
Buprestis Tenebrionis atra, elytris integris lineato-punctatis, thorace variolofo dilatato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 661. 11.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 16.
Habitat in Europa, Africa.
- Rubi*. 44. B. cylindrica nigra, elytris fasciis cinereis vndulatis.
. *Syst. Ent.* 221. 30. *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 14.
Habitat in Europae australioris rubo, cichorio.
- bimacula*. 45. B. elytris integerrimis striatis, macula rubra, corpore fusco viridi. *Syst. Ent.* 222. 31. *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 16. *Mus. Lud. Vlr.* 92.
. *Sulz. Hist. Inf. 57. tab. 6. fig. 15.*
Habitat in India.
- macula*. 46. B. elytris integris, viridis, thorace postice elytrisque-ta. maculis duabus aureis. *Gen. Inf. Mant.* 137. *
Habitat in India. *D. Fothergill.*
- tristis*. 47. B. elytris integerrimis marginatis, corpore cupreo, abdomen punctis decem nigris. *Syst. Ent.* 222. 32.
Linn. Syst. Nat. 2. 662. 18. *Mus. Lud. Vlr.* 93.
Habitat in Indiis.
- fusca*. 48. B. elytris integerrimis, thoracis lateribus scabris, scutello tuberculari, corpore cupreo. *Syst. Ent.* 222. 33.
Linn. Syst. Nat. 2. 662. 20. *Mus. Lud. Vlr.* 94.
Habitat in America.
- nobilis*. 49. B. elytris integerrimis, strigis duabus vndatis inau-ratis, corpore fusco. *Syst. Ent.* 222. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 21.
Habitat in Indiis.

50. B. elytris integerrimis punctatis, thorace punctis quatuor impressis, corpore obscuro. *Syst. Ent.* 222. 35. *Buprestis* ^{4 punctata} *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 22. *Fn. Sv.* 759.
- Buprestis* subuiridi nigra, thorace punctis quatuor impressis. *Degeer Inf.* 4. 134. 8.
- Habitat in Europae floribus, frequens in caltha palustri.
51. B. coleoptris integerrimis aureis, punctis duobus eruceque postica nigris. *Syst. Ent.* 222. 36. * *Buprestis cruciata*.
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
52. B. elytris integris obscuris, thorace aureo, striis duabus nigris. *Buprestis striata*. *Syst. Ent.* 222. 37. *
Buprestis manca aurata, thoracis lineis duabus elytrisque fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1067. 10.
Cucuius aeneus, elytris fuscis, thorace rubro, fasciis fuscis. *Geoff. Inf.* 1. 127. 4.
Habitat in Gallia, Germania.
53. B. elytris integerrimis transuerse rugosis, thorace subtrilobo laeui, corpore ouato nigro. *Syst. Ent.* 223. 38. *Linn. Syst. Nat.* 2. 663. 24. *Fn. Sv.* 760. *Buprestis minuta*.
Cucuius fusco cupreus triangularis, fasciis vndulatis, villoso albidis. *Geoff. Inf.* 1. 128. 6.
Habitat in Europa, saepius capta in coryli foliis.
54. B. elytris integerrimis linearibus punctatis, corpore viridi elongato. *Syst. Ent.* 223. 39. *Linn. Syst. Nat.* 2. 663. 25. *Fn. Sv.* 762. *Buprestis viridis* nitida, corpore elongato, elytris linearibus scabris integerrimis. *Degeer Inf.* 4. 133. 6. tab. 5. fig. 1.
Cucuius viridi cupreus oblongus. *Geoff. Inf.* 1. 127. 5.
Mordella ferraticornis. *Scop. carn.* 190.
Schaeff. Icon. tab. 76: fig. 9.
Habitat in Europae betula alba.
55. B. elytris integerrimis linearibus viridibus, punto albo, abdome cyaneo, punctis tribus albis. *Gen. Mant.* 237. * *Buprestis biguttata*.
Habitat in Angliae plantis. *Dom. Yeats.*

- atra.* 56. *B. elytris integerrimis linearibus, corpore elongato atro.* *Syst. Ent.* 223. 40. *Linn. Syst. Nat.* 2. 663. 26.
Habitat in Germania.
- festiva.* 57. *B. elytris integerrimis, maculis sex coeruleis, corpore viridissimo elongato.* *Syst. Ent.* 223. 41. *Linn. Syst. Nat.* 2. 663. 27.
Habitat in Africa.
- nitidula.* 58. *B. elytris integerrimis, thorace marginato vtrinque depresso, corpore viridi nitido.* *Gen. Ins. Mant.* 237. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 15. *Fn. Sv.* 757.
Schaeff. Icon. tab. 50. fig. 7.
Habitat in Europa boreali.
- laeta.* 59. *B. elytris integris viridibus, capite thoraceque aureis.*
Syst. Ent. 223. 42. *
Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.*
Varietatem *B. nitidulae* credit a *Linné*, an rite?
- salicis.* 60. *B. elytris integerrimis viridis nitens, coleoptris aureis basi viridibus.* *Gen. Ins. Mant.* 237. *
Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 12.
Habitat in Germaniae salice. *D. Schulz.*
- cyanea.* 61. *B. elytris integerrimis rugosis, corpore cyaneo.* *Syst. Ent.* 223. 43. *
Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.*
- 9macula-*
ta. 62. *B. elytris integerrimis nigris, maculis tribus flauis.*
Syst. Ent. 223. 44. *
Buprestis 9maculata elytris integerrimis, maculis tribus longitudinalibus, fronte thoracisque lateribus luteis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 17.
Sulz. Hist. Ins. tab. 16. fig. 17.?
Habitat - - - - *Dom. Mauduit.*

63. C I C I N D E L A.

- grossa.* 1. *C. nigra, elytris acuminatis, maculis tribus albis.*
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Maxima. Corpus maximum, fuscum pilis cinereis hirtum labio flavo. Mandibulae fluae apice nigrae.
Tho-

Thorax rotundatus, punctatus, fuscus, immaculatus striga antica impressa. Elytra punctata, subhirata maculis tribus flaviis anteriore baseos, postica oblonga apicis. Corpus subtus cinereo hirtum.

2. C. viridis nitida, elytris obscure cyaneis immaculatis, bicolor. abdominalis margine testaceo.

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo et statura C. campestris. Antennae fuscae basi virescentes. Caput viride, nitidum mandibulis albis apice nigris. Palpi testacei apice nigri. Thorax viridis, nitidus, immaculatus. Elytra obscure cyanea, immaculata. Corpus subtus cyaneum, nitidum, margine abdominalis testaceo.

3. C. viridis, punctis quinque albis. *Syst. Ent.* 224. 1. *campestris.* Linn. *Syst. Nat.* 2. 657. 1. *Fn. Sv.* 746. *Scop. carn.* *stris.* 181.

Cicindela viridis nitida, elytris singulis punctis sex albis. *Degeer Inf.* 4. 113. 1. tab. 4. fig. 1.

Buprestis inauratus supra viridis, coleoptris punctis duodecim albis. *Geoff. Inf.* 1. 153. 27.

Cantharis quarta. *Mouff. Inf.* 145. fig. inf.

Scarabaeus viridis, cui decem maculae albae supra alarum thecas. *Lift. Sc. Angl.* 386. 17.

Cantharis Mouffeti minor quarta. *Ionst. Inf.* tab. 15.

Bergstraess. *Nomencl.* 1. 15. 8. 9. 10. 11. tab. 2. fig. 8 — 11.

Schaeff. Icon. tab. 34. fig. 8. 9.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 37.

Habitat in Europae campis arenosis.

Larua mollis alba, capite pedibusque sex ferrugineis foueam magnitudine corporis in terra excavat, in qua latens insecta arripit. *Geoff.*

Imago laruas etiam hirsutas venatur. *Raj.*

4. C. subpurpurascens, elytris fascia lunulisque duabus albis. *Syst. Ent.* 224. 2. Linn. *Syst. Nat.* 2. 657. 2. *Fn. Sv.* 747. *Scop. carn.* 183.

Cicindela maculata supra viridi grisea nitida subtus viridi aurea, elytris singulis fascia lunulisque duabus albis. *Degeer Inf.* 4. 115. 3. tab. 4. fig. 8.

Berg-

Bergstr. Nomencl. 1. 26. tab. 4. fig. 5.

Schaeff. Elem. tab. 43.

Icon. tab. 35. fig. 10.

Habitat in Europae fabulosis.

fyluatica. 5. C. nigra, elytris fascia vndata punctisque duobus albis. *Syst. Ent.* 224. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 658. 8. *Fn. Sv.* 748.

Cicindela supra nigra, subtus viridis nitida, elytris singulis fascia punctisque tribus albis. *Degeer Ins.* 4. 114. tab. 4. fig. 7.

Buprestis inauratus, supra fusco viridis, coleoptris fasciis sex vndulatis albis. *Geoff. Ins.* 1. 155. 28.

Petiv. Gazoph. tab. 50. fig. 5.

Habitat in Europae pinetis.

trifinis. 6. C. nigra, elytris macula media flava. *Syst. Ent. App.* 825. *

Habitat - - - Dom. Drury.

inter- 7. C. elytris fuscis, puncto baseos fasciis tribus inter-
rupta. ruptis lineolaque apicis flavis. *Syst. Ent.* 225. 4.

Habitat in Sierra Leon. *Mus. Dom. Banks.*

lunulata. 8. C. nigra, elytris lunulis duabus maculisque duabus albis, anteriore transuersa.

Habitat ad Cap. bon. sp. *D. Forster. Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo et statura C. hybridae. Caput nigrum labio flavo. Mandibulae valde exsertae, dentatae, nigrae basi flavescentes. Thorax rotundatus, niger, immaculatus. Elytra nigra lineola baseos ad marginem exteriorem, macula transuersa in medio, tunc puncta duo parua et tandem lunula apicis albis. Subtus cyaneo nitida.

turida. 9. C. obscura, elytris punctis duobus lunulisque tribus albis, intermedia flexuosa.

Habitat ad Cap. bon. sp. *D. Forster. Mus. Dom. Banks.*

Caput et thorax obscure cuprea, immaculata. Labium flavum striga antica punctorum nigrorum impressa. Elytra

Elytra nigra puncto medio baseos et altero ante medium versus futuram. Praeterea lunulae tres, baseos ad marginem exteriorem, secunda in medio fere duplicata et tertia apicis.

10. *C. subaenca*, elytris albis, linea fusca triramosa. *Syst. capensis.*
Ent. 225. 5. *Linn. Syst. Nat. 2. 657. 3.* *Mus. Lud.*
Vir. 84.
Degeer Inf. 7. tab. 47. fig. 3.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 11.
Habitat ad Cap. bon. sp.
11. *C. cuprea*, elytris viridibus, puncto lunulaque apicem albis. *Syst. Ent. 225. 6.* *Linn. Syst. Nat. 2. 657. ca.*
4. Scop. carn. 182.
Buprestis inauratus supra fusco viridis, coleoptris punctis sex albis. *Geoff. Inf. 1. 155. 29.*
Cicindela obscurior viridis, elytris punctis quatuor lineolaque alba. *Schreb. Inf. 10. 5.*
Habitat in Germaniae arenosis.
12. *C. thorace fusco bituberculato, elytris fusco viridiisque tuberculis variis, margine tridentato albo.* *Syst. Ent. 225. 7. * lata.*
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
13. *C. subpurpurascens*, labio elytrisque puncto albo. *unipunctata.*
*Syst. Ent. 225. 8. **
Habitat in America. *Dom. Drury.*
14. *C. viridi aenea*, elytrorum disco obscuriore, punctis sexpunctatis albis. *Syst. Ent. 226. 9. **
ctata.
Habitat ad littora Malabarica. *Dom. Drury.*
15. *C. viridi aenea*, elytris obscuris, margine lineaque media albis. *quadrilineata.*
Habitat in Indiis. *D. Schulz.*
Magnitudo praecedentium. Maxillae porrectae, basi albae, apice nigrae. Caput viridi aeneum oculorum orbita aurea. Thorax rotundatus aeneo nitens, subtus aureus hirsutie alba. Elytra obscura margine albo, qui versus apicem denticulum exserit. In medio elytrorum linea lata alba, quae tamen apicem haud attin-

attingit. Abdomen subtus aureum nitidissimum lateribus hirtis.

biramosa. 16. C. obscure aenea, elytrorum margine biramoso albo. Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Magnitudo praecedentis. Corpus totum supra obscure aeneum, subtus aureum, nitidum. Elytrorum margo exterior albus ramos siue dentes duos emittens altero in medio, altero versus apicem.

sexgutta-ta. 17. C. viridis nitida, clytris punctis tribus marginalibus albis. *Syst. Ent.* 226. 10. *

Habitat in Virginia.

Labium superius flauum.

Catena. 18. C. viridi aenea, elytris albidis, punctis sex viridibus concatenatis. *Syst. Ent.* 226. 11. *

Habitat in India orientali.

marginalis-ta. 19. C. viridis, elytris margine fascia vndata punctisque duobus albis. *Syst. Ent.* 226. 12. *

Habitat in Virginia.

trifascia-ta. 20. C. obscura, elytris strigis tribus albis, secunda flexuosa.

Habitat in America.

Parua, supra obscura, subtus aenea nitida. Labium albuu. Elytra strigis tribus, prima abbreviata, luna, secunda flexuosa, tertia apicis.

carolina. 21. C. viridis nitida, elytrorum apicibus ore antennis pedibusque flauis. *Syst. Ent.* 226. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 657. 6. *Amoen. acad.* 6. 395. 23.

Cicindela carolina. *Degeer Ins.* 4. 120. 2. tab. 17. fig. 24.

Habitat in Carolina.

virginica. 22. C. nitida, ore antennis pedibusque testaceis, *Syst. Ent. App.* 825. *Linn. Syst. Nat.* 2. 657. 5.

Habitat in Virginia.

23. *C. flava*, elytris fasciis duabus nigris latis. *Syst. Ent.* *aequino-*
 226. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 658. 7. *Amoen. acad.* *titialis*.
 6. 395. 6.

Habitat Surinami.

24. *C. nigra*, elytris punctis sex albis, tertio et quarto *maura*.
 parallelo. *Syst. Ent.* 226. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2.
 658. 9.

Habitat in Oriente.

64. E L A P H R V S.

1. *E. viridi aeneus*, elytris punctis latis excavatis. *Syst. riparius.*
Ent. 227. 1.

Cicindela riparia. *Linn. Syst. Nat.* 2. 658. 10. *Fn. Sv.*
 749.

Cicindela viridi aenea maculis rotundis excavatis griseo
 viridibus. *Degeer Inf.* 4. 117. 4. tab. 4. fig. 9.

Buprestis viridi aeneus, elytris punctis latis excavatis
 mammillosis. *Geoff. Inf.* 1. 156. 30.

Scarabaeus parvus inauratus. *Lift. Loqu.* 385.
Schaeff. Icon. tab. 86. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 13.

Habitat in Europae humentibus.

Colore saepius variat.

2. *E. obscure aeneus*, elytris subnebulosis, pedibus lu- *flauipes*.
 teis. *Syst. Ent.* 227. 2.

Cicindela flauipes. *Linn. Syst. Nat.* 2. 658. 11. *Fn. Sv.*
 750.

Cicindela flauipes capite thoraceque viridi aeneis, ely-
 tris pallide fuscis nigro maculatis, antennis pedibus-
 que flavescentibus. *Degeer Inf.* 4. 119. 6.

Habitat in Europa boreali ad littora riparum.

Elytra punctata.

3. *E. niger*, coleoptris punctis duobus fasciaque ferrugi- *rupestris*.
 neis. *Syst. Ent.* 227. 3.

Cicindela rupestris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 658. 12.

Habitat in Sueciae rupibus.

- aquati-* 4. E. aeneus nitidus capite striato. *Syst. Ent.* 227. 4.
cus. *Cicindela aquatica.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 658. 14. *Fn.*
Sv. 752.
Buprestis fuscus aeneus, capite profunde striato, elytro-
rum stria prima remotissima. *Geoff. Inf.* 1. 157. 31.
Cicindela pusilla. *Schreb. Inf.* 6.
List. mut. tab. 31. *fig.* 13.
Habitat ad Europae aquas frequens.
- semipun-* 5. E. aeneus nitidus, elytris punctatis, dorso glaberrimo.
titatus. *Syst. Ent.* 227. 5. *
Cicindela striata aenea nitidissima, capite striato, ely-
tris dimidio striatis punctatis, intus laeuis. *De-
geer Inf.* 4. 118. 5.
Habitat Halac Saxonum.
- zgutta-* 6. E. aeneus, elytris nitidis apice flavescentibus. *Iter
tus.* *Norvag. d.* 11. *Iul.* *
Habitat ad Norvagiae aquas, capt. d. 11. *Iul.*

65. H Y D R O P H I L V S.

- piceus.* 1. H. niger, sterno canaliculato postice spinoso. *Syst.
Ent.* 228. 1.
Hydrophilus niger, elytris sulcatis, antennis fuscis.
Geoff. Inf. 1. 182. 1. *tab.* 3. *fig.* 1.
Hydrophilus ruficornis niger capitulo antennarum ru-
fo, elytris laeuis ab domine postice acuminato.
Degeer Inf. 4. 371. 1. *tab.* 14. *fig.* 1. 2.
Dytiscus piceus antennis perfoliatis, corpore laeui, ster-
no carinato postice spinoso. *Linn. Syst. Nat.* 2. 664.
1. *Fn. Sv.* 764.
Dytiscus hastatus. *Acta Soc. Berol. phys.* 4. *tab.* 7. *fig.* 2.
Lyonet. Less. *tab.* 1. *fig.* 15. 16. 17.
Frisch. Inf. 2. *tab.* 6.
Sulz. Hist. Inf. *tab.* 6. *fig.* 8.
Bergstr. Nomencl. 1. *tab.* 6. *fig.* 3.
tab. 8. *fig.* 1.
tab. 9. *fig.* 1.
Schaeff. Elem. *tab.* 71.
Icon. *tab.* 33. *fig.* 1. 2.
Habitat in Europae aquis, piscibus infestus.

2. H.

CLASS. I. ELEVTERATA. *Hydrophilus*. 289

2. *H. oliuaceus*, sterno canaliculato postice spinoso, co- *oliuaceus*.
leoptris emarginatis.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus H. piceo paullo minus totum oliuaceum siue obscure virescens, laeue, glabrum antennis femoribusque piceis. Sternum postice porrectum fere longitudine abdominis. Coleoptera emarginata.
3. *H. niger nitidus*, elytris substriatis. *Syst. Ent.* 228. 2. *caraboides*.
Hydrophilus niger, elytrorum punctis per strias digestis, antennis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 183. 2.
Hydrophilus nigricornis niger capitulo antennarum nigro, elytris laeuis, abdome postice rotundato. *Degeer Inf.* 4. 516. 2.
Dytiscus caraboides antennis perfoliatis, corpore glabro, striis aliquot recurvis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 664. 2. *Fn. Sv.* 765.
Hydrocantharis niger subrotundus. *Raj. Inf.* 95. 7.
Roef. Inf. 2. *Aquat.* 1. tab. 4. fig. 1. 2.
Frisch. Inf. 13. p. 24. tab. 21.
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 5. fig. 8. 9.
tab. 7. fig. 8. 9. *Laru. Pupp.*
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 41.
Schaeff. Icon. tab. 53. fig. 10.
Habitat in Europae aquis dulcibus.
4. *H. niger nitidus*, thoracis elytrorumque marginibus lateralis flavis. *Syst. Ent.* 228. 3. *
Habitat in Americae insulis. *Mus. Tottianum.*
5. *H. niger*, elytris striatis, pedibus piceis. *Syst. Ent.* *scarabaeoides*.
228. 4.
Scarabaeus aquaticus muticus piceus, elytris striatis, antennis flavescentibus filiformibus. *Linn. Syst. Nat.* x. n. 56.
Scarabaeus piceus. *Geoff. Inf.* 1. 85.
Dytiscus scarabaeoides ovalis conexus ater laevisimus, antennis filiformibus triarticulatis *Linn.*
Syst. Nat. 2. 664. 3.
Habitat in Europae aquis.
Antennae omnino perfoliatae, at palpi prominentes filiformes triarticulati.
Fabr. Spec. Inf. T 4. H,

- orbicula-* 6. *H. subrotundus*, corpore glabro atro. *Syst. Ent.* 229. 5.*
ris. Habitat in Germaniae aquosis.
- collaris.* 7. *H. niger*, ore thoracis lateribus lineisque elytrorum ferrugineis. *Syst. Ent.* 229. 6.*
Habitat in America. *Mus. Tottianum*.
- luridus.* 8. *H. elytris striatis*, corpore cinereo fusco. *Syst. Ent.* 229. 7.
Hydrophilus fuscus, corpore conuexo supra fusco, sub-
tus nigro, capitulo antennarum oblongo, elytris
striatis. *Degeer Inf.* 4. 378. 4. tab. 15. fig. 1. 2.
Dytiscus luridus antennis perfoliatis luridus, elytris
punctis tribus fusciscentibus, thorace lateribus fla-
uicante. *Linn. Syst. Nat.* 2. 665. 5. *Fn. Sv.* 767.
- minutus.* 9. *H. ouatus niger*, elytris pedibusque griseis. *Syst. Ent.* 229. 8.
Dytiscus dermestoides hemisphaericus ouatus luridus,
capite thoraceque nigris. *Forst. nou. sp. Cent.* 1. 53.
Scarabaeus totus rufo niger maculis nigroribus,
Geoff. Inf. 1. 85. 27.?
Habitat in Europae aquis.
Vesperi sonorus. *Goeze*.
- bipuncta-* 10. *H. thorace atro*, margine griseo, elytris fuscis, pun-
tus. eto postico albo. *Syst. Ent.* 229. 9.*
Habitat in Vpsaliae aquis.

66. D Y T I S C V S.

- latifissimus.* 1. *D. niger*, elytrorum marginibus dilatatis, linea flava.
Syst. Ent. 230. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 665. 6. *Fn. Sv.* 768.
Dytiscus nigro fuscus, thorace margine flavo, clytro-
rum marginibus dilatatis, linea transuersa flava. *De-
geer Inf.* 4. 390. 1.
- Scarabaeus aquaticus magnus niger*, margine luteo.
Frisch. Inf. 2. tab. 7. fig. 1. 2.
Salz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 19.

Bergstr.

Bergstr. Nomencl. I. tab. 5. fig. I. 2.
tab. 9. fig. 3.

Habitat in Europae borealis aquis.

Mas glaber, femina sulcata.

I. propriam speciem saeuit.

2. *D. niger, capitis fascia, thoracis margine, elytrorumque stria costali ferrugineis.* *Syst. Ent.* 230. 2. *

Habitat Surinami. *Dom. Teats.*

Color ferrugineus feminae multo obscurior. Elytra semifistriata.

3. *D. niger, thoracis marginibus omnibus, elytrorumque exteriori flavis.* *Syst. Ent.* 230. 3. *Linn. Syst. Nat.* lis.
2. 665. 7. *Fn. Sv.* 769. *Geoff. Inf.* 1. 186. 2.

Dytiscus nigro fuscus nitidus, thorace vnde elytrorumque margine flavo. *Degeer Inf.* 4. 391; 2. tab. 16. fig. 2.

Hydrocantharis nostras. *Raj. Inf.* 93. 1.

Hydrocantharis. *Mouff. Inf.* 164.

Roeß. Inf. 2. *Aquat.* I. tab. 1. fig. 9. II.

List. mut. tab. 5. fig. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 42.

Bergstr. Nomencl. I. I. I. tab. I. fig. I.

tab. 6. fig. I. 2.

tab. 7. fig. 4. 5. *Larv. Pup.*

Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 8.

8. *Dytiscus semifistriatus fuscus, elytris sulcis dimidiatis decem.* *Syst. Ent.* 231. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 665.
8. *Fn. Sv.* 772. *Geoff. Inf.* 1. 187. 3.

Hydrocantharis elytris striatis siue canaliculatis. *Raj.*
Inf. 94. 2.

Frisch. Inf. 2. tab. 7. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 7.

Roeß. Inf. 2. *Aquat.* I. tab. I. fig. 10.

Bradl. nat. tab. 26. fig. 2.

Degeer Inf. 4. 391. 2. tab. 16. fig. I.

Bergstr. Nomencl. I. 2. 2. tab. I. fig. 2.

Habitat in Europae aquis.

Agilis in dorsu incubans saltu se restituit. Si diu in siccо detineantur, aegre se immergunt.

Maribus & anteriorum pedum plantae hemisphaericæ,
patelliformes ad arctiorem copulam.
Feminae ♂ oua oblonga, magna alba.
Conf. *Bergstraess.* *Nomencl.* 1. tab. 7. fig. 1. vix di-
stinctus.

punctula- 4. *D. niger*, clypeo thoracis elytrorumque margine ex-
teriori albis, elytris striis tribus punctatis. *Gen. Inf.*
Mant. 238. *

Dytiscus margine coleoptrorum thoracisque flavo.
Geoff. Inf. 1. 185. 1.

Dytiscus glaber ex virescenti fuscus, elytris compressis
glabris, marginibus exterioribus quaquauersum fla-
uis, ventre pedibusque ferrugineis. *Bergstr. No-*
menc. 1. 31. 45. tab. 6. fig. 4. 5. tab. 8. fig. 4. et tab.
9. fig. 2.

Dytiscus laterali marginatus. *Degeer Inf.* 4. 396. 3.
Roef. Inf. 2. *Aquat.* 1. tab. 2.
Frisch. Inf. 13. tab. 1. fig. 7.
Schaeff. Elem. tab. 7.

Habitat in Germaniae riuiulis syluaticis.

Femina fulcis decem dimidiatis elytrorum, uti in *D.*
marginali.

Conf. *Bergstraess.* *Nomencl.* 1. tab. 8. fig. 6. 7. vix di-
stincta species.

limbatus. 5. *D. niger*, thoracis elytrorumque margine exteriori fla-
vo, elytris laevissimis. *Syst. Ent.* 230. 4. *

Habitat in China. *Mus. Dom. Banks.*

Abdomen atrum vtrinque punctis tribus ferrugineis.

fulcatus. 6. *D. coleoptris* fulcis decem longitudinalibus villosis.
Syst. Ent. 231. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 666. 13. *Fn. Sv.*
773. *Geoff. Inf.* 1. 189. 5.

Dytiscus fasciatus elytris fuscis, thorace fulvo, fasciis
duabus nigris latere connatis, abdomine subtus fla-
vo, lineis nigris. *Degeer Inf.* 4. 397. 4.

Hydrocantharis minor, corpore rotundo plano. *Raj.*
Inf. 94. 3 et 10.

Frisch. Inf. 13. p. 13. tab. 7.

Roef. Inf. 2. *Aquat.* 1. tab. 3. fig. 7.

Bradl. nat. tab. 26. fig. 2. A.

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 3.

*Bergstr. Nomencl. I. tab. 5. fig. 3. 4. 5.
tab. 7. fig. 6. 7.*

Habitat in Europae, Americae aquis.

Mas elytris glabris omnino distinctus a D. cinereo.

7. D. elytris flavis, fasciis duabus punctoque apicis nigris. *fasciatus.*

*Syst. Ent. App. 825. **

Habitat in Indiae aquis.

8. D. fuscus, elytris transuersim subtilissime striatis. *Syst. striatus.*

Ent. 231. 7. Linn. Syst. Nat. 2. 665. 9. Fn. Sv. 770.

*Dytiscus transuersè striatus supra nigro fuscus, subtus
niger, elytris transuersè subtilissime striatis.* *Degeer*
Inf. 4. 399. 5. tab. 15. fig. 16.

Habitat in Europae aquis,

9. D. niger, ore verticis punctis duobus thoracisque mar-

ginibus rufis, elytris fuscis. *Syst. Ent. 231. 8. **

Habitat in Maderae aquis. *Mus. Dom. Banks.*

10. D. ater laevis, elytris vitta marginali flava, macula vittatus.

baseos atra. *Syst. Ent. App. 825. **

Habitat in Indiae aquis. *Mus. D. Hunter.*

11. D. cinereus, elytrorum margine thoracisque mediata-

te flavis. *Syst. Ent. 231. 9. Linn. Syst. Nat. 2. 666.*

11. *Fn. Sv. 771. Geoff. Inf. 1. 188. 4.*

Dytiscus fasciatus elytris fuscis thorace fulvo, fasciis
duabus transuersis nigris latere connatis, abdomine
subtus fulvo, lineis nigris. *Degeer Inf. 4. 397. 14.*

Huffnag. Inf. 2. tab. 12.

Roef. Inf. 2. aquat. 1. tab. 3. fig. 6.

Lift. mut. tab. 5. fig. 1.

Act. Nidros. 425. tab. 16. fig. 11.

Petiv. Gazoph. tab. 70. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 7.

Habitat in Europae aquis frequentissimus.

cinereus.

12. D. cinereus, elytris fascia dentata nigra.

griseus.

Habitat in Indiae aquis. *Dom. Lund.*

Paullo maior D. cinereo. Caput flavescentia macula frontali transuersa nigra. Thorax griseus maculis duabus dorsalibus transuersis nigris. Elytra grisea lineis tribus punctorum impressorum. In medio macula marginalis nigra et postice fascia dentata nigra. Corpus subtus flavescentia.

sticticus. 13. D. pallens, elytris griseis, puncto oblongo laterali impresso nigro. *Syst. Ent.* 232. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 666. 12.

Habitat in Africæ aquis.

sopuncta- 14. D. ater glaber, elytris punctis albis quinque. *Syst. Ent.* 232. 11. *

Habitat in nouae Hollandiae aquis. *Mus. Dom. Banks.*

apustula- 15. D. laevis ater, capite postice punctis duobus rubris. ta. *Syst. Ent.* 232. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 667. 17.

Dytiscus totus niger laevis. *Geoff. Inf.* 1. 189. 6. ?

Habitat in Europæ borealis aquis.

Puncta capitinis rubra vix nudo oculo conspicua.

cinctus. 16. D. capite thoraceque flavis, elytris nigris, margine omni albo. *Syst. Ent.* 232. 13. *

Habitat in Americæ aquis. *Dom. Mauduit.*

feneстра- 17. D. subtus ferrugineus supra niger, elytris punctis duobus senestratis.

Habitat in aquis Hamburgensisbus. *D. Schulz.*

Statura omnino D. apustulati. Corpus subtus ferrugineum. Caput nigrum, ore antennis punctisque duobus baseos ferrugineis. Thorax niger margine ferrugineo. Elytra nigra punctis duobus fenestrato hyalinis, altero in medio, altero versus apicem.

transuer- 18. D. ater, thorace antice elytrorumque marginibus *salis*. flavis.

Dytiscus niger thorace vtrinque fascia que antica, elytris margine lineaque transuersa baseos flava. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 71. 668.

Pontopp. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 5, fig. 6.

Habitat in Europæ aquis.

19. D. gibbus, capite, thorace elytrorumque basi ferrugineis, elytris truncatis. *Hermannii.*
Dytiscus Hermanni gibbus, elytris fascia vndata baseos ferruginea. *Syst. Ent.* 232. 14.
Dytiscus tardus. *Acta Soc. Berol. phys.* 4. tab. 7. fig. 3.
 Habitat in Alsatiae aquis stagnantibus. *Prof. Hermann.*
 Statura D. erythrocephali. Caput obscure ferrugineum oculorum orbita nigra. Thorax ferrugineus margine antico et postico nigris. Elytra laevia, nigra basi ferruginea, apice truncata. Abdomen ferrugineum apice nigrum.
20. D. gibbus ferrugineus, elytris nigris apice acuminatis. *Gen. Inf. Mant.* 238.
 Habitat in Kiliae aquis stagnantibus. *Dom. de Scheßlitz.*
21. D. ater nitidus, antennis, pedibus elytrorumque latevliginore exteriore ferrugineis. *Syst. Ent.* 232. 15. * *Linn. fus.*
Syst. Nat. 2. 667. 20. *Fn. Sv.* 776.
 Habitat in Europae aquis.
22. D. testaceus nigro irroratus, capite pectoreque nigris. *irroratus.*
Syst. Ent. 233. 16. *
 Habitat in Americae aquis.
23. D. niger, thorace nigro, fascia pallida, elytris albo maculanoque variis. *Syst. Ent.* 233. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 666. 5. *Fn. Sv.* 777. *Vdm. Diff.* 43.
 Habitat in Europae aquis.
24. D. ouato oblongus niger, capite pedibusque rufis. *erythro-*
Syst. Ent. 233. 18. *Linn. Syst. Nat.* 2. 660. 14. *Fn. cephalus.*
Sv. 774.
Degeer Inf. 4. 404. 12.
 Habitat in Europae aquis.
25. D. thorace rufo, elytris cinereo nigroque striatis. *varius.*
Syst. Ent. 233. 19. *
 Habitat in Patagoniae aquis. *Muf. Dom. Banks.*

notatus. 26. D. fuscus, thorace flavo, punctis quatuor nigris.

Dytiscus notatus. *Bergstr. Nomencl.* 1, tab. 5, fig. 10.

Habitat in Germaniac aquis.

Statura D, palustris. Margo elytrorum flavescit.

depressus. 27. D. thorace ferrugineo, punctis duobus baseos nigris,

elytris fuscis ferrugineo maculatis. *Syst. Ent.* 233. 20. *

Habitat in Sueciae aquis.

Opustula- 28. D. ater, capite ferrugineo, elytris maculis tribus ru-

tus, baseos maiore. *Gen. Inf. Mant.* 239, *

Habitat in Sueciae aquis stagnantibus.

palustris. 29. D. laevis, elytris lituriis duabus lateralibus albis. *Syst.*

Ent. 233. 21. *Linn. Syst. Nat.* 2. 667. 19. *Fn. Sv.* 775.

Habitat in Europae aquis stagnantibus.

Thorax ferrugineus.

ouatus. 30. D. ouatus fuscus, capite thoraceque ferrugineis. *Syst.*

Ent. 233. 22, *Linn. Syst. Nat.* 2. 667. 18. *Fn. Sv.* 2282,

Dytiscus ouatus fuscus, capite thoraceque rubicundis.

Geoff. Inf. 1. 191. 10.

Dytiscus sphaericus rufo fuscus, corpore ouato gibbo.

Degcer Inf. 4. 402. 9. tab. 14. fig. 17 — 19.

Habitat in Europae aquis stagnantibus.

Varietatem vidimus duplo maiorem vix tamen distin-

ctam, margine elytrorum albo maculato.

lituratus. 31. D. niger, elytris basi lituraque apicis pallidis.

Habitat in Italia. *Dr. Allioni*.

Corpus paruum, depresso, atrum. Basis elytrorum

pallida et versus apicem punctum unum alterumue.

Pedes picci.

signatus. 32. D. niger, capite thoraceque rufis, signaturis nigris.

Syst. Ent. 234. 23. *

Habitat in Patagoniae aquis. *Mus. Dom. Banks*,

granula- 33. D. niger, elytris lineis duabus flavescentibus, pedibus

rufis. *Syst. Ent.* 234. 24. *Linn. Syst. Nat.* 2. 667. 22.

Dytiscus

Dytiscus minimus. Scop. carn. 297.

Habitat in Europae borealis aquis stagnantibus,

34. D. ferrugineus, coleoptris fuscis, lineis flavescenti-lineatus, bus. Syst. Ent. 234. 25. *

Dytiscus lineatus. Bergstr. Nomencl. I. 32. 8. 9. tab. 6. fig. 8. 9.

Habitat in aquis stagnantibus Alsatiae. D. Prof. Hermann.

35. D. ferrugineus, elytris nigris, lateribus inaequaliter inaequaliter ferrugineis. Gen. Inf. Mant. 239. *

Habitat in Sueciae aquis stagnantibus,

36. D. flavesens, elytris fuscis, margine flavo maculato. minutus, Syst. Ent. 234. 26.

Dytiscus minutus elytris fuscis basi lateribusque pallidis, thorace flavo immaculato, corpore ouato. Linn. Syst. Nat. 2. 667. 23. Fn. Sv. 778.

Dytiscus ruficollis rufus, elytris striatis flavo griseis, maculis nigris. Degeer Inf. 4. 404. 18. tab. 16. fig. 9.

Habitat in Europaë aquosis,

37. D. ater, thorace elytrisque margine albis. pusillus.

Habitat in Italiae aquis. D. Allioni.

Corpus vix magnitudine pediculi nigrum. Thorax ater margine albo. Elytra nigra margine inprimis antico et apicis albo.

67. G Y R I N V S.

I. G. substriatus. Syst. Ent. 234. 1. Linn. Syst. Nat. 2. natator. 567. 1. Fn. Sv. 779. Geoff. Inf. 1. 194. tab. 3. fig. 3.

Dytiscus natator. Scop. carn. 299.

Scarabaens aquaticus subrotundus e coeruleo viridi colore splendente vnde tinctus. Raj. Inf. 87. 10.

Scarabaens niger nostras, supra aquam velociter circumnatans. Petiv. Gazoph. 21. tab. 13. fig. 9.

Pulex aquaticus. Merret. pin. 203.

Roeß. Inf. 3. 195. tab. 31.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 43.

Schaeff. Elem. tab. 57.

T 5

Habi-

Habitat in Europae lacubus frequens.

Animalculum nitidissimum foetens velocissime supra aquam per orbis cursum, dum vero vrinatur, bullam aeream hydrargyri coloris secum trahit.

australis. 2. *G. virescens substriatus*, elytris abbreviatis vñidentatis.

Syst. Ent. 235. 2. *

Habitat in nouae Hollandiae aquis. *Mus. Dom. Banks.*

america- 3. *G. laevis ater opacus*, *Syst. Ent.* 235. 3. *Linn. Syst.*
nus. *Nat.* 2. 568. 2.

Habitat in Americae meridionalis aquis.

spinosus. 4. *G. niger nitidus*, thoracis elytrorumque margine flano, elytris spinosis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium, at distinctus spinis elytrorum duabus elongatis, acutissimis. Corpus subtus ferrugineum ano nigro,

68. C A R A B V S.

* Maiores.

maxillo- 1. *C. apterus ater*, mandibulis exsertis longitudine capitatis, thorace postice producto bilobo.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Maximus in hoc genere. Antennae filiformes, nigrae apice fuscae. Caput magnum, exsertum fronte plana, clypeoque porrecto, rotundato, integro. Mandibulae magnae, exsertae, acutae, integræ. Thorax singularis, cordatus, marginatus, dorso eleuato, medio concauo et postice producto lamellis duabus depresso, obtusis. Elytra glabra, vix punctata, atra.

coriaceus. 2. *C. apterus ater opacus*, elytris connatis punctis intricatis subrugosis. *Syst. Ent.* 235. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 668. 1. *Scop. carn.* 265.

Buprestis ater, clytris rugosis. *Geoff. Inf.* 1. 141. 1.

Sulz.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 44.

Pontop. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Degeer Inf. 4. 9. 4.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 13. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 36. fig. 1.

Habitat in Germaniae syluis.

3. *C. alatus niger*, thorace elytrorumque marginibus vio- *violaceus*.
laceis. *Syst. Ent.* 236. 2.

Carabus violaceus alatus, elytris laeuiusculis nigris,
margine aureo, thorace subuiolaceo. *Linn. Syst. Nat.*
2. 669. 8. *Fn. Sv.* 787.

Carabus apterus aeneo niger nitidus thorace subuiolaceo,
elytris punctis minutissimis excavatis triplici
serie. *Degeer* Inf. 4. 89. 3.

Scarabaeus maior e purpura nigricans. *Raj.* Inf. 96. 1.

Scarabaeus maximus e viola nigricans. *Lift.* Scar.
Angl. 389. 22.

Scarabaeus terrestris nigricans. *Frisch.* Inf. 13. tab. 23.

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 1.

tab. 88. fig. 1.

Bergstr. Nomencl. 1. 16. 14. tab. 2. fig. 14.

tab. 10. fig. 6.

Habitat in Europae syluis passim.

4. *C. apterus niger violaceo nitens*, elytris punctis intri- *cyaneus*.
catis rugosis. *Gen. Inf. Mant.* 239. *

Carabus intricatus violaceo niger, elytris intricatis
eleuato striatis punctatisque. *Linn. Fn. Sv.* 207. 780.

Buprestis nigro violaceus, elytris dense striatis. *Geoff.*
Inf. 1. 144. 4.

Pontop. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 10. fig. 7.

Habitat in Europa boreali rario.

5. *C. apterus*, thorace angustato ater, coleoptris nouem *sogutia-*
falcatis punctisque decem albis. *Syst. Ent.* 236. 3. *tus*.
Linn. Syst. Nat. 2. 669. 10. *Mus. Lud. Vlr.* 96.

Carabus ferrator coleoptris ouatis subplanis pone
truncatis nigris, maculis inaequalibus albis. *Forsk.*
Desc. anim. 77. 4.?

Habitat in Africa.

Maximus in hoc genere.

- 6gutta-* 6. *C. apterus*, thorace postice angustato, elytris laeui-
tus. bus atris, punctis duobus griseis. *Syst. Ent.* 236. 4.*
 Habitat in Suratte. *Mus. Dom. Banks.*
 Thorax puncto vtrinque unico, elytris duobus vil-
 loso griseis.
- quadri-* 7. *C. apterus*, thorace postice attenuato, elytris sulcatis,
guttatus, maculis duabus griseis remotis, *Syst. Ent.* 236. 5.*
 Habitat ad Cap. bon. sp.
- tabidus.* 8. *C. apterus*, thorace postice angustato ater, elytris ru-
 goso sulcatis. *Syst. Ent.* 237. 6.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- gemma-* 9. *C. apterus niger*, elytris striatis, punctis aeneis bilo-
tus. bis excavatis triplici serie.
 Habitat Hamburgi. *D. Schulz.*
 Statura omnino *C. hortensis.* Caput et thorax atra,
 immaculata. Elytra striis plurimis exarata punctis-
 que aeneis bilobis excavatis triplici serie.
- hortensis,* 10. *C. apterus niger*, elytris laeuibus, punctis aeneis ex-
 cauatis triplici serie. *Syst. Ent.* 237. 7. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 668. 3. *Fn. Sv.* 783.
Carabus striatus niger, elytris striatis, margine vio-
 laceis punctis aureis excavatis triplici serie. *Degeer*
Ins. 4. 90. 5. tab. 3, fig. 1.
Cerambyx purpurea punctata. *Raj. Ins.* 96. 2. *Lift.*
mut. tab. 8. fig. 4.
Stroem. Act. Nidros. 3, p. 401. tab. 6. fig. 7.
Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 3.
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 10. fig. 4. 5.
 Habitat in Europæ hortis et syluis.
- calidus.* 11. *C. apterus niger*, elytris crenato striatis punctisque
 aureis excavatis triplici serie. *Syst. Ent.* 237. 8.*
 Habitat in Ameriæ meridionalis insulis. *D. v. Rohr.*
- retusus.* 12. *C. apterus*, elytris striatis virescentibus, punctis ae-
 neis excavatis triplici serie basi retusis. *Syst. Ent.*
 237. 9.*
 Habitat ad Patagoniae littora. *Mus. Dom. Banks.*

13. C. apterus ater, elytris basi retusis. *Syst. Ent.* 237. 10.* *Maderae.*
Habitat in Madera insula. *Mus. Dom. Banks.*
14. C. apterus conuexus ater laevis, thorace postice emarginato. *Syst. Ent.* 238. 11.*
Habitat in Germaniae syluis.
15. C. apterus, elytris auratis sulcatis, antennis pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 238. 12.
Carabus auratus apterus, elytris sulcatis, striis sulcis-que laevis inauratis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 669. 7.
Fn. Sv. 780.
Carabus sulcatus apterus viridi aeneus nitidus, antennis pedibusque rufis, abdome nigro, elytris sulcatis. *Degeer Ins.* 4. 104. 1. tab. 7. fig. 20.
Buprestis viridis, elytris obtuse sulcatis non punctatis, pedibus antennisque ferrugineis. *Geoff. Ins.* 1. 142.
2. tab. 2. fig. 5.
Cerambyx dorso in longas regulas diuiso, omnium pulcherrimus. *Raj. Ins.* 96. 6.
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 12. fig. 8. 9.
Habitat in Europae locis suffocatis, syluis.
16. C. apteris, elytris striatis viridibus, sutura aurea. *Syst. futuralis.*
Ent. 238. 13.*
Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*
17. C. apterus nigricans, elytris aeneis striatis interiectis granulis punctis eleuatis longitudinalibus. *Syst. Ent.* 238. 14. *tus.*
Carabus granulatus apterus, elytris longitudinaliter conuexe punctatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 668. 2. *Fn.*
Sv. 780.
Buprestis niger, elytris aeneis conuexe punctatis stria-que. *Geoff. Ins.* 1. 143. 3.
Carabus subapterus supra viridi aeneus subtus niger, elytris tuberculatis triplici ordine sulcis eleuatis. *Degeer Ins.* 4. 88. 2.
Carabus granulatus. *Bergstr. Nomencl.* 1. tab. 12.
fig. 4. 5.
Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 6.
Sulz. Hist. Ins. tab. 7. fig. 2.
Habitat in Europae aruis.

clatratus. 18. C. apterus nigricans, elytris aeneis striatis interiectis punctis excavatis cupreis.

Carabus clatratus apterus nigricans, elytris aeneis porcatis interiectis punctis excavatis longitudinalibus.

Syst. Ent. 238. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 669. 5. *Fn. Sv.* 782.

Habitat in Europa.

Difert manifeste a praecedente elytris striatis et inter strias puncta eleuata longitudinalia et inter haec puncta magna excavata, cuprea.

porcatus. 19. C. apterus ater, elytris striatis apice granulatis. *Syst. Ent.* 239. 16.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

reflexus. 20. C. apterus ater, thoracis margine rotundato reflexo, elytris sulcatis, maculis duabus flavis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Caput atrum vtrinque impressum. Thorax inaequaliter punctatus margine vtrinque dilatato rotundato parum reflexo. Elytra connata sulcis octo exarata, atra maculis duabus transuersis flavis. Pedes nigri.

angula- *tus*. 21. C. apterus hirtus ater, thorace canaliculato, coleoptris sulcatis, fasciis duabus flavis interruptis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis praecedenti, attamen differre videtur. Thorax vix marginatus vtrinque angulum format lineaque dorsali impressa. Coleoptrorum maculae maiores fasciam in medio interruptam constituunt.

nitens. 22. C. apterus, elytris porcatis scabris viridibus, margine aureo. *Syst. Ent.* 239. 17.

Carabus nitens apterus, elytris porcatis, striis paucim interruptis sulcisque scabriusculis inauratis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 669. 6. *Fn. Sv.* 185.

Carabus aureus apterus, capite thoraceque aureis, corpore subtus nigro, elytris viridi aeneis, margine aureo, sulcis eleuatis nigris. *Degeer Ins.* 4. 91. 6.

Schaeff. Icon. tab. 51. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 3.

Scopol. carn. 262.

Habitat in Europa syluis.

23. C. alatus, elytris striatis viridi aeneis, punctis triplici *inquisitor*. ordine. Syst. Ent. 239. 18. Linn. Syst. Nat. 2. 669.
H. Fn. Sv. 789.

Carabus alatus, elytris striatis margine aeneis, punctis excauatis triplici ordine. Degeer Inf. 4. 94. 9.

Buprestis, elytris latis, singulo striis sedecim. Geoff. Inf. 1. 145. 6.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 12. fig. 3.

Habitat in Europa locis suffocatis.

Variat rarius elytris totis nigris.

24. C. alatus, elytris striatis viridibus, punctis triplici *scrutator*. serie, thorace cyaneo, margine reflexo inaurato. Syst. Ent. 239. 19. *

Habitat in Virginia. Mus. Dom. Banks.

25. C. alatus violaceo nitens, elytris striatis aureis. Syst. *sycophanta*. Ent. 239. 20.

Carabus sycophanta aureo nitens, thorace coeruleo, elytris aureo viridibus striatis, abdomine subatro.

Linn. Syst. Nat. 2. 670. 12. Mus. Lud. Vlr. 95. Fn. Sv. 790.

Carabus alatus nitens, thorace femoribusque violaceis, elytris viridibus striatis, abdomine viridi aureo. Degeer Inf. 4. 105. 2. tab. 17. fig. 19.

Buprestis nigro violaceus, elytris latis aeneis, e viridi purpureis, singulis striis sexdecim. Geoff. Inf. 1. 144. 5.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 12. fig. 1. 2.

Reaum. Inf. 2. tab. 37. fig. 18.

Rob. Iun. tab. 20. fig. 2.

Schaeff. Elem. tab. 2. fig. 1.

Icon. tab. 66. fig. 6.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 1.

Habitat in Europa sub lapidibus.

Larua nigra laruis phalaenarum viicitat.

rostratus. 26. C. apterus, elytris laeuiibus nigris, thorace angustiore, capite angustissimo. *Syst. Ent.* 240. 21.

Tenebrio rostratus apterus niger, elytris laeuiusculis vniangulatis, thorace angustiore, capite angustissimo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 577. 20. *Fn. Sv.* 823.

Habitat in Europa boreali.

Huius generis, at clytra deflexa, vti in *Tenebrio*nibus.

cephalo- 27. C. apterus ater laeuissimus, thorace orbiculato conuexo. *Syst. Ent.* 240. 22.

Carabus Cephalotes apterus, elytris atris laeuiibus, thorace exerto oblongo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 669. 9. *Fn. Sv.* 188.

Scarabaeus. *Frisch. Ins.* 13. 25. tab. 22.

Sulz. Hist. Ins. tab. 7. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 17. fig. 1.

β. *Tenebrio gibbus* apterus laeuis, thorace orbiculato conuexo antice truncato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 676. 18. *Fn. Sv.* 824.

Tenebrio apterus niger laeuissimus, thorace orbiculato, elytris valde eleuatis conuexis. *Degeer Ins.* 5. 51. 1. tab. 13. fig. 8.

Habitat in Europa boreali.

laeuiga- 28. C. alatus depresso ater, thoracis angulis postice rotundatis, thorace elytrisque laeuissimis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus maiusculum, at praecedentibus magis planum, laeve, glabrum, atrum, immaculatum. Thoracis anguli postice omnino rotundati.

leuco- 29. C. alatus ater, elytris striatis, thorace canaliculato. *phtalmus.* *Syst. Ent.* 240. 23.

Carabus leucophtalmus elytris laeuiibus, striis obsoletis octo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 668. 4. *Fn. Sv.* 784.

Carabus niger striatus alatus totus niger nitidus, elytris striatis. *Degeer Ins.* 4. 96. 12.

Buprestis ater, elytro singulo striis octo laeuiibus, pedibus nigris. *Geoff. Ins.* 1. 146. 7.

Scarabaeus ex toto niger. *List. Scar. Angl.* 390. 23.

Bergstr. Nomencl. 1. 9. 13. tab. 1. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 2.

Habitat

Habitat in Europae quisquiliis frequens.
Magnitudine variat.

30. C. apterus ater, thorace angustiori, capite postice attelaboides. attelaboides.
nuato, elytris sulcatis truncatis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo C. leucophtalmi. Caput magnum, porrectum, atrum, oculis testaceis antice subretusum, postice attenuatum. Thorax angustus, parum marginatus, punctatus, ater, immaculatus. Elytra sulcis nouem aequalibus exarata, atra, immaculata postice truncata, integra. Corpus et pedes nigra.

31. C. apterus ater, thorace postice angustato, marginibus albis, elytris albidis, futura lineaque atris. trilineatus.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Minor praecedentibus. Caput cum antennis atrum interdum immaculatum, interdum lineolis duabus villoso albidis. Thorax postice valde angustatus, ater lateribus late villoso albidis. Elytra villoso albida futura tota lineaque media atris, quae nec basin nec apicem attingit. Corpus et pedes atra.

- Varietas linea elytrorum altera, quae futuram lineamque iungit.

** Minor e s.

32. C. niger, thoracis basi vtrinque puncto impresso, elytris striatis medio glabris. *Syst. Ent. 240. 24.* lus.*

Habitat ad Patagoniae littora. *Mus. Dom. Banks.*

33. C. ater, thorace quadrato laeui, antennis piceis. *Syst. caliginosus. Ent. 240. 25.**

Habitat in America. *Dom. Lewin.*

Caput punctis duobus impressum.

34. C. pallidus, elytris maculis duabus dorsalibus atris. *arenaarius. Syst. Ent. 241. 26.**

Habitat in arena mobili Cambriae. *Mus. Dom. Banks.*

35. C. ater, elytris sulcatis laeubus, antennis pedibusque ruficoris. *Syst. Ent. 241. 27.**

Fabr. Spec. Inf.

Buprestis niger, elytro singulo striis octo laevis, pedibus ferrugineis. *Geoff. Inf.* 1. 146. 8.

Scarabaeus niger, pedibus corniculisque piceis. *Lift. Scar. Engl.* 390. 24.

Habitat in Europae syluis frequens.

bicolor. 36. *C. supra niger subtus ferrugineus.* *Syst. Ent.* 241. 28.*
Habitat in America boreali. *Dom. Lewin.*

piceus. 37. *C. thorace obcordato, antennis tibiisque piceis, elytris striatis.* *Syst. Ent.* 241. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 672. 30.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 9.

Habitat in Europa boreali.

femoralis. 38. *C. capite thoraceque aeneis, elytris striatis obscurioribus, femoribus rufis.* *Syst. Ent.* 241. 30.*

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

mavidus. 39. *C. thorace postice vtrinque impresso niger, femoribus rufis.* *Syst. Ent.* 241. 31.*

Habitat in Anglia, capt. die VI. Maii in nemore Richmondense.

Varietatem vidi femoribus nigris: an distincta species?

inter-ruptus. 40. *C. ater, thorace postice rotundato ab domineque remotis.* *Syst. Ent.* 242. 32.*

Habitat in Oriente. *Dom. Forstahl.*

Forte ad tenebriones emendandus.

complanatus. 41. *C. thorace orbiculato rufus, elytris fasciis duabus nigris.* *Syst. Ent.* 242. 33.*

Carabus complanatus pallidus, elytris fasciis duabus undulatis nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 671. 17.

Habitat in St. Domingo.

americanus. 42. *C. niger, thorace, pedibus antennisque ferrugineis.* *Syst. Ent.* 242. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 671. 19.

Carabus alatus niger, thorace, antennis pedibusque ferrugineis, genibus nigris, elytris striatis. *Degeer Inf.* 4. 107. 3. tab. 17. fig. 21.

Habitat in America.

43. C. ferrugineus, elytris nigro cyaneis. *fumans.*
 Habitat in America. *D. Blackburn.*
 Affinis C. crepitanti, at triplo maior et totus ferrugineus solis elytris cyaneis.
44. C. thorace, capite pedibusque ferrugineis, elytris nigro cyaneis. *crepitans.*
Syst. Ent. 242. 35.
Carabus crepitans. Linn. Syst. Nat. 2. 671. 18. Fn.
Sv. 272.
Carabus alatus ferrugineus, thorace angusto, elytris cinereo nigris. Degeer Inf. 4. 103. 22. tab. 3. fig. 18.
Buprestis capite, thorace pedibusque rubris, elytris coeruleo nigris. Geoff. Inf. 1. 151. 19.
Cicindela capite, thorace pedibusque rufis, elytris nigro coeruleis. Rol. Att. Holm. 1750. 292. tab. 7. fig. 2.
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 13. fig. 9.
Schaeff. Icon. tab. II. fig. 13.
Voet. Scarab. 1. tab. 36. fig. 26.
 Habitat in Europae nemoribus.
 Venatus a maioribus carabis eos crepitu ventris repellit.
45. C. niger, capite elytrisque truncatis puncto baseos bimaculata fascia media ferrugineis. *Syst. Ent. 243. 36. ** *tus.*
Carabus maculatus niger, fascia communi flava interrupta, antennis pedibusque testaceis. Linn. Mant.
532.
Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 5.
 Habitat in India orientali.
 Thorax colore variat, mox flauus, mox niger, mox maculatus.
46. C. rufus, elytris nigris, punctis sex rufis. *Syst. Ent. 6puftulatus.*
*App. 825. **
 Habitat in America meridionali. *Dom. Edler.*
47. C. thorace orbiculato cyaneus, ore antennis tibiisque spinibaris. *Syst. Ent. 243. 37. ** *bis.*
 Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*
48. C. thorace rotundato, elytris striatis punctisque impressis, antennis pilosis. *Syst. Ent. 243. 38. **

Habitat in Anglia. Mus. Dom. Banks.

Variat colore nigro et aeneo.

coerule- 49. C. nigro coerulescens, elytris striatis. *Syst. Ent.* 243.
scens. 39.*

Carabus coerulescens nigro coeruleus, antennis basi
rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 672. 28. *Fn. Sv.* 800.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 3. 4.

Habitat in Europae hortis, viis.

cupreus. 50. C. cupreus, antennis basi rubris. *Syst. Ent.* 243. 40.*
Linn. Syst. Nat. 2. 672. 29. *Fn. Sv.* 801.

Carabus alatus supra viridi aeneus, subtus niger, an-
tennis basi rufis. *Degeer Ins.* 4. 97. 13. tab. 3. fig. 15.

Buprestis totus viridi cupreus, antennis nigris. *Geoff.*
Ins. 1. 161. 40.

Habitat in Europae syluis.

Carnifex. 51. C. alatus viridi aeneus, antennis pedibusque rufis,
thorace angustato. *Syst. Ent.* 244. 41.*

Habitat in Terra del Fuego. Mus. Dom. Banks.

vulgaris. 52. C. nigro aeneus, pedibus antennisque nigris. *Syst.*
Ent. 244. 42. *Linn. Syst. Nat.* 2. 672. 27. *Fn. Sv.*
799. *Scop. carn.* 268.

Carabus alatus supra viridi aeneus nitidus subtus ni-
ger, pedibus antennisque nigris. *Degeer Ins.* 4.
97. 14.

Buprestis fusco aeneus, elytris striatis, punctis quatuor
impressis. *Geoff. Ins.* 1. 158.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 2.

Habitat in Europae syluis frequens.

azureus. 53. C. cyaneus, antennis pedibusque rubris. *Syst. Ent.*
244. 43.*

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 10. fig. 3.

Habitat in Lipsiae collibus arenosis.

latus. 54. C. niger, elytris striatis crenatis, antennis pedibusque
ferrugineis. *Syst. Ent.* 244. 44. *Linn. Syst. Nat.* 2.
672. 24.

*Carabus alatus niger nitidus, elytris striatis pedibus
antennisque rubris.* Degeer Inf. 4. 101. 18.

Schaeff. Icon. tab. 194. fig. 7.

Habitat in Europa frequens.

Punctum vtrinque thoracis basi impressum.

55. C. thorace subaequali ferrugineus, elytris lineola ni- lineola.
gra. Syst. Ent. 244. 45. *

Habitat in America septentrionali. Mus. Dom. Banks.

56. C. ferrugineus, elytris striatis obscurioribus. Syst. ferrugi-
neus. Ent. 244. 46.

Carabus ferrugineus thorace glaberrimo. Linn. Syst.
Nat. 2. 672. 25. Fn. Sv. 798.

*Carabus alatus flavo griseus nitidus oculis nigris, ely-
tris striatis.* Degeer Inf. 4. 101. 19.

Buprestis ferrugineo liuidus, elytris punctato striatis.
Geoff. Inf. 1. 162. 43.

Habitat in Europae aruis.

57. C. pallidus, elytris striatis. Syst. Ent. 244. 47. * pallens.
Habitat Dresdae Saxonum.

58. C. subaeneus, elytris punctis vagis plurimis impressis. multipun-
Syst. Ent. 245. 48. Linn. Syst. Nat. 2. 672. 32. Fn. Status.
Sv. 805.

Habitat in Europae sabulosis.

59. C. ferrugineus, thorace elytrisque aeneis. Syst. Ent. aeneus.
245. 49. *

Habitat in Lipsiae hortis.

60. C. capite thoraceque viridibus, elytris cupreis. Syst. sexpun-
Ent. 245. 50. etatus.

*Carabus sexpunctatus subaeneus, elytris punctis lon-
gitudinalibus sex impressis.* Linn. Syst. Nat. 2. 672.
35. Fn. Sv. 807.

*Carabus alatus, capite thoraceque viridi aureis, elytris
rubro aeneis, punctis sex impressis.* Degeer Inf. 4.
99. 16.

*Buprestis nitens, capite thoraceque viridibus, elytris
cupreis punctatis.* Geoff. Inf. 1. 149. 14.

Goed. Inf. 2. 126. tab. 31.

Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 4.

Habitat in Europa, America boreali.

marginalis. 61. *C. viridis*, elytris margine tibiisque testaceis. *Syst. Ent.* 245. 51. *Linn. Syst. Nat.* 2. 670. 16. *Fn. Sv.* 804.

Buprestis viridis pedibus elytrorumque margine exteriori pallidis. *Geoff. Inf.* 1. 162. 41.

Pontop. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Habitat in Europae aruis.

Variat colore nigro et viridi.

cinctus. 62. *C. fuscus*, capite thoraceque viridi aeneis, elytrorum margine pedibusque pallidis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Meior *C. marginato*. Caput et thorax viridi aenea, glabra, nitida. Antennae palpique pallidae. Elytra striata fusca margine pallido. Corpus fuscum abdominis margine pallido. Pedes pallidi.

limbatus. 63. *C. thorace elytrisque viridibus*, margine fasciisque abbreviatis pallidis. *Gen. Inf. Mant.* 240.*

Carabus dubius. *Akt. Soc. Berol. phys.* 4. tab. 7. fig. 4. Habitat Kiliae sub lapidibus. *Dom. de Scheftedt.*

melanocephalus. 64. *C. niger*, thorace pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 245. 52.

Carabus melanocephalus thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque atris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 671. 22. *Fn. Sv.* 795.

Carabus apterus niger nitidus, elytris laevis, antennis pedibusque flavo testaceis. *Degeer Inf.* 4. 93. 8.

Buprestis niger, thorace, antennis pedibusque ferrugineis. *Geoff. Inf.* 1. 162. 42.

Habitat in Europae suffocatis.

Variat antennis ferrugineis et fuscis.

cyanopeplus. 65. *C. thorace pedibusque ferrugineis*, elytris capiteque cyaneis. *Syst. Ent.* 245. 53. *Linn. Syst. Nat.* 2. 671. 21. *Fn. Sv.* 794.

Carabus alatus capite elytrisque viridi coeruleis, thorace pedibusque ferrugineis. *Degeer Inf.* 4. 100. 17.
tab. 3. fig. 17.

Buprestis capite elytrisque coeruleis, thorace rubro.
Geoff. Inf. 1. 149. 40.

Cantharis elytris et capite coeruleis, scapulis croceis.
Raj. Inf. 89. 1.

Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 14.

Habitat in Europae syluis.

66. C. niger, elytris ferrugineis, macula media sinuata *flexuosa*.
punctoque apicis nigris. *Syst. Ent.* 246. 54. *
Habitat in India orientali. *D. Koenig.*

67. C. thorace orbiculato rubro, coleoptris truncatis ru- *crux ma-*
bris, cruce nigra. *Syst. Ent.* 246. 55. * *ior.*

Carabus crux maior thorace capiteque nigro rubescen-
te, coleoptris ferrugineis cruce nigra. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 673. 39.

Buprestis niger, thorace pedibusque rubris, elytris ru-
bris, cruce nigra. *Geoff. Inf.* 1. 150.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 13.

Habitat in Europae syluis.

68. C. thorace marginato rufo, elytris atris, vitta alba. *vittatus.*
Gen. Inf. Mant. 240. *

Habitat in America boreali. *Dom. Yeats.*

69. C. thorace orbiculato rufo, coleoptris apice nigris, *crux mi-*
macula rufa. *Syst. Ent.* 246. 56. * *nor.*

Carabus crux minor thorace luteo glabro, elytris po-
stice nigris, maculis duabus stauis. *Linn. Syst. Nat.*
2. 673. 40. *Fn. Sv.* 809.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 8.

tab. 41. fig. 13.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 6.

Habitat in Anglia, Europa.

70. C. thorace orbiculato nigro nitido, elytris pallidis, *Andreae.*
fascia media nigra.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Statura omnino C. crux minor. Elytra apice parum
fusca. Pedes pallidi. Fascia in medio clytrorum ad
futuram dilatata.

- germanus.* 71. *C. cyaneus*, capite elytris pedibusque testaceis, elytris apice violaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 672. 26.
Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 13.
Habitat in Germania.
- velox.* 72. *C. nigricans*, antennis pedibusque pallidis, elytris obtusissimis. *Syst. Ent.* 247. 57. *Linn. Syst. Nat.* 2. 672. 31. *Fn. Sv.* 803.
Habitat in Europae arena.
- rufescens.* 73. *C. thorace rotundato ferrugineus*, vertice anoque nigris. *Syst. Ent.* 247. 58. *
Habitat in Anglia. *Mus. D. Hunter.*
- apustula-* 74. *C. thorace orbiculato elytrisque nigris*, maculis duabus rufis. *Syst. Ent.* 247. 59. *
Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*
- apustula-* 75. *C. thorace cordato flauus*, elytris fuscis, maculis duabus flauis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Paruus. Antennae fuscae. Caput flauum, immaculatum. Thorax cordatus, flauus linea dorsali impressa. Elytra substriata, truncata, fusca maculis duabus flauis, altera baseos, altera versus apicem.
- vapora-* 76. *C. thorace*, elytris antice margineque, antennis pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 247. 60. *Linn. Syst. Nat.* 2. 261. 23. *Fn. Sv.* 796.
Carabus nigricans, antennis, thorace pedibus elytrisque antice ferrugineis. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 78. 850.
Habitat in Europa frequens.
- meridia-* 77. *C. niger*, elytris antice pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 247. 62. *Linn. Syst. Nat.* 2. 673. 36.
Habitat in Europa.
Paruus a *C. vaporariorum* diuersissimus.
- Comma.* 78. *C. niger*, thorace fusco, elytris griseis, macula linearis nigra. *Syst. Ent.* 248. 63. *
Habitat in America. *Dom. Drury.*

79. C. thorace ferrugineo glabro, elytris obtusissimis fu- 4macula-
scis, maculis duabus albis. *Syst. Ent.* 248. 64. *Linn.* *tus.*
Syst. Nat. 2. 673. 40. *Fn. Sv.* 809.
Buprestis niger, thorace plano ferrugineo, elytris lae-
uibus, maculis quatuor albis. *Geoff. Inf.* 1. 152. 24.
Pontop. Atl. Dan. 1. tab. 29.
Habitat in Europae quisquiliis.
80. C. thorace rotundato atro, elytris nigris, punctis qua- 4gutta-
tuor albis. *Syst. Ent.* 248. 65. * *tus.*
Habitat in Anglia.
81. C. thorace nigro, elytris obscuris pallido bifasciatis. *astulatus.*
Syst. Ent. 248. 66. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 673. 38. *Fn.*
Sv. 810.
Habitat in Europae quisquiliis.
Variat maculis magnis obsoletis rubro pallidis.
82. C. thorace rotundato rufo, elytris obtusis testaceis, *atricapil-*
capite atro. *Syst. Ent.* 248. 67. *lus.*
Carabus atricapillus flauus, capite nigro, elytris ob-
tusissimis. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 673. 42.
Habitat in Europa boreali.
83. C. thorace rotundato aeneo, elytris nigris, macula *bigutta-*
apicis pallida. *It. Norwag.* d. 13. Iul. * *tus.*
Habitat sub arborum corticibus, *Norwagiae* capt. d.
13. Iul.
84. C. capite thoraceque ferrugineis, elytris testaceis. *Syst. testaceus.*
Ent. 248. 68.
Carabus testaceus pallide testaceus, elytris glabris.
Linn. *Syst. Nat.* 2. 673. 37. *Fn. Sv.* 812.
Buprestis testaceus capite nigro. *Geoff. Inf.* 1. 153. 25.
Habitat in Europa.
85. C. thorace rotundato rufo, elytris abbreviatis testa- *abbrevia-*
ceis. *It. Norwag.* d. 22. Iul. * *tus.*
Habitat in *Norwagiae rupibus*, capt. d. 22. Iul.
86. C. aeneus, antennis nigris, tibiis pallidis. *Syst. Ent.* *bipuncta-*
249. 69. *tus.*

Carabus 2punctatus subaeneus, elytris punctis duobus impressis. Linn. Syst. Nat. 2. 672. 33. Fn. Sv. 806.
Habitat in Europae quisquiliis.

69. S C A R I T E S.

gigas. 1. S. ater, pedibus anticis palmato digitatis, mandibulis sulcatis, elytris substriatis.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. Dom. Banks.
Nimis S. subterraneo affinis, at triplo maior. Mandibulae porrectae, sulcatae. Caput antice sulcatum.
Elytra obsoletius et rarius striata.

subterra- 2. S. ater, pedibus anticis palmato digitatis, capite antice
neus. sulcato, elytris striatis. Syst. Ent. 249. 1. *
Habitat in America. Dom. Lewin.

cyanus. 3. S. cyanus glaberrimus, antennis pedibusque nigris.
Syst. Ent. 249. 2. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

arena- 4. S. piceus, tibiis anticis palmato digitatis. Syst. Ent.
rius. 249. 3.
Tenebrio Fosfor. Linn. Syst. Nat. 2. 675. 7. Fn. Sv.
817.

Attelabus Fosfor niger nitidus, elytris sulcatis, tibiis
anticis palmato spinosis. Degeer Ins. 4. 350. 1. tab.
30. fig. 1. 2.

Habitat in Europae collibus arenosis.

Curfor. 5. S. testaceus, thorace oblongo, angulis quinque denti-
culatis. Syst. Ent. 249. 4.

Tenebrio Curfor. Linn. Syst. Nat. 2. 675. 8. Fn. Sv.
817.

Tenebrio fuscus, thorace oblongo tricarinato rugoso,
vtrinque denticulato, elytris substriatis. Müll. Zool.
Dan. prodr. 74. 798.

Habitat in Europae collibus arenosis.

grabs. 6. S. niger, thorace ferrato, antennis pedibusque testa-
ceis. Syst. Ent. 250. 5. *

Habitat in Oriente. Dom. Prof. Forstahl.

7. S. piceus, antennis clauatis. *Syst. Ent.* 250. 6. *Tenebrio minutus* alatus niger, thorace marginato, antennis clauatis pedibusque piceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 675. 12.

Habitat in Sueciae sabuletis.

70. S E P I D I V M.

1. S. thorace tricuspidato, corpore griseo. *Syst. Ent.* 250. 1. * *Tenebrio alexandrinus* niger, thorace spina vtrinque obtusa, antice gibbo supra caput, coleoptris obtusis, striis quatuor aculeatis. *Forstahl Descri. Animal.* 80. 12. ?

Habitat in Aegypto. *Dom. Prof. Forstahl.*

2. S. thorace tricuspidato cristato, corpore variegato. *cristatum.* *Syst. Ent.* 250. 2. *

Habitat in Aegypto. *Prof. Forstahl.*

3. S. thoracis lateribus angulatis, elytris reticulatis. *reticulatum.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo S. tricuspidati. Caput et thorax nigra interdum cinereo villosa maculis aliquot villo- fuis, fuscis. Thorax vtrinque in angulum acutum dilatatus. Elytra in iunioribus grisea, in adultioribus nigra lineis eleuatis numerosis longitudinalibus et transuersalibus reticulata. Linea intermedia magis eleuata ante apicem coit cum intermedia elytri alterius et inde dorsum planum appetet.

4. S. thorace laeui nitido atrum, elytris rugosis, linea rugosum; eleuata vnica.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et summa affinitas praecedentis. Antennae ci- nereo villosae. Caput et thorax laeua, atra, nitida. Elytra atra, nitida lineolis transuersis eleuatis rugosa, lineaque vnica laeui eleuata longitudinali, quae tamen apicem haud attingit, nec coit. Pedes atri.

5. S. thorace subangulato, elytris atris, vittis duabus ali- *vittatum.*
bis lineaque eleuata vnica.

Habitat

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Praecedentibus duplo minor. Caput nigrum. Thorax marginatus angulo paruo obtuso in medio, niger margine cinereo pubescente. Elytra linea vntica eleuata, atra vittis duabus albis, quarum interior apicem haud attingit.

70. P I M E L I A.

striata. 1. *P. atra glabra, elytris striis quatuor sanguineis.* *Syst.*

*Ent. 251. 1. **

Habitat in Indiis.

unicolor. 2. *P. glabra nigra, elytris immaculatis.*

Tenebrio gigas. *Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 9.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis omnino *P. striatae*, at paullo minor et elytra immaculata.

hispida. 3. *P. atra, corpore muricato hispido.* *Syst. Ent. 250. 2. **

Tenebrio hispidus apterus, totus supra setis hispidus, thorace teretiusculo. *Forstahl Descr. Animal. 79. 8.*

Habitat rarius in hortis Alexandrinis sub sarmentis mense Septembri.

longipes. 4. *P. atra, elytris connatis muricatis, pedibus longioribus.* *Syst. Ent. 251. 3. **

Habitat in Aegypto. *Prof. Forstahl.*

muricata. 5. *P. nigra, coleoptris obtusis, striis muricatis.* *Syst. Ent. 251. 4.*

Tenebrio muricatus. *Linn. Syst. Nat. 2. 676. 12. Mus. Lud. Vlr. 100.*

Tenebrio atra aptera rotundata, elytris sulcis tribus eleuatis. *Geoff. Inf. 1. 352. ?*

Habitat in Europa australi, Aegypto.

spunctata. 6. *P. atra, thorace globofo, punctis duobus impressis, elytris rugosis, striis tribus eleuatis laeuiibus.*

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Statura omnino praecedentium.

7. *P. atra*, elytris scabris, antennis pedibusque fuscis. *scabra.*
Syst. Ent. 251. 5. *
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
8. *P. elytris spinosis*, linea laterali eleuata ferrata. *Syst. angulata.*
Ent. 252. 6. *
Tenebrio spinosus apterus niger, thorace teretiusculo,
 elytris margine laterali ferratis, singulis striis tribus
 spinosis, interiectis tuberculis acutis. *Forsk. Descr.*
animal. 80. 13.
 Habitat Alexandriae. *Forskahl.*
9. *P. thoracis lateribus spinosis*, elytris lineis eleuatis tri-
 bus echinatis. *echinata.*
 Habitat ad Promont. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentium. Caput obscurum. Thorax ci-
 nereus punctis longioribus nigris scaber, margine
 antico dentato, laterali in medio spina acuta, reflexa.
 Elytra deflexa, fusco cinerea lineis tribus eleuatis
 echinatis, in primis lateralibus. Abdomen nigrum.
 Pedes cinerei.
10. *P. thorace laeui nitido*, elytris lineis eleuatis tribus *porcata.*
 interiectis punctis eleuatis.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Minor praecedentibus. Caput et thorax laeua, atra,
 nitida. Elytra connata, deflexa lineis tribus eleu-
 atis laeubus, quae tamen apicem haud attingunt. Spa-
 tium inter lineas punctis eleuatis scabrum. Pedes
 postici longiores.
11. *P. thorace nigro*, elytris cinereis fusco maculatis, li- *maculata.*
 neis tribus eleuatis, secunda subundata.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Caput et thorax nigra punctis eleuatis longioribus sca-
 bra. Elytra grisea lineis duabus macularum fuscarum,
 altera marginali, altera linea eleuata interiori diui-
 sa. Lineae tres eleuatae nigricantes, quarum inter-
 media vndata. Pedes cinerei punctis eleuatis nigris
 irrorati.
12. *P. thorace varioloso*, elytris lineis tribus eleuatis echi- *serrata.*
 natis, interstitiis rugosis, pedibus elongatis.
 Habitat

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Parua, atra. Thorax punctis impressis. Elytra lineis eleuatis tribus serratis. Pedes elongati tibiis obscure rufis.

minuta. 13. P. thorace laeui obscurro, elytris cinereis hispidis, lineis tribus eleuatis laeuibus.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Elytra pilis erectis hispida, cinerea. Pedes cinerei. Tibiae anticae apice dentibus tribus rufis.

rugosa. 14. P. thorace scabro, elytris rugosis antice angustioribus.

Syst. Ent. 252. 7. *

Habitat in Aegypto. *Forstahl.*

spinosa. 15. P. thorace marginato, marginibus antice posticeque spinosis, elytris striis eleuatis laeuibus. *Syst. Ent.* 252. 8.

Tenebrio spinosus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 677. 24. *Mus. Lud. Vlr.* 101.

Habitat in Europa australi, Oriente.

reflexa. 16. P. thorace marginato, marginibus reflexis, elytris muricatis, linea laterali carinata laeui. *Syst. Ent.* 352. 9.*

Tenebrio vulgaris apterus ater, elytris latere carinatis, singulis serie tuberculorum duplici, thorace planiusculo pone spinoso, margine acuto. *Forstahl Descr. anim.* 79. 9.

Habitat frequens in Aegypto.

Morio. 17. P. thorace antice rotundato atra, antennis apice rufis.

Gen. Ins. Mant. 240. *

Habitat in Anglia rarius.

fasciata. 18. P. thorace suborbiculato atra, elytris fasciis duabus abbreviatis flauis.

Habitat in India. *Dom. Lund.*

Huius generis videtur specimen mutilatum. Caput prominens, subcylindricum, atrum, immaculatum. Thorax elytris angustior, laevis, ater immaculatus. Elytra connata striata atra fasciis duabus flauis, quarum anterior suturam haud attingit, posterior vero nec suturam nec marginem. Pedes atri.

19. P. nigra, clytris laeuiibus vniangulatis thorace angu- *collaris.*
stiore, capite depresso sculo carinato. *Syst. Ent.*
252. 11.

Tenebrio collaris apterus niger, clytris laeuiusculis vni-
angulatis, thorace angustiore, capite depresso sculo
carinato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 677. 21.

Habitat in Europa australi.

E geniculis oleum flauescens exsudat.

20. P. nigra, thorace orbiculato, clytris lineis eleuatis *carinata.*
tribus laeuiibus. *Syst. Ent.* 252. 10. *

Tenebrio aegypticus apterus, thorace subrotundo an-
tice et pone truncato, clytris obsolete punctatis,
striis tribus eleuatis laeuiibus, dorso planiusculo.
Forfk. Dscr. anim. 78. 6.

Habitat in Gallia, Aegypto.

21. P. nigra depressa, thorace clytrisque reflexo marginata- *ciliata.*
ciliatis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentium. Caput paruum intra
emarginaturum thoracis. Thorax glaber, depressus,
margin'e dilatato, subreflexo, ciliato, antice emargi-
nato pro receptione capit'is. Elytra connata, plana,
depressa laevia margine subreflexo ciliato.

22. P. thorace rotundato scabro, clytris striis tribus pun- *lineata.*
ctato scabris, postice lineolis albis.

Habitat in Siberia. *Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum. Caput nigrum ante antennas vtrin-
que prominens, subspinatum. Thorax rotundatus
punctis eleuatis scaber. Elytra dorso piano lateri-
bus deflexis lineisque tribus punctorum eleuatorum
et inter has lineolae tres apicis albae. Linea latera-
lis eleuata, serrata. Tibiae anticae extus ferratae.

23. P. atra, thorace rotundato, clytris glaberrimis. *Syst. glabra.*
Ent. 253. 12. *

Tenebrio laevis apterus nitens, thorace suborbiculato
marginato, clytris laeuiibus marginatis. *Forfk. Dscr.*
animal. 78. 7.

Habitat in Aegypto.

angusta- 24. P. glabra, thorace postice angustato, elytris acuminata. *Syst. Ent.* 253. 13. *
Habitat in Aegypto. *Forskahl.*

orbicula- 25. P. glabra, thorace orbiculato, elytris acuminatis. *Syst. Ent.* 253. 14. *
Habitat in Oriente. *Forskahl.*

72. S C A V R V S.

atratus. 1. *Scaurus* *Syst. Ent.* 253. 1. *

Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl.*

Tota atra glabra. Thorax addito capite fere longitudo elytrorum. Elytra connata, obtusa. Pedes antici dente altero valido versus apicem femorum, altero ad basin tibiarum.

73. M A N T I C O R A.

maxillo- 1. *Manticora*.

sa. *Carabus tuberculatus* apterus niger, elytris scabris, tuberculis conicis hirsutis, tibiis obscure ferrugineis. *Degeer Inf.* 7. 623. 10. tab. 46. fig. 14.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Genus affine *Pimeliae*, a quo tamen manifeste differt.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor subaequales, filiformes, anteriores paullo longiores, quadriarticulati, articulo secundo longiori, ultimo obconico obtuso adhaerentes maxillae dorso, posteriores triarticulati, articulo secundo longiori cylindrico, ultimo obconico, obtuso adnati labii basi interiori. Mandibula exserta, porrecta, apice curvata basi interiori dentata. Maxilla cornua, arcuata, simplex, acutissima, intus ciliata. Labium cornuum, durum, trifidum, laciniis lateralibus, latioribus, acutis, intermedia breviori compressa obtusiuscula. Antennae filiformes articulis cylindricis, subaequalibus. Labium hoc vere trifidum nec est palatum porrectum ut in carabis, quin palpi huic ipso sub emarginatura adhaereant.

Corpus magnum atrum. Caput magnum, porrectum, subglobosum, glabrum, vtrinque ante antennas impressum.

pressum. Thorax antice rotundatus, in medio impressus, postice eleuatus margine rotundato, apice emarginato. Elytra connata, supra plana, scabra margine deflexo, vti in Pimeliis, et linea laterali acutissima, ferrata. Pedes simplices, nigri.

74. B L A P S.

1. B. nigra, thorace rotundato, elytris laeuiibus obtusis. *Gages.*
Syst. Ent. 254. 1. *
Tenebrio Gages. *Linn. Syst. Nat.* 2. 676. 14.
Sulz. Hist. Inf. 64. tab. 7. fig. 9.
Habitat in Europa australiori.
2. B. coleoptris mucronatis sulcatis. *Syst. Ent.* 254. 2. * *sulcata.*
Tenebrio polychrestus apterus, elytris mucronatis, singularis striis nouem eleuatis. *Forfk. Descr. animal.* 79. 10.
Habitat in Aegypti hortis frequens.
Butyro coetae a feminis Turcis saginandi cauissa comeduntur.
Contra aurium dolores morsumque scorpionum laudantur.
3. B. atra, coleoptris mucronatis laeuiibus. *Syst. Ent.* *mortifaga.*
254. 3.
Tenebrio mortifagus apterus, thorace aequali, coleoptris laeuiibus mucronatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 676. 15.
Fn. Sv. 822.
Tenebrio atra aptera, coleoptris laeuiibus pone acuminate. *Geoff. Inf.* 1. 346.
Tenebrio acuminatus apterus, coleoptris pone acuminate. *Degeer Inf.* 5. 31. 1.
Scarabaeus maior totus niger, abdomine longo elytris veluti caudatis. *Raj. Inf.* 90. 12.
Scarabaeus ex toto niger, minime nitens, foetidus. *Lister. Scarab. Augl.* 388. 21.
Scarabaeus impennis tardipes. *Pet. Gazoph.* tab. 24. fig. 7.
Blatta foetida. *Mouff. Inf.* 139.
Frisch. Inf. 13. tab. 25.

Schaeff. *ELEM.* tab. 124. fig. 1.

Icon. tab. 37. fig. 6.

tab. 6. fig. 13.

Habitat in Europae vmbrosis suffocatis.

excavata. 4. B. thorace postice angulato, elytris excavato punctatis acutiusculis. *Syst. Ent.* 254. 4. *

Petiv. Gazoph. tab. 92. fig. 14.

Akt. Angl. 271. 861. 13.

Habitat in Coromandel. *Mus. Brit.*

striata. 5. B. thorace postice angulato atra, elytris obtusis striatis. Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Caput et thorax laevia, atra, minime nitida. Thorax margine postico vtrinque angulato. Elytra connata, nitidiora, atra, striata striis sublaeuis.

crenata. 6. B. thorace postice angulato, griseo fusca, elytris crenato striatis obtusis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at duplo minor. Caput et thorax laevia, griseo fusca, immaculata. Elytra striata striis crenatis.

75. T E N E B R I O.

serratus. 1. T. ater glaber, elytris striatis, tibiis posticis serratis.

Syst. Ent. 255. 1. *

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

Molitor. 2. T. oblongus piceus, elytris striatis. *Syst. Ent.* 255. 2.

Tenebrio Molitor alatus niger totus, femoribus anticis crassioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 674. 2. *Fn. Sv.* 875. *Scop. carn.* 259.

Tenebrio atra oblonga, elytris striis nouem laevis.

Geoff. Inf. 1. 349. 6.

Tenebrio alatus nigro fuscus, subtus castaneus, corpore oblongo, elytris striatis. *Degeer Inf.* 5. 34. 3. tab. 2. fig. 4.

Vermis farinarius. *Raj. Inf.* 4. *Larua*.

Frisch. Inf. 3. 1. tab. 1.

Sulz.

Sulz. *Ins.* tab. 7. fig. 52.

Schaeff. *Icon.* tab. 66. fig. 1.

Habitat in farina pistorum, pane sicco.

Larua alba mollis luscinarum gratissimus cibus.

3. *T. oblongus ater, elytris laeuiusculis.* *laeuiga-*
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.* *tus.*
T. molitor paullo minor, totus laeuis, glaber, ater.
4. *T. violaceus, pedibus antennisque piceis.* *Syst. Ent.* *chaly-*
255. 3. Linn. Syst. Nat. 2. 674. 3. *beus.*
Tenebrio aeneus alatus niger, elytris striato punctatis
aeneo coerulescentibus. *Degeer Ins. 5. 53. 4. tab. 13.*
fig. II.
Habitat in Guinea.
5. *T. oblongus fusco cinercoque varius.* *variega-*
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.* *tus.*
Statura oblonga et magnitudo praecedentium, at totus
fuscus pilis griseis variegatus.
6. *T. ouatus ater, elytris striatis, capite tuberculato.* *Syst. abbrevia-*
*Ent. 256. 5. ** *tus.*
Habitat in India. *Mus. Brit.*
7. *T. ouatus niger, elytris striatis, tibiis anticis dentato* *fessor.*
spinosis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus medium supra totum nigrum, subtus piceum.
Caput et thorax glabra, laeuia. Elytra crenato stria-
ta. Pedes antici breues, validi tibiis apice dentato
spinosis.
8. *T. thoracis marginibus crenatis angulisque prominu-* *cornutus.*
lis, thorace bicorni. *Syst. Ent. 256. 6. **
Habitat Smirnae. *Dom. Drury.*
9. *T. ater, antennis pedibusque sanguineis.* *Syst. Ent.* *sanguini-*
*256. 7. ** *pes.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
10. *T. ater, thorace ovali marginato, elytris connatis buprestoi-*
laeubus. *Habi-*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et summa affinitas *T. caraboidis*, at maior, et clytra laevia.

pallens. 11. *T. pallide testaceus*, thorace transuerso.

Tenebrio pallens alatus pallide testaceus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 874. 10. *Fn. Sv.* 820.

Habitat ad Cap. bon sp. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum pallide testaceum. Antennae monili-formes fuscae articulo primo et ultimo pallidis. Pe-des pallidi tibiis basi nigris.

ferrugi- 12. *T. ferrugineus*, elytris striatis testaceis.

neus. Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus praecedenti adhuc minus, magis depresso fer-rugineum. Elytra striata, testacea.

caraboi- 13. *T. niger*, thorace ovali marginato, elytris striatis.

des. *Syst. Ent.* 256. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 677. 25. *Fn. Sv.* 825.

Carabus coadunatus apterus niger totus, corpore oua-to breui, elytris coadunatis scabriusculis. *Degeer Inf.* 4. 97. 7. tab. 3. fig. 13.

Platycerus fuscus, elytris striatis. *Geoff. Inf.* 1. 64. 5.

Habitat in Europae quisquiliis.

76. H E L O P S.

coeruleus. 1. *H. coerulescens*, thorace suborbiculato, elytris striatis.

Syst. Ent. 257. 1.

Tenebrio coeruleus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 677. 19. *Mus. Lud. Plr.* 98.

Lift. Angl. app. 4. fig. 14.

Pet. Gazoph. tab. 22. fig. 6.

Habitat in Europa australiori.

lanipes. 2. *H. aeneus*, elytris striatis acuminatis. *Syst. Ent.* 257. 2.*

Tenebrio lanipes alatus aeneus, elytris subbifido mu-cronatis, plantis subtus hirsutis. *Linn. Mant.* 1. 533.

Tenebrio nigro cuprea, elytro singulo strjis octo, coleoptris pone acuminatis. *Geoff. Inf.* 1. 349. 5.

Tenebrio aeneus. *Scop.* 255.

Habitat in Germaniae quisquiliis.

3. H. niger digitis ferrugineis, palpis porrectis. *Syst. Ent.* *serratus.*
 257. 3. *
- Tenebrio depresso* alatus niger, elytris coerulecentibus, antennis tibiisque sanguineis, thorace depresso.
Linn. Syst. Nat. 2. 675. 11.?
- Serratula. Schulz. Act. Dresd.* 1.
 Habitat in Anglia.
 De Synonymo *Linnaei* adhuc dubito, quum pedes in nostro omnino nigri,
4. H. ater, elytris fascia abbreviata aurea. *Syst. Ent.* *equestris.*
 257. 4. *
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
5. H. ater, thorace vtrinque rotundato laeui, elytris ex. *maura.*
 cauato punctatis,
 Habitat in India orientali. *Dom. Lund.*
 Magnus. Caput atrum laeuē clypeo rotundato integro.
 Palpi antici porrecti, securiformes, postici capitati.
 Labium subemarginatum, Antennae extrorsum crassiores. Elytra connata punctis latis excavatis distantibus striata,
6. H. ater, thorace quadrate laeui, elytris punctato stria- *morio.*
 tis. *Gen. Ins. Mant.* 241, *
 Habitat in America boreali,
7. H. ater, thoracis marginibus rotundatis, elytris cre- *nigrita.*
 nato sulcatis,
Tenebrio atratus oblongus ater, elytris sulcatis acutiusculis. *Syst. Ent.* 256. 4.
 Habitat in America meridionali.
 Corpus magnum, atrum, immaculatum. Antennae apice moniliformes. Thorax glaber, laeuis margine exteriori rotundato anguloque postico acuto. Elytra sulcata sulcis crenatis. Plantae subtus lana rufa.
8. H. niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Syst. rufipes.*
Ent. 258. 5. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
9. H. niger, pedibus fuscis. *Syst. Ent.* 258. 6, * *turidus.*
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

longipes. 10. H. niger, elytris striatis, pedibus elongatis, tibiis secundi paris barbatis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Palpi securiformes huius generis. Corpus magnum, gibbum, totum nigrum, immaculatum, obscurum. Thorax glaber, laevis. Elytra striata. Pedes omnes elongati. Tibiae secundi paris pilis rufis barbatae.

ater. 11. H. ater, elytris striatis. *Syst. Ent.* 258. 7. *

Habitat Lipsiae.

Elytra striata, striis laeuis.

dentipes. 12. H. ater, elytris punctato sulcatis, femoribus anticis acute dentatis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura H. atri at paullo minor. Caput et thorax laetitia, atra, obscura. Elytra sulcata et in singulo sulco linea punctorum impressorum. Pedes nigri femoribus anticis medio interiori acute dentatis.

quisqui- 13. H. niger, antennis pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* *258* 8.

Tenebrio quisquilius niger, ore pedibusque ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 676. 13. *Fn. Sv.* 821.

Habitat in Europae quisquiliis.

Subtus totus ferrugineus.

glaber. 14. H. corpore atro laeui. *Syst. Ent.* 258. 9. *

Habitat in Europae quisquiliis.

77. E R O D I V S.

testudina- 1. E. gibbus ater, elytris connatis scabris, lateribus puluerulento albis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum, gibbum, subtus planum, atrum. Thorax gibbus antice late emarginatus pro receptione capitis ater margine puluerulento albido. Elytra valde gibba punctis elevatis scabra, atra lateribus puluerulento albidis. Pedes simplices, atri.

gibbus. 2. E. gibbus ater, elytris lineis elevatis tribus. *Syst. Ent.* *258*. 1. *

Tenebrio

Tenebrio cothurnatus apterus niger, thorace laeui,
vtrinque antice vnidentato, elytris tuberculatis,
striis duabus elatis. *Forfk. Descr. anim.* 80. II.?

Habitat in Aegypto frequens.

3. E. ater, elytris linea elevata vnica. *Syst. Ent.* 259. 2.* *planus.*
Habitat in Aegypto. *Prof. Forstkahl.*
4. E. ater, elytris laeuissimis. *Syst. Ent.* 259. 3.* *minutus.*
Habitat in Oriente. *Dom. Forstkahl.*

78. M E L O E.

1. M. corpore violaceo. *Syst. Ent.* 259. 1. *Linn. Syst. Nat.* proscarabaeus.
2. 679. 1. *Fn. Sv.* 826.

Meloe. Geoff. Inf. 1. 377. 1.

Cantharis proscarabaeus aptera, violaceo nigra. *Degeer Inf.* 5. 31. tab. 1. fig. 1.

Scarabaeus mollis, e nigra viola nitens. Lister. Scar.
Angl. 392. 27.

Proscarabaeus. Mouff. Inf. 162. fig. med.

Proscarabaei femina. Ionst. Inf. p. 74. tab. 14.

Vermis maialis. Clut. hemerob. 81. 73.

Frisch. Inf. 6. tab. 6. fig. 5.

Huffnag. Inf. 2. tab. 9.

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 5.

Elem. tab. 82.

Bergstraess. Nomencl. 1. 17. 15. tab. 2. fig. 15.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 10.

Sulz. Inf. tab. 7. fig. 54.

Habitat in Europae campis apricis, arenosis.

Meloe Vralensis. Pall. Iter. 2. 722. 56. triplo minor
vix specie differt.

Intermedius antennarum articulus maris dimidiatus.

Taeta oleum limpidissimum, flauicans, e poris praesertim geniculis pedum exsudat summe diureticum. Melle vel oleo mixtum in rabie canina laudatur.

Oua suaveolentia. *Lister.*

2. M. segmentis dorsalibus abdominis rubris. *Syst. Ent.* *maialis.*
259. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 679. 2.

Proscarabaeus alter. *Frisch.* *Ins.* 6. *tab.* 6. *fig.* 4.

Schaeff. *Icon.* *tab.* 3. *fig.* 6.

Pontop. Atl. Dan. 1. *tab.* 29.

Habitat in Europa australi.

Affinis praecedenti, cuius varietatem dicit *Frisch.*

margina- 3. M. nigra, thoracis elytrorumque margine ferrugineo.

ta. *Meloe hungarus* apterus ater laevis, thoracis bati elytrorumque margine interiore ferrugineis. *Schrink.* *Beytr.* 71. 19.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Duplo minor M. proscarabaeo. Caput nigrum anten-
nis moniliformibus. Thorax niger margine ferru-
gineo. Elytra abbreviata, laevia, concava, nigra
margine exteriori ferrugineo. Abdomen et pedes
nigra, obscure nitida, immaculata. Alae nullae.

79. L Y T T A.

vesicato- 1. L. viridis, antennis nigris. *Syst. Ent.* 260. 1.

ria. *Meloe vesicatorius* alatus viridissimus nitens, antennis
nigris. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 679. 3. *Fn. Sv.* 827. *Scop.*
carn. 185.

Cantharis viridi aurata, antennis nigris. *Geoff.* *Ins.* 1.
341. 1. *tab.* 6. *fig.* 5.

Cantharis vesicatoria alata viridi aurea nitidissima, an-
tennis nigris. *Degeer* *Ins.* 4. 12. 2. *tab.* 1. *fig.* 9.

Cantharis vulgaris officinarum. *Raj.* *Ins.* 1. 341.

Schaeff. *Icon.* *tab.* 47. *fig.* 1.

Elem. *tab.* 33.

Sulz. *Hist. Ins.* *tab.* 7. *fig.* 55.

Mouff. *Ins.* 144.

Ionst. *Ins.* 76. *tab.* 7.

Habitat in ligastro, fraxino, sambuco, syringa.
Officinalis pro vesicatorio.

nitidula. 2. L. viridi acuea, elytris testaceis. *Syst. Ent. Append.*
826. *

Habitat in Anglia.

3. L. viridi coerulea, thorace ferrugineo. *syriaca.*
Meloe syriacus alatus viridi coeruleus, thorace luteo.
Linn. Syst. Nat. 2. 680. 4. Mus. Lud. Vlr. 102.
Gron. Zooph. 620.
Habitat in Oriente.
Antennæ nigrae. Thorax antice attenuatus. Tibiae pallide testaceae.
4. L. viridi aenea nitida, elytris testaceis, maculis viridi *festiua.*
aeneis.
Meloe festiua. Pall. Iter. 2. 721. 54.
Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentium. Antennæ desunt. Corpus totum viridi aeneum, iminaculatum. Elytra testacea maculis viridi aeneis. Maculae elytrorum variant.
5. L. atra, elytrorum marginibus cinerascentibus. *Syst. marginata.*
*Ent. 260. 2. **
Meloe cinereus alatus cinereus, antennis elytrisque atris margine cinereis. *Forst. nou. sp. Cent. 1. 62. 62.*
Habitat ad Cap. bon. sp.
6. L. elytris nigris, vitta marginibusque flavis. *Syst. Ent. vittata.*
*260. 3. **
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
7. L. corpore atro immaculato. *Syst. Ent. 260. 4. ** *atrata.*
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
8. L. atra, capite testaceo, thorace elytrisque cinereo li- *erythrocephala.*
neatis.
Pall. Itiner. 1. App. 46.
Scop. Ann. Hist. nat. 5. 103. 81.
Habitat in Europa australiori.
Affinis praecedenti, at caput testaceum linea media nigra. Thorax canaliculatus linea dorsali lateribusque cinereis. Elytra margine futura lineaque media cinereis.
9. L. atra, capitis vertice fulvo, thorace elytrisque im- *dubia.*
maculatis.

Meloe algiricus. Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 12.

Habitat in Sibiria. Mus. Dom. Banks.

Nimis praecedenti affinis, a qua tamen differt vertice
capitis rufo, immaculato, thorace elytrisque atris,
immaculatis.

africana. 10. L. nigra, thorace rufo. Syst. Ent. 260. 5.

Meloe ater alatus niger, thorace rufo. Linn. Syst. Nat. 2. 680. 10.

Habitat in Africa.

Affinis L. atratae, at thorax totus rufus et elytra magis
cyanea.

80. M Y L A B R I S.

fasciata. 1. M. nigra, elytris fascia media flava. Syst. Ent. 261. 1.*
Habitat in Indiis. Dom. D. Torsten森.

Cichorei. 2. M. nigra, elytris flavis, fasciis tribus nigris. Syst. Ent.
261. 2.

Meloe Cichorei alatus niger, thorace hirsuto, elytris
fasciis tribus flavis, antennis clavatis. Linn. Syst.
Nat. 2. 680. 5. Mus. Lud. Vlr. 103.

Cantharis Cichorei alata nigra hirsuta, elytris fasciis
tribus transuersis flavis, antennis clavatis longitudi-
ne thoracis. Degeer Inf. 5. 17. 2. tab. 13. fig. 2.

Chrysomela Cichorei. Hasselqu. Itin. 410. 101.

Cantharis fasciata. Imperati nat. 78.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 11.

Habitat in totius Orientis cichoreis.

Officinalis in China.

Variat antennis apice flavis et totis nigris elytrorum-
que fasciis et colore.

algirica. 3. M. atra, elytris testaceis immaeulatis.

Meloe algiricus alatus niger, elytris testaceis. Linn.
Syst. Nat. 2. 681. 11.

Mylabris immaculata. Syst. Ent. App. 828. *

Habitat in India.

capensis. 4. M. nigra, elytris maculis sex flavis, prima arcuata. Syst.
Ent. 261. 3. *

Meloe

Meloe capensis alatus niger, elytris maculis sex flavis prima arcuata, antennis flavis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 180. 7. *Mus. Lud. Vlr.* 104.

Degeer Inf. 7. tab. 48. fig. 14.

Habitat ad Cap. bon. sp.

Duplo minor M. Cichorei.

5. M. atra, elytris testaceis punctis quinque nigris. *Meloe 4punctata.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 680. 6. *topunctata.*

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Statura omnino M. Cichorei, at triplo minor. Antennae moniliformes articulo ultimo crassiori clavato, nigrae. Corpus nigrum. Elytra testacea punctis quinque nigris 2. 2. 1.

6. M. nigra, coleoptris flavis, fascia puncto que communi fuscis. *Syst. Ent.* 261. 4. * *3maculata.*

Habitat in Oriente. *Prof. Forsk.*

7. M. testacea, pectore elytrorumque apicibus nigris. *Meloe testacea,*

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium, at paullo minor. Caput et thorax ferruginea. Elytra testacea apice nigra. Corpus testaceum pectore abdominisque basi nigris.

81. C E R O C O M A.

1. C. viridis, antennis pedibusque luteis. *Syst. Ent.* *Schaefferi.* 262. 1. *

Meloe Schaeffri alatus viridis, pedibus luteis, antennis mari abbreviatis clavatis brevibus irregularibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 681. 12.

Cerocoma. Geoff. Inf. 1. 358. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 13.

Schaeff. Elem. tab. 37.

Icon. tab. 53. fig. 8. 9.

Habitat in Europa australiori.

2. C. viridis antennis pedibus abdominisque segmentis tribus flavis. *Schreberi.*

Habitat in Europa australiori. *Dom. D. Schreber.*

Nimis

Nimis praecedenti affinis, at duplo fere maior. Antennae irregulares flavae.

82. M O R D E L L A.

- ferrugi-* 1. *M. antennis pectinatis rufa, pectore ano pedibusque nigris.* *Syst. Ent.* 262. 1. *
Habitat in India orientali. *D. Koenig.*
- parado-* 2. *M. antennis pectinatis, thoracis lateribus elytrisque testaceis.* *Syst. Ent.* 262. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 682.
1. *Fn. Sv.* 831.
Habitat in Europae plantis umbellatis rarius.
- pectinata.* 3. *M. antennis pectinatis rufa, elytris nigris.* *Syst. Ent.* 263. 3. *
Habitat in America. *Dom. Drury.*
Forte proprii generis tres hae species mihi haud rite examinatae,
- sexmacu-* 4. *M. atra, thorace ferrugineo, elytris testaceis, maculis lata.* *tribus nigris.* *Syst. Ent.* 263. 4. *
Habitat in America. *D. Hunter.*
- dimidia-* 5. *M. atra, elytris basi flavis.*
ta. Habitat - - - - *Dom. Teats.*
Statura omnino praecedentium. Antennae breues, pectinatae, atrae. Corpus totum atrum nitidum elytris solis a basi ad medium flavis. Abdomen valde obtusum et fere truncatum,
- limbata.* 6. *M. ferruginea, vertice thoracis disco elytrisque atris.*
Habitat - - - - *Mus. Dom. Teats.*
Statura praecedentium, Antennae breues, serratae, nigrae primo articulo ferrugineo. Caput ferrugineum, nitidum. Thorax in medio ater limbo omni ferrugineo. Scutellum ferrugineum. Pectus ferrugineum macula laterali atra. Elytra laevia, atra, immaculata. Abdomen breve, obtusiusculum, ferrugineum basi utrinque macula magna atra. Pedes nigri femoribus ferrugincis,

7. M. ano aculeato, corpore atro immaculato. *Syst. Ent.* *aculeata.*
 263. 5.
Mordella aculeata atra, ano spina terminato. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 682. 2. *Fn. Sv.* 832.
Mordella atro caudata vnicolor. *Geoff. Inf.* 1. 353. 1.
Mordella. *Schaeff. Elem. tab.* 84.
Icon. tab. 127. fig. 7.
Sulz. Inf. tab. 7. fig. 46.
 Habitat in floribus semifloceulosis, vmbellatis Europae borealis frequens.
8. M. ano aculeato nigra, elytris fasciis duabus cinereis. *fasciata.*
Syst. Ent. 263. 6. *
Mordella atra caudata, fasciis villoso aureis. *Geoff. Inf.*
 1. 354. 2.
 Habitat in Europae australioris floribus.
 Varietatem praecedentis credit a *Linné.*
9. M. ano aculeato, elytris nigris, punctis quatuor flauis, 8punctata-
 primo lunato. *Syst. Ent.* 263. 7. *
 Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom.* *Banks.*
10. M. ano aculeato nigra, thorace abdomineque fuluis. *abdominalis.*
Syst. Ent. 264. 8. *
Mordella bicolor. *Sulz. Hist. Inf. tab.* 7. fig. 15.
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
11. M. atra, ore lateribus thoracis pedibusque flauis. *Syst. humeralis.*
Ent. 264. 9.
Mordella humeralis atra, lateribus thoracis baseosque elytrorum flauescitibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 682. 3.
Fn. Sv. 833. ?
 Habitat in Europae floribus.
12. M. atra, fronte pedibusque flauescitibus. *Syst. Ent. frontalis.*
 264. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 682. 4. *Fn. Sv.* 834.
 Habitat in Europae borealis floribus.
13. M. atra, capite thoraceque flauis. *Syst. Ent.* 264. 11. *thoracica.*
Linn. Syst. Nat. 2. 682. 5. *Fn. Sv.* 835.
 Habitat in Europae floribus.

- flava.* 14. *M. flava*, elytrorum apicibus nigris. *Syst. Ent.* 264.
 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 682. 6. *Fn. Sv.* 835.
Habitat in Europae floribus umbellatis frequens.

83. S T A P H Y L I N V S

- hirtus.* 1. *S. hirsutus niger*, thorace abdomineque postice flavis. *Syst. Ent.* 264. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 683. 1. *Fn. Sv.* 839.

Staphylinus niger villosus, capite thorace anoque pilis fulvo aureis. *Geoff. Inf.* 1. 363. 7.

Staphylinus Bombylius hirsutus niger, capite, thorace abdominalisque apice viridi flavis nitidis. *Degeer Inf.* 4. 20. 5.

Schaeff. monogr. 1754. tab. 2. fig. 12.

Icon. tab. 36. fig. 6.

Habitat in Europae locis arenosis.

- murinus.* 2. *S. pubescens cinereus nigro nebulosus*. *Syst. Ent.* 265.
 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 683. 2. *Fn. Sv.* 840.

Staphylinus villosus e fusco cinereoque viridi tessellatus. *Geoff. Inf.* 1. 362. 6.

Staphylinus villosus griseo fusco virescens nigro nebulosus, abdome conico, maculis nigris, capite maximo. *Degeer Inf.* 4. 12. 1. tab. 1. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 11.

Habitat in cadaueribus, fimo.

Elytra subtus coerulea.

Larua hexapoda nuda, pallida capite segmentisque tribus anterioribus brunneis. Cauda setis duabus articulatis subtusque tuberculo pediformi, cylindrico tubuloso. *Stroem. Att. Nidros.* 6.

- maxillo-fus.* 3. *S. pubescens niger*, fasciis cinereis. *Syst. Ent.* 265. 3.
Linn. Syst. Nat. 2. 683. 3. *Fn. Sv.* 841.

Staphylinus ater extremo antennarum articulo lunato. *Geoff. Inf.* 1. 360. 1. tab. 7. fig. 1.

Staphylinus balteatus niger nitidus, abdome subtus elytrisque fascia transuersali griseo cinerea punctis nigris. *Degeer Inf.* 4. 18. 4. tab. 1. fig. 7. 8.

Staphy.

Staphylinus maior totus niger. *Raj. Inf.* 109. 1.

Scarabaeus maiusculus niger, forcipibus infestis. *List.*

Loqu. 391.

Ionst. Inf. tab. 17. fig. 1. 2. 3.

Bocc. Mus. 2. tab. 31. fig. A. A.

Schaeff. Icon. tab. 20. fig. 1.

Habitat in Europae sylvis rapina vicitans.

Adultior totus ater, glaber euadit.

Staphylinus olens totus niger, capite thoraceque scabriusculo. *Müll. Faun. Fridrichsd.* 23. 228. *Zool. Dan.* 97. 1090.

4. S. ater nitidus, capite vtrinque macula fulua. *Syst. oculatus.*

Ent. 265. 4. *

Habitat in noua Hollandia, Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

5. S. ater, elytris antennarum basi pedibusque rufis. *Syst. erythro-*

Ent. 265. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 683. 4. *Fn. Sv.* 842. *pterus.*

Staphylinus ater non nitens, elytris pedibusque rufis.

Geoff. Inf. 1. 364. 9.

Scarabaeus rapax elytris breuibus. *Frisch. Inf.* 5. 49.

tab. 25.

Degeer Inf. 4. 21. 6.

Stroem. Act. nidros. 3. 404. tab. 5. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 2.

Elem. tab. 117.

Habitat saepius in Europae fimo.

6. S. ater, capite rufo, elytris violaceis. *Syst. Ent.* 265. 6. * *erythrocephalus.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

7. S. niger, thorace elytrisque nitidis. *Syst. Ent.* 166. 7. *politus.*

Linn. Syst. Nat. 2. 683. 5. *Fn. Sv.* 843.

Staphylinus ater antennarum extremo articulo subgloboso, elytris thorace breuioribus. *Geoff. Inf.* 1. 361. 3.

Staphylinus niger nitidus, antennis obscure fuscis, ab domine elongato. *Degeer Inf.* 4. 22. 7.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 12.

Scop. carn. 304.

Habitat in Europae cadaueribus.

Recens odorem ambrosiacum spargit.

- brunni-* 8. *S. niger*, pedibus antennarum basi apiceque ferrugineis.
pes. Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et magnitudo *S. politi*. Antennae nigrae articulo primo et vltimis duobus ferrugineis. Caput et thorax atra, nitida oculis albis. Elytra et abdomen atra, at obscuriora. Pedes rufi.
- margina-* 9. *S. ater*, thoracis lateribus pedibusque flauis. *Syst. Ent.*
tus. 266. 8. *
Staphylinus marginatus. Act. Nidros. 4. 332. 33.
 Habitat in Anglia, captus die II. Maii, in Norwagia die 16. Iun.
- flaue-* 10. *S. ater*, pedibus rufis, elytrorum margine flauo. *Syst.*
scens. *Ent.* 266. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 684. 13. *Fn. Sv.* 850.
 Habitat in Europa boreali.
- obtusus.* 11. *S. testaceus*, elytris antice anoque nigris. *Syst. Ent.*
 266. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 684. 9.
 Habitat in Anglia, Germania.
- pusilla-* 12. *S. niger*, elytris puncto ferrugineo. *Syst. Ent.* 266. 11.
tus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 685. 16. *Fn. Sv.* 847.
 Habitat in Europa boreali.
- egutta-* 13. *S. niger*, elytris puncto albido, oculis prominulis.
tus. *Gen. Inf. Mant.* 241. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 685. 15.
Fn. Sv. 851.
 Habitat ad littora maris balthici.
- clavicor-* 14. *S. niger* immaculatus, thorace rotundato laeui, anten-
 nis extrorsum crassioribus. *Gen. Inf. Mant.* 241. *
Habitat Kiliae. Dom. Lund.
- fuscipes.* 15. *S. ater*, elytris pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 266.
 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 685. 23. *Fn. Sv.* 857.
 Habitat in Europae stercore.
- hypno-* 16. *S. ater* laeuis, thoracis lateribus, elytris pedibusque
rum. testaceis. *Syst. Ent.* 266. 13. *
 Habitat in Anglia.

17. *S. ater*, thoracis marginibus flauescentibus, elytris *nitidulus*. ferrugineis, margine nigro.
 Habitat in Suecia. *Mus. Dom. Banks.*
Duplo minor S. Hypnorum. Antennae nigrae basi flauescentes. Caput et thorax glabra, atra margine flaueseante. Elytra testacea margine nigro. Pedes flauescentes.
18. *S. ater*, thorace, elytris pedibusque rufis. *Syst. Ent.* *merdarius.* 266. 14. *
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
19. *S. thorace rufo*, elytris fuscis, puncto baseos margine- *atricapil-* que postico albis. *Syst. Ent.* 267. 15. * *tus.*
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
20. *S. ater*, elytrorum margine laterali et postico ferru- *marginel-* gineis. *lus.*
 Habitat in Angliae stercore. *Mus. Dom. Banks.*
Medius. Caput, thorax, abdomen, pedes atra immaculata, obscura vix punctata. Elytra atra, at margine laterali et postico obscure ferrugineo.
21. *S. niger*, thorace, elytris pedibusque testaceis. *Syst. chrysome-* *Ent.* 267. 16. *Linn. Syst. Nat.* 2. 685. 21. *Fn. Sv.* *linus.* 825.
Geoff. Inf. 1. 368. 18.
 Habitat in Europa boreali.
22. *S. ater glaber*, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 267. 17. *Linn. rufipes.* *Syst. Nat.* 2. 685. 24. *Fn. Sv.* 858.
Staphylinus niger, thorace marginato laeui, pedibus rufis. *Geoff. Inf.* 1. 367. 19.
Staphylinus ouatus glaber niger nitidus, pedibus rufis, elytris amplis, abdominis apice truncato. *Degeer Inf.* 4. 24. II. tab. 1. fig. 14.
 Habitat in Europa.
 Variat colore omnino testaceo et nigro pedibus testaceis.
23. *S. flavius immaculatus.* *Syst. Ent.* 267. 18. *Linn. Syst. caraboides.* *Nat.* 2. 685. 20. *Fn. Sv.* 854.

*Staphylinus fulvus rufo flavius postice niger, elytris
pedibusque testaceis, antennis longitudine corporis.
Degeer Inf. 4. 25. 12.
Habitat in Europa boreali.*

rugosus. 24. S. niger, thorace elytrisque rugosis. *Syst. Ent.* 267.
19. *
Habitat in Anglia.

piceus. 25. S. niger, thorace depresso, lineis eleuatis tribus, ely-
tris piceis. *Syst. Ent.* 267. 20. *Linn. Syst. Nat.* 2.
686. 25.
Habitat in Europa boreali.

84. O X Y P O R V S.

rufus. 1. O. rufus, capite elytrorum abdominisque posticis ni-
gris. *Syst. Ent.* 267. 1.

Staphylinus rufus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 684. 6. *Fn. Sv.* 844.

*Staphylinus flavius capite, elytris abdomineque postice
nigris.* *Geoff. Inf.* 1. 370. 22.

Staphylinus, capite elytrorum abdominisque posticis
nigris. *Degeer Inf.* 4. 24. 10. tab. 1. fig. 11. 12.

*Staphylinus pallide rufus, elytris coerulecentibus, ca-
pite et apice abdominis nigris.* *Gad. Sat.* 80.

Schaeff. Icon. tab. 35. fig. 3.

Habitat in Europae boletis.

lunulatus. 2. O. flavius, elytris nigris basi apiceque pallidis. *Syst.
Ent.* 268. 2.

Staphylinus lunulatus rufus, capite abdominis elytro-
rumque posticis nigris, femoribus totis rufis. *Linn.
Syst. Nat.* 2. 689. 7. *Fn. Sv.* 845.

Habitat in Europae boletis.

Caput nigrum. Abdomen apice nigrum annulo albo.

thoraci- 3. O. nigricans thorace rufo, elytris fuscis basi albis.
cus. *Gen. Inf. Mant.* 241. *

Habitat in boletis Kiliae, capt. d. 11. Iul. *D. de Sche-
stedt.*

4. *O. nigricans*, thorace elytrisque pallidis. *Gen. Inf. pygmaeus.*
Mant. 241. *
 - Habitat in boletis, capt. Kiliae d. II. Iul. *Dom. de Scheftedt.*
5. *O. niger*, elytris tibiisque fuscis. *Syst. Ent. 268.* 3. *flavipes.*
Linn. Syst. Nat. 2. 685. 22. *Fn. Sv. 856.*
Habitat in Europae boletis.

85. P A E D E R V S.

1. *P. rufus*, elytris coeruleis, capite abdominisque apice *riparius.*
nigris. *Syst. Ent. 268.* 1.
Staphylinus riparius. *Linn. Syst. Nat. 2. 684.* 8. *Fn.*
Sv. 846. *Geoff. Inf. 1. 369.* 21. *Degeer Inf. 4. 28.* 14.
tab. 1. fig. 1.
Staphylinus gregarius. *Scop. carn. 308.*
Schaeff. Icon. tab. 71. fig. 3.
Habitat ad Europae ripas frequens.
2. *P. niger*, thorace rufo, elytris cyanis. *Gen. Inf. Mant. ruficollis.*
241. *
- Habitat Kiliae sub lapidibus. *Dom. de Scheftedt.*
3. *P. niger*, elytris postice pedibusque fuluis. *Syst. Ent. elongatus.*
268. 2.
Staphylinus elongatus. *Linn. Syst. Nat. 2. 685.* 14.
Habitat in Europa boreali.

C L A S S I S I I.

V L O N A T A.

86. F O R F I C V L A.

auricula- 1. **F.** elytris apice albis, antennis 14 articulatis. *Syst. Ent.* 269. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 686. 1. *Fn. Sv.* 860. *Geoff. Inf.* 1. 375. 1. *Scop. carn.* 312.

Forficula maior fusca pedibus testaceis, antennis articulis 14. *Degeer Inf.* 3. 545. 1. tab. 25. fig. 16.

Forficula auricularia vulgaris. *Mouff. Inf.* 171. fig. inf.

Forficula vulgaris. *Petiv. Gazoph.* tab. 74. fig. 5.

Scarabaeus subrufus cauda furcata. *List. Scar. Angl.*

391. 25.

Frisch. Inf. 8. 31. tab. 15. fig. 1. 2.

Ionst. Inf. tab. 16. fig. 2.

Merian. Inf. tab. 30.

Sulz. Inf. tab. 7. fig. 50.

Hist. Inf. tab. 7. fig. 17.

Schaeff. Elem. tab. 63.

Icon. tab. 144. fig. 3 4.

Habitat in Europae fructibus frequens.

Aures dormientium intrare creditur, pellitur spiritu frumenti.

spuncta- 2. **F.** nigra, capite postice pedibusque rufis, elytris macula alba.

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Antennae articulis 11 nigris. Caput nigrum postice rufum. Thorax marginatus niger margine rufo. Elytra nigra macula magna versus suturam albida marginaque pallescente. Abdomen nigrum. Forceps acuta, recta.

minor. 3. **F.** elytris testaceis immaculatis, antennis 10 articulatis. *Syst. Ent.* 269. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 686. 2. *Fn. Sv.* 861. *Geoff. Inf.* 1. 376. 2.

Forfi-

Forficula minor fusca, capite thoraceque nigris, pedibus flauis, antennis articulis 11. *Degeer Inf.* 3. 553.
2. tab. 25. fig. 26. 27.

Schaeff. Icon. tab. 41. fig. 12. 13.

Habitat in Europa rarius.

Antennarum apex albicat.

4. F. forcipe flexuosa, elytris punctis duobus flauis. *Syst. flexuosa.*
Ent. 269. 3. *

Habitat Caiennae. *Dom. Mauduit.*

5. F. antennis decem articulatis fusca, thoracis marginibus pedibus pallidisque, forcipe basi dentata. *Syst. dentata.*
Ent. 270. 4. *

Habitat in Madera insula. *Mus. Dom. Banks.*

6. F. nigra, thoracis marginibus, elytris pedibusque pallidis, forcipe recta inermi. *Syst. Ent.* 270. 5. *

Habitat in insula Madera. *Mus. Dom. Banks.*

7. F. atra, antennis fascia alba. *Syst. Ent.* 270. 6. * *Morio.*
Habitat in insula Otaheita maris pacifici. *Mus. Dom.*

Banks.

8. F. forcipe elongata vnidentata nigra, pedibus albis. *pallipes.*
Syst. Ent. 270. 7. *

Habitat in insulis promontorii viridis. *Mus. Dom.*
Banks.

Antennae mihi defunt.

87. B L A T T A.

1. B. liuida, thoracis clypeo macula quadrata fusca. *Syst. gigantea.*
Ent. 271. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 687. 1. *Mus. Lud.*
Vlr. 106.

Gronov. Zooph. 633. tab. 16. fig. 3.

Seb. Mus. 3. tab. 77. fig. 1. 2.

4. tab. 85. fig. 17. 18.

Drury Inf. 2. tab. 36. fig. 2.

Habitat in America, Asia.

2. B. fusca, thorace elytrisque liuidis fusco variegatis. *Maderae.*
Habitat in Madera insula. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino B. giganteae, at paullo minor. Caput oliuaceum antennis fuscis. Thoracis clypeus transuersus liuidus punctis nigris maculatus. Elytra liuida sulcis duobus impressis, altero recto, altero arcuato, apice lineolis fuscis creberrimis variegata. Corpus oliuaceo fuscum.

- aegyptia-* 3. B. atra, thoracis margine antico albo. *Syst. Ent.* 271.
ca. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 687. 2. *Mus. Lud. Vlr.* 107.
 Gronov. Zooph. 637. tab. 15. fig. 2.
 Drury Ins. 2. tab. 36. fig. 3.

Habitat in Aegypto, Oriente.

- surina-* 4. B. liuida, thoracis margine antico albo. *Syst. Ent.* 271.
menis. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 687. 3.
 Sulz. Ins. tab. 8. fig. 1.
 Degeer Ins. 3. tab. 44. fig. 8.

Habitat Surinami.

- america-* 5. B. ferruginea, thoracis clypeo postice exalbido. *Syst.*
na. *Ent.* 271. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 687. 4.
Blatta fusco flauescens, elytris sulco ouato impressis
 abdоминe longioribus. *Geoff. Ins.* 1. 381. 2.
Blatta ferruginea, thoracis clypeo flauescente, inacu-
 lis lineis marginaque postico nigris, abdоминe rufo,
 antennis longissimis. *Degeer Ins.* 3. tab. 44. fig.
 1. 2. 3.
Blatta molendinaria ab insula Iamaica allata maior.
Raj. Ins. 68.
Merian. Sur. 1. tab. 1.

Habitat in America; nuper incipit in Europa sacharo
 allata.

- australa-* 6. B. ferruginea, thorace atro, annulo albo, elytris basi
siae. lineola alba. *Syst. Ent.* 271. 5. *
 Capta frequens in naue e mari pacifico insulisque Au-
 stralasiae reuertente.

erythro- 7. B. atra, capite pedibusque ferrugineis.

cephala. Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum, atrum. Caput ferrugineum antennis
 oculisque atris. Thoracis clypeus rotundatus, ater,
 imma-

immaculatus. Elytra et abdomen atra. Pedes ferruginei.

8. *B. grisea*, thorace atro, margine antico albo. *Syst. Ent. indica.*
272. 6. *

Habitat in India orientali. *D. Koenig.*

9. *B. alba*, antennis flavis. *Syst. Ent. 272. 7. Linn. Syst. nivea.*
Nat. 2. 688. 5.

Drury Inf. 2. tab. 36. fig. 1.

Degeer Inf. 3. tab. 44. fig. 10.

Habitat in America meridionali.

10. *B. pallida*, thorace elytrisque fusco irroratis, alis irrorata.
disco nigro. *Syst. Ent. 272. 8. **

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

11. *B. viridis*, antennis thoracisque linea laterali flavis, *viridis.*
alis albis. *Syst. Ent. 272. 9. **

Habitat in America. *Mus. Tottianum.*

12. *B. pallida*, abdomine atro. *Syst. Ent. 272. 10. ** *brasiliensis.*
Blatta abdomen nigrum. Degeer Inf. 3. 538. 3. tab. 44. fig. 5.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

13. *B. nigra*, elytris maculis quatuor flavescentibus. *Syst. petiueriana-*
Ent. 272. 11. *na.*

Cassida petiueriana. Linn. Syst. Nat. 2. 578. 28.

Cassida 7guttata nigra, coleoptris maculis septem ali-
bis. *Syst. Ent. 90. 26. Linn. Syst. Nat. 2. 577. 19.*

Blatta heteroclita. Pall. Spicil. Zoolog. fasc. 9. 9. tab.
1. fig. 5.

Cimici affinis niger. Petiv. Gazoph. tab. 71. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 11. fig. A. B.

Schroet. Abhandl. 1. tab. 1. fig. 7. 8.

Seb. Mus. 4. tab. 95. fig. 21.

Habitat in India.

Demis antennis statura omnino Cassidae.

14. *B. ferrugineo fusca inimaculata*, elytris sulco oblongo. *orientalis.*
Syst. Ent. 272. 12. Linn. Syst. Nat. 2. 688. 7.

Fu. Sv. 862. Geoff. Inf. 1. 380. tab. 7. fig. 5.

Blatta culinaris ferrugineo fusca, alis mari abdomine breuioribus, femina aptera. *Degeer Inf.* 3. 530. 1. tab. 25. fig. 1. 2.

Blatta prima seu *mollis* *Mouffeti*. *Raj. Inf.* 68. 1.

Blatta molendinaria. *Mouff. Inf.* 138. fig. 2. 3.

Scarabaeus alter testudinatus minor atque alatus. *Column. Ecphr.* 1. 40. tab. 36.

Grylli. *Ionst. Inf.* tab. 13. fig. A.

Blatta lucifuga s. *molendinaria*. *Frisch. Inf.* 5. tab. 3. *Sulz. Inf.* tab. 7. fig. 47.

Hift. Inf. tab. 8. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 155. fig. 6. 7.

Habitat in America, hospitatur nunc in Oriente adiacenteque Europa. Lucifuga consumit panem, cibaria, calceos etc. velocissime cursitans.

Femina aptera laruae simillima parit ouum magnitudine dimidii abdominis subcylindricum carina crenulata.

variega- 15. B. thorace flauescente, elytris testaceis apice nigris. *ta.* *Syst. Ent.* 273. 13. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

sapponi- 16. B. flauescens, elytris nigro maculatis. *Syst. Ent.* 273. *ca.* 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 688. 8. *Fn. Sv.* 863.

Blatta flauescens, elytris ad anguluni acutis striatis. *Geoff. Inf.* 1. 381. 3.

Blatta nigro fusca, thoracis margine elytrisque dilute griseis nigro maculatis. *Degeer Inf.* 3. 533. 2. tab. 25. fig. 8. 9.

Sulz. Hift. Inf. tab. 8. fig. 3.

Schaeff. Elem. tab. 26. fig. 2.

Icon. tab. 88. fig. 2. 3.

Habitat in Europa, cibaria consumens.

Thorax niger margine flauescente.

Variat rarius corpore multo breviori et thorace toto flauescente.

germani- 17. B. liuida, thorace lineis duabus atris parallelis. *Syst. ca.* *Ent.* 273. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 688. 9.

Blatta transfuga. *Atl. Dan.* 1. tab. 29.

Habi-

Habitat in Europa. In insulis australasiae Brasilia. *Mus.*
Dom. Banks.

18. *B. oblonga liuida*, thorace punctis duobus lunulaque *oblonga-*
nigris. *Linn. Syst. Nat. 2.* 689. 10. *ta.*

Blatta oblonga flavo testacea, thorace fascia punctis-
que duobus nigris, antennis hirsutissimis nigris. *De-*
geer Inf. 3. 541. 9. tab. 44. fig. 11.

Habitat Surinami.

19. *B. thorace ferrugineo, elytris cyaneis.* *nitidula.*

Habitat Surinami. *Mus. Dom. Banks.*

Minuta, nitida. Caput atrum fascia oris alba. Anten-
nae nigrae ante apicem albae. Thorax ferrugineus,
nitidus macula baseos nigra. Elytra cyanea, imma-
culata. Alae hyalinae, nitidae macula baseos apicis-
que nigra. Abdomen fuscum. Pedes pallentes.

88. M A N T I S.

1. *M. thorace teretiusculo scabro, elytris breuissimis, pe-* *Gigas.*
dibus spinosis. *Syst. Ent. 274. 1.* *Linn. Syst. Nat. 2.*
689. 1. *Mus. Lud. Vlr. 109.*

Arumatia. Margr. Brasf. 251.

Bradl. nat. tab. 27. fig. 6.

Petiv. Gazoph. tab. 60. fig. 2.

Seb. Mus. 4. tab. 77. fig. 1. 2.

Habitat in Asia.

2. *M. thorace scabro, elytris ouatis angulatis breuissimis, ne-* *cydalo-*
alis oblongis. *Syst. Ent. 274. 2.* *Linn. Syst. Nat. 2.* *loides.*
691. 14.

Gryllus necydalooides. Linn. Amoen. acad. 6. 397. 3.

Roeß. Inf. 2. Gryll. tab. 19.

Degeer Inf. 3. tab. 36. fig. 2.

Habitat in Asia.

3. *M. thorace quadrispinoso, elytris breuissimis basi ari-* *atrophi-*
stato mucronatis. *Mantis atrophica. Pall. Spic. Zool. fasc. 9. tab. 1.*

fig. 7.

Habitat in insula Iaua.

Caput inerme. Thorax spinis quatuor erectis acutis.
Elytra breuissima ouata basi aristata, apice truncata.

spinosa. 4. M. capite thoraceque spinosis, elytris breuissimis acutis. *Syst. Ent.* 274. 3. *
Habitat in India.

spinosa. 5. M. thorace teretiusculo antice bispinoso, elytris breuissimis, margine flauo. *Syst. Ent.* 274. 4. *
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

iamaicensis. 6. M. linearis viridis, elytris breuissimis margine exteriori flauis.

Mantis iamaicensis. *Drury Inf.* 2. tab. 49. fig. 1.
Habitat in Iamaica.

Affinis M. laterali, at corpus totum viride elytris solis margine exteriori flauis. Antennae fuscae. Alae pallide roseae margine exteriori viridi.

lateralis. 7. M. linearis nigra, elytris breuissimis gibbis, lateribus flauis. *Syst. Ent.* 275. 5. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

gongyloides. 8. M. thorace apice dilatato, femoribus anticis spina terminatis, reliquis lobo. *Syst. Ent.* 275. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 690. 4. *Mus. Lud. Vlr.* 112.

Gryllus thorace linearis alarum longitudine, in margine denticulis ciliato. *Linn. Amoen. acad.* 1. 504.

Mantis. *Aldrov. Inf.* tab. 13. fig. 21.

Guayara. *Margr. Bras.* 246.

Drury Inf. 1. tab. 56. fig. 2.

Roef. Inf. 2. *Gryll. tab.* 7.

Sulz. Hist. Inf. tab. 8. fig. 56.

Seb. Mus. 4. tab. 68. fig. 9 - 12.

Aub. Miscell. tab. 65. fig. 2.

Habitat in Africa, Asia.

Caput vertice subulato, bifido rarius antennis pectinatis.

paupera. 9. M. thorace linearis spinulofo, femoribus anticis spina terminatis, reliquis lobo.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.* In Lusitania. *D. Gray.*

Minor

Minor M. gongylode. Caput vertice subulato, bifido.

Thorax elongatus, filiformis spinis rarioribus ciliatus. Elytra albida margine exteriori viridi et ante marginem baseos lineola abbreviata, flavescentes. Pedes pallidi, viridi variegati, femoribus anticis spina terminatis, reliquis lobo rotundato, at tantum latere exteriori.

10. M. thorace marginato dentato, elytris albo viridique mendica. variis, margine albo punctato. *Syst. Ent.* 275. 7. *

Habitat Alexandriae. *Prof. Forskahl.*

11. M. thorace vtrinque membranaceo dilatato obcordato, stiruma. *Syst. Ent.* 276. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 691. 13.

Roes. Inf. 2. *Gryll. tab.* 3.

Merian. Inf. Surin. tab. 27.

Seb. Mus. 4. tab. 69. fig. 7. 8.

Habitat in Indiis,

12. M. thorace lateribus expanso lobato, capite cornu- tricolori- to, pedibus anticis latissimis. *Syst. Ent.* 276. 11.

Linn. Syst. Nat. 2. 691. 12. *Mus. Lud. Vlr.* 117.

Habitat in India.

Oculi in cornicula auriformia acuta desinunt.

13. M. thorace vtrinque dilatato membranaceo plano. *Syst. cancella-* ta. *Ent.* 276. 12. *

Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

14. M. thorace denticulato, femoribus ouatis membrana- fuscifolia. ceis. *Syst. Ent.* 276. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 689. 3.

Mus. Lud. Vlr. 111.

Roes. Inf. 2. *Gryll. tab.* 17.

Edw. Av. tab. 258.

Merian. Sur. tab. 66.

Seligman. Av. 7. tab. 48.

Habitat in Indiis.

15. M. thorace laeui, vertice subulato, antennis pectina- pectini- tis. *Syst. Ent.* 276. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 691. 10. cornis.

Gryllus pectinicornis. *Linn. Amoen. acad.* 6. 396. 27.

Drury Inf. 1. tab. 50. fig. 1.

Habitat in Indiis, in Iamaica. *Drury.*

oculata. 16. M. thorace triangulo filiformi, oculis oblongis porrectis acuminato spinosis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Caput pallidum oculis magnis acuminato conicis, porrectis, acutis et sub oculis os et antennae. Thorax valde elongatus, filiformis, triangularis, laevis, testaceus angulis obscurioribus. Elytra alis breviora, albo hyalina, striata, obtusa. Alae acutiores, concolores. Pedes elongati, simplices, obscuri.

supersti- *tiosa*. 17. M. thorace filiformi triangulo antice serrulato elytris virescentibus, alarum costa transuerso striata.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Thorax valde elongatus, triangularis antice scaber margine serrulato, postice laevis. Elytra virescentia. Alae ex albida costa lineolis transuersis, elevatis abbreviatis fuscis.

irrorata. 18. M. thorace laeui subcarinato, elytris viridibus, punctis ferrugineis vagis. *Syst. Ent.* 276. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 690. 7. *Amoen. acad.* 6. 397. 29.

Habitat in America meridionali.

oratoria. 19. M. thorace laeui, clytris viridibus immaculatis. *Syst. Ent.* 276. 14.

Mantis oratoria thorace laeui, elytris viridibus, alis macula nigra antice rufescens. *Linn. Syst. Nat.* 2. 690. 6. *Mus. Lud. Vlr.* 115.

Mantis. Geoff. Ins. 1. 399. 1. tab. 8. fig. 4.

Roef. Ins. 2. tab. 1. 2.

Mouff. Ins. 118. fig. 3.

Aldrov. Ins. 4. tab. 3. fig. 10.

Degeer Ins. 3. tab. 37. fig. 2.

Seb. Mus. 4. tab. 67. fig. 9. 10.

5. *Mantis religiosa* thorace laeui subcarinato elytris que viridibus immaculatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 690. 5.

Roef. Ins. 2. *Gryll.* tab. 1. 2.

Schaeff. Elem. tab. 81.

Sulz. Hist. Ins. tab. 8. fig. 4.

Seligm. Av. 5. tab. 4.

Seb. Mus. 4. tab. 67. fig. 7. 8.

Habitat

Habitat in Oriente, Europa australi.

In Gallia australiori infantibus viam monstrare creditur. Reaum.

20. M. thorace subciliato, elytris virescentibus, ocello *precaria*. ferrugineo. *Syst. Ent.* 277. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 691. 8. *Mus. Lud. Vlr.* 114.

Mantis thorace marginato spinoso, elytris flavis, macula fusca, antennis thorace brevioribus, pedibus anticus cheliformibus. *Degeer Inf.* 3. 406. 3. tab. 36. fig. 4.

Merian. Surin. tab. 66.

Seb. Mus. 4. tab. 67. fig. 3 - 6.

Habitat in America, Africa.

Ocellus ferrugineus antice dimidiato albus.

Variat rarius macula elytrorum alba loco ocelli.

21. M. thorace ferrulato, obscure grisea, elytris macula *obscura*. baseos, alis apicis nigris.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at minor. Caput obscure griseum macula frontali nigra. Thorax lateribus ferrulatus obscurus linea dorsali nigra. Elytra obtusa, obscure macula magna baseos interioris nigra. Alae obscurae macula magna atra marginis exterioris versus apicem. Pedes antici serrati, reliqui simplices.

22. M. thorace ciliato, elytris hyalinis, margine viridi, *hyalina*. fronte bidentata. *Syst. Ent.* 277. 16.*

Mantis hyalina. *Degeer Inf.* 3. 410. 4. tab. 37. fig. 1.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

23. M. thorace laevi, alis hyalinis, elytrorum margine *fenestra*- exteriori fuscō. *ta.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Caput griseum oculis prominentibus globosis et inter oculos stemmata elevata, globosa. Thorax filiformis, laevis, obscure pallidus. Elytra albo hyalina margine exteriori fuscō. Alae albo hyalinae margine exteriori apice fuscō. Pedes pallidi tibiis anticus interne punctis aliquot atris.

- bidens.* 24. M. thorace scabro, elytris viridibus, fasciis nigris, alis fuscis, disco atro. *Syst. Ent.* 277. 17. *
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
- ministra-* 25. M. thorace scabro crenato longitudine capitis antice ferrugineo, elytris viridibus. *Syst. Ent.* 277. 18. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- urbana.* 26. M. thorace integro, elytris viridibus, puncto fascia- que ferrugineis. *Syst. Ent.* 278. 19.
Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*
- rufica.* 27. M. thorace laeui fuscō, elytris ala breuioribus fusco hyalinis, antennis pilosis.
Habitat ad littora Patagoniae. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo M. paganae. Caput griseo fuscum stemma- tibus valde eleuatis, globosif. Antennae pilis breui- bus hispidae. Thorax linearis, laeuis, griseo fu- scus. Elytra alis breuiora, obtusa, obscura, fusco hyalina. Pedes flauescentes.
- lobata.* 28. M. thorace trilobo, capitī fronte cornu bifido, oculi conico acuminatis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Parua. Os viride fulcoque varium. Frons virescens cornu inter antennas porrecto, lato apice bifido. Antennae nigrae. Vertex fuscus. Oculi magni, conico acuminati, testacei. Thorax breuis, obscure virescens margine lateralī et postico dilatatis in lobum maiorem, rotundatum, integrum. Elytra vi- ridia basi maculaque media albis. Alae nigrae apice albae. Corpus viridi alboque varium abdominis margine eleuato, lobato.
- pagana.* 29. M. alis reticulatis albis, macula laterali ferruginea, manibus chelatis. *Syst. Ent.* 278. 20. *
Mantis Perla. Pall. Spicil. Zoolog. fasc. 9. 14. tab. 1. fig. 8.
Habitat in Gallia, Germania.
- minuta.* 30. M. thorace cylindrico flauescente, elytris hyalinis co- sta virescente. *Syst. Ent.* 278. 21. *

Habitat

Habitat in America meridionali. *Mus. Dom. Banks.*
*Elytra hyalina margine exteriori virescente puncto que
 medio paruo albo. Alae rufescentes apice hyalinac
 margineque interiori nigricantes.*

31. M. thorace cylindrico flavescente, elytris alisque hyalinis immaculatis. *Gen. Inf. Mant.* 241. *

*Mantis pusilla. Pall. Spicil. Zoolog. fasc. 9. 15. tab. 1.
 fig. 9.*

Habitat in Africa, ad Cap. bon. sp.

Vix Raphidia ophiopsi maior.

-89. A C R Y D I V M.

1. A. thoracis scutello abdominis longitudine. *Syst. Ent.* 2punctatum. 278. 1.

*Acrydium elytris nullis, thorace producto, abdomine
 aequali. Geoff. Inf. 1. 394. 5.*

*Gryllus 2punctatus. Linn. Syst. Nat. 2. 693. 7. Fn. Sv.
 884.*

*Acrydium scutellatum fuscum punctis duobus nigris,
 elytris nullis, thoracis scutello abdominis longitudi-
 ne alas tegente. Degeer Inf. 3. 483. 11. tab. 23.
 fig. 15.*

*Locusta minor fuscescens cucullo longo rhomboide.
 Raj. Inf. 60.*

Scop. Ent. carn. 316.

Lepechin. Itiner. tab. 4. fig. 1. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 8. fig. 6.

Habitat in Europae coilibus arenosis, apricis.

2. A. thoracis scutello abdome longiore. *Syst. Ent.* subulatum. 279. 2.

*Acrydium elytris nullis, thorace producto abdome
 longiore. Geoff. Inf. 1. 395. 6.*

*Acrydium subulatum fuscum, elytris nullis thoracis
 scutello abdome longiore alas tegente. Degeer
 Inf. 3. 484. 12. tab. 23. fig. 17.*

*Gryllus subulatus. Linn. Syst. Nat. 2. 693. 8. Fn. Sv.
 865.*

Sulz.

Sulz. *Hist. Inf.* tab. 8. fig. 7.

Schaeff. *Icon.* tab. 161. fig. 2. 3.

tab. 154. fig. 9. 10.

Habitat cum praecedente.

Praecedenti nimis affinis et forte eius mera varietas.

90. TRUXALIS.

nasutus. 1. T. capite conico, corpore viridi. *Syst. Ent.* 279. 1.

Gryllus nasutus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 692. 1. *Mus.* *Lud. Vir.* 118.

Mantis africana. *Mouff. Inf.* 119.

Roes. Inf. 2. *Gryll.* tab. 4.

Sulz. *Inf.* tab. 8. fig. 57.

Hist. *Inf.* tab. 8. fig. 5.

Drury Inf. 2. tab. 40. fig. 1.

Seb. Mus. 4. tab. 96. fig. 41.

β. *Gryllus turritus* capite conico, antennis ensiformibus, alis hyalinis. *Linn. Syst. Nat. Ed.* X. 427.

Seb. Mus. 4. tab. 80. fig. 1. 2.

tab. 96. fig. 46.

Habitat in Africa.

Animaleculum valde distinctum, capite porrecto conico, apice antennis, basi ore instructo.

conicus. 2. T. capite conico, corpore fusco, elytrorum costa dimidiata viridi, linea punctorum alborum.

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis affinis T. nasuto. Antennae fuscae ensiformes thorace longiores. Caput conicum fuscum lateribus baseos viridibus. Thorax fuscus lateribus maculaque dorsali baseos viridibus. Elytra fusca costa baseos viridi linea punctorum alborum. Corpus fuscum.

breuicor- 3. T. capite prominulo viridis, antennis compressis longitudine thoracis. *Syst. Ent.* 279. 2.

Gryllus breuicornis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 692. 2. *Amoen. acad.* 6. 398. 37.

Acrydium ensicorne viride capite conico, antennis compressis, alis hyalinis. *Degeer Inf.* 3. 499. 16. tab. 41. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

91. A C H E T A.

1. A. alis caudatis elytro longioribus, pedibus anticis pal- *gryllotal-*
matis. *Syst. Ent.* 279. 1. *pa.*

Gryllus gryllotalpa. *Linn. Syst. Nat.* 2. 693. 10. *Fn.*
Sv. 806. *Geoff. Inf.* 1. 387. 1. *Scop. carn.* 317.

Gryllus supra fuscus, subtus ferrugineo flavius, pedi-
bus anticis latis compressis denticulatis. *Degeer Inf.*
3. 517. 2.

Gryllotalpa. *Raj. Inf.* 64.

Gryllotalpa. *Ionst. Inf.* tab. 12. fig. vlt.
Catesb. Carol. 1. tab. 8.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 14. 15.

Frisch. Inf. 11. tab. 5.

Sulz. Inf. tab. 9. fig. 59.

Schaeff. Icon. tab. 37. fig. 1.

Barth. Att. Hafn. 4. p. 5. fig. 1—6.

Seb. Mus. 4. tab. 89. fig. 3. 4.

Habitat in Europae, Americae borealis cultis, horto-
rum pestis.

Allicitur fino equino, pellitur porcino. *Scop.*

Nidum e gleba struunt, quam aura secca et calida attol-
lere perperam affirmat *Goedart.*

2. A. elytris alisque caudato conuolutis. *Syst. Ent.* Ap- *monstro-*
pend. 826. *sa.*

Gryllus monstrosus. *Drury Inf.* 2. tab. 42. fig. 1.

Habitat in India.

3. A. alis caudatis elytro longioribus, corpore glauco. *domestica.*
Syst. Ent. 280. 2.

Gryllus domesticus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 694. 12. *Fn.*
Sv. 868. *Scop. carn.* 318.

Gryllus pedibus anticis simplicibus. *Geoff. Inf.* 1. 389. 2.

Gryllus domesticus. *Raj. Inf.* 63.

Gryllus domesticus. *Mouff. Inf.* 135.

Gryllus griseo fuscus pallidus, capite fasciis fuscis ob-
scurus. *Degeer Inf.* 3. 509. 1. tab. 24. fig. 1. 2.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 12.

Ionst. Inf. tab. 12.

Huffnag. Inf. p. 11. fig. 4.

Seb. Mus. 4. tab. 65. fig. 24.

Fabr. Spec. Inf.

Z

Hospit.

Hospitatur in Europae muris domesticis, tota nocte stridens, praesertim instanti pluuiia. Lactatur calore fornacum.

Vescitur fanie et liquore carnium. *Raj.*

Blattis non cohabitare affirmat *Poda.*

Necatur pillulis ex Arsenico et radice Dauci recentis farina tritici mixtis. Nymphaeae lacti incoctae radicibus. *Linn.*

affimilis. 4. A. alis caudatis elytro longioribus, abdomine stylis duobus apice fissis. *Syst. Ent.* 280. 3. *

Habitat in Americae meridionalis insulis.

reticula- 5. A. nigra, elytris rufo reticulatis, antennis albo annulatis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae corpore duplo longiores, nigrae annulis septem albis. Caput flavescentia vertice nigro. Thorax niger macula media flava. Elytra brevia, obtusa, nigra rufo valde reticulata. Abdomen atrum stylis duobus villofis enseque ascendentente fusco.

brasiliensis. 6. A. alis caudatis elytris longioribus fusca, dorso pallidiore, cauda ascendentente longitudine corporis. *Syst. Ent.* 280. 4. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

orientalis. 7. A. alis caudatis elytris longioribus albis, corpore atro, capite pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 281. 5. *

Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*

capensis. 8. A. alis caudatis elytris longioribus nigra, elytris fuscis, basi flavis. *Syst. Ent.* 281. 6. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Morio. 9. A. alis caudatis elytro longioribus albis apice nigris, corpore atro.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo A. campestris. Corpus atrum, immaculatum, oculi testacei. Elytra apice rotundata. Alae solae albae apice nigrae. Ensis elongatus, filiformis, fuscus.

10. A. alis elytro breuioribus, corpore nigro, stylo linea- *campe-*
 ri. *Syst. Ent.* 281. 7. *stris.*

Gryllus campestris. Linn. *Syst. Nat.* 2. 695. 13. *Mus.*
Lud. Vlr. 124. *Scop. carn.* 319.

Gryllus campestris Mouffeti. *Raj. Inf.* 63.

Roef. Inf. 2. *Gryll. tab.* 13.

Frisch. Inf. 1. *tab.* 1.

Schaeff. Elem. *tab.* 66.

Icon. tab. 157. *fig.* 2. 3. 4.

Seb. Mus. 4. *tab.* 65. *fig.* 23.

tab. 96. *fig.* 24.

Habitat in Europa australiori.

Stridet a primo die Maii ad aequinoctium, domestica
 facta pellit A. domesticam. *Stop.*

Coniunxit *Geoffroy* hanc cum A. domesticata, at vix vlo-
 iure. Et character et habitus nimis differunt.

11. A. alis caudatis elytro longioribus albis, costa fusca, *hospes.*
 elytris nigris albo maculatis. *Syst. Ent.* 281. 8. *

Habitat in America. *Dom. Eaton.*

12. A. capite thoraceque flauescens, elytris aqueis lon- *italica-*
 gitudine alae.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Parua. Antennae corpore longiores flauescentes. Ca-
 put et thorax flaua, immaculata oculis nigris. Ely-
 tra plana apice rotundata aquei coloris. Alae vix
 elytris longiores, conuolutae, acutae. Abdomen
 nigrum, cauda setis duabus villosis. Pedes antici
 flauescentes, postici fusi pedibus spinosis.

13. A. thorace rotundato flauescens, alis caudatis, cauda *minuta.*
 bifeta, tibiis posticis trispinosis. *Syst. Ent.* 282. 9.

Gryllus minutus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 694. 11.

Gryllus testaceus flauo testaceus, antennis corpore tri-
 plo longioribus, cauda feminae ensifera recurvata.

Degeer Inf. 3. 524. 8. *tab.* 43. *fig.* 8.

Habitat in America meridionali.

Gryllus grylloides. Pall. *Sp. Zool.* *tab.* 1. *fig.* 10. nul-
 lo modo hoc pertinet.

92. L O C V S T A.

- citrifolia*. 1. L. thorace tetragono, angulis crenatis. *Syst. Ent.* 282. 1.
Gryllus citrifolius. *Linn. Syst. Nat.* 2. 695. 16. *Mus. Lud. Vlr.* 125. *Gronov. Zooph.* 657.
Locusta viridis thorace tetragono, marginibus scabris.
Degeer Inf. 3. 437. 7. tab. 37. fig. 3.
Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 16. fig. 1.
Habitat in Indiis.
- laurifo-* 2. L. thorace tetragono laeui, alis lanceolatis elytro obtusiore longioribus. *Syst. Ent.* 282. 2.
Locusta oblongifolia thorace subtetragono plano, corpore fusco, elytris viridibus ouatis ala breuioribus, pedibus posticis longissimis. *Degeer Inf.* 3. 445. 6. tab. 38. fig. 2.
Gryllus laurifolius. *Linn. Syst. Nat.* 2. 695. 17. *Mus. Lud. Vlr.* 126.
Locusta maxima viridis, alis latissimis. *Sloan. Iam.* 2. 201. tab. 236. fig. 1.
Tucurubi. *Margr. Bras.* 246.
Habitat in America, noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Elytra dorso gibba.
- myrtifo-* 3. L. thorace subtetragono laeui, alis deflexis elytro longioribus, ense breuissimo recurvo. *Syst. Ent.* 282. 3.
Gryllus myrtifolius thorace subtetragono laeui, alis deflexis elytro longioribus, tibiis muticis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 696. 18.
Locusta myrtifolia viridis pedibus testaceis, thorace tetragono plano, elytris ouatis ala acuminata breuioribus. *Degeer Inf.* 3. 447. 8. tab. 38. fig. 4.
Drury Inf. 2. tab. 41. fig. 2.
Habitat in America meridionali.
Femina ense breuissimo recurvo.
- camillifo-* 4. L. thorace deflexo, elytris concavis apice rotundatis ala longioribus *Syst. Ent.* 283. 4. *
Locusta siccifolia elytris maximis ouatis, erectis folii formibus. *Degeer Inf.* 3. 438. 2. tab. 37. fig. 5.
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

5. L. thorace tetragono laeui, elytris sublinearibus fuscō *thypho-*
punctatis, alis breuioribus. *Syst. Ent.* 283. 5. * *lia.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Variat colore viridi et ferrugineo.
6. L. thorace tetragono, elytris filiformibus fuscis ala *gramini-*
brevioribus, capite acuminato. *Syst. Ent. Append.* *folia.*
 826. *.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
7. L. thorace deflexo, elytris concavis viridibus, basi ocel- *perspicil-*
lo dorsali vitreo. Syst. Ent. 283. 6. * *lata.*
 Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
8. L. thorace rotundato, elytris viridi hyalinis ala *brevi-*
oribus, pedibus anticis spinosis. *Syst. Ent.* 283. 7. *
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
9. L. viridis, antennis maxillisque flavis. *Syst. Ent.* *maxillo-*
 284. 8. * *sa.*
 Habitat in Americae insulis. *Dom. v. Rohr.*
10. L. thorace subquadrato laeui, elytris alisque griseis *elongata.*
 corpore longioribus. *Syst. Ent.* 284. 9.
Gryllus elongatus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 696. 20. *Mus.*
Lud. Vlr. 127.
Roef. Inf. 2. *Gryll. tab.* 18. fig. 7.
 Habitat in India.
11. L. thorace rotundato, elytris griseis basi ocello dor- *specula-*
fali vitreo, antennis longissimis. Syst. Ent. 284. 10. * *ris.*
 Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
12. L. thorace rotundato, alis ocello notatis. *Syst. Ent.* *ocellata.*
 284. 11.
Gryllus ocellatus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 696. 22. *Mus.*
Lud. Vlr. 129. *Gron. Zooph.* 649.
Seb. Mus. 4. tab. 73. fig. 7. 8.
 Habitat in Indiis.
13. L. thorace rotundato laeui, elytris oblongis alae ae- *lanceola-*
qualibus, fronte porrecta lanceolata subtus vniiden-
tata. Syst. Ent. 284. 12. * *ta.*
 Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

- acumina-* 14. L. thorace rotundato, vertice subulato, alis virescentia. tibibus longitudine corporis. *Syst. Ent.* 284. 13.
Gryllus acuminatus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 696. 23. *Mus. Lud. Vlr.* 130.
Locusta acuminata thorace rotundato, vertice cornuto laeui, femoribus spinosis, antennis nigris elytro longioribus. *Degeer Inf.* 3. 443. 4. tab. 37. fig. 8.
Sulz. Hist. Inf. tab. 9. fig. 1.
Sloan. Iam. 2. 202. tab. 236. fig. 3.
Habitat in America meridionali.
- conoce-* 15. L. thorace rotundato laeui, elytris oblongis ala breuioribus, capite conico obtuso. *Syst. Ent.* 285. 14.
Gryllus conocephalus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 696. 19.
Habitat in Africa.
Ensis ferrugineus.
- triops.* 16. L. vertice acuminato, subtus puncto ocellari nigro, elytris alae aequalibus. *Syst. Ent.* 285. 15.
Gryllus triops thorace rotundato, vertice acuminato, subtus puncto ocellari nigro, alis viridibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 697. 24. *Mus. Lud. Vlr.* 131.
Habitat in Indiis.
- coronata.* 17. L. thorace spinis erectis coronato, elytris varioloso concavis. *Syst. Ent.* 285. 17.
Gryllus coronatus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 697. 26.
Locusta coronata thorace spinis erectis coronato, elytris maculis concavis nigris, antennis corpore triplo longioribus. *Degeer Inf.* 3. 448. 9. tab. 38. fig. 5.
Habitat in Indiis.
- melano-* 18. L. thorace rotundato laeui, elytris abdomine dimidio breuioribus, alis nigris. *Syst. Ent.* 285. 18.
Gryllus melanopterus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 697. 28.
Mus. Lud. Vlr. 134.
Habitat in Indiis.
Elytra breuissima, ouata.
- coriacea.* 19. L. thorace rotundato laeui, elytris coriaceis, alis pallidis, antennis longissimis. *Syst. Ent.* 285. 19.

Gryllus

Gryllus coriaceus. Linn. Syst. Nat. 2. 697. 30. Mus.

Lud. Vlr. 136.

Habitat in Indiis.

20. L. thorace postice rotundato laeui, elytris cinereo *albifrons*. nigroque variis, capite pallido, ense apice ferrato.

Syst. Ent. 286. 20. *

Habitat in insula Madera. Mus. Dom. Banks. In Italia.

21. L. thorace laeui postice rotundato fusca, capite pal- *falx*. lido, ense falcato atro. Syst. Ent. 286. 21. *

Habitat in insula Madera. Mus. Dom. Banks.

22. L. thorace postice carinato rotundato fusca, ense fal- *grisea*. cato atro basi vtrinque pallido.

Habitat in Italia. D. Allioni.

Capit et thorax fusca, obscura antennis longitudine corporis flavescentibus. Elytra fusco cinereoque variegata. Alae hyalinae. Pedes virescentes.

23. L. alis viridibus immaculatis, antennis longissimis. *viridissima*. Syst. Ent. 286. 22.

Locusta cauda ensifera recta. Geoff. Inf. 1. 397. 2. tab. 8. fig. 3.

Locusta viridis cantatrix viridis immaculata, thorace rotundato, cauda seminae ensifera recta. Degeer Inf. 3. 428.

Gryllus viridissimus. Linn. Syst. Nat. 2. 698. 31. Fn. Sv. 869. Scop. carn. 320.

Agrigoneus. Linst. Goed. 301. tab. 121.

Robert. Icon. tab. 27.

Frisch. Inf. 12. tab. 2. fig. 1. 2.

Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 10. 11.

Schaeff. Elem. tab. 79.

Icon. tab. 139. fig. 3. 4. 5.

Goed. Inf. 65. tab. 40.

Zinann. Obs. tab. 7. fig. 7.

Habitat in Europae graminosis, noctu stridens.

24. L. alis viridibus fusco maculatis, antennis longitudi- *verrucu-* ne corporis. Syst. Ent. 286. 23. *nora*.

Locusta cauda ensifera curua. Geoff. Inf. 1. 398. 1.

Locusta verruciuora viridis, elytris fusco maculatis,
cauda feminae ensifera recurvata. *Degeer Inf. 3. 430.*
2. tab. 21. fig. 1. 2.

Gryllus verruciuorus. *Linn. Syst. Nat. 2. 698. 33. Fn.*
Sv. 870. Scop. carn. 321.

Locusta viridis maior. *Raj. Inf. 61.*

Locusta maior viridis. *Frisch. Inf. 12. tab. 2. fig. 1. 2.*
Ionst. Inf. tab. 11. fig. 1. 2. 3.

Merian. Inf. tab. 176.

Sulz. Inf. tab. 9. fig. 61.

Roeß. Inf. 2. Gryll. tab. 8.

Schaeff. Icon. tab. 62. fig. 5.

Habitat in Europae graminosis,

Rustici Sueciae huic insecto verrucas manus admouent,
quas praemordet et euomit in vulnus liquorem, unde verruca contabescit. *Linn.*

varia. 25. L. thorace viridi flavo lineato, fronte acuminata, antennis longissimis. *Syst. Ent. 287. 24. **

Locusta thalassina coeruleo viridis, antennis pedibusque flavescensibus, cauda feminae ensifera recurvata. *Degeer Inf. 3. 433. 3.*

Goed. Inf. 2. 142. tab. 40.

Frisch. Inf. 12. tab. 2. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 8. fig. 9.

Habitat in Lipsiae hortis,

brachyptera. 26. L. griseo fusca, elytris alisque corpore dimidio breuioribus.

Locusta brachyptera griseo fusca, thorace lineis duabus albis, elytris alisque abdomine breuioribus. *Degeer Inf. 3. 434. 4. tab. 22. fig. 2. 3.*

Gryllus brachypterus. *Linn. Fn. Sv. 868.*

Habitat in Europae borealis graminosis.

Ensis elongatus, recurvus.

Papa. 27. L. thorace spinoso, corpore aptero. *Syst. Ent. 287. 25.*

Locusta Papa spinosa aptera thorace spinoso, abdome tuberculis conicis spinosis. *Degeer Inf. 3. 453. 13. tab. 39. fig. 5.*

Gryllus Papus apterus, thorace spinoso, femoribus punctatis. *Linn. Syst. Nat. 2. 699. 34. Amoen. acad. I. 322.*

Locusta

Locusta talpa capensis pedibus longis. *Pet. Gazoph.*
tab. 13. fig. 7.

Roeſ. Inf. 2. Gryll. tab. 6. fig. 3.
Kundm. Prompt. 118. et 184.

Habitat in Aethiopia.

Scutellum magnum, rotundatum spinis ciliatum. Femora postica subtus quadridentata.

28. L. thorace spinis muricato cinctoque, corpore aptero. *spinulosa.*
ro. *Syst. Ent. App.* 826.

Gryllus spinulosus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 703. 59. *Amoen.*
acad. 6. 389. 35.

Edw. Av. 2. 161. tab. 285. fig. 3. 4. 5.

Habitat in Indiis.

Abdomen nigrum maculis testaceis. Ensis recurvus.

29. L. thorace laeui nigro, lateribus griseis, corpore aptero. *Onos.*

Gryllus Onos. *Pall. Spicil. Zool.* fasc. 9. 18. tab. 2.
fig. 1.

Locusta echinata impennis e Chusan. *Petiv. Gazoph.*
tab. 39. fig. 9.?

Habitat in Sibiria.

Ensis longitudine abdominalis.

Synonymon *Petiverii* a cel. *Pallas allatum forte potius*
ad L. spinulosum pertinet.

30. L. thorace postice marginato dentato, ense recurvo, *Laxmanni.*
apice deflexo, femina aptera.

Gryllus Laxmanni. *Pall. Spicil. Zool.* fascicul. 9. 20.
tab. 2. fig. 2. 3.

Habitat in Sibiria.

Alae in femina omnino nullae, in mare duas, paruelle, ouatae, reticulatae, fuscae, margine crassiore versus basin pallidae, sub scuto thoracis porrecto latentes.

93. G R Y L L V S.

I. G. thorace carinato integro, corpore aptero. *Linn. Elephas.*
Syst. Nat. 2. 699. 35.

Roeſ. Inf. 2. Gryll. tab. 6. fig. 2.

Habitat in Africa.

- succin-* 2. *G. thoracis carina margineque postico elytrorumque*
itus. *margine dorsali flauis, gula cornuta.* *Syst. Ent.* 287.
 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 699. 36. *Amoen. academ.*
 6. 398. 36.

Habitat in Indiis.

Antennae flauae. Tibiae posticae spinis luteis apice atris.

- cristatus.* 3. *G. thorace cristato, carina quadrifida, alis apice fuscis.*
 Syst. Ent. 288. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 699. 37. *Mus.*
 Lud. Vlr. 137. *Amoen. acad.* 1. 21. tab. 17. fig. 4.

***Gryllus arabicus. Hasselqu. It.* 413.**

***Gryllus ex Aegypto. Olear. Mus. tab.* 17. fig. 5.**

***Frisch. Inf.* 9. tab. 1. fig. 1.**

***Roeßl. Inf.* 2. *Gryll.* tab. 5.**

***Edw. Av.* tab. 312.**

***Seb. Mus.* 4. tab. 72. fig. 11. 12.**

Habitat in Arabia, Aegypto frequens.

Arabis esculentus.

- Dux.* 4. *G. thorace carinato scabro, elytris viridibus, alis ru-*
 fis fusco maculatis.

***Gryllus Dux. Drury Inf.* 1. tab. 44.**

Habitat in America meridionali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnus. Antennae filiformes nigrae. Caput flavescentia.

Thorax carinatus, virescens punctis eleuatis pallidis

scaber carina obscura. Elytra viridia flavo neruosa.

Alae rubrae maculis marginaque postico fuscis. Cor-

pus et pedes virescentes.

- carina-* 5. *G. thorace cristato, carina trifida, alis fascia nigra.*
tus. *Syst. Ent.* 288. 4. *

Habitat in Aegypto. *Prof. Forstahl.*

- Lunus.* 6. *G. thoracis segmento crista semiorbiculata, elytris ni-*
 gris, fasciis albis. *Syst. Ent.* 288. 5. *Linn. Syst. Nat.*
 2. 693. 9. *Amoen. acad.* 6. 397. 30.

Habitat in America meridionali.

Alae nigrae, immaculatae.

- reticula-* 7. *G. thorace cymbiformi postice producto acuto, elytris*
tus. *reticulatis.*

Habitat in Bengal. *Mus. Dom. Banks.*

Magni-

Magnitudo fere G. ferrati. Caput ferrugineum ore nigro maculato. Antennae ferrugineae articulo primo vltimisque nigris. Thorax crista trifida carinata posticeque producta cymbiformi, ferrugineus carina lineaque laterali abbreviata atris. Elytra nigra flavo reticulata. Pedes nigri subtus rufi.

8. G. thorace cymbiformi carinato serrato postice producendo acuto. *Syst. Ent.* 288. 6.

Gryllus serratus thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acuminato, abdomine coeruleo. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 693. 5. *Mus. Lud. Vlr.* 121.

Aerydium serratum viride, thorace cymbiformi, carinato denticulato, capite acuminato. *Degeer Ins.* 3. 493. 10. tab. 41. fig. 6.

Gronov. Zooph. 642.

Roeß. Ins. 2. *Gryll.* tab. 16. fig. 2. perperam antennas setaceas depingit.

Sulz. Ins. tab. 8. fig. 58.

Habitat ad Cap. bon. sp.

9. G. viridis, elytris maculis duabus albis, abdomine vesiculoso, vtrinque maculis tribus albis. *Syst. Ent. App. pend.* 827. *

Pneumora sexguttata. *Tunberg. Att. Holm.* 1775. 258. 3. tab. 7. fig. 3.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

10. G. viridis albo maculatus, scutello carinato vtrinque papillodentato, abdomine vesiculoso variegato. *Syst. Ent. App.* 827. *

Pneumora immaculata. *Tunberg. Att. Holm.* 1775. 256. 1. tab. 7. fig. 1.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

11. G. viridis calloso punctatus, abdomine vesiculoso albo variegato. *Syst. Ent. App.* 827. *

Gryllus variolosus calloso punctatus, abdomine vesiculoso albo punctato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 693. 4. *Mus. Lud. Vlr.* 120.

Pneumora maculata. *Tunberg. Att. Holm.* 1775. 257. 2. tab. 7. fig. 2.

Habitat ad Cap. bon. sp.

miliaris. 12. G. thorace subquadrato verrucoso, elytris punctis callosis albis. *Syst. Ent.* 288. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 700. 39. *Mus. Lud. Vlr.* 142.

Acrydium verrucosum thorace ouato plano dentato verrucoso, elytris alisque fuscis, abdomine nigro fasciis albis. *Degeer Inf.* 3. 486. 1. tab. 40. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

Sequenti affinis videtur.

morbillo- 13. G. thorace quadrato rubro verrucoso, elytris fuscis albo punctatis, alis rufis. *Syst. Ent.* 289. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 700. 38. *Mus. Lud. Vlr.* 142.

Gron. Zooph. 179. 662.

Roef. Inf. 2. *Gryll. tab.* 18. fig. 6. perperam anten-
nas depingit setaceas.

Seb. Mus. 4. tab. 79. fig. 7. 8.

Seligm. Av. 1. tab. 43.

Habitat ad Cap. bon. sp.

Antennae nigrae, filiformes,

puncta- 14. G. thorace verrucoso, elytris atris flavo punctatis, alis
atris.

Gryllus punctatus, *Drury Inf.* 2. tab. 41. fig. 4.

Gryllus punctatus. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 9. fig. 3.

Habitat in India orientali.

Elytra in nostro specimine multo nigriora, quam in
figura Sulzeri.

squarro- 15. G. thorace subtriarticulato, articulis vtrinque spino-
sis, alis rubris nigro punctatis.

Gryllus squarrosum viridis, thorace subarticulato, arti-
culis vtrinque subtricuspidibus, alis rubris nigro
punctatis. *Linn. Mant.* 533.

Locusta squarrosa. *Syst. Ent.* 285. 16.

Drury Inf. 1. tab. 49. fig. 1.

Habitat in Africa. *Mus. Dom. Banks.*

Caput et thorax obscure viridia. Thoracis articulus
primus bispinosus, spina posteriori tricuspidi, arti-
culus secundus spina tricuspidi, tertius multispi-
nosus. Elytra viridia fusco punctata,

16. *G. thorace subcarinato scabro, capite obtuso, femori-haemato-
bus piloso ciliatis.* *Syst. Ent.* 289. 9. *Linn. Syst. Nat.* *pus.*
2. 700. 40. *Mus. Lud. Vlr.* 143.

*Acrydium rubripes griseum punctatum, thorace sea-
bro subcrustato, femoribus maximis intus nigris, ti-
biis posticis rubris.* *Degeer Inf.* 3. 490. 6. tab. 40.
fig. 10.

Habitat in Indiis.

Elytra cinerea. Alae hyalinae venis nigris articulatae.

17. *G. elytris viridibus albo punctatis apice rufescen-
tibus, corpore coeruleo flavoque variegato.* *Syst. Ent.*
289. 10. *

Habitat Caiennae. *D. Mallet.*

18. *G. thorace segmentis tribus, fronte impressa, mandi-
bulis concoloribus.* *Syst. Ent.* 289. 11. *Linn. Syst. tartari-*
Nat. 2. 700. 42. *Mus. Lud. Vlr.* 139.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 18. fig. 8.

Drury Inf. 1. tab. 49. fig. 2.

Habitat in Africa.

Affinis sequenti. Ambo elytris cinerascentibus fusco
maculatis.

19. *G. thorace subcarinato, segmento unico, mandibulis migrato-
coeruleis.* *Syst. Ent.* 289. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 701. *rius.*
41. *Fn. Sv.* 871. *Scop. carn.* 323.

*Acrydium migratorium fuscum seu viride obscure ma-
culatum, elytris dilute fuscis nigro maculatis, denti-
bus nigris.* *Degeer Inf.* 3. 466. 1. tab. 23. fig. 1.

Gryllus migratorius. *Frisch. Inf.* 9. tab. 1. fig. 8.

Roef. Inf. Gryll. tab. 24.

Seb. Mus. 4. tab. 65. fig. 21.

Edw. Av. 208. tab. 208.

Seligm. Av. 6. tab. 103.

Habitat in Tartaria, variis annis in Europam migrans,
destruens vegetabilia, gramina.

20. *G. thorace subcarinato fusco, linea dorsali rufa, fe-
moribus posticis intus sanguineis, tibiis coeruleis.* *lineola.*

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Magnitudo G. migratorii. Caput fuscum, sulcatum. Thorax segmentis tribus carinatus, fuscus carina rufa. Elytra grisea. Alae albae fusco reticulatae. Pedes postici femoribus linea interiori sanguinea, tibiis coeruleis adspersis, spinis albis apice atris.

variega- 21. G. thorace lineato flavo, elytris viridibus, alis coeruleis. *Syst. Ent.* 290. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 700. 43. *Mus. Lud. Vir.* 144.

Habitat in America.

Antennae nigrae annulis rubris. Frons rubra maculis atris.

vocans. 22. G. thorace carinato, elytris pallidis, maculis ocellaribus fuscis, alis basi ferrugineis. *Syst. Ent.* 290. 14.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

turidus. 23. G. thorace subcarinato niger, pectoris macula, abdominisque cingulis sanguineis, fronte porrecta.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo G. striduli. Antennae filiformes nigrae articulo penultimo flauescente. Caput nigrum fronte supra antenas porrecta, obtusa, supra plana. Thorax subcarinatus, scaber, obscurus, immaculatus. Pectus atrum, nitidum macula magna, sanguinea. Abdomen atrum annulis sanguineis. Pedes atri.

musicus. 24. G. thorace carinato, elytris antice nigris fascia alba, postice griseis nigro variis. *Syst. Ent.* 290. 15.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

tubercu- 25. G. thorace scabro, alis rufis apice cinereis, femoribus latus. posticis supra infraque carinatis. *Syst. Ent.* 290. 16.*
Habitat in Iutlandiae arenosis.

stridulus. 26. G. thorace carinato, alis rubris extimo nigris. *Syst. Ent.* 290. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 701. 47. *Fn. Sv.* 872.

Acrydium elytris nebulosis, alis rubris externe nigris. *Geoff. Inf.* 1. 393. 4.

Acrydium rubripenne nigro fuscum, alis rubris extimo nigris, thorace carinato. *Degeer Inf.* 3. 472. 2.

Frisch.

Frisch. Inf. 9. tab. 1. fig. 2.

Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 21. fig. 1.

Schaeff. Elem. tab. 15.

Icon. tab. 27. fig. 10. 11.

Seb. Mus. 4. tab. 65. fig. 20.

Scopol. carn. 326.

Habitat in Europae siccis, arenosis.

Variat corpore toto nigro et nigro flavoque vario. Setae duae paruae in abdominis penultimo segmento.

27. *G. thorace tuberculato, elytris obscuris immaculatis, ferruginalis ferrugineis, capite acuminato.* *ferrugineus.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae filiformes, nigrae annulis duobus flavis. Os fuscum maculis rubris. Frons et vertex flava. Margo sub oculis prominentiaque inter antennas fusca. Thorax in medio flavius margine nigro, antico tuberculato, postico punctato subspinoso. Elytra glabra, laevia, obscura, immaculata. Alae ferruginea maragine interiori apice cinerascente. Abdomen fuscō flavoque annulatum. Femora subtus et tibiae totae rufa.

28. *G. thorace lineis quatuor flavis, alis coeruleis, elytris surinacoeruleis.* *Syst. Ent. 291. 18. Linn. Syst. Nat. 2. mus. 700. 45. Mus. Lud. Vlr. 146.*

Habitat in America meridionali.

Femora basi sanguinea.

29. *G. fuscus, thorace carinato, alis rubris apice hyalinis.* *italicus.* *Syst. Ent. 291. 19. Linn. Syst. Nat. 2. 701. 46. Mus. Lud. Vlr. 147.*

Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 21. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 8. 9.

Scop. carn. 327.

Habitat in Europa australiori.

30. *G. testaceus, alis sanguineis apice hyalinis, femoribus germani posticis nigro punctatis.* *Syst. Ent. 291. 20. ** *cus.* *Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 21. fig. 7.*

Habitat in Germaniae agris.

31. *G. thorace laeui viridi, alis hyalinis latere tenuiori thalassiviridibus apice fuscis.* *nus.*

Habitat

Habitat in Italia. *D. Allioni*.

Caput viride ore oculisque fuscis. Thorax laevis, viridis antice vtrinque macula magna fusca. Elytra grisea costa baseos viridi. Femora postica viridia fusco maculata. Tibiae sanguineae.

virginia- 32. *G. thorace carinato, elytris costa viridi, alis nigris basi virescentibus.* *Syst. Ent.* 291. 21.

Habitat in America boreali. *Dom. Lewin.*

coeruleans. 33. *G. thorace laeuiuscule, elytris pallidis nigro maculatis, alis latere tenuiore coerulescentibus.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 701. 48.

Habitat in Europa australiori. *D. Allioni.*

carolinus. 34. *G. thorace subcarinato, alis nigris, margine postico cinereo.* *Syst. Ent.* 291. 22. *Linn. Syst. Nat.* 2. 701. 49.

Locustella carolina, elytris fuscis, alis inferioribus nigris ad extremitates luteis. *Catesb. Carol.* 2. 89. tab. 89.

Acrydium carolinum fuscum nebulosum, thorace carinato segmento unico, alis nigris margine flavis. *Degeer Ins.* 3. 491. 7. tab. 41. fig. 2. 3.

Habitat in America boreali.

Elytra obscura punctis fuscis irrorata.

obscurus. 35. *G. thorace subcarinato, alis disco rubro, fascia nigra apice hyalinis.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 701. 50. *Mus. Lud. Vlr.* 144.

Acrydium obscurum fuscum, alis rubro roseis, margine nigris, macula hyalina alba, tibiis posticis albis. *Degeer Ins.* 3. 492. 8. tab. 41. fig. 4.

Drury Ins. 2. tab. 41. fig. 1.

Seb. Mus. 4. tab. 80. fig. 15. 16.

Habitat in Africa.

sibiricus. 36. *G. thorace subcarinato, antennis clauatis, tibiis anticis ouato clauatis.* *Gen. Ins. Mant.* 243. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 701. 51.

Gryllus clavimanus. *Pall. Spic. Zool.* fasc. 9. p. 21. tab. 1. fig. 11.

Nou.

Nou. Comment. Acad. Scient. Petrop. 14. tab. 25. fig. 8.

Habitat in Sibiria.

Femina tibiis simplicibus.

37. *G. thorace subcarinato, alis virescenti coeruleis, fascia nigra.* *Syst. Ent.* 292. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. *coerulea scens.* 700. 44. *Mus. Lud. Vlr.* 145.

Acrydium elytris nebulosis, alis coeruleis extimo nigro. *Geoff. Inf.* 1. 392. 2.

Acrydium coeruleipenne fuscum, elytris griseis, fasciis tribus fusca, alis virescenti coeruleis extimo nigris thorace carinato. *Degeer Inf.* 3. 473. 3.

Frisch. Inf. 9. tab. 1. fig. 3.

Sulz. Inf. tab. 9. fig. 60.

Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 6. 7.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 21. fig. 4.

Seb. Mus. 4. tab. 65. fig. 19.

Scopol. carn. 325.

Raj. Inf. 60.

Habitat in Europa australiori.

38. *G. thorace carinato, elytris margine tenuiori viridibus, alis basi flauescens apice cinereis.* *einera-* *scens.*

Habitat in Italia. *Dom. D. Allioni.*

Affinis *G. flauo*, at duplo maior. Frons virescens ore ferrugineo. Thorax carinatus, fuscus. Elytra flauescens albo punctata apice cinerea. Alae basi flauescentes apice late cinereae. Tibiae posticae rufae.

39. *G. thorace carinato obscurus, alis flauissimis apice nigricantibus.* *sulphureus.*

Habitat in America boreali. *Dom. A. Blackburn.*

Parvus. Caput, thorax et elytra obscure ferruginea. Elytra apice parum cinerascentia. Alae basi sulphureae apice fuscae. Femora postica intus flauo nigroque annulata. Tibiae cyaneae basi pallidae.

40. *G. thorace carinato, alis flauis, fascia nigra apice cinereis.* *flauus.* *Syst. Ent.* 292. 24. *

Gryllus flauus thorace subcarinato, alis disco flauo, fascia nigra apice hyalinis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 702. 52.

Fabr. Spec. Inf.

A a

Acry-

Acrydium nigro fasciatum viride maculis fuscis, elytris nigro maculatis, alis hyalinis virescentibus, medio fascia nigra. *Degeer Inf.* 3. 493. 9. tab. 41. fig. 5.?

Locusta capensis alis inferioribus luteis. *Pet. Gazoph.* 6. tab. 3. fig. 6.

Habitat in Europa australiori, ad Cap. bon. sp.

Elytra fusca albo obsolete maculata. Tibiae posticae sanguineae.

cyanipes. 41. G. fuscus, linea dorsali flava, tibiis posticis flavis apice cyaneis. *Syst. Ent.* 292. 25. *

Acrydium flavo fasciatum fuscum, thorace elytrisque fasciis longitudinalibus flavis. *Degeer Inf.* 3. 489. 4. tab. 40. fig. 3.

Habitat in Americae meridionalis insulis.

ruficulus. 42. G. griseus, elytris basi fuscis flavo maculatis apice cinereo fuscoque variis. *Syst. Ent.* 292. 26. *

Habitat in Americae meridionalis insulis.

lateralis. 43. G. thorace fusco, margine puncto que vtrinque tibiis que flavis. *Syst. Ent.* 293. 27. *

Habitat in Americae meridionalis insulis.

viridulus. 44. G. thorace cruciato, corpore supra viridi, elytrorum margine albido. *Linn. Syst. Nat.* 2. 702. 54. *Fn. Sv.* 874.

Gryllus capite, thorace elytrisque superne viridibus. *Linn. It. Westrog.* 276.

Acrydium albo marginatum viride seu fuscum, abdome griseo, elytris albo marginatis. *Degeer Inf.* 3. 480. 7.

Frisch. Inf. 9. tab. 1. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 141. fig. 2. 3.

Habitat in Europac aruis sterilioribus frequens.

biguttulus. 45. G. thorace cruciato, elytris nebulosis, puncto oblongo albo versus apices. *Linn. Syst. Nat.* 2. 702. 55. *Fn. Sv.* 875.

Acrydium biguttulum griseo fuscum nigro maculatum subtus viride, ano ruso, elytris macula albicante. *Degeer Inf.* 3. 479. 6.

Schaeff.

Schaeff. Icon. tab. 190. fig. 1. 2.

Habitat in Europae borealioris aruis sterilioribus frequens.

6. G. femoribus sanguineis, elytris virescentibus, anten- grossus.
nis cylindricis. Syst. Ent. 293. 28. Linn. Syst. Nat.
2. 702. 58. Fn. Sv. 877.

Acrydium femoribus sanguineis, alis subfuscis reticu-
latis. Geoff. Ins. 1. 393. tab. 8. fig. 2.

Acrydium rubripes viride nigro maculatum, elytris
fuscis flavo marginatis, femoribus posticis subtus ru-
bris. Degeer Ins. 3. 477. 5. tab. 22. fig. 4.

Hollar. Ins. tab. 10. fig. 5. 6.

Frisch. Ins. 9. 5. tab. 4.

Habitat in Europae aruis arenosis frequens.

7. G. thorace cruciato fuscus, femoribus tibiisque po- captiuus.
sticis fascia alba. Syst. Ent. 293. 29. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

8. G. fuscus, abdomine rufo, antennis subclavatis. Syst. rufus.
Ent. 293. 30. Linn. Syst. Nat. 2. 702. 56. Fn. Sv. 876.

Acrydium clauicorne griseo fuscum, tibiis posticis ru-
bris, antennis clavatis. Degeer Ins. 3. 482. 10. tab.
23. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 136. fig. 4. 5.

Scop. carn. 329.

Habitat in Europae aruis sterilioribus frequens.

9. G. corpore incarnato aptero. Syst. Ent. 293. 31. Linn. pedestris.
Syst. Nat. 2. 703. 60. Fn. Sv. 878.

Acrydium apterum griseo incarnatum, femoribus
subtus rubris, tibiis coeruleis. Degeer Ins. 3. 474.
4. fig. 23. fig. 8. 9.


Habitat in Europa.


Insectum perfectum, quamvis apterum, teste Linné, Pal-
las.

10. G. alarum rudimentis ocello atro, oculis aureis. Syst. perspicil-
Ent. 293. 32. Linn. Syst. Nat. 2. 703. 61. Amoen. latus.
acad. 6. 398. 34.

Habitat in Indiis.

An potius Puppa alias speciei.





CLASSIS III.
SYNISTATA.

94. MONOCVLVS.

- Polyphe-* **1. M.** testa plana conuexa, sutura lunata, postica dentata, cauda subulata longissima. *Syst. Ent.* 294. *I.*
mus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1057. *1. Mus. Lud. Vlr.* 460.
Xiphosura. *Grou. Zooph.* 953.
Ionst. Exsangu. tab. 7. fig. 1. 2. —
Olear. Mus. tab. 28. fig. 1. 2.
IVorm. Mus. tab. 249.
Rumph. Mus. 21. tab. 12.
Knorr. Del. tab. F. 1.
Kaempf. Iap. tab. 13. fig. 8.
Schaeff. monogr. 1756. tab. 7.
Cancer moluccanus. *Seb. Mus.* 3. tab. 17. fig. 1.
 Habitat in Indiae aquis. Insectorum omnium facile maximum éuadens.
- piscinus.* **2. M.** testa cordata plana. *Syst. Ent.* 294. *2. Linn. Syst.*
Nat. 2. 1057. *2. Fn. Sv.* 2045.
Binoculus hemisphaericus, cauda foliacea, capitis puncto triplici fusco. *Geoff. Inf.* 2. 660. *2. tab. 21. fig. 3.*
Loeffl. Act. Vpf. 1750. 42.
Bast. Subs. 157. tab. 8. fig. 9. 10.
Frisch. Inf. 6. tab. 12.
Stroem. Sundm. tab. 1. fig. 4. 5. 6.
 Habitat in Oceano.
 Duae huius sunt varietates. Stylatus antennis corpore longioribus, muticus absque exsertis antennis.
- Apus.* **3. M.** antennis trifidis, cauda bifida. *Syst. Ent.* 295. *3.*
Monoculus Apus testa subcompressa antice retusa postice truncata, cauda bifida. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1058.
3. Fn. Sv. 2046.

Bino-

Binoçulus cauda bifeta. *Geoff. Inf.* 2. 660. 1. tab. 21.
fig. 4.

Apus canceriformis. *Schaeff. monogr.* 1756. tab. 1—6.
Schaeff. Elem. tab. 29. fig. 1.

Frisch. Inf. 10. tab. 1.

Att. Angl. 40. 150. tab. 1. fig. 2.

Sulz. Inf. tab. 24. fig. 153.

Habitat in Europae fossis, piscinis.

Aestate exsiccati reuiuscunt affluente aqua.

M. antennis dichotomis, cauda inflexa acuta. *Syst. Ent.* *Pulex.*
295. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1058. 4.

Monoculus Pulex ramosus brachiis dichotomis, cauda
appendiculata inflexa, testa postice vniispinosa. *De-*
geer Inf. 7. 442. 1. tab. 27. fig. 1. 2. 3.

Vermes minimi rubri aquam stagnalem colore rubro
inficientes, vnde vulgus dira protendit. *Merret.*
pen. 207.

Pulex aquaticus. *Schaeff. monogr.* 1755. tab. 1. fig.
1—8.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 10.

Schaeff. Elem. tab. 29. fig. 4.

Geoff. Inf. 2. 655. 1.

Swammerd. bibl. tab. 31. fig. 1. 2. 3.

Ioblot. microsc. 1. p. 2. tab. 13. fig. P. Q. R.

Ledermüll. microsc. 146. tab. 72. fig. 2.

Habitat in Europae aquis dulcibus.

M. antennis dichotomis, cauda elongata sub corpore laevis.
inflexa.

Monoculus exspinosus brachiis dichotomis, cauda sim-
plici inflexa, testa postice rotundata non spinosa. *De-*
geer Inf. 7. 457. 2. tab. 27. fig. 9. 10. 11.

Pulex aquaticus ecaudatus. *Schaeff. monogr.* tab. 1.
fig. 9.

Habitat in Europae aquis.

Nimis praecedenti affinis videtur.

M. antennis dichotomis, cauda inflexa, testa postice *bispino-*
bidentata, capite acuminato. *fus.*

Monoculus bispinosus brachiis dichotomis, capite rotato, cauda inflexa, testa postice bispinosa. *Degeer Inf.* 7. 463. 3. tab. 28. fig. 3. 4.
Habitat in Europae aquis.

Pediculus 7. M. antennis dichotomis, cauda reflexa. *Syst. Ent.* 295. lus. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1058. 5. *Fn. Sv.* 2048.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 8.

Geoff. Inf. 2. 656. 2.

Monoculus Pediculus ramosus brachiis dichotomis, cauda bifida rectiuscula exserta, pedibus nudis. *Degeer Inf.* 7. 467. 4. tab. 28. fig. 9. 10.

Habitat in Europae aquis dulcibus.

quadricornis. 8. M. antennis quaternis, cauda recta bifida. *Syst. Ent.* 295. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1058. 6. *Fn. Sv.* 2049. *Geoff. Inf.* 2. 656. 3.

Monoculus cornubus quaternis mobilibus setaceis, corpore ouato, cauda longa, recta, cylindrica, bifida. *Degeer Inf.* 7. 483. 7. tab. 29. fig. 11. 12.

Backer microsc. tab. 9. fig. 1. 2.

Blanc. Inf. 149. tab. 13. fig. B.

Ioblot. microsc. 1. p. 2. tab. 14. fig. 6. D.

Degeer Act. Holm. 1747. tab. 6. fig. 2.

Roef. Inf. 3. tab. 98. fig. 1. 2. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 9.

Leuwenh. arc. 142. fig. 1.

Scop. carn. 1129.

Act. angl. abbr. 2. 258. tab. 20. fig. 5. 6.

Habitat in Europae aquis stagnantibus frequens.

Antennae caudaque rufescunt.

conchaceus. 9. M. antennis capillaribus multiplicibus, testa biualui. *Syst. Ent.* 295. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1059. 7. *Fn. Sv.* 2050.

Monoculus ouato conchaceus testa ouata biualui, brachiis apice capillaceis multiplicibus intra testam. *Degeer Inf.* 7. 476. 6. tab. 29. fig. 5. 6. 7.

Geoff. Inf. 2. 657. 4.

Habitat in aquis stagnantibus, velocissime antennis exsertis natans.

95. O N I S C V S.

1. *O. antennis quaternis*, segmentorum lateribus falcato *parado-*
spinesis. *Syst. Ent.* 296. 1. * *xus.*
Habitat in Terra del Fuego. Mus. Dom. Banks.
Affinis Monoculis. An Protypon Entomolithi para-
doxi? In multis certe conuenit.
2. *O. antennis quaternis compressis*, pedibus vnguicula- *imbrica-*
tis, femoribus posticis carinatis. *Syst. Ent.* 296. 2.* *tus.*
Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.
3. *O. abdomine foliolis duobus obtecto*, cauda semioua- *Asilus.*
- li. *Syst. Ent.* 296. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1059. 1.
Fn. Sv. 2052. *Mus. Adolph. Frid.* 1. 88.
Asilus s. Oestrum. Bell. aquat. 443.
Pediculus marinus. Rond. Pisc. 576.
Gron. Zooph. 997.
Petiv. Gazoph. tab. 155. fig. 1.
Planc. de Conch. minus not. tab. 5. fig. A. B.
Pall. Spicil. Zoolog. fasc. IX. p. 71. tab. 4. fig. 12.
Habitat in Oceano Europaeo viuiparus.
4. *O. abdomine foliis sex obtecto*, cauda retusa. *Syst. Oestrum.*
Ent. 297. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1059. 2. *Fn. Sv.*
2053. Mus. Adolph. Frid. 89.
Animalculum crustaceum. Margr. Bras. 155. fig. 3. 4.
Stroem. Sundm. 165. 2. tab. 1. fig. 2. 3.
Pall. Spicil. Zoolog. fasc. IX. p. 74. tab. 4. fig. 13.
Seb. Mus. 1. tab. 90.
Habitat in Oceano Europaeo.
5. *O. antennis quateruis*, cauda oblonga acuta. *Syst. Ent. Entomon.*
297. 5.
Oniscus Entomon abdomine subtus nudo, cauda subu-
lata. Linn. Syst. Nat. 2. 1060. 5. *Fn. Sv.* 2055.
Asellus marinus cornubiensis *alius. Raj. Inf.* 43.
Entomon pyramidale. Klein. tab. 38. fig. 1. 2.
Squilla Entomon murina cauda longa subulata crusta-
cea. Degeer Inf. 7. 514. 2. tab. 32. fig. 1. 2.
Petiv. Gazoph. tab. 1. fig. 4.
Gron. Zooph. 992.

Bast. subf. 2. 143. tab. 13. fig. 2.

Pall. Spicil. Zool. fasc. IX. p. 64. tab. 5. fig. 1.

Habitat in Oceano.

Natat velocissime, vicitat canceris, piscibus, pescatori-
bus inuisus.

aquati- 6. O. cauda rotundata, stylis bifurcatis, antennis quaternis.
cus.

Syst. Ent. 297. 6.

Oniscus aquaticus lanceolatus, cauda rotundata, stylis
bifurcatis. Linn. Syst. Nat. 2. 1061. 11. Fn. Sv. 2051.

Squilla Asellus aquatica, cauda rotundata, stylis binis
bifurcatis. Degeer Inf. 7. 496. 1. tab. 31. fig. 1.

Asellus cauda bifida, stylis bifurcatis articulis septem.
Geoff. Inf. 2. 672. 1.

Asellus aquaticus Gesneri. Raj. Inf. 43. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 12.

Frisch. Inf. 10. tab. 5.

Schaeff. Elem. tab. 22.

Habitat in Europae aquis dulcibus.

Nulli intra folliculum sexfidum matris.

marinus. 7. O. semicylindricus, cauda ouato oblonga acuminata.

Syst. Ent. 297. 7.

Oniscus marinus semicylindricus, cauda ouato oblon-
ga, integra. Linn. Syst. Nat. 2. 1060. 7. Fn. Sv.
2057. Linn. Iter Westrogoth. 190.

Oniscus balthicus. Pall. Spicil. Zool. fasc. IX. 66. tab.
4. fig. 6.

Squilla marina corpore elongato semicylindrico cauda
oblonga aequali apice truncata. Degeer Inf. 7. 523.
3. tab. 32. fig. 11.

Gron. Zooph. 996. tab. 17. fig. 3.?

Habitat in Oceano Norwagico.

linearis. 8. O. cauda quadridentata. Gen. Inf. Mant. 243. Linn.

Syst. Nat. 2. 1060. 9. Amoen. acad. 6. 415. 100.

Oniscus unguatus. Pall. Spicil. Zool. fasc. IX. 62. tab.
4. fig. 11.

Habitat in Indiae Oceano.

chelipes. 9. O. oblongus, cauda tridentata, pedibus subchelifor-
mibus. Syst. Ent. 297. 8.

Oniscus

Oniscus depressus oblongus, pedibus omnibus subcheliformibus. *Pall. Miscell.* 194. tab. 14. fig. 16. 17.

Oniscus linearis. *Pall. Spicil. Zool.* fasc. IX. 69. tab. 4. fig. 17.

Oniscus longus, tercs. *Bast. subsec.* 2. 143. tab. 13. fig. 2. med.

Habitat inter maris atlantici fucos.

10. *O. semicylindricus*, caudis duabus longitudine corporis bicaudaris. *Syst. Ent.* 297. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1060. 8. *tus.*
Fn. Sv. 2062.

Habitat in Oceano Norwagico.

11. *O. luteus*, strigis fuscis. *Syst. Ent.* 298. 10. *Linn. Syst. scopulorum.*
Nat. 2. 1061. 10. *Fn. Sv.* 2060.
Linn. Iter Westrogoth. 190.
Stroem. Sundm. 166. 3.

Habitat in Oceano Norwagico.

12. *O. abdomine subtus nudo*, cauda semiouali acuta. *Syst. Psora.*
Ent. 298. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1060. 3. *Fn. Sv.*
2054.

Oniscus cauda ouiali acuta subtus duabus valuulis clausa. *Stroem. Aft. Hafn.* IX. 594. tab. 10.

Habitat in Oceano Norwagico.

13. *O. abdomine subtus nudo*, cauda ouata, antennis quaternis. *Physodes.*
Syst. Ent. 298. 12.

Oniscus Physodes abdomine subtus nudo, cauda ouata.
Linn. Syst. Nat. 2. 1060. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 11.

Habitat in Oceano, in Terra del Fuego. *Mus. Dom.*
Banks.

14. *O. oblongus*, corpore spinoso pellucido. *Syst. Ent. spinosus.*
298. 13. *

Habitat in Oceano Atlantico. *Mus. Dom. Banks.*

15. *O. oblongus gibbus*, antennis plicatis longissimis. *Syst. gibbosus.*
Ent. 298. 14. *

Habitat in Oceano Lusitanico. *Fig. pict. in Mus. Banks.*

- quadri-* 16. O. oblongus, stylis caudalibus senis, antennis quatercornis. *Syst. Ent.* 299. 15.*
Ceti. Habitat in mari Atlantico. *Mus. Dom. Banks.*
- Ceti.* 17. O. oualis, segmentis distinctis, pedibus tertii quartique paris linearibus muticis. *Syst. Ent.* 299. 16. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 1060. 6. *Fn. Sv.* 2056. *Mus. Adolph. Frid.* 1. 89.
Squilla Balaenae corpore ouali depresso, segmentis distinctis, pedibus cheliferis, tertii quartique paris linearibus muticis. *Degeer Inf.* 7. 541. 6. tab. 42. fig. 6. 7.
Pediculus Ceti. *Martens Spitzb.* tab. 8. fig. D.
Seb. Mus. 1. tab. 90. fig. 5.
Pall. Spicil. Zool. fasc. IX. 76. tab. 4. fig. 14.
Egede Groenl. tab. 37.
Habitat in Oceano boreali balaenis molestus.
Ab hoc genere differre videtur vterius examinandus.
- oceani-* 18. O. oualis cauda bifida, stylis bifidis. *Syst. Ent.* 299. *cus.* 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1061. 12.
Oniscus stylis caudae vtrinque binis, *Stroem. Sundm.* 202. tab. 1. fig. 14. 15.
Oniscus, corpore lato, pedibus natatoriis, cauda vtraque biseta. *Akt. Helv.* 5. 371. tab. 5. fig. 463.
Bast. subf. 26. 145. tab. 13. fig. 4.
Gronov. Zooph. 994. tab. 17. fig. 2.
Habitat in Oceano Europaeo.
- affinis.* 19. O. oualis, cauda obtusa mutica, corpore cinereo. *Gen. Inf. Mant.* 243. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1061. 13.
Astellus marinus vulgari breuior et latior. *Raj. Inf.* 43.
Oniscus globator. *Pall. Spicil. Zool.* fasc. IX. 70. tab. 4. fig. 18.?
Bast. subsec. 2. 144. tab. 13. fig. 3.
Habitat in Oceani Europaei fucis.
- macula-* 20. O. oualis, cauda obtusa mutica, corpore plumbeo, *tus.* lineis punctatis albis.
Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
Statura O. Armadillo, at triplo maior. Color totius corporis plumbeus lineis septem longitudinalibus e punctis albis, extimis marginalibus.

21. O. oualis ater, segmento primo punctis quatuor, re- pustula-
liquis duobus rubris. tus.

Oniscus Armadillo. Scop. carn. 1144.

Habitat in Lusitania. D. Gray.

Difserit manifeste ab O. Armadillo. Primum segmen-
tum atrum, nitidum punctis quatuor rubris, reliqua
segmenta pallidiora punctis duobus.

22. O. oualis, cauda obtusa, stylis duobus simplicibus. Syst. Asellus.
Ent. 299. 18. Linn. Syst. Nat. 2. 1061. 14. Fn. Sv.
2058.

Oniscus cauda obtusa bifurca. Geoff. Inf. 2. 670. 2.

Oniscus oualis subdepressus flavo maculatus, cauda sty-
lis duobus conicis articulatis. Degeer Inf. 7. 547. 1.
tab. 35. fig. 3.

Asellus asininus s. vulgaris. Raj. Inf. 41. 1.

Scop. carn. 1142.

Matthiol. Discor. 257.

Aldrov. Inf. 632.

Mouff. Inf. 202.

Schaeff. Elem. tab. 92.

Gron. Zooph. 993.

Sulz. Inf. tab. 24. fig. 154.

Habitat in domibus, muris, lignis putridis.

Pulli intra folliculum quadrivaluem abdominalem
matris.

23. O. oualis cinereo fuscus, cauda obtusa integra. Syst. Armadil-
Ent. 299. 19. Linn. Syst. Nat. 2. 1062. 15. Fn. Sv. 10.
2059. Geoff. Inf. 2. 670. 1.

Asellus liuidus. Raj. Inf. 42.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 13.

Habitat sub Europae lapidibus.

Tactus se in globum immobilem, durum contrahit.

96. L E P I S M A.

1. L. squamata argentea, cauda triplici. Syst. Ent. 300. 1. *sacchari-*
Lepisma saccharina squamosa, cauda triplici. Linn. na-

Syst. Nat. 2. 1012. 1. Fn. Sv. 1925.

Lepisma vulgaris. Scop. Ent. carn. 1026.

Forbicina plana. Geoff. Inf. 2. 613. 1.

Forbi-

Forbicina. Aldr. Inf. 570. tab. 2. fig. 5.

Setoura subargentea, cauda setosa, setis hirsutis. Brown.

Jamaic. 425.

Sulz. Inf. tab. 22. fig. 142.

Schaeff. Elem. tab. 75.

Degeer Inf. 7. 14. 1.

Adam. microscop. tab. 28. fig. 147.

Habitat in America inter saccharum, nunc in Europa
frequens inter vtenstilia, libros vestesque.

polypoda. 2. L. saltatoria, cauda triplici, abdominis segmentis
subtus vtrinque villosis. Syst. Ent. 300. 2.

Lepisma polypoda scutata, cauda triplici. Linn. Syst.
Nat. 2. 1012. 2.

Forticina teres saltatrix. Geoff. Inf. 2. 614. 2.

Lepisma squamosa saltatoria, setis caudae tribus inter-
media maiore. Stroem. Act. Hafn. 9. 575. tab. 2.

Habitat in Europae littoribus lapidosis.

Saltat velocissime furca subulata alba ani.

Aliam simillimam inueni cauda quintuplici. Fortemera
sexus varietas.

lineata. 3. L. cauda triplici, corpore fusco, vittis duabus albis.
Syst. Ent. 300. 3. *

Habitat in Heluetiae muris, capt. d. 1. Maii.

villosa. 4. L. fusca, cauda triplici villosa. Syst. Ent. 300. 4. *
Habitat in China. Dom. Drury.

97. P O D V R A.

signata. 1. P. subglobosa fusca, abdominis lateribus fulvo macula-
tis. Gen. Inf. Mant. 244.

Podura fusco nigra, abdome globosa, signaturis fer-
ruginis. Geoff. Inf. 2. 607. 1.

Habitat - - - -

viridis. 2. P. subglobosa viridis. Syst. Ent. 301. 1. Linn. Syst. Nat.
2. 1013. 1. Fn. Sp. 1922.

Podura viridis capite flavescente, antennis in medio
fractis. Geoff. Inf. 2. 607. 2.

Habitat in Europae plantis frequens in Polygoni fago-
pyri foliis primordialibus.

3. P. subglobosa atra, antennis longitudine corporis apicem polypoda.
ce albis. *Syst. Ent.* 301. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1013.
2. *Fn. Sv.* 1928.
Habitat in Europae plantis variis.
4. P. globosa fusca nitida, antennis longis, articulis plurimi-
nis. *Syst. Ent.* 301. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1013. 3.
Fn. Sv. 1929.
Podura globosa fusca-globosa fusca nitida, antennis
longis fractis. *Degeer Inf.* 7. 357. tab. 3. fig. 7. 8.
Act. Holm. 1743. 296. tab. 7.
Habitat in Europae terrestribus frequens.
5. P. teres fusco coerulea nitida. *Syst. Ent.* 301. 4. *Linn. plumbata.*
Syst. Nat. 2. 1013. 4. *Fn. Sv.* 1930.
Podura corpore tereti nigro coeruleo plumbeo nitido,
antennis quadrinodiis, capite pedibusque griseis.
Degeer Inf. 7. 31. 5. tab. 3. fig. 1.
Podura plumbea. *Geoff. Inf.* 2. 610.
Sulz. Inf. tab. 22. fig. 143.
Habitat in Europae plantis frequens.
6. P. ouata flava, dorso maculis duabus ferrugineis. *Syst. minuta.*
Ent. 301. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1013. 5.
Habitat in Europae hortis.
7. P. oblonga cinerea, signaturis nigris. *Syst. Ent.* 301. *nivalis.*
6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1013. 6. *Fn. Sv.* 1931.
Podura arborea grisea oblonga griseo cinerea signa-
turis nigris, antennis longis quadrinodiis. *Degeer*
Inf. 7. 21. 2. tab. 2. fig. 8.
Pulex Niuis. *Eph. Nat. Cur.* 6. Dec. 2. Ann. 3. obs.
197.
Degeer Act. Vpf. 1740. 54. tab. 2.
Habitat in Europae nemoribus, lignis hyeme frequens
in vestigiis hominum et mammalium supra niues.
8. P. oblonga nigra, abdomine antennisque fascia alba. *vaga.*
Syst. Ent. 302. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1013. 7.
Podura atra cingulo antennarum abdominalisque albo.
Stroem. Act. Hafn. 9. 578. tab. 3.
Habitat in Europae nemoribus.

- arborea*. 9. *P. oblonga nigra*, pedibus furcaque albis. *Syst. Ent.* 302. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1014. 8. *Fn. Sv.* 1932.
Podura arborea nigra oblonga nigra, antennis quadrinodiis, pedibus furcaque pallide fuscis. *Degeer Inf.* 7. 18. 1. tab. 2. fig. 1. 2.
Degeer Act. Upal. 1740. 49. tab. 1.
Act. Holmienf. 1750. 272. tab. 1.
Podura nigra thoracis limbo antennarumque basi flavis, pedibus furcaque pallidis. *Geoff. Inf.* 2. 609. 6.
Habitat in Europae sylvis.
Podurae simillimae, at albae his societate iunguntur.
- villosa*. 10. *P. oblonga villosa fusco nigroque variegata*. *Syst. Ent.* 302. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1014. 9.
Podura fusco nigroque variegata villosa. *Geoff. Inf.* 2. 608. tab. 20. fig. 2.
Sulz. Hist. Inf. tab. 29. fig. 2.
Schrink. Beytr. 46. 2. tab. 2. fig. 14. 15.
Habitat in Europa australiori.
- cincta*. 11. *P. cylindrica grisea*, cingulo atro antice albo. *Syst. Ent.* 302. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1014. 10. *Fn. Sv.* 1933.
Habitat in Europa.
- annulata*. 12. *P. liuida*, annulis nigris. *Syst. Ent.* 302. 11.
Podura liuido lutea, annulis transuersis nigris. *Geoff. Inf.* 2. 609. 5.
Habitat in Europa.
- lignorum*. 13. *P. plumbea*, capite, thorace, pedibus furcaque pallidis. *Syst. Ent.* 302. 12. *
Habitat in Europae lignis antiquis.
- pufilla*. 14. *P. cylindrica aenea*, furca alba. *Syst. Ent.* 302. 13.
Linn. Syst. Nat. 2. 1014. 11.
Habitat in Europa.
- aquatica*. 15. *P. nigra aquatica*. *Syst. Ent.* 302. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1014. 12. *Fn. Sv.* 1934.
Podura aquatica nigra aquatica tota nigra, antennis quadrinodiis. *Degeer Inf.* 7. 23. 3. tab. 2. fig. 14. 15.
Geoff. Inf. 2. 610. 8.
Degeer

Degeer Act. Vpsal. 1740. 57. tab. 3.

— — *Act. Holmiens.* 1750. 279. tab. 3. 4.

Ledermüll. Epist. 15. tab. 7.

Habitat in Europae aquosis, horis matutinis per phalanges decorticat aquas stagnantes.

Podurae cinereae, at rariores his societate iunguntur: an sexu, an aetate, an specie distinctae?

16. P. terrestris alba. *Syst. Ent.* 303. 15. *Linn. Syst. Nat. fimetaria,* 2. 1014. 13. *Fn. Sv.* 1935.

Podura fimetaria. *Scop. carn.* 1935.

Schrink. Beytr. 47. 4. tab. 2. fig. 1.

Habitat in Europae terra praegnante, frequens primo vere cauda mutica. Haud sicut.

17. P. alba, cauda bifida extensa. *Syst. Ent.* 303. 16. *Linn.* ambu-

lans.

Podura terrestris nivea, antennis quadrinodiis, cauda bifida breui extensa. *Degeer Inf.* 7. 33. 6. tab. 3. fig. 5.

Habitat in Europae muscis.

98. E P H E M E R A.

* Cauda trifeta.

1. E. cauda trifeta, alis fusco reticulatis maculatisque, corpore vulgata,

pore fusco. *Syst. Ent.* 303. 1.

Ephemera vulgata cauda trifeta, alis nebuloso maculatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 906. 1. *Fn. Sv.* 1472.

Ephemera cauda trifeta, abdomine obscure flauescente, maculis nigris trigonis, alis fusco maculatis. *Degeer Inf.* 2. 7. 1. tab. 16. fig. 1.

Ephemera alis nebuloso maculatis, cauda trifeta. *Geoff. Inf.* 2. 238. 1.

Sulz. Inf. tab. 17. fig. 103.

Scop. carn. 683.

Habitat in Europae aquis.

Vesperi sub arboribus choreas instituunt.

2. E. cauda trifeta, alis hyalinis reticulatis, corpore luteo. *Syst. Ent.* 303. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 906. 2.

Ephe-

Ephemera lutea alis albis reticulatis, cauda trifeta.
Geoff. Inf. 2. 238. 2.
 Habitat in Europae aquofis.

margina- 3. E. cauda trifeta, alis albis, margine exteriori fusco, ta. corpore nigro. *Syst. Ent.* 303. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 906. 3.

Ephemera luteo fusca, alis fusco viridibus, cauda trifeta. *Geoff. Inf.* 2. 239. 3.

Ephemera cauda trifeta nigra, thoracis marginibus brunneis, alis albo hyalinis. *Degeer Inf.* 2. 2. 24. 2. tab. 17. fig. 14. 15.

Roef. Inf. 2. *Aquat.* 2. tab. 12. fig. 1. 2.
 Habitat in Europa.

vesperti- 4. E. cauda trifeta, alis nigris, posticis albis. *Syst. Ent.* na. 303. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 906. 4. *Fn. Sv.* 1480.

Ephemera nigra, cauda trifeta. *Geoff. Inf.* 2. 239. 4.
 Habitat in Europae aquofis.

haltera- 5. E. cauda trifeta fusca, abdomine albido, alis duabus ta. albis. *Gen. Inf. Mant.* 244. *

Phryganea cauda trifeta fusca, alis abdominalisque medio albis, oculis maris quatuor. *Degeer Inf.* 2. 2. 27. 3. tab. 17. fig. 17. 18.

Habitat Kiliae ad aquas stagnantes frequens.

** Cauda bifeta.

venosa. 6. E. cauda bifeta, alis albis reticulatis, corpore fusco. *Syst. Ent.* 304. 5. *

Ephemera cauda bifeta fusca, alis hyalinis nigro neruosis, abdomine subtus cinereo. *Degeer Inf.* 2. 2. 28. 4. tab. 18. fig. 1 - 4.

Habitat in Daniae paludosis.

bioculata. 7. E. cauda bifeta, alis albis reticulatis, capite tuberculis duobus luteis. *Syst. Ent.* 304. 6.

Ephemera bioculata cauda bifeta, alis albis reticulatis, abdomine diaphano. *Linn. Syst. Nat.* 2. 906. 5. *Fn. Sv.* 1473.

Ephemera lutea, alis albis reticulatis, cauda bifeta.

Geoff. Inf. 2. 239. 5. *tab. 13. fig. 4.*

Habitat in Europae aquis.

Caudae albae fusco punctatae corpore longiores.

8. *E. cauda bifeta, corpore nigro, alis nigricantibus, posticis minimis.* *Syst. Ent.* 304. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 967. 7. *Fn. Sv.* 1478.

Habitat in Europae aquosis.

9. *E. cauda bifeta, alis albis, margine crassiori nigricante.* *horaria.* *Syst. Ent.* 304. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 907. 9. *Fn. Sv.* 1476.

Ephemera alis albis margine crassiori nigricantibus, cauda bifeta. *Geoff. Inf.* 2. 240. 8.

Ephemera alis albis minima. *Att. Vpf.* 1736. 27. 3.

Ephemera minima. *Swammerd. quart.* 87.

Habitat ad Europae aquas frequens.

Esca pisium ex hac et congeneribus praestantissima.

10. *E. cauda bifeta, alis albis, corpore fusco.* *Syst. Ent. culiciformis.* *304. 9. Linn. Syst. Nat.* 2. 907. 8. *Fn. Sv.* 1475.

Geoff. Inf. 2. 240. 6.

Pod. Inf. tab. 1. fig. 10.

Habitat in Europae aquosis.

11. *E. cauda bifeta, alis hyalinis striatis, thorace fusco, striata.* *abdomine albo.* *Syst. Ent.* 304. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 907. 10.

Ephemera mutica. *Fn. Sv.* 1479.

Ephemera thorace fusco, abdomine albo, cauda bifeta, alis fuscis striatis. *Geoff. Inf.* 2. 240. 7.

Habitat in Europa.

12. *E. cauda bifeta alis duabus, costa marginali fusca cincta.* *diptera.* *nereo maculata.* *Syst. Ent.* 304. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 907. 11. *Fn. Sv.* 1477.

Ephemera diptera bicaudata grisea, abdomine lineolis rubris, alarumque margine brunneo albo maculato.

Degeer Inf. 2. 2. 31. 5. *tab. 13. fig. 5.*

Habitat in Europae aquosis.

99. S E M B L I S.

peftini- 1. *S. antennis pectinatis, alis albis, signaturis neruisque fuscis albo subarticulatis.*

Hemerobius peftinicornis. Syst. Ent. 309. 1. Linn. Syst. Nat. 911. 1. Amoen. Acad. 6. 412.

Hemerobius fuscus, pedibus testaceis, antennis pectinatis nigris, alis griseo fuscis, neruis nigro punctatis. Degeer Inf. 3. 562. 2. tab. 27. fig. 3.

Habitat in America septentrionali.

grisea. 2. *S. alis griseis albo maculatis.*

*Hemerobius griseus. Gen. Inf. Mant. 244. **

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Teats.*

atrata. 3. *S. alis albidis, anticis nigro maculatis, corpore atro.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Caput atrum fronte cinereo pilosa. Antennae defunt. Thorax hirtus ater antice vtrinque linea cinerea. Abdomen cylindricum, atrum versus apicem macula oblonga testacea. Pedes valde pilosi atri. Alae anticae albidae neruis dilatatis nigris maculatae, posticae albidae neruo marginali maculaque versus apicem nigris.

fuscata. 4. *S. alis fuscis albo maculatis, posticis basi atris.*

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Teats.*

Praecedentibus minor. Antennae defunt. Caput ferrugineum ore nigro. Thorax obscurus. Abdomen deest. Alae magnae, anticae fuscae fascia media abbreviata punctisque apicis sparsis albis, posticae basi atrae, apice fuscae albo inaculatae.

phalaenoides. 5. *S. nigra, alis albis, maculis nigris sparsis. Syst. Ent. 305. 1.*

Phryganea phalaenoides. Linn. Syst. Nat. 2. 908. 3.

Phryganea nigra, alis albo pallidis, maculis plurimis nigris. Vdm. Diff. 53. fig. 16.

Habitat in Europa boreali, Finlandia.

bicauda- 6. *S. cauda biseta, setis longitudine corporis. Syst. Ent. 305. 2.*

Phry-

Phryganea ecaudata cauda bifeta, alis venoso reticulatis. Linn. Syst. Nat. 2. 908. 1. Fn. Sv. 1489.

Phryganea maxima. Scop. carn. 705.

Hemerobius cauda bipili, alis cinereis venoso reticulatis. Att. Vpsal. 1736. 27. 1.

Perla fusca, capite thoraceque linea longitudinali flava, alis fusco reticulatis. Geoff. Inf. 2. 231. 1. tab. 13. fig. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 24. fig. 8.

Reaum. Inf. 3. tab. 13. fig. 12.

Sulz. Inf. tab. 17. fig. 6.

Habitat in Europae aquosis oua sub ventre circumferrens. Corpus totum virescens.

7. S. cauda bifeta, setis truncatis abbreviatis. Syst. Ent. *nebulosa*. 305. 3.

Phryganea nebulosa cauda bifeta, alis subcinereis. Linn. Syst. Nat. 2. 908. 2. Fn. Sv. 1499.

Perla nigro fusca, alis subcinereis pallidis, caudae setis truncatis. Geoff. Inf. 2. 232. 3.

Pseudo Phryganea corpore oblongo ovato, alis elongatis cinereis nigro venosis. Degeer Inf. 2. 2. 83. tab. 23. fig. 16. 17.

Habitat ad Europae aquas.

8. S. ecaudata, alis reticulatis. Syst. Ent. 305. 4. *lutaria*.

Hemerobius lutarius niger, alis albidis s. iatis albo maculatis. Linn. Syst. Nat. 2. 913. 14. Fn. Sv. 1513.

Hemerobius niger, thorace plano depresso, alis fuscis nigro neruosis. Degeer Inf. 2. 2. 74. 5. tab. 20. fig. 14. 15.

Hemerobius ater, alis fuscis reticulatis, margine exteriori dilatato. Geoff. Inf. 2. 255. 3.

Roe. Inf. 2. aquat. 2. tab. 13.

Schaeff. Elem. tab. 97.

— — Icon. tab. 37. fig. 9. 10.

Hoeffnag. pict. tab. 12.

Habitat in Europae aquosis.

Oua plurima, aggregata, brunnea plantis aquaticis adglutinat.

100. PHRYGANEAE.

- reticula*. 1. *P. nigra*, alis subferrugineis atro reticulatis. *Syst. Ent.* ta. 306. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 908. 4. *Fn. Sv.* 1482.
Habitat in Europa.
- striata*. 2. *P. alis testaceis neruoso striatis*. *Syst. Ent.* 306. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 908. 5. *Fn. Sv.* 1483.
Hemerobius alis testaceis venoso striatis, antennis longitudine alarum. *Akt. Vpf.* 1736. 27. 2.
Musca quadripennis, alis longis angustis papilionum in modum variegatis. *Raj. Inf.* 247. 2.
Geoff. Inf. 2. 246. 1. tab. 13. fig. 5.
Frisch. Inf. 13. tab. 3.
Albin. Inf. 763.
Reaum. Inf. 3. tab. 13. fig. 8. 9. II.
Scop. carn. 688.
Aldrouand. Inf. 763.
Habitat in Europae aquosis.
- analis*. 3. *P. alis fuscis, macula anali alba, nucha hirta aurea*.
Syst. Ent. 306. 3. *
Habitat in Europa boreali, Suecia.
- fusca*. 4. *P. alis anticus fuscis immaculatis, pedibus flavis*. *Syst. Ent.* 306. 4.
Phryganea fusca immaculata, alis inferioribus hyalinis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 910. 20. *Fn. Sv.* 1500.
Phryganea fusca, antennis corporis longitudine, pedibus luteis, macula alba, alarum neruis albo nigro-que variis. *Degeer Inf.* 2. 407. 4.
Habitat in Europa frequens.
Larua intra cylindrum e frustulis plantarum aquatica- rum tectis ramentis gramineis longitudine cylindri.
- pilosa*. 5. *P. alis testaceis immaculatis, capite thoraceque hirtis*.
Syst. Ent. 306. 5. *
Habitat in Sueciae aquosis.
- pallipes*. 6. *P. alis omnibus nigris immaculatis, pedibus pallidis*.
Habitat in Italia. *Dr. Allioni*.
Triplo minor P. fusca. Antennae mediocres uti totum corpus fuscae, immaculatae. Pedes pallidi.

7. P. alis griseo fuscis, margine postico flavo striato. *signata.*
 Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*
 Parua. Caput cum antennis fuscum. Alae griseo fuscæ, nitidae flavo maculatae et margine postico flavo striato.
8. P. alis fusco testaceis cinereo maculatis. *Syst. Ent. grandis.* 306. 6.
Phryganea grandis alis cinereo testaceis, lineolis duabus longitudinalibus nigris, puncto albo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 909. 7. *Fn. Sv.* 1485.
Roef. Inf. 2. aquat. 2. tab. 17.
Reaum. Inf. 3. tab. 14. fig. 4.
Sulz. Hist. Inf. tab. 24. fig. 9.
Degeer Inf. 2. 388. 2. tab. 13. fig. 1.
Schaeff. Icon. tab. 180. fig. 1. 2.
 Habitat in Europæ aquis intra cylindrum ex ramentis longitudinalibus ligneis.
 Ova cum gelatina ponuntur.
9. P. alis fusco griseis, maculis atomisque niueis numerosis.
 Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*
 Magnitudo P. rhombicae. Caput nigrum antennis testaceis. Thorax niger macula dorsali testacea. Alae anticae apice subascendentes cinereo fuscae inaculis plurimis rhomboidalibus atomisque niueis. Pedes testacei.
10. P. alis griseis, macula laterali rhombica alba. *Syst. rhombica.* *Ent. 307. 7.*
Phryganea rhombica alis flauescentibus deflexo compressis, macula laterali rhombea alba. *Linn. Syst. Nat. 2. 909. 8. Fn. Sv. 1486. Geoff. Inf. 2. 246. 2.*
Reaum. Inf. 3. tab. 14. fig. 5.
Roef. Inf. 2. aquat. 2. tab. 16.
Schaeff. Elem. tab. 100.
Icon. tab. 90. fig. 5. 6.
 Habitat in Europæ aquis intra cylindrum ex ramentis gramineis transuersis.
11. P. alis anticis nebulosis, macula marginali nigra. *Linn. grisea.*
Syst. Nat. 2. 909. 6. Fn. Sv. 1484.

Phryganea antennis longitudine corporis fusco maculata punctataque, alis lineola marginali nigra, margine postico rotundato. *Deger Inf.* 2. 399. 3. tab. 13. fig. 21.

Habitat ad Europae aquas.

Larua intra cylindrum e culmis graminum et iuncorum.

notata. 12. P. alis anticis cinereo flauescens, macula marginali fusca.

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo praecedentis, at distincta. Corpus fuscum antennis pedibusque testaceis. Alae antice cinereo flauescentes vnicolores macula marginali fusca, posticae albae, hyalinae, nitidae.

bimacula. 13. P. alis fuscis, macula laterali dupli flaua. *Syst. Ent.* ta. 307. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 909. 9. *Fn. Sv.* 1486.

Phryganea antennis longioribus, alis fuscis, maris cinereo fasciatis, feminae macula grisea. *Deger Inf.* 2. 416. 7. tab. 15. fig. 5.

Habitat in Europa.

Larua intra cylindrum attenuatum ex arena lutoque confectum.

nigra. 14. P. alis nigris, antennis longissimis. *Syst. Ent.* 307. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 909. 11.

Phryganea antennis longissimis, palpis porrectis pilosis, alis atro coeruleis, oculis rufis. *Deger Inf.* 2. 424. 12. tab. 15. fig. 21.

Geoff. Inf. 2. 250. 10.

Raj. Inf. 275.

Habitat in Europae riuulis.

azurea. 15. P. alis nigris postice violaceis. *Syst. Ent.* 307. 10. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 909. 12. *Fn. Sv.* 1491.

Habitat in Europae borealis aquis.

marginalis. 16. P. nigricans, alis margine omni flavo. *Syst. Ent.* 307. ta. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 910. 14.

Habitat in Suecia.

Thorax tomentosus, testaceus.

17. P. alis fuscis testaceo irroratis. *variegata.*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
 Media. Alae anticae fuscae maculis atomisque testaceis
 irroratae. Antennae vix longitudine corporis fusco
 testaceoque tenuissime annulatae. Pedes flavescentes.
18. P. alis fuscis, utroque margine lineolis duabus trans- *bilineata.*
 versis albidis. *Syst. Ent.* 307. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2.
 910. 19. *Fn. Sv.* 1496.
 Habitat in Europa boreali.
19. P. nigra, alis fuscis, fasciis quatuor niveis, anterio- *interru-*
 ribus interruptis, posteriori marginali punctata. *Syst. pta.*
Ent. 307. 13.*
 Habitat in Angliae aquosis.
20. P. fusca, alis anticis hirtis, antennis longitudine cor- *hirta.*
 poris. *Syst. Ent.* 308. 14.*
 Habitat Oxoniae Anglorum.
21. P. alis fuscis, strigis duabus vndatis obscurioribus, an- *longicor-*
 tennis longissimis. *Syst. Ent.* 308. 15. *nis.*
Phryganea longicornis alis superioribus nebulosis, an-
 tennis corpore triplo longioribus. *Linn. Syst. Nat.*
 2. 910. 15. *Fn. Sv.* 1492.
Phryganea alis superioribus nebulosis nigro puncta-
 tis, antennis triplo longioribus. *Geoff. Inf.* 2. 249. 7.
 Habitat in Europa.
22. P. nigra, alis testaceis, fasciis quatuor nigris, anten- *4fasciata.*
 nis longissimis. *Syst. Ent.* 308. 16.*
 Habitat in Angliae aquosis.
23. P. alis rotundatis fuscis immaculatis, antennis corpo- *filosa.*
 re triplo longioribus. *Syst. Ent.* 308. 17.*
Phryganea filosa alis cylindrico incumbentibus flaue-
 scensibus, antennis corpore triplo longioribus. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 910. 16. *Fn. Sv.* 1493.?
 Habitat in Anglia.
24. P. fusco cinereoque variegata, palpis villosis. *minuta.*
Phryganea minuta nigra, palpis villosis capite lon-
 gioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 911. 23. *Fn. Sv.* 1501.
 Habitat in Europa.

pusilla. 25. P. alis ciliatis testaceo fuscis, antennis albo nigroque annulatis.

Habitat in Italia. *D. Allioni*.

Corpus paruum, obscurum. Antennae longitudine corporis, annulatae. Alae anticae testaceae, ciliatae, posticae magis fuscae.

101. H E M E R O B I V S.

cornutus. 1. H. mandibulis porrectis corniformibus. *Gen. Inf. Mantiss.* 244.

Hemerobius maxillis corniformibus porrectis capite longioribus, alis griseo fuscis albo punctatis. *Deger. Inf.* 3. 559. 1. tab. 27. fig. 1.

Raphidia cornuta maxillis corniformibus porrectis thorace longioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 916. 3.

Habitat in America boreali.

Forte proprii generis insectum.

perla. 2. H. luteo viridis, alis hyalinis, vasis viridibus. *Syst. Ent.* 309. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 911. 2. *Fn. Sv.* 1504. *Geoff. Inf.* 2. 253. 1. tab. 13. fig. 6.

Musca quadripennis, corpore luteo viridi, alis perampliis, e flavo pariter virentibus. *Raj. Inf.* 274.

Hemerobius chrysops. *Scop. carn.* 708.

Musca chrysops. *Mouff. Inf.* 937.

Perla inerدام olens. *Petiv. Mus.* 4. 6.

Goed. Inf. 2. 40. tab. 14.

Alb. Inf. tab. 64.

Merian. Europ. 3. 49. tab. 8.

Vall. nat. 1. 77. tab. 2.

Reaum. Inf. 3. tab. 33. fig. 2. 5. 6.

Roef. Inf. 3. tab. 21. fig. 4. 5.

Schaeff. Icon. tab. 5. fig. 7.

Habitat in Europa, viettans aphidibus.

Oua stipiti capillari insident.

albus. 3. H. albus, alis hyalinis, oculis aeneis. *Syst. Ent.* 309.

3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 911. 3. *Fn. Sv.* 1506.

Habitat in Europae plantis.

Praecedenti nimiris affinis.

4. *H. viridi nigroque varius, alis hyalinis, maculis reticulatis.* Syst. Ent. 309. 4. Linn. Syst. Nat. 2. 912. 4. Fn. Sv. 1505. *chrysops.*
Hemerobius luteus, alis aqueis, vasis fusco punctatis. Geoff. Inf. 2. 254. 2.
Hemerobius viridis nigro maculatus, alis neruis nigris. Degeer Inf. 2. 2. 68. 1. tab. 22. fig. 1.
Frisch. Inf. 4. 40. tab. 23.
Reaum. Inf. 3. tab. 33. fig. 14 - 16.
Roef. Inf. 3. tab. 21. fig. 3.
Schaeff. Icon. tab. 5. fig. 7. 8.
Sulz. Hist. Inf. tab. 25. fig. 1.
Habitat in Europae nemoribus.
5. *H. testaceus, alis basi mucronatis postice excisis.* Syst. phalaenoides. Ent. 310. 5. Linn. Syst. Nat. 2. 912. 5. Fn. Sv. 1508.
Hemerobius testaceus, thorace angulato, alis latis postice excisis. Degeer Inf. 2. 2. 73. 4. tab. 22. fig. 12. 13.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 11. 12.
Scop. Ann. Hist. nat. 5. 120. 141.
Sulz. Hist. Inf. tab. 25. fig. 2.
Reaum. Inf. 3. tab. 32. fig. 8.
Habitat in Europa.
Alae testaceae striga obliqua punctoque fuscis.
6. *H. alis fusco nitidulis, corpore testaceo, pedibus pal- nitidulus.* lidis. Gen. Inf. Mant. 245. *
Habitat in Germania. Dom. de Hattorf.
7. *H. flavesens, alis albis, strigis fuscis.* Syst. Ent. 310. 6. hirtus.
Hemerobius hirtus alis albis fusco reticulatis, fasciis duabus fuscescentibus. Linn. Syst. Nat. 2. 912. 6. Fn. Sv. 1507.
Hemerobius griseus fusco maculatus, alis albis punctis pilisque fuscis. Degeer Inf. 2. 2. 70. 12. tab. 22. fig. 4. 5.
Habitat in Europae humulo, corylo.
8. *H. alis albis, punctis sparsis fuscis, antennis albo ni- Humuli. groque annulatis.* Syst. Ent. 310. 7. Linn. Syst. Nat. 2. 912. 10. Fn. Sv. 1510.
Habitat in lupuletis Vpsaliensibus.

- longicor-* 9. *H. niger*, ore pedibusque pallidis, antennis longioribus fuscis. *Gen. Inf. Mant.* 245. *
Habitat in praedio comitis nobilissimi Holk. Eikhoff.
prope a Kilouio.
- striatulus.* 10. *H. fuscus* flauo maculatus, alis fusco striatis, posticis immaculatis. *Syst. Ent.* 310. 8. *
Habitat in Europae hortis.
- 6puncta-* 11. *H. alis albis*, maculis fuscis, postice punctis sex distinctis, antennis fuscis. *Syst. Ent.* 310. 9. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 913. 12. *Fn. Sv.* 1511.
Phryganea fusca, alis albis fusco maculatis. *Geoffroy Inf.* 2. 250. 10.
Habitat in Europae hortis.
- flavicans.* 12. *H. niger*, thorace abdomineque flauis. *Syst. Ent.* 310.
 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 913. 13. *Fn. Sv.* 1512.
Habitat in Europae hortis.
- 2puncta-* 13. *H. flauo fuscoque varius*, alis punctis duobus nigris.
 tus. *Syst. Ent.* 310. 11. *Linn. Fn. Sv.* 1514.
Habitat in Europa.
Puncta duo alarum nigra, posteriore maiore.
- abdomi-* 14. *H. fuscus*, abdomine flauo, ano nigro. *Syst. Ent.*
nalis. 310. 12. * *It. Norwag.* d. 3. August.
Habitat in Anglia, in Norwagia, capt. d. 3. August.
- pulsato-* 15. *H. apterus* ore rubro, oculis luteis. *Syst. Ent.* 311. 13.
 rius. *Termes pulsatorium* abdomine oblongo, ore rubro,
 oculis luteis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1015. 2. *Fn. Sv.*
 1937.
Termes lignorum albidum, oculis maculisque abdominalibus rufis. *Degeer Inf.* 7. 41. 1. tab. 4. fig. 1.
Pediculus ligni antiqui. *Geoff. Inf.* 2. 601. 12.
Bradl. nat. tab. 27. fig. 3.
Att. angl. 270. p. 231. et 291.
Roland. Att. Holm. 1754. 152.
Sulz. Inf. tab. 22. fig. 144.
 - - *Hift. Inf. tab.* 29. fig. 3.
Schaeff. Elem. tab. 126.

Scop. carn. 1032.

Derh. theol. 119.

Raj. Inf. 8.

Blank. belg. 169. tab. 14. fig. F.

Habitat in Europa, America frequens in domibus, in uisus vestibus, herbariis, muscis.

Femina horologii instar pulsatoria in ligneis festucis.

16. *H. apterus*, ore pallido, oculis fuscis. *Syst. Ent. fatidicum.* 311. 14.

Termes fatidicum abdomine ouato, ore pallido, oculis fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1016. 3. *Fn. Sv.* 1938.

Frisch. Inf. 11. p. 2. tab. 10.

Habitat in Europa.

Nimis praecedenti affinis, at paullo maior.

102. T E R M E S.

1. *T. supra fuscum*, thorace segmentis tribus, alis pallidis, costa testacea. *Syst. Ent.* 390. 1. *fatale.*

Termes fatale luteum, alterius maxillis longitudine antennarum. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1015. 1. Larua et Puppa.

Termes destruitor albidum capite luteo, antennis filiformibus, alterius maxillis longitudine antennarum.

Degeer Inf. 7. 50. 3. tab. 37. fig. 1. 2.

Termes arda. *Forsk. Descript. anim.* 96. 61. tab. 25. fig. A.

Acta Soc. Berol. phys. 1. 177.

— — — — — 4. tab. 1. fig. 1—5.

Habitat in Indiae orientalis et Africae aequinoctialis vimbrosis, cuius calamitas summa, fornices cylindricos progrediendo inaedificans, nidos e sabulo simibus daedalaeis in tophum struens, tumulos altitudine hominis dupla turnulis cauis conicis semper progreendiendo erigens.

Destruit utensilia, cibaria, vestimenta, relicta sola superficie integra, calce viua coercendum, incolis aubusque domesticis esculentum.

Observationibus *D. Smeathmann* nuper ex Africa reducis animaleculi oeconomiam accuratiorem debemus.

Oua

Oua innumera, parua, rotundata, fusca.

Larua parua, hexapoda, plerumque pallens, capite subrotundo, testaceo, maxillis breuibus, validis dentatis, oculis nullis coecutiens, antennis moniliformibus longitudine thoracis. Thorax segmentis tribus abdomen ouatum. Haec sola operaria tumulos semper sub superficie degens erigit, parentes nutrit ouaque curat.

Puppa, olim neutrum dicta, capite maximo ouato laeui testaceo, nitido, maxillis porrectis longitudine capitis forficatis, edentulis, acutis, atris, antennis moniliformibus longitudine thoracis, oculis nullis coecutiens. Thorax et abdomen pallescentia. Haec nunquam operaria, tantum militans, defendit familiam morsu acuto maxillis forficatis nunquam extrahendis. Maxillis porrectis lignum foliaque cum sibilo pulsant, ut animent operarios ad diligentiores laborem.

Mas feminaque simillimae, alatae, capite paruo fusco maxillis breuibus, acutis, dentatis, antennis moniliformibus flavescentibus, oculisque globosis prominulis nigris. Thorax segmentis tribus aequalibus, marginatis fuscis siue obscure testaceis. Abdomen ouatum dorso fusco strigis albis. Feminae grauidae abdomen intumescit ad magnitudinem diti maioris vesiculosum, album, maculis transuersis fuscis margine inaequali vndulante. Oua continet innumera per lineas parallelas disposita, quae continuo per annos ponit. Alae corpore duplo longiores pallidae costa testacea. Pedes pallescentes. Examinant ambo aera nocturno tempore, at sole oriente alae exsiccantur, decidunt, includuntur a laruis operariis in celulis, quarum aperturam diminuunt, ne amplius exeat, et a minoribus operariis sustentantur.

- destru-* 2. T. supra testaceum, capite atro, antennis flauis.
ctor. *Hemerobius marginalis* flauus, alis hyalinis margine fuscis corpore triplo longioribus. *Linn. Syst. Nat.*
 2. 912. 9.
Degeer Inf. 3. tab. 21. fig. 6. 7.
Termes monoceros. *Koenig Att. Soc. Berol. phys.* 4. tab.
 1. fig. 5. *Larua.*

Habitat

Habitat in Americae meridionalis insulis, in India orientali, nidum ouatum, densum circa arborum ramos inaedificans.

Larua obscure pallida, capite ouato atro antice producto conico acuto, absque oculis coecutiens.

Imago praecedenti affinis, at duplo minor capiteque atro distinctus.

3. T. nigrum, abdominis segmentis apice albis, pedibus *arda*.
pallidis.

Habitat in Africa aequinoctiali, cylindros 2 — 3 pedum, capitulo orbiculato fornicato margine integro vndique prominente, argilla fusca plantis graminibusque variis mixta inaedificans. Oeconomia omnino praecedentium. *D. Smeathmann*.

Larua operaria, capite pallido, antennis moniliformibus, oculis nullis coecutiens maxillisque breuibus, dentatis. Thorax et abdomen ouata, cinereo plumbea pedibus pallidis.

Puppa militans capite maximo testaceo, antice eleuato gibbo, postice ouato obtuso, producto maxillis porrectis fareatis atris antennisque moniliformibus testaceis longitudine capitis, oculis nullis coecutiens. Thorax paruuus abdomenque ouatum cinereo plumbea. Pedes testacei.

Imago praecedentibus minor. Nigra segmentorum marginibus albis. Alae incumbentes nigrae. Pedes omnes pallide testacei.

Conf. *Hemerobius testaceus* fusco testaceus, alis nigris corpore triplo longioribus. *Linn. Syst. Nat. 2. 912. 8.*

Degeer Inf. 3. tab. 21. fig. 4. 5.

Hoc Termes ex America videtur affine, attamen differens.

4. T. nigrum, abdominis segmentis apice albis, pedibus *mordax*.
nigris.

Habitat in Africa aequinoctiali, cylindros minores capitulo orbiculato fornicato margine vndique prominente argilla fusca plantis graminibusque variis mixta struens. Oeconomia omnino praecedentium. *D. Smeathmann*.

Affine

Affine praecedenti, at minus, et differt alis brevioribus margine exteriori fusco pedibusque omnibus nigris.
Larua et *puppa* praecedentis similes, at semper minores, forte praecedentis mera varietas.

Termes viarum. Koenig Act. Soc. Berol. phys. 4. tab. 1. fig. 8. , etiam in Mus. Dom. Banks obseruauit. Est Larua aliis speciei huius generis distincta ab omnibus oculis binis nigris. Reliquum specierum laruae et pupae sub terrae superficie tantum in tenebris degunt, haec vero sub dio uti formica migrat.

Videtur *Termes capensis* luteus antennis filiformibus, dentibus porrectis nigris interdum alatus, alis diaphanis fusco marginatis. Degeer Inf. 7. 47. 2. tab. 38. fig. 1. 2. 3. at color differt.

103. M Y R M E L E O N.

libelluloides. 1. M. alis griseis fusco maculatis, corpore nigro flauoque variegato. Syst. Ent. 311. 1.

Myrmeleon libelluloides alis nigro punctatis maculatisque. Linn. Syst. Nat. 2. 913. 1. Drury Inf. 1. tab. 46. fig. 1. Sulz. Hist. tab. 25. fig. 3.

• *Myrmeleon maculatum* niger collari luteo, alis griseis nigro maculatis neruisque flauis. Degeer Inf. 3. 365. 2. tab. 27. fig. 9.

• *Hemerobius libelluloides*. Mus. Lud. Vlr. 401.

• *Musca* rarissima ad libellas referenda. Raj. Inf. 53.

Libella turcica maior alis locustae. Petiv. 6. tab. 3. fig. 1.

• Habitat ad Cap. bon. sp.

Hemerobius speciosus Linnaei eiusdem speciei.

Pardalis. 2. M. alis albis, punctis nigris sparsis, femoribus flauis. Habitat in Coromandel. Mus. Dom. Banks.

Duplo praecedente minor. Caput et thorax nigro flauoque variegata. Antennae atrae clava compressa. Abdomen flauum nigro maculatum. Alae albae maculis plurimis sparsis nigris. Pedes nigri femoribus flauis.

formica- 3. M. alis fusco nebulosis, macula alba marginali postica. rium. Linn. Syst. Nat. 2. 914. 3. Syst. Ent. 312. 2.

Formi-

Formicaleo. Geoff. *Inf.* 258. tab. 14. fig. 1.

, *Vallisi.* *Opera* 1. p. 77. tab. 2.

Reaum. *Inf.* 4. tab. 14. fig. 18. 19.

tab. 11. fig. 6. 8.

tab. 32. 33. 34.

Roeſ. *Inf.* 3. tab. 17 — 20.

Sulz. *Inf.* tab. 17. fig. 105.

Schaeff. *ELEM.* tab. 65.

Icon. tab. 22. fig. 1. 2.

Pod. *Inf.* tab. 1. fig. 8.

Habitat in Europae arenosis.

Larua retrograda sub fouea excauata formicis insidiatur.

4. M. alis hyalinis fusco submaculatis, neruis nigro maculatis. *Syst. Ent.* 312. 3. *

Habitat in Madera Insula. *Mus. Dom. Banks.*

5. M. alis immaculatis, corpore fusco. *Syst. Ent.* 312. 4. *Catta.*
Myrmeleon formicalynx alis immaculatis hyalinis, ante- *formica-*
tensis setaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 914. 4. *lynx.*

Myrmeleon immaculatum alis hyalinis, macula albida,
corpore fusco maculis griseis. *Degeer Inf.* 3. 564. 1.
tab. 27. fig. 8.

Roeſ. *Inf.* 3. tab. 21. fig. 2.

Habitat in America, Africa.

Antennae in nostro specimine clauatae, uti in congeneribus.

6. M. alis hyalinis immaculatis, corpore fusco, thoracis *tigrinum.*
margine pedibusque flavis. *Syst. Ent.* 312. 5. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

104. A S C A L A P H V S.

1. A. alis reticulatis flauescente hyalinis, maculis duabus *barbarus.*
fuscis. *Syst. Ent.* 313. 1.

Myrmeleon barbarum alis hyalinis, antennis longitudo
corporis, clava suborbiculata. *Linn. Syst. Nat.*
2. 914. 5.

Libelluloides f. *Libellula spuria.* *Schaeff. Monogr.* 1763.

Schaeff.

Schaeff. *Elem.* tab. 77.

Icon. tab. 50. fig. 1. 2. 3.

Seb. Mus. 3. tab. 86. fig. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 25. fig. 4.

Habitat in Europa australi, Africa.

Antennae longitudine corporis clava compressa truncata. Alae hyalinae, reticulatae, flavescentes macula baseos apiceque nigris. Thorax flavo maculatus.

italicus. 2. A. alis anticis hyalinis, macula dupliciti baseos flava, posticis flavis basi atris.

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Vix a praecedente distinctus. Caput nigrum, hirtum pilis in medio atris superne inferneque ferrugineis.

capensis. 3. A. alis albis nigro reticulatis, cauda forcipata.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo et statura praecedentis. Antennae elongatae fuscae clava compressa nigra. Caput hirtum nigrum. Corpus nigrum. Abdomen terminatur forcipe valida, ciliata. Alae omnes albae fusco reticulatae et praeterea costa alarum nigro maculata. Pedes nigri.

105. P A N O R P A.

communis. 1. P. alis aequalibus nigro maculatis. *Syst. Ent.* 313. 1.
Linn. Syst. Nat. 2. 915. 1. *Fn. Sv.* 1516.

Panorpa flavo nigroque varia, alis nigro maculatis.
Degéer Inf. 2. 2. 86. tab. 24. fig. 3. 4.

Musca Scorpiorum. *Aldrov. Inf.* 386. fig. 8. 9.
387. fig. 5. 6.

Panorpa. *Geoff. Inf.* 2. 260. tab. 14. fig. 2.

Scorpio Musca. *Frisch. Inf.* 9. tab. 14. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 25. fig. 5. 6.

Mouff. Inf. 62. fig. 3. 4.

Reaum. Inf. 4. tab. 8. fig. 9.

Schaeff. Elem. tab. 93.

Icon. tab. 88. fig. 7.

Sulz. Inf. tab. 17. fig. 106.

Alt. nidros. 3. 414. tab. 6. fig. 10.

Habitat

Habitat in Europa, vicitans rapina in primis diptero-
rum.

Metamorphosis omnino adhuc latet.
Mas cauda chelifera, femina inermi.

2. P. alis aequalibus hyalinis apice fuscis. *Syst. Ent.* 313. *germani-*
ca.
2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 915. 2.

Habitat in Germania.

Vix a praecedente satis distincta.

3. P. alis subulatis subincuruatis ciliatis, femina aptera. *hyemalis.*
Syst. Ent. 314. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 915. 3.

Habitat Halae Saxonum mense regelationis.

Statura praecedentium, at vix pediculo duplo maior.

4. P. alis immaculatis, abdomine falcato, pedibus longis. *tipularia.*
fimis. *Syst. Ent.* 314. 4.

Panorpa italica lutea, alis aequalibus, puncto marginali, abdomine falcato. *Müller. Att. Taurin.* 3. 194.

Panorpa tipuloides alis omnibus aequalibus ferrugineis immaculatis, pedibus longis. *Schrank. Beytr.* 82. 40.

Sulz. Hist. Inf. tab. 25. fig. 7. 8.

Habitat in Europa australiori. *D. Allioni.*

Figura omnino *Tipulae*, at character huius generis et
alae quatuor.

5. P. alis erectis, posticis sublinearibus longissimis. *Syst. Coa.*
Ent. 314. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 915. 4.

Ephemera Coa. *Hasselqu. Iter* 423.

Att. Holm. 1747. 176. tab. 6. fig. 1. mal.

Ruysch. Thesaur. animal. tab. 1. fig. 2. D.

Petiv. Gazoph. 1. tab. 73. fig. 1.

Habitat in Archipelagi insulis.

6. P. alis anticis flavo fuscoque variis, posticis longissimi- *haltera-*
mis fuscis, maculis tribus albis. *Gen. Inf. Mant.* 246.* *ta.*

Panorpa halterata. *Forsk. Descr. animal.* 97. tab. 25.
fig. 2.

Habitat in Oriente.

Statura et summa affinitas praecedentis.

Fabr. Spec. Inf.

C c

106. RA-

106. R A P H I D I A.

notata. 1. *R. thorace cylindrico*, alis macula marginali fusca.
Habitat in Anglia. Mus. Dom. Banks.
Affinis R. ophiopsis, at paullo maior. *Corpus nigrum*
macula capitinis subtestacea. Aculeus exsertus longi-
tudine abdominalis. Alae magnae, reticulatae, macu-
la magna fusca marginali. Pedes testacei femoribus
nigris.

Ophioptis. 2. *R. thorace cylindrico*, alis immaculatis. *Syst. Ent.* 314.
 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 916. 1. *Fn. Sv.* 1517.

Raphidia nigra, abdomen flavo striato, thorace cy-
 lindrico. *Degeer Ins.* 2. 2. 93. tab. 25. fig. 4.

Raphidia. Geoff. Ins. 2. 233. 1.

Scop. carn. 711.

Sulz. Hist. Ins. tab. 25. fig. 9.

Roef. Ins. 3. tab. 21. fig. 6. 7.

Schaeff. Elem. tab. 107.

Icon. tab. 95. 1. 2.

Habitat in Europae pinetis.

Pupa agilis, currens, matri simillima, at aptera.

mantispa. 3. *R. pedibus anticis thoraci antice annexis, antennis*
thorace brevioribus. Syst. Ent. 314. 2. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 916. 2.

Sulz. Hist. I:if. tab. 25. fig. 10.

Pod. Ins. 101. tab. 1. fig. 15.

Scop. carn. 712.

Habitat in Europa australiori.

Tarde progreditur vnto et tibiis complicatis, solis fe-
 morum geniculis insistens, quibus explicatis ad-
 scandit.

107. C Y N I P S.

Rosae. 1. *C. nigra*, abdomen ferrugineo postice nigro, pedibus
 ferrugineis. *Syst. Ent.* 315. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2.
 917. 1. *Fn. Sv.* 1518.

Diplolepis Bedeguaris niger, abdomen ferrugineo,
 apice nigro, pedibus rufis. *Geoff. Ins.* 2. 310. 2.

Blank.

Blank. *Ins.* tab. 16. fig. V — Z.

Reaum. *Ins.* 3. tab. 46. fig. 5 — 8. et tab. 47. fig.

1 — 4.

Habitat in *Bedeguar rosarum hispido.*

2. *C. fusca*, thorace villoso. *Syst. Ent.* 315. 2. *Glecho-*
Cynips Glechomae hederaceae. Linn. Syst. Nat. 2. 917. *mæ.*
 3. *Fn. Sv.* 1520.

Cynips totus fuscus, thorace villoso. *Geoff. Ins.* 2.
 303. 20.

Reaum. *Ins.* 3. tab. 42. fig. 1 — 5.

Welsh. *hecast.* tab. 127. fig. 1.

Habitat in *Glechomae hederaceae gallis globosis, scabris*
foliorum.

3. *C. nigra*, antennarum basi pedibusque flatiescentibus. *Quercus*
Syst. Ent. 315. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 917. 4. *Fn. Sv.* *bacca-*
 1522. *rum.*

Cynips niger, pedibus fuluo flauis, gallarum fungiformium quercus. *Geoff. Ins.* 2. 300. 9.

Vdm. Dissert. 81. tab. 1. fig. 14.

Reaum. *Ins.* 3. 192. tab. 42. fig. 8.

Habitat in gallis foliorum quercus pellucidis subglobosis paginae inferiori adhaerentibus, magnitudine pisfi, exiens media aestate.

4. *C. nigra*, thorace lineato, pedibus griseis, femoribus *Quercus*
subtus nigris. Syst. Ent. 315. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. *folii.*
 918. 5. *Fn. Sv.* 1521.

Diplolepis fuscus gallae globosae glabrae et durae foliorum quercus. Geoff. Ins. 2. 309. 1.

Sulz. Hist. Ins. tab. 26. fig. 1.

Frisch. Ins. 2. tab. 3. fig. 5.

Sulz. Ins. tab. 18. fig. 108.

Reaum. *Ins.* 3. tab. 39. fig. 14 — 17.

Blanc. Ins. tab. 16. fig. A — H.

Roes. Ins. 3. tab. 52. 53.

Habitat in gallis foliorum quercus paginae inferioris, auellanae magnitudine.

5. *C. atra*, antennis pedibusque pallidis. *Syst. Ent.* 316. 5. *Quercus*
Linn. Syst. Nat. 2. 918. 6. *inferus.*

Habitat in Gallis globosis, opacis, rubris foliorum
quercus paginae inferiori innatis.
Alae hyalinae absque venis aut puncto costali.

Quercus 6. *C. nigra*, pedibus albidis, femoribus fuscis. *Syst. Ent.* 316. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 918. 7. *Fn. Sv.* 1523.

Cynips fuscus nitens, capite nigro, abdominis apice
villoso, gallae racemosae quercus. *Geoff. Inf.* 2.
301. II.

Roeſ. Inf. 3. tab. 35. 36.

Reaum. Inf. 3. tab. 35. fig. 3.

Habitat in gallis vtrinque conuexis petiolorum quer-
cus.

Quercus 7. *C. grisea*, alis cruce linearis. *Syst. Ent.* 316. 7. *Linn.*
pedunculi. *Syst. Nat.* 2. 918. 8. *Fn. Sv.* 1524.

Cynips gallae pomiformis extremitatis rāmorū quer-
cus. *Geoff. Inf.* 2. 302. 16.

Reaum. Inf. 3. tab. 40. fig. 1 — 6.

Habitat in quercus floribus inaequalibus, gallis granulatis in
catenas nodorum.

Quercus 8. *C. pallida*, alis ab domine que nigris. *Syst. Ent.* 316. 8.
ramuli. *Linn. Syst. Nat.* 2. 918. 10. *Fn. Sv.* 1527.

Habitat in gallis lanatis albis quercus rainulorum.

Fagi. 9. *C. atra*, immaculata. *Syst. Ent.* 316. 9.

Cynips Fagi syluaticae. *Linn. Syst. Nat.* 2. 919. 12.
Fn. Sv. 1528.

Frisch. Inf. 2. tab. 5.

Habitat in gallis pyriformibus paginae superioris fagi
syluaticae foliorum.

viminalis. 10. *C. flava*, thorace nigro. *Syst. Ent.* 316. 10. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 919. 13. *Fn. Sv.* 1529.

Roeſ. Inf. 2. *Vesp.* tab. 10. fig. 5 — 7.

Habitat in salicis viminalis foliis sub costa.

Capreae. 11. *C. viridis* nitida, pedibus pallidis. *Syst. Ent.* 316. 11.
Linn. Syst. Nat. 2. 919. 14. *Fn. Sv.* 1531.

Frisch. Inf. 4. 39. tab. 22.

Habitat in salicis gallis ferrugineis, hordeiformibus,
foliis innatis, nec non in aliis excrecentiis rāmorū.

12. C.

12. C. atra, thoracis tergo virescente. *Syst. Ent.* 317. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 919. 15. *Fn. Sv.* 1532. *Salicis strobili.*
Schulze de Rosis Salicinis. Act. Dresd. 1.
 Habitat in salicis glabrae apicibus ramulorum strobili-formibus e foliolis.
13. C. nigra, pedibus pallidis. *Syst. Ent.* 317. 13. *Linn. Amer. Syst. Nat.* 2. 919. 16. *Fn. Sv.* 1536. *nae.*
 Habitat in salicis pentandrae gallis inaequalibus, ramos terminantibus.
14. C. Ficus Caricae. *Syst. Ent.* 317. 14. *Linn. Syst. Nat. Psenes.*
 2. 919. 17. *Amoen. acad.* 1. 41.
Hasselqu. Iter 424. 111. 112.
Ponteder. Anthol. tab. 11. fig. 12. 13. 14.
 Habitat in grossis Ficus Caricae orientalis.
15. C. Ficus Sycomori. *Syst. Ent.* 317. 15. *Linn. Syst. Nat. Sycomori.*
 2. 919. 18. *Mus. Lud. Vlr.* 404.
Hasselqu. Iter 426. 113.
 Habitat in Aegypti Ficus Sycomori grossis.
 Corpus nigrum aculeo exerto debili.

108. T E N T H R E D O.

* Antennis clauatis.

1. T. antennis clauatis luteis, corpore atro, femoribus *femorata*. posicis maximis. *Syst. Ent.* 317. 1. *Linn. Syst. Nat.* 920. 1. *Fn. Sv.* 1533.
Tenthredo nigra, antennis clauatis, abdominalis basi macula flava, antennis pedibusque luteis. *Degeer Inf.* 2. 2. 229. 2. *tab.* 34. *fig.* 3. 4.
Crabro niger, segmento primo margine inciso: lumen la flava. *Geoff. Inf.* 2. 263. *tab.* 14. *fig.* 4.
Alb. Inf. *tab.* 69.
Sulz. Hist. Inf. *tab.* 26. *fig.* 4.
Scopol. Ann. Hist. nat. 5. 120. 142.
Schaeff. Icon. *tab.* 104. *fig.* 1. 2.
 Habitat in Europae alno, salice.
 La flava viridis linea dorsali coerulea, laterali flava.

- lucorum.* 2. *T. antennis clauatis nigris, corpore villoso atro.* *Syst. Ent.* 317. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 921. 6. *Fn. Sv.* 1537.
Habitat in betula, alno.
- lutea.* 3. *T. antennis clauatis, abdominis segmentis plerisque flauis.* *Syst. Ent.* 318. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 921. 3. *Fn. Sv.* 1534.
Tenthredo brunnea, antennis clauatis, abdomine flauo nigro striato fasciatoque. *Degeer Inf.* 2. 2. 223. 1. tab. 33. fig. 8 — 16.
Roef. Inf. 2. *Vesp.* tab. 13.
Albin. Inf. tab. 59. a. b. c.
Schaeff. Icon. tab. 103. fig. 2. 3.
Frisch. Inf. 4. tab. 25.
Habitat in salice, alno, betula.
Larua glabra, viridis, linea dorsali nigra.
- Ameri-* 4. *T. antennis clauatis, corpore cinereo, abdomine sub-*
nac. *Tenthredo nigra, antennis clauatis, abdomine lateri-*
bus subtusque rufo, pedibus testaceis. *Degeer Inf.*
2. 2. 232. 3. tab. 33. fig. 20.
Tenthredo Amerinae. *Scop. carn.* 720.
Roef. Inf. 2. *Vesp.* tab. 1. et tab. II.
Goed. Inf. 1. tab. 64.
Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 8. 9.
Habitat in salice.
Larua rugosa viridis albo irrorata.
- margina-* 5. *T. antennis clauatis apice lutescentibus, corpore ni-*
ta. *Tenthredo nigra, antennis clauatis apice fuscis.* *Iter*
Norwag. 334. *
Habitat in insularum Sundinoerensium betula. *Don.*
Stroem.
Larua viridis, linea dorsali azurea, atra et lutea am-
briata.

7. *T. antennis clauatis, abdomine supra nigro, lateribus rufis, femoribus posticis dentatis.* *Syst. Ent.* 318. 6.* *Vitellinae.*
Tenthredo Vitellinae antennis clauatis, ore elabiato, abdomine rufo dorso nigro, femoribus posticis dentatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 921. 5. *Fn. Sv.* 1535.
Stroem. Sundm. 171. tab. 10. fig. II.
 Habitat in betula, salice.
 Antennae flavae apice nigrae.
 Larua virescens per aperturam ante anum tanquam e siphone aquam exspuit.
8. *T. antennis clauatis nigris atra, alis anticis fascia fusca. fasciata.*
Syst. Ent. 318. 7. *
Tenthredo fasciata *antennis clauatis nigris, abdomine glabro atro, alis superioribus fascia fusca.* *Linn.*
Syst. Nat. 2. 921. 7. *Fn. Sv.* 1538.
 Habitat in Europa boreali.
9. *T. antennis clauatis luteis, thorace atro, abdomine sericea. aeneo.* *Syst. Ent.* 319. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 921. 8.
Tenthredo viridis nitida, tibiis flavis, antennis clauatis nouem articulatis, alis flavescentibus macula fusca. *Degeer Ins.* 2. 2. 275. 26. tab. 38. fig. 34.
Schaeff. Elem. tab. 51.
10. *Tenthredo nitens antennis clauatis luteis, abdomine viridi coerulescente, nitente.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 922. 10. *Fn. Sv.* 1539. Femina,
Sulz. Ins. tab. 18. fig. 109.
 Habitat in Europae betula,
 Larua brevis, viridis, lineis duabus flavis, capite cincereo, fascia brunnea.
11. *T. antennis clauatis, corpore glabro nigro.* *Syst. Ent.* obscura.
 319. 9.*
 Habitat in Sueciae nemoribus.
- ** *Antennis exarticulatis extrorsum crassioribus.*
11. *T. antennis clauato filiformibus exarticulatis, corpore vistulata. nigro, abdomine coerulescente, tibiis pallidis.* *Linn.*
Syst. Nat. 2. 922. 13. *Fn. Sv.* 1542.

Tenthredo violacea nitida, antennis clauatis nouem articulatis nigris, alis fusco hyalinis. *Degeer Inf.* 2. 2. 277. tab. 39. fig. 19. 20.

Sulz. Inf. tab. 18. fig. 3.

Att. nidros. 3. 373. 39.

Habitat in *Europae rosa canina*.

Larua viridis lineis duabus albis, capite testaceo, fascia obscura.

enodis. 12. *T.* antennis clauato filiformibus exarticulatis, corpore atro coerulecente. *Linn. Syst. Nat.* 2. 922. 11.

Tenthredo violacea, antennis clauatis triarticulatis.

Degeer Inf. 2. 2. 282. 29. tab. 40. fig. 9. 10.

Tenthredo violacea. *Iter Norwag.* 64.

Habitat in *Europae salice*.

Larua viridis nigro punctata linea laterali rugosa flava, cauda acuta.

clauicor- 13. *T.* antennis clauato filiformibus exarticulatis nigra, nis.

Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.* Antennae flavescentes basi nigrae. Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen flavum ano nigro. Pedes flavi femoribus nigris. Alae anticae macula marginali fusca.

*** Antennis pectinatis.

cephalo- 14. *T.* antennis pectinatis atra, abdomine cingulis quatuor flavis.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Magna. Caput grande, atrum, punctis tribus inter oculos lunulisque duabus posticis flavis. Antennae breves, pectinatae, testaceae. Thorax ater striga antica interrupta glauca. Abdomen glabrum, atrum, cingulis quatuor flavis anteriore maiore. Pedes ferruginei.

dorsata, 15. *T.* antennis subpectinatis albida, capite thoracis abdminisque dorso nigris.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura T. fericeae. Antennae multiarticulatae, nigrae pilis breuibus fasciculatis serratae. Caput nigrum. Thorax albidus maculis tribus fere totum abdomen occupantibus nigris. Abdomen albidum dorso fusco, basi apiceque tamen albido. Pedes albi femoribus intus linea atra.

16. T. antennis pennatis obtusis, thorace glabro. *Syst. Juniperi.*
Ent. 319. 10. Linn. Syst. Nat. 2. 923. 15. Fn. Sv. 1541.
Vdm. Diff. 51. fig. 12.

Tenthredo pterophorus. Sulz. Inf. tab. 18. fig. 10.
Hist. Inf. tab. 26. fig. 5. 6.

Habitat in Junipero.

Larua viridis nigro punctata.

17. T. antennis pennatis lanceolatis, thorace subuilloso. *Pini.*
Syst. Ent. 319. 11. Linn. Syst. Nat. 2. 922. 14. Fn.
Sv. 1540.

Tenthredo nigra, antennis vno versu peccinatis, tibiis tarassisque flauis. Geoff. Inf. 2. 286. 33.

*Tenthredo antennis peccinatis pedibusque cinereis fe-
 mina cinerea, capite maculisque nigris. Degeer Inf.*
2. 2. 247. 10. tab. 36. fig. 13 — 18.
Schaeff. Icon. tab. 68. fig. 7. 8.
Vdm. Diff. 90. fig. 13.

Habitat in pino Europae borealis frequens.

**** Antennis filiformibus articulis 7 - 9.

18. T. antennis septemnodiis, abdome cingulis quinque *Scrophu-*
flauis, primo remotiore. Syst. Ent. 319. 12. Linn. lariae.
Syst. Nat. 2. 923. 17. Fn. Sv. 1545.

*Tenthredo nigra, segmentorum abdominalium margi-
 nibus, excepto secundo et tertio, flauis. Geoff. Inf.*
2. 277. 13.

Reaum. Inf. 5. tab. 13. fig. 12 - 33.

Blackie. herb. tab. 87. fig. 10.

Habitat in scrophulariis Europae.

Larua 22poda, niuea nigro punctata.

19. T. antennis septemnodiis, corpore variegato. *Salicis.*
Tenthredo Salicis antennis septemnodiis, corpore fla-
Cc 5 uo,

uo, vertice capitis thoracisque nigris. Linn. Syst.
Nat. 2. 924. 21. Fn. Sv. 1548.

Tenthredo antennis filiformibus nouem articulatis,
corpore pedibusque flauis, capite, thorace antennis-
que nigris. Degeer Inf. 2. 2. 259. 14. tab. 37. fig.
19. 20.

Reaum. Inf. 5. tab. 11. fig. 10.

Habitat in populo, salicibus.

Larua per phalanges parallelas pascens, plana, hirsuta,
flaua, lineis vtrinque duabus lateralibus e punctis
nigris, capite nigro.

flauicor- 20. *T. antennis septemnodiis flaua, capite caudaque nigris.*
nis. Habitat in Germania, in Italia. D. Allioni.

Magnitudo praecedentis. Caput atrum antennis flauis.
Thorax niger disco flauo. Abdomen subpellucidum,
flauum, apice nigrum. Alae hyalinae apice fuscescen-
tes. Pedes flavi.

viridis. 21. *T. antennis septemnodiis, corpore viridi, abdomine
supra fusco.* Syst. Ent. 320. 14. Linn. Syst. Nat. 2.
924. 27. Fn. Sv. 1554.

*Tenthredo viridis, capite thoraceque supra characteri-
bus nigris.* Geoff. Inf. 2. 271. 1.

Sulz. Inf. tab. 18. fig. 112.

Habitat in Europae borealis betula.

Colore maxime variat. Mox magis viridis, mox ma-
gis fusca.

Cerasi. 22. *T. antennis septemnodiis, corpore nigro, scutello
pedibusque flauis.* Syst. Ent. 320. 15. Linn. Syst.
Nat. 2. 923. 20. Fn. Sv. 1547.

Tenthredo nigra, pedibus flauis. Geoff. Inf. 2. 286.

*Tenthredo antennis filiformibus nouem articulatis ni-
gra, pedibus brunneis, alis fuscis.* Degeer Inf. 2. 2.
269. 23. tab. 38. fig. 22-24.

Reaum. Inf. 5. tab. 12. fig. 1-5.

Habitat in cerasi foliis.

Larua gelatinosa, nigra.

nassata. 23. *T. antennis septemnodiis lutea, scutello punctoque
alarum albis.* Syst. Ent. 320. 16. *

Tenthre-

Tenthredo nassata antennis septemnodiis, corpore luteo, scutello albo, alis fusco reticulatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 926. 38.

Habitat in Europae borealis nemoribus.

24. *T. antennis septemnodiis, corpore atro, thorace rubro.* *Syst. Ent.* 320. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 924. 28. *Fn. Sv.* 1553. *ouata.*

Tenthredo nigra, antennis filiformibus nouem articulatis, thorace macula rufa. *Degeer Inf.* 2. 2. 237. 5. tab. 35. fig. 10.

Alt. Nidros. 4. 292. 64.

Habitat in Europa, folia alni exedens.

Pedes antici pallidiores.

Larua virescens, puluere albido farinaceo tecta.

Puppa intra folliculum duplensem.

25. *T. antennis septemnodiis, corpore atro, capite thoraceque rubris.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 925. 29. *Fn. Sv.* 1571. *Alni.*

Reaum. Inf. 5. tab. 1. fig. 1. 2.?

Habitat in alni foliis.

Antennae nigrae. Pedes antici testacei. Abdomen atrum, violaceo colore nitidum.

26. *T. antennis septemnodiis violacea, abdomine flavo,* *coerule-*
alis macula fusca. *Syst. Ent.* 321. 18. * *scens.*

Habitat in Angliae nemoribus.

27. *T. antennis septenodiis nigra, abdomine segmentis* *pauida.*
tribus pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 321. 19. *

Tenthredo antennis filiformibus nouem articulatis ab-
domine cylindrico nigro, medio rufo pedibusque ru-
fis. *Degeer Inf.* 2. 2. 244. 8. tab. 35. fig. 17. 18.

Goed. Inf. 2. tab. 17.

Reaum. Inf. 5. tab. 12. fig. 19. 20. 21.

Habitat in Sueciae rosis.

Larua viridis puluere albo farinaceo adspersa, capite flavo.

28. *T. antennis septemnodiis, corpore nigro, abdominis* *Abietis.*
segmentis quatuor ferrugineis. *Syst. Ent.* 321. 19.
Linn. Syst. Nat. 2. 923. 18. *Fn. Sv.* 1545.

Tenthre-

Tenthredo nigra, abdominis medio ferrugineo. *Geoff.*
Ins. 2. 285. 29.
Frisch. Ins. 2. tab. I. fig. 21 — 24.
Habitat in pino, abiete.

germani- 29. *T. antennis septemnodiis, corpore nigro, thorace antice abdomeque rufis.* *Syst. Ent. 321. 21.* *
Habitat in Germaniae nemoribus.

liuida, 30. *T. antennis septemnodiis, corpore atro, antennis ante apicem albis.* *Syst. Ent. 321. 22.* *Linn. Syst. Nat. 2. 925. 33.* *Fn. Sv. 1557.*

Tenthredo nigra, antennarum apice albo, abdominis macula vtrinque alba, apice fulvo. *Geoff. Ins. 2. 282. 22.*

Habitat in Europa.

Variat abdome toto atro et supra infraque liuido.

albicolor- 31. *T. antennis septemnodiis apice albis atra, tibiis testaceis alis apice fuscis.*

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Magna et breuis. Antennae apice omnino albae. Corpus atrum, immaculatum. Pedes testacei femoribus nigris. Alae albidae costa testacea apiceque fusca.

gonagra, 32. *T. antennis septemnodiis, corpore atro nitido, genubus testaceis.*

Habitat in Germaniae plantis.

Media. Corpus totum atrum, immaculatum. Genua sive femora apice et tibiae basi testacea. Punctum sub scutello flauum.

atra, 33. *T. antennis septemnodiis, corpore atro, pedibus rubris.* *Syst. Ent. 321. 23.* *Linn. Syst. Nat. 2. 924. 26.* *Fn. Sv. 1554.*

Tenthredo nigra, pedibus ferrugineis. *Geoff. Ins. 2. 283.*
Scopol. carn. 729.

Habitat in Europae plantis.

cincta, 34. *T. antennis septemnodiis, nigra, abdominis cingulo tibiisque flavis.* *Syst. Ent. 322. 24.*

Tenthredo-

Tenthredo bicincta antennis septemnodiis, corpore atro, abdominis cingulo, ano, ore tibiisque flauis. *Linn. Syst. Nat. 2. 925. 31.*

35. *Tenthredo liuida* antennis septemnodiis, corpore atro, abdominis cingulo albo. *Linn. Syst. Nat. 2. 925. 32. Fn. Sv. 1556.*

Habitat in Europa.

35. *T. antennis septemnodiis nigra*, abdomine cingulo *rufica*. tribus flauis, posticis duobus interruptis. *Linn. Syst. Nat. 2. 923. 16. Fn. Sv. 1543.*

Tenthredo nigra antennis filiformibus nouem articulatis, abdomine albo; cingulis flauis, pedibus luteis. *Degeer Inf. 2. 2. 234. 4. tab. 34. fig. 13.*

Geoff. Inf. 2. 276. 4. tab. 14. fig. 5.

Habitat in Europae caprifolio.

Larua cinerea, maculis dorsalibus triangularibus brunneis.

36. *T. antennis septemnodiis nigra*, dorso medio rufo lateralis. teribusque albis. *Iter Norwag. d. 10. Iun.*

Habitat in Sueciae floribus, capt. d. 10. Iun.

37. *T. antennis septemnodiis*, thorace luteo, abdomine americanacoeruleo, alis nigris. *america-*
na.

Tenthredo americana antennis subclavatis, thorace luteo, abdomine coeruleo, alis nigris. *Linn. Syst. Nat. 2. 921. 9.*

Tenthredo antennis crassioribus septemnodiis, thorace flavo, abdomine coeruleo nitido, alis violaceis. *Degeer Inf. 3. 599. 2. tab. 30. fig. 21.*

Habitat Surinami.

38. *T. antennis septemnodiis nigra*, alarum costa ferruginea. *costalis. Syst. Ent. 322. 25. **

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorff.*

39. *T. antennis septemnodiis nigra*, abdomine flavo, alarum anteriorum costa nigra. *Rosae. Syst. Ent. 322. 26. **

Tenthredo Rosae antennis septemnodiis, corpore flavo, costa alaruin superiorum longitudinali nigra. *Linn. Syst. Nat. 2. 925. 30. Fn. Sv. 1555.*

Tenthre-

Tenthredo crocea thorace supra, capite alarumque marginē exteriori nigris. *Geoff. Inf.* 2. 272. 4.

Tenthredo flava, antennis clauatis triarticulatis, capite thoraceque nigris, alis anticis nigro maculatis. *Deger Inf.* 2. 2. 279. 28. tab. 39. fig. 27.

Roes. Inf. 2. *Vesp.* tab. 2.

Reaum. Inf. 5. tab. 14. fig. 10 — 12.

Merian. Inf. Eur. tab. 144.

Goed. Inf. 2. tab. 3.

Scop. carn. 722.

Ait. nidros. 4. 290. 60.

Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 10. II.

Habitat in Europae rōsis.

Variat colore thoracis interdum toto nigro, interdum flavo maculato.

Larua flava, nigro punctata.

Capreae. 40. T. antennis septemnodiis flava, capite thorace abdomeque supra nigris, alis puncto flavo. *Syst. Ent.* 322. 27.

Tenthredo Salicis Capreae. *Linn. Syst. Nat.* 2. 928. 55.

Fn. Sv. 1572.

Tenthredo nouemnodia flava, capite thoraceque supra nigro. *Geoff. Inf.* 2. 281.

Goed. Inf. 1. tab. 19.

Alb. Inf. tab. 59. fig. 9. h.

Frisch. Inf. 6. tab. 4.

Reaum. Inf. 5. tab. 11. fig. 10.

— — — 1. tab. 1. fig. 18.

Habitat in salicibus, rībe.

Larua cyanea, segmentis tribus primis vltimisque fuluis, maculis nigris ordinibus nouem. Destruit quotannis ribem rubram et grossalariam, intacta rībe nigra.

Morio. 41. T. antennis septemnodiis atra, pedibus pallidis.

Habitat in Germania. *D. de Hattorff.*

Statura brevis, parua praecedentium. Corpus totum atrum, immaculatum. Pedes omnes pallidi.

septen-trionalis. 42. T. antennis septemnodiis, pedibus posticis compressis dilatatis. *Syst. Ent.* 323. 28. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 926. 36. *Fn. Sv.* 1558.

Tenthre-

Tenthredo nigra, antennis filiformibus nonem articulatis, abdomine rufo apice nigro, pedibus posticis longis compressis. *Degeer Ins.* 2. 2. 262. 16. tab. 37. fig. 26.

Schaeff. Icon. tab. 167. fig. 5. 6.

Habitat in alno.

Larua gregaria viridis nigro maculata apicibus flauis.

43. *T. antennis septemnodiis*, corpore atro, punctis duo-^{12punctata} decim albis. *Syst. Ent.* 323. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. ta. 926. 39. *Fn. Sv.* 1559.

Habitat in Europae boreali.

44. *T. antennis septemnodiis*, corpore nigro, abdominis *punctum*. lateribus albis, femoribus posticis rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 924. 23.

Habitat in Germania.

Affinis *T. 12punctatae*. Differt tamen labio atro, pedibus albis femoribusque posticis rufis.

45. *T. antennis septemnodiis* atra, abdomine medio rufo, femoribus posticis macula alba. *Syst. Ent.* 323. 30. *

Habitat in Anglia. *Mus. Bankianum.*

46. *T. antennis septemnodiis* nigra, ventre pedibusque *vaga*. flauis.

Tenthredo mesomela antennis septemnodiis subflaua, dorso nigro, arcubus flavescentibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 924. 22. *Fn. Sv.* 1549.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Parua. Caput nigrum ore flauo. Thorax niger. Abdomen supra nigrum, strigis aliquot obsoletis flauis. Subtus vti et pedes flauum.

47. *T. antennis septemnodiis* atra, thorace vtrinque macula apicis rufa. *Syst. Ent.* 323. 31. *

Habitat in Sueciae hortis.

48. *T. antennis septemnodiis* atra, ore tibiisque anticis testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 926. 37. *carbonaria.*

Habitat in Germania.

Media labio flavescente. Pedes postice ante apicem albi.

49. *T.*

nigra. 49. T. antennis septemnodiis, corpore toto nigro. *Syst. Ent.* 323. 32. *Linn. Syst. Nat.* 2. 925. 34.
Habitat Vpsaliae.

Morio. 50. T. antennis septemnodiis glabra atra, tibiis quatuor anticus pallidis.
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
Parua. Corpus totum atrum tibiis solis quatuor anterioribus albis.

***** Antennis setaceis, articulis plurimis.

erythrocephala. 51. T. antennis setaceis, corpore coeruleo, capite rubro. *Syst. Ent.* 323. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 926. 40. *Fn. Sv.* 1560.
Tenthredo coerulea nitida, capite luteo, antennis setaceis, articulis viginti quatuor. *Degeer Inf.* 2. 2. 290. 33. tab. 40. fig. 19.
Sulz. Inf. tab. 18. fig. 113.
Schaeff. Icon. tab. 96. fig. 9.
Vdm. Dissert. 89.
Habitat in pino sylvestri.
Mas ater, ore tibiisque anticus luteis.

syluatica. 52. T. antennis setaceis, corpore nigro, pedibus thorace que characteribus flavis. *Syst. Ent.* 323. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 926. 41. *Fn. Sv.* 1561.
Tenthredo nigra, pedibus rufis, antennis setaceis flavis, antennis 30. *Degeer Inf.* 2. 2. 292. 36. tab. 40. fig. 23.
Habitat in Europa.

Cynosba ti. 53. T. antennis setaceis, corpore atro, pedibus ferrugineis, posticis albo nigroque annulatis. *Syst. Ent.* 324. 35. *Linn. Syst. Nat.* 2. 927. 43. *Fn. Sv.* 1563.
Geoff. Inf. 2. 287. 36.
Reaum. Inf. 5. tab. 15. fig. 1 — 6.
Habitat in Europa rosa.

signata. 54. T. antennis setaceis pallida, thorace maculis tribus dorsalibus longitudinalibus nigris.
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorff.*

Media.

Media. Corpus pallidum. Antennae supra fuscae. Caput vertice puncto nigro. Thorax maculis tribus dorsalibus longitudinalibus scutelloque atris. Abdomen basi litura nigra. Pedes pallidi.

55. T. antennis setaceis atro coerulescens, ore palpis tibiisque flavis. *Syst. Ent.* 324. 36.* *Linn. Syst. Nat.*

2. 927. 44.

Habitat in Europae populo.

56. T. antennis setaceis, capite nigro albo variegato, pedibus testaceis. *Syst. Ent.* 324. 37. *Linn. Syst. Nat.*

2. 927. 45.

Habitat in Suecia.

57. T. antennis setaceis, corpore rubro, thorace, ano oculisque nigris, alis postice fuscis. *Syst. Ent.* 324. 38. *Linn. Syst. Nat.* 2. 927. 47. *Fn. Sv.* 1565.

Tenthredo ferruginea, antennis setaceis, articulis 24, oculis, thorace caudaque nigris, alis macula fusca. *Degeer Inf.* 2. 2. 291. 34. tab. 40. fig. 21.

Habitat in Europae betula.

58. T. antennis setaceis, corpore nigro, abdomine luteo. *saltuum.* *Syst. Ent.* 324. 39. *Linn. Syst. Nat.* 2. 927. 48. *Fn. Sv.* 1566.

Habitat in Europa.

Corpus nigrum, abdomine luteo.

59. T. antennis setaceis atra, ano pedibusque testaceis. *haemorrhoidalis.* Habitat in Germania. *Dom. de Hattorff.*

Corpus paruum atrum. Antennae setaceae, nigrae longitudine corporis. Abdomen atrum ano rufo. Pedes testacei femoribus basi nigris.

60. T. antennis setaceis flava, macula alarum ferruginea. *flava.* *Syst. Ent.* 324. 40. *Linn. Syst. Nat.* 2. 927. 49. *Fn. Sv.* 1567.

Reaum. Inf. 5. tab. 10. fig. 6. 7.

Habitat in Europa.

61. T. antennis setaceis, abdomine medio rufo, scutello punctoque alarum albis. *lucorum.* *Syst. Ent.* 324. 41.*

Habitat in Angliae nemoribus.

Fabr. Spec. Inf.

D d

109. Si-

109. S I R E X.

gigas. 1. S. abdomine basi apiceque flavo, corpore nigro. *Syst. Ent.* 325. 1.

Sirex gigas abdomine ferrugineo, segmentis 3. 4. 5. 6. nigris, thorace villoso. *Linn. Syst. Nat.* 2. 928. 1. *Fn. Sv.* 1573.

Vroceros. *Geoff. Inf.* 2. 265. tab. 14. fig. 3.

Linn. Act. Holm. 1739. tab. 3. fig. 7.

Reaum. Inf. 6. tab. 31. fig. 1. 2.

Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 1. 2.

Roej. Inf. 2. *Vesp.* tab. 8. 9.

Sulz. Inf. tab. 8. fig. 114.

Poda Inf. tab. 1. fig. 6.

Schaeff. Elem. tab. 1. fig. 2.

tab. 13. fig. 7.

Icon. tab. 10. fig. 2. 3.

Seb. Mus. 4. tab. 53. fig. 15.

Habitat in Europae arboribus coniferis.

columba. 2. S. thorace villoso ferrugineo, abdomine nigro, lateribus flavo maculatis. *Syst. Ent.* 325. 2. *

Sirex Columba abdomine nigro, fasciis testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 929. 2. *Amoen. acad.* 6. 412. 88.

Sirex pensylvanicus capite thoraceque ferrugineis, abdomine atro, supra fasciis transuersis flavis. *Degeer Inf.* 3. 593. 1. tab. 30. fig. 13.

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

nigricornis. 3. S. thorace villoso atro coerulescente, abdomine ferrugineo basi cyaneo.

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Tents.*

Caput nigrum cyaneo nitidum antennis nigris. Thorax villosum niger, parum coerulescens. Abdomen ferrugineum segmentis tribus baseos cyaneis nitidis. Corniculus brevis, acuminatus ferratus. Aculeus piceus. Pedes picei femoribus nigris.

flavicornis. 4. S. thorace villoso atro immaculato, abdominis fasciis, antennis pedibusque flavis.

Habitat in Labrador Americae. *Mus. Dom. Banks.*

- Magnitudo S. columbae. Caput atrum antennis oculisque flauis. Thorax villosus, ater, immaculatus. Abdomen atrum segmentis 1. 2. 7. 8. supra flauis, subtus immaculatum. Cornu clauato acuminatum, serratum, flauum. Aculeus niger. Pedes flavi femoribus atris.
5. S. abdomine atro, thorace villoso, litura ante alas *speculum*: lutea. *Syst. Ent.* 326. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 929. 3.
Fn. Sv. 1574.
Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 6.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 9. 10.
Linn. Amoen. acad. 3. 325.
Scop. carn. 740.
Habitat in Europae lignis putridis.
6. S. abdomine atro coerulecente, thorace villoso unico-*iuuenius*: lore. *Syst. Ent.* 326. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 929. 4.
Fn. Sv. 1575.
Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 7.
Sulz. Hist. Inf. tab. 26. fig. 9. 10.
Scop. carn. 741.
Habitat in Europae syluis.
Aculeus corniculo sesqui longior. Pedes rufi.
7. S. abdomine supra flavo, annulis atris, capite pedibus *fantonia*: que luteis.
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorff.*
Magnitudo et statura praecedentium. Caput cum antennis flauum ore atro. Thorax obscurus antice flavigans, subtus niger. Abdomen subtus nigrum, supra flauum in medio annulis atris. Pedes flavi.
8. S. cyaneus nitidus, pedibus flauis. *cyaneus*:
Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Teats.*
Medius. Antennae nigrae. Corpus totum cyaneum, nitidum, immaculatum. Thorax subuillosus. Corniculus acutus, serratus. Aculeus niger. Alae obscure hyalinae. Pedes omnes flavi, immaculati.
9. S. ater, capite vtrinque macula antennisque medio *albicolor*: albis.
nis.
Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Teats.*

Magnitudo praecedentis. Antennae albae basi apiceque nigrae. Caput nigrum pone oculos macula magna glabra, nitida, alba. Thorax subvillosus, ater, immaculatus. Abdomen glabrum, atrum puncto parvo albo vtrinque in segmento penultimo. Corniculus porrectus, acuminatus, serratus. Aculeus niger. Alae obscurae. Pedes nigri tibiis tarassisque basi albis.

camelus. 10. S. abdomine atro lateribus albo maculato, thorace laevi. *Syst. Ent.* 326. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 929. 5. *Fn. Sv.* 1576.

Scop. carn. 742.

Vdm. Diff. 82.

Habitat in ligno putrido Europae.

mariscus. 11. S. abdomine testaceo, segmentis duobus ultimis nigris, thorace villoso. *Syst. Ent.* 326. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 929. 6. *Fn. Sv.* 1577.

Habitat in Europae syluis.

Aculeus omnino nullus. Corniculus breuissimus, acuminatus.

pygmae- 12. S. abdomine compresso nigro, punctis duobus fasciisque tribus luteis. *Syst. Ent.* 326. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 929. 7.

Habitat in Europa.

Antennae extorsum subcrassiores fere longitudine corporis.

tabidus. 13. S. niger, abdominis lateribus flavo punctatis, tibiis anticis testaceis. *Syst. Ent.* 326. 8. *

Habitat in Angliae floribus. *Mus. Dom. Banks.*

I C H N E V M O N.

* *Scutello albido, antennis albo annulatis.*

fugillato- 1. I. scutello flauicante, thorace immaculato, abdomine atro, segmentis duobus vtrinque puncto albo. *Syst. Ent.* 327. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 930. 1. *Fn. Sv.* 1578.

Ichneu-

Ichneumon niger, pedibus ferrugineis, thoracis apice maculisque abdominis quatuor albis, antennarum medio albo. *Geoff. Inf.* 2. 345. 54.

Ichneumon dubitatorius. *Sulz. Hist. Inf. tab.* 26. fig. 11.
Habitat in Europa.

2. I. scutello albo, thorace immaculato, abdominis *raptorius* segmento secundo tertio quartoque luteis, reliquis us. apice albis. *Syst. Ent.* 327. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 930. 2. *Fn. Sv.* 1579.

Ichneumon niger, abdomine antice ferrugineo, postice nigro, punctis tribus albis, thorace, apice annuloque antennarum albis. *Geoff. Inf.* 2. 342. 49.

Habitat in Europa.

Vltima abdominis segmenta terminantur puncto dorsali albo.

3. I. scutello albido, thorace immaculato, abdominis *sarcitorius* segmento tertio posterius secundoque ferrugineis, sexto flavo. *Syst. Ent.* 327. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 930. 3. *Fn. Sv.* 1580.

Vespa Ichneumon abdomine nigro duobus luteis circulis diuiso. *Raj. Inf.* 255. 15.

Sulz. Inf. tab. 18. fig. 15.

Habitat in Europa.

4. I. scutello flauicante, thorace immaculato, abdominis *extensorius* segmento secundo tertioque ferrugineis, vltimis apice albidis. *Syst. Ent.* 327. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 930. 4. *Fn. Sv.* 1581.

Vespa Ichneumon thorace nigro cum punto in dorso albo, abdomine anteriore rubro, posteriore nigro, pedibus rubris. *Raj. Inf.* 253. 8.

Schaeff. Icon. tab. 43. fig. 1. 2.

Habitat in Europa.

5. I. scutello flauicante, thorace maculato, abdominis tribus vltimis segmentis macula dorsali alba. *Syst. Ent.* 328. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 930. 5. *Fn. Sv.* 1582.

Habitat in Europae hortis.

6. I. scutello flauicante, thorace immaculato, abdominis *culpatiorius* segmento secundo tertioque ferrugineis, reliquis nigris.

D d 3.

gris.

gris. *Syst. Ent.* 328. 6. *Linn. Syst. Nat.* [2. 930.] 6.
Fn. Sv. 1583.

Habitat in Europa..

Thorax in nostro immaculatus.

nutato- 7. I. scutello flauo, thorace maculato, abdomine atro,
rius. segmentorum marginibus flauis, pedibus rufis, plan-
tis albis. *Syst. Ent.* 328. 7. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

irrorato- 8. I. scutello flauicante niger, thorace maculato, abdo-
rius. minis primo segmento punc̄to, reliquis margine al-
bis. *Syst. Ent.* 328. 8. *

Habitat in America.

infratto- 9. I. scutello flauo, thorace maculato, abdominis segmen-
rius. tis margine flauis, pedibus flauis, femoribus nigris.
Syst. Ent. 328. 9. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 931. 7. *Fn.*
Sv. 1584.

Habitat in Europa.

ambula- 10. I. scutello flauicante, thorace maculato, abdominis
torius. segmento secundo ferrugineo, reliquis margine al-
bis. *Syst. Ent.* 329. 10. *

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

saturato- 11. I. scutello albo, thorace immaculato, abdomine nigro
rius. apice albo. *Syst. Ent.* 329. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2.
931. 9. *Fn. Sv.* 1586.

Degeer Inf. 1. tab. 23. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 61. fig. 4.

Habitat in Europae hortis.

molito- 12. I. scutello albo, corpore atro. *Syst. Ent.* 329. 12.
rius. *Ichneumon molitorius* scutello flauescente, thorace im-
maculato, abdominis apice tibiarumque basi albis.
Linn. Syst. Nat. 2. 931. 10. *Fn. Sv.* 1588.

Habitat in Europa.

Pedes colore variant, mox nigri, mox rufi, mox nigri
tibiis basi albis.

erispato- 13. I. scutello albo, thorace immaculato, abdomine lu-
rius. te apice nigro. *Syst. Ent.* 329. 13. *Linn. Syst. Nat.*
2. 931. 11. *Fn. Sv.* 1588.

Habitat in Europa.

14. I. scutello albo, thorace iminaculato, abdomine ru-
bro apice nigro, puncto albo. *Syst. Ent.* 329. 14.* *motato-*
Habitat Hafniae. *rius.*
- ** Scutello albo, antennis nigris totis.
15. I. scutello albo, thorace maculato, abdominis segmen-
to secundo tertioque luteis. *Syst. Ent.* 329. 15. *Linn. luctato-*
Syst. Nat. 2. 931. 13. *Fn. Sv.* 1590.
Ichneumon niger, fronte, thoracis apice, tibiis ex par-
te abdominalisque medio flauis. *Geoff. Ins.* 2. 347. 59.
Habitat in Europa, in noua Zelandia. *Mus. Dom.*
Banks.
Zelandicus puncto albo sub alis, vix tamen distinctus.
16. I. scutello flauicante, thorace maculato, abdominis *lotato-*
segmento secundo rufo. *Syst. Ent.* 330. 16.* *rius.*
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
17. I. scutello albo, thorace maculato, abdomen nigro, *fasciato-*
segmento secundo basi tertio sextoque flauis. *Syst. Ent.* 330. 17.* *rius.*
Ent. 330. 17.*
Habitat in Anglia.
18. I. scutello flauicante, thorace maculato, abdominis *volutato-*
segmentis omnibus margine flauis. *Syst. Ent.* 330. 18. *rius.*
Linn. Syst. Nat. 2. 932. 14. *Fn. Sv.* 1591.
Habitat in Europa.
19. I. scutello albo, thorace maculato, abdomen nigro, *vaginato-*
fasciis quinque albis, tertia interrupta. *Syst. Ent.* 330. 19.* *rius.*
Ichneumon vaginatorius scutello flauicante, thorace
maculato, abdominis segmentis margine flauis, pri-
mo quintoque unicolore. *Linn. Syst. Nat.* 2. 932.
15. *Fn. Sv.* 1592.
Habitat in Europa.
Primum segmentum punctis duobus albis.
20. I. scutello flauicante, thorace maculato, abdominis *annulato-*
segmentis quatuor anticis margine flauis. *Syst. Ent.* 330. 20.* *rius.*
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

- bidento-* 21. I. scutello flauicante, thorace subinaculato, abdominis secundo tertioque segmento flauo, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 331. 21. *
rius. Habitat in Europa boreali.
 Variat thorace bidentato et nitido.
- petiuso-* 22. I. scutello albo, thorace maculato, abdominis segmentis omnibus vtrinque punctis duobus albis. *Syst. Ent.* 331. 22. *Linn. Syst. Nat.* 2. 932. 16. *Fn. Sv.* 1593.
rius. *Degeer Ins.* 1. tab. 36. fig. 8.
Sulz. Hist. Ins. tab. 26. fig. 12.
Schaeff. Icon. tab. 80. fig. 2.
 Habitat in Europae hortis.
- designato-* 23. I. scutello flauicante, thorace maculato, abdomine atro, segmentis primis quatuor vtrinque puncto albo. *Syst. Ent.* 331. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 932. 18. *Fn. Sv.* 1595.
rius. Habitat in Europae hortis.
- edito-* 24. I. scutello flauicante, thorace maculato, punctis vtrinque duobus abdomineque toto atro. *Syst. Ent.* 331. 24. *Linn. Syst. Nat.* 2. 932. 19. *Fn. Sv.* 1596.
rius. Habitat in Europa boreali.
- dubito-* 25. I. scutello flauicante, thorace maculato, abdomine flauo apice nigro, alis fascia fusca. *Syst. Ent.* 331. 25.*
rius. Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- laetato-* 26. I. niger, scutello albo, thorace maculato, abdomine rufo apice nigro, tibiis posticis annulo albo.
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
rius. Parvus. Antennae supra nigrae, subtus fulvae. Caput nigrum orbita oculorum alba. Thorax ater scutello punctis duobus ante alas et uno sub scutello albis. Abdomen rubrum apice atrum. Pedes rufi tibiis posticis nigris annulo albo.
- fusorius.* 27. I. scutello flauicante, thorace maculato, abdomine luteo. *Syst. Ent.* 332. 26. *Linn. Syst. Nat.* 2. 933. 21. *Fn. Sv.* 1598.

β. *Ichneumon pisorius* scutello flauicante, thorace maculato, abdomine toto luteo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 931.

12. *Fn. Sv.* 1589.

Schaeff. Elem. tab. 12. *fig. 1.*

Icon. tab. 6. fig. 12.

Habitat in Europae syluis.

β. Vix differt, quamvis antennae albo annulatae.

28. I. scutello flauicante, thorace maculato, punctis vtrinque tribus, abdomine toto atro, tibiis albis. *Syst. Ent.* 332. 27. *Linn. Syst. Nat.* 2. 932. 20. *Fn. Sv.* 1597.

Habitat in Europa.

29. I. scutello flauicante, thorace immaculato, abdomine *fessorius*. atro, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 332. 28. *Linn. Syst. Nat.* 2. 933. 22. *Fn. Sv.* 1599.

Habitat in Europa.

Affinis I. quaeſitorio.

30. I. scutello flauicante, thorace variegato, abdomine *falcatorius*. subfalcato ferrugineo basi apiceque nigro. *Syst. Ent.* 332. 29. *

Habitat Hafniae.

31. I. scutello albo, thorace immaculato, abdomine testaceo basi nigro apice flauo. *sponsorius.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Parvus. Antennae elongatae supra nigrae, subtus fluae. Caput atrum ore late flauo. Thorax ater, immaculatus scutello albo. Abdomen testaceum basi nigrum apice flavescentes. Pedes flavi.

32. I. scutello flauo, thorace immaculato, abdominis *sollicitorius*. segmento primo secundo tertioque rufis. *Syst. Ent.* 332. 30. *

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

33. I. scutello albo, thorace immaculato, abdomine atro, *cinctorius.* fascia anali niuea. *Syst. Ent.* 332. 21. *

Habitat in Anglia.

- decorato*. 34. I. scutello flavo ferrugineus, abdominis ultimo segmento fascia atra. *Syst. Ent.* 333. 32. *
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
- *** Scutello thorace concolore, antennis fascia annulatis.
- rekitta-* 35. I. niger, abdome medio piceo, tibiis anticis clavatae. *Syst. Ent.* 333. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 933. 27.
Fn. Sv. 1603.
Habitat in Europa.
- obiurga-* 36. I. ater, capite thoraceque antice ferrugineis, alis cyanearis anticis puncto hyalino.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Magnus. Antennae nigrae albo annulatae. Caput et thorax antice obscure ferruginea. Thorax postice niger. Abdomen petiolatum, clavatum primo segmento incurvo, atrum, immaculatum. Aculeus exsertus, rectus longitudine abdominalis. Alae cyaneae, anticis puncto neruo diviso hyalino. Pedes antici picei, postici atri, tibiis annulo baseos albo.
- comita-* 37. I. ater totus, antennis fascia alba. *Syst. Ent.* 333. 34.
Linn. Syst. Nat. 2. 933. 24. *Fn. Sv.* 1600.
Ichneumon totus ater, antennis medio albis. *Geoff. Inf.* 338.
Reaum. Inf. 6, tab. 29. fig. 1 — 4.
Degeer Inf. 1. tab. 24. fig. 10.
Habitat in Europa.
- vigilator*, 38. I. ater, abdominis segmento quinto margine albo, alis anticis apice nigris.
Habitat in Africe aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Magnus. Antennae nigrae annulo lato albo. Corpus atrum, immaculatum abdominalis segmento quinto margine superiori albo. Alae obscurae, anticae apice nigrae. Pedes nigri.
- restaura-* 39. I. niger, abdominalis striga alba, pedibus ferrugineis, antennis fasciatis. *Syst. Ent.* 333. 35. *
Habitat Hafniae.

40. I. niger, abdomine clauato, fasciis tribus pallidis, fe- *caudator.*
moribus rufis. *Syst. Ent.* 333. 36. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
41. I. niger, abdominalis quatuor segmentis intermediis *debella-*
rufis, femoribus clauatis nigris. *Syst. Ent.* 333. 37.* *tor.*
Habitat in Suecia. *D. Solander.*
42. I. niger, abdomine ferrugineo apice nigro, antennis *migrator.*
fasciatis. *Syst. Ent.* 334. 38.
Ichneumon niger, abdomine ferrugineo apice nigro,
tibiis antennisque annulo albo. *Geoff. Inf.* 2. 343. 50.
Habitat in Europa.
43. I. niger, thorace postice abdomeque antice ferru- *dimidia-*
gineis. *tor.*
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorff.*
Antennae nigrae, basi rufae, medio albo annulatae.
Thorax niger postice cum scutello ferrugineus. Ab-
domen antice ferrugineum, postice nigrum. Pedes
rufi, postici apice rufi.
44. I. niger, abdomine ferrugineo, petiolo nigro, pedi- *profliga-*
bus rufis. *Syst. Ent.* 334. 39. *tor.*
Ichneumon niger, abdomine toto ferrugineo, antennis
annulo albo. *Geoff. Inf.* 2. 341. 46.
Habitat in Europa australiori.
Pedes postici nigro varii.
Variat rarius pedibus nigris.
45. I. niger, abdomine ferrugineo, apice nigro, macula *incubitor.*
alba, alis hyalinis, antennis fasciatis. *Syst. Ent.* 334.
40. *Linn. Syst. Nat.* 2. 933. 26. *Fn. Sv.* 1602.
Ichneumon abdomine ferrugineo apice nigro, antennis
annulo albo. *Geoff. Inf.* 2. 341. 48. tab. 16. fig. 1.
Habitat in Europa.
- **** Scutello thorace concolore, antennis
nigris totis.
46. I. luteus, alis fuscis, fascia alba. *Syst. Ent.* 334. 41. *desertor.*
Ichneumon desertor corpore luteo, alis fuscis, fasciis
duabus

duabus albis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 334. 29. *Fn. Sv*
1605.

Schaeff. Icon. tab. 20. fig. 2. 3.
Habitat in Europae floribus.

fastidia- 47. I. coccineus, alis fuscis, anticis macula marginali coccinea.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis I. desertor. Antennae totae nigrae. Caput rubrum vertice nigro. Thorax et abdomen coccinea, immaculata. Aculeus exsertus, breuis, niger. Alae omnes nigrae anticis macula magna marginal coccinea, quae antice terminatur macula alba. Pede coccinei.

ariolator. 48. I. thorace bispinoso rufo, abdome atro, strigis quatuor albis. *Syst. Ent.* 334. 42. *

Ichneumon ariolator thorace ferrugineo bispinoso, ali faciis binis fuscis, abdome fasciis quatuor albis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 933. 23.

Ichneumon spinosus thorace ferrugineo bispinoso, ali maculis binis fuscis, abdome nigro, fasciis tribu albis. *Degeer Ins.* 3. 596. 2. tab. 38. fig. 16.

Habitat in Americae meridionalis insulis. *Dom. i Rohr.*

proficifica- 49. I. luteus, alis anticis fascia apiceque fuscis, antenni aculeoque nigris. *Syst. Ent.* 335. 43. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

hospita- 50. I. luteus, alis anticis fascia apiceque fuscis, antenni anoque nigris. *Syst. Ent.* 335. 44. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

denuncia- 51. I. rufus, capite abdominalisque apice atris, alis nigris anticis macula media alba.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Parvus. Caput atrum ore rufo. Thorax ferrugineus immaculatus. Abdomen striatum, rufum, apice nigrum. Alae omnes nigrae, anticae macula media alba, posticae immaculatae. Pedes omnes ferruginei.

2. I. luteus, abdominis segmentis vtrinque puncto atro, pedator.
antennis aculeoque nigris. *Syst. Ent. App.* 828. *
- Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*
3. I. ferrugineus, antennis ano pedibusque posticis ni- defensor.
gris, alis subfuscis. *Syst. Ent.* 335. 45. *
- Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
4. I. ater, abdominis segmento secundo tertioque fuluis, arroga-
alis atris, macula costali testacea. tor.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Magnus. Caput cum antennis, thorax, pedes atra im-
maculata. Abdomen ouatum, atrum, segmento se-
cundo tertioque rufis. Alae atrae nitidae macula
parua costali testacea.
5. I. ater, capite pallido, alis nigris, puncto maculaque insidia-
albis. tor.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Affinis videtur sequenti. Caput pallidum antennis ni-
gris apice piceis. Thorax ater, immaculatus. Ab-
domen supra atrum, subitus pallescens. Aculeus fe-
re longitudine corporis. Alae omnes nigrae, anticae
puncto paruo pone medium et macula maiori versus
apice in hyalino albis, posticae immaculatae. Pedes
atri tibiis anticis testaceis.
6. I. ater, capite rufo, alis nigris immaculatis. *Syst. Ent. capitator.*
335. 46. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
7. I. ater, thorace rufo, alis fuscis. *Syst. Ent.* 335. 47: * mutator.
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
8. I. ater, alis nigris, lunula hyalina, abdomine coccineo. denigra-
neo. *Syst. Ent.* 335. 48.
Ichneumon denigrator corpore atro, alis nigris, lunu-
la hyalina, abdomine testaceo subfessili. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 934. 28. *Fu. Sv.* 1064.
Ichneumon incertus. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 26. fig. 16.
Ichneumon niger, abdomine coccineo. *Geoff. Inf.* 2.
352. 96.

Schaeff.

Schaeff. Icon. tab. 20. fig. 4. 5.
Habitat in Europae hortis.

corrusca- 59. I. corpore artubusque atris, alis fusco hyalinis. *Syst. Ent.* 336. 49. *Linn. Syst. Nat.* 2. 934. 31. *Fn. Sv.* 1606.
Habitat in Europa.

fasciator. 60. I. ater, abdomine fasciis tribus albis, aliis apice fuscis.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Parvus. Corpus nigrum, immaculatum abdomine solo
fasciis tribus albis, quarum prima interrupta, tertia
remota fere analis.

rutilator. 61. I. niger, antennis subtus, abdomine pedibusque qua-
tuor anticis rufis. *Syst. Ent.* 336. 50. *Linn. Syst. Nat.*
2. 934. 30. *Fn. Sv.* 1607.
Habitat in Europa.

manife- 62. I. ater immaculatus, abdomine sessili cylindrico, pe-
stator. dibus rufis. *Syst. Ent.* 336. 51. *Linn. Syst. Nat.* 2.
934. 32. *Fn. Sv.* 1608.

Ichneumon ater, pedibus rufis, setis ani corpore duplo
longioribus. *Geoff. Inf.* 2. 323. 5.

Vespa Ichneumon tota nigra praeter pedes, qui crocei
sunt. *Raj. Inf.* 256. 19.

Musca tripilis, corpore tenui et praelongo, setis a cau-
da longissime exeuntibus. *Raj. Inf.* 261. 1.

Reaum. Inf. 6. tab. 29. fig. 16.

Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 3.

Habitat in Europae locis glareosis.

polycera- 63. I. ater, abdomine linearie longissimo, tibiis posticis
tor. clauatis. *Gen. Inf. Mant.* 254. *
Habitat in India. *D. Fothergill.*

lunator. 64. I. nigro flavoque varius, abdomine clauato, vtrinque
lunulis flavis.

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Yeats.*

Magnus. Antennae nigrae primo articulo flavo. Caput
nigruin, subtus orbitaque oculorum flavis. Thorax
nigro

nigro flauoque variegatus. Abdomen clauatum, fuscum, lunulis lateralibus maculisque apicis flavis. Alae hyalinae macula magna marginali fusca. Pedes flavi. Aculeus elongatus corpore duplo longior.

65. I. ater, ore pedibusque rufis, abdomine petiolato. *Syst. Ent.* 336. 52. *compunctor.*
Ichneumon compunctor corpore atro immaculato, abdomine subpetiolato longo, pedibus rufis, palpis setaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 934. 33. *Fn. Sv.* 1609.
- Ichneumon* ater, pedibus rufis, setis ani longitudine corporis, abdomine laeui. *Geoff. Inf.* 2. 324. 6.
Schaeff. Icon. tab. 49. fig. 4.
 Habitat in Europa, frequens in papilionum pupis.
66. I. niger, abdomine ferrugineo, primo segmento toto, reliquis punctis duobus nigris. *Syst. Ent.* 336. 53. *
irritator.
 Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
67. I. niger, abdomine ferrugineo basi apiceque nigro, pedum posticorum patellis solis nigris. *Syst. Ent.* 337. 54. *Linn. Syst. Nat.* 2. 934. 34. *Fn. Sv.* 1609. *delusor.*
 Habitat in Europæ nemoribus.
68. I. niger, abdominis segmento secundo tertio quarto elongato, pedibusque rufis, femoribus posticis nigris. *Syst. Ent.* 337. 55. * *elongator.*
 Habitat in Anglia.
69. I. niger, abdominis segmento secundo tertio quarto, ore pedibusque rufis, posticis nigris rufo annulatis. *latrator.*
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
 Affinis videtur praecedenti, at triplo minor. Os vti et antennae subtus rufum. Abdomen petiolatum basi apiceque nigrum. Pedes rufi postici nigri femoribus tibiisque basi rufis.
70. I. corpore nigro, abdomine ferrugineo basi apiceque nigro, pedibus posticis nigris, plantis albis. *Syst. Ent.* 337. 56. *Linn. Syst. Nat.* 2. 934. 35. *Fn. Sv.* 1611. *titillator.*
 Habitat in Europa.

venator. 71. I. niger, abdomine subfalcato basi subtus incarnata, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 337. 57.

Ichneumon venator corpore atro immaculato, abdomine basi subtus incarnata, pedibus rufis, aculeo retractili. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 36. *Fn. Sv.* 1612.

Habitat in Europa.

fornica- 72. I. ater, abdomine clauato fornicato immaculato, tibiis rufis.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Magnitudo I. venatoris. Corpus totum atrum. Abdomen apice incrassatum subtus fornicatum. Pedes rufi plantis posticis nigris.

lineator. 73. I. ater, abdomine petiolato, fronte flavo lineata, pedibus anticis ferrugineis.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus medium totum atrum. Caput atrum fronte lineis duabus flavis vel potius orbita oculorum flava. Thorax immaculatus. Pedes quatuor anteriores ferruginei, postici nigris.

extensor. 74. I. niger, abdomine subcylindrico, pedibus rufis, aculeo corpore longiori. *Syst. Ent.* 337. 58.

Ichneumon extensor corpore nigro immaculato, abdomine cylindrico, pedibus rufis, palpis setaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 37. *Fn. Sv.* 1613.

Ichneumon linearis, antennis longitudine corporis, tentaculis setaceis, femoribus clauatis. *Geoff. Ins.* 2. 359. 86.

Habitat in Europa.

macula- 75. I. niger, abdominalis lateribus pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 337. 59. *

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Turionel- 76. I. niger, pedibus rufis, tibiis posticis nigris albo annulatis. *Syst. Ent.* 338. 60.

Ichneumon Turionellae niger, abdomine cylindrico, macula alarum fusca albae inserta, tibiis posterioribus albo annulatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 40. *Fn. Sv.* 1615.

Habitat in Phalaenarum larvis.

77. I. niger, aculeo corpore duplo longiore, pedibus strobilella. lutecentibus, posticis tibia digitoque nigris albo annulatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 41. *Fn. Sv.* 1616.
Habitat in larvis Tiniae strobilellae.
78. I. niger, abdomine petiolato compresso, pedibus pallidis, aculeo corpore subbreuiore. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 42. *Fn. Sv.* 1617. *moderator.*
Habitat in larva Ichneumonis strobilellae, qua consumata folliculum cranio superstite inaedificat. *Linn.*
79. I. ater, abdomine clavato breuissimo, aculeo cylindrico, pedibus posticis elongatis. *saltator.*
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
Parvus. Corpus totum atrum exceptis solis tibiis anticefalicorumque basi testaceis. Abdomen breve, compressum, petiolatum terminatur aculeo breui, cylindrico, obtuso. Pedes postici elongati, nigri.
80. I. ater, abdominis basi vtrinque puncto flavo, thorace postice bidentato. *Syst. Ent.* 338. 61.* *oculator.*
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
81. I. niger, pedibus flavis, abdomine sessili cylindrico Resinellae. incurvo, antennis basi luteis. *Syst. Ent.* 338. 62. *lae.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 936. 43. *Fn. Sv.* 1618.
Habitat in Phalaenae resinellae larvis.
82. I. niger, abdomine oblongo obtuso, ore pedibusque pallidis. *Syst. Ent.* 338. 63. *Linn. Syst. Nat.* 2. 936. 44. *Fn. Sv.* 1619. *praegator.*
Habitat in Bombycis salicis larvis.
83. I. niger, abdomine falcato, segmentis tertio quarto- que basi flavescentibus, pedibus testaceis. *Syst. Ent.* 338. 64. *Linn. Syst. Nat.* 2. 936. 46. *fomentator.*
Habitat in Europa boreali.
84. I. niger, abdominis segmentis secundo tertioque ferrugineis, triangulo dorsali nigro. *Syst. Ent.* 338. 65.* *mensurator.*
Habitat in Saxonia.

- variega-* 85. I. niger, thorace variegato, abdomine clauato, fasciis tribus flavis. *Syst. Ent.* 339. 66. *
tor. Habitat in Europa boreali.
- grauida-* 86. I. niger, abdominis primo segmento ferrugineo, ab-
domen dimidium obtegente. *Syst. Ent.* 339. 67. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 936. 48. *Fn. Sv.* 1622.
 Habitat in Europa.
- inculca-* 87. I. niger, abdomine falcato toto ferrugineo. *Syst. Ent.*
tor. 339. 68. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 936. 49. *Fn. Sv.* 1623.
Ichneumon niger, pedibus abdomineque ferrugineis.
Geoff. Inf. 2. 357. 80.
Reaum. Inf. 6. tab. 30. fig. 9.
 Habitat in Europa.
- falcator.* 88. I. niger, thorace maculato, abdomine falcato, segmen-
 tis secundo tertio quartoque rufis. *Syst. Ent.* 339.
 69. *
 Habitat in Europa boreali.
- pugilla-* 89. I. thorace immaculato, abdomine falcato rufo basi
tor. apiceque nigro, pedibus tenuibus ferrugineis. *Syst.*
Ent. 339. 70. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 936. 50. *Fn. Sv.*
 1624.
Ichneumon niger, abdomine falcato, pedibus abdomi-
 nisque medio flavis. *Geoff. Inf.* 2. 332. 24.
Vespa Ichneumon maior et longior, abdomine multo
 tenuiore ligamento pectori annexo. *Raj. Inf.* 255. 17.
Degeer Inf. 1. tab. 6. fig. 12.
 Habitat in Bombycis ziczac laruis.
 Frons macula flava.
- irrorator.* 90. I. ater, alis anticis apice nigris, punto albo, abdo-
 mine clauato, apice macula villosa aurea. *Syst. Ent.*
 340. 71. *
Ichneumon ater, alis extremo fuscis, abdominis apice
 villoso ferrugineo. *Geoff. Inf.* 2. 337. 36.
 Habitat in Europa australiori.
- rufspator.* 91. I. niger, pedibus ferrugineis, femoribus clauatis, po-
 sticis dentatis. *Syst. Ent.* 340. 72. *Linn.* *Syst. Nat.*
 2. 937. 51. *Fn. Sv.* 1625.
Ichneu-

CLASS. III. SYNISTATA. Ichneumon. 435

Ichneumon niger, pedibus ferrugineis, femoribus posticis crassis denticulo armatis. *Geoff. Inf.* 2. 326. 12.
Habitat in Europa.

92. I. niger, abdomine falcato medio rufo, tibiis posticis clauatis basi apiceque albis. *Syst. Ent.* 340. 73..
Linn. Syst. Nat. 2. 937. 52. *Fn. Sv.* 1626.
Ichneumon totus niger, tibiis posticis clauatis, abdome longo, tenui falcato. *Geoff. Inf.* 2. 328. 16.
Vespa Ichneumon thorace crasso nigro, abdome a longo et tenuiori filamento incipiente et in caudam crassam desinente. *Raj. Inf.* 253. 5.
Degeer *Inf.* 1. tab. 36, fig. 10.
Mouff. *Inf.* tab. 121.
Reaum. *Inf.* 4. tab. 10. fig. 14.
Habitat in Apum Sphegumque laruis.

93. I. niger, abdomine falcato, maculis tribus lateralibus rufis, tibiis posticis clauatis nigris. *Syst. Ent.* 340. 74. *affectator*.
Ichneumon affectator niger, abdome falcato, segmento secundo, tertio quartoque latere rufis, tibiis posticis clauatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 937. 53. *Fn. Sv.* 1627.
Ichneumon niger, tibiis posticis clauatis, abdome tenui falcato circa medium fuluo. *Geoff. Inf.* 2. 329. 17.
Scop. carn. 756.
Habitat in Europa.
94. I. niger, abdome flavo apice nigro, pedibus flavis. *necator*.
Gen. Inf. Mant. 252. *
Roef. *Inf.* 2. *Vesp.* 4. tab. 4.
Habitat in Phalaenarum laruis, quas folliculis associatis, numerosis, albis obtegunt.

***** Antennis luteis.

95. I. luteus, thorace striato, abdome falcato. *Syst. Ent.* *luteus*. 341. 75. *Linn. Syst. Nat.* 2. 937. 55. *Fn. Sv.* 1628.
Ichneumon corpore luteo falcato, oculis viridibus nitidis. Degeer *Inf.* 2. 2. 169. 5. tab. 29. fig. 16. 17.
Ichneumon luteus totus. *Geoff. Inf.* 2. 330.

Vespa Ichneumon maior tota fulua, alis amplis, anterioribus nota fulua. *Raj. Inf.* 253. 6.

Goed. Inf. 2. tab. 37. et tab. 20. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 12.

tab. 101. fig. 4.

Sulz. Inf. tab. 18. fig. 118.

Habitat in Europae laruis, in noua Hollandia, Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

flavus. 96. I. luteus, vertice atro, abdomine apice fusco. *Syst. Ent.* 341. 76. *

Habitat in America. *D. v. Rohr.*

fulvus. 97. I. luteus, alis nigris. *Syst. Ent.* 341. 77. *

Habitat in America. *Dom. Drury.*

atratus. 98. I. ater, capite pedibus strigaque anali flavi, aculeo longissimo.

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Yeats.*

Corpus magnum. Antennae luteae. Caput luteum mandibulis strigaque inter oculos nigris. Thorax ater, immaculatus. Abdomen compressum, clauatum, atrum, ultimo segmento margine flavo. Aculeus exsertus corpore triplo longior. Alae obscurae. Pedes flavi femoribus quatuor posticis atris.

dentatus. 99. I. niger flavo maculatus, scutello apice bidentato flavo, ano bidentato. *Iter Norwag.* d. 4. Aug. *

Habitat in Norwagiae lucis. *Dom. Praep. Stroem.*

Morio. 100. I. ater, abdomine falcato, alis cyaneis.

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnus. Antennae luteae. Caput atrum fronte flavo maculata. Thorax et abdomen petiolatum falcatum, atra, immaculata. Alae omnes cyaneae apice fuscae. Pedes atri, antici testacei.

amictus. 101. I. niger, abdomine falcato, antennis pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 341. 78. *

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

glaucopterus. 102. I. luteus, pectore nigro, abdomine falcato, ano nigro. *Syst. Ent.* 341. 79. *Linn. Syst. Nat.* 2. 938. 57. *Fn. Sv.* 1630.

Schaeff.

Schaeff. Icon. tab. 82. fig. 3.

Habitat in Europa.

103. I. niger, abdomine falcato antice flauo, pedibus posticis nigro geniculatis, scutello flauo. *Syst. Ent.* 341. *xus.*

80. *Linn. Syst. Nat.* 2. 938. 59. *Fn. Sv.* 1631.

Habitat in Europa.

104. I. flauus, capite thoraceque maculatis, abdomine punctatus vtrinque punctis quinque nigris.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Caput flauum macula verticis atra et in hac stemmata duo. Antennae paullo obscuriores. Thorax flauus macula dorsali punctisque duobus scutelli atris. Abdomen flauum segmentis 1. 3. 4. 5. 7. vtrinque puncto magno atro. Pedes testacei, immaculati.

105. I. niger, antennis pedibusque ferrugineis, alis hyalinis, stigmate nigro. *Syst. Ent.* 342. 81. *Linn. Syst. Nat.* 2. 938. 61.

Habitat in praedio *Dom. a Linne Hanmarby* dicto.

106. I. flavescentia, abdomine fascia atra, alis fusco maculatis. *Syst. Ent.* 342. 82. *

Habitat Hafniae.

107. I. ater, antennis pedibusque ferrugineis, alis albis, fasciis duabus nigris. *Syst. Ent.* 342. 83. *Linn. Syst. Nat.* 2. 938. 60. *Fn. Sv.* 1632.

Ichneumon niger, alis albis fascia duplice nigra posteriori maiori. *Geoff. Inf.* 2. 359. 85.

Habitat in Europae hortis.

108. I. niger, abdomine fascia ferruginea, alis fusco maculatis. *fuscatus.*

Habitat in Germania. *D. de Hattorff.*

Statura praecedentis parua. Caput nigrum fronte flavescente. Thorax niger, immaculatus. Abdomen nigrum fascia antica fulua. Pedes ferruginei.

***** Minuti. Antennis filiformibus. Abdomine ouato, sessili.

musca- 109. I. auratus, pedibus flavis saltatoriis. *Syst. Ent.* 342.
rum. 84. *Linn. Syst. Nat.* 2. 938. 62. *Fn. Sv.* 1636.
Degeer Inf. 1. tab. 32. fig. 19. 20.
Habitat in laruis Muscarum aphidiuararum.

Bedegua- 110. I. viridis nitens, abdomine aureo. *Syst. Ent.* 432. 85.
ris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 63. *Fn. Sv.* 1634.
Ichneumon antennis clauatis nigris, capite thoraceque
 viridi aureis, pedibus flavis, abdomine aureo. *De-
 geer Inf.* 20. 186. 10.
Cynips thorace viridi aeneo, abdomine aureo, setis
 ani corpore longioribus. *Geoff. Inf.* 2. 296. 1.
Roes. Inf. 3. tab. 53. fig. F. H.
Reaum. Inf. 3. tab. 41. fig. 13. 14.
Att. Nat. Curios. Dec. 2. *Ann.* 2, obs. 10.
Blancard. Inf. 188. 12.
Habitat in laruis gallarum rosae, quercus,

gallarum. III. I. fusco aeneus, abdomine nigro, tibiis pallidis. *Syst.*
Ent. 342. 86. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 64. *Fn. Sv.*
 1638.
Habitat in Cynipedis quercus laruis.

Juniperi. 112. I. auratus viridis, antennis nigris, alis hyalinis. *Syst.*
Ent. 342. 87. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 65. *Fn. Sv.*
 1635.
Habitat in Tipulae iuniperinae larua.

Pupa- 113. I. auratus coeruleus, abdomine viridi nitido, pedibus
rum. pallidis. *Syst. Ent.* 342. 88. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939.
 66. *Fn. Sv.* 1636.
Cynips viridi sericeus, abdomine aureo, pedibus pal-
 lidis chrysalidum papilionum. *Geoff. Inf.* 2. 305. 24.
Ichneumon Antiopae. *Scop. carn.* 765.
Reaum. Inf. 6. tab. 30. fig. 13. 14. 15.
Merian. Inf. Europ. tab. 44. et 52.
Goed. Inf. 1. tab. 77.
Degeer Inf. Vers. Germ. 1. tab. 32. fig. 19. 20.
 tab. 35. fig. 17.
Degeer

Degeer Inf. I. tab. 30. fig. 8.

Roeſ. Inf. 2. *Vesp.* tab. 3.

Habitat in pupis Papilionum et Muscarum, quibus numeris exuta larua oua imponit.

114. I. auratus viridis, abdomine nigro, macula dorsali purpurascente, pedibus flauis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 67. *Fn. Sv.* 1657. *laruarum.*

Ichneumon antennis clauatis fractis, capite thoraceque viridibus, pedibus flauis, abdomine nigro, macula testacea. *Degeer Inf.* 2. 2. 194. 14. tab. 31. fig. 6. 7.

Reaumur. Inf. 2. tab. 36. fig. 9. 10. 11.

Habitat in Phalaenarum laruis.

115. I. auratus viridis, abdomine fusco, basi cingulo pallido, pedibus flavescentibus. *Syst. Ent.* 343. 89. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 68. *Fn. Sv.* 1659. *cynipedis.*

Habitat in Cynipedium et Phalaenarum laruis.

116. I. nigro aeneus, abdomine coerulecente, pedibus coccorum, liuidis. *Syst. Ent.* 343. 90. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 69. *Fn. Sv.* 1640.

Degeer Inf. I. tab. 35. fig. 17.

Habitat in Europaec Coccis,

117. I. niger, capite rufo, oculis viridibus. *Syst. Ent.* 343. 91. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 70. *Fn. Sv.* 1641. *secalis.*

Habitat in laruis spicarum secalis.

Conf. *Ichneumon agricola* niger, capite ferrugineo, abdomine sessili. *Linn. Syst. Nat.* 2. 937. 54. Mera huius videtur varietas.

118. I. niger, alis hirsutis, macula lunari nigra. *Syst. Ent.* 343. 92. *Linn. Syst. Nat.* 2. 940. 71. *Fn. Sv.* 1642. *neus.*

Degeer Inf. I. tab. 30. fig. 21.

Habitat in laruis subcutaneis,

119. I. niger, abdomine conico acutissimo, femoribus clavatis ferrugineis. *Syst. Ent.* 343. 93. *conicus.*

Habitat in Daniae nemoribus.

120. I. niger, pedibus ferrugineis. *Syst. Ent.* 343. 94. *Linn. globatus.*

Syst. Nat. 2. 940. 74. *Fn. Sv.* 1647.

Ichneumon niger, antennis filiformibus, pedibus ferrugineis, abdomine virescente. *Degeer Inf.* 2. 2. 176.
6. tab. 29. fig. 13. 14.

Ichneumon serico conglobato albo. *Geoff. Inf.* 2. 320. 1.
Vespa Ichneumon crucigera parua. *Raj. Inf.* 255. 13.

Merian. Europ. tab. 22.

Frisch. Inf. 6. tab. 10.

Reaum. Inf. 2. tab. 35. fig. 5. 6.

Derham theor. 8. cap. 6. n. 1.

Habitat in culmis intra folliculum communem, bombycinum, subrotundum, album.

glomera. 121. I. *niger*, pedibus flauis. *Syst. Ent.* 344. 95. *Linn. Syst. Nat.* 2. 940. 75. *Fn. Sv.* 1646.

Ichneumon serico conglobato flavo. *Geoff. Inf.* 2. 321. 2.

Vespa Ichneumon tripilis, antennis praelongis crucigera s. erucae brassicariae. *Raj. Inf.* 254. 12.

Goed. Inf. 1. 59. 11.

Reaum. Inf. 2. tab. 33. fig. 2. 7. 8.

Merian. Europ. tab. 48.

Degeer Inf. 1. tab. 16. fig. 6.

Roes. Inf. 2. *Vesp.* 4. tab. 3. a. b.

Habitat in Papilionum laruis: exeentes proprios folliculos flauos neestunt, intra quos excluduntur.

Aphidum. 122. I. *niger*, abdomine basi pedibusque anticis genubusque posticis flauis. *Syst. Ent.* 344. 96. *Linn. Syst. Nat.* 2. 940. 72. *Fn. Sv.* 1643.

Ichneumon niger, antennis filiformibus, ore flavescente, pedibus variegatis. *Degeer Inf.* 2. 2. 179. 8.

Ichneumon Aphidum. *Geoff. Inf.* 2. 322. 4.

Frisch. Inf. 11. tab. 19.

Habitat in Europae aphidibus.

Ouulo-rum. 123. I. *niger*, pedibus rufis, antennis filiformibus longis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 940. 73. *Fn. Sv.* 1644.

Degeer Inf. 1. tab. 35. fig. 11. 12. 13.

Habitat in glossatorum ouis.

Conf. *Schrink. Beytr.* tab. 2. fig. 13. Vix differt, at pedes nigri.

124. I. ater, antennis ramosis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 941. *peftini-*
77. Fn. Sv. 1647. cornis.
Degeer Inf. 1. tab. 35. fig. 3. 4. 5.
Act. Holm. 1740. 4. 64. tab. 1. fig. 4—6.
 Habitat in laruis subcutaneis B. quercus.
125. I. viridis, antennis ramosis. *ramicor-*
Degeer Inf. 2. 2. 200. 16. tab. 31. fig. 14. nis.
Eulophus. Geoff. Inf. 2. 312. 1. tab. 15. fig. 3.
 Habitat in Phalaenarum laruis.
 Singularis ob antennas ramosas, vix tamen proprii ge-
 neris.
126. I. apterus niger, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 344. 97. * *agilis.*
Ichneumon apterus niger, corpore oblongo, antennis
pedibusque brunneis. Degeer Inf. 2. 2. 203. 17. tab.
31. fig. 18.
 Habitat in laruis Ichneumonis aphidum Sueciae.
127. I. apterus niger, abdomine antice pedibusque ferru- *cursitans.*
*gineis. Syst. Ent. 344. 98. **
Ichneumon apterus niger, abdomine ouali oblongo,
antennis pedibusque rufis. Degeer Inf. 2. 2. 205.
18. β.
 Habitat in Sueciae hortis.
128. I. apterus rufus, capite abdomineque postico nigris. *Acaro-*
Syst. Ent. 344. 99. rum.
Mutilla Acarorum. Linn. Syst. Nat. 2. 968. 9. Fn.
Sv. 1729.
Ichneumon apterus rufus, capite, antennis abdominis-
que postico nigris. Degeer Inf. 2. 2. 206. 19. tab. 31.
fig. 19. 20.
 Habitat in Europae borealis Curculionum laruis.
 Pedes ferruginei.
129. I. apterus niger, abdomine rufo basi apiceque nigro, *pedestris.*
*Syst. Ent. 344. 100. **
 Habitat in Sueciae hortis.
130. I. apterus rufus, capite abdomineque nigris. *Syst. formica-*
Ent. 345. 101. riis.

Mutilla formicaria. Linn. *Syst. Nat.* 2. 968. 10. *Fn.*

Sv. 1728.

Habitat in Sueciae hortis.

III. E V A N I A.

appendi- 1. *E. atra*, abdomine petiolato breuissimo dorso thoracis gaster. imposito. *Syst. Ent.* 345. 1.

Sphex appendigaster atra, abdomine petiolato breuissimo, pedibus posticis longissimis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 943. 12.

Ichneumon niger, abdomine breuissimo compresso truncato, petiolo longo thoracis dorso imposito, pedibus posticis longissimis. *Degeer Inf.* 3. 594. 1. tab. 30. fig. 14.

Reaum. Inf. 6. tab. 31. fig. 13.

Brown Iam. tab. 44. fig. 6.

Habitat in Europa australi, capite bon. sp., in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

maculata. 2. *E. thorace maculato*, abdominis primo segmento punctis duobus, secundo margine albis. *Syst. Ent.* 345. 2.*

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

III. S P H E X.

* Abdomine petiolato.

sabulosa. 1. *S. nigra hirta*, abdominis petiolo biarticulato, segmento secundo tertioque ferrugineis. *Syst. Ent.* 346. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 941. 1. *Fn. Sv.* 1648.

Sphex nigra, antennis filiformibus, petiolo elongato, alis fuscis, abdomine antice rubro. *Degeer Inf.* 2. 2. 148. 4. tab. 28. fig. 27.

Ichneumon niger, abdomine fulvo postice nigro, petiolo longissimo. *Geoff. Inf.* 2. 349. 63.

Scopol. carn. 770.

Frisch. Inf. 2. tab. 1. fig. 6. 7.

Sulz. Inf. tab. 19. fig. 120.

Schaeff. Icon. 83. fig. 1.

Habitat in Europae terra sabulosa, vbi canis instar pedibus anterioribus cuniculum fodit laruanique Phalaenae

laenae s. Araneae semimortuam in eo sepelit, cui ouulum concredit, quo facto orificium terra claudit. *Linn.*

2. *S. nigra*, abdomine rufo, petiolo maculaque dorsali ni- *Thomae.*
gris. *Syst. Ent.* 346. 2. *

Habitat in Insula Thomae Americis.

3. *S. nigra*, labio, ano pedibusque ferrugineis. *haemor-*
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.* *rhoidalis.*

Magnitudo et statura *S. pensylvanicae*. Antennae ni-
grae basi ferrugineae. Caput nigrum labio ferrugi-
neo. Thorax hirtus, ater, immaculatus. Abdomen
glabrum, atrum ano siue ultimo segmento rufo. Pe-
des ferruginei femoribus basi nigris. Alae subcyanæ.

4. *S. nigra*, abdomine petiolato atro, alis subuiolaceis. *pensylua-*
Syst. Ent. 346. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 941. 3. *Amoen. nica.*
acad. 6. 412. 89.

Sphex nigra, alis violaceis apice fuscis, abdominis pe-
tiolo filiformi, maxillis longissimi incuruatis. *De-*
geer Inf. 3. 586. 2. tab. 30. fig. 2.

Habitat in Pensylvaniam, in noua Hollandia. *Mus. Dom.*
Banks,

5. *S. cyanea*, alis albis apice fuscis, antennis nigris. *Syst. violacea.*
Ent. 346. 4. *

Habitat ad Cap. bon. sp.

6. *S. coerulea*, alis cyaneis apice fuscis, antennis nigris. *cyanea.*
Syst. Ent. 346. 5.

Sphex coerulea, alis fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 941.
2. *Amoen. acad.* 6. 412. 90.

Sphex coerulea nigra, coeruleo nitida, antennis ni-
gris, alis fusco violaceis, abdominis petiolo elonga-
to. *Degeer Inf.* 3. 589. 6. tab. 30. fig. 6.

Habitat in America boreali.

7. *S. cyanea*, abdomine atro, femoribus posticis rufis. *femorata.*
Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Media. Caput cyaneum antennis nigris. Thorax cya-
neus, nitidus. Abdomen petiolatum, atrum, nitidum.
Alae subferrugineae. Pedes nigri femoribus posticis
rufis. 8. 8.

tibialis. 8. *S. hirta nigra cyaneo nitida*, tibiis posticis ferrugineis, alis nigris.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Antennae nigrae basi ferrugineae. Caput atrum, corpus hirtum, nigrum, cyaneo nitidum. Pedes quatuor postici ferruginei femoribus nigris. Alae nigræ.

flavipes. 9. *S. laevis atra*, pedibus flauis, femoribus nigris.

Habitat in America. *Dom. Blackburn.*

Magnitudo *S. cyaneae*. Caput fuscum antennis nigris.

Thorax niger puncto flauo ante alas. Abdomen petiolatum, atrum, nitidum, immaculatum. Alae fusco flavescentes. Pedes flavi femoribus nigris.

Figulus. 10. *S. laevis atra*, abdomine petiolato, labio segmentorumque marginibus lucidis. *Syst. Ent.* 347. 6. *Linn.*

Syst. Nat. 2. 942. 11. *Fn. Sv.* 1650.

Habitat Vpsaliae in parietum ligneorum foraminibus. Larua apoda, pallida.

lunata. 11. *S. abdomine petiolato nigro*, primo segmento lunula flava. *Syst. Ent.* 347. 7. *

Sphex asiatica ferruginea, thorace variegato, abdominis petiolo macula vtrinque ad basin flava. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 942. 5. *Mus. Lud. Vlr.* 405.?

Sphex flauo maculata nigra, alis fuscis, abdominalis petiolo longissimo, thorace abdominalisque basi pedibusque flauo maculatis. *Degeer Inf.* 3. 580. 4. tab. 30. fig. 4.

Sphex caementaria. *Drury Inf.* 1. tab. 44. fig. 6—8. Habitat in Antigua Insula.

feruens. 12. *S. nigra*, abdomine petiolato ferrugineo, alis fuscis.

Syst. Ent. 347. 9. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 942. 6. *Mus. Lud. Vlr.* 406.

Habitat in India.

Abdominis petioli niger.

jamaicensis. 13. *S. abdomine petiolato nigro*, segmento primo toto reliquo margine flauis. *Syst. Ent.* 347. 10. *

Habitat in Jamaica Insula.

14. *S. nigra*, capite petioli basi pedibusque ferrugineis. *Habitat in Malabar.* *Mus. Dom. Banks.* *erythrocephala.*
Statura S. spirificis, at paullo maior. Antennae fuscae
 basi ferrugineae. Caput ferrugineum maxillis apice
 atris. Thorax hirtus, ater, lobo antico puncto que
 ante alas ferrugineis. Abdomen longe petiolatum,
 atrum, petiolo dimidiato ferrugineo. Pedes ferru-
 ginei. Alae cyaneae.
15. *S. atra*, thorace hirto immaculato, petiolo vniarticu- *spirifex.*
 lato flavo longitudine abdominis. *Syst. Ent.* 347. 11.
Linn. Syst. Nat. 2. 942. 9.
Reaum. Inf. 6. tab. 28. fig. 5.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 1.
Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 2.
 16. *S. aegyptia nigra*, petiolo abdominis pedum-
 que articulatis flavis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 942. 10.
Mus. Lud. Vlr. 406.
*Habitat in Europa australi, Aegypto, in cylindris spira-
 libus sub tectis.*
16. *S. nigra*, thorace hirto maculato, abdominis petiolo *madra-
 spatana.*
Habitat in Malabar. *Mus. Dom. Banks.*
- Affinis *S. spirificis*, at triplo minor. Caput cum anten-
 nis nigrum labio pube argentea. Thorax hirtus, ni-
 ger, punctis duobus anticis, vnico ante alas lineola-
 que transuersa loco scutelli flavis. Abdomen atrum
 petiolo elongato flavo. Pedes quatuor antici flavi
 femoribus basi nigris, postici flavi femoribus tibiis-
 que apice nigris.
17. *S. nigra*, thorace maculato, abdomine coerulescente, *clavus.*
 petiolo elongato rufo, fascia nigra. *Syst. Ent.* 348.
 12. *
- Habitat in noua Hollandia.* *Mus. Dom. Banks.*
18. *S. viridi cyanea*, thoracis lobo anteriore distincto, alis *lobata.*
 subferrugineis. *Syst. Ent.* 348. 13. *
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
19. *S. viridis nitida*, femoribus quatuor posticis compres- *compre-
 sis ferrugineis.* *sa.*
Habitat

Habitat in Malabar. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis *S. lobatae*, at triplo minor. Antennae fuscae. Caput et thorax viridi aenea, nitida thorace antice attenuata lobo distincto. Abdomen petiolatum, ova-tum, magis cyaneum. Pedes antici fusci femoribus in medio crassioribus. Postici quatuor cyanei femoribus compressis ferrugineis. Alae fuscae.

Ichneumo- 20. *S. fulua*, abdome nigro, basi ferrugineo. *Syst. Ent.* nea. 348. 14.

Apis iclineumonea rostro corneo recto, abdome petiolato, thoracis futuris auro nitentibus. *Linn. Syst. Nat. 2. 959. 36.*

Apis antennis filiformibus, capite thoraceque nigris auro maculatis, abdome brunneo, apice nigro, pedibus testaceis. *Degeer Inf. 2. 2. 105. tab. 32. fig. 13.*

Habitat in America meridionali.

Sispes. 21. *S. nigra*, abdominis petiolo femoribusque posticis, in-crassatis flauis.

Chrysis sispes atra, abdome breuissimo, pedibus posticis clauatis denticulatis rufis. *Syst. Ent. 359. 15.*

Sphex sispes. *Linn. Syst. Nat. 2. 943. 13. Fn. Sv. 1657. 2*
Vespa femoribus posticis crassis globosis ferratis dentculo donatis, abdominis globosi petiolo tenui longo. *Geoff. Inf. 2. 380. 16.*

Sphex nigrifex. *Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 1.*
Habitat in Europa australiori.

Forte proprii generis animalculum. Antennae ab hoc genere differunt. Femora postica clauata, dentata, flava, macula magna nigra.

punctata. 22. *S. flava nigro punctata* femoribus posticis clauatis dentatis, abdome conico.

Habitat in Europa.

Singulare insectum hic colloco ad vltiorem examinationem. Caput mihi deest. Thorax flavius punctis maculisque nigris. Abdomen subpetiolatum, conicum, flavum apice nigrum. Pedes flavi femoribus posticis globosis, dentatis, punto apicis baseosque nigris. Alae albae immaculatas.

** Abdo-

** *Abdomine sessili.*

23. *S. nigra*, abdomine apice ferrugineo, alis cyaneis. *Syst. Ent.* 348. 15. *
Ent. 348. 15. *
Habitat in Malabar. *Dr. Koenig.*
24. *S. atra immaculata*, alis nigris. *Syst. Ent.* 349. 16. * *morio.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Varietatem vidimus simillimam fronte cinerascente articuloque primo antennarum ferrugineo.
25. *S. atro cyanea*, thoracis lobo antico fuluo. *Syst. Ent. collaris.*
 349. 17. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
26. *S. atra*, fronte thoracisque lobo antico flavis. *Syst. frontalis.*
Ent. 349. 18. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
27. *S. glabra atra*, abdomine apice ferrugineo, alis albidis. *analis.*
Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
 Paullo maior *S. fusca.* Corpus totum atrum, immaculatum solis abdominis vltimis segmentis ferrugineis.
 Alae albidae paullo cyaneo nitidae.
28. *S. glabra atra*, abdomine apice ferrugineo, alis nigris. *similis.*
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Differt manifeste a praecedente duplo minor. Corpus totum glabrum, atrum vltimis duobus abdominis segmentis supra ferrugineis. Alae omnes obscurae, nigrae. Pedes nigri femoribus apice tibiisque ferrugineis.
29. *S. glabra atra*, abdomine basi ferrugineo. *Syst. Ent. fusca.*
 349. 19.
Sphex fusca atra laevis, abdominis segmentis tribus anticis subferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 944. 16.
Fn. Sv. 1652.
Sphex nigra, antennis filiformibus. *Degeer Ins.* 2. 2.
 147. tab. 28. fig. 6.
Ichneumon ater, abdomine subsessili, segmentis tribus anticis rufis, alis nigricantibus. *Geoff. Ins.* 2. 354. 74.

Vespa

Vespa Ichneumon maior, capite, thorace et pedibus nigris, abdominis anteriore parte rubra, posteriore nigra. *Raj. Inf.* 254. 9.

Goed. Inf. 1. tab. 58.

Habitat in Europae fabuletis, laruas attrahens, sepeliens.

viatica. 30. *S. pubescens nigra*, alis fuscis, abdomine antice ferrugineo, cingulis nigris. *Syst. Ent.* 349. 20. *Linn. Syst. Nat.* 2. 943. 15. *Fn. Sv.* 1651.

Sphex nigra hirta, antennis filiformibus, petiolo breui, alis fuscis, abdomine antice rufo, postice nigro. *Degeer Inf.* 2. 2. 153. 6. tab. 28. fig. 15.

Ichneumon niger, abdominis segmentis tribus anticis fuluis, alis nigris. *Geoff. Inf.* 2. 354. 74.

Frisch. Inf. 2. tab. 1. fig. 13.

Habitat in Europae fabuletis, laruas imposito ouo sepe liens.

cingula- 31. *S. nigra*, fronte, thoracis striga antica abdominalisque ta. segmentorum marginibus cinereis. *Syst. Ent.* 350. 21.* Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

nigra. 32. *S. nigra*, abdomine sessili, segmentorum marginibus lucidis. *Syst. Ent.* 350. 22. Habitat in Europae fabulosis,

punctum. 33. *S. nigra*, ano puncto albo.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Parua. Duplo praecedente minor. Corpus totum nigrum. Abdomen terminatur puncto albo, paruo. Alae hyalinae, immaculatae.

gibba. 34. *S. nigra*, abdomine ferrugineo, apice fusco, alis anticis apice fuscis. *Syst. Ent.* 350. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 946. 33. *Fn. Sv.* 1658.
Scop. carn. 570.

Habitat in Europae fabuletis.

fasciata. 35. *S. nigra*, antennis rufis, alis albis, fasciis duabus fuscis. *Syst. Ent.* 350. 24.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

36. *S. cinerea*, abdominis segmentis basi atris, apice fu- *cinerea*, scis. *Syst. Ent.* 350. 25.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
37. *S. nigra*, abdominis segmento secundo ferrugineo. *tropica*. *Syst. Ent.* 350. 26.
Sphex tropica nigra, oculis albis, abdominis segmen- to secundo latiori ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 945. 27. *Mus. Lud. Vlr.* 408.
Habitat in America meridionali.
38. *S. thorace tomentoso aureo*, abdome ferrugineo, *fugax*. alis flavescentibus, fascia fusca. *Syst. Ent.* 350. 27.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
39. *S. ferruginea*, thorace postice aureo, alis flavescenti- bus. *Syst. Ent.* 351. 28.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
40. *S. atra*, abdominis segmentis vtrinque puncto albo, *rufipes*. alis apice fuscis. *Syst. Ent.* 351. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 945. 29. *Fn. Sv.* 1659.
Habitat in Europae sabuletis.
Varietatem vidi thorace postice ferrugineo, vix tamen distinctam.
41. *S. atra*, capite thoraceque rufis. *Syst. Ent.* 351. 30. *nigricori- nis*.
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
42. *S. nigra*, abdome rufo, apice atro, alis apice fuscis, *exaltata*. puncto albo. *Syst. Ent.* 351. 31.*
Habitat in Europa.
43. *S. atra*, thorace antice fascia cinerea, abdome rufo, *abdomi- nalis*. alis apice fuscis. *Syst. Ent.* 351. 32.*
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
44. *S. nigra*, antennis, tibiis aliquo testaceis, his apice *capensis*. fuscis. *Syst. Ent.* 347. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 942. 4.
Mus. Lud. Vlr. 407.
Habitat in Africa.
45. *S. atra*, alis cyaneis. *nigrita*.
Habitat in Malabar. *Mus. Dom. Banks.*
Fabr. Spec. Ins. F f Statura

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Corpus totum atrum, immaculatum. Alae cyaneae, nitidae.

turcica. 46. S. nigra, thorace antice fascia cinerea, abdomine rufo, alis nigris. *Syst. Ent.* 351. 33. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

villoso. 47. S. nigra, abdomine villoso testaceo, alis atris. *Syst. Ent.* 352. 34. *

Habitat in Malabaria. *D. Koenig.*

flavua. 48. S. atra, dorso anoque ferrugineis, alis flauis apice fuscis. *Syst. Ent.* 352. 35. *

Habitat in India orientali.

bicolor. 49. S. atra, capite abdominalis apice alisque flauis, his apice fuscis. *Syst. Ent.* 352. 36. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

flavitor-nis. 50. S. atra, labio antennis pedibusque ferrugineis. Habitat in Malabaria. *Mus. Dom. Banks.*

Maior *S. ruficorni*. Caput nigrum labio antennisque totis ferrugineis. Corpus atrum, iminaculatum. Alae cyaneae. Pedes ferruginei femoribus basi nigris. Tibiae posticae serratae.

ocellata. 51. S. atra, pedibus testaceis, alis cyaneis; anticis macula ocellari ferruginea.

Habitat in Africa aequinoctiali.

Magna. Antennae nigrae articulo primo crassiori piceo.

Caput nigrum oculis pallidis oreque ferrugineo.

Thorax et abdomen glabra, atra, immaculata. Alae omnes cyaneae, anticis macula media ferruginea puncto cyaneo. Pedes omnes testacei. Tibiae posticae serratae.

rufitor-nis. 52. S. cyanea, antennis rufis. *Syst. Ent.* 352. 37. *

Habitat in America meridionali.

coerulea. 53. S. coerulea, alis apice albicantibus. *Syst. Ent.* 352. 38. *

Sphex coerulea alis ferrugineis basi nigris. *Linn. Syst.*

Nat. 2. 947. 38.

Sphex auripennis nigra coeruleo nitida, alis ferrugineo aureis

aureis basi nigris apice albicantibus, antennis apice ferrugineis. *Degeer Inf.* 2. 2. 585. tab. 30. fig. 1.

Sphex rubra. *Drury Inf.* 2. tab. 39. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

Variat alis ferrugineis basi nigris, et nigris macula media ferruginea. Apex alarum semper albicat.

113. T I P H I A.

1. *T. nigra*, femoribus quatuor posticis angulatis rufis. *femorata*.
Syst. Ent. 353. 1. *
Habitat in Anglia.
2. *T. nigra*, thorace maculato, abdomine fasciis quinque *5cincta*.
flavis, secunda interrupta. *Syst. Ent.* 353. 2. *
Habitat in Europa, Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
3. *T. thorace nigro flauo vario*, abdomine flauo. *variegata*.
Habitat in Sibiria. *Pallas. Mus. Dom. Banks.*
Media. Antennae nigrae. Caput nigrum ore flauo fronte que pube argentea. Thorax niger margine antico macula magna ante alas scutelloque flavis. Abdomen flauum fascia vna alterae atra. Anus incuruus, ater.
4. *T. nigra*, abdomine vtrinque maculis quinque flavis, *haemorano* pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 353. 3. * *rhoidalis*.
Habitat in America meridionali. *D. v. Rohr.*
5. *T. nigra*, thorace macula dorsali rufa. *Syst. Ent.* 353. 4. * *ephippium*.
Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*
6. *T. hirta nigra*, thorace antice rufescente, abdominis *radula*.
segmento secundo tertioque flavis. *Syst. Ent.* 354. 5. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
7. *T. nigra*, abdomine fasciis tribus flavis, ano pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 354. 6. * *tricincta*.
Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*
8. *T. atra*, thorace antice cinereo villoso, postice retuso, *collaris*.
alis cyaneis. *Syst. Ent.* 354. 7. *
Habitat in Malabaria. *D. Koenig.*

pedestris. 9. *T. aptera nigra flavo variegata, thorace compresso.*
*Syst. Ent. 354. 8. **
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

II4. S C O L I A.

atrata. 1. *S. hirta nigra, alis ferrugineis apice nigris. Syst. Ent.*
*355. 1. **
Habitat in America. Dom. Drury.

morio. 2. *S. atra, alis cyaneis.*
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. Dom. Banks.
Corpus medium atrum, immaculatum. Alae cyaneae
puncto paruo transuerso ad marginem crassiorem
alae anticae.

nigrita. 3. *S. atra, alis albis, costa atra.*
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. Dom. Banks.
Statura praecedentis, tota atra, immaculata. Alae omnes
albae margine exteriori late atro, qui tamen in alis
posticis apicem haud attingit.

macula- 4. *S. hirta nigra, abdomine maculis quatuor fulvis. Syst.*
*ta. Ent. 355. 2. **
Sphex maculata. Drury Inf. 2. tab. 39. fig. 2.
Habitat in America boreali.

flavi- 5. *S. atra, fronte flava, abdomine maculis quatuor flavis.*
*frons. Syst. Ent. 355. 3. **
Sphex bidens. Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 3.
Habitat in Italia. D. Allioni.

macula- 6. *S. hirta atra, abdomine maculis trium parium flavis.*
ta. Habitat in Italia. D. Allioni.
Statura omnino praecedentium, at paullo minor. Cor-
pus atrum macula flava ante et pone oculos. Abdo-
men maculis sex flavis, quarum posticae fere coëunt.

macula- 7. *S. hirta atra, abdomine maculis duabus luteis, anten-*
nis flavis.
Habitat in America boreali. Mus. Dom. Teats.
Praecedentibus minor. Antennae flavae primo articulo
nigro. Corpus hirtum, nigruum. Maculae duas gla-
brae,

brae, luteae in tertio abdominis segmento. Alae apice fuscae.

8. S. hirta ferruginea, alis apice fuscis. *Syst. Ent.* 355. 4.* *ferruginea.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

9. S. hirta nigra, abdomine fasciis quatuor flavis. *Syst. radula.*
Ent. 355. 5.*

Sphex plumipes. Drury Ins. 1. tab. 44. fig. 5.
Habitat in America boreali.

10. S. cinereo hirta, abdomine cyaneo, fasciis quinque 5fasciata.
flavis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Antennae nigrae. Caput et thorax pube densa,
cinerea recta. Abdomen cylindricum, cyaneum, nitidum
fasciis quinque flavis, posterioribus obsole-
tioribus. Anus tridentatus. Alae fuscescentes. Pedes
hirti, fusi.

11. S. hirta atra, abdomine fasciis duabus flavis, alis cya- *scinetta.*
neo atris. *Syst. Ent.* 356. 6.*

Sphex radula. Sulz. Ins. tab. 27. fig. 4.

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

12. S. hirta atra, vertice fulvo. *Syst. Ent.* 356. 7.* *verticalis.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

13. S. atra, abdomine punctis quatuor rufis, alis cyaneis. *4pustula-*
Habitat in Malabaria. *Mus. Dom. Banks.* *ta.*

Statira praecedentium, tota atra. Abdominis segmen-
tum secundum et tertium vtrinque puncto rufo, po-
steriori maiori. Alae omnes cyaneae, nitidae.

14. S. nigra, abdōmine medio rufo apice nigro, punctis 5punctata-
quinque albis.

Habitat in Germania.

Parua. Antennae petiolatae, nigrae. Caput nigrum,
puncto paruo albo in orbita oculorum. Thorax ni-
ger antice vtrinque puncto albo. Abdominis segmen-
tum primum atrum, 2. 3. rufa, reliqua atra punctis
quinque albis 2. 2. 1. quorum duo intermedia mi-
nótissima. Pedes breues, nigri.

4guttata. 15. *S. atra*, abdomine punctis quatuor albis, alis hyalinis.
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Affinis *S. coliae 4punctatae*, at paullo minor. Antennae petiolatae, nigrae, subtus ferrugineae. Caput nigrum fronte alba. Thorax niger, immaculatus. Abdomen atrum, nitidum punctis vtrinque duobus transversalibus albis. Alae hyalinae, immaculatae. Pedes nigri.

4punctata. 16. *S. atra*, abdomine punctis quatuor albis, alis ferrugineo fuscis. *Syst. Ent.* 356. 8. *
Habitat in Italia.

sexcincta. 17. *S. nigra* flavo maculata, abdomine atro, strigis sex flauis. *Syst. Ent.* 356. 9. *
Habitat in America. *Dom. v. Rohr.*

interrupta. 18. *S. nigra* cinereo hirta, abdomine atro, fasciis sex flauis, anticis tribus interruptis, ano tridentato.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Affinis videtur *S. coliae 7cinctae*. Antennae nigrae. Caput cinereo hirtum labio basi vtrinque lineola flava. Thorax niger cinereo pubescens punctis tribus scutellaribus flauis. Abdomen pubescens, atrum, fasciis sex flauis anticis tribus interruptis, quarto vtrinque puncto nigro. Anus dentibus tribus validis. Pedes nigri, tibiis quatuor anticis supra flauis. Alae albidae costa anteriorum ferruginea.

7cincta. 19. *S. cinereo hirta*, abdomine coerulescente, fasciis septem flauis, ano tridentato. *Syst. Ent.* 356. 10. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

115. C H R Y S I S.

splendida. 1. *C. coerulea* nitida, ano quadridentato. *Syst. Ent.* 357. 1. *
Habitat in Malabaria. *D. Koenig*, in noua Hollandia.
Mus. Dom. Banks.
Corpus totum coeruleum viridi colore nitens.

smaragdula. 2. *C. viridis* nitida, ano sexdentato coeruleo. *Syst. Ent.* 357. 2. *
Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*

3. *C. coerulea nitida, abdomine aureo, ano quadridentato coeruleo.* *calens.*
Habitat in Sibiria. D. Pallas. Mus. Dom. Banks.
Magnitudo praecedentis. Antennae fuscae. Caput et thorax coerulea, nitida scutello prominente concauo. Abdomen aureum nitidum ano coeruleo quadridentato. Pedes coerulei apice fusi.
4. *C. viridis nitens, abdomine vtrinque macula ocellari oculata. aurea, ano sexdentato coeruleo.* *Syst. Ent. 357. 3.**
Habitat in Malabaria. D. Koenig.
5. *C. viridis nitida, abdominalis secundo segmento vtrinque ocello coerulescente, scutello prominulo acuto.* *Syst. Ent. 357. 4.**
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. Dom. Drury.
6. *C. glabra nitida, thorace abdominisque primo segmento viridibus, reliquis carneis, ano ferrato.* *carnea.* *Syst. Ent. 357. 5.**
Habitat in Italia. D. Allioni.
7. *C. glabra nitida, thorace abdominisque primo segmento coeruleis, reliquis aureis, ano quadridentato.* *fulgida.*
Linn. Syst. Nat. 2. 948. 7. Fn. Sv. 1669.
Habitat in Europa.
Paullo maior C. ignita.
8. *C. glabra nitida, thorace viridi, abdomine aureo apice quadridentato.* *ignita.* *Syst. Ent. 358. 6. Linn. Syst. Nat. 2. 947. 1. Fn. Sv. 1665.*
Chrysis viridis nitida, thorace postice coeruleo, abdome aureo quadridentato. *Degeer Ins. 2. 2. 155. 1. tab. 28. fig. 17. 18.*
Vespa thorace viridi coeruleo, abdomine inaurato ponere cupreo dentato. *Geoff. Ins. 2. 382. 20.*
Frisch. Ins. 9. tab. 10. fig. 1.
Sulz. Ins. tab. 19. fig. 121.
Schaeff. Elem. tab. 40.
Icon. tab. 74. fig. 7. 8.
Habitat in Europae muris.

bidentata. 9. *C. glabra nitida cyanea*, thorace bidentato abdomineque segmentis duobus primis aureis. *Syst. Ent.* 358. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 947. 2.

Chrysis cyanea nitida, abdomine macula magna nigra, alis apice fuscis. *Degeer Inf.* 2. 2. 159. 2. tab. 29. fig. 3. 4.

Habitat in Europa.

Anus dentibus tribus breuissimis.

succincta. 10. *C. glabra viridis nitens*, thorace fascia coccinea, abdomine aureo subtridentato. *Syst. Ent.* 358. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 947. 3.

Habitat in Europa boreali.

lucidula. 11. *C. glabra viridis nitens*, thorace antice abdomineque aureis, ano integro. *Syst. Ent.* 358. 9. *

Vespa viridi coerulea, abdomine thoracisque antica parte ruberrimis. *Geoff. Inf.* 2. 382. 19.

Sphex nobilis. *Scop. carn.* 792.

Habitat in Europa australiori.

feruida. 12. *C. glabra aurea nitida*, abdomine subtus atro.

Habitat in Italia. *D. Allioni*.

Parua magnitudine *C. auratae*. Caput, thorax, abdomen aurea, glabra, nitida, sub alis cyanea. Abdomen subtus atrum. Pedes atri.

aurata. 13. *C. glabra nitens*, thorace viridi, abdomine aureo, ano bidentato. *Syst. Ent.* 359. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 948. 4. *Fn. Sv.* 1666.

Vespa thorace viridi coeruleo, abdomine aurato, cupero pone inermi. *Geoff. Inf.* 2. 383. 27.

Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 5. 6.

Habitat in Europae muris.

cyanea. 14. *C. glabra nitens*, thorace abdomineque coeruleis, ano tridentato. *Syst. Ent.* 359. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 948. 5. *Fn. Sv.* 1667.

Vespa coerulea nitens. *Geoff. Inf.* 2. 384. 23.

Schaeff. Icon. tab. 81. fig. 5.

Scop. carn. 697.

Habitat in Europae muris.

15. C. viridis nitens, ano quadridentato coeruleo. *Syst. amethystina.*
*Ent. 359. 12. **
- Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
16. C. viridis nitens, thorace postice bidentato, ano quadridentato. *Syst. Ent. 359. 13. ** *nitidula.*
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
17. C. aurea, abdomine ferrugineo apice cyanea. *Syst. semiaurata.*
Ent. 359. 14.
- Sphex semiaurata* viridis nitida, abdomine ferrugineo
apice nigro. *Linn. Syst. Nat. 2. 946. 35. Fn. Sv. 1661.*
Vespa capite thoraceque rubro cupreо, abdomine rufо
pone nigro. *Geoff. Inf. 2. 384. 24.*
Habitat in Europa boreali.

116. THYNNVS.

1. T. abdомине atro, segmento secundo tertio quartoque *dentatus*:
punctis duobus albis. *Syst. Ent. 360. 1. **
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
2. T. abdомине nigro, segmentis fascia interrupta flava, *emarginatus*:
scutello emarginato. *Syst. Ent. 360. 2. ** *natus.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
3. T. ater, abdомinis segmentis margine villoso cinereis, *integer*:
ano integro. *Syst. Ent. 360. 3. **
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

117. LEVCOSPI.

1. *Leucospis.* *Syst. Ent. 361. 1. ** *dorsigera.*
Sphex dorsigera. *Sulz. Hist. Inf. tab. 27, fig. 11.*
Habitat in Italia. *D. Allioni.*

118. BEMBEX.

1. B. labio superiori rotundato integro, corpore nigro *signata*:
flauoque vario. *Syst. Ent. 361. 1.*
Vespa signata thorace supra nigro, lineis quatuor fascio-
FF 5 lisque

lisque duabus flauis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 952. 24.
Mus. Lud. Vlr. 410.

Vespa signata. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 27. fig. 9.
 Habitat in America meridionali.

punctata. 2. B. labio superiori integro, abdominis segmentis atris,
 punctis quatuor flauis. *Syst. Ent.* 361. 2. *
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

rostrata. 3. B. labio superiori conico fiso, abdome atro, fasciis
 glaucis repandis. *Syst. Ent.* 362. 3.
Apis rostrata labio superiori conico inflexo, abdomi-
 nis fasciis glaucis repandis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 957.
 25. *Fn. Sv.* 1700. *Iter Gotl.* 336.
 Habitat in Europae monticolis arenosis, in singulis ni-
 dis vnico pullo.

fasciata. 4. B. labio rotundato, nigra, abdome fasciis sex flauis,
 anterioribus quinque interruptis.
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Magnitudo praecedentis. Antennae nigrae articulo pri-
 mo subtus flauo. Caput cinereo pubescens labio ro-
 tundato flauo. Thorax fuscus, cinereo pubescens,
 immaculatus. Abdomen atrum, nitidum fasciis sex
 flauis, anterioribus quinque interruptis. Pedes fla-
 ui femoribus nigris.

119. V E S P A.

cincta. 1. V. nigra, thorace obscure maculata, abdome atro,
 fascia ferruginea. *Syst. Ent.* 362. 1. *
Sphex tropica. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 27. fig. 5.
 Habitat in Malabaria. *D. Koenig.*
 Varietas minor thorace immaculata e Promontorio bon.
 sp. *Mus. Dom. Banks.*

ephippi- 2. V. abdome ferrugineo, segmento secundo maiori
 um. atro, scutello tridentato. *Syst. Ent.* 362. 2. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

orientalis. 3. V. ferruginea, abdome fascia flava vtrinque bipun-
 &tata. *Syst. Ent.* 363. 3. *

Vespa

Vespa orientalis fusca, abdominis segmento tertio quartoque flavis, punctis duobus nigris. Linn. Mant. 540.

Vespa turcica. Drury Ins. 2. tab. 39. fig. 1.?

Habitat in Oriente.

4. V. ferruginea, abdomine atro, fasciis tribus interruptis *tricincta*.
flavis. Syst. Ent. 363. 4. *

Habitat in America. Mus. Dom. Banks.

5. V. nigricans, abdominis primo et secundo segmento basi *analis*.
ferrugineis, sexto toto flavo. Syst. Ent. 363. 5. *

Habitat ad Cap. bon. sp. Mus. Dom. Banks.

6. V. thorace lineolis nigris tribus, corpore ferrugineo, *carolina*.
alis anticis nigricantibus. Syst. Ent. 363. 6. Linn.

Syst. Nat. 2. 948. 1.

Habitat in America boreali.

Maginitudo V. crabronis.

7. V. ferruginea, abdomine alisque atris, mandibulis por- *cornuta*.
rectis capite longioribus. Syst. Ent. 363. 7. *

Vespa cornuta rostro corneo subulato, abdomine atro,
segmento secundo maiore. Linn. Syst. Nat. 2. 951.
20. Mus. Lud. Vlr. 409.

Apis cornuta. Drury Ins. 2. tab. 48. fig. 3.

Habitat in Africa aequinoctiali.

Mandibulae semper porrectae, in altero sexu cornutae.

8. V. thorace nigro antice rufo innaculato, abdominis in-
cisuris puncto nigro dupli contiguo. Syst. Ent. 364. *crabro*.

8. Linn. Syst. Nat. 2. 948. 3. Goff. Ins. 2. 368. 1.

Vespa nigra luteaque, capite postice, thorace antice, an-
tennarumque primo articulo testaceis. Degeer Ins. 2.
2. 132. tab. 27. fig. 9. 10.

Scop. carn. 824.

Mouff. Ins. 50.

Raj. Ins. 250.

Frisch. Ins. 9. tab. 11. fig. 1.

Swammerd. Bibl. Nat. tab. 26. fig. 9.

Reaum. Ins. 6. tab. 18. fig. 1.

— — 4. tab. 10. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 53. fig. 5.

— — tab. 136. fig. 3.

Habitat sub arborum radicibus. Apibus insidiatur.

vulgaris. 9. V. thorace vtrinque lineola interrupta, scutello quadrimaculato, abdominis incisuris punctis nigris distinctis. *Syst. Ent.* 364. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 949. 4. *Fn. Sv.* 1671.

Vespa thorace lineolis trium parium differentium flauescientium. *Geoff. Inf.* 2. 369. 2.

Vespa nigra luteaque, antennis totis nigris. *Degeer Inf.* 2. 2. 111. tab. 26. fig. 7.

Vespa vulgaris *Raj.* *Inf.* 256.

Scopol. carniol. 825..

Recam. Inf. 6. tab. 12. fig. 7. 8.

Frisch. Inf. 9. tab. 12. fig. 2.

Swammerdam Bibl. tab. 26. fig. 8.

Schaeff. Elem. tab. 130.

— — — *Icon.* tab. 35. fig. 4.

Habitat sub Europae tectis, praedatur Muscas, furatur mel Apum.

gallica. 10. V. thorace vtrinque lineola, scutello sexmaculato, abdominis incisuris flauis: secunda bimaculata.

Linn. Syst. Nat. 2. 949. 7.

Habitat in Europa australiori.

Affinis *V. vulgari*, at minor.

rufa. 11. V. thorace vtrinque lineola, scutello bipunctato, abdome flauo antice ferrugineo. *Syst. Ent.* 364. 10.

Linn. Syst. Nat. 2. 948. 5. *Fn. Sv.* 1672.

Habitat in Europa boreali.

norwegi- 12. V. thorace vtrinque lineola, scutello immaculato, ab-
ca. dominis segmentis margine flauis, secundo vtrinque
macula rufa.

Habitat in Norwegia. *Dom. Lund.*

Affinis praecedentibus. Caput nigrum ore flauo. Thorax pubescens niger lineola vtrinque flaua. Scutellum omnino inimaculatum. Abdomen atrum segmentorum marginibus flauis. Macula magna rufa in secundo segmento.

macula- 13. V. nigra, thorace albo maeulato, scutello quadrimaculato, abdomine postice albo. *Syst. Ent.* 364. 11.

Linn. Syst. Nat. 2. 948. 2. *Amoen. acad.* 6. 412. 91.

Vespa

Vespa nigra, thoracis lateribus apiceque abdomine-
que postice sulphureo maculatis. *Degeer*, *Ins. 3. 584.*
9. tab. 29. fig. 13.

Habitat in America boreali.

14. *V. nigra*, thorace flavo maculato, abdomine fasciis *arenaria*,
sex dentatis luteis: prima linearis interrupta *Syst.*
*Ent. 365. 12. **

Habitat in Americae arenosis, fauos strueus planos, ho-
rizontales, incumbentes, cellis hexagono prisinaticis,
deorsum spectantibus. Delectatur fructibus dulci-
bus, eorumque succis expressis. *Mus. Dom. Banks.*

15. *V. thoracis dorso nigro*: lineis duabus flauis, scutello *lineata*.
flauo, linea nigra. *Syst. Ent. 365. 13. **

Habitat in America *Dom. Drury.*

16. *V. flava*, thoracis dorso nigro: punctis quatuor fer- *carnifex*.
rugineis. *Syst. Ent. 365. 14. **

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

17. *V. fusca*, capite ferrugineo, antennis medio *nigris*, *lano*.
*Syst. Ent. 365. 15. **

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

18. *V. fusco ferruginea*, fronte flauescente, antennis *vni-* *schach*.
coloribus.

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis praecedenti affinis. Antennae ferrugineae,
immaculatae. Corpus totum fusco ferrugineum,
immaculatum, abdominis apice tamen paullo pal-
lidiore. Frons flauicat. Alae ferrugineae.

19. *V. fusca*, genibus, antennarum apicibus marginaque
primi segmenti flauis. *Syst. Ent. 366. 16. Linn.* *annula-*
ris.
Syst. Nat. 2. 950. 9. Amoen. acad. 6. 413. 93.

Vespa nigro fusca, thoracis lateribus rubris, abdomi-
ne fascia tarsisque flauis. *Degeer Ins. 3. 583. 7. tab.*
29. fig. 11.

Habitat in America boreali.

20. *V. fusca*, abdomine cinerascente, segmenti primi *humilis*.
margine flauescente.

Habi-

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis praecedenti affinis. Caput et thorax fusca, ferrugineo paullo mixta. Labium mox flauescens, mox fuscum. Abdomen cinerascens, obscurum margine primi segmenti tenuissime flavo. Alae ferrugineo fuscae. Pedes ferruginei femoribus fuscis.

tepidā. 21. V. nigra, thorace lobo antico punctisque duobus abdomine apice ferrugineis. *Syst. Ent.* 366. 17. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

aestuans. 22. V. thoracis dorso atro, scutello quadripunctato, abdomine atro, segmento primo et secundo maculis duabus albis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Caput nigrum labio oreque ferrugineis. Maxillae porrectae, exsertae fere longitudine antennarum. Antennae ferrugineae. Thorax subtus ferrugineus dorso atro. Maculae vtrinque pallidae in margine antico. Puncta quatuor alba in scutello, quorum duo postica elevata, fere spinosa. Abdomen ouatum, atrum primo segmento basi ferrugineo apice maculis duabus albis. Segmentum secundum maculis duabus maioribus transuersis albis. Alae et pedes ferruginei.

calida. 23. V. nigra, abdomine apice fuluo. *Syst. Ent.* 366. 18. *
Vespa calida nigra, abdominis apice antennisque fuluis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 952. 27.
Habitat in Africa aequinoctiali.

haemorrhoidalis. 24. V. nigra, thorace antice abdomineque postice ferrugineis, alis flavis basi atris. *Syst. Ent.* 366. 19. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*

albifrons. 25. V. atra, labio abdominalisque fascia niveis. *Syst. Ent.* 366. 20. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

concinna. 26. V. nigra, abdomine ferrugineo, segmento secundo toto atro. *Syst. Ent.* 367. 21. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

27. V. atra, scutello abdominalisque fascia baseos albis. *vncinata*.
Syst. Ent. 367. 22. *

Vespa quadriens atra, thorace quadridentato, scutello primoque segmento abdominalis niueis. *Linn.*

Syst. Nat. 2. 951. 15. *Amoen. acad.* 6. 413. 92. At thorax in nostra omnino inermis.

Vespa cincta nigra, alis fusco violaceis, thorace maculis tribus, abdominali fascia sulphureis. *Degeer*
Ins. 3. 584. 8. tab. 29. fig. 12.

Habitat in America.

28. V. nigra, labio pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 367. 23. * *rufipes*.
Habitat in Insulis Oceani pacifici. *Mus. Dom. Banks.*

29. V. thorace postice lineolis duabus flavis, abdominali *marginali*-ferrugineo, segmento primo tertioque nigris, marginis.
Syst. Ent. 367. 24. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*

30. V. ferruginea, abdominalis segmento secundo nigro; *oculata*.
macula vtrinque ocellari lutea.

Habitat in Italia. *Dr. Alioni*.

Statura V. dorsalis. Caput cum antennis obscure ferrugineum. Thorax ferrugineus macula magna dorsali nigra. Abdomen ouatum segmento primo ferrugineo, secundo nigro vtrinque macula magna ocellari lutea, reliqua breuissima, ferruginea. Alae ferrugineae apice nigrae. Pedes ferruginei.

31. V. ferruginea, abdominalis primo segmento macula *dorsalis*. nigra margineque flavo. *Syst. Ent.* 367. 25. *

Habitat in America boreali. *Lewin*.

32. V. nigra, thorace punctis duobus, scutello bipuncta-parietum, abdominali fasciis quinque flavis, prima remotissima. *Syst. Ent.* 368. 26. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 949. 6. *Fn. Sv.* 1673. et 1679.

Vespa nigra, abdominali fasciis quinque flavis, prima remotissima. *Geoff. Ins.* 2. 376.

Roe. Ins. 2. *Vesp.* tab. 17. fig. 8.

Frisch. Ins. 9. tab. 12. fig. 1.

Habitat in foraminibus parietum ligneorum.

tridens. 33. V. nigra, abdomine fasciis quinque flauis, ano tridentato.

Habitat in Italia. *Dr. Alioni.*

Parua duplo praecedente minor. Antennae nigrae.

Caput nigrum labio flavo: Thorax niger puncto sub alis flauo. Abdomen nigrum segmentorum marginibus flauis. Anus tridentatus. Pedes flavi femoribus nigris.

ferripes. 34. V. nigra, abdomine fasciis quinque flauis, tibiis serrato spinosis.

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Antennae nigrae articulo secundo tertioque rufis. Caput nigrum maculis tribus, sub antennis punctis duobus pone oculos fuluis. Thorax niger punctis duobus anticis, scutello punctisque duobus posticis flauis. Abdomen atrum fasciis sex flauis, prima fere interrupta. Pedes flavi tibiis omnibus serrato spinosis. Alae fuscae.

muraria. 35. V. nigra, thorace maculis duabus luteis, abdomine fasciis quatuor flauis, prima remotissima. *Syst. Ent.*

368. 27. *Linn. Syst. Nat.* 2. 950. 8. *Fn. Sv.* 1674.

Scopol. carn. 828.

Frisch. Ins. 9. tab. 12. fig. 8. 9.

Schaeff. Icon. tab. 24. fig. 3.

Habitat in Europae muris.

Scutellum immaculatum.

spinipes. 36. V. nigra, abdomine fasciis quinque flauis, femoribus intermediis denticulatis. *Syst. Ent.* 368. 28.

Linn. Syst. Nat. 2. 950. 10. *Fn. Sv.* 1682.

Habitat in Europa boreali.

bidens. 37. V. nigra, thorace bispinoso, abdominis segmentis tribus margine luteis. *Syst. Ent.* 368. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 951. 16.

Habitat in Europa boreali.

Scutellum bipunctatum.

2fascia. 38. V. nigra, thorace immaculato, abdomine fasciis duabus flauis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 950. 14. *Fn. Sv.* 1683.

Habi-

Habitat in Europa boreali.

Antennae nigrae. Labium flauum.

39. V. nigra, thorace maculato, abdomine fasciis duabus *2cincta*.
flavis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Parua a praecedente distincta. Antennae nigrae. Caput nigrum puncto inter antennas duobusque ad basin labii flavis. Thorax niger punctis duobus anticis, duobus ante alas quatuorque loco scutelli flavis. Abdomen glabrum, atrum fasciis duabus flavis.

40. V. abdominalis fasciis quatuor flavis, tertia interrupta. *aruensis.*
Syst. Ent. 368. 30. *Linn. Syst. Nat.* 2. 950. 12. *Fn.*
Sv. 1678.

Vespa primo abdominalis segmento pyriformi fasciisque
tribus flavis. *Geoff. Ins.* 2. 375. 7.

Degeer Ins. 2. 2. 146. 3.

Schaeff. Ieon. tab. 93. 8.

Habitat in Europae muris.

41. V. nigra, thorace lineola punctis duobus scutelloque
flavis, abdomine fasciis quatuor flavis, prima inter- *campe-*
rupta. *Syst. Ent.* 369. 31. *stris.*

Vespa campestris nigra, thorace lituris quatuor abdo-
minisque fasciis quatuor flavis, prima interrupta.
Linn. Syst. Nat. 2. 950. 13. *Fn. Sv.* 1677.

Habitat in Europae parietibus.

42. V. nigra, abdomine atro nitido, fasciis sex flavis. *sexfascia-*
Habitat in Italia. *D. Allioni.* *ta.*

Parua. Antennae supra nigrae, subtus fluae. Caput
nigrum labio punctoque inter antennas flavis. Tho-
rax niger striga marginis anterioris flava. Abdomen
atrum, nitidum segmentis margine flavis, fascias sex
constituentibus. Pedes flavi femoribus nigris.

43. V. ferruginea, abdomine fasciis quinque flavis, anten- *tricolor.*
nis medio nigris, apice flavis. *Syst. Ent.* 369. 32. *

Habitat in Iamaica.

44. V. thorace maculato, abdomine fasciis quatuor punctis- *bipuncta-*
que duobus primi segmenti flavis. *Syst. Ent.* 369. 33. * *ta.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Fabr. Spec. Ins.

Gg

45. V.

- flauipes.* 45. V. thorace maculato, abdomine fasciis tribus punctisque duobus primi segmenti flauis. *Syst. Ent.* 369. 34. *
Habitat in America. *Dom. Lewin.*
- variabi-* 46. V. nigro ferrugineoque varia, abdomine flauo, segmento primo macula, secundo toto nigris.
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentium. Caput et thorax ferrugineo nigroque varia. Labium interdum flauescens. Maculae duae flavae sub scutello. Abdomen flauicans. Primum segmentum macula magna nigra, secundum totum atrum, tertium basi atrum. Reliqua flava. Pedes ferruginei.
Variat rarius colore abdominalis magis nigro.
- cinera-* 47. V. nigra, thorace postice vtrinque subspinoso, alis *scens.* violaceis. *Syst. Ent.* 369. 35. *
Habitat in America. *Dom. v. Rohr.*
- tetta.* 48. V. thorace nigro, lobo antico abdominalaque ferrugineis, dorso nigro.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Antennae ferrugineae. Caput nigrum labio posneque oculos flavum. Thorax niger lobo antico et postico ferrugineis. Abdomen sessile, ferrugineum, linea dorsali late nigra. Alae anticae subcyaneae, basi ferrugineae. Pedes ferruginei femoribus posticis atris.
- lateralis.* 49. V. obscura, abdominali atro, lateribus albidis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo et statura praecedentis. Caput obscure ferrugineum antennis apice nigris. Thorax obscure ferrugineus dorso nigro. Abdomen glabruum atrum lateribus late albidis. Pedes obscure ferruginei.
- flauescens.* 50. V. ferruginea, alis apice macula fusca. *Syst. Ent.* 370. 36. *
Habitat in India orientali. *D. Koenig.*
- gibbosa.* 51. V. capite thoraceque maculatis, abdominali varioloso quadrifasciato, primo segmento gibboso. *Syst. Ent.* 370. 37. *
Habitat in America. *Dom. Lewin.*

52. V. scutello fasciis duabus lineolisque quatuor flauis, *america-*
abdomine fasciis flauis, ano fusco. *Syst. Ent.* 370. 38.* *na.*
 Habitat in Americae meridionalis insulis.
53. V. abdominis primo segmento infundibuliformi, se- *coarcta-*
cundo campanulato maximo. *Syst. Ent.* 370. 39.* *ta.*
Linn. Syst. Nat. 2. 950. II. *Fn. Sv.* 1676.
Vespa nigra, abdominis articulo primo infundibuli-
 formi, secundo campanulato maximo. *Geoff. Inf.*
 2. 377. tab. 16. fig. 2.
Scop. carn. 830.
Frisch. Inf. 9. tab. 9.
 Habitat in Europae hortis.
 Abdomen nigrum fasciis flauis.
54. V. nigra flauo variegata, abdominis petiolo incuruo, *arcuata.*
 maculis quatuor flauis. *Syst. Ent.* 371. 40.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
55. V. nigra flauo variegata, abdominis petiolo ferrugineo, *campani-*
apice nigro, maculis duabus flauis. *Syst. Ent.* 371. *formis.*
 41.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
56. V. ferrugineo flauo varia, abdominis petiolo in- *petiolata.*
 curuo ferrugineo, fascia atra.
 Habitat in Malabarria. *Mus. Dom. Banks.*
 Media. Antennae ferrugineae, vncinatae. Caput ferru-
 gineum fascia verticis inter oculos atra. Thorax fer-
 rugineus lobo antico flauo. Abdominis petiolus elon-
 gatus, incuruus, ferrugineus basi fasciaque apicis atris.
 Segmentum secundum ferrugineum, apice atrum, reli-
 qua flavescentia. Pedes ferruginei.
57. V. abdomine flauo basi nigro, petiolo incuruo ferru- *pyrifor-*
 gineo, fasciis duabus nigris. *Syst. Ent.* 371. 42.* *mis.*
 Habitat in China. *Drury.*
58. V. nigra flauo variegata, abdominis petiolo bipuncta- *pomifor-*
 to, secundo segmento fascia interrupta omnibusque *mis.*
 margine flauis.
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Statura et magnitudo V. coarctatae. **Antennae nigrae** primo articulo subtus flauo. **Caput nigrum labio flauo, puncto medio nigro.** Thorax niger fascia antica, puncto magno sub alis maculisque quinque scutellaribus flavis. Abdominis primum segmentum elongatum, infundibuliforme punctis duobus marginique flavis, secundum campaniforme, maximum, nigrum, fascia media interrupta marginique flavis, reliqua breuissima margine flauo. Pedes flavi.

grisea. 59. V. cinerea, abdominis petiolo ferrugineo, lateribusque flauo maculatis. *Syst. Ent.* 372. 43. *
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

cinerea. 60. V. cinereo fusca, abdominis immaculati petiolo elongato incurvo ferrugineo.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Statura et summa affinitas V. griseae, at paullo minor et abdominis latera immaculata. Alae nigrae.

macilenta. 61. V. cinerascens, abdominis nigricantis petiolo ferrugineo, secundo segmento maculis duabus cinereis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentium, at duplo minor. Antennae ferrugineae dorso nigro. Caput et thorax cinerascens, subuillosa dorso obscuriore. Abdominis petiulus elongatus, incurvus, ferrugineus, immaculatus. Secundum segmentum ferrugineum apice maculis duabus griseis, reliqua nigricantia. Pedes ferruginei. Alae albidae.

tabida. 62. V. nigra flauo maculata, abdominis petiolo nigro, secundo segmento basi flauo.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus paruum. Antennae nigrae. Caput nigrum labio flauo. Thorax niger margine antico punctis duobus sub alis, duobus transuersis loco scutelli, lineolisque duabus sub scutello flavis. Abdomen atrum, petiolo elongato, incurvo, immaculato. Segmentum secundum basi flauum, tertium vix basi flauicat. Pedes flavi femoribus posticis nigris.

63. V. abdominis ferruginei petiolo nigro, fascia flava. attenuata.
Syst. Ent. 372. 44. *
 Habitat in America meridionali. *Dom. Drury.*
64. V. coerulea, ore ferrugineo, alis fuscis. *Syst. Ent.* cyanea.
 372. 45. *
 Habitat in Brasilia. Nidus cordatus cortice tenuissimo
 tectus Anacardii orientalis truncis adhaeret. *Mus.*
Dom. Banks.
65. V. nigra, thorace antice ferrugineo, abdomen conico flavo, segmento secundo fascia, reliquis basi nigris. *Vespa conica nigra*, thorace antice ferrugineo, abdome conico flavo, segmento secundo et sexto basi nigris. *Syst. Ent.* 372. 46. *
 Habitat in America meridionali, in Italia. *D. Allioni.*
66. V. nigra, abdominis petiolo pedibusque rufis. *Syst. arietis.*
Ent. 373. 47. *
 Habitat in Americae meridionalis insulis. *D. v. Rohr.*
67. V. scutello quadripunctato, abdominis segmentis marginae albis, secundo punctis duobus albis. *biglumis.*
Syst. Ent. 373. 48. *Linn. Syst. Nat.* 2. 951. 17. *Fn. Su.* 1680.
 Habitat in Europa, nidum e fistulis aggregatis ad latera
 rupium struens.
68. V. nigra, abdomen flavo, segmentis triangulo dorsali triangulo nigro. *Syst. Ent.* 373. 49. * *lum.*
 Habitat Hafniac.

120. C R A B R O.

1. C. abdomine fasciis duabus flavis, ano tridentato, alis tridentatae nigris margine albis. *Syst. Ent.* 373. 1. * *tus.*
 Habitat in Europa australi.
2. C. thorace postice bidentato, abdomen fasciis tribus spinosus. flavis. *Syst. Ent.* 373. 2. *
 Habitat in Europa australiori.
3. C. thorace immaculato, abdomen maculis vtrinque fossorius. quinque lutescentibus, pedibus nigris. *Syst. Ent.* 374. 3. *G g 3* *Sphex*

Sphex fossoria. Linn. Syst. Nat. 2. 946. 32. Fn. Sv.
1662.

Habitat in Europae montibus fabulosis.

Maculae abdominis posticae connatae in fasciam.

subterra- 4. C. thorace maculato, abdomine vtrinque maculis quinque flauis, pedibus ferrugineis. Syst. Ent. 374. 4. *
neus. Habitat Hafniae.

macula- 5. C. thorace maculato, abdomine atro, maculis vtrinque quatuor, tibiisque flauis.

Habitat in America boreali. Mus. Dom. Banks.

Medius. Antennae nigrae primo articulo flavo. Caput nigrum labio argenteo. Thorax niger striga antica, puncto sub alis scuteiloque flauis. Abdomen atrum, nitidum, maculis vtrinque quatuor transueris flauis. Femora nigra, tibiae flavae,

flavipes. 6. C. niger, thorace maculato, abdomine flavo, segmentorum marginibus anoque nigris.

Habitat in Italia. D. Allioni.

Medius. Antennae nigrae. Caput nigrum labio flavo fronteque pube argentea. Thorax niger striga marginali antica, punctis sub alis strigaque marginali postica duplicata flauis. Abdomen flavum segmentorum marginibus ultimoque segmento toto atris. Pedes flavi.

sexcin- 7. C. thorace maculato, abdomine fasciis sex flauis, primis interruptis. Syst. Ent. 374. 5. *
citus.

Habitat in Germania. Dom. de Hattorf.

cribrari- 8. C. niger, abdomine fasciis flauis, intermediis interruptis, tibiis anticis clypeis concavis. Syst. Ent. 374. 6.

Sphex cribraria. Linn. Syst. Nat. 2. 945. 23. Fn. Sv. 1675.

Sphex abdomine fasciis duabus interruptis, pedibus anticis clypeatis. Degeer Inf. 2. 2. 139. tab. 28. fig. 1.

Vespa Ichneumon antennis reflexis, pedibus anterioribus velut clypeatis. Raj. Inf. 255. 14.

Apis tibiis anticis lamella cribiformi. Vdm. Diff. 94. Roland. Act. Holm. 1751. 56. tab. 3. fig. 1.

Naturforsch. 2. tab. 2.

Schaeff. Icon. tab. 177. fig. 6.

Sulz. Hist. Ins. tab. 27. fig. 6.

Habitat in Europae floribus.

Sexus alter pedibus simplicibus, alter clypeatis ad artiorem cohaesionem in copula.

9. C. niger, abdomine punctis flauis, pedibus anticis con- *clypeatus.*
cano clypeatis. *Syst. Ent.* 375. 7.

Sphex clypeata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 945. 24.

Apis nigra, abdomine fasciis sex flauis, primis duabus
interruptis, tibiis anticis lamellis integris. *Sclureb.*

Ins. II. tab. I. fig. 8.

Habitat Halae Saxonum.

10. C. niger, abdominis fasciis tribus flauis, primis inter- *vagus.*
ruptis, tibiis flauis. *Syst. Ent.* 375. 8.

Sphex vagus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 946. 36. *Fn. Sv.* 1661.

Scop. carn. 785.

Habitat in Europae floribus.

Variat thorace maculato et immaculato.

11. C. niger, scutello flauo, abdominis segmentis tribus *mystacea-*
marginे flauis, primo interrupto, tibiis *ferrugineis.* *us.*

Syst. Ent. 375. 9.

Sphex mystacea. *Linn. Syst. Nat.* 2. 944. 21. *Fn. Sv.*
1653.

Habitat in Europae floribus frequens.

12. C. laevis ater, thorace maculato, abdomine antice fa- *dimidia-*
scia, punctis duobus anque flauis. *tus.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Paruus. Caput atrum labio argenteo primoque anten-
narum articulo subtus flauo. Thorax niger lineola
antica, punctis duobus lineolaque scutelli flauis. Ab-
domen antice atrum fascia punctisque duobus flauis,
postice flauuni, strigis obscurioribus. Pedes flavi fe-
moribus nigris.

13. C. laevis ater, abdomine pedibusque ferrugineo fla- *diadema.*
uis, labio albo.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Paruus. Caput nigrum labio albo et inter antennas
macula tridentata alba. Thorax niger margine an-

tico, puncto sub alis maculisque duabus transuersis
loco scutelli flauis. Abdomen flauum dorso magis
ferrugineo primoque segmento nigro. Pedes flave-
scentes.

femoratus. 14. C. flauus nigro maculatus, femoribus posticis crassissi-
mis denticulatis flauis. *Syst. Ent.* 375. 10. *

Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*

tricinctus. 15. C. ater, scutello punctis duobus sub scutello, abdomi-
nisque fasciis tribus flauis. *Syst. Ent.* 375. 11. *

Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*

vniiglumis. 16. C. scutello mucronato, abdominis segmentis tribus,
punctis duobus albis. *Syst. Ent.* 376. 12. *

Vespa vniiglumis. Linn. *Syst. Nat.* 2. 951. 18. *Fn. Sv.*
1681.

Habitat in Europae floribus, in primis umbellatis.

leucostoma. 17. C. ater glaber, labio argenteo. *Syst. Ent.* 376. 13.

Vespa leucostoma atra glabra, labio argenteo, palmis
fuscis. Linn. *Syst. Nat.* 2. 946. 36. *Fn. Sv.* 1663.

Habitat in Europae floribus.

121. ANDRENA.

coerulea. 1. A. fusca subuillosa, abdomine coerulecente, incisura-
scens. rarum marginibus albicantibus. *Syst. Ent.* 376. 1.

Apis coerulea. Linn. *Syst. Nat.* 2. 956. 21. *Fn. Sv.* 1696.
Habitat in Europa.

Margines segmentorum abdominis latere in primis albi.

labiata. 2. A. villosa nigra, abdominis segmento secundo tertio-
que rufis.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.* In Italia. *D. Allioni.*

Corpus totum villosum, nigrum, abdominis segmentis
duobus solis ferrugineis. Labium flauum.

Variat rarius abdominis apice ferrugineo fusco nec
nigro.

3. A. aenea, grisecente pubescens. *Syst. Ent.* 376. 2. *aenea.*
Apis aenea. Linn. *Syst. Nat.* 2. 955. 20. *Syst. Ent.*
 1695.
Apis tota viridi cuprea. *Geoff. Inf.* 2. 415. 15.
 Habitat in Europa, in America paullo maior.
4. A. thorace pubescente, abdomine ferrugineo segmentorum marginata. *margina-*
ta.
Gen. Inf. Mant. 247. *
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
5. A. thorace ferrugineo, abdomine cinerascente. *Syst. heluola.*
Ent. 376. 3.
Apis heluola rufa villosa oblonga subtus albida. Linn.
Syst. Nat. 2. 955. 16. *Fn. Sv.* 1693.
 Habitat in Europae floribus.
6. A. thorace villoso ferrugineo, abdomine atro immaculato. *bicolor.*
Syst. Ent. 376. 4. 4. *
 Habitat in Daniae memoribus.
7. A. thorace nigro postice villoso ferrugineo, abdomine atro, segmentorum marginibus niueis. *tricolor.*
Syst. Ent. 377. 5. *
 Habitat in America boreali.
8. A. capite thoraceque viridi pubescentibus, abdomine atro, segmentorum marginibus cyaneis. *cincta.*
 Habitat in Malabaria. *Mus. Dom. Banks.*
Magna. Antennae nigrae. Caput fuscum, viridi pubescens ore pallido. Thorax viridi pubescens. Abdomen atrum segmentorum marginibus late cyaneis. Pedes nigri tibiis dorso ferrugineo ciliatis.
9. A. atra, abdomine segmentorum marginibus niueis. *nigrita.*
Syst. Ent. 377. 6. *
 Habitat in America.
10. A. cinereo pubescens, abdomine atro, fasciis quatuor albis. *fasciata.*
Syst. Ent. 377. 7. *
 Habitat in America.
11. A. subpubescens fusca, abdomine fasciis quatuor coeruleis. *zonata.*
Syst. Ent. 377. 8.

Apis zonata. Linn. Syst. Nat. 2. 955. 19. Mus. Lud.
Vlr. 415.

Habitat in India orientali.

Affinis A. cinctae, at distincta.

pilipes. 12. A. atra glabra, pedibus posticis albo ciliatis, alis fuscis.

Habitat in Italia. D. Allioni.

Statura et magnitudo A. haemorrhoidalis tota glabra, atra, thorace obscuro, abdomine nitido. Alae omnes fuscae. Pedes nigri postici albo ciliati.

haemor- 13. A. nigra, ano ferrugineo. Syst. Ent. 377. 9. *
rhoidalis. Habitat in Sueciae nemoribus.

gulosa. 14. A. nigra, abdomine flavo basi nigro, lingua longissima. Syst. Ent. 377. 10. *

Habitat ad Cap. bon. spei. Dom. Drury.

bidenta- 15. A. abdomine fusco, cingulis quinque albidis, ano bidental. Syst. Ent. 377. 11. *

Habitat in America. Mus. Dom. Banks. Nidum in muris e foliis conuolutis arborum struens.

Pedes antici elongati, flavi tarsis ciliatis.

virescens. 16. A. capite thoraceque viridi aeneis, abdomine nigro. Syst. Ent. 378. 12. *

Habitat in America. Mus. Dom. Banks.

cinguita- 17. A. thorace rufo, abdomine atro, fasciis quatuor coerulecentibus. Syst. Ent. 378. 13. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

succincta; 18. A. thorace hirsuto fulvo, abdomine nigro, cingulis quatuor albis. Syst. Ent. 378. 14.

Apis succincta. Linn. Syst. Nat. 2. 955. 18. Fn. Sv. 1694.

Apis nigra, thorace hirsuto fulvo, abdomine glabro, incisuris albis. Geoff. Ins. 2. 411. 7.

Schaeff. Icon. tab. 32. fig. 5.

Habitat in Europae floribus.

Varietas minor thorace magis nigricante fasciaque prima abdominis absoluta.

122. Apis

122. A P I S.

1. A. hirsuta atra, tarsis anticis explanatis flauis, intus ciliatis. *Syst. Ent.* 378. 1. * *latipes.*
Apis latipes. *Drury Inf.* 2. tab. 48. fig. 2.
 Habitat in China.
2. A. hirsuta atra, alis violaceis. *Syst. Ent.* 2. 379. 2. *violacea.*
Linn. Syst. Nat. 2. 959. 38. *Mus. Lud. Vlr.* 415.
Geoff. Inf. 2. 416. 19.
Apis gigas nigra nitida, oculis fuscis, alis violaceo viridibus aeneo nitentibus. *Degeer Inf.* 5. 76. 10.
 tab. 28. fig. 15.
Bombylius lusitanicus e nigro coerulescens. *Petiv. gazoph.* tab. 12. fig. 5.
Reaum. Inf. 6. tab. 5. fig. 1. 2.
Scopol. caru. 812.
 Habitat in truncis exsiccatis Europae australioris et Indiae, quos perforat, longitudinaliter excavat ibique plures nidos a fundo incipiens polline herbarum melle mixto replet, et vnicuique ouumi concretit. Nidi distinguuntur 4. 5. annulis ligneis.
Nymphaea caput deorsum spectat, vt in vndo exitum quaerat apis perfecta.
3. A. hirsuta atra, fronte abdominisque lateribus cinereis. *nigrita.*
Syst. Ent. 379. 3. *
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
4. A. hirsuta atra, abdомине supra flaueseente. *Syst. Ent.* *carolina.*
 379. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 959. 40.
 Habitat in America.
5. A. hirsuta nigra, thorace cingulo flauo, ano albo. *Syst. terrestis.*
Ent. 379. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 959. 41. *Fn. Sv.* 2709.
Bombylius maior niger, linea dupli transuersim ducta lutea, alia supra scapulas, alia per medium abdominis, imo abdомinе albo. *Raj. Inf.* 247. 5.
Goed. Inf. 2. tab. 46.
Bradl. nat. tab. 26. fig. 1. D.
Reaum. Inf. 6. tab. 3. fig. 1.
Frisch. Inf. 9. tab. 13. fig. 1.

Sulz. *Inf.* tab. 19. fig. 124.

Schaeff. *Elem.* tab. 20. fig. 6.

Icon. tab. 69. fig. 7.

Habitat in Europae terra, profunde nidificans, strenue mellificans.

Varietas quadruplo minor in pratis Kilonienibus frequens.

crypta- 6. A. hirsuta nigra, abdominis fascia flava, ano albo.
rumin. *Syst. Ent.* 379. 6. *

Habitat Hafniae. *Dom. Mohr.*

ruderata. 7. A. hirsuta atra, thorace flavo, fascia atra, abdomine antice flavo, ano albo. *Syst. Ent.* 380. 7. *

Habitat Hafniae. *Dom. Mohr.* In Madera. *Mus. Dom. Banks.*

nemorum. 8. A. hirsuta atra, thorace fascia interrupta flava, ano pallido. *Syst. Ent.* 380. 8. *

Habitat Hafniae. *Dom. Mohr.*

soroeensis. 9. A. hirsuta atra, ano albo. *Gen. Inf. Mant.* 248. *

Habitat in syluis Soroeensibus. *Dom. de Slangbush.*

Statura omnino praecedentium, at tota atra solo ano albo.

surinamensis. 10. A. hirsuta nigra, abdomine excepto, primo segmento flavo. *Syst. Ent.* 380. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 961. 52.

Apis abdomen flavum hirsuta nigra, abdomine excepto, primo segmento flavo, tibiis posticis dilatatis.

Degeer Inf. 3. 574. 6. tab. 28. fig. 9.

Drury Inf. 1. tab. 43. fig. 4.

Habitat Surinamini.

virginica. 11. A. hirsuta pallida, abdomine excepto primo segmento atro. *Syst. Ent.* 380. 10. *Linn. Mant.* 1540.

Drury Inf. 1. tab. 43. fig. 1.

Habitat in Virginia.

antiguensis. 12. A. hirsuta atra, thorace abdomineque antice flavis.

Syst. Ent. 380. 11. *

Habitat in Antigua Insula. *Dom. Drury.*

A sequente manifeste differt.

13. A. hirsuta nigra, thorace antice flauo, abdomine fla- *america-*
uo, ano nigro. *Syst. Ent.* 380. 12. * *norum.*

Habitat in America boreali. *Dom. Lexin.*

14. A. hirsuta nigra, thoracis dorso flano, abdomine vi- *africana.*
rescente, segmento primo flauo.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Caput nigrum pube cinera-
scente. Antennae nigrae, apice ferrugineae. Tho-
rax flauissimus limbo antico nigro. Abdomen vi-
rescente segmento primo flauissimo. Alae fuscae.
Pedes nigri.

15. A. hirsuta nigra, thorace abdomineque antice flavis, *hortorum.*
ano albo. *Syst. Ent.* 380. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 960.

42. *Fn. Sv.* 1710.

Habitat in Europae hortis.

Affinis A. hortorum, at triplo minor.

16. A. hirsuta nigra, thorace antice flauo, ano rubro. *arbusto-*
Gen. Inf. Mant. 247. * *rum.*

Apis pratorum. Linn. Syst. Nat. 2. 960. 43. *Fn. Sv.*
1711.

Habitat in Daniae nemoribus. *Dom. de Slangbush.* In
Italia. *Dr. Allioni.*

17. A. hirsuta atra, ano fuluo. *Syst. Ent.* 381. 14. *Linn. lapida-*
Syst. Nat. 2. 960. 44. *Fn. Sv.* 1701. *Geoff. Inf.* 2. 417.

Bombylius maximus totus niger, exceptis duobus ex-
tremis abdominis annulis rufis. Raj. Inf. 246. 1.

Scopol. carn. 813.

Frisch. Inf. 9. tab. 25. fig. 2.

Reaum. Inf. 6. tab. 1. fig. 1—4.

Schaeff. Icon. tab. 69. fig. 9.

Habitat in lapidum aceruis, strenue mellificans.

Varietas triplo minor, vix distincta.

18. A. hirsuta pallida, thoracis fascia abdomineque po- *syluarum.*
stice nigris, ano rufo. *Syst. Ent.* 381. 15. *

Apis syluarum hirsuta pallida, thoracis fascia nigra,
ano

ano rubro. *Linn. Syst. Nat. 2. 960. 45. Fn. Sv. 1713.*

Scopol. carn. 822.

Habitat in Europae nemoribus.

bryorum. 19. A hirsuta flava, abdomine virescente. *Syst. Ent. 381. 16. **

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

*musco-
rum.* 20. A. hirsuta fulua, abdomine flavo. *Syst. Ent. 381. 17. Linn. Syst. Nat. 2. 960. 46. Fn. Sv. 1714.*

Bombylius medius, dorso longis pilis rufis vestito, mellificus, vulgatissimus, in gramine nidum construens. *Raj. Inf. 246. 3.*

Frisch. Inf. 9. tab. 26. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 69. fig. 8.

Reaum. Inf. 6. tab. 2. fig. 3. 4.

Habitat sub Europae muscis mellifacans.

*hypno-
rum.* 21. A. hirsuta fulua, abdominis fascia nigra, ano albo. *Syst. Ent. 381. 18. Linn. Syst. Nat. 2. 960. 47. Fn. Sv. 1715.*

Apis nigra thoracis basi et apice abdominalisque basi flavis, ano albo. *Geoff. Inf. 2. 418. ?*

Scopol. carn. 820.

Reaum. Inf. 6. tab. 2. fig. 4. 1.

Habitat sub Europae muscis.

sibirica. 22. A. hirsuta flava, thoracis fascia annoque fuluis.

Habitat in Sibiria. *Dr. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Caput vti totum corpus atrum. Thorax flavo hirtus fascia fulua inter alas. Abdomen flavo hirtum anno fuluo.

*prato-
rum.* 23. A. hirsuta flava, thorace fascia nigra. *Syst. Ent. 382. 19. **

Apis fragrans. Pall. Iter 1. 474. 75.

Habitat in Daniae nemoribus, in Sibiria *Pallas.*

Feminae odore roseo fragrantissimae *Pallas.*

lucorum. 24. A. hirsuta flava, ano albido. *Syst. Ent. 382. 20. Linn. Syst. Nat. 2. 961. 48. Fn. Sv. 1716.*

Habitat in Europae floribus.

25. A. hirsuta atra, tibiis posticis ferrugineis. *Syst. Ent.* aceruo-
382. 21. * rum.
Apis aceruorum hirsuta atra. *Linn. Syst. Nat.* 2. 961.
50. *Fn. Sv.* 1717.
Schaeff. Icon. tab. 78. fig. 5.
Habitat in Europa sub terra.
26. A. hirsuta atra, ano fuscō. *Syst. Ent.* 382. 22. *Linn.* subter-
Syst. Nat. 2. 961. 51. *Fn. Sv.* 1718. ranea,
Geoff. Inf. 2. 416. 20.
Bombylius minor praecedenti concolor, abdomine imo
pallidius nitente seu fuluo. *Raj. Inf.* 246. 2.
Habitat in Europae floribus.
27. A. hirsuta atra, scutello abdomineque palescentibus, minorum.
ano rufo. *Gen. Inf. Mant.* 248. *
Habitat Kiloniae. *Dom. de Scheftedt.*
28. A. hirsuta heluola, femoribus basi nigris. *Syst. Ent.* brasilia-
382. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 961. 49. norum.
Habitat in America.
29. A. hirsuta coerulecente atra, thorace supra flauo. *aestuans.*
Syst. Ent. 382. 24. *
Apis aestuans hirsuta nigra, thorace flauo. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 961. 53. *Mus. Lud. Vlr.* 416.
Apis leucothorax hirsuta nigra, thorace luteo, alis
nigro violaceis, abdomine glabro. *Degeer Inf.* 3. 573.
4. tab. 28. fig. 7.
Habitat in America, noua Hollandia, Cap. b. spei.
30. A. hirsuta nigra, abdomine postice flauo. *Syst. Ent.* tropica.
382. 25. *Linn. Syst. Nat.* 2. 961. 54. *Mus. Lud. Vlr.*
416.
Habitat in regionibus australioribus.
31. A. hirsuta cinerea. *Syst. Ent.* 382. 26. * senilis.
Habitat in Daniae nemoribus.
32. A. thorace hirto atro antice flauo, abdomine nudo seminuda.
atro, fascia interrupta hirta.
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Media. Caput vix pubescens, atrum. Thorax valde
hirtus

hirtus ater, antice fascia flava. Abdomen ouatum, atrum, nitidum in medio fascia interrupta hirta. Pedes atri.

lagopoda. 33. A. grisea, pedibus anticis dilatato ciliatis, tibiis posticis clauatis, ano emarginato. *Syst. Ent.* 383. 27. *Linn. Syst. Nat.* 2. 957. 27. *Fn. Sv.* 1702.

Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 17.

Habitat in Europae floribus.

pilipes. 34. A. grisea, pedibus intermediis fasciculato pilosis. *Syst. Ent.* 383. 28. *

Apis plumipes. *Pall. Spicil. Zool.* fasc. 9. 24. tab. 1. fig. 14.

Habitat in Anglia. *Dom. Lewin.*

plumipes. 35. A. thorace fulvo, abdomine nigro, apice fulvo, tibiis posticis compresso dilatatis hirsutis atris.

Habitat in India. *Mus. Dom. Teats.*

Antennae nigrae, labium flavum, frons nigra, linea flava. Vertex lana fulua, subtus lana alba. Thorax testus lana fulua. Abdominis primum et secundum segmentum atrum, reliqua fulua lateribus albo maculatis. Pedes antici albo villosi, reliqui quatuor atri tibiis valde compressis, dilatatis, hirtis.

cunicula- 36. A. pubescens, thorace ferrugineo, abdomine fusco pedis.

Syst. Ent. 383. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 957. 23. *Fn. Sv.* 1698.

Habitat in terra sabulosa Europae.

mellifica. 37. A. pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, tibiis posticis ciliatis intus transverse striatis. *Syst. Ent.* 383. 30. *Linn. Syst. Nat.* 2. 955. 22. *Fn. Sv.* 1697.

Apis gregaria. *Geoff. Inf.* 2. 407. 1.

Apis domestica siue *vulgaris*. *Raj. Inf.* 240.

Swammerd. Bibl. Nat. tab. 17. fig. 1. operaria.

fig. 3. femina.

fig. 4. inas.

Reaum. Inf. 5. tab. 21. 22. 23. fig. 1. operaria.

fig. 2. inas.

fig. 3. femina.

Sulz. Inf. tab. 19. fig. 123.

Habitat in Europae arboribus cauis, frequentius culta.

38. A.

38. A. nigra, thorace postice abdomineque antice tomen- *disiuncta*.
tosis flauis, alis fuscis.
Habitat in America.
Magnitudo A. mellifcae. Caput nigrum. Thorax ni-
ger postice tomento denso flauo. Abdomen cyaneum,
nitidum, segmento primo tomento flauo tectum. Pe-
des nigri. Alae fuscae.
39. A. nigra, thorace postice abdomineque antice tomen- *rufipes*.
toso ferrugineis, alis testaceis, apice fuscis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Magna. Caput nigrum, immaculatum. Thorax antice
niger, immaculatus, postice tomento ferrugineo te-
ctus. Abdomen nigrum segmento primo toto, secun-
doque margine ferrugineo tomentosis. Alae omnes
testacea, apice fuscae. Pedes ferruginei.
40. A. atra, thorace rufo, alis apice fuscis. *Syst. Ent. thoracica.*
383. 31. *
Habitat in Daniae nemoribus.
41. A. thorace hirsuto albicante, fascia nigra, abdomine *flaui-*
coerulecente, ano cinereo. *Syst. Ent. 383. 32. ** *frons.*
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
42. A. nigra, thorace hirsuto albicante, fascia nigra, ab- *cineraria*.
domine coerulecente. *Syst. Ent. 384. 33. Linn. Syst.*
Nat. 2. 953. 5. Fn. Sv. 1688.
Schaeff. Icon. tab. 22. fig. 5. 6.
Habitat in Europae floribus.
43. A. thorace villoso cinereo, abdomine coerulecente, *analis*.
ano nigro. *Syst. Ent. 384. 34. **
Habitat in America. *Dom. Drury.*
44. A. thorace villoso ferrugineo, abdomine atro, lateri- *haemor-*
bus glauco maculatis, ano ferrugineo. *rhoa.*
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Caput cum antennis nigrum fronte cinereo pubescente.
Thorax niger, lana ferruginea tectus. Abdomen atrum
nitidum maculis lateralibus glaucis anōque rufo. Pe-
des nigri tibiis posticis rufo hirtis.

- manicata*. 45. A. cinerea, abdomine nigro, maculis lateralibus flauis
ano quinquedentato. *Syst. Ent.* 384. 35. *Linn. Syst.
Nat.* 2. 958. 28. *Fn. Sv.* 1701.
Apis abdomine fasciis flauis interruptis apice spina
quintuplici recurva armato. *Geoff. Inf.* 2. 498. 3.
Swammerd. Bibl. Nat. 26. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 32. fig. 11. 12.
Habitat in Europae arboribus cauis.
- florenti- na*. 46. A. abdomine maculis flauis lateralibus subtus hirsutissi-
mo, segmentis tribus vltimis vtrinque dentatis. *Syst.
Ent.* 384. 36. *
Habitat in Europa australi. *Mus. Com. Excell. Dom.
Tott.*
- Ireos*. 47. A. thorace hirto ferrugineo, abdomine atro, fasciis
tribus interruptis albis, tarsis posticis angulato dilata-
tis.
Apis Ireos. Pall. Iter 2. 2. pag. 731. 93.
Habitat in floribus Iridis Russiae. *Mus. Dom. Banks.*
Maior A. maculata. Os et labium flava. Abdominis
segmentum primum lana ferruginea, 2. 3. 4. fascia
interrupta alba. Pedes flavi tarsis posticis basi valde
angulatis.
- maculata*. 48. A. nigra, thorace maculato, abdomine maculis vtrin-
que sex transuersis flauis, ano integro.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Caput nigrum ore punctisque verticalibus flauis, Tho-
rax niger, subpubescens maculis lateralibus flauis.
Abdomen glabrum, atrum, nitidum maculis vtrinque
sex transuersis flauis. Femora rufa. Tibiae supra fla-
vae, subtus nigrae.
- inter- rupta*. 49. A. pubescens nigra, abdomine strigis quinque flauis,
anticis duabus interruptis, ano bidentato.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Statura omnino praecedentis, at thorax magis pubescens
nec maculatus. Caput nigrum clypeo punctoque su-
pra oculos flauis. Abdomen glabrum, nigrum, strigis
quinque flauis obsoletis anticis interruptis. Anus
bidentatus.

o. A. nigra, abdominis segmentis maculis quatuor flauis variegata transuersis.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Afñnis A. maculatae. Caput fuscum labio vtrinque macula flava et puncto paruo pone oculos. Thorax fuscus linea marginali maculisque duabus scutellariis flauis. Abdomen globosum, atrum maculis quatuor flauis in singulo segmento subtus pilis rufis hirtum. Pedes flavi femoribus supra nigris. Anus integer.

1. A. supra lutea, fascia baseos alarum atra. *Syst. Ent.* 384. *fasciata.*
37. *Linn. Syst. Nat.* 2. 958. 30.

Habitat in Africa.

Abdominis prima duo segmenta atra lateribus albis.

2. A. fronte bicorni, capite nigro, abdome hirsuto rufo. *bicornis.*
Syst. Ent. 384. 38. *Linn. Syst. Nat.* 2. 954. 10.
Fn. Sv. 1691.

Habitat in Europa.

3. A. fusca, abdome rufescente, fronte alba. *Syst. Ent.* 385. 39. *Linn. Syst. Nat.* 2. 954. 9. *Fn. Sv.* 1690. *rufa.*

Apis sylvestris parua, abdome breuiore, tota supina parte lanagine rufa vestita, thorace lanagine albican-te. *Raj. Inf.* 242. 7.

Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 15.

Habitat in Europa frequens in floribus.

Antennae corpore breuiores, nigrae.

54. A. thorace ferrugineo, abdome nigro albo fasciato, *lanata.*
ventre lana nivea. *Syst. Ent.* 385. 40. *

Habitat in America.

55. A. nigra, abdome hirto, supra fuluo, subtus niveo. *bicolor.*
Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura A. centuncularis, at maior. Antennae breues, cylindricae, nigrae. Caput nigrum fronte tomento cinereo. Thorax ater puncto villoso albo, sub alis postice tomento fuluo. Abdomen supra tomento fuluo, subtus albo densiori tectum. Pedes cinereo tomentosi plantis tomento fuluo. Alae anticae obscurae.

56. A. atra, thorace abdominisque cinereo hirtis, ventre villosa.
lana atra. *Syst. Ent. App.* 828. *

Habitat in India orientali. *Dom. Edler.*

pubescens. 57. A. corpore cinereo pubescente immaculato.

Habitat in Italia. *D. Allioni*.

Parua, corpore toto pube cinerascente tecto. Abdominis segmenta margine albidiora.

mystacea. 58. A. nigra, abdomine toto ferrugineo. *Syst. Ent.* 385. 41.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.

centuncularis. 59. A. nigra, ventre lana fulua. *Syst. Ent.* 385. 42. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 953. 4. *Fn. Sv.* 1687.

Apis nigra, abdomine supra lineis albis, subtus lana fulua. *Geoff. Inf.* 2. 410. 5.

Apis parua nigra, abdomine supino nigro glabro splendente, prono lanugine rufa densa vestito. *Raj. Inf.* 242. 6.

Scop. carn. 799.

Reaum. Inf. 6. tab. 10. fig. 3. 4.

Habitat in Europa intra terram plures nidos cylindricos ex foliis rosae formans tanquam centunculos.

punctata. 60. A. nigra cinereo villosa, abdomine atro, segmentis vtrinque puncto albo, scutello integro. *Syst. Ent.* 385. 43.*

Habitat in Angliae floribus.

cincta. 61. A. thorace cinereo villoso, abdomine fusco, segmentorum marginibus fuluis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks*.

Magna. Caput et thorax fusca, cinereo hirta. Segmentum abdominalis primum itidem cinereo hirtum, reliqua fusca marginibus fuluis subtus fuluo villosum.

Pedes fusci plantis quatuor posticis fuluo villosis.
Alae fuscae.

bombylans. 62. A. cyanea nitida, abdomine aeneo. *Syst. Ent.* 386. 44.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.

muscaria. 63. A. coerulescens, ano albido. *Syst. Ent.* 386. 45.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.

haemorrhoidalis. 64. A. atra, abdomine aeneo, ano rufo. *Syst. Ent.* 386. 46.*
Habitat in Americae meridionalis insulis.

dentata. 65. A. viridis nitida, alis nigris, femoribus posticis dentatis. *Syst. Ent.* 386. 47. *Linn. Syst. Nat.* 2. 954. 14.
Mus. Lud. Vtr. 413.

Sulz.

Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 16.

Habitat in Americae meridionalis insulis.

66. A. viridis nitida, alis hyalinis, abdomine cordato, tibiis posticis dilatatis. *Linn. Syst. Nat. 2. 955. 15.*
Degeer Inf. 3. 572. 3. tab. 28. fig. 5.
Habitat Surinami.
67. A. thorace hirto cinerascente, abdomine cyaneo, ano verficolor.
rufescente. *Syst. Ent. 386. 48. **
Habitat in Americae meridionalis insulis. *D. v. Rohr.*
68. A. fusca, abdomine cingulis quinque albidis, ano quadridentata.
dridentato, intermediis bifidis. *Syst. Ent. 386. 49.*
Linn. Syst. Nat. 2. 958. 29. Fn. Sv. 1703.
Swamm. Bibl. Nat. tab. 26. fig. 4.
Habitat in Europa.
69. A. thorace cinereo, abdomine rufso, pedibus posticis lanipes.
hirutissimiis. *Syst. Ent. 386. 50. **
Habitat in Americae meridionalis insulis. *D. v. Rohr.*
70. A. fusca, abdomine glabro ferrugineo, vtrinque nigro
maculato. *Syst. Ent. 387. 51. **
coecutiens.
Habitat in Liptiae hortis.
71. A. scutello tridentato, abdomine conico acutissimo, tridentata.
segmentorum marginibus albis. *Syst. Ent. 387. 52. **
Habitat in Americae meridionalis insulis. D. v. Rohr.
72. A. fusca, abdomine conico acutissimo, segmentorum conica.
marginibus albis, scutello inermi. *Syst. Ent. 387. 53.*
Linn. Syst. Nat. 2. 958. 32. Fn. Sv. 1705.
Vespa sylvestris caudacuta, abdomine nigro, annulis
flavis distincto. Raj. Inf. 252. 4.
Reaum. Inf. 6. tab. 11. fig. 2. 3. 4.
Habitat in Europae floribus, in noua Hollandia alis
cyaneis. *Mus. Dom. Banks.*
73. A. cinerea, abdomine cylindrico nigro, fasciis sex al-
bis, pedibus flavis. *Syst. Ent. 387. 54. **
sexcincta.
Habitat in America.
Maior A. florifomni.

- quadri-* 74. A. nigra, abdomine cylindrico, fasciis quatuor albis cincta. *Gen. Inf. Mant.* 248. *
Habitat in Soroea Dauorum. *Dom. de Slangbusch.*
- maxillo-* 75. A. nigra, maxillis prominentibus, antennis thorace brevioribus, abdomine cylindrico subtus luteo hirsuto. *Linn. Syst. Nat.* 2. 954. II.
Habitat in Europae floribus.
Affinis praecedenti. Abdominis segmenta margine interrupta alba.
- flori-* 76. A. hirsuta, abdomine cylindrico incuruo, ano bidentato. *Syst. Ent.* 387. 55.
Apis florifommis nigra, abdomine subcylindrico incurvo ano bidentato, tibiis posticis apice spinosis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 954. 13. *Fn. Sv.* 1704.
Scop. carn. 796.
Habitat in Europa, in floribus pernoctans.
- annulata.* 77. A. nigra, fronte annulisque pedum albis. *Syst. Ent.* 387. 56. *Linn. Syst. Nat.* 2. 958. 33. *Fn. Sv.* 1706.
Habitat in Europae floribus frequens.
Parua moschum spirat.
- albipes.* 78. A. fusca, abdominis medio rufa, tibiis albis.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Statura parua omnino A. annulatae. Caput et thorax fusca, parum pubescentia. Abdominis segmentum secundum apice, tertium totum, quartumque bal rufum. Pedes nigri tibiis albis macula baseos fusca
Variat interdum segmento secundo tertioque rufis macula media nigra.
- tumulo-* 79. A. antennis filiformibus longitudine corporis nigri rum. maxillis lauis. *Syst. Ent.* 388. 57. *Linn. Syst. Nat.* 2. 953. 2. *Fn. Sv.* 1685. *Iter Gotl.* 336.
Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 14.
Habitat in Europae floribus.
- longicor-* 80. A. antennis longitudine corporis hirsuti fuluique nis. *Syst. Ent.* 388. 58. *Linn. Syst. Nat.* 2. 953. 1. *Fn. Sv.* 1684.

Apis

Apis hirsutie flavescentia, fronte flava, antennis articulatione compressis corpori aequantibus. Geoff. Inq. 2. 413. 10.

Apis sylvestris domesticae similis, antennis longis nigris. Raj. Inf. 243. 1.

Eucera longicornis. Scop. Ann. Hist. nat. 4. p. 8. 1.
Scop. carn. 794.

Swammerd. Bibl. tab. 26. fig. 6.

Habitat in Europae floribus.

Lingua septemfida.

§1. A. antennis ferrugineis longitudine corporis hirsuti *glaucia*.
glaucique. Syst. Ent. 388. 59. *

Habitat in Oriente. Prof. Forskahl.

§2. A. antennis nigris longitudine corporis, thorace cinereo, ab domine nigro. Syst. Ent. 388. 60. *

Habitat in Saxoniae floribus.

Lingua septemfida.

123. N O M A D A.

1. N. thorace, ab domine pedibusque albo nigroque variis, *histrionis*.
scutello emarginato. Syst. Ent. 388. 1. *

Habitat in India orientali. D. Koenig. In noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

2. N. nigra cinereo villosa, ab domine atro, vtrinque albo scutellata-
punctato, scutello porrecto bidentato. ris.

Habitat in Sibiria. D. Pallas. Mus. Dom. Banks.

Praecedente minor. Caput nigrum fronte albo pubescente. Thorax niger antice cinereo pubescens. Scutellum postice productum emarginato bidentatum. Abdomen totum glabrum, atrum, segmento 1. punctis vtrinque duobus, reliquis vtrinque unico albis. Pedes nigri tibiis macula magna alba. Alae anticae fuscae litura marginali alba.

3. N. thorace ab domine que albo variegatis, pedibus ferrugineis. Syst. Ent. 389. 2. variegata.

Apis variegata. Linn. Syst. Nat. 2. 957. 24. Fn. Sv. 1699.

Habitat in Europa, pernoctat in Geranii phaei rostris,
mordicus apprehensis.
Variat scutello albo et ferrugineo.

ruficornis. 4. N. antennis, pedibus punctisque quatuor scutelli ferrugineis, abdomine luteo variegato. *Syst. Ent.* 389. 3.
Apis ruficornis antennis pedibus duobus punctisque thoracis ferrugineis, abdomine luteo variegato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 958. 34. *Fn. Sv.* 1707.
Habitat in Europae floribus.
Thorax ferrugineo lineatus.

Fabricia. 5. N. nigra, abdomine glabro ferrugineo, maculis duabus flavis. *Syst. Ent.* 389. 4.
Apis Fabriciana. *Linn. Syst. Nat.* 2. 955. 17.
Habitat Vpsaliae.

gibba. 6. N. nigra, abdomine rufo apice nigro. *Syst. Ent.* 389. 5.
Nomada succincta. *Scop. Ann. Hist. nat.* 4. 45. 2.
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Hattorf. 7. N. nigra, abdominalis secundo segmento ferrugineo, maculis tribus nigris. *Syst. Ent.* 389. 6. *
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

cingula. 8. N. cinereo villosa, abdomine glabro nigro, segmento secundo tertioque ferrugineis. *Syst. Ent.* 390. 7. *
Habitat in Sueciae nemoribus.

124. F O R M I C A.

herculea- 1. F. nigra, abdomine ouato, pedibus ferrugineis. *Syst. Ent.* 391. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 962. 1. *Fn. Sv.* 1720.
Formica magna, hippomyrmex. *Linn. It. Gotl.* 232.
Formica maxima. *Raj. Inf.* 69.
Scop. carn. 832.
Habitat in Europae, Americae truncis putrescentibus vagabunda.

smaragdina. 2. F. viridis, thorace flavo sublineato. *Syst. Ent.* 828. *
Habitat in India. *Dom. Edler.*

rufipes. 3. F. hirta atra, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 391. 2. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

4. F. atra, capite rufo, squama petiolari didyma. *Syst. Ent.* 391. 3. * *erythrocephala.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
5. F. nigra, abdomine cinerascente, squama petiolari di- *didyma.*
dyma.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Statura F. rufae. Caput nigrum antennis piceis. Thorax gibbus, niger, immaculatus. Abdomen ouatum, pube cinerea nitidum. Squama petiolaris ouata, didyma vel potius late emarginata. Pedes nigri tibiis piceis.
6. F. nigra, thorace compresso pedibusque ferrugineis. *rufa.*
Syst. Ent. 391. 4.
Formica rufa thorace compresso toto ferrugineo, capite abdomineque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 962. 3. *Fn. Sv.* 1721.
Formica ferruginea capite abdomineque brunneis squamaque petiolari. *Degeer Inf.* 2. 2. 305. 1. tab. 41. fig. 1. 2.
Formica fusca thorace fuluo. *Geoff. Inf.* 2. 428.
Formica media rubra. *Raj. Inf.* 69.
Habitat in Europae, Americae aceruis acerosis, sylvaticis, pungens aculeo obsoleto.
Formicarum respublica consistit maribus feminisque alatis, incurvis, gulae deditis, spadonibusque numerosis, apteris, indefessis. Hae corradunt quisquiliis in aceruum, sustentant mares feminasque sub nuptiis, at peractis puerperiis parentes expellunt, retentis liberis pro conseruatione familiae.
7. F. atra, abdomine pubescente. *Syst. Ent.* 392. 5. * *pubescens.*
Habitat in Hungaria. *Mus. Tottianum.*
8. F. nigra nitida, ano piceo. *Syst. Ent.* 392. 6. *nigra.*
Formica nigra tota nigra nitida, tibiis cinerascentibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 963. 5. *Fn. Sv.* 1723.
Formica nigra squama petiolari, plantis antennisque dimidiato ferrugineis. *Degeer Inf.* 2. 2. 323. 4. tab. 42. fig. 16.
Formica atra. *Geoff. Inf.* 2. 429.

Formica minor e fusco nigricans. *Raj. Inf.* 69.

Sivamerd. Bibl. Nat. tab. 16. fig. 1 — 11.

Scop. carn. 834.

Habitat in Europae terra.

fusca. 9. F. nigra, ore thoracis apice pedibusque ferrugineis.

Formica fusca cinereo fusca, tibiis pallidis. *Linn. Syst.*

Nat. 2. 963. 4. *Fn. Sv.* 1722. *Geoff. Inf.* 2. 428. 5.

Formica nigra nitida, squama petiolari. *Degeer Inf.* 2. 2. 328. 3. tab. 42. fig. 12.

Formica media nigro colore splendens. *Raj. Inf.* 69.

Habitat in Europae syluis.

subra. 10. F. testacea, oculis puncto que sub abdomine nigris.

Linn. Syst. Nat. 2. 963. 7. *Fn. Sv.* 1725.

Formica ferruginea, aculeo spinisque duabus thoracis.

Degeer Inf. 2. 2. 328. 6. tab. 43. fig. 1.

Formica minima rufa. *Raj. Inf.* 69.

Leuwenh. Epist. 9. Sept. 1687. p. 107. fig. 8.

Habitat in Europae syluaticis sub lapidibus.

obsoleta. 11. F. supra nigra, subtus testaceo rufa, abdomine sub-

globoso. *Syst. Ent.* 392. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 963. 6.

Fn. Sv. 1724.

Habitat in Europae terra.

4punctata. 12. F. thorace compresso ferrugineo, abdomine atro, pun-
ta. etis quatuor niveis. *Syst. Ent.* 392. 8. *

Formica 4punctata rubra, abdomine nigro, punctis
quatuor albis. *Linn. Mant.* 1. 541.

Habitat in Alsatia, capt. d. 15. Maj.

virescens. 13. F. pallida, capite abdomineque virescentibus. *Syst.*

Ent. 392. 9. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

facchari- 14. F. nigra, pedibus, antennis maxillisque rufis. *Syst.*
vora. *Ent.* 392. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 963. 10.

Formica minima facchariora. *Brown. Iam.* 440.

Habitat in America, intra culmos facchari nidificans,
quos destruit.

15. F. nigra, thorace postice femoribusque ferrugineis, *macula-*
abdomine pallido maculato. *ta.*
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Caput magnum, atrum maxillis brevibus,
multidentatis. Antennae apice piceae. Thorax
compressus, antice niger, postice ferrugineus. Ab-
domen ouatum, pilosum, nigrum lateribus pallido
maculatis. Pedes nigri femoribus ferrugineis.
16. F. atra, capite, antennis plantisque ferrugineis, pe- *barbara.*
tiolo binodi. *Syst. Ent. 393. 11. Linn. Syst. Nat. 2.*
962. 2.
Habitat in Africa.
17. F. nigra, thorace rufo postice bidentato, petiolo bi- *aegyptia-*
nodi. *Syst. Ent. 393. 12. ** *ca.*
Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl.*
18. F. nigra, capite maxime rufo, petiolo binodi. *Syst. binodis.*
*Ent. 393. 13. **
Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl.*
19. F. thorace punctis eleuatis, petiolo binodi, corpore *omniuo-*
testaceo, abdomine minuto. *Linn. Syst. Nat. 2. 964. 12. ra.*
Formica pusilla rufa, abdomine fusco, pedibus testa-
ceis, thorace bidentato. *Degeer Inf. 3. 611. 9. tab. 31.*
fig. 23. 24.
Habitat Surinami.
20. F. flava, abdomine ouato pubescente. *flava.*
Formica flava squama petiolari. *Degeer Inf. 2. 2. 326.*
—5. tab. 42. fig. 24—28.
Habitat in Europae borealis syluis.
Parua, magnitudine tamen differt.
21. F. nigra, abdominalis petiolo binodi, scutello bidenta- *caespiti-*
to. *Syst. Ent. 393. 14.* *tum.*
Formica caespitum abdominalis petiolo binodis, priori
subtus thoraceque supra bidentato. *Linn. Syst. Nat.*
2. 963. 11. *Fn. Sv. 1726.*
Formica ferruginea, capite abdominalique aculeatis
rufis, thorace bispinoso. *Degeer Inf. 2. 2. 334. 7. tab.*
43. fig. 21, 22.
Formi-

Formica binodis. Linn. *Amoen. acad.* 6. 413. 94.

Sulz. *Hist. Inf.* tab. 17. fig. 20. 21. 22.

Aff. *Havniens.* 10. t. tab. 1. fig. 1. 2. 3.

Scopol. carn. 837.

Hamb. Mag. 5. 393.

Habitat in Europae pratis siccioribus sub muscis. Mares feminaeque examinant medio Augusti, meridie calido, more Phryganearum in aere choreas agentes turma volatili, depluentes per paria iuncta. Linn.

tuberum. 22. F. rufa, capite abdominalisque fascia nigris, petiolo binodi. *Syst. Ent.* 393. 15. *

Habitat in Suecia.

australis. 23. F. nigra, thorace inermi, squama petiolari bispinosa. *Syst. Ent.* 393. 16. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

bidentata. 24. F. thoracis gibbere bidentato, capite ouato, antennis ferrugineis, articulo infimo nigro. Linn. *Syst. Nat.* 2. 964. 13.

Formica rufo fusca, antennis ferrugineis, articulo infimo nigro, capite ouato, thoracis gibbere bidentato, petiolo squama erecta. *Degeer Inf.* 3. 600. 1. tab. 31. fig. 1. 2.

Habitat Surinami.

biscutata. 25. F. thorace bidentato, squama petiolari duplicata. *Syst. Ent.* 394. 17. *

Habitat Cajennae. *Dr. Mallet.*

eleuata. 26. F. nigra, thorace bidentato, abdominalis petiolo subtus videntato. *Syst. Ent.* 394. 18. *

Habitat in India orientali.

attelaboi. 27. F. thorace bispinoso nigra, pedibus ferrugineis, capite postice attenuato. *Syst. Ent.* 394. 19. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Ammon. 28. F. thorace bispinoso, squama petiolari spinis duabus incuruis. *Syst. Ent.* 394. 20. *

Habitat in noua Holländia. *Mus. Dom. Banks.*

29. F. thorace quadrispinoso, squama petiolari spinis *bihamata*
duabus arcuatis. *Syst. Ent.* 394. 21. * *ta.*

Formica bihamata. Drury Ins. 2. tab. 38. fig. 7. 8.

Sulz. Hist. Ins. tab. 27. fig. 19.

Habitat in Insula St. Iohannis Indiae.

30. F. thorace antice bispinoso, squama petiolari quadri-*militaris*
spinosa.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum. Caput magnum, gibbum, nigrum,
inter antennas vtrinque carinatum. Thorax gib-
bus, fasciis antice vtrinque spina acuta valida.
Squama petiolaris spinis quatuor erectis, validis,
lateralibus paullo minoribus. Abdomen globosum,
pubescens, nigrum. Alae fuscae.

31. F. thorace quadrispinoso, capite didymo magno, vtrinque *cephalo-*
que postice mucronato. *Syst. Ent.* 395. 22. *Linn. Syst. tes.*

Nat. 2. 964. 15.

Formica migratoria fuscocastanea, capite didymo ma-
gno vtrinque postice spinoso, thorace quadrispinoso.

Degeer Ins. 3. 604. 5. tab. 31. fig. 11.

Formica magna. Margr. Bras. 252.

Merian. Sur. tab. 18. fig. maiores.

Seb. Mus. 4. tab. 99. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

32. F. thorace sexspinoso, capite didymo maximo. *Syst. 6dens.*
Ent. 395. 23. Linn. Syst. Nat. 2. 964. 14.

Formica rufa capite didymo magno vtrinque postice
spinoso, thorace sexspinoso. *Degeer Ins. 3. 608. 6.*
tab. 31. fig. 14.

Habitat in America meridionali.

33. F. thorace quadrispinoso, capite depresso marginato
vtrinque bispinoso. *Syst. Ent. 395. 24. Linn. Syst.* *atrata.*
Nat. 2. 965. 16.

Formica quadridens atra nitida, capite magno depre-
so marginato vtrinque bispinoso, thorace quadrispi-
noso. *Degeer Ins. 3. 609. 7. tab. 31. fig. 17.*

Tapicai Margr. Bras. 252.

Seb.

Seb. Mus. 4. tab. 99. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

gulosa. 34. F. rufa, abdomine apice nigro primo segmento contracto, mandibulis porrectis. *Syst. Ent.* 394. 25. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

hamata. 35. F. ferruginea, capite maximo pallido, mandibulis porrectis hamatis.

Habitat Caiennae. *Mus. Dom. Teats.*

Media. Caput maximum subrotundum, pallidum, nitidum, basi vtrinque spina parua, conica. Maxillae porrectae, capite longiores, hamatae, acutae, nigrae. Antennae nigrae basi ferrugineae. Corpus ferrugineum thorace inermi petioloque binodoso.

haemato- 36. F. squama petiolari conica acutissima, capite subdymo, mandibulis porrectis. *Syst. Ent.* 395. 26. * *Linn.*

Syst. Nat. 2. 965. 17.

Formica maxillosa alata nigro fusca, pedibus maxillis que porrectis rufis, squama petiolari conica. *Degeer Ins.* 3. 601. 2. tab. 31. fig. 3.

Habitat in America meridionali.

maxillo- 37. F. thorace sexdentato, capite flavescente, mandibulis longitudine capitis. *Syst. Ent.* 396. 27. *

fa. Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

125. M V T I L L A.

occidenta- 1. M. coccinea, abdomine cingulo nigro. *Syst. Ent.* 395. lis. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 1.

Petiv. Mus. 404.

— — *Gazoph.* tab. 13. fig. 10.

— — *Filic.* 404. tab. 11. fig. 4.

Catesb. Carol. 3. p. 15. tab. 15.

Sulz. Ins. tab. 19. fig. 9.

Habitat in America septentrionali.

Aculeus reconditus, punctarius.

antiguensis. 2. M. coccinea, abdominis apice nigro, strigis albis. *Syst. Ent.* 396. 2. *

Habitat in Antigua insula. *Dom. Drury.*

america- 3. M. atra, abdomine maculis quatuor flavescentibus lineisque tribus albis. *Syst. Ent.* 396. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 2.

Sphex

Sphex americana aptera nigra, abdomine maculis rufis quatuor lineisque tribus albis. *Degeer Inf.* 3. 591.
8. tab. 30. fig. 10.

Habitat in America australi.

4. M. nigra, abdomine linea dorsali punctorum albido-formicarium. *Syst. Ent.* 397. 4. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

5. M. atra, abdomine punctis duobus baseos striga interrupta lineolaque postica flavis. *Syst. Ent.* 397. 5. *

Habitat in America. *Dom. Drury.*

6. M. coeruleocephala, abdomine inacula magna aurea. *Syst. aurata.* *Ent.* 397. 6. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

7. M. nigra, thorace rufo, abdominis segmentis margine europaea, albis. *Syst. Ent.* 397. 7. *

Mutilla europaea nigra, abdomine fasciis duabus albis, thorace antice rufo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 4.
Fn. Sv. 1727.

Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 23. 24.

Apis aptera. *Vdm. Diff.* 98. tab. 17.

Habitat in Europae sylvis acerosis.

8. M. nigra, antennis rufis, ano albido. *Syst. Ent.* 397. 8. * *ruficornis.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

9. M. nigra, thorace supra rufo, abdomine coeruleo, fasciis duabus albis. *Syst. Ent.* 397. 9. *atrata.*

Mutilla atrata atra, abdomine fascia alba, thorace im-
maculato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 5.

Habitat in Africa.

Alae fuscescentes.

10. M. nigra, abdomine maculis quatuor albis, thorace rufo. *Syst. Ent.* 398. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 967. 6. *maura.*
Habitat in Europa australiori.

11. M. abdomine basi apiceque nigro, medio rufo, fascia verfico-
alba, punto nigro. *Syst. Ent.* 398. 11. * *verficolor.*

Habitat in America meridionali. *Dom. Drury.*

12. M. glabra nigra, ore, thorace abdomineque subtus ru- *glabratiss.*
fis. *Syst. Ent.* 398. 12. *

Habitat in Oriente. *Prof. Forskahl.*



CLASSIS IV.
A G O N A T A.

126. C A N C E R.

* Thorace laeui lateribus integerrimis.

- ranninus.* 1. **C**• thorace laeui integerrimo oblongo obovato antice truncato dentato. *Syst. Ent.* 400. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1039. 2. *Mus. Lud. Vlr.* 430. *Rumph. Mus. tab.* 7. fig. T. V.
Habitat in mari Indico.
- mutus.* 2. C. thorace laeui integerrimo, margine antice transuerso brunneo. *Syst. Ent.* 400. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1039. 3.
Habitat in mari mediterraneo.
Chelae laeues.
- cordatus.* 3. C. thorace laeui vndato integerrimo, chelis subtus cordatis. *Syst. Ent.* 400. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1039. 4.
Amoen. acad. 6. 414. 97.
Habitat in America meridionali.
- ruricola.* 4. C. thorace laeui integro, pedum primo articulo spinoso, secundo tertioque fasciculato pilosis. *Syst. Ent.* 401. 4.
Cancer ruricola brachyurus, thorace laeui integerrimo antice retuso, pedum articulis ultimis penultimisque vndique spinosis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1040. 11.
Cancer thorace laeui antice bidentato, pedibus depressis, articulis tribus ultimis spinosis, fetis nigris. *Degeer Ins.* 7. 417. 1. tab. 25. fig. 1.
Sloan. Iam. 1. tab. 2.
Fewill. Peruv. 3. p. 237.
Seb. Mus. 3. tab. 30. fig. 4. 5.
Catesb. Carol. 2. tab. 32.
Brown. Iam. 423.
Habitat in America meridionali.

Degit in syluis, quotannis vastissimis agminibus ad littora maris migrans, oua deponendo. Cuniculos fodit. Delectatur fructibus Mancinellae et inde saepe venenatus fertur.

Iuniores articulis pedum tribus ultimis quadrifariam spinosis, at in adulterioribus spinae in fasciculos pilorum nigrorum transeunt.

5. C. thorace orbiculato laeui integerrimo obtuso, cauda corporis amplitudine. *Syst. Ent.* 401. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1039. 6.

Pennant. Brit. Zool. 4. tab. 4. fig. 1.

Habitat in mari mediterraneo.

Corpus fere orbiculatum.

6. C. thorace laeui subcrenato, cauda basi binodi, brachiis globus scabris. *Syst. Ent.* 401. 6. *

Habitat ad littora Malabarica. *Koenig.*

7. C. thorace laeui integerrimo ouato glaberrimo, manibus ancipitibus laeui bus. *Syst. Ent.* 402. 8. *Linn. craniola. Syst. Nat.* 2. 1041. 15. *Mus. Lud. Vlr.* 431.

Petiv. Gazoph. tab. 9. fig. 3.

Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 4. 10.

Rumph. Mus. tab. 10. fig. A. B.

Habitat in mari Asiatico.

8. C. thorace laeui integerrimo subquadrato, margini actiusculo, pedibus compressis. *Syst. Ent.* 402. 9. *Linn. minutus. Syst. Nat.* 2. 1040. 8. *Mus. Ad. Fr.* 1. 8. *It. Westra-goth.* 137. tab. 3. fig. 1.

Penn. Brit. Zool. 4. tab. 1. fig. 2.

Sloan. Iam. 2. tab. 245. fig. 1.

Gronov. Zooph. 962.

Kalm. It. 1. 143.

Bast. subf. 2. 26. tab. 4. fig. 12.

Habitat in Pelago.

9. C. thorace laeui integerrimo subquadrato, tarsis unicus dentatis. *Syst. Ent.* 402. 10. *

Habitat in Oceano boreali.

10. C. glaberrimus, thorace laeui lateribus antice planato, pinnothecae medio noduloso carinato. *Syst. Ent.* 402. 11. *res.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 1040. 9.

Fabr. Spec. Inf.

11

Ionst.

Ionst. exsang. tab. 20. fig. 3.

Hasselqu. It. 450.

Habitat in mari Asiatico intra testas pinnae. *Forstahl.*
Neque enim vita conchae fortasse seruari posset nisi
opera Cancri. *Bell. aquat.* 401.

pinnophy- 11. C. thorace orbiculato inaequali ciliato, pedibus dor-
salibus quatuor. *Syst. Ent.* 402. 12. *Linn. Syst. Nat.*
2. 1039. 5. *Amoen. acad.* 6. 415. 93.
Pinnotheres. *Rumph. Mus.* 25.

Habitat in America intra Chamam Lazarum, cuius pinno-
theres et custos est.

orbiculus. 12. C. thorace orbiculato laeui plano, rostro tricuspidato.
Syst. Ent. 402. 13. *
Habitat in nouâ Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

longicor- 13. C. thorace orbiculato laeui chelis minore, antennis lon-
gissimis. *Syst. Ent.* 403. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 2040. 10.
Penn. Zool. Brit. 4. tab. 1. fig. 3.
Gron. Zooph. 968.

Aet. Heluet. 5. 363. tab. 5. fig. 447.
Bast. subf. 2. 26. tab. 4. fig. 3.
Seb. Mus. 3. 42. tab. 17. fig. 1 — 4.

Habitat in Oceano Europaeo, australi. —

hexapus. 14. C. thorace orbiculato laeui integro, pedibus senis, an-
tennis corpore longioribus. *Syst. Ent.* 403. 15. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 1039. 7.

Cancer thorace laeui orbiculato subdepresso, chelis va-
lidioribus, antennis longissimis, pedibus posticis mi-
nutioribus. *Bast. subf.* 2. 26. tab. 4. fig. 3.

Habitat in Oceano Europaeo.

Vca. 15. C. thorace laeui cordato litera H. impresso, pedibus
subtus barbatis, brachiis muricatis. *Syst. Ent.* 403.
16. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1041. 13.

Vca vna. *Margr. Bras.* 184.

Habitat in Americae paludibus.

** Thorace laeui lateribus inciso.

floridus. 16. C. thorace laeui vndentato maculato, fronte triloba.
Syst. Ent. 403. 17.

Cancer floridus brachyurus, thorace laeui mutico macu-
lato margine crenulato, manibus cristatis. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 1041. 12. *Amoen. acad.* 6. 414. 98. ?

Rumph.

Rumph. Mus. tab. 8. fig. 5.

Habitat in Indiae aquis.

Figura *Rumphii* cum nostro omnino conuenit, at de synonymo *Linnaeano* dubito, quum margo haud crenulatus, nec manus cristatae.

17. C. thorace laeui vnidentato, chela altera maiori, oculis elongatis. *vocans.*

Cancer vocans thorace inermi quadrato, lateribus antice prominulis, chela altera magna. *Syst. Ent.* 401.

7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1041. 14. *Amoen. acad.* 6. 414. 96.

Cancer thorace lato quadrato mutico laeui, chela altera corpore maiori, altera minima. *Degeer Ins.* 7. 430. 4. tab. 26. fig. 12.

Pis. Brasil. 77. tab. 78.

Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 8.

Petiv. Gazoph. tab. 78. fig. 5.

Habitat in Iamaica. *Mus. Dom. Banks.*

Testa media antice truncata utrinque ad receptionem oculorum excauata, marginibus crenulatis, supra laeuis dente anteriori acuto. Chela altera maxima mox laevis, mox scabra digitis elongatis granulatis.

18. C. thorace rotundato vnidentato, oculis porrectis *ceratospina terminatis.* *ceratophtalmus.*

Cancer ceratophtalmus. *Pall. spicil. Zool.* fasc. 9. tab. 5. fig. 7.

Habitat — — — —

Oculi singulares terminantur appendiculo linearie obtusiusculo.

19. C. thorace orbiculato laeui, lateribus vnidentatis, *planatus.* fronte tridentata. *Syst. Ent.* 403. 18. *

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

20. C. thorace laeui, lateribus antice vniispinosis, fronte *rhombo-truncata.* *Syst. Ent.* 404. 19. *Linn. Syst. Nat.* 2. des. 1042. 17.

Barrel. Icon. rar. tab. 1287. fig. 1.

— — — — tab. 1286. fig. 1. 2.

Habitat in mari mediterraneo.

macula- 21. *C. thorace laeui, maculis sanguineis rotundis, lateribus vñidentatis, fronte triloba.* *Syst. Ent.* 404. 20. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1042. 18. *Mus. Lud. Vlr.* 433.

Petiv. Amboin. tab. 1. fig. 8.

Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 12.

Rumph. Mus. tab. 10. fig. 1.

Gron. Zooph. 971.

Habitat in Asiae aquis.

pelagicus. 22. *C. thorace laeui vtrinque vnispinoso antice octodentato, fronte sexdentata, manibus multangulo prismatis.* *Syst. Ent.* 404. 21. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1042. 19. *Mus. Lud. Vlr.* 434.

Cancer thorace lato vtrinque vnispinoso, lateribus vtrinque octo dentatis, fronte dentata, manibus elongatis multangulis, pedibus posticis dilatato foliaceis. *Degeer Inf.* 7. 427. 3. tab. 26. fig. 8.

Cancer manuum articulis omnibus dentatis, extimo heptagono. *Osb. It.* 307.

Rumph. Mus. tab. 7. fig. R.

Gron. Zooph. 956.

Brown. Iam. 421. tab. 41. fig. 2.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 9.

Habitat in Pelagi fuco natante.

haftatus. 23. *C. thorace laeui, lateribus octodentatis, postico maximo, manibus angulatis.* *Syst. Ent.* 404. 22. *

Cancer haftatus brachyurus, thorace rugoso nudo, margine vtrinque octodentato, postico maximo, palmis posticis ouatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1046. 39. ?

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

nucleus. 24. *C. thorace laeui globoso antice vtrinque vñidentato postice rostroque bidentato.* *Syst. Ent.* 404. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1042. 20.

Habitat in mari mediterraneo.

maenas. 25. *C. thorace laeui scuto vtrinque quinquedentato, carpis vñidentatis.* *Syst. Ent.* 405. 24. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1043. 22. *Mus. Lud. Vlr.* 436. *Fn. Sv.* 2026.

Petiv. Amb. tab. 1. fig. 5.

Bast. subf. 2. 19. tab. 2.

Rumph.

Rumph. Mus. tab. 6. fig. O.

Gron. Zooph. 955.

Habitat in oceano Europaeo, Asiatico.

26. C. thorace laeui vtrinque quinquedentato, manibus *depurata*, apice compressis, pedibus posticis ouatis. *Syst. Ent.* tor.

405. 25. *Linn. Syst. Nat. 2. 1043. 23.*

Cancer caninus. Mus. Adolph. Frid. 1. 85.

Cancer latipes. Rond. pise. 565.

Cancer ramipes. Barrel. Icon. 1287. fig. 2. mal.

Planc. conch. 34. tab. 3. fig. 7. mal.

Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 9. bon.

Scopol. carn. 1124.

Habitat in Oceano Europaeo,

27. C. hirsutus, thorace vtrinque dentato, pedibus *dromia*. sticis vnguis geminis. *Syst. Ent. 405. 26. Linn.*

Syst. Nat. 2. 1043. 24. Amoen. acad. 6. 413. 96.

Cancer lanosus. Rumph. Mus. tab. 11. fig. 1.

Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 1. 3.

Habitat in Indiae orientalis profundo,

28. C. thorace laeui vtrinque quinquedentato, manibus *feriatus*. multangulis ouatis, carpis vndentatis. *Syst. Ent.*

405. 27. *Linn. Syst. Nat. 2. 1043. 25. Mus. Lud. Vlr.*

437.

Rumph. Mus. tab. 6. fig. P.

Petiv. Amboin. tab. 1. fig. 6.

Habitat in mari Indico.

29. C. thorace vtrinque obtuse nouemplicato, manibus *pagurus*. apice atris. *Linn. Syst. Nat. 2. 1044. 27. Fn. Sv.*

2028. *Mus. Adolph. Frid. 1. 85.*

Cancer pagurus thorace laeui vtrinque quadridentato, fronte fissa, manibus apice atris. Syst. Ent. 405. 28.

Gron. Zooph. 967.

Bradl. nat. tab. 3. fig. 4.

Rumph. Mus. tab. 11. fig. 4.

Habitat in Oceano Europaeo, Indico.

30. C. thorace subnodoso crenato, angulis posticis dilata- *granula-*

to quinquedentatis, manibus cristatis. *Syst. Ent. 406. tus.*

29. *Linn. Syst. Nat. 2. 1043. 26.*

I i 3

Can-

Cancer chelis crassissimus. *Catesb. Car. 2. tab. 36.*

Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 13.

Habitat in mari mediterraneo.

calappa. 31. C. thorace laeui crenulato, angulis posticis dilatato integerrimis, manibus cristatis. *Syst. Ent. 406. 30.*

Cancer calappa brachyurus, thorace strigis subimbriato gibbo antice trilobo. *Linn. Syst. Nat. 2. 1048.*

52. *Mus. Lud. Vlr. 449.*

Petiv. Gazoph. tab. 75. fig. 11.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 7. 8.

Rumph. Mus. tab. 11. fig. 2. 3.

Habitat in America.

Affinis praecedenti, at duplo maior et anguli dilatati integerrimi.

aeneus. 32. C. thorace rugosissimo obtuso vtrinque quadrilobo.

Syst. Ent. 406. 31. Linn. Syst. Nat. 2. 1048. 54.

Mus. Lud. Vlr. 451.

Habitat in India.

depressus. 33. C. thorace sublaeui vtrinque quadridentato, femori-

bus videntatis, vnguis subtus ferratis. *Syst. Ent. 406. 32. **

Habitat in mari mediterraneo.

grapsus. 34. C. thorace laeui vtrinque tridentato subrugoso, cor-

pore variegato. *Syst. Ent. 406. 33.*

Cancer grapsus brachyurus, thorace strigis lateralibus, fronte retusa. *Linn. Syst. Nat. 2. 1048. 53. Amoen. acad. 4. tab. 3. fig. 10.*

Pagurus maculatus. *Catesb. Carol. 2. tab. 36. fig. 1.*

Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 5.

Gron. Zooph. 966.

Habitat in mari mediterraneo.

*** Thorace supra hirto aut spinoso.

cylindrus. 35. C. thorace bisulcato, lateribus dilatato cylindricis apice spinosis. *Gen. Inf. Mant. 256. **

Habitat in Malabar.

36. C. thorace hirto suborbiculato mutico, manibus ouatis muricatis. *Syst. Ent.* 407. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1044. 28. *Mus. Lud. Vlr.* 438.
Habitat in Oceano Indico.
37. C. thorace hirto rugoso vtrinque dentato, rostro bi-dentato. *Syst. Ent.* 407. 35. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1044. 24.
Planct. conch. 36. tab. 5. fig. 1.
Habitat in mari mediterraneo.
38. C. thorace vndique aculeato, rostro bifido, subtus *nasutus*. dente vnico, supra duobus. *It. Norwag.* d. 20. Iun. *
Habitat in Oceano Norwagico, capt. d. 20. Iun.
39. C. thorace lanato tuberculato, rostro bifido, chelis lae. *Hircus.* uibus.
Habitat in Iamaica. *Mus. Dom. Banks.*
Statura omnino C. aranei, at triplo minor. Thorax ouatus pilis densioribus tectus tuberculisque elevatis ferre spinosis. Rostrum porrectum bifidum laciinis acutis. Chelae laeues, glabrae, brachiorum dorso subdentato. Digihi apice albi. Pedes reliqui octo hirti vngue arcuato, acuto, albo.
Iunior totus lanatus tuberculis oblitteratis.
40. C. thorace hirto ouato tuberculato, rostro bifido, manibus ouatis. *Syst. Ent.* 407. 36. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1044. 30. *Fn. Sv.* 2030. *Mus. Lud. Vlr.* 439.
Ionst. Exsangu. tab. 5. fig. 13.
Habitat in Oceano Europaeo.
41. C. thorace pubescente obcordato, dorso spinis duabus rostratus. erexit, manibus oblongis compressis. *Syst. Ent.* 407. 37. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1045. 31. *Fn. Sv.* 2027.
Habitat in Oceano Europaeo.
42. C. thorace spinis octo, pedibus filiformibus, rostro tribulus. bifido. *Syst. Ent.* 407. 32. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1045. 35.
Habitat in mari mediterraneo.
43. C. thorace aculeato, rostro porrecto bifido cristato, cristatus. pedibus aculeatis. *Syst. Ent.* 407. 33.

Cancer cristatus brachyurus, thorace aculeato, rostro bifido cristato, manibus teretibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1047. 44. *Mus. Lud. Vlr.* 443.
Habitat in Oceano.
Synonyma a *Linnaeo* citata vix hic pertinent.

punctatus. 44. *C. thorace ouato crenato postice tridentato*. *Syst. Ent.* 407. 40. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1045. 36.
Brown. Iam. tab. 42. fig. 3.
Habitat in Asia, America.

cornutus. 45. *C. thorace aculeato, rostro spinis corniformibus barbatis, manibus rotundatis*. *Syst. Ent.* 407. 41. *
Linn. Syst. Nat. 2. 1047. 46. *Mus. Lud. Vlr.* 445.
Habitat in mari mediterraneo.

longirostris. 46. *C. thorace aculeato porrecto adscendente, rostro acuto bifido, pedibus longissimis*. *Syst. Ent.* 408. 42. *
Cancer dodecos brachyurus, thorace pubescente spinis duodecim, rostro bifido. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1046. 38. ?
Habitat in mari mediterranno.
Variat rostro fere longitudine thoracis.

Scorpio. 47. *C. thorace pubescente spinis quatuor erectis, pedibus anticis longissimis*. *It. Norwag.* d. 9. Aug.
Habitat in Oceano Norwagico, capt. d. 9. Aug.
Parvus, statura C. Phalangii.

Phalan- 48. *C. thorace pubescente antice spinis tribus erectis acutis, postice tuberculis obtusis, rostro bifido*. *Syst. Ent.* 408. 43. *
Habitat — — — —

puber. 49. *C. thorace hirto cordato vtrinque quinquedentato, manibus vnidentatis apice nigris*. *Syst. Ent.* 408. 44. *
Cancer puber brachyurus, thorace rugoso villoso vtrinque quinquedentato, palmis posticis ouatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1046. 40.

Habitat in mari mediterraneo.

50. C. thorace aculeato, manibus ventricosis spinosis, digitis penicillato hirsutis. *Syst. Ent.* 408. 45. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 1045. 41. *Fn. Sv.* 2031.

Ionst. Exsangu. tab. 5. fig. 5.

Gron. Zooph. 973.

Habitat in Oceano Norwagico.

51. C. thorace aculeato nodoso, pedibus senis, cauda cariosa. *Cancer horridus.*

Syst. Ent. 409. 46.

Cancer horridus brachyurus, thorace obtuse aculeato, manibus ouatis, cauda cariosa. *Linn. Syst. Nat.* 2.

1047. 43. *Mus. Lud. Vlr.* 442.

Gron. Zooph. 976.

Petiv. Amb. tab. 1. fig. 7.

Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 10.

— — — tab. 22. fig. 1. 2. 3.

Rumph. Mus. tab. 9. fig. 1.

Habitat in Oceano Asiatico.

52. C. thorace nodoso inaequali, rostro plano retuso, pedibus octo nodulosis. *Syst. Ent.* 409. 47. *

Habitat in mari mediterraneo.

53. C. thorace antice nodulo dentato, manibus nodulosis. *Cancer gonagra.*

Habitat in Iamaica insula. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudine variat. Thorax inaequalis antice nodulis plurimis eleuatis, obtusis margineque vtrinque septemdentato. Rostrum omnino nullum, sed testa antice fissa. Chelae articulo primo laeui, secundo tertioque supra valde nodulosis. Digi-
 tati, fusi. Pedes octo compressi, pilosi.

54. C. thorace vndique nodulo crenato, pedibus digito nodulosus, spinoso.

Habitat — — — — *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis. Rostrum omnino nullum, sed testa antice emarginata, supra tota nodis eleuatis obtusissimis testa margineque crenato. Chelae breues manibus nodulosis digito nigro. Reliqui octo breues dorsa pilosi ciliati, digitoque nigro spinis plurimis erectis, validis.

longima- 55. *C. thorace aculeato*, manibus corpore longioribus,
nus. digito patulo pollice curuato. *Syst. Ent.* 409. 48.
Linn. Syst. Nat. 2. 1046. 42.
Rumph. Mus. tab. 8. fig. 2.
Petiv. amb. tab. 2. fig. 15.
Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 12.
 Habitat in Oceano Asiatico.

longipes. 56. *C. thorace aculeato*, manibus ouatis scabris, pedibus
 posterioribus longissimis. *Syst. Ent.* 409. 49. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 1047. 47. *Mus. Lud. Vir.* 446.
Rumph. Mus. tab. 8. fig. 4.
 Habitat in Oceano Indico.

spinifer. 57. *C. thorace postice vniaculeato inaequali*, pedibus se-
 cundi paris longissimis. *Syst. Ent.* 409. 50. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 1047. 48. *Mus. Lud. Vir.* 447.
 Habitat in Oceano Asiatico.

germa- 58. *C. thorace inaequali*, spina altera frontis, altera su-
nus. pra caudam. *Syst. Ent.* 409. 51. *Linn. Syst. Nat.* 2.
 1047. 49.
 Habitat in mari Germanico.
 Chelae laeues.

auritus. 59. *C. thorace antice vtrinque vniispinoso*, dorso canali-
 culato molliusculo. *Syst. Ent.* 410. 52. *
 Habitat in Islandia. *Dr. Koenig.*

127. P A G V R V S.

latro. 1. *P. thorace futuris quadrifido*, cauda simplici, subtus
 ventricosa. *Syst. Ent.* 410. 1.

Cancer latro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1049. 56.

Cancer crumenatus. *Rumph. Mus.* tab. 7. fig. 4.

Bourfries Rochef. ant. 1. c. 21.

Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 1. 2.

Habitat in Indiae orientalis cryptis rupium, terrestris,
 nocturnus, vicitans nucibus Cocos, quas adscendens
 deiicit, dein manibus violenter aperit. Demis in-
 testinis esculentus.

Bernhar- 2. *P. parasiticus*, chelis muricatis, dextra maiore, *Syst.*
dus. *Ent.* 410. 2.

Can-

Cancer Bernhardus. Linn. Syst. Nat. 2. 1049. 57.

Mus. Lud. Vlr. 454. Fn. Sv. 2032.

Astacus Bernhardus cauda molli recurvata, thorace laeui, pedibus chelisque muricatis scabris, dextra maiore. Degeer Inf. 7. 405. 4. tab. 23. fig. 5. 6.

Ionst. ex sangu. tab. 7. fig. 6. 12.

Swammerd. Bibl. Nat. tab. 11. fig. 1. 2.

Bast. subf. 1. 74. tab. 10. fig. 3. 4.

Gron. Zool. 982.

Habitat in Oceano Europaeo intra testas cochlearum, quas vacuas intrat trahitque mutatas prout adolecit.

3. P. parasiticus, chelis laeui bus pubescentibus, sinistra *Diogenes*. maiore. Syst. Ent. 410. 3.

Cancer Diogenes. Linn. Syst. Nat. 2. 1049. 58.

Gron. Zool. 983.

Rumph. Mus. tab. 5. fig. K. L.

Catesb. Carol. 2. tab. 33. fig. 1. 2.

Kaempf. Iap. tab. 13. fig. 7.

Habitat in Oceano Americano, Asiatico intra testas cochlearum.

4. P. parasiticus, chelis scabris subaequalibus, pedibus *Eremita*. sex anterioribus pollicatis. Syst. Ent. 411. 4.

Cancer Eremita. Linn. Syst. Nat. 2. 1049. 59.

Habitat in mari Italico intra tophum suberosum subrotundum apertura transuersali.

Pedes sex, antici porrecti extra tophum.

5. P. parasiticus, chelis muricatis aequalibus, oculorum *oculatus*, pedunculis longitudine thoracis. Syst. Ent. 411. 5. *

Habitat in Murice Brandaris.

6. P. parasiticus, manibus laeui bus trialatis, dextra maiore. *alatus*. Syst. Ent. 411. 6. *

Habitat in Islandiae Bullis.

7. P. parasiticus, chelis scabris, cauda apice callosa vnguiculata. *araneiformis*. Syst. Ent. 411. 7. *

Habitat in fissuris rupium maris Edimburgici, intrans Helices et Turbines.

tubularis. 8. P. parasiticus subcylindricus, testa punctis excavatis.

Syst. Ent. 411. 8.

Habitat intra testas Serpulae maris mediterranei.

caput 9. P. tomentosus obtectus pileo hemisphaerico suberofo.

mortuum. *Syst. Ent.* 411. 9.

Cancer caput mortuum. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1050. 61.

Habitat in mari mediterraneo.

strigosus. 10. P. thorace antrosum rugoso spinis ciliato, rostro acuto septemdentato. *Syst. Ent.* 412. 10.

Cancer strigosus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1052. 10.

Cancer macrourus thorace chelisque angulatis hispidis.

Mus. Adolph. Frid. 87.

Astacus marinus Column. aquat. 8. tab. 6.

Astacus similis pediculo marino. *Ioust. exsang.* tab. 2. fig. 7.

Astacus strigosus thorace depresso rugoso lateraliter aculeato, rostro acuto septemdentato, chelis spino-fissimis, pedibus posticis filiformibus. *Degeer Inf.* 7. 393. 2. tab. 23. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 32. fig. 1.

Barrel. rar. tab. 1288. fig. 1.

Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 19. 20.

Gronov. Zooph. 980.

Act. Heluet. 4. 23. tab. 2. fig. 1. 2.

Habitat in Oceano Europaeo.

rugosus. 11. P. thorace rugoso antice ciliato spinoso, rostro tridente, manibus filiformibus. *Syst. Ent.* 412. 11. *

Habitat in mari mediterraneo.

grega- 12. P. thorace rugoso ciliato, rostro tridentato, palpis *rius.* anticis elongatis. *Syst. Ent.* 412. 12. *

Habitat in Oceano Americano Patagoniam alluente gregarius, vnde mare saepe cruentum videtur. *Mus. Dom. Banks.*

ample- 13. P. thorace laeui, rostro breuissimo emarginato, pedibus intermediis longissimis. *Syst. Ent.* 412. 13. *

Hab. in Oceano Atlantico, Brasiliam alluente, noctu fulgens.

128. S C Y L L A R V S.

1. Sc. antennarum squamis ciliato aculeatis. *Syst. Ent.* 413. *ardus.*
Cancer arctus macrourus, thorace antrosum aculeato,
 fronte diphylla, manibus subadaetyle. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 1053. 75. *Fn. Sv.* 2040.
Ionst. ex sangu. tab. 4. fig. 4. 8. 12.
Sulz. Hist. Inf. tab. 32. fig. 3.
Barrel. Icon. 1288. fig. 2.
Rumph. Mus. tab. 2. fig. 6. *D.*
Brown. Iam. tab. 41. fig. 1.
Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 1.

Habitat in Oceano Europae, Asiae, Africæ, Americae.

2. Sc. antennarum squamis laeuis rotundatis. *australis.*
 Habitat in Oceano australiori. *Mus. Dom. Banks.*
 Specimen nostrum siccatum, male conseruatum. Sta-
 tura praecedentis, at multo angustior. Squamae biar-
 ticulatae, loco antennarum posticarum rotundatae,
 laeues. Thorax inaequalis, at haud spinosus margi-
 ne crenato. Pedes decem vngue simplici, vti in praec-
 edente.

129. A S T A C V S.

1. A. antennis posticis bifidis, thorace laeui, rostro la- *marinus.*
 teribus dentato, basi supra dente duplice. *Syst. Ent.*
 413. 1. *Iter Norw.*
Cancer gammarus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1051. 62. *Fn.*
Sv. 2033.
Iter Wgoth. 174.
Mus. Adolph. Frid. 87.
Bast. subf. 2. 6. tab. 1.

Habitat in Oceano Norwagico frequens.

2. A. antennis posticis bifidis, thorace laetui, rostro late- *fluviati-*
 ribus dentato, basi dente vtrinque unico. *Syst. Ent.* *lis.*
 413. 2.
Cancer Astacus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1051. 63. *Fn. Sv.*
 2034.
Astacus fluviatilis thorace laeui, rostro supra dentato,
 basi vtrinque dente unico, chelis maximis papilloso
 scabris. *Degeer Inf.* 7. 365. 1. tab. 20. fig. 1.

Can-

Cancer macrourus, rostro supra serrato, basi vtrinque dente simplici, thorace integro. *Geoff. Inf.* 2. 666. 1.
Mus. Adolph. Frid. 1. 87.
Gronov. Zooph. 977.
Roef. Inf. 3. tab. 54. fig. 55.
Ionst. Exsangu. tab. 4. fig. 1.
Sulz. Inf. tab. 23. fig. 151.
Habitat in Europae lacubus, fluuiis.

homarus. 3. A. antennis posticis bifidis, thorace antrorsum aculeato, fronte bicorni, manibus adactylis. *Syst. Ent.* 414. 3.
Cancer homarus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1053. 74. *Mus. Lud. Vlr.* 457.
Rumph. Mus. tab. 1. fig. A.
Gronov. Zooph. 981.
Margraf. Bras. 245. tab. 246.
Petiv. amb. tab. 6. fig. 1.
Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 5.
Habitat in mari Asiatico, Americano.
Corpus punctis rotundis albis variegatum. Aculei apice rufi. Antennae anticae aculeatae. Pedes omnes terminantur digito piloso.

carcinus. 4. A. antennis posticis bifidis, thorace laeui, manibus teretiusculis, brachiis hispido aculeatis. *Syst. Ent.* 414. 4.
Cancer carcinus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1051. 64.
Locusta marina. *Rumph. Mus.* tab. 1. fig. B.
Astacus fluuiatilis maior chelis aculeatis. *Sloan. Iam.* 2. 271. tab. 245. fig. 2.
Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 4.
Habitat in Americae fluuiis.

coerule- 5. A. antennis posticis bifidis, coerulescens, thorace laeui, rostro porrecto subulato bidentato. *Syst. Ent.* 414. 5. *
Habitat in Pelago inter Tropicos frequens. *Mus. Dom.* Banks.

fulgens. 6. A. antennis posticis bifidis, rostro breuissimo subulato, pedibus simplicibus. *Syst. Ent.* 415. 6. *
Habitat in Oceano Brasiliam alluente, noctu fulgens.
Mus. Dom. Banks.

7. A. antennis posticis bifidis, corporis segmentis dorso *Homari*.
subspinosis, cauda fasciculata, stylis serratis. *Iter Norwag.* d. 18. Iul. *
Cancer dorso carinato ferrato. *Stroem. Act. Hafn.* x.
pag. 5. tab. 2.
Cancer macrourus articularis, dorso carinato ferrato,
spinis caudae bifidis. *Mill. Zool. Dan.* 197. 2358.
Habitat in Oceano Norwagico.
8. A. antennis posticis bifidis porrectis, rostro subulato, *Haren-*
oculis globosis prominentibus. *It. Norwag.* d. 18. *gum.*
Iul. *
Habitat in Oceano Norwagico copiosissime, Harengum
et Gadorum esca.
Marum articulus primus et secundus pedunculi anten-
narum posticarum apice inferiori vnguiculati, forte
Genitalia.
9. A. antennis posticis bifidis, thorace articulato, pedi- *crafficor-*
bus sexti paris longissimis. *Syst. Ent.* 415. 7. * *nis.*
Habitat in Oceano Americano. *Mus. Dom. Banks.*
10. A. antennis posticis bifidis, thoracis margine bidenta- *histrio.*
to, rostro lanceolato ferrato, corpore variegato.
Syst. Ent. 415. 8. *
Cancer pennaceus macrourus, thorace laeui cylindri-
co, rostro ensiformi, margine superiori ferrato.
Linn. Syst. Nat. 2. 1051. 65. ?
Habitat in Groenlandia.
11. A. antennis posticis bifidis, thorace laeui inermi, che- *malaba-*
la dextra maiori, pedibus filiformibus. *Syst. Ent.* 415. 9. * *ricus.*
Habitat ad littora Malabarica. *Dr. Koenig.*
12. A. antennis posticis bifidis, thorace aculeato, pedibus *Boreas.*
secundi tertiique paris filiformibus.
Cancer Boreas macrourus, thorace carinato aculeato,
manibus laeui bus, pollice subulato incuruo. *Phipps.*
Iter boreal. 190. tab. 12. fig. 1.
Habitat in Oceano boreali. *Mus. Dom. Banks.*
Rostrum breue, depresso, vtrinque canaliculatum,
acutum, subtus dente valido.

carina- 13. *A. antennis posticis bifidis*,¹ *thoracis carina dentata*,
tus. *rostro breui recurvo apice tridentato.*

Habitat — — — *Mus. Dom. Banks.*

Thoracis carina valde eleuata, *quadridentata*, *quae terminat in rostrum breue*, *recuruum*, *apice truncatum*, *tridentatum*. *Margo thoracis anticus vni-*
dentatus et spina incumbens, *acuta vtrinque fere in medio thoracis*. *Abdomen carinatum carina ante-*
ce posticeque spinosa. *Cauda foliolis quinque in-*
termedia acutiore.

groenlan- 14. *A. antennis posticis bifidis*, *thorace margine antico*
dicus. *rostroque dentatis*, *palpis apice spinosis*, *corpore*
fusco. *Syst. Ent. 416. 10.* *

Habitat in mari Groenlandico.

varius. 15. *A. antennis posticis bifidis*, *thoracis margine vniiden-*
tato, *rostro vtrinque ferrato*, *corpore variegato*.
Iter Norveg. d. 4. Aug.

Habitat in Oceano Norwagico capt. d. 4. Aug.

emeritus. 16. *A. antennis* — — — *manibus nullis*, *pedibus vtrin-*
que quinque natatoriis. *Syst. Ent. 416. 11.*

Cancer emeritus. *Linn. Syst. Nat. 2. 1055. 79.*

Emerita Gron. Zooph. 1000. tab. 17. fig. 8. 9.

Pet. pterigr. tab. 20. fig. 9.

Habitat in mari Indico.

Specimina mea imperfecta, *adeoque de genere dubius*
haereo.

norwagi- 17. *A. antennis posticis trifidis*, *thorace antrorsum acu-*
cus. *leato*, *manibus prismaticis*, *angulis spinosis*. *Syst.*
Ent. 416. 12..

Cancer Norwagicus. *Linn. Syst. Nat. 2. 1053. 73. Fn.*
Sv. 2039.

Mus. Lud. Vlr. 456. Mus. Ad. Frid. 1. 88.

Astacus norwagicus *thorace conuexo*, *capite aculeato*,
chelis prismaticis elongatis, *seriebus quaternis spi-*
nosis. *Degeer Ins. 7. 398. 3. tab. 24. fig. 1.*

Gron. Zooph. 979.

Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 3.

Habitat in mari Norwagico.

Varie.

Varietatem duplo minorem e mari mediterraneo accepimus.

8. A. antennis posticis trifidis, thorace laeui, rostro supra ferrato, subtus tridentato, thoracis margine quinquedentato. *Syst. Ent.* 416. 13. *squilla.*

Cancer squilla macrourus, thorace laeui, rostro supra ferrato, subtus tridentato, manuum digitis aequalibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1051. 66. *Fn. Sv.* 2037.

Sulz. Hist. Inf. tab. 32. fig. 4.

Klein dub. 35. fig. A.

Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 9. 10.

Bast. subf. 2. 30. fig. 5.

Gron. Zooph. 986.

Habitat in Oceano Europaeo, mari Balthico frequens.

Variat rosto recto et incurvo.

9. A. antennis posticis trifidis, thorace laeui, rostro porrecto supra ferrato, subtus laeui, digitis elongatis filiformibus. *locusta.*

Habitat — — — — *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at minor. Rostrum elongatum, supra ferratum, subtus laeue. Thorax laeuis margine vtrinque vnidentato. Pedes antici elongati, filiformes. Manus ouatae, breues digitis elongatis, linearibus, acutis.

0. A. antennis posticis trifidis, thorace laeui, rostro breui integerrimo, manuum pollice longiori. *crangon.*

Syst. Ent. 417. 14.

Cancer Crangon. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1052. 67. *Fn. Sv.* 2038.

Squilla marina bataua. *Bast. subf.* 2. 27. tab. 3. fig. 1-4.

Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 8.

Roef. Inf. 3. tab. 63. fig. 1. 2.

Habitat in mari Balthico.

1. A. antennis posticis trifidis, thorace spinoso, pedibus quatuor anticis filiformibus. *Syst. Ent.* 417. 15. * *tettigonus.*

Habitat in Islandia. *Dr. Koenig.*

Affinis videtur A. Boreae.

Varietas minor carina thoracis tridentata, vix distincta.

Fabr. Spec. Inf.

Kk

130. *Squil-*

130. S Q V I L L A.

Mantis. 1. *S. manibus adactylis compressis falcatis ferrato dentatis.*

Astacus Mantis. *Syst. Ent.* 417. 16.

Squilla Mantis corpore elongato, thorace angulato, cauda lata depressa spinosa, pedibus anticis chelatis dentatis. *Degeer Ins.* 7. 533. 5. tab. 34. fig. 1.

Cancer Mantis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1054. 76. *Fn. Sv.*

2635. *Mus. Adolph. Frid.* 1. 86.

Sulz. Hist. Ins. tab. 32. fig. 2.

Cancer arenarius. *Rumph. Mus.* tab. 3. fig. 2.

Tamaru guacu. *Margr. Bras.* 186. tab. 187.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 2. 3.

Gron. Zooph. 984.

Habitat in mari Asiatico, Indico, mediterraneo. Italis esculentus.

Genus omnino distinctum. Os mandibulis palpisque absque maxillis. Palpi sex inaequales. Anteriores laterales, elongati, compressi, arcuati, filiformes, quinquearticulati, articulo secundo longissimo, ultimo breuissimo, rotundato, ciliato. Medii breues, lati, compressi, os obtegentes, quadriarticulati, articulis subaequalibus; ultimo acutiusculo, ciliato. Posteriores breues, filiformes, triarticulati, articulis subaequalibus, compressis, mandibulae dorso adhaerentes. Mandibula crassa, cornea, apice compressa, concava, dentata processu lateralí elongato, subulato, lateribus dentatis. Labium duplex. Exterius breve, corneum, bifidum, laciniis concavis, fissis, laminis aequalibus, exteriore subulata, acutissima, interiori apice latiori, truncata, ciliata, interius breve, subcorneum, bifidum laciniis distantibus, quadratis, angulatis, obtusis. Clypeus rotundatus, concavus, forniciatus, integer. Antennae quatuor, subaequales. Anteriores pedunculatae, setaceae, multiarticulatae; articulis breuissimis, pedunculo triarticulato, extus lamina ouata ciliata basi articulata suffulta. Posteriores pedunculatae pedunculo quadriarticulato, setaceae multiarticulatae trifidae.

Scylla- 2. *S. manibus adactylis ventricosis rectis angulatis introrsum tridentatis.*

Asta-

Astacus scyllarus. Syst. Ent. 417. 17.

*Cancer scyllarus. Linn. Syst. Nat. 2. 1054. 77. Mus.
Lud. Vlr. 457.*

Cancer mirabilis. Linn. Mus. Adolph. Frid. 1. 86.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 6.

Habitat in mari Asiatico.

S. manibus adactylis subulatis basi nodosis rufis. *chiragra.*

Squilla arenaria marina Rumph. Mus. tab. 3. sig. F.

Habitat in Oceano Australi. *Mus. Dom. Banks.* Manibus acutissimis vulnerans.

Statura omnino S. Mantis, at triplo minor. Antennae aequales pedunculatae posticis trifidis. Thorax planus, laeuis, bisulcatus lamina marginis anterioris mobili tridentata, dente anteriori porrecto acutissimo. Abdomen segmentis vndecim, rotundatis laeubus, decimo lineis sex eleuatis spinosis ultimo lineis eleuatis spinosis margineque postico spinis serrato. Cauda sub decimo segmento inserta foliolis vtrinque tribus exteriore lineato, margineque exteriori acutissime serrato, interiori rotundato ciliato, intermedio depresso, apice late bifido laciniis acutissimis, interiori ouato ciliato. Pedes 14 anteriores duo femoribus incrassatis, subtus antice canaliculatis. Tibiae breues, compressae supra canaliculatae, apice subincrassatae coeruleae. Manus basi exteriori nodo rufo, subulatae, acutissimae. Pedes sex sequentes approximati articulo ultimo compresso acute vnguiculato. Pedes reliqui filiformes tibiis lamina cylindrica, ciliata suffulti. Natorii breues, compressi, rotundati, bifidi.

S. thorace laeui carinato, angulis subulatis, manibus *vitreus.* falcato subulatis integris.

*Astacus vitreus. Syst. Ent. 417. 18. **

Habitat in Oceano Atlandico. *Mus. Dom. Banks.*

131. G A M M A R V S.

G. manibus adactylis, pedibus quatuordecim, femoribus posticis compresso dilatatis. *ampulla.*

Cancer Ampulla macrourus articularis, corpore ouali, pedibus quatuordecim simplicibus, laminis fe-

morum postici paris ouato subrotundis. *Phips Iter Bor.* 191. tab. 12. fig. 3.

Habitat in Oceano boreali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum in hoc genere, ampullaceum, fere album. Rostrum breue, incuruum, acutiusculum. Cauda foliolis sex articulo vltimo bifido, laciinis acutis.

nugax. 2. *G. manibus adactylis, pedibus quatuordecim, femoribus sex posticis compresso dilatatis.*

Cancer nugax macrourus articularis pedibus quatuordecim simplicibus laminis femorum sex posteriorum dilatatis subrotundo cordatis. Phips Iter. Bor. 192. tab. 12. fig. 2.

Habitat in Oceano boreali. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae quatuor posterioribus feta minori suffultis.

cancellus. 3. *G. manibus quatuor monodactylis, pedibus sedecim.*

Oniscus cancellus. Pall. Spicil. Zool. fasc. 9. 53. tab. 3. fig. 18.

Habitat in Sibiriae fluuiis.

Maior *G. Locusta.* Antennae anticae incuruae.

longicornis. 4. *G. manibus adactylis, antennis corpore longioribus, cauda obtusa. Iter Norw. d. 4. Aug. **

Cancer grossipes. Linn. Syst. Nat. 2. 1055. 80.

Astacus muticus, pede antico subulato edentulo longissimo crassissimo. Gron. Zooph. 989. tab. 17. fig. 7.

Oniscus volutator. Pallas Spicil. Zool. fasc. 9. 59. tab. 4. fig. 9.

Habitat in Europae Oceano.

locusta. 5. *G. manibus quatuor adactylis, pedibus quatuordecim, femoribus simplicibus. Syst. Ent. 418. 1.*

Cancer locusta. Linn. Syst. Nat. 2. 1055. 82. Fn. Sv. 2042.

Oniscus locusta. Pall. Spicil. Zool. 9. 56. tab. 4. fig. 7. Sulz. Inf. tab. 23. fig. 152.

Frisch. Inf. 7. tab. 18.

Roef. Inf. 3. tab. 62.

Klein miss. 5. tab. 6. fig. A. B. C.

Habitat sub Europae maritimis frequentissimus; dorso innatans, etiam in fontibus et fossis.

Conf.

Conf. Oniscus gammarellus. Pall. Spicil. Zool. fasc.
9. 57. tab. 4. fig. 8.

6. G. manibus quatuor adactylis, pedibus decem. *Syst. pulox.*
Ent. 418. 2.

Squilla pulox aquatica, corpore compresso, pedibus
quatuor anticis chelatis, cauda setis sex bifurcatis ter-
minata. *Degeer Inf. 7. 525. 4. tab. 33. fig. 1. 2.*

Pulex fluviatilis. Raj. Inf. 44.

Pulex marinus. Bast. subf. 2. 31. tab. 3. fig. 7.
Gronov. Zooph. 990.

Habitat ad Oceani littora frequentissimus, saliens, pisci-
bus infestus, in branchiis vlcera caussans.

7. G. manibus adactylis, rostro incurvo subulato, thora- *corniger.*
cis lateribus cornu dupli. *Iter Norwag. d. 20.*
Aug. *

Habitat in Oceano Norwagico, capt. d. 20. Aug.

8. G. manibus quatuor monodactylis, pedibus deceim. *linearis.*
Syst. Ent. 419. 3.

Cancer linearis. Linn. *Syst. Nat. 2. 1056. 83.*

Oniscus scolopendroides. Pall. Spicil. Zool. fasc. 9.
tab. 4. fig. 15.

Mart. Spizb. tab. P. fig. I.

Bast. subf. 1. 32. tab. 4. fig. 2.

Habitat in Oceano Islandico. *Dr. Koenig*, in Insula
terra noua. *Mus. Dom. Banks.*

Cancer atomos. Linn. *Syst. Nat. 2. 1056. 84.* vix dif-
fert.

9. G. pedibus viginti patentibus, cauda subulata. *Syst. Ent. salinus.*
419. 4.

Cancer salinus. Linn. *Syst. Nat. 2. 1056. 86.*

Maty diar. brit. 1756.

Habitat in Angliae salinis Limingtonianis.

Duas video varietates, alteram oculis prominulis, glo-
bosis, atris ouarioque vtrinque ouato; alteram coe-
cutientem pedibus anticis porrectis chelatis. An po-
tius Monoculus?

stagnalis. 10. G. manibus adactylis, pedibus patentibus, cauda cylindrica bifida. *Syst. Ent.* 419. 5.

Cancer stagnalis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1056. 87. *Fn. Sv.* 2043.

Habitat in Europae aquis stagnantibus.

esca. 11. G. manibus adactylis, cauda articulata subulata apice fissa. *Iter Norwag.* d. 4. Aug. *

Habitat in Oceano Norwagico. Harengum cibus gratifimus.

Medusa- 12. G. manibus quatuor monodactylis, capite obtusissimo. *Iter Norwag.* d. 8. Aug.

Pulex cancriformis. *Stroem. Sundm.* 118. tab. I. fig. 12. 13.

Cancer Medusarum antennis breuissimis, corpore latiori. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 2355.

Habitat sub Medusis Oceani Norwagici.

CLASSIS V.

V N O G A T A.

132. LIBELLULA.

1. L. alis posticis basi omnibusque medio antico macula nigricante, abdomine depresso tomentoso. *Syst. ta.*
Ent. 420. 1.

Libellula 4maculata alis posticis basi omnibusque medio antico macula nigricante. *Linn. Syst. Nat. 2. 901. 1.*
Fn. Sv. 1459.

Libellula alis macula duplice marginali. *Geoff. Inf. 2. 224. 6.*

Libellula maxima, abdomine breuiori latiorique flavo.
Raj. Inf. 49. 4.

Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 1. 2.

Habitat in Europae aquosis.

2. L. alis omnibus basi nigricantibus, abdomine depresso *depressa* lateribus flauicante. *Syst. Ent. 420. 2.*

Libellula depressa alis omnibus basi nigricantibus, thorace lineis duabus flavis, abdomine lanceolato lateribus flavescente. *Linn. Syst. Nat. 2. 902. 5. Fn. Sv. 1413.*

Libellula thorace viridi nitido, lineis flavis, alis albis, abdomine nigro coerulecente. *Geoff. Inf. 2. 226. 9.*

Libellula maxima, abdomine breuiore latioreque coeruleo. *Raj. Inf. 49. 5.*

Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 1.

Kk 4

Roes.

*Roes. Inf. 2. aqu. tab. 6. fig. 4.
tab. 7. fig. 3.*

Edw. Av. tab. 333.

Habitat ad Europae aquas.

Variat colore. Mās abdomine coerulecente maculis
lateralibus baseos flauis, femina abdomine fuscō
lateribus flauis.

bifascia- 3. L. alis hyalinis, macula baseos fasciisque duabus fuscis.
ta. *Syst. Ent. 421. 3. **

Libellula maculata capite globoso, alis albis, media
macula, basi fascia longitudinali fuscis. *Degeer Inf.*
3. 556. 2. tab. 26. fig. 2.

Libellula pulchella. *Drury Inf. 1. tab. 48. fig. 5.*
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

4puncta- 4. L. alis albis, posticis basi nigris linea flava, omnibus
ta. puncto atro, abdomine rotundato.

Habitat in America. *Dom. Blankburn.*

Statura L. bifasciatae. Os nigrum labii lateribus flauis.
Frons vesiculosus, viridis. Thorax tomentosus obscur-
re virescens. Abdomen rotundatum basi virescens
apice nigricans. Alae omnes albae puncto atro in
medio marginis crassioris et stigmate oblongo ordi-
nario ad apicem. Posticae basi atrae flavo tenuissime
reticulatae et linea flava lata versus marginem anti-
cum.

flaveola. 5. L. alis basi luteis. *Syst. Ent. 421. 4. Linn. Syst. Nat. 2.*
901. 2. Fn. Sv. 1460.

Libellula alis albis basi luteis, abdomine lutescente.
Geoff. Inf. 2. 225. 7.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 1.
Habitat in Europa ad aquas.

Variat rarius alis absque macula lutea.

stigmatis- 6. L. flavescentes, alis macula apiceque fuscis, stigmate mu-
xans. *Syst. Ent. 421. 5. **

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

7. L. flauescens, alis anticis apice, posticis margine oculata.
aqueis, stigmate nuceo. *Syst. Ent.* 421. 6. ⁸
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
8. L. alis flauo fuscoque variis apice albis, posticis macula *indica*.
baseos cyanea.
Libellula Arria. Drury Ins. 2. tab. 46. fig. 1.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Corpus fuscum. Alae anticae basi flauae macula fasciaque media fuscis et pone hanc ala aqua stigmate ordinario nigro. Posticae fere totae flauae macula baseos cyanea, in medio fascia sinuata, quae a medio marginis crassioris ad marginem tenuiorem et inde ad angulum ani extenditur. Versus apicem macula fusca puneto magno flauo. Apex alae flauus.
9. L. alis albis, fronte elevata vesiculoso thoraceque fla- *vesiculoso*.
uis immaculatis. *Syst. Ent.* 421. 7. *
Habitat in America.
10. L. alis tantum posticis basi nigricantibus, corpore te- *rubicun-*
staceo. *Syst. Ent.* 422. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 902. 4. da.
Fn. Sv. 1462.
Roef. Ins. 2. *agu.* 2. tab. 7. fig. 4.
Raj. Ins. 50. 8.
Habitat in Europa ad aquas.
11. L. alis basi flauescens, corpore obscure ferrugineo. *ferrugi-*
nata. Habitat ad Cap. Bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus totum obscure ferrugineum. Alae albidae re-
ticulatae basi flauescentes apiceque stigmate ordina-
rio fuscō. Pedes valde ciliati.
12. L. thorace flauo, striis octo nigris. *Syst. Ent.* 422. 9. *vulgatiss.*
Linn. Syst. Nat. 2. 502. 6. *Fn. Sv.* 1464. *sima.*
Libellula lateribus flavis, alis albis. *Geoff. Ins.* 2. 227.
11.
Roef. Ins. 2. *agu.* 2. tab. 5. fig. 3
Habitat in Europa ad aquas.

obscura. 13. L. alis totis ferrugineis, corpore obscuro. *Syst. Ent.*

422. 10. *

Habitat in America. *Dom. Lewin.*

vulgata. 14. L. alis hyalinis immaculatis, abdomine cylindrico rufo. *Syst. Ent.* 422. 11.

Libellula vulgata alis hyalinis, corpore griseo, cauda simplici. *Linn. Syst. Nat.* 2. 901. 3. *Fn. Sv.* 1461.

Roef. Inf. 2. *aqu.* 2. *tab.* 8.

Habitat ad Europae aquas.

cancella-ta. 15. L. alis basi immaculatis, abdomine, dorso lateribus que interrupte luteis. *Syst. Ent.* 422. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 902. 7. *Fn. Sv.* 1465.

Habitat ad Europae aquas.

paede-montana. 16. L. alis planis cinereis, fascia apicis fusca.

Libellula Harpedone. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 24. fig. 1. *

Habitat in agro Pedemontano. *D. Allioni.*

Parua. Corpus obscure flauescens.

fasciata. 17. L. alis planis fuscis, striga alba. *Syst. Ent.* 422. 13.

Libellula fasciata alis planis fuscis, fascia linearis alba.

Linn. Syst. Nat. 2. 903. 12.

Libellula violacea capite globoso, alis violaceo fuscis, fascia transversali linearis alba. *Degeer Inf.* 3. 559. 6. tab. 26. fig. 7.

Edw. Av. 174. *tab.* 174.

Habitat in India ad aquas.

vnibrata. 18. L. alis planis atris, fascia alba. *Syst. Ent.* 422. 14. *Linn.*

Syst. Nat. 2. 903. 13.

Libellula unifasciata capite globoso, alis albis, fascia

transversali fusca. *Degeer Inf.* 3. 557. 3. tab. 26. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

dimidia-ta. 19. L. alis planis a basi ad medium nigris. *Syst. Ent.* 422.

15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 903. 14.

Libellula marginata capite globoso, alis dimidiato fuscis albisque fusco cinctis. *Degeer Inf.* 3. 558. 5. tab. 26. fig. 6.

Seb.

Seb. Mus. 4. tab. 78. fig. 7. 8.
tab. 86. fig. 19.

Habitat in America.

20. *L. alis diimidato nigris, fascia media niuea.* *equestris.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Parua. Corpus fuscum linea dorsali flava. Alae omnes
a basi ad medium nigrae, tunc fascia niuea apice
aqueae stigmate ordinario fusco.

21. *L. alis anticis testaceo obsoletis, posticis viridibus, chinensis.*

apice fuscis. *Syst. Ent.* 423. 16. *Linn. Syst. Nat.* 2.

904. 15.

Edw. Av. 112. tab. 112.

Habitat in China.

22. *L. alis planis albis, maculis tribus atris tribusque ci- vericolor:*

nereis. *Syst. Ent.* 423. 17.

Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*

23. *L. alis purpurascensibus, fascia alba, anticis apice american-*

albis, posticis linea baseos alba. *Syst. Ent.* 423. 18. *na.*

Linn. Syst. Nat. 2. 904. 16.

Habitat in India.

Corpus viride.

24. *L. alis nigris, anticis macula apicis, posticis margine marginata.*

albis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Frons cyanea. Oculi magni fusci flavo pun-
ctati. Thorax niger immaculatus. Abdomine fuscum
cum basi albidum. Alae omnes nigrae, nitidae,
anticae macula magna apicis alba, posticae margi-
ne toto tenuiori albo. Pedes nigri.

25. *L. alis albis, corpore ferrugineo, ore punto vtrinque ferrugi-*

nea. *Syst. Ent.* 423. 19. *

Habitat in America.

26. *L.*

- tomento-* 26. *L. alis albis, corpore tomentoso fusco viridique va-*
sa. riegato. *Syst. Ent.* 423. 20. *
- Habitat in America.*
- aenea.* 27. *L. alis hyalinis, thorace viridi aeneo.* *Syst. Ent.* 423.
 21. *Linn Syst. Nat.* 2. 902. 8. *Fn. Sv.* 1466.
Libellula viridi inaurata, alis pallidis, pedibus nigris.
Geoff. Inf. 2. 226. 10.
Libellula viridi aurata, capite rotundato, pedibus ni-
gris, abdominis medio inflato. *Degeer Inf.* 2. 2. 52.
tab. 19. fig. 8.
Schaeff. Icon. tab. 113. fig. 4.
Roeß. Inf. 2. aqu. tab. 182. f. 1. 2. tab. 5. fig. 2.
Raj. Inf. 49. 5.
Habitat ad Europae aquas.
- cyanea.* 28. *L. alis albis, stigmate nino terminato, corpore cya-*
neo. *Syst. Ent.* 424. 22. *
- Habitat in America. Dom. Lewin.*
- variega-* 29. *L. alis flauo fuscoque variis apice albis stigmate al-*
ta. *Libellula Lucia.* *Drury Inf.* 2. tab. 45. fig. 1.
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. Dom. Banks.
Parua. Caput obscure flavescentia. Thorax obscurus
lineis duabus sub alis scutelloque sulphureis. Ab-
domen sulphureum striis tribus nigris, lateralibus
latrioribus, intermedia basi attenuata. Alae omnes
basi flauo fuscoque variae apice stigmate ordinario
albo nigro terminato. Pedes nigri femoribus basi
flavescentibus.
- carolina.* 30. *L. alis albis, posticis basi dentato ferrugineis, thora-*
ce fusco. *Syst. Ent.* 424. 23.
Libellula carolina alis patentibus hyalinis, posticis basi
tota late ferruginea. *Linn. Syst. Nat.* 2. 504. 17. ?
Amoen. acad. 6. 411. 85. ?
Libellula chinensis capite globoso, alis posticis basi
macula magna fusca flauo cineta venisque flavis.
Degeer Inf. 3. 556. 1. tab. 26. fig. 1.
Libellula carolina. *Drury Inf.* 1. tab. 48. fig. 1.
Habitat in America.

1. L. alis patentibus albidis fusco vndique maculatis *capensis*.
punctatisque. *Syst. Ent.* 424. 24. *Linn. Syst. Nat.*
2. 904. 19.

Seb. Mus. 4. tab. 86. fig. 17.

Habitat ad Cap. bon. sp.

133. A E S H N A.

2. A. thorace nigro, characteribus variis flauescentibus, *forcipata*.
cauda vnguiculata. *Syst. Ent.* 424. 1.

Libellula forcipata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 903. 11. *Fn. Sv.*
1469.

Libellula nigra capite rotundato, thorace segmentisque
aliquot abdominis viridi inaculatis. *Degeer Inf.* 2.
2. 50.

Libellula thorace luteo virescente lineis nigris, abdo-
mine nigricante, characteribus flauis. *Geoff. Inf.* 2.
228. 13.

Schaeff. Icon. tab. 160. fig. 1.

— — — tab. 186. fig. 1.

Petiv. Mus. 84. tab. 10. fig. 4.

Reaum. Inf. 4. tab. 10. fig. 4.

— — 6. tab. 35. fig. 5.

Habitat in Europa.

2. A. thorace lineis quatuor flauis, corpore variegato. *grandis*.
Syst. Ent. 424. 2.

Libellula grandis alis glaucescentibus, thoracis lineis
quatuor flauis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 903. 9. *Fn. Sv.*
1467.

Libellula fulua, alis flauescentibus, thoracis lateribus
lineis duabus flauis, fronte flauescente, cauda di-
phylla. *Geoff. Inf.* 2. 227. 12.

Libellula fusca, capite rotundato, thorace lineolis qua-
tuor transuersis luteis, alis flauicantibus, abdomen
cylindrico. *Degeer Inf.* 2. 2. 45. tab. 20. fig. 6.

Libel-

Libellula maxima vulgatissima, alis argenteis. *Raj. Inf.*

48. I.

Sulz. Inf. tab. 17. fig. 101.

Att. nidros. 3. 412. tab. 6. fig. 9.

Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 3.

Roef. Inf. 2. aqu. 2. tab. 4. fig. 14.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 4.

Habitat in Europa ad aquas.

Colores corporis pulcre variegati vita pereunt.

variega- 3. A. thorace lineis vtrinque duabus flauis, alis basi ma-
ta. *Syst. Ent. 425. 3. **

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

clauata. 4. A. abdomine clauato basi gibbo, corpore fusco viridi-
que variegato. *Syst. Ent. 425. 4. **

Habitat in China. *Dom. Drury.*

134. A G R I O N.

virgo. 1. A. alis erectis coloratis. *Syst. Ent. 425. 1.*

Libellula virgo. *Linn. Syst. Nat. 2. 904. 20. Fn. Sv.*
1470.

2. *Libellula corpore viridi coeruleo nitido, alis medio*
coerulecentibus basi et apice albis, margine immacu-
lato. *Geoff. Inf. 2. 221. 1.*

Roef. Inf. 2. aqu. 2. tab. 9. fig. 7.

Raj. Inf. 50. n. II.

Schaeff. Elem. tab. 78. fig. 1.

3. *Libellula corpore sericeo nitido, alis viridi coeru-*
lecentibus apice fuscis margine immaculatis. *Linn.*
Fn. Sv. 1. 757.

Raj. Inf. 50. n. 10.

Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 7.

Leuwenh. arc. 19. tab. 19.

y. Libel-

γ. *Libellula* viridi sericea, alis subfuscis, puncto marginali albo. *Geoff. Inf. 2. 142. 2. Fn. Sv. 1. 758.*

Roef. Inf. 2. aqu. 2. tab. 9. fig. 6.

Raj. Inf. 51. n. 12.

δ. *Libellula* corpore sericeo nitido, alis inaurato fuscis macula nigra. *Linn. Fn. Sv. 1. 759.*

Mouff. Inf. 68. fig. 1. 3.

Roef. Inf. 2. aqu. 2. tab. 9. fig. 5.

Raj. Inf. 50. n. 9.

Habitat ad Europae fluuios frequens.

A. alis erectis hyalinis. *Syst. Ent. 426. 2. puella.*

Libellula puella. Linn. Syst. Nat. 2. 905. 21. Fn. Sv. 1471.

ε. *Libellula* corpore coeruleo cinereoque alterno, alis puncto marginali nigro. *Geoff. Inf. 2. 222. 3.*

Raj. Inf. 51. n. 15.

Reaum. Inf. 6. tab. 40.

Roef. Inf. 2. aqu. 2. tab. 10. fig. 3. 4.

Sulz. Inf. tab. 17. fig. 102.

Schaeff. Icon. tab. 120. fig. 4. 5. 6.

Ϛ. *Libellula* corpore infra coeruleo viridi, supra fuso, thorace fasciis fuscis coerulescentibusque alternis, puncto alarum marginali nigro. *Geoff. Inf. 2. 223. 4.*

Roef. Inf. 2. aqu. 2. tab. 11. fig. 7.

γ. *Libellula* corpore viridi pallide incarnato, thorace fasciis tribus longitudinalibus nigris, alis puncto marginali fuso. *Geoff. Inf. 2. 224. 5.*

Libellula obscure viridis nitida, capite latiore, alis hyalinis, oculis viridibus. Degéer Inf. 2. 2. 60.

Habitat in pratis Europae paludosis, vicitans rapina muscarum.

Varietates harum specierum innumerae, at copula iunguntur, ideoque haud distinctae.

Aliam

Aliam adhuc vidimus tibiis quatuor posticis albo membranaceis, ciliatis, at vix distincta videtur.

ciliata. 3. A. viridi aenea, abdomine fusco, pedibus ciliatis nigris.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentium. Caput aeneum nitidum oculis magnis prominulis fuscis. Thorax obscure aeneus. Alae erectae, obscurae macula marginali ordinaria. Abdomen cylindricum, fuscum. Pedes valde ciliati, nigri.

nobilita- 4. A. alis erectis, posticis supra viridi sericeis apice atris.
ta. *Gen. Inf. Mant.* 248. *

Habitat in America meridionali. *Dom. Spengler.*

linearis. 5. A. alis reticulatis, abdomine longissimo. *Gen. Inf. Mant.* 249. *

Libellula Lucretia. *Drury Inf.* 2. tab. 48. fig. 1.
Sulz. Hist. Inf. tab. 24. fig. 4.

Habitat in India. *D. Fothergill.*

Stigma alarum mox flauescens, mox nigrum.

135. I V L V S.

ouatus. 1. I. pedibus vtrinque 20. *Syst. Ent.* 427. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1064. 1. *Amoen. acad.* 4. 253. 36. tab. 3. fig. 4.

Oniscus. *Gron. Zooph.* 995. tab. 17. fig. 4. 5.

Habitat in Oceano Europaeo.

varius. 2. I. pedibus vtrinque 78, segmentis basi nigris apice albis.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Medius.

Medius. Caput nigrum fascia media alba. Segmenta corporis albida, basi nigra. Margo tenuissime ferrugineus. Pedes nigri.

*I. pedibus vtrinque 80. Syst. Ent. 427. 2. Linn. Syst. crassus.
Nat. 2. 1065. 2. Amoen. acad. 4. 253. 35.*

Habitat in Asia.

Corpus pallescens vtrinque linea e punctis minutissimis nigris. Cauda acuta.

*I. pedibus vtrinque 100. Syst. Ent. 427. 3. Linn. Syst. terrestris.
Nat. 2. 1065. 3. Fn. Sv. 2066. Geoff. Inf. 2. 679. 1.*

Iulus fasciatus nigro fuscus, lineis binis longitudinalibus rufis, pedibus vtrinque 100. *Degeer Inf. 7. 578.
2. tab. 36. fig. 9. 10.*

Iulus quartus glaber. Raj. Inf. 46. 4.

Sulz. Inf. tab. 24. fig. 156.

— *Hift. Inf. tab. 30. fig. 15.*

Aldrov. Inf. 636. fig. 4.

Frisch. Inf. 2. tab. 8. fig. 3.

Ionst. Inf. tab. 23.

Habitat in Europae nemoribus.

Pedes 176. s. 88 paria numerat *Rajus*.

*I. pedibus vtrinque 30, corpore planiusculo. Syst. Ent. complanatus.
427. 4.*

Iulus complanatus pedibus vtrinque 30, corpore planiusculo, antennis clauatis. *Linn. Syst. Nat. 2. 1065.
4. Fn. Sv. 2068.*

Iulus complanatus fuscus, pedibus vtrinque 31. segmentis corporis clypeolis planiusculis marginatis. *Degeer Inf. 7. 586. 3. tab. 36. fig. 23.*

Scolopendra fusca, pedibus vtrinque triginta. *Geoff.
Inf. 2. 675. 3.*

Scolopendra iulacea. Scopol. carn. 1150.

Fabr. Spec. Inf.

L 1

Iulus

Iulus scolopendricus. Pod. Inf. 127.

Habitat in Europa, in Anglia frequens.

tridentata. 6. I. pedibus vtrinque 36, ano tridentato. Syst. Ent. 427. 5. *

Habitat in America. Dom. Drury.

sabulosus. 7. I. pedibus vtrinque 120. Syst. Ent. 428. 6. Linn. Syst. Nat. 2. 1065. 5. Fn. Sv. 2067. Geoff. Inf. 2. 679. 2.

Iulo glabro affinis liuidis albisque circulis. Raj. Inf. 47.

Schaeff. Elem. tab. 73.

Habitat in Europae Corylo.

I. terrestri duplo maior.

stigma. 8. I. pedibus vtrinque 30, corpore atro, segmentis alternis vtrinque puncto calloso albo. Syst. Ent. 428. 7. *

Habitat in Coromandel. D. Koenig.

carnifex. 9. I. pedibus vtrinque 94, capite cauda linea dorsali pedibusque sanguineis. Syst. Ent. 428. 8. *

Schroet. Abh. 1. tab. 3. fig. 7.

Habitat in Coromandel. D. Koenig.

indus. 10. I. pedibus vtrinque 115. Syst. Ent. 428. 9. Linn. Syst. Nat. 2. 1065. 6. Mus. Lud. Vlr. 462. Mus. Adolph. Frid. 1. 90.

Iulus cylindricus fuscus pedibus rufis vtrinque 110. Degeer Inf. 7. 588. 1. tab. 43. fig. 7.

Gron. Zooph. 1008.

Seb. Mus. 1. tab. 81. fig. 5.

Petiv. Gazoph. tab. 74. fig. 3.

Habitat in Indiis.

Corpus ferrugineum vltimo segmento acuminato. Pedes lutei.

11. I. pedibus vtrinque 124. *Syst. Ent.* 428. 10. *Linn.* *fuscus*
Syst. Nat. 2. 1065. 7. *Amoen. acad.* 4. 253. 34.

Seb. Mus. 2. tab. 24. fig. 4. 5.

Habitat in Indiis.

12. I. pedibus vtrinque 134. *Syst. Ent.* 428. 11. *Linn.* *Syst. maximus*
Nat. 2. 1066. 8.

Vermis terrestris. *Margr. Bras.* 255.

Lift. It. 1699. tab. 5.

Habitat in America.

136. S C O L O P E N D R A.

1. S. pedibus vtrinque 12, corpore ovali, cauda penicillo albo. *Syst. Ent.* 429. 1. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 1062.
 1. *Fn. Sv.* 2063. *Geoff. Inf.* 2. 677. 6. tab. 22.
 fig. 4.

Iulus penicillatus corpore oblongo, fasciculis squamosis, cauda penicillo albo, pedibus vtrinque 12. *Degeer Inf.* 7. 571. 1. tab. 36. fig. 1. 2. 3.

Iulus lagurus. *Scop. carn.* 1152.

Att. par. miss. 1. 532. tab. 17. fig. 4 — 10.

Habitat sub Europae muscis.

2. S. pedibus vtrinque 14 elongatis, thorace scutellato. *coleoptrata*.
Syst. Ent. 429. 2.

Scolopendra coleoptrata pedibus vtrinque 14, thorace coleoptrato. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 1062. 2.

Iulus araneoides. *Pall. Spicil. Zool.* fasc. 9. 85. tab. 4.
 fig. 16.

Habitat in Europa australi.

forficata. 3. S. pedibus vtrinque 15. *Syst. Ent.* 429. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1062. 3. *Fn. Sv.* 2064. *Geoffroy Inf.* 2. 674. 1.

Scolopendra rufa fusca, pedibus vtrinque 15. *Degeer Inf.* 7. 557. 1. tab. 35. fig. 12.

Sulz. Inf. tab. 24. fig. 155.

Schaeff. Elem. tab. 3. fig. 1.

Habitat in Europa, America.

gigantea. 4. S. pedibus vtrinque 17. *Syst. Ent.* 429. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1063. 4.

Scolopendra maxima pedibus 36. *Brown. Iam.* 426. tab. 42. fig. 4.

Habitat in America.

Sequenti affinis, at multo maior.

morsitans. 5. S. pedibus vtrinque 20, oculis octo. *Syst. Ent.* 429. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1068. 5. *Amoen. acad.* 1. 325. 506.

Scolopendra pedibus vtrinque 21, posterioribus spinosiss. *Degeer Inf.* 7. 563. 1. tab. 43. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 14.

Schroet. Abhandl. 1. tab. 3. fig. 2.

Olear. Mus. tab. 12. fig. 5.

Petiv. Gazoph. tab. 13. fig. 3.

Bradl. nat. tab. 25. fig. 4.

Seb. Mus. 1. tab. 81. fig. 3. 4.

— — 2. tab. 25. fig. 3. 4.

Frisch. Inf. 2. tab. 2. fig. 5.

Catesb. Carol. 3. p. 2. tab. 2.

Habitat in Indiis.

ferruginea. 6. S. pedibus vtrinque 22. *Syst. Ent.* 430. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1068. 6.

Scolopendra pedibus vtrinque 23, posterioribus longissimis bispinosis. *Degeer Inf.* 7. 568. 2. tab. 43. fig. 6.

Habitat

Habitat in Africa.

Corpus ferrugineum pedibus luteis.

7. S. pedibus vtrinque 30, corpore fusco linea dorsali *dorsalis*.
ferruginea.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Teats.*

Corpus magnum, depresso corporis segmentis marginatis fuscis linea dorsali ferruginea. Pedes ferruginei.

8. S. pedibus vtrinque 30, corpore fusco scabro, capite *clypeata*.
clypeato.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Teats.*

Corpus praecedente minus constat segmentis 16 angustis, marginatis, fuscis, substriatis punctisque elevatis scabris. Caput antennis breuibus, pallidis, tegitur clypeo rotundato, integro. Cauda s. ultimum segmentum emarginatum. Pedes pallidi.

9. S. pedibus vtrinque 148. *Syst. Ent.* 430. 7. *Linn. Syst. Gabrielis.*
Nat. 2. 1063. 7.

Habitat in Italia.

Statura S. *electrica*, at quadruplo maior, tota depresso flauescens.

10. S. pedibus vtrinque 70, corpore linear. *Syst. Ent. electrica*
430. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1068. 8. *Fn. Sv.* 2065.
Geoff. Inf. 2. 676. 2.

Scolopendra flava, capite pedibusque vtrinque 54.
rufis. *Degeer Inf.* 7. 561. 2. tab. 35. fig. 17.

Aldr. Inf. 636. fig. 8.

Frisch. Inf. 2. tab. 8. fig. 1.

Raj. Inf. 45.

Habitat in Europae suffocatis, in tenebris phosphorea.

phospho- 11. *S. pedibus vtrinque 76.* *Syst. Ent.* 430. 9. *Linn. Syst. rea.* *Nat.* 2. 1064. 9.

Habitat in Asia, noctu instar lampyridis ignitae ex alto coelo decidua in nauem, in mari Indico et Aethiopico 100 milliaribus a continente. *Linn.*

occidenta- 12. *S. pedibus vtrinque 123.* *Syst. Ent.* 430. 10. *Linn. lis.* *Syst. Nat.* 2. 1064. 10.

List. It. 1699. tab. 6.

Habitat in America.

Corpus ferrugineum. Antennae articulis 14.

marina. 13. *S. pedibus - - - corpore pallido, linea dorsali rufa.* *Syst. Ent.* 430. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1064. 11. *It. Westrogoth.* 191.

Stroem. Sundm. 1. 160.

Habitat in Oceano Norwagico.

Clupearum harengum esca, vnde abdomen piscium rufescit, et corpus breui pubescit. *Stroem. loc. cit.*

137. T R O M B I D I V M.

tinctori- 1. *T. abdomine hirsuto rubro postice obtuso, tibiis anterioribus pallidioribus.* *Syst. Ent.* 430. 1.

Acarus tinctorius. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1025. 20.

Acarus araneoides. *Pall. Spicil. Zool.* fasc. 9. 42. tab. 3. fig. II.

Aranea hirsutissima, coccinea, abdomine ouato, pedibus breuibus. *Gron. Zooph.* fasc. 2. 218. 943.

Habitat in Guinea, Surinami.

Corpus vndique hirsutissimum, rubrum in spiritu vini albidum euadit.

holoseri- 2. *T. abdomine sanguineo depresso tomentoso, postice cereum.* *Syst. Ent.* 431. 2.

Acarus

Acarus holosericeus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1025. 22. *Fn.*
Sv. 1979.

Acarus terrestris ruber, abdomen depresso. *Geoff.*
Inf. 2. 624. 7.

Acarus holosericeus terrestris ruber quatus depresso
rugoso tomentosus, pedibus posticis remotis. *De-*
geer Inf. 7. 136. 22. *tab.* 8. *fig.* 12. 13.

Lift. Aranear. *fig.* 38.

Roef. Inf. 4. *tab.* 38.

Blankard. Inf. *tab.* 14. *fig.* 1.

Habitat in Europae, Americae siccis.

3. T. abdomen sanguineo depresso tomentoso, postice *aquati-*
cum, obtuso, aquaticus. *Syst. Ent.* 431. 3.

Acarus aquaticus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1025. 21. *Fn.*
Sv. 1978.

Acarus aquaticus ruber, abdomen depresso. *Geoff.*
Inf. 2. 625. 8.

Acarus aquaticus ruber, corpore subgloboso, tentacu-
lis longis, pedibus approximatis. *Degeer Inf.* 7. 141.
24. *tab.* 9. *fig.* 3. 4.

Frisch. Inf. 8. *tab.* 3.

Roef. Inf. 3. *tab.* 25.

Sulz. Inf. *tab.* 22. *fig.* 147.

Habitat in Europae aquis dulcibus, velociter natans,
qua rubra in nepis ponens.

4. T. abdomen fusco rufo maculato postice porrecto cy-
lindrico. *cauda-*
tum.

Acarus caudatus aquaticus subrotundus fuscus, rufo
maculatus, abdomine caudato cylindrico. *Degeer*
Inf. 7. 159. 23. *tab.* 9. *fig.* 1.

Habitat in Europae aquis celerrime natans.

5. T. fuscum, corpore globoso, pedibus rubris. *globosum.*

Acarus aquaticus globosus aquaticus rubro fuscus, cor-
L 14 pore

pore globoso, tentaculis brevioribus, pedibus rubris approximatis. *Degeer Inf.* 7. 146. 25. tab. 9 fig. 11.

Habitat in Europae aquis.

Conf. *Acarus aquaticus maculatus aquaticus fuscus*
macula rubra, corpore globoso, tentaculis brevioribus crassis, pedibus viridi griseis approximatis
Degeer Inf. 7. 146. 26. tab. 9. fig. 13.

138. A R A N E A.

* Oculis ::::

extensa. 1. A. abdomine longo argenteo virescente, pedibus longitudinaliter extensis. *Syst. Ent.* 431. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1033. 22. *Fn. Sv.* 2011.

Aranea retiaria, abdomine elongato griseo fuscō, pedibus longitudinaliter extensis. *Degeer Inf.* 7. 236. 10.

Geoff. Inf. 2. 642 3.

Raj. Inf. 19. 3.

Lift. Aran. fig. 3.

Habitat in uliginosis, sylvaticis.

lobata. 2. A. abdomine ouato lobato albo, apice lineis geminatis fuscis.

Aranea lobata. *Pall. Spicil. Zoolog.* fasc. 9. 46. tab. 3. fig. 14. 15.

Araneoides capensis. *Petiv. Gazoph.* tab. 12. fig. 11. ¶ Habitat - - - - -

longima. 3. A. abdomine longo cylindrico fuscō, pedibus anticis longissimis.

Habitat Cajennae. *Mus. Dr. Hunter.*

Corpus obscure ferrugineum abdomine cylindrico subtilloso, elongato fuscō. Mandibulae elongatae cylindricae, apice vnguiculatae. Pedes antici longissimi, tertii paris brevissimi.

A. abdomine globoſo gibbo, ambitu ſexdentato. *Syst. cancriformis.*
Ent. 431. 2.

Aranea cancriformis abdomen ſemiorbiculato, ambitu ſexdentato. *Linn. Syst. Nat. 2. 1037. 45*

Araneus cancriformis campeſtris reticulum spirale nectens. *Sloan. Iam. 2. 197. tab 235. fig. 45.*

Aranea nigra cancriformis Brown. Iam. 419. tab. 44.
fig. 5.

Slubber. obs. microſc. tab. i.

Habitat in America.

A. atra, abdomen cinerascente, linea dorsali atra in- *latens.*
terrupta. *Syst. Ent. 432. 3. **

Habitat in Anglia, latitans ſub paruo reticulo in folio-
rum pagina superiori.

A. virescens thoracis lateribus abdominalisque lineis *signata.*
duabus nigris. *Gen. Inf. Mant. 249. **

Habitat in nemoribus Kiloniensibus, capt. d. II. Jul.

A. abdomine ouato atro, linea dorsali coccinea *Syst. mattans.*
*Ent. 432. 4. **

Habitat in America boreali. *Dom. Lewin.*

Aliam vidi ſimillimam, at paullo maiorem, abdomi-
ne punctis duorum parium anque coccineis.

A. atra, abdomen subtus punctis duobus testaceis. *nigrita.*
*Syst. Ent. 432. 5. **

Habitat in Saxonia.

** Oculis .:::

A. nigra, abdomen lateribus sanguineis. *Syst. Ent. globoſa.*
*432. 6. **

Habitat in pratis Lipsiensibus.

*** Oculis . . .

horrida. 10. A. abdomine subtriangulari apice truncato retuso pedibus quatuor anticis longioribus. *Syst. Ent.* 433. 7. *

Habitat Lipsiae in hortis.

latro. 11. A. thorace villoso cinereo, abdomine ouato atro ferrugineo maculato.

Habitat in America. *Dom. Blackburn.*

Magna Os pallidum. Thorax ouatus, pubescent, cinereus. Abdomen ouatum, atrum, ferrugineo maculatum. Pedes nigri femoribus pallidis.

viatica. 12. A. abdomine subrotundo plano obtuso, pedibus quatuor posticis breuissimis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1036. 43. *Fn. Sv.* 2024.

Aranea cancroides fusco marginata grisea s. fusca, abdomine ouato plano, fascia laterali nigro fusca lineaque nigro albida. *Degeer Ins.* 7. 301. 31. tab. 18. fig. 23.

Araneus subfuscus minutissimus oculis e viola purpura-scentibus, tardipes et gressu et figura cancro marino non adeo dissimilis. *List. Aran.* fig. 29.

Frisch. Ins. 7. tab. 5.

Schaeff. Icon. tab. 189. fig. 7.

Habitat in Europae hortis.

domestica. 13. A. abdomine ouato fusco, maculis nigris quinque subcontiguis, anterioribus maioribus. *Syst. Ent.* 433. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1031. 9. *Fn. Sv.* 2000.

Aranea domestica vestiaria griseo fusca, abdomine ouato tomentoso, maculis nigris marmorato. *Degeer Ins.* 7. 264. 19. tab. 15. fig. 11.

Aranea Derhamii. Scop. carn. 1104.

Raj Ins. 27. 17.

List. Aran. 59. fig. 17.

Clerk. Aran. 76. tab. 2. fig. 9.

Habitat in Europae fenestris et domibus.

1. A. viridis, abdominis dorso fusco. Gen. Inf. Mantis. dorsata.

249. *

Habitat in nemoribus Kiloniensibus.

2. A. nigra, abdomine ouato, punctis sex impressis impressa.
subtus punctis duobus flavis. It. Norwag. d. 14.

Aug. *

Habitat in Norwagiae rupibus, d. 14. August.

3. A. abdomine rhomboide depresso nigro maculato, laeuipes.
pedibus extensis variegatis. Linn. Syst. Nat. 2. 1037.

44. Fn. Sv. 2025.

Aranea cancrioides tigrina abdomine obtuso plano al-
bido, maculis nigris, pedibus posticis quatuor bre-
uioribus. Degeer Inf. 7. 302. 32. tab. 18. fig. 25.

Araneus margaritatus. Clerk. Aran. tab. 6. fig. 3.

Frißch. Inf. 10. tab. 14.

Habitat in Europae muris.

17. A. virescens, abdomine albo, ano rufescente. Syst. tricuspi-
data. Ent. 433. 9. *

Habitat in Lipsiae hortis.

**** Oculis : :

18. A. abdomine albo postice fusco, ambitu sexdentato. argenta-
ta. Syst. Ent. 433. 10. *

Habitat in Indiis.

***** Oculis : :

19. A. argentea, abdomine fasciis flavescentibus, pedi-fasciata.
bus fusco annulatis. Syst. Ent. 433. 11. *
Habitat in Madera Insula. Mus. Dom. Banks.

20. A. abdomine ouato, antice lateribus angulato acuto, angulata.
thoracis centro excavato. Syst. Ent. 434. 12. Linn.
Syst. Nat. 2. 1031. 8. Fn. Sv. 1999.

Ara-

Aranea retiaria, abdomine ouato nigro, supra tuberculis magnis conicis nigris. *Degeer Inf.* 7. 221. tab. 12. fig. 1.

Clerk. Aran. tab. 1. fig. 1.

Habitat in arboribus rete perpendiculari.
Colore variat.

diadema. 21. A. abdomine subgloboso rubro fusco, cruce albo-punctata. *Syst. Ent.* 434. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 103c. 1. *Fn. Sv.* 1993.

Aranea cruciger retiaria, abdomine subgloboso fuscus vel rufo tuberculis duobus, cruce dorsali triplici albo punctata. *Degeer. Inf.* 7. 218. 1. tab. 11. fig. 3.

Aranea Linnaei. *Scop. carn.* 1077.

Mouff. Inf. 233. fig. 1.

Aldrov. Inf. 608. fig. 9.

Ionst. Inf. tab. 18. fig. 17. 19. 20.

Raj. Inf. 18. 2.

Lift. aran. fig. 2.

Frisch. Inf. 7. tab. 4.

Clerk. Aran. tab. 21. fig. 2.

Shaeff. Elem. tab. 21. fig. 2.

--- *Icon.* tab. 19. fig. 9.

Habitat in Europae arboribus.

marmoreo- 22. A. fusca, abdomine ouato fusco alboque variegato. *Syst. Ent.* 434. 14. *

Clerk. Aran. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Europa, nidum in fruticibus et graminibus struens attractis insectorum cadaueribus.

4punctata- 23. A. abdominis dorso plano nigro, punctis excavatis quatuor. *Syst. Ent.* 434. 15.

Aranea 4punctata abdomine oblongo nigro, punctis excavatis quatuor. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1034. 28.

Fn. Sv. 2014. *It. Oel.* 34.

Habitat in Europae domibus.

militaris. 24. A. spinis dorsalibus quatuor, posticis longioribus patentibus. *Syst. Ent.* 434. 16. *

Habi-

Habitat in America. Dom. v. Rohr.

A. spinis dorsalibus octonis, posticis duabus patentibus, abdomine subtus conico. *Syst. Ent.* 435. 17.
spinosa.
Linn. Syst. Nat. 2. 1037. 47.

Aranea triangulari spinosa retiaria, abdomine triangulari, spinis octonis, binis anticis horizontalibus, posticis duabus magnis diuergentibus. Degeer Ins.
7. 321. 6. tab. 39. fig. 9. 10.

Habitat in America.

A. spinis dorsalibus sex, posticis patentibus. *Syst. aculeata.*
Ent. 435. 18. *

Aranea elongato spinosa retiaria, abdomine oblongo, supra rugoso, spinis octonis magnis, anticis sex eretis, posticis binis patentibus diuergentibus. Degeer Ins.
7. 323. 7. tab. 39. fig. 11. 12.

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

A. abdomine globoso, ambitu quadridentato. *Syst. tetracantha.*
Ent. 435. 19. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 1037. 45.
Pall. Spicil. Zool. fasc. 9. 49. *tab. 3. fig. 16.* 17.

Habitat in Americae insulis.

8. A. abdomine transuerso, ambitu sexdentato. *hexacantha.*
Brown. Iam. *tab. 44. fig. 5.*

Habitat in Jamaica insula.

Affinis A. tetracanthe, at spinae vtrinque duae et postice duae. Margo abdominis anticus punctatus.

9. A. abdomine vtrinque fornicato, bispinoso spinis fornicata. posterioribus longioribus. *Syst. Ent.* 435. 20. *
posterioribus longioribus. Syst. Ent. 435. 20. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

10. A. abdomine ouato fusco, linea exalbida pinnata. *labyrinthica.*
Syst. Ent. 435. 21. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1031. 12. *Fn.* *labyrinthica.*
Sv. 2003.

Clerk. Aran. 79. *tab. 2. fig. 8.*

Raj. Ins. 27. 18.

List. Aran. 60. *fig. 18.*

Schaeff.

Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 8.

Habitat in Europae terra, tela horizontali cum puto cylindrico.

palustris. 31. A. fusca, thorace abdomineque vtrinque linea nivea.

Aranea palustris abdomen oblongo nebuloso, lineis lateralibus albis. *Linn. Syst. Nat. 2. 1036. 41. Fn. Sv. 2023.*

Habitat in paludibus caespitosis, capt. Fridrichsdaliae prope Hafniam.

Affinis A. fimbriatae, at oculorum situs omnino differt.

Apex thoracis ante oculos terminatur linea nivea.

aquatica. 32. A. fusca, abdomine ouato cinereo, dorso fuso, punctis duobus impressis. *Syst. Ent. 436. 22.*

Aranea aquatica linida, abdomine ouato, linea transversa punctisque duobus excavatis. *Linn. Syst. Nat. 2. 1036. 39. Fn. Sv. 2020.*

Aranea aquatica tota fusca. *Geoff. Inf. 2. 644. 7.*?

Aranea aquatica nigra siue nigro fusca. *Degeer Inf. 7. 303. 33. tab. 19. fig. 5.*

Clerk. Aran. 143. tab. 6. fig. 8.

Habitat in Europae aquis dulcibus vrinatoria. Hybernatur in cochleis, quas rete artificioso claudit.

Mandibulae atrae vnguis sanguineis.

trigutta- 33. A. flauescens, abdomine nigro, maculis tribus albis. *ta.* *Syst. Ent. 436. 23.**

Habitat in Alsatia, capta tempore autumnali in foliis Viburni. *Prof. Hermann.*

scorpifor- 34. A. nigra, abdomine albicante, lineis duabus nigris, mis. pedibus quatuor anticis longissimis. *Syst. Ent. 436. 24.**

Habitat in Lipsiae hortis, laterigrada.

sexpunctata. 35. A. abddomine oblongo, punctorum excavatorum paribus tribus. *Syst. Ent. 436. 25. Linn. Syst. Nat. 2. 1033. 24. Fn. Sv. 2013.*

Habitat in Europae sylvis.

5. A. ferruginea abdome cinereo, linea dorsali fusca. *carnifex.*
*Syst. Ent. 436. 26. **
 Habitat in Angliae nemoribus.

***** Oculis .::.

7. A. abdomine oblongo, tibiis excepto tertio pari clauipes.
 uatis villosis. *Syst. Ent. 437. 27. Linn. Syst. Nat.*
 2. 1034. 24.

Aranea fasciculata retiaria, abdome oblongo, ante gibbo, thoracis medio spinis duabus erectis nigris extremitate villosis. *Deger Inf. 7. 316. 2. tab.*
 39. fig. 1.

Aranea oblonga luteo variegata, pedibus longissimis articulis inferioribus tumidis hirsutis. *Brown.*
Jam. 419. tab. 44. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

Abdomen flavum, albo punctatum.

38. A. abdome ouato ferrugineo fusco. *Syst. Ent. 437. saccata.*
 28. *Linn. Syst. Nat. 2. 1036. 40. Fn. Sv. 2021.*
Lift. Aran. 82. fig. 28.
Frisch. Inf. 8. tab. 2.
Clerk. Aran. tab. 4. fig. 5.

Habitat in Europae hortis, ouorum saccum circumferens.

Pedes liuidi annulis fuscis confertis, inaequalibus.

39. A. abdome ouato fusco, basi punctis duobus albis. *fumigata.*
Syst. Ent. 437. 29. Linn. Syst. Nat. 2. 1032. 16. Fn.
Sv. 2006.
Clerk. Aran. tab. 5. fig. 6.

Habitat in campis, ante laruarum nidum incubans,
 quas vnam post alteram prehendit & exsugit.

***** Oculis :::

40. A. nigra linea laterali alba. *Syst. Ent. 437. 30. fimbriata.*
Aranea fimbriata abdome oblongo nigro, linea
 vtrin-

vtrinque laterali alba. *Linn. Syst. Nat. 2. 1035. 2.
Fn. Sv. 2012.*

Aranea lupus paludosa corpore oblongo fusco, thorace abdomineque fascia vtrinque laterali alba, pedibus fuscis. *Degeer Inf. 7. 278. 23. tab. 16. fig. 10.*

Aranea tota cinereo villosa, thoracis linea triplici, abdominali. *Geoff. Inf. 2. 650. 15.*

Clerk. Aran. tab. 5. fig. 9.

Habitat in Europae paludibus caespitosis.

dorsalis. 41. A. atra, thorace linea dorsali alba. *Syst. Ent. 438.
31. **

Habitat in Anglia.

scenica. 42. A. saliens nigra, striis tribus semicircularibus albis. *Syst. Ent. 438. 32. Linn. Syst. Nat. 2. 1035. 34. Fn. Sv. 2017.*

Aranea phalangium albo fasciata nigra, abdomine oblongo, fasciis tribus albis transuersis semicircularibus. *Degeer Inf. 7. 287. 27. tab. 17. fig. 8. 9.*

Aranea saliens nigra, abdomine vtrinque lineis tribus albis, ad angulum acutum coeuntibus. *Geoff. Inf. 2. 650. 16.*

List. Aran. fig. 31.

Raj. Inf. 37. 31.

Bradl. nat. tab. 24. fig. 5.

Clerk. Aran. tab. 5. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 11.

Habitat in Europae parietibus.

pubescens. 43. A. abdomine ouato fusco, maculis quatuor cinereis, posticis maioribus. *Syst. Ent. 438. 33. **

Habitat Lipsiae in hortis.

cinerea. 44. A. cinerea, abdominis dorso fusco, punctis octo cinereis. *Gen. Inf. Mant. 249. **

Habitat ad littora sinus Kiloniensis.

6. A. abdominis dorso maculis trigonis nigris, pedibus Tarantu-
nigro maculatis. *Syst. Ent.* 438. 34. *la.*

Aranea Tarantula subtus atra, pedibus subtus atro
fasciatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1035. 35.

Tarantola. *Bocc. Mus.* 1. 101. tab. 2.

Albin. Aran. 64. tab. 38.

Bradl. nat. tab. 24. fig. 10.

Olear. Mus. 21. tab. 12. fig. 4.

Habitat in Europa australi.

***** Oculis :::

6. A. thorace orbiculato conuexo, centro transuerse auicula-
excauato. *Syst. Ent.* 438. 35. *Linn. Syst. Nat.* 2. ria.
1034. 31. *Mus. Lud. Vlr.* 428.

Aranea vestiaria hirsutissima nigro fusca siue rufescens,
plantis amplis tomentosis. *Deger Inf.* 7. 313. 1. tab. 38.
fig. 8.

Linn. Amoen. acad. 1. 323.

Laet. americ. tab. 570.

Worm. Mus. tab. 244.

Seb. Mus. 1. tab. 69. fig. 2. 3.

Olear. Mus. tab. 17. fig. 3.

Merian. Sur. tab. 18.

Roef. Inf. 3. tab. 11.

Habitat in America, insidiatur auiculis, insectis.

***** Oculis tantum senis :::

7. A. virescens, abdominis dorso late sanguineo. *Gen. myopa.*
Inf. Mant. 250. *

Habitat in praedio Eckhoff prope Kiel.

8. A. atra, abdomine cylindrico fusco, punctis sex im- longipes.
pressis, pedibus longissimis.

Habitat in Australasia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum, atrum. Mandibulae dentatae apice
vnguiculatae. Palpi basi ferruginei apice nigri. Ab-
Fabr. Spec. Inf. M m domen

domen cylindricum fuscum punctis trium parium dorsalibus impressis nigris. Pedes in primis anteriore elongati, nigri.

senocula- 49. A. abdomine virescente, lateribus flavis. *Syst. Ent.* *ta.* 439. 36. *

Aranea senoculata oculis tantum senis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1034. 30. *Fn. Sv.* 2036.

Aranea senoculata textoria, abdomine ouato oblong griseo, fascia longitudinali laciniosa fusca, thorac fusco. *Degeer Ins.* 7. 258. 18. tab. 15. fig. 5.

Lister. aran. 74. fig. 24.

Raj. Ins. 32. 24.

Habitat in Germaniae hortis.

scopulo- 50. A. abdomine fusco, linea dorsali pinnata alba. *I-* *rum.* *Norie.* d. 3. August.

Habitat in rupibus Norwagiae submarinis, capt. d. August.

luca. 51. A. pallida, abdomine argenteo, lineis ramosis nigri. *Syst. Ent.* 439. 37. *

Habitat in Coromandel. *D. Koenig.*

† Oculis -----

cruenta- 52. A. atra, abdomine fascia baseos flava, pectore sa-
ta. guineo. *Syst. Ent.* 439. 38. *

Habitat ad Rio Ianeiro Brasiliac. *Mus. Dom. Banks.*

venato- 53. A. thorace orbiculato glabro, atro, abdomine ouato pi-
ria. besciente fusco. *Syst. Ent.* 439. 39.

Aranea venatoria subhirsuta, thorace orbiculato co-
uexo, abdomine ouato magnitudine thoracis. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 1035. 33.

Aranea cornuta. *Pall. Spic. Zool.* fasc. 9. 45. tab.
fig. 13.?

Gron. Zooph. 2. 217.

Merian. Surin. tab. 18.

Sloan

Sloan. *Iam.* 2. 181. tab. 235. fig. 1. 2.

Brown. *Iam.* 420. tab. 44. fig. 2.

Habitat in America. Nidum struit cylindricum, tenacem longitudine pedis, superne operculo claudendum.

4. A. capite antice tridentato, abdomine spinosissimo. *Tribulus.*

Habitat ad Cap. bon. spei. *Mus. Dr. Schulz.*

Corpus medium griseum punctis eleuatis scabrum. Caput antice denticulis tribus ferrugineis, intermedio obtusiore. Abdomen ouatum vndique spinis erectis elongatis validis, anterioribus quibusdam bifidis.

139. PHALANGIUM.

1. P. corpore ouato atro, subtus pedumque basi pallidis. *morio.*

It. Norwag. d. 9. Aug. *

Habitat in Norwegiae rupibus. Capt. d. 9. Aug.

2. P. abdomine ouato griseo subtus albo. *Syst. Ent.* 440. *opilio.*

2. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1027. 2. *Fn. Sv.* 1992.

Phalangium parietinum corpore ouato, supra griseo fusco, subtus albido. *Degeer Inf.* 7. 166. 1. tab. 10. fig. 1.

Araneus rufus non cristatus. *Raj. Inf.* 40. 35.

Goed. Inf. 2. tab. 49.

Mouff. Inf. 234. fig. 4.

Hoffnag. Inf. 2. tab. 9.

Bradl. nat. tab. 24. fig. 2.

Clerk. Aran. tab. 6. fig. 10. 3.

Sulz. Inf. tab. 22. fig. 140.

Habitat in America, Europa, nocte vagatur.

3. P. abdomine depresso, mandibula conica adscendente, *cornutum*. palpis pediformibus. *Syst. Ent.* 440. 3.

Phalangium cornutum abdomine depresso, rostro bicorni, palpis pediformibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1028. 3.

Phalangium corpore ouato supra griseo fuscō, fascia nigra, subtus albo, tentaculis longissimis, chelis cornutis. *Degeer Inf.* 7. 173. 2. tab. 10. fig. 12.

Phalangium. Geoff. Inf. 2. 629. 1. tab. 20. fig. 6.

Araneus cinereus cristatus. *Raj. Inf.* 39. 35.

Schaeff. Elem. tab. 13. fig. 9.

— *Icon.* tab. 39. fig. 13.

Habitat in Europa, Anglia.

bilineata. 4. *P. pallidum, lineis duabus dorsalibus punctatis atris.*
tum. *It. Norwag.* d. 14. Aug.

Habitat in Norwagiae rupibus submarinis, capt. d. 14.
Aug. Forte mera *P. opilionis* varietas.

diadema. 5. *P. thoracis tuberculo dorsali eleuato spinoso.* *It. Nor-*
wag. d. 9. Aug.

Phalangium corpore ouato, tuberculo thoracis spinoso. *Stroem. Act. Hafn.* 9. 583. tab. 6.

Müll. Zool. Dan. prodr. Add. 280 192.

Habitat sub muscis rupium Norwagiae.

Tuberculum dorsale elevatum apice spinosum vtrinque oculo magno instructum.

bimacula. 6. *P. abdomine atro, maculis duabus albis.* *Syst. Ent.*
tum. 440. 4. *

Habitat in Anglia, capt. d. 6. Maj. in Norwagia capt. d. 4. August.

cauda- 7. *P. chelis ramosis, ano setifero.* *Syst. Ent.* 441. 5.
tum. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1029. 8. *Mus. Lud. Ulr.* 426.

Scerpio. Gronov. Zooph. 952.

Pall. Spicil. Zool. fasc. 9. 30. tab. 3. fig. 1. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 29. fig. 11.

Seb. Mus. 1. tab. 70. fig. 7. 8.

Habitat in India orientali.

reniforme. 8. *P. brachiis dentatis, pedibus primis longissimis filiformibus, thorace reniformi.* *Syst. Ent.* 441. 6. *Linn.*

Syst. Nat. 2. 1029. 9. *Luf. Mud. Ulr.* 427.

Phalangium palpis longissimis crassis. Gronov. *Zooph.*

935.

Tarantula fusca maior, pedibus anterioribus crassioribus aculeatis et vnguiculatis, fere cheliformibus proximis longissimis et tenuissimis. Brown. *Iam.* 409. tab. 11. fig. 3.

Cancellus araneoides. Pet. pteriog. tab. 20. fig. 12.

Pall. *Spicil. Zoolog.* fasc. 9. 34. tab. 3. fig. 3.

Blanc. *theat. Inf.* tab. 17. B.

Habitat in America meridionali.

P. brachiis longissimis apice spinosis, thorace reniformi. lunatum.

Phalangium lunatum. Pall. *Spicil. Zoolog.* fasc. 9.

32. tab. 3. fig. 5. 6.

Habitat in America meridionali.

Paullo praecedente minor, at latior. Brachia corpore quadruplo longiora, laevia apice tantum multispinosa.

. P. chelis dentatis villosis, corpore oblongo. araneoides.

Phalangium araneoides. Pall. *Spicil. Zoolog.* fasc. 9. 37. tab. 3. fig. 7. 8. 9.

Proscarabaeoides capensis pedibus plumosis. Petiv. *Zooph.* tab. 85. fig. 9.

Habitat ad Cap. bon. spei.

Species 7-10 nondum rite examinatae. Chelae oris a palpi, a mandibulae. Si palpi, ad Scorpiones emendanda, si mandibulae ad hoc genus pertinebunt. Forte vero proprii generis Infecta, in primis *P. araneoides* a reliquis differre videtur,

140. S C O R P I O.

australa- 1. *S. pectinibus 6dentatis, manibus laeibus.* *Syst. Ent. fiae.* 399. 1. *

Habitat in Insulis Oceani pacifici. *Mus. Dom. Banks*

maurus. 2. *S. pectinibus 8 dentatis, manibus subcordatis punctatis.* *Syst. Ent.* 399. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1037. 1

Scorpio senoculus pectinibus 8dentatis, manibus ouatis, cauda corpore breuiore, aculeo simplici. *Degeer Ins.* 7. 337. 1. tab. 40. fig. 1.

Habitat in Africa.

afer. 3. *S. pectinibus 13dentatis, manibus subcordatis pilosis*
Syst. Ent. 399. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1038. 3
Mus. Lud. Ulr. 429.

Scorpio Indus octonoculus pectinibus 13dentatis, manibus ouatis scabris, cauda corporis fere longitudine aculeo simplici. *Degeer Ins.* 7. 341. 3.

Swammerd. Bibl. Nat. tab. 3. fig. 3.
 — — — quart. tab. 6.

Seb. Mus. 1. tab. 70. fig. 4.

Petiv. Gazoph. tab. 13. fig. 2.

Roef. Ins. 3. tab. 65.

Habitat in India.

america-nus. 4. *S. pectinibus 14dentatis, manibus subciliatis, digiti filiformibus.* *Syst. Ent.* 399. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1038. 4.

Scorpio maculatus octonoculus, fusco maculatus pectinibus 18dentatis, brachiis manibusque longissimi subulatis, digitis filiformibus, cauda longissima, aculeo basi mucronato. *Degeer Ins.* 7. 346. 6. tab. 41. fig. 9. 10.

Roef. Ins. 3. tab. 66. fig. 5.

Sulz. Hist. Ins. tab. 30. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

S. pectinibus 18dentatis, manibus angulatis. *Syst. euro-*
Ent. 399. 5. Linn. Syst. Nat. 2. 1038. 5. Mus. paeus.
Lud. Ulr. 429.

Scorpio octonoculus fuscus, pectinibus 18dentatis,
manibus elongatis, digitis filiformibus, cauda cor-
pore longiori, aculeo basi mucronato. *Degeer Inf.*
7. 344. 5. tab. 41. fig. 5.

Mouff. Inf. 204.

Raj. Inf. 9.

Schaeff. Elem. tab. 113.

Aldr. Inf. 517.

Roeß. Inf. 3. tab. 66. fig. 1. 2.

Sulz. Inf. tab. 23. fig. 150.

Habitat in Europa australiori.

S. pectinibus 32dentatis, manibus laeuis. *Syst. australis.*
Ent. 400. 6. Linn. Syst. Nat. 2. 1038. 6.

Scorpio octonoculus fuscus, pedibus rufis, pectinibus
30dentatis. manibus elongatis rufis, digitis filifor-
mibus, cauda corpore longiori, aculeo basi mucro-
nato. *Degeer Inf. 7. 348. 8. tab. 41. fig. 5.*

Habitat in Africa.

S. abdomine ecaudato ouato depresso fusco. *Syst. cancroi-*
Ent. 400. 7. des.

Phalangium cancrioides abdomine obouato depresso,
chelis laeuis, digitis pilosis. *Linn. Syst. Nat.*
2. 1028. 4. Fn. Sv. 1968.

Chelifer abdomine lineis transversis. *Geoff. Inf. 2.*
618. 1.

Chelifer europaeus, obscure fuscus, corpore ouato de-
presso, chelis elongatis. *Degeer Inf. 7. 355. 2.*
tab. 19. fig. 14.

Seb. Mus. 1. tab. 70. fig. 11.

Roeß.

Roes. Inf. 3. tab. 64.

Sulz. Hist. Inf. tab. 29. fig. 11.

Frisch. Inf. 8. tab. 1.

Schaeff. Elem. tab. 38.

Clerk. Aran. tab. 6. fig. 10.

Habitat in Europae vmbrosis, suffocatis.


Retrogradus vicitat Hemerobio pulsatorio, Acaris.

acaroides. 8. S. abdomine ecaudato cylindrico flauescente.

Phalangium acaroides abdomine cylindrico, cheli laeibus, capite appendiculato. *Linn. Syst. Nat. 2. 1028. 5.*

Chelifer americanus, corpore cylindrico flauescente thorace chelisque obouatis fusco castaneis. *Degeer Inf. 7. 353. 1. tab. 42. fig. 1. 2.*

Habitat in Americae meridionalis suffocatis.



81 182 ③

17. IV. 78

